



54
ji 15

M.M.ABDULXAYEVA

KIMYO

*Oliy o'quv yurtiga kiruvchilar, akademik
litsey va kasb-hunar kollejlari uchun
o'quv qo'llanma*



VIIY ELEMENTLAR DAVRIY JADVALI

G R U P P A L A R I															
VIII															
H															
O	F														
S	Cl														
Mn	Fe	Co	Ni												
Sc	Br														
Tc	Ru	Rh	Pd												
Fe	I														
Rc	Os	Ir	Pt												
Po	At														
Bh	Hs	Mt													
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	(No)	(Lr)		

M.M.ABDULXAYEVA

KIMYO

Oliy o'quv yurtiga kiruvchilar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun o'quv qo'llanma

TOSHKENT
"TIB-KITOB" NASHRIYOTI
2011

UDK 54(075)

Taqrizchilar: - kimyo fanlari doktori, professor
A.A. Yo'lchiboyev
- kimyo fanlari nomzodi
T.S.Xoliqov

Abdulg'ayeva M.M.

A15 Kimyo: oliy o'quv yurtiga kiruvchilar, akademik litsey
va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun o'quv qo'l.
/ M.M. Abdulg'ayeva. - T.: Tib-kitob nashriyoti, 2011.
- 608 b.

BBK 24ya729

Mazkur qo'llanma Kimyo fanidan akademik litseylar (AL) va kasb-hunar kollejlari (KHK) uchun o'quv dasturi asosida yozilgan bo'lib, u umumiy o'rta ta'lim maktablarida olingan bilimlarni chuqurlashtirish uchun xizmat qiladi.

Qo'llanmada kimyoning asosiy tushunchalari va qonunlari, kimyoviy elementlar davriy jadvali, uning mohiyati, eritmalar, oksidlanish-qaytarilish jarayonlari, koordinatsion birikmalar to'g'risida, shuningdek, anorganik moddalar, ularning olinishi, xossalari, ishlatilishi, kimyoviy ishlab chiqarish texnologiyasi, respublikamizda kimyo sanoati erishgan yutuqlar, kimyoviy ishlab chiqarishning ekologiyaga ta'siri haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Jumladan, kimyo sanoatida ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan ko'pchilik moddalarning olinish texnologiyasi, respublikamizda mavjud bo'lgan xomashyo turlari va manbalari to'g'risidagi ma'lumotlar, xomashyo va qazilma boyliklarni qayta ishlash va boyitish jarayonlari, ishlab chiqarish qonuniyatlari haqidagi keng ma'lumotlar berilgan.

Qo'llanmada har bir mavzuni yoritishda yangiliklar, O'zbekiston kimyo sanoatini rivojlantirish muammolari, o'zbek kimyogar olimlari erishgan yutuqlar to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Yuqori molekulyar birikmalar — polimerlar, sun'iy va sintetik tolalar mavzularini yoritishda, fanning so'nggi yutuqlari va shu sohada o'zbek kimyogarlari olib borayotgan ilmiy izlanishlar haqidagi ma'lumotlar o'z aksini topgan. Shu bilan birga, o'z hayotini fanga bag'ishlagan o'zbek kimyogar olimlari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Qo'llanmadan asosan AL va KHK talabalari, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun tayyorlanayotgan abituriyentlar, shuningdek, o'qituvchilar foydalanishlari va o'zlarini qiziqitgan ma'lumotlarni olishlari mumkin.

ISBN 978-9943-348-1313-4

78815

© "UNIVERSAL TADQIQOTCHI" MCHJ, 2011 y.
© Abdulg'ayeva Maxsuda Muxammadjanovna, 2011 y.
© "TIB-KITOB" nashriyoti, 2011 y.

3a

SO'Z BOSHI

E'tiboringizga havola etilayotgan mazkur o'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlar, akademik litseylar (AL) va kasb-hunar kollejlari (KHK) talabalari, maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Qo'llanma umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfini tugatgan, kimyoning boshlang'ich tushunchalari bo'yicha ma'lum darajada bilimga ega bo'lgan o'quvchilarga umumiy, anorganik va organik kimyodan bilim olishlariga yordam beradi.

Qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'quv dasturi bo'yicha yozilgan va AL va KHK lar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan "Kimyo" darsligi (M.Abdulxayeva, O'.Mardonov) asosida yozilgan bo'lib, uni qayta ishlash, yangi ma'lumotlar bilan to'ldirish, test va masalalar yechish bo'yicha ko'proq yo'nalishlar berish orqali yanada mukammallashtirilgan.

Bu abituriyentlarning olingan nazariy bilimlarni masalalar yechish uchun qo'llashlarida, testlar javobini to'g'ri topishga o'rganishlarida muhimdir.

Qo'llanmada mavzular bo'yicha mustaqil tayyorlanish uchun savollar, masalalar va ularni yechish yo'llari batafsil berilgan.

Muallif qo'llanmaning yaratilishida o'zining qimmatli maslahatlari bilan yaqindan yordam bergan kimyo fanlari doktori, professor A. A. Yo'lchiboyevga va kimyo fani o'qituvchisi P.N.Mirzayevga, shuningdek, kitobni qisqa muddatda nashrga tayyorlashda katta yordam bergan Kan Arturga chuqur minnatdorlik bildiradi.

I bob

KIMYO FANI VA UNING PREDMETI

Tabiatda inson paydo bo'lishi bilan unda tabiatni, atrof muhitni o'rganish va undan foydalanish ko'nikmalari paydo bo'lgan. Hayot sharoitlarining o'zgarishi, insonning o'zi va atrof muhitni o'rab turgan borliqlar bilan o'zaro ta'riflash natijasida tabiat va jamiyat to'g'risidagi fanlar kelib chiqqan. Shunday tabiiy fanlar qatoriga kimyo fani ham kiradi. Kimyo fani atrofda bo'lgan barcha hodisalarni o'rganish va ularni qayta yaratishdir.

Kimyo fani atrofdagi barcha borliqni, uni tashkil etgan taqismlarni moddalardan iborat deb qaraydi. Moddalarni o'rganish borliqni o'rganadi.

Shu sababli kimyo — moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossal-
 ularning bir turdan boshqa turga aylanishi sababi va qonuniyat-
 o'rganadigan fan. Kimyo fanining predmeti (o'rganadigan ob'ek-
 t) moddadir.

Kimyo sanoat to'g'risidagi fandir

Kimyo fani boshqa fanlardan shunisi bilan farq qiladiki, bu fan natijalari aniq ishlab chiqarish (kimyo sanoati) sohalarida qo'llaniladi. Kimyo fanning bu sohasi kimyoviy texnologiya deb nomlanadi. Kimyoviy texnologiya kimyo fanining chuqur ilmiy tekshirishlar natijasida ishlab chiqilgan uslub, qonuniyatlar va iqtisodiy hisoblashlarga tayangan bilimlar to'g'risida xalq xo'jaligida foydalaniladigan kimyoviy moddalar ishlab chiqarish usullarini o'rganish bo'limidir.

Mavjud kimyoviy texnologik jarayonlar kimyo fanining sanoat ekanligini ko'rsatadi va oziq-ovqat, yengil va to'qimachilik, kimyo o'g'itlar, sintetik polimerlar, sintetik yuvish vositalari, metallurgiya, va gazni qayta ishlash sanoati va dori-darmonlar ishlab chiqarishni ichiga oladi.

Kimyo fanini o'rganishdagi ilmiy uslublar

Kimyo fanini o'rganishda quyidagi bilishning ilmiy uslublaridan foydalaniladi.

Biror kimyoviy muammoni o'rganish va uning yechimini topish avvalo muammoga taalluqli kuzatish va tadqiqotlar olib borilib, ma'lumot yig'iladi. Dalillar asosida u yoki bu hodisa (o'zgarish)lar orasida o'zaro bog'lanish va qonuniyatlar borligi aniqlanib, oxirida yagona xulosaga kelinadi, ya'ni umumlashtiriladi. Moddalar massasining saqlanish qonun tarkibning doimiylik qonuni, Avogadro qonuni, Gund qonuni, Faraday qonunlari shular qatoriga kiradi. Bunga dunyoni (borliqni) bilishni **induktiv bilish usuli** deyiladi. Misol sifatida moddalar massasining saqlanish

ni, tarkibning doimiylik qonuni, Avogadro qonuni, Faradey qonunini
ish mumkin.

Umumiy xulosa aytilib, so'ngra bu xulosaning qanchalik hayotiyligini tekshirish uchun zarur tajribalar olib boriladi. Bu **deduktiv bilish usuli** bo'lib, kimyo fanida bunday usullardan ko'p foydalaniladi. Masalan, davriy qonun kashf qilinib, hozirga qadar bu qonun qanchalik hayotiy ekanligi ko'p sonli tajriba va yangi elementlar kashf etilishi bilan tekshirilgan bo'lsa, bunday xulosalarda ham qonunlar — qonun, gipoteza (faraz).

Kimyoni o'rganishda ilmiy uslublar — qonun, gipoteza (faraz),
ariya, ta'limotlardan foydalaniladi.

Kimyoviy qonunlar — kimyoviy jarayonlar ro'y berganda dalillar asosida topilgan (yoki aytilgan) ilmiy xulosadir. Kimyoviy qonunlar — ko'p kimyoviy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan talab as, aksincha, shu o'zgarishga olib kelgan yoki o'zgarishning mohiyatini o'z ichiga olgan beruvchi haqiqatdir.

Kimyoviy qonunlarning mohiyatini tushunish, ya'ni qonun qanday
nima sababdan amal qiladi, degan savollarga javob berish kerak. Buning
ayhun, avvalo biror fikr (taxmin) aytilib, so'ngra aniq tajribalar asosida
tekshiriladi. Bunday ilmiy uslub — *gipoteza* deyiladi. Agar bu aytilgan
fikir tajribalar asosida tasdiqlansa, *nazariyaga* aylanadi. Buning isboti
sistatida modda (materiya)ning asosiy tarkibini atomlar tashkil etishi
to'g'risida atomistik nazariya yaratildi. Bu nazariya M.V. Lomonosov
omonidan tajriba va yangi natijalar bilan modda tuzilishi to'g'risida
dastlabki *te'limot* darajasiga yetkazildi.

Kimyo fanining hozirgi zamon muammolarini hal etishdagi o'zni
Barcha fanlar qatori kimyo fani o'z taraqqiyoti davomida insoniyatga
irik muammolarni hal etib berishda asosiy ilmiy, tajribaviy va amaliy
ordam berib keldi, ya'ni katta tarixiy yo'lni bosib o'tdi.

Yildan-yilga fan va texnika taraqqiyoti rivojlanib borishi bilan qator muammolar yuzaga keladi, ularning ichida hozirgi zamonda insoniyatni qayta talqin etishi lozim bo'lgan yirik muammolarni yechishda kimyo fani ham o'z hissasini qo'shmoqda. Yechimini topishda kimyo fani bevosita o'z hissasini qo'shadigan zamonaviy dolzarb muammolar, jumladan, quyidagilar:

— Yer yuzida insonlarning ko'payishi ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosini keltirib chiqarmoqda. Bu muammoni yechishda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati va fan salmoqli o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda kimyo fani qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalarga qarshi kurash vositalari, o'g'itlar, ekinlarning o'sishini tezlashti-



ruvchi stimulyatorlar, toza, sifatli, tabiiy va sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish usullarini yo'lga qo'yadi.

Toza ichimlik suvi ishlab chiqarish va suv osti dunyosidan toza oqilona foydalanib, oziq-ovqat mahsulotlari, o'g'itlar, mineral moddalar, osh tuzi, metallar, brom va yod olish muammolarini yechish, ichimlik suvi tanqisligi kuchayib borayotgan bir vaqtda okean, dengiz, daryo va ko'l suvlaridan chuchuk suv olish masalalarini hal etish.

Ilmiy tadqiqotlar. Kimyo fani sohasida hal etilishi lozim bo'lgan fundamental muammolar: kimyoviy reaksiyalar (fotosintez natijasi), glyukozaning kraxmal yoki sellyulozaga aylanishi) ayrim katalitik reaksiyalarning mexanizmi, kristallarning o'sishi, quyosh sistemasi va yulduzlardagi jarayonlar, mikro-zarrachalar, yadro reaksiyalari va ularning tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni hal etish, biokimya jarayonlarni o'rganishda yangi kimyoviy usullar va moddalarni qidirish, modda almashinuvi mexanizmini, fikrlash, irsiyat, dorivor moddalar va ularning organizmga ta'sirining kimyoviy talqinini to'laqonli ochib berish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladi.

— *Yangi energiya manbalarini yaratish.* Neft va gaz mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini takomillashtirish, yangi texnologiyalar o'zlashtirish va yaratish, toshko'mir asosida olinadigan mahsulotlar tashish, ko'paytirish, tugab borayotgan neft va gaz zahiralari o'rnini bosadigan yadro energiyasidan foydalanish, quyosh energiyasi va suvdan energiya manbai sifatida foydalanish muammolarini hal etish.

— *Yangi kimyoviy moddalar va materiallarni yaratish.* Odan farqli turmush darajasini oshirish va ular ehtiyojini to'laroq qondirish maqsadida turli yangi bezalar kompozitsion polimer, yarimo'tkazgich, o'ta yulduz o'tkazuvchan va keramika materiallari ishlab chiqarish, yangi doril moddalarni ularning tabiiy manbalari (o'simlik va hayvonot dunyosi) dan ajratib olish, sintez qilish va hayotda qo'llash.

— *Atrof muhit muhofazasi bilan bog'liq ekologik muammolar.* Atmosfera, gidrosfera, yer va yer yuzasi turli zaharli moddalar bilan ifloslanishining oldini olish, chiqindisiz texnologiya yaratish, oziq-ovqat qatlamining buzilishi, radioaktiv moddalar bilan zaharlanishning oldini olish choralarini izlab topish.

O'zbekistonda kimyo sanoatining istiqbollari kattadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov o'zining "O'zbekiston XXI asrda bo'sag'asida" asarida zararsiz va chiqindisiz yangi texnologiyalarni yaratish, xalqning turmush darajasini oshirish va xalq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirish maqsadida sanoatni rivojlantirish muammolariga ahamiyat berdi. Polimer mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha respublikamiz tutgan muhim

ni ta'kidlab o'tdi. Respublika o'zining katta istiqbollarini gaz qazib chiqarish sanoati, tabiiy gaz va gaz kondensatini ishlab chiqarish, qayta ishlash bilan bog'lashini aytib o'tdi. Masalan, Sho'rtangaz kimyo kompaniyasi bilan bog'lashini aytib o'tdi. Masalan, Sho'rtangaz kimyo kompaniyasi olinuvchi etilen akrilonitril nitron tolasi olish uchun ishlatilishi mumkin. I. A. Karimov, shuningdek, kompozitsion polimer materiallar, jumladan, polimer kaprolaktam, yuqori sifatli paxta sellyulozasi, qayta tolalar ishlab chiqarish va qayta ishlashning ekologik jihatdan afzal va zararsiz texnologiyalarini yaratish masalasining muhimligiga alohida e'tibor berib o'tdi.

Yuqoridagi muammolarni hal etish O'zbekistonda iqtisodiy jihatdan afzal va zararsiz bo'lgan talab va ehtiyojni to'la qondirish uchun xizmat qiladi.

II bob

KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHALARI

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: modda, oddiy va murakkab moddalar, aralashmalar, identifikatsiyalash, ajratish, anorganik moddalarning sinflari, oksidlar, asoslar, kislotalar, tuzlar.

II.1. Modda haqida tushuncha.

Modda — kimyo fani o'rganadigan asosiy ob'yekt bo'lib, unga dunyoviy qonunlar nuqtai nazaridan qaralsa, modda fazoni (bo'shliqni) to'ldirib turuvchi, massaga ega bo'lgan materiyadir.

Kimyoviy nuqtai nazardan qaraganda, modda bir turdagi molekula yoki kristallar to'plami bo'lib, o'zining aniq tarkibi, tuzilishi va xossasi bilan bir-biridan farq qiladigan turli ko'rinishdagi materiyadir. Modda o'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun modda to'g'risidagi atom-molekulyar ta'limotni, tarkibiy qismlarini, tuzilishini va fizik-kimyoviy xossalarni bilish kerak. Moddaning tarkibiy qismlari: molekulalar — moddaning tarkibini, tuzilishini va xossalarni o'zida mujassamlashtirgan eng kichik zarrachadir. Har qanday molekula bir yoki undan ortiq

¹ I. A. Karimov. "Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida". "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida" 6-1. "O'zbekiston". 1998.

atomlardan tarkib topib, atomlar bir yoki bir necha turdagi elementga bo'linishi mumkin bo'lgan bo'lad.

Atom — kimyoviy elementning xossalari o'zida namoyon bo'lgan eng kichik zarrachadir.

Kimyoviy element — bir turdagi atomlar majmuidir. Boshqa aytdigan bo'lsak, **kimyoviy element** — yadro zaryadi bir xil zarrachalar to'plamidir. Kimyoviy element tushunchasi kimyoni tushunchasi bo'lib, elementlarni va ular hosil qilgan birikmalarni o'yo'li bilan kimyoni o'rganamiz. Tabiatda materiyaning turli ko'rinishlari mavjud bo'lsa-da, ularning hammasini ham kimyoviy element sifatida qabul qilib bo'lmaydi. Kimyoviy elementlarni bir-biri bilan farq qilib turgan asosiy tavsiflari ularning atom yadro zaryadi (atom raqami), kimyoviy belgisi (simvoli) va nomlanishidir. Shunday shartlar to'liq bajara olgan 119 xil rasman tan olingan zarracha, ya'ni kimyoviy elementlar hozirgi kungacha elementlar davriy jadvaliga kiritilgan. Yuqoridagi aytilganlarga asosanib kislorod elementi bilan tanishaylik:

16 ← atom massasi

${}_8\text{O}$ — kislorod (Oxygenium) ← nomlanishi
kimyoviy belgisi, uning oʻqilishi — “O”
(7-8) ...

($z=8$) tartib raqami (yadro zaryadining qiymati)

Moddaning tuzilishi — tuzilish formulalari orqali ifodalanib, molekulasidagi (yoki kristall panjarasidagi) zarrachalar o'zaro qatnash tartibida, qanday bog'lanishlar orqali bog'langanini ko'rsatuvchi usuli. Moddalar fizikaviy va kimyoviy xossalarga ega bo'ladi.

Fizikaviy xossalarga agregat (gaz, suyuq, qattiq) holatiga xos bo'lgan xossalari, rangi, suyuqlanish, qaynash, muzlash (qotish, kristallanish) temperaturallari, eruvchanligi, zichligi, elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi kabi xossalari kiradi. Moddaning fizikaviy xossalarini aniqlash vaqtida uning tarkibi o'zgarmaydi.

Kimyoviy xossalarga metall yoki metallmasligi, oksidlovchi yoki qaytaruvchiligi, asosli yoki kislotaliligi, yonish-yonmasligi va qanday moddalar bilan reaksiyaga kirishishi kabilar kirib, bu xususiyatlarni aniqlash mobaynida moddaning tarkibi o'zgaradi.

Toza modda — bitta modda holida mavjud boʻladi.

Toza modda — bitta modda bo'lib, yuqoridagi xossalari bilan tavsiflanadi.

Aralashmalar — bir-biri bilan o'zaro reaksiyaga kirishmaydigan il yoki undan ortiq moddalardan iborat bo'lib, aniq yagona tarkibga o

ay, bir-biridan osonlik bilan ajratilishi mumkin bo'lgan tarkibiy komponent) lardan iborat bo'ladi. Aralashmalar bir jinsli (agregat) va bir xil moddalar aralashmasi) yoki gomogen aralashma va turli (turli agregat holatdagi moddalar) aralashmasi, ya'ni geterogen aralashmalarga bo'linadi.

masalan: a. Havo (N_2 , O_2 , CO_2 va boshqa) gazsimon moddalarning (geterogen) aralashmasi bo'lib, ularni suyuqlanish temperaturalari orqali ajratish mumkin.

2. Oltingugurt kukuni temir kukuni bilan aralashtirilganda (geterogen) aralashma hosil qiladi. Ular tashqi tomondan bir-biridan farqlanib turadi. Ular aralashmaga yaqinlashtirsak temir magnitga tortilib, oltingugurt qoladi.

ajralib qoladi.

f. Mexanik qo'shimchalardan tozalangan neft (turli uglevodorodlar-
3 gomogen aralashmasi).

Aralashmalarni ajratish

Har qanday aralashma tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ularni bir-
dan ajratishning turli usullari mavjud.

ayratishning turli usullari mavjud.

a) *Haydash (distillash) usuli* suyuq aralashmalarni va eritmalarni ajratishda qaynash temperaturalariga asosanib har bir komponent ajratib olinadi.

Ma'lumotlar, masalan, neftni shu usul bilan bir necha moddalarga ajratish mumkin. Bunda har bir ajratib olinadigan modda past qaynash temperaturasidan yuqori qaynash temperaturasiga qarab boradi. Bu **fraksion haydash usuli** deyiladi.

Agar ajralayotgan komponent qisman ikkinchi modda bilan aralashib yalsa, moddalarni toza holda ajratish uchun qayta haydash usulidan foydalaniladi. Masalan: suv bilan spirt aralashmasini 78°C da spirt va suvga ajratish mumkin. Lekin "spirt-suv" tarkibli oz miqdordagi aralashma ham spirtga o'tib ketgani uchun spirt suv bilan "iflos"lanadi. Shu aralashmani toza holda ajratish uchun u yana qayta haydaladi.

Ba'zi mexanik aralashmalar magnit xossalari-ga ko'ra suvda yoki boshqa moddalarda eruvchanligiga, aktiv sirtga yutilishi (adsorbsiyala-nishi)ga qarab ajratiladi. Moddalarning boshqa modda sirtiga yutilish (xossalardan foydalanib havoni zaharli gazlardan tozalash mumkin protivogazning ishlashi). Bunda havodagi boshqa gazlar bilan aralash-

gan zaharli gazlar molekulalari g'ovak sirtga yutiladi va havo to'ldiriladi. Shu usuldan foydalanib, moddalarni bir-biridan ajratish konsentrlash usullari "xromatografiya" va "ekstraksiya" usullari bilan chiqirilgan.

Ajratib olingan yoki yangi sintez qilingan moddalarni (individual, ya'ni toza) modda ekanligini aniqlash kerak. Moddalarni individual ekanligini aniqlash va tasdiqlash "identifikatsiya" usullari bilan. Moddalarni identifikatsiyalash turli usullar yordamida quyidagicha oshiriladi.

1. **Moddalarning rangi va agregat holati o'rganiladi.** Agar qattiq bo'lsa, uning suyuqlanish temperaturasi (t_{suyuq}) aniqlanadi. Kattalik har bir modda uchun asosiy foydalanish tavsifi hisobi. **Suyuqlanish temperaturasi** deb, qattiq holdagi modda qizdirilganda suyuq holga o'tish temperaturasi aytiladi. Masalan, muz 0°C da suyuqlanadi, suyuq holga o'tadi, kumush 960°C da suyuqlanadi, shakar (shakar) uchun $t_{\text{suyuq}} = 185^\circ\text{C}$.

Ba'zi moddalar qizdirilganda suyuqlanishga "ulgurmasdan" o'tib aylanib ketadi. Ko'pchilik organik moddalar parchalanish (ko'mir) temperaturasi ega. Ayrim qattiq moddalar qizdirilganda suyuq o'tmasdan bug' holatiga o'tib ketadi. Masalan, J_2 (kristall) qizdirilganda to'g'ridan-to'g'ri bug' holiga o'tadi, bu hodisaga "sublimatsiya" deyiladi. Suyuq moddalar uchun qaynash temperaturasi (t_{qayn}) aniqlanadi. Masalan, spirt 78°C da, metil spirti 53°C da, atseton 59°C da qaynaydi.

2. **Modda tarkibini sifat va miqdoriy analiz (tahlil) qilish.** Har bir modda tarkibiga kiruvchi elementlarning turi va ularning miqdorlari aniqlanadi. Shu natijalar asosida moddaning empirik formula (modda molekulasida tarkibiga qanday element necha atomdan iboratligi) aniqlanadi. Masalan, H_2SO_4 — bir molekula sulfat kislota ikki vodorod, bir atom oltingugurt va to'rt atom kisloroddan iborat. Buning fizikaviy va kimyoviy usullardan foydalaniladi.

Moddalarning tarkibini analiz qilish usullari va ular bilan bo'lgan qonun-qoidalarni o'rgatuvchi kimyo fani bo'limiga **analitik kimyo** deyiladi. Hozirgi vaqtda moddalarni identifikatsiyalashda turli maxsus asbob (qurilmalar) ishlatiladi. Ko'pchilik rangli va rangsiz moddalar yorug'lik nurlari ko'rinish sohasi (400—800 nm — nanometr) va ultrabinafsha (180—200 nm) nurlarni yutadi. Moddalarning nur yutish xossasini aniqlab berish maxsus qurilma **spektrofotometr** deyiladi. Bu qurilma yutilgan nurlar to'liq uzunligi λ (nm, mkm — mikrometr) yoki chastota ν (sek^{-1}) yoki nur intensivligi (%) bog'lanishi ko'rinishidagi spektrni chizib beradi.

Spektrdagi yutilish sohasiga ko'ra moddaning tuzilishi va tarkibi haqida to'g'ri xulosa qilinadi.

Moddalar infragizil nurni yutish xossasiga ega. Infragizil spektroskopiya usuli bilan ham moddalar identifikatsiyalanadi. IQ-spektrda (400—1000 cm^{-1}) molekuladagi atomlar o'rtasida hosil bo'lgan turli bog'lanish-mos keluvchi tebranishlar to'liq sonlari sohalari aniqlanib, shular bilan moddaning tuzilishi to'g'risida xulosa qilinadi.

II.2. Atom va molekulyar massa

Kimyoviy hodisalar sodir bo'lganda moddalar ma'lum miqdoriy o'lchovlarda o'zaro ta'sirlashadilar. Moddalarning miqdorlari va ular bilan bog'liq bo'lgan hisoblashlarni amalga oshirish uchun "atom massasi", "molekulyar massa", "mol" tushunchalarini bilish zarur. Bu tushunchalar o'z o'rnidan oldin atom-molekulyar ta'limot nuqtai nazaridan o'rganishdan eslab o'tamiz.

M. V. Lomonosov o'zining "Matematik kimyo elementlari" asarida atom-molekulyar ta'limotning asosiy qoidalarini quyidagicha keltiradi:

1. Barcha moddalar korpuskula (molekula) lardan iborat va bu korpuskulalar orasida oraliqlar bor.
2. Molekulalar to'xtovsiz harakatda bo'ladilar.
3. Molekulalar "element" (atom)lardan iborat. Atomlar ham molekulalar kabi to'xtovsiz harakatda bo'ladilar.
4. Atomlarning muayyan massa va o'lchami bor.
5. Oddiy moddalarning molekulalari bir xil atomlardan tuzilgan.

Moddalarning molekulalari esa har xil atomlardan tuzilgan. Atom-molekulyar ta'limot kimyoda XIX asrning o'rtalarida to'liq tasdiqlandi. 1860 yilda Karlsrueda bo'lgan kimyogarlarning xalqaro yig'inzida atom va molekulaga ta'rif berildi. Bunga asosan:

Molekula — muayyan moddaning kimyoviy tarkibi, tuzilishi va massalarini o'zida mujassamlashtirgan eng kichik zarracha. Molekulaning kimyoviy xossalari uning tarkibi va kimyoviy tuzilishi bilan aniqlanadi.

Atom — kimyoviy elementning barcha xossalari o'zida namoyon bo'luvchi oddiy va murakkab moddalar molekulasida kiruvchi eng kichik zarracha. Atomning kimyoviy xossalari uning tuzilishiga bog'liq.

Hozirgi kunda atomga quyidagicha ta'rif beriladi:

Atom — musbat zaryadlangan yadro bilan uning atrofiga joylashtirilgan elektronlardan tarkib topgan elektroneytral zarracha.

Kimyoviy moddalar *molekulyar* va *nomolekulyar* tuzilishga ega. Molekulyar tuzilishga ega bo'lgan moddalar molekulalardir, masalan: uglerod (IV)-oksid va suv. Nomolekulyar tuzilishga ega moddalar esa bir-biri bilan kimyoviy bog'langan zarrachalar (atomlar) lardan tarkib topgan bo'ladi. Masalan, olmos, kremniy, oksidlar.

Molekulyar tuzilishli moddalarda molekulalar orasidagi bog'lanish (ta'sir) atomlar va ionlar orasidagiga nisbatan ancha bo'shroq bo'ladi. Sababli, bunday moddalarning suyuqlanish va qaynash temperaturasi bo'shroq bo'ladi. Nomolekulyar tuzilishli moddalarda esa zarrachalar o'zaro kimyoviy bog'lanish kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu moddalar suyuqlanish va qaynash temperaturasi nisbatan yuqoriroq bo'ladi.

Kimyoviy element — yadrosining mushat zaryadi soni bir xil bo'lgan atomlar turi. Atomlar yadrosidagi musbat zaryad elementlari D. I. Mendeleyev davriy jadvalidagi tartib raqamiga tengdir. Elementlarda atom yadrosining musbat zaryadi har xil bo'ladi.

Kimyoviy elementlar yer qobig'ida juda notekis tarqalgan. Yer qobig'ining yuqori qismida elementlar taxminan quyidagicha tarqalgan: yeri qobig'i massasining 47% ini kislorod, 29,5% ini kremniy, 8,05% ini alyuminiy, 4,65% ini temir, 3,3% ini kalsiy, 2,5% ini natriy, 2,5% ini kaliy, 1,87% ini magniy, 0,15% ini vodorod tashkil etadi. Yer qobig'ida elementlarning tarqalishini o'rganuvchi fan geokimyo yoki yer kimyosi deb ataladi. Yuqorida keltirilgan elementlar yer qobig'ining 99,52% ni tashkil etadi. Yuqoridagi elementlar yeri qobig'ining 99,52% ni tashkil etadi. D. I. Mendeleyevning ta'kidlashicha, tabiatda atom og'irligi kichik bo'lgan elementlar tarqalgan, organizmlarda ham yengil elementlar (vodorod, uglerod, kislorod) ko'p miqdorda bo'ladi.

Atom massasi. Atomlarning haqiqiy massalari 10^{-24} dan 10^{-26} grammgacha bo'ladi. Bu qiymatlar juda kichik bo'lib, amalda ularni foydalanib bo'lmaydi. Shu sababli atomlarning real massalari o'rniga "nisbiy atom massa"si tushunchasi ishlatilib (A_r), uning o'lchov birligi sifatida "uglerod birligi" (u. b) tushunchasi qabul qilingan.

Atomning uglerod birligiga nisbatan aniqlangan massasi atom massasi deyiladi.

"Uglerod birligi" deb, uglerod atomining massasi 12 bo'lgan izotop massasining $1/12$ qismiga teng bo'lgan massa miqdoriga aytiladi. Bu tushunchaga asosan:

Nisbiy atom massa (A) = $\frac{\text{Element bitta atomining massasi}}{\text{12 Atom massa sin ing 1/12 qismi}}$

Uglerod birligi" bo'yicha vodorod (^1H) atomining massasi 1,0078 ga teng bo'lib, bu qiymatning ma'nosi 1 ta H atomining massasi od atomi massasining 1/12 qismiga nisbatan 1,0078 marta katta ekanligidir. Shuningdek, kislorod (^{16}O) atomining massasi 15,994 = 16 bo'lgan ma'noni anglatadi.

Atomining massasi $m_{a.b.} = 55.845 + 0.0000086 = 55.84586$ g/mol. Uning haqiqiy son qiymati $N_{a.b.} = \frac{m_{a.b.}}{m_{a.b.}}$ da belgilanadi. Uning haqiqiy son qiymati $N_{a.b.} = \frac{m_{a.b.}}{m_{a.b.}}$ da belgilanadi. Uning haqiqiy son qiymati $N_{a.b.} = \frac{m_{a.b.}}{m_{a.b.}}$ da belgilanadi.

605655 $\pm$ 0,0000086) 10^{-27} g
Masalan, temir atomi massasi 56 u.b.ga teng deganda, bu temir atomi
massasi 56 marta og'irligini bildiradi.

Har qanday elementning nisbiy atom massasi deb, son jihatdan uning

Ular qanday elementning nisbiy atom massasi

iladi. Elementlarning nisbiy atom massalari qiymati davny jadvalda
 ilgan bo'lib, bu qiymatlardan barcha kimyoviy hisoblashlarda foyda-

ilgan bo'lib, bu qiymatlardan barcha kimyoviy hisoblar o'tkaziladi. Masalan: $A_r(\text{Fe}) = 55,847$ m.a.b.; $A_r(\text{Cl}) = 35,453$ m.a.b. va

Hozirgi vaqtda elementlarning nisbiy atom massalarini aniqlashda

Hozirgi vaqtda elementlarning nisbiy atom massalarini aniqlash uchun mass-spektroskopiya usuli qo'llanilib, "standart" sifatida ^{12}C atomining

Mohar massa. Moddaning nisbiy molyar massasi deb, son jihatdan

Molyar massa. Moddaning nisbiy molyar massasi deb, son ifodalangan qanday modda molekulasining massasiga teng bo'lib, uglerod birliklarida ifodalanadi. Molyar massa ham ^{12}C — atomining

qanday modda molekulasining massasiga teng bo'lib, uglerod atomining nisbiy og'irligiga aytiladi. Molyar massa ham ^{12}C — atominin

dalangan og'irligi uchun "nisbiy molyar massa" deyila

12 qismiga nisbatan o'changani uchun "nisbiy molyar massa" deyila

va M_r — holdida belgilanadi. Masalan: $M_r(O_2) = 32$ u. b. yoki 32 g/mol, $M_r(H_2SO_4) = 98$ u. b. yoki 98 g/mol va hokazo.

Molekula tarkibiga kirgan atomlar soni bitta bo'lsa (Fe , Au , Ar , Cu)
 1) molekula massasi atom massasiga teng bo'ladi: $M_{\text{r(Fe)}} = A_{\text{r(Fe)}} = 55,84$

g. b. voki 55, 847 g/mol.

Agar ikki yoki undan ortiq atomdan iborat molekular bo'lsa, ularni

Agar ikki yoki undan ortiq atomdan iborat molekullar **massalari** quyidagicha hisoblanadi.

$$M_{(H_2O)} = 2A_{(H)} + A_{(O)} = (2 \cdot 1) + 16 = 18 \text{ u. b. yoki } 18 \text{ g/mol}$$

$$M_{(H_2PO_4)} = 3A_{(H)} + A_{(P)} + 4A_{(O)} = (3 \cdot 1) + 31 + (4 \cdot 16) = 98 \text{ u. b.}$$

voki 98 g/mol.

Ayrim murakkab molekularlar: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ ning molyar massasini hisoblashda ham shu qoidaga amal qilinadi.

$$M = A_{(K)} + A_{(Al)} + 2A_{(S)} + 8A_{(O)} + 12M_{(H_2O)} = 39 + 27 +$$

$$+ (2 \cdot 32) + (8 \cdot 16) + (12 \cdot 18) = 474 \text{ u. b. yoki } 474 \text{ g/mol}$$

Kimyoda moddalar miqdorining o'lchov birligi sifatida "mol" qilingan.

$$N_A = \frac{0,012 \text{ kg/mol}}{1993 \cdot 10^{-26}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ g/mol}$$

"Mol" deb, moddaning ^{12}C izotopining $6,02 \cdot 10^{23}$ ta C — soniga teng zarracha (molekula, atom, ion) saqlagan miqdoriga a Masalan, suvning molyar og'irligi ≈ 18 u. b. ga teng. Suvning 1 grammga teng bo'ladi va $6,02 \cdot 10^{23}$ ta suv molekulasidan iborat.

Mol - bu moddalarning 0,012 kg uglerod izotopi ^{12}C da nechta bo'lsa, tarkibida shuncha struktura birliklar (molekula, atom, ion, elektron) bo'ladigan miqdoridir.

Bitta uglerod atomi massasi $1,993 \cdot 10^{-26}$ kg, 0,012 kg atomlar N_A quyidagicha topiladi:

$$N_A = \frac{0,012 \text{ kg/mol}}{1,993 \cdot 10^{-26} \text{ kg}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ g/mol}$$

$6,0210^{23}$ -Avogadro soni deyiladi va barcha moddalar uchun bir qo'llanadi.

Shu bilan bir qatorda, kimyoviy hisoblashlarda kilo-molekula (kg-mol), milligramm-molekula (mg-mol) ham ishlatiladi. 1 k-mol molga teng, 1 mg-mol 0,001 molga teng bo'ladi.

Moddaning "mol"lar sonini n , massasini m va molekulyar massa M bilan belgilasak, bu uchala kattalik orasidagi o'zaro bog'liqlik:

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{gramm})}{M(\text{gramm/mol})} \text{ bolad}$$

Bu formuladan moddalarning miqdorini hisoblashda juda ko'p foydalaniladi. Masalan: 20 gramm NaOH da necha "mol" modda bor?

Demak, $m_{\text{NaOH}} = 20 \text{ g}$, $M_{(\text{NaOH})} = 40 \text{ g/mol}$ bo'lsa,

$$n(\text{mol}) = \frac{20 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 0,5 \text{ mol NaOH.}$$

11.3. Kimyoviy formula va kimyoviy tenglamalar

11.3. Kimyoviy formula va kimyo

Demak, kimyoni o'rganishda adabiy so'z va iboralardan tashqari yana shimcha "maxsus yozuv va belgilar" bo'lishi kerakki, u yuqoridagi "qulaylik"larni bartaraf etsin. Bular kimyoviy formula va kimyoviy belgilardir.

Kimyoviy belgilar — kimyoviy element lotincha nomining bosh harfi keyingi harflaridan biri bilan ifodalanadigan shartli belgi. Masalan, kislorodning lotincha nomi — Hydrogenium, belgisi — H, kislorodning lotincha nomi — Oxygenium, belgisi — O, ruxning lotincha nomi — Ferrum, belgisi — Fe, temirning lotincha nomi — Zincum, belgisi — Zn, va hokazo.

Kimyoviy belgilar: elementning nomini, bir atomini, 1 ta atom massasini, 1 molini ko'rsatadi. Elementlarning kimyoviy belgilari D. I. Mendeleyevning elementlar davriy sistemasida keltirilgan.

Kimyoviy formula deb, moddaning sifat va miqdor tarkibini kimyoviy elgi, indeks va koeffitsiyentlar yordamida ifodalashning shartli yozuv suliga aytiladi. Kimyoviy formulalar modda molekulasini tarkibiga qaysi elementlar atomlari va ularning qancha miqdorda kirishini ko'rsatadi. Masalan: osh tuzi — NaCl , suv — H_2O , sulfat kislota — H_2SO_4 , shakar — $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ formulalarga ega bo'ladi. Shu singari hozirgacha ma'lum bo'lgan barcha moddalarning kimyoviy formulasi mavjud.

Kimyoviy formula yordamida:

- moddaning bitta molekulasini tarkibini bilamiz va ifodalaymiz;
- uning "1 mol" miqdorining massasini hisoblay olamiz va;
- uning xususiyatlari to'g'risida xulosa qilamiz va qanday miqdor ishlatilishi to'g'risida dastlabki tushunchalarga ega bo'lamiz.

Kimyoviy formula turlaridan biri empirik formuladir:

Empirik formula — kimyoviy analiz natijalari asosida aniqlanadigan modda bitta molekulasining tarkibini sifat va miqdoriy jihatdan ta'riflash uchun qabul qilib oladigan yoki beradigan elektron qavatini kimyoviy bog' hosil bo'lishida element atomi tashqi elektron qavatini to'ldirish uchun qabul qilib oladigan yoki beradigan elektronlar sonidir. Shu sababli, ko'pchilik hollarda elementning valentligi davriy jadvalda aniqlanadi. Masalan, I guruh elementlari bir valentli (Li—, Na—, K—, ...), II guruh elementlari ikki valentli (—Be—, —Mg—, —Ca— ...) va hokazo.

Ko'rinib turibdiki, moddaning empirik formulasini yozish uchun kimyoviy elementlar belgilari (simvol)ni, indeks, koeffitsiyent va valentliklarni bilish zarur.

Indeks — moddaning bir molekulasini tarkibiga kirgan ayni element atomi (atomlar gruppasi) sonini ko'rsatuvchi kattalikdir.

Agar molekula tarkibida ayni element atomidan bitta bo'lsa, ko'rsatuvchi 1 raqami indeks holida formulada yozilmaydi.

Masalan, NaOH molekulasini ($\text{Na}_1\text{O}_1\text{H}_1$) da "1" indekslari yozilmaydi. Shu qoidaga asosan formulada agar element belgisining o'ng tomonida pastda hech qanday raqam yozilmasa, uning indeksi "1" deb hisoblanadi. Boshqa hollarda (2 va undan ortiq) indekslar albatta formulalarda yoziladi.



Yuqoridagi yozuvlarga asosan, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ molekulasini ko'rib chiqing. 1 molekula alyuminiy sulfat tuzi tarkibida 2 atom Al, 3 atom S, 12 ta O elementlari bor. Bu formulada (SO_4)₃ gruppasida 2 xil indeks ishlatilgan.

Ulardan birinchisi "4" raqami faqat O (kislorod) atomlariga tegishli bo'lib, bitta sulfat ionida 4 ta kislorod atomi borligini bildirsa, qavs tashqaridagi umumiy indeks — "3" raqami SO_4 gruppasidan 3 ta borligini anglatib, bir yo'la ham S, ham O (kislorod) atomlariga tegishli.

Moddalar va ularning xossalarini o'rganishda yana molekulasining elektron formulasi va tuzilish (grafik) formulasi keng qo'llaniladi. Tuzilish formulalari mazkur modda molekulasini tarkibidagi atomlarning bir-biri bilan qanday tartibda birikkani, ularning holati o'zaro ta'siri haqida ma'lumot beradi. Tuzilish formulasiga qarab biz moddaning xossalarini aniqroq bilib olamiz.


11.4. Valentlik

Valentlik element atomi (ion)ga xos tushunchadir. Valentlik — bir element atomining ayni molekula tarkibidagi boshqa element (yoki elementlar) bilan hosil qilgan bog'lanishlar sonidir.

Agar atom tuzilishi nuqtai nazaridan qarasak, elementning valentligi kimyoviy bog' hosil bo'lishida element atomi tashqi elektron qavatini to'ldirish uchun qabul qilib oladigan yoki beradigan elektronlar sonidir. Shu sababli, ko'pchilik hollarda elementning valentligi davriy jadvalda aniqlanadi. Masalan, I guruh elementlari bir valentli (Li—, Na—, K—, ...), II guruh elementlari ikki valentli (—Be—, —Mg—, —Ca— ...) va hokazo.


Demak, bu tushunchalarga ko'ra, biror moddaning ham empirik, ham tuzilish formulasini yozadigan bo'lsak, modda tarkibiga kiradigan elementlar va ularning davriy jadvalda joylashgan gruppasi raqamini bilish zarur.

Shuni unutmaslik kerakki, molekula tarkibidagi barcha atomlarning valentliklari yig'indisi o'zaro teng bo'lishi, ya'ni molekula tarkibidagi har bir elementning valentligi to'yingan bo'lishi shart. Shu qoidaga binoan, agar bir element atomi valentligi bilan ikkinchi element valentligi o'zaro teng bo'lmasa, formulani yozishda "indeks" dan foydalaniladi. Buni suv molekulasidagi vodorod va kislorod atomlari misolida ko'rsak, 1 ta kislorod atomining ikkita valentligi (—O—)ni 1 ta vodorod atomi valentligi (—H—) to'yintira olmaydi. Buning uchun 2 ta vodorod atomi bo'lishi kerak. Vodorod atomlarini 2 marta takror yozmasdan, shu element belgisining o'ng tomonidan pastga "2" raqami (H_2O) yoziladi. Valentlik, odatda, element belgisining tepasida rim raqami bilan ko'rsatiladi. Buni quyidagi moddalar tarkibidagi elementlar misolida ko'ramiz:



Elementlarning valentligi doimiy va o'zgaruvchan bo'ladi.

Quyida valentliklari doimiy va o'zgaruvchan bo'lgan elementlar keltirilgan:



A. Valentliklari doimiy elementlar: H^I , Na^I , Li^I , K^I , Rb^I , Cs^I , O^{II} , Ca^{II} , Mg^{II} , Be^{II} , Ba^{II} , Sr^{II} , Zn^{II} , Cd^{II} , Al^{III} , B^{III} , Si^{IV} va boshqalar.

B. O'zgaruvchan valentli elementlar: Cu^I , Cu^{II} , Fe^{II} , Fe^{III} , C^{II} , S^{II} , S^{IV} , S^{VI} , N^I , N^{II} , N^{III} , N^{IV} , P^{III} , P^V , Cl^I , Cl^{III} , Cl^V , Cl^{VII} , Mn^{II} , Mn^{IV} , Mn^{VI} , Mn^{VII} , Cr^{III} , Cr^{VI} , Pb^{II} , Pb^{IV} , Sn^{II} , Sn^{IV} , Au^I , Au^{III} hokazolar.

Keltirilgan formulalardan $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ da indekslardan tashqari suv molekulasida "5" raqami yozilgan bo'lib, u **koeffitsiyent** deyiladi. Koeffitsiyentning vazifasi ayni modda molekulasida 5 ta suv molekulasini (yoki boshqa modda) molekulalari borligini anglatadi. **Koeffitsiyent** *yo'la shu modda molekulasida barcha elementlarga tegishli bo'ladi*.

Tuzilish (struktura) formulalari. Barcha moddalar molekulalarida atomlar kimyoviy bog'lar yordamida bog'langan. Molekulada atomlarning *bir-birlariga nisbatan biror tartib (ketma-ketlik) asosida joylashuvini ifodalovchi shartli yozuv modda molekulasining tuzilish formulasi deyiladi*.

Tuzilish formulalari aslida kristall moddalarni rentgen nurlari bilan tekshirish (rentgen tuzilishi analizi usuli) asosida aniqlanadi. Aniq parametrlar (bog'ning uzunligi, bog'lar orasidagi burchak, moddaning kristall tuzilishi) asosida modda molekulasining tuzilishi "namoyish" etiladi.

Aksariyat hollarda modda tuzilishini bunday darajada "namoyish" etib bo'lmagani uchun ularning shartli grafik tuzilish formulalari bilan kifoyalaniladi. Masalan, $NaCl$ ni $Na-Cl$, H_2O ni $H-O-H$, ko'rinishda yoziladi. Bu formulalar molekulaning haqiqiy tuzilishini ifodalamasada (chunki, yuqorida aytganimizdek, ayrim moddalarga molekula tushunchasini tatbiq qilish mumkin emas), bizda har bir element molekula tarkibida valentliklariga muvofiq birikishi, ular orasida birlamchi, ikkilamchi (uchlamchi) bog'lar hosil bo'lishi kabi modda tuzilishi to'g'risidagi dastlabki tasavvurlarni uyg'otadi.

II.5. Kimyoviy reaksiyalar va ularning turlari

Kundalik hayotimizda turli hodisalar sodir bo'layotganligining guvohi bo'lamiz va ularni kuzatamiz. Masalan, idishda turgan suv hajmi (miqdori)ning kamayishi, shisha buyumning tushib sinishi, gazning, yog'ochning va ko'mirning yonishi, muzning suyuqlanishi, temir buyumning zanglashi, kishilarning nafas olishi va hokazo.


Bu hodisalarni ikki turga bo'lishimiz mumkin: 1) fizikaviy hodisalar, 2) kimyoviy hodisalar.

Fizikaviy hodisalar deb, moddaning tarkibi o'zgarmasdan ro'y beradigan hodisalarga aytiladi. Bu hodisalar tufayli moddaning agregat holati o'zgarishi (qattiq $\rightarrow$ suyuq, suyuq $\rightarrow$ gaz; gaz $\rightarrow$ qattiq), shakli o'zgarishi (bir bo'lak qattiq moddani maydalab ezish, yaxlit bo'lakni mayda bo'lakchalarga bo'lish) mumkin, lekin uni tashkil etgan moddaning tarkibi o'zgarmay qoladi. Yuqoridagi misollarimizdan suv hajmining kamayishi (bug'lanishi) natijasida suv moddasi "suvligicha" qoladi, lekin suyuq holatidan gaz holatiga o'tadi, ya'ni $(H_2O)_s \rightarrow nH_2O$; shishaning sinishida uning shakli (butunligi) o'zgaradi (tarkibi o'zgarmaydi) qog'ozning yirtilishida qog'oz qog'ozligicha qoladi, faqat uning yaxlitligi buziladi. Bularning hammasi fizikaviy hodisalar.

Kimyoviy hodisalar deb, moddalar (kimyoviy) tarkibining o'zgarishi bilan boradigan hodisalarga aytiladi. Bunda modda ichki o'zgarishlar (dastlabki mavjud kimyoviy bog'larning uzilib, yangilarining hosil bo'lishi) natijasida molekulalar yoki kristallar tarkibidagi atomlar soni, o'zaro joylashuvi — tuzilishi o'zgaradi. Bu ular xususiyatlarining tubdan o'zgarishiga olib keladi. Boshqacha aytganda, dastlabki modda yangi moddaga aylanadi. Har qanday kimyoviy hodisaga **kimyoviy reaksiya** deyiladi. Masalan, yuqorida sanab o'tilgan hodisalardan gaz, yog'och, ko'mirning yonishi, temirning zanglashi, odamlarning nafas olishi va shu kabi hodisalar kimyoviy hodisalar (reaksiyalar) deyiladi.

Sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlarning asl mohiyatini tushunib yetish uchun har bir reaksiyani "kimyoviy til" da bayon yetish usuli sifatida kimyoviy tenglamalardan foydalaniladi.

Masalan, "ikki molekula vodorod bir molekula kislorod bilan birikib suv hosil qiladi" yoki rux bo'lakchasi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, rux xlorid tuzi va vodorod gazini hosil qiladi" deyiladi. Bu ifodani kimyoviy tenglama shaklida yozsak:



ko'rinishiga ega bo'ladi. Bu yuqorida aytilgan hodisalar (reaksiyalar)ning kimyoviy tenglamasidir.

Kimyoviy tenglama — kimyoviy hodisalarni, kimyoviy formula va koeffitsiyentlar yordamida ifodalashning shartli yozish usulidir.

Kimyoviy tenglama:

— ro'y berayotgan hodisaning kechishini, kimyoviy ma'nosini bilishga;

Almashinish reaksiyasi deb, ikki murakkab modda tarkibiy qismlarini o'zaro almashinuvi natijasida yangi murakkab moddalar hosil bo'larayoniga aytiladi.

Bu turdagi reaksiyalar o'rin olish reaksiyasiga o'xshab ketadi, faqat ular o'z tarkibiy qismlari bilan almashinadilar.

Umumiy holda: $AB + CD \rightarrow AC + BD$

misollar: $BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 \downarrow + 2HCl$

$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$

$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$

Mexanizmlariga ko'ra reaksiyalar ion (almashinish), oksidlanish-qaytarilish, radikal zanjir reaksiyalarga bo'linadi. Bu turdagi reaksiyalar alohida mavzularda o'rganiladi.

Ko'pgina kimyoviy jarayonlar issiqlik chiqishi yoki yutilishi bilan boradi. Kimyoning bunday jarayonlarni o'rganuvchi sohasi **termokimyo** deyiladi. Issiqlik effektiga asosan reaksiyalar **ekzotermik** va **endotermik** reaksiyalarga bo'linadi. **Issiqlik ajralib chiqishi bilan boradigan reaksiyalar ekzotermik reaksiyalar deyiladi.** Masalan, vodorod va xlor gazlarida vodorod xlorid hosil bo'lish reaksiyasi issiqlik chiqishi bilan boradi:




Issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalar endotermik reaksiyalar deyiladi. Masalan, azot va kisloroddan yuqori temperaturada azot (II) oksidning hosil bo'lish reaksiyasi:



Ajralib chiqqan yoki yutilgan issiqlik miqdori kimyoviy jarayonning **issiqlik effekti** deyiladi. Issiqlik effekti keltirilgan tenglamalar **termokimyoviy tenglamalar** deyiladi.

Kimyoviy reaksiyalar qaytar va qaytmas turlarga bo'linadi.

Oxirigacha boradigan, ya'ni boshlang'ich moddalar molekularining hammasi reaksiya mahsulotlariga aylanadigan reaksiyalar qaytmas reaksiyalar deyiladi. Bu reaksiyalarga misol qilib Bertole tuzining parchalanishini keltirish mumkin (katalizator MnO_2):



Bu reaksiya Bertole tuzining barcha molekulari kaliy xlorid va kislorodga aylanib bo'lganidan keyin tugallanadi.

Ammo ko'pchilik reaksiyalar qaytar jarayonlardir.

Bir vaqtning o'zida qarama-qarshi yo'nalishlarda boradigan reaksiyalar qaytar reaksiyalar deyiladi.

III bob

ODDIY MODDALAR

Bir xil element atomlaridan iborat moddalar **oddiy moddalar** deyiladi. Masalan: H_2 , O_2 , N_2 , O_3 , C (grafit), C (olmos), Au, Fe va hokazo.

Oddiy moddalar gazsimon (H_2 , O_2 , Cl_2 , N_2 , He, Ne), suyuq (Br_2 , Hg), qattiq (Fe, Mg, Ca, S, P, I, ...) holatlarda bo'ladi. Oddiy moddalar bir atomli (Fe, Ag, Al, Na, K ...) va ko'p atomli (O_2 , H_2 , I_2 , O_3 , S_8 , P_4 ...) bo'ladi. Shu sababli ular qattiq holda atomar va molekulyar kristall panjarali bo'ladilar.

Oddiy moddalardan O_2 , N_2 , H_2 , S_8 , He, Ne, Ar, Kr, Xe, C (grafit), S (olmos), Cl_2 , Hg, Au, Ag, Fe, Cu lar tabiatda erkin holda mavjud bo'ladi. Ko'pchilik elementlar birikmalar tarkibida uchraydi. Ularni turli usullar bilan ajratilib, sof holda olinadi.

Oddiy moddalarning sifat tarkibi bir xil, tuzilishi va xossalari har xil bo'lishi allotropiya hodisasi deyiladi. Har bir holatga to'g'ri keluvchi moddalar allotropik shakllar deyiladi. Masalan, uglerod elementi uch xil allotropik shaklda: C (olmos), C (grafit), C (karbin); kislorod ikki xil: O_2 (kislorod) va O_3 (ozon) holatlarida mavjud bo'ladi. Allotropik shakl o'zgarishining kelib chiqishiga sabab - molekulada ayni element atomlari soni va ularning o'zaro birikish tartibi har xilligidir. Qattiq moddalarda esa ayni element atomlarining bir-biriga nisbatan joylashish tartibi - kristall panjarasi har xil bo'ladi. Olmosda uglerod atomlari tetraedr hosil qilib, kubsimon kristall panjara vujudga keladi, grafitda olti yoqli prizma hosil bo'lib, ular qavat-qavat joylashadi.

C (karbin) da C — atomlari qo'sh bog' yoki bir bog' — uch bog' tartibida bog'lanib amorf holatda bo'ladi.

Oddiy moddalarni olish usullari

Usul	Birikma holati	Oddiy moddalar
A. Qaytarish usuli		
Vodorodli	Oksidlar, galogenidlar va tuzlardan	Ga, In, Si, Ge, Mo, W, Re, B
Karbótermiya	Oksidlar va tuzlardan	Fe, Co, Ni, Si, Pb, Sn, Zn, Cd, Cu, P, As, Mo, W, Sb, Bi..
Alyuminótermiya	Oksidlardan	Cr, Fe, Co, Ni, Mn..
Ruxtermiya	Galogenidlardan	Si, Ag, Au
Magniytermiya	Oksidlar va galogenidlardan	Be, Ti, Zr (Si), B, Hf
Kalsiytermiya		U, V, Nb, Ta, Sc, La (lantanoidlar)
Elektroliz (katod)	Galogenidlar, tuzlar va suvdan	Ishqoriy va ishqoriy yer metallari Al, Ga, In, Tl, Be, Mg, Zn, Mn, Cu, H ₂
B. Oksidlash usullari		
Xlorning ta'siri, elektroliz (anod)	Bromid, yodid, florid, xloridlarning suyuqlanmasi, eritmasi, suv	Br ₂ , I ₂ , Cl ₂ , F ₂ , O ₂

IV bob

MURAKKAB MODDALAR

Murakkab moddalar yoki kimyoviy birikmalar bir necha elementlar atomlaridan tarkib topgan bo'ladi. Masalan, osh tuzi molekulasi natriy xlor atomlaridan tarkib topgan. Mis (II)-oksidi mis va kislorod atomlaridan, suv esa bir atom kislorod va ikki atom vodoroddan tarkib topgan. Murakkab moddalar: a) anorganik moddalar va b) organik moddalarga bo'linadi.


IV.1. Oksidlar

Elementlarning kislorodli birikmalari oksidlardir. Ularning umumiy formulasi $E O_x$ (E — kisloroddan boshqa kimyoviy element). Oksidlarni nomlashda avval kimyoviy element nomi, keyin shu elementning ayni oksid tarkibidagi valentligi qavs ichida beriladi va chiziqcha qo'yilib, oksid so'zi qo'shiladi. Masalan, FeO — temir (II)-oksidi, Fe_2O_3 — temir (III)-oksidi va hokazo.

Davriy jadvaldagi He, Ne, Ar — oksidlarining mavjudligi aniqlanmagan. Boshqa elementlarning oksidlari suv bilan ta'sirlashib tegishli birikmalar hosil qilish xossalariga ko'ra befarq (CO , N_2O , NO) va tuz hosil qiluvchi oksidlarga bo'linadi. Tuz hosil qiluvchi oksidlar suv bilan ta'sirlashib hosil qilgan birikmalarining xossalariga ko'ra yana uchga; asosli, kislotali, amfoter oksidlarga bo'linadi.

Asosli oksidlar deb, suv bilan birikib tegishli asoslarni hosil qiluvchi oksidlarga aytiladi. Masalan: Na_2O , K_2O , MgO , FeO , CuO , BaO . Asosli oksidlar, asosan metallarning oksidlari bo'lib, metall atomlari musbat (+1, +2, +3 ...) oksidlanish darajasiga ega bo'lib, kislorod atomlari (-2) oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Kislorod atomi II valentli, metall atomlari I, II, ba'zan III valentli bo'ladi.

Olinishi. 1. Oksidlar metallarning bevosita kislorod bilan ta'sirlashuvi natijasida olinadi:



2. Gidroksidlarni parchalash yo'li bilan olinadi:



Oddiy moddalarni olish usullari

Usul	Birikma holati	Oddiy moddalar
A. Qaytarish usuli		
Vodorodli	Oksidlar, galogenidlar va tuzlardan	Ga, In, Si, Ge, Mo, W, Re, B
Karbitermiya	Oksidlar va tuzlardan	Fe, Co, Ni, Si, Pb, Sn, Zn, Cd, Cu, P, As, Mo, W, Sb, Bi..
Alyuminotermiya	Oksidlardan	Cr, Fe, Co, Ni, Mn..
Ruxtermiya	Galogenidlardan	Si, Ag, Au
Magniytermiya	Oksidlar va galogenidlardan	Be, Ti, Zr (Si), B, Hf
Kalsiytermiya		U, V, Nb, Ta, Sc, La (lantanoidlar)
Elektroliz (katod)	Galogenidlar, tuzlar va suvdan	Ishqoriy va ishqoriy yer metallari Al, Ga, In, Tl, Be, Mg, Zn, Mn, Cu, H ₂
B. Oksidlash usullari		
Xlorning ta'siri, elektroliz (anod)	Bromid, yodid, florid, xloridlarning suyuqlanmasi, eritmasi, suv	Br ₂ , I ₂ , Cl ₂ , F ₂ , O ₂

IV bob

MURAKKAB MODDALAR

Murakkab moddalar yoki kimyoviy birikmalar bir necha elementlar atomlaridan tarkib topgan bo'ladi. Masalan, osh tuzi molekulasi natriy xlor atomlaridan tarkib topgan. Mis (II)-oksid mis va kislorod atomlaridan, suv esa bir atom kislorod va ikki atom vodoroddan tarkib topgan. Murakkab moddalar: a) anorganik moddalar va b) organik moddalarga bo'linadi.



IV.1. Oksidlar

Elementlarning kislorodli birikmalari oksidlardir. Ularning umumiy formulasi E_xO_y (E — kisloroddan boshqa kimyoviy element). Oksidlarni omlashda avval kimyoviy element nomi, keyin shu elementning ayni oksid tarkibidagi valentligi qavs ichida beriladi va chiziqcha qo'yilib, oksid so'zi qo'shiladi. Masalan, FeO — temir (II)-oksid, Fe_2O_3 — temir (III)-oksid va hokazo.

Davriy jadvaldagi He, Ne, Ar — oksidlarining mavjudligi aniqlanmagan. Boshqa elementlarning oksidlari suv bilan ta'sirlashib tegishli birikmalar hosil qilish xossalariga ko'ra befarq (CO , N_2O , NO) va tuz hosil qiluvchi oksidlarga bo'linadi. Tuz hosil qiluvchi oksidlar suv bilan ta'sirlashib hosil qilgan birikmalarining xossalariga ko'ra yana uchga; asosli, kislotali, amfoter oksidlarga bo'linadi.

Asosli oksidlar deb, suv bilan birikib tegishli asoslarni hosil qiluvchi oksidlarga aytiladi. Masalan: Na_2O , K_2O , MgO , FeO , CuO , BaO . Asosli oksidlar, asosan metallarning oksidlari bo'lib, metall atomlari musbat (+1, +2, +3 ...) oksidlanish darajasiga ega bo'lib, kislorod atomlari (-2) oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Kislorod atomi II valentli, metall atomlari I, II, ba'zan III valentli bo'ladi.


Olinishi. 1. Oksidlar metallarning bevosita kislorod bilan ta'sirlashuvi natijasida olinadi:




2. Hidroksidlarni parchalash yo'li bilan olinadi:




3. Tuzlarni parchalash usuli bilan olinadi:




4. Metall sulfidlarini kuydirish usuli bilan olinadi:



Kimyoviy xossalari. Asosli oksidlar suv ta'sirida tegishli (ishqor)larni, kislotali oksidlar bilan tuzlarni hosil qiladilar:



kislotalar bilan ta'sirlashib tuz va suv hosil qiladilar:




Fizikaviy xossalari. Asosli oksidlarning barchasi qattiq modda bo'lib, kristall va amorf tuzilishga, o'ziga xos rangga ega: FeO (qorami), Ag₂O, CuO — qora, CaO, Na₂O, K₂O, MgO, MnO — oq rangli, CoO ko'kimtir yashil, NiO — yashil.

Ishqoriy metallarning oksidlari suvda yaxshi eriydi, ishqoriy-y metallari oksidlari qisman, boshqa asosli oksidlar suvda yomon eriydigan moddalar. Yuqori temperaturalarda suyuqlanuvchan, elektr tokini o'tkazmaydigan birikmalardir.


Kislotali oksidlar. Suv bilan ta'sirlashib kislotalarni hosil qiluvchi oksidlarga kislotali oksidlar deyiladi.

Ular qatoriga: CO₂, SO₂, N₂O₅, P₂O₅, SO₃, Cl₂O₇, oksidlari va Mn₂O₇, O₃, CrO₃, V₂O₅, MoO₃, WO₃ kabi metallarning yuqori oksidlanish +6 va +7) darajalaridagi oksidlari kiradi. Ularni "angidrid"lar (suvlantirilgan kislotalar) nomi bilan yuritiladi.


Olinishi: 1. Metallmaslarning havo kislorodida yonishi natijasida:




2. Kuchsiz (beqaror) kislotalar tuzlariga kuchli kislotalar ta'sir ettirib, o'zi hollarda qizdirish natijasida:




3. Birikmalarni oksidlash (yondirish) usuli bilan:




4. Kislotalar tarkibidan suvni ajratish (degidratlash) usuli bilan:



5. Metall oksidiga metallmaslarning ta'siri natijasida:










6. Metallar va metallmaslarga kislota eritmalarini ta'sir ettirish bilan hosil qilinadi:








Fizikaviy xossalari. Kislotali oksidlar gazsimon (CO_2 , SO_2 , SO_3 , Cl_2O_7), qattiq (P_2O_5 , CrO_3 , Mn_2O_7 , N_2O_5) holatlarda bo'ladi. Ayrimlari suvda kam eriydi (SiO_2), gazsimon oksidlarning bosimi bilan suvda eruvchanligi ortadi. Suvli eritmalarini nordon ta'mli bo'ladi. Ular CrO_3 — qizg'ish-sariq, P_2O_5 , N_2O_5 , SiO_2 oq rangli, V_2O_5 , Mn_2O_7 — qoramtir-binafsha ranglarda bo'ladi.





Kimyoviy xossalari. 1. Suv ta'sirida tegishli kislotalarni hosil qiladi:



2. Asos (ishqor)lar bilan reaksiyaga kirishib tuz va suv hosil qiladi:





3. Asosli oksidlar bilan birikib tuzlarni hosil qiladi:





Amfoter oksidlar. Ham kislota, ham asos xossasiga ega bo'lgan oksidlar amfoter oksidlar deyiladi.

Amfoter ("ikki yuzlamachi") oksidlar qatoriga BeO , ZnO , SnO , PbO , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO_2 , SnO_2 , PbO_2 larni kiritish mumkin.



Olinishi: 1. Ko'pchilik boshqa oksidlar qatori bu oksidlar ham kislota bilan ayni elementlarning o'zaro bevosita ta'sirlashuvi natijasida hosil bo'ladi.



2. Gidroksidlarni termik parchalab olinadi:





3. Ayrim tuzlarni termik parchalab olinadi:





Fizikaviy xossalari. Amfoter oksidlar qattiq, amorf, ba'zan kristall tuzilishli, o'ziga xos rangli, yuqori temperaturaga chidamli moddalar bo'lib, suvda erimaydi.


Kimyoviy xossalari. 1. Amfoter oksidlarning asosiy xossalari — ularning asosli oksidlar bilan qizdirilganda birikib tuzlar hosil qilishidir:





2. Amfoter oksidlar (kislotali xossasi kuchliroq bo'lganlari) ishqorlar bilan qizdirilganda reaksiyaga kirishadi:



3. Amfoter oksidlar Na_2SO_3 , K_2CO_3 tuzlari bilan qo'shib qizdirilganda tuz va kislotali oksid hosil qiladilar:



4. Kislotalar ta'sirida ayrim amfoter oksidlar Al_2O_3 , SnO_2 , Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , PbO (kislotali xossalari kuchliroq) erimaydilar. Ayrimlari ZnO , Fe_2O_3 , PbO , SnO lar kislotalarda yaxshi eriydi, tuz va suv hosil bo'ladi:





Bulardan tashqari oksidlarning boshqa turlari ham mavjud. Ular peroksidlar va aralash oksidlardir.



Peroksidlar deb, tarkibida $-\text{O}-\text{O}-$ gruppalari va boshqa kimyoviy elementlarni tutgan oksidlarga aytiladi.

Masalan: Na_2O_2 , H_2O_2 , K_2O_2 , BaO_2 shular qatoriga kiradilar.

Peroksidlar quyidagi reaksiyalar bo'yicha olinadi:
Metallarning havoda yonishi:



Metallarning peroksidlariga kislotalar ta'sir ettirilsa, vodorod hosil bo'ladi:



Aralash oksidlar qatoriga Fe_3O_4 ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$), Pb_2O_3 ($\text{PbO} \cdot \text{Pb}_2\text{O}_3$) larni kiritish mumkin.

Bu birikmalarni bir elementning turli oksidlanish darajalarida olinishi. I. Ishqorlar ishqoriy va ishqoriy-yer metallarining suvda erishi natijasida hosil bo'ladi:

oksidlari $\text{Fe}_2\text{O}_3 = \overset{+2}{\text{FeO}} \cdot \overset{+3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$, yoki tegishli kislotalarning ayni bilan hosil qilgan tuzi $\text{Fe}(\text{FeO}_2)_2$ sifatida qarash mumkin.

Ba'zan $\text{M}_2\text{O} \cdot \text{M}_2\text{O}_3$ — tarkibli ikki xil metallarning II va III valentli aralash oksidlari — *shpinellar* ham uchraydi. Ularga $\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ kabilar tegishli bo'lib, juda qattiq, kristall moddalardir. Ular paramagnit va rangli kristallar bo'lgani uchun radioelektronikada va qimmatbaho toshlar sifatida ishlatiladi.




IV.2. Gidroksidlar

Tarkibida metall atomi va gidroksil gruppalarini tutgan murakkab moddalar gidroksidlar deyiladi. Ularning umumiy formulasi $\text{Me}(\text{OH})_n$ bo'lib, Me — metall atomi, n — gidroksil gruppalar soni (metallarning valentligi).

Gidroksidlar suvda eruvchanligiga ko'ra ishqorlar va asoslarga bo'linadi. Amfoter gidroksidlar ham mavjud.


Ishqorlar deb, suvda yaxshi erib, kuchli dissotsilanuvchi gidroksidlar aytiladi. Ularga: NaOH , LiOH , KOH , RbOH , CsOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ kiradi. Ishqor — "o'yuvchi", "yemiruvchi" ma'nosini bildiradi.

Ishqorlarning asosiy xususiyatlari suvda yaxshi erib, suvli eritmada deyarli to'liq ionlanishidir.




Asoslar — suvda kam eriydigan va juda kam dissotsilanuvchi moddalardir. Asoslarga: $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$ misol bo'ladi. NH_4OH — ammoniy gidroksidi, metall atomi bilan bog'langan yagona gidroksid ham asoslar qatoriga kiradi.

Asoslar suvda oz eriydi, juda oz ionlanadi:






Ishqorlar va asoslar eritmalarida OH^- — ionlari ko'p bo'lgani uchun eritma — ko'k rangli, fenolftalein — binafsha rangli bo'ladi.


Olinishi. I. Ishqorlar ishqoriy va ishqoriy-yer metallarining suvda erishi natijasida hosil bo'ladi:




II. Metall oksidlarining suvda erishi natijasida hosil bo'ladi:



III. Metall gidridlarining suvda erishi natijasida hosil bo'ladi:




IV. Ayrim hollarda almashinish reaksiyalari yordamida ishqorlar olinadi:



V. Asoslarni olish uchun ular oksidlarining suvda qisman erishidan foydalanish mumkin: $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$.

Umuman, gidroksid — "suvli oksid" ma'nosini bildirib, ikki xil metallar va metallmaslar oksidlarining suvli birikmalari sifatida qaralsa, metallarning gidroksidlari — asoslar, metallmaslarning gidroksidlari — kislotalar bo'ladi.


VI. Aksariyat hollarda asoslarni olish uchun metallarning eritmalari ishqor eritmalari ta'sir ettiriladi:




Fizikaviy xossalari. Hidroksidlardan faqat NH_4OH eritma bo'lib, boshqalari qattiq holda bo'ladi. Ishqorlar qattiq holda, oq yoki jigirtilgan, juda gigroskopik moddalardir. Asoslar turli rangli bo'lib, amorf va kristall tuzilishli, suvda kam eruvchan moddalardir. Ishqorlarning suvli eritmalari kuchli va asoslarning eritmalari kam elektr o'tkazish xossalariga ega.

Kimyoviy xossalari: a) yuqorida aytilganidek, kimyoviy jihatdan ishqorlar asoslarga nisbatan faol moddalardir. Ular suyuqlanma eritmada $\text{Me(OH)}_n = \text{Me}^{n+} + n\text{OH}^-$ tenglamaga ko'ra OH^- ionlarini miqdorda hosil qiladilar. Shu sababli ular "o'yuvchi" xossalarini namoyon qiladilar.


b) gidroksidlar kislotali oksidlar bilan ta'sirlashib tuz va suv hosil qiladilar:



v) qizdirilganda suv ajratib chiqarib tegishli metall oksidini hosil qiladi:



g) ba'zi gidroksidlar qizdirilsa, suv, kislorod va erkin holda metall ajralib chiqadi:




d) ammoniy gidroksid temperatura ta'sirida gazsimon moddalarga parchalanadi:



Gidroksidlarning nomlanishi: ularni nomlashda tegishli metall nomiga "gidroksid" so'zi qo'shib aytiladi. Masalan, LiOH — litiy gidroksidi, Ca(OH)_2 — kalsiy gidroksidi. Kimyoviy xossasiga ko'ra ular ishqorlar bo'lgani uchun: LiOH — litiy ishqori (yoki o'yuvchi litiy); NaOH — natriy ishqori (o'yuvchi natriy) nomlari ham mavjud.




Asoslarni nomlashda ham yuqoridagi qoida saqlanib qoladi. Agar bir metall turli oksidlanish darajalaridagi gidroksidlarni hosil qilsa, uning nomlari ko'rsatiladi: Fe(OH)_2 — temir (II)-gidroksidi; temir (II)-asosi; Fe(OH)_3 — temir (III)-gidroksidi; temir (III)-asosi; Cu(OH)_2 — mis (II)-gidroksidi; CuOH — mis (I)-gidroksidi va hokazo.

Amfoter gidroksidlar. Ham asos, ham kislota xossalarini namoyon qiluvchi gidroksidlar amfoter gidroksidlar deyiladi. Ularning umumiy tarkibini Me(OH)_n ga mos kelishini e'tiborga olib, amfoterlik xossasini shunday tushuntirish mumkin:




Bunday gidroksidlar qatoriga: Zn(OH)_2 , Sn(OH)_2 , Be(OH)_2 , Pb(OH)_2 , Al(OH)_3 , Cr(OH)_3 , Sn(OH)_4 lar kiradi.


a) amfoter gidroksidlar kislota xossasini namoyon qiladi:



b) amfoter gidroksidlar asos xossasini namoyon qiladi:



Amfoter gidroksidlarni olish uchun metallga ekvivalent miqdorda ishqor ta'sir ettirish kerak:



IV.3. Kislotalar

Kislotalar deb, tarkibida vodorod atomlari va kislota qoldig'i sa murakkab moddalarga aytiladi.

Kislotalar tarkibiga ko'ra, kislordsiz (H_2E) va kislородli (H_2E) bo'ladi.


Kislordsiz kislotalarga: HF, HCl, HBr, HI, H_2S , HCN , kabilar kiradi.

Kislородli kislotalarga: $HClO$, $HClO_2$, $HClO_4$, $HBrO_3$, HIO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , HNO_2 , HNO_3 , HPO_3 , H_3PO_3 , HPO_4 , H_2PO_4 , H_2CrO_4 , $HMnO_4$ kabilar kiradi.


Kislotalar tarkibidagi vodorod atomlari soniga ko'ra: *bir asosli* (bir asosli) HF, HCl, HNO_2 , HNO_3 , HI, HBr, $HClO$ — molekulasida bitta vodorod atomi tutgan kislotalar;

ikki asosli (ikki negizli) kislotalar H_2S , H_2CO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , *uch asosli* (uch negizli) H_3PO_3 , *to'rt asosli* (to'rt negizli) $H_4P_2O_7$ ga bo'linadi.



Olinishi. 1. Kislota oksidlarini (angidridlarni) suvda eritish:




2. Metallmaslarning to'g'ridan-to'g'ri vodorod bilan ta'sirlanish natijasida:




3. Kuchsiz kislota tuzlariga kuchli kislotalarni ta'sir ettirish:



4. Metallmaslarni kuchli kislotalar ta'sirida oksidlab olinadi:




5. Ba'zi metallmaslarning birikmalarini gidrolizlash usullari bilan olinadi:




Fizikaviy xossalari. Kislordsiz kislotalar odatdagi sharoitda zaharli hissimon moddalar bo'lib, ularning turli konsentratsiyali eritmalarini sil qilishda suvda eruvchanligidan foydalaniladi. Ayrim kislородli kislotalar suyuq (HNO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4), ba'zilari qattiq (H_2SiO_3 , H_3BO_3) moddalardir.


Kimyoviy xossalari. 1. Kislotalar asosli va amfoter oksidlar bilan aksiyaga kirishib tuz va suv hosil qiladilar:




2. Kislotalar gidroksidlar bilan ta'sirlashib tuz va suv hosil qiladi. Bu aksiya *neytrallanish* reaksiyasi ham deyiladi:



3. Aktivlik qatorida vodoroddan oldin turgan metallar bilan ta'sirlashib tuz va vodorod gazini hosil qiladi (nitrat kislota va konsentrlangan sulfat ishlata bundan mustasno):



4. Temperatura ta'sirida parchalanib (degidratlanib) tegishli oksid va suv hosil qiladi:



5. Kislotalar IYuPAK ning 1979 yilda qabul qilgan nomenklaturasidan asosan nomlanadi:

a) **kislorodsiz kislotalarning nomi** — kislota hosil qilgan element nomiga — “id” qo’shimchasi qo’shib aytiladi: HF — fluorid, HCl — xlorid, HBr — bromid, H₂S — sulfid, H₂Se — selenid, HCN — siyanid, H₂CO₃ — rodanid kislotalari;

b) **kislorodli kislotalarda element turli valentlik (yoki oksidlanish darajalari) namoyon qilsa:**

— “gipo” — old qo’shimchasi markaziy atom eng past oksidlanish darajasida bo’lsa qo’shiladi: HClO — gipoxlorit, HBrO — gipobromat, HIO — gipoyodat kislota deyiladi;

— “ir” — qo’shimchasi markaziy atom o’rtacha oksidlanish darajasida bo’lsa qo’shib aytiladi: HClO₂ — xlorit, H₂SO₃ — sulfit, HNO₂ — nitrit, H₃PO₃ — fosfit, H₃AsO₃ — arsenit, H₂SeO₃ — selenit kislotalari deyiladi;

— “at” — qo’shimchasi markaziy atom yuqori oksidlanish darajasida bo’lsa, kislota hosil qiluvchi element nomiga qo’shib aytiladi: H₂CO₃ — karbonat, H₂SiO₃ — silikat, H₂SO₄ — sulfat, HClO₃ — xlorat, HBrO₃ — bromat, HIO₃ — yodat, H₂SeO₄ — selenat, HNO₃ — nitrat kislotalari deyiladi;

— “per” — old qo’shimchasi kislota hosil qiluvchi elementning yuqori oksidlanish darajasini ko’rsatish uchun aytiladi: HClO₄ — perxlorat, HMnO₄ — permanganat, HI₄ — peryodat kislota;

— “piro” — qo’shimchasi agar kislota bir xil tarkibli kislotalar katta molekulasini birikib, bir molekula suv chiqib ketishidan (qizil) natijasida hosil bo’lgan bo’lsa, uning nomiga qo’shib aytiladi: H₂P₂O₇ — pirofosfat kislota (yoki difosfat kislota).

— bir element bir xil oksidlanish darajasida turli tarkibli kislotalar hosil qilsa, vodorod atomlari (aniqrog’i suv molekulasini) soni katta bo’lsa, vodorod atomlari ko’piga “orto” — old qo’shimchasi qo’shib aytiladi: HP⁺O₃ — metafosfat; H₂P⁺O₄ — ortofosfat, HB⁺O₂ — metaborat; H₂B⁺O₃ — ortoborat; H₂Si⁺O₃ — metasilikat; H₄Si⁺O₄ — ortosilikat kislotalari deyiladi;

Kislotalarning eritmalarida H⁺(H₃O⁺) — ionlari bo’lgani uchun lakmus-qizil rangga, metiloranji qizg’ish-binafsha rangga, Fenoltalein rangsiz bo’ladi.

IV.4. Tuzlar

Tuzlar deb, tarkibida metall atomlari va kislota qoldig’i bo’lgan anorganik birikmalarga aytiladi. Umuman, tuzlar gidroksidlar va kislotalarning o’zaro ta’siri mahsuloti bo’lib, ular turli tarkibli bo’ladi. Ularning har biri bilan tanishib chiqamiz.

I. **O’rta tuzlar** — tarkibi faqat metall atomi (yoki ammoniy gruppasi) kislota qoldig’idan iborat bo’lib M₂E, yoki M₂E₂O₂ formulalarga mos bo’ladi. Bunday tuzlarga: NaCl, KF, LiI, Rb₂S, CsNO₃, MgSO₄, CaCO₃, (PO₄)₃, FeSO₄, NH₄Cl, NH₄NO₃ va boshqalarni kiritish mumkin.

II. **Nordon tuzlar** — tarkibida metall atomi, kislota qoldig’idan tashqari vodorod atomi saqlagan tuzlardir. Bu tuzlarga: NaHCO₃, Mg(HCO₃)₂, (HCO₃)₂, K₂HPO₄, Fe(H₂PO₄)₂, LiHS, Mg(HS)₂, KHSO₃, NaH₂PO₄ boshqalar misol bo’ladi.

III. **Asosli tuzlar** — tarkibida metall atomi kislota qoldig’i va OH — gidroksil gruppalarini saqlagan tuzlar. Ularga: Mg(OH)Cl, (CuOH)₂CO₃, (OH)(CH₃COO)₂, Al(OH)SO₄, Al(OH)₂Cl, Fe(OH)₂NO₃, (OH)₂SO₄ va boshqalar kiradi.

IV. **Qo’sh tuzlar** — tarkibida bir xil kislota qoldig’i va ikki xil metall atomlari saqlagan tuzlar.

Bu qator tuzlarga: KAl(SO₄)₂ · 12H₂O; (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ · 12H₂O; Cr(SO₄)₂ · 6H₂O lar kiradi.

V. **Kompleks tuzlar** — tarkibida qattiq holda va eritmada mustaqil mavjud bo’la oladigan kompleks — ion saqlagan moddalar. Bu tuzlar qatoriga: K₄[Fe(CN)₆]; K₃[Fe(CN)₆]; Na₃[Co(NO₂)₆]; a₂[PtCl₆]; K₂[HgI₄]; Na₂[Zn(OH)₄]; Na₂[FeF₆]; K₂[PtCl₆] kabi moddalar kiradi.

Tuzlarning nomlanishi:

— o’rta tuzlar metall nomiga (valentligi) kislota qoldig’ining nomini o’shib aytish bilan nomlanadi: CuSO₄ — mis sulfat, FeCl₂ — temir (II)-xlorid, FeCl₃ — temir (III)-xlorid; Sn(NO₃)₂ — qalay (II)-nitrat; Cr₂(SO₄)₃ — xrom (III)-sulfat;

— nordon tuzlar metall (valentligi) va kislota qoldig’i nomiga, agar tuz tarkibida vodorod atomi bitta bo’lsa “gidro” yoki ikkita bo’lsa “digidro” qo’shimchalari qo’shib aytiladi. Masalan: NaHCO₃ — natriy gidrokarbonat yoki natriy bikarbonat; KHSO₃ — kaliy gidrosulfit (yoki kaliy bisulfit); NaH₂PO₄ — kalsiy gidrofosfat; NH₄H₂PO₄ — ammoniy digidrofosfat; Mg(H₂PO₄)₂ — magniy digidrofosfat, KH₂BO₃ — kaliy digidroborat;

— asosli tuzlar metall nomi (valentligi) va kislota qoldig’i nomiga “gidrokso” so’zi qo’shib nomlanadi. Masalan, Mg(OH)NO₃ — magniy gidroksonitrat, Fe(OH)Cl — temir (II)-gidroksoxlorid, Fe(OH)₂Cl — temir (III)-digidroksoxlorid; Al(OH)₂CH₃COO — alyuminiy digidroksoasetat;

— qo’sh tuzlar avval valentligi (oksidlanish darajasi) katta metall, keyin valentligi kichigining nomi va oxirida kislota qoldig’ining nomi aytilishi bilan nomlanadi: KAl(SO₄)₂ — alyuminiy kaliy sulfat.

$(\text{NH}_4)_2 \cdot \text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ — temir ammoniy sulfat. Bu tuzlar nom bilan "achchiqtosh"lar ham deb aytiladi. Shunga mos ravishda birinchisi — alyuminiy kaliyli achchiqtosh, ikkinchisi — temir ammoniy achchiqtosh deb aytiladi;

— kompleks tuzlarni nomlashda, avval kislota qoldig'i (yoki molekulaning lotincha soni, keyin uning nomi, metallning (valentligi) va tashqi sferadagi metall (yoki kislota qoldig'i) nomi keltiriladi. Masalan: $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ — kaliy geksasianoferrat (III);

$\text{K}_2[\text{PtCl}_4]$ — kaliy tetraxlor platinat (II);



$[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$ — dixlorotetraakva xrom (III)-xlorid.

Agar tashqi sferada boshqa ionlar bo'lmasa: $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ — triakva xrom (III) kabi nomlanadi.

Fizikaviy xossalari: barcha tuzlar qattiq moddalar bo'lib, turli rang bo'ladilar. Ular suvda eruvchanligi bo'yicha yaxshi eriydigan (KCl , NH_4NO_3 , KNO_3 , CaCl_2 va hokazo), kam eruvchan (CaSO_4 , AgCl , PbCl_2 va hokazo) va juda kam eruvchan (CaCO_3 , BaSO_4 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_3$ va hokazo)larga bo'linadi.

Kimyoviy xossalari:

1. Barcha tuzlar temperatura ta'sirida parchalanadi:




ko'rinib turibdiki, tuzlar parchalanganda ularning tarkibiga bog'liq turli anorganik moddalar hosil bo'ladi.




2. Nordon tuzlar ishqorlar va kislotalar bilan reaksiyaga kirishib o'rta tuz va suv (kislota yoki oksidni) hosil qiladilar:





3. Asosli tuzlar ishqor ta'sirida asos va yangi tuz hosil qiladilar:





Kislota ta'sirida o'rta tuz, suv (tuz tarkibida kislota qoldig'idan farq qiladigan) kislota bo'lsa — yangi kislota) hosil qiladi.






4. O'rta tuzlar ishqorlar va kislotalar ta'sirida quyidagilarni hosil qiladi:



Agar bu reaksiyalarda tuz va ishqor (yoki tuz va kislota) o'qvimolekulyar miqdorda olinsa, quyidagi moddalar hosil bo'ladi:




5. Tuzlar eritmalariga metallar ta'sir ettirilsa, almashinish reaksiyalari xolib, yangi tuz va metall ajralib chiqadi:




Tuzlarning olinishi. Tuzlarni olishning ko'p usullari mavjud bo'lib, ulardan eng asosiylari quyidagilardir.


1. Metallarning metallmaslar bilan ta'siri:




II. Metallarning kislotalar bilan ta'siri:




III. Metallarning ishqorlar bilan ta'siri:




IV. Metallarning tuzlar bilan ta'siri:




V. Asosli oksidlarning kislotalar bilan ta'siri:




VI. Kislotali oksidlarning gidroksidlar bilan ta'siri:




VII. Gidroksidlar va kislotalarning o'zaro ta'siri:




VIII. Kislotali oksidlarning tuzlar bilan ta'siri:







IX. Yaxshi eruvchan ikki tuzning o'zaro ta'siri:




X. Tuzlarning ishqorlar bilan ta'siri:




XI. Tuzlarning kislotalar bilan ta'siri:




XII. Galogenlarning ishqorlarda erishi:




XIII. Ayrim metallmaslarning tuzlar bilan ta'siri:





XIV. Ayrim tuzlarning o'zaro birikishi:




XV. Ammiakning kislotalar bilan birikishi tufayli tuzlar hosil bo'ladi:



XVI. Asosli tuzlar gidroksil guruhlari ko'p bo'lgan asoslar soniga nisbatan kam sondagi vodorod atomlariga ega bo'lgan bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'ladi:





Agar shu reaksiyada 3 ta OH⁻ ga 3 mol HCl qo'shganimizda




bo'yicha o'rta tuz hosil bo'lar edi.

XVII. Nordon tuzlar ko'p vodorodli kislotalar bilan shu vodorod sonidan kam OH⁻ ga ega bo'lgan asoslar reaksiyaga kirishganda hosil bo'ladi:



Agar shu reaksiyada 3 ta vodorod atomi uchun 3 mol KOH olish



bo'yicha o'rta tuz hosil bo'lar edi.

Yuqorida bayon etilgan mavzulardagi (tushuncha, formula va tenglamalari asosida) har bir sinf birikmalarining tarkibi va xossalari o'rganish natijalarini yakunlab, barcha anorganik birikmalar sinflari o'rganish bog'lanish bor, degan xulosaga kelish mumkin.

V bob

KIMYONING ASOSIY MIQDORIY (STEXIOMETRIK) QONUNLARI

Atom-molekulyar ta'limot nuqtai nazaridan kimyoning asosiy qonunlariga moddalar massasining saqlanish qonuni, tarkibning doimiylik qonuni, ekvivalentlar qonuni, karrali nisbatlar qonuni, hajmiy nisbatlar qonuni, Avogadro qonuni kiradi. Ular **stexiometrik qonunlar** deyiladi.

Stexiometriya — kimyoning alohida bo'limi bo'lib, unda reaksiyaga ishtirokchi moddalar orasidagi massa va hajmiy nisbatlar ko'rib chiqiladi. Stexiometrik miqdorlar — moddaning reaksiya tenglamasiga ko'ra yoki mulaga muvofiq keladigan miqdorini bildiradi.


Asosiy miqdoriy qonunlarni alohida-alohida ko'rib chiqamiz.

V.1. Moddalar massasining saqlanish qonuni

Ma'lumki, kimyoviy jarayonlar moddalar molekulari, atomlari va ionlari o'rtasida ro'y berib, ular o'zaro ma'lum miqdor yoki og'irlik nisbatlarida ta'sirlashadilar. Reaksiya davomida moddalarning shakli, rangi, fizik xossalari o'zgarsa-da, ularning umumiy miqdori o'zgarmay qoladi. Shu miqdor o'zgarishsizlik qonuni deb ataladi. Bu qonun o'zgarishsizlik qonuni bilan bog'liq munosabatlarni o'rganuvchi asosiy qonunlar qonunidir.

Ta'rif: Reaksiyaga kirishayotgan moddalar massalarining yig'indisi reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar massalari yig'indisiga tengdir.

Ta'rifning qanchalik to'g'ri ekanligini quyidagi tenglama misolida ko'rsatib ko'raylik:



Ta'rifga ko'ra: $\Sigma m_{\text{dastlabki moddalar}} = \Sigma m_{\text{hosil bo'lgan moddalar}}$ bo'ladi.

Tenglamada H_2SO_4 , KOH — dastlabki moddalar, hosil bo'lgan moddalar K_2SO_4 va H_2O ekanligini bilgan holda:

$$\Sigma m_{\text{dastlabki moddalar}} = M_{\text{H}_2\text{SO}_4} + 2M_{\text{KOH}} = 98 + (2 \cdot 56) = 210 \text{ g}$$

$$\Sigma m_{\text{hosil bo'lgan moddalar}} = M_{\text{K}_2\text{SO}_4} + 2M_{\text{H}_2\text{O}} = 174 + (2 \cdot 18) = 210 \text{ g}$$

$$\Sigma m_{\text{dastlabki moddalar}} = \Sigma m_{\text{hosil bo'lgan moddalar}}, \text{ ya'ni } 210 = 210 \text{ g}$$

Bu qonun asosida har qanday kimyoviy reaksiyalar bilan miqdoriy hisoblashlar amalga oshiriladi. Yirik ishlab chiqarish (kimyo sanoati) uchun qo'llanilganda esa, har bir texnologik jarayon moddiy balansi (xomashyo sarfi, mahsulot ishlab chiqarish) hisoblashni o'rgatadi.

Yadro reaksiyalarida moddalar massasining saqlanish qonuni qilmaydi. Chunki bunday reaksiyalarda bir element yadrosidan elementlar yadrolari hosil bo'lishida massa o'zgarishi ro'y berib, yadrolar massalari yig'indisi bilan hosil bo'lgan yadrolar massasi g'indisi o'rtasida Δm — qiymatga teng farq yuzaga keladi. Bu farq "massa defekti" deyiladi. Tinchlik massasi m_0 quyidagi E = mc^2 formulasiga binoan E ga to'g'ri kelgan qiymatga proporsional o'zgaradi. Bu formula A. Eynshteyn tomonidan taklif etilgan bo'lib, moddaning tinch holatdagi energiyasi, m — modda massasi, c — yonqorin vakuum sharoitidagi tezligi bo'lib, $3 \cdot 10^8$ m/sek ga teng. E = 8,9 kJ/mol bo'ladi. Kimyoviy jarayonlarda ajralib chiquvchi energiya massaning $10^{-7}\%$ iga proporsionaldir.

Yadro reaksiyalarida juda katta energiya ajralgani uchun kamayadi, shu sababli bu yerda massaning saqlanish qonuni qilmaydi.

Moddalar massasining saqlanish qonuni barcha kimyoviy reaksiyalarda qo'llaniladi. Uni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan hisoblashlar bilan tanishib chiqamiz.

1-masala. Tarkibida 10% qo'shimchasi bo'lgan 10 g texnik temir namunasi bilan reaksiyaga kirishishi uchun necha gramm HCl kerak?


Yechish: a) 10 g texnik temir namunasidagi sof Fe moddasi og'irligini hisoblaymiz:

10 g namuna $\rightarrow$ 100 % bo'lsa,

$m_{\text{qo'shimcha}} \rightarrow$ 10 % bo'ladi.

$$m_{\text{qo'shimcha}} = \frac{10 \cdot 10}{100} = 1 \text{ g.}$$

$$\text{Endi } m_{\text{Fe}} = m_{\text{namuna}} - m_{\text{qo'shimcha}} = 10 - 1 = 9 \text{ g.}$$



tenglamaga ko'ra:



$$1 \text{ mol Fe} = 56 \text{ g uchun} \rightarrow 2 \text{ mol} = 2 \times 36,5 = 73 \text{ g HCl kerak}$$

9 g uchun m_{HCl}

$$m_{\text{HCl}} = \frac{9 \cdot 73}{56} = 11,73 \text{ g HCl kerak}$$

2-masala. 20 gramm CaCO_3 ni hosil qilish uchun CaO ning qanday miqdorini suvdan eritib, unga necha litr CO_2 yutilishini hisoblang.

Yechish: Reaksiya tenglamasini tuzamiz:



(b) tenglamaga ko'ra 1 mol (100 g) CaCO_3 hosil bo'lishi uchun 1 mol (74 g) Ca(OH)_2 reaksiyaga kirishadi.

20 gramm CaCO_3 ($20/100 = 0,2$ mol) uchun $m_{\text{Ca(OH)}_2}$ kerak. Buni proporsiya holida yozsak:

$$100 \text{ g CaCO}_3 \text{ uchun} \rightarrow 74 \text{ g Ca(OH)}_2 \text{ kerak.}$$

$$20 \text{ g CaCO}_3 \text{ uchun} \rightarrow m \text{ g kerak.}$$

$$m_{\text{Ca(OH)}_2} = \frac{20 \cdot 74}{100} = 14,8 \text{ gramm}$$

(a) tenglamaga asosan 1 mol (74 g) Ca(OH)_2 olish uchun 1 mol (56 g) CaO ni suvdan eritish kerak. 14,8 g Ca(OH)_2 uchun m g CaO

$$74 \text{ g Ca(OH)}_2 \text{ uchun} \rightarrow 56 \text{ g CaO kerak.}$$

$$14,8 \text{ g Ca(OH)}_2 \text{ uchun} \rightarrow m_{\text{CaO}} \text{ kerak.}$$

$$m_{\text{CaO}} = \frac{14,8 \cdot 56}{74} = 11,2 \text{ gramm}$$

(b) tenglamaga asosan 100 g CaCO_3 hosil bo'lishi uchun 22,4 l (1 mol) CO_2 sarflanadi. 20 g CaCO_3 uchun esa:

$$V_{\text{CO}_2} = \frac{20 \cdot 22,4}{100} = 4,48 \text{ litr}$$

Agar yuqoridagi ikkala reaksiya ketma-ket borib, oxirida bitta mahsulot — CaCO_3 hosil bo'lishini e'tiborga olsak, (a) va (b) tenglamalardagi Ca(OH)_2 va H_2O lar hisoblashda ishtirok etmaydi:

$\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ (v) tenglamaga kelinadi. Bu tenglamada ham moddalar massaning saqlanish qonuni amal qiladi va uning asosidagi hisoblash 1 taga qisqarib, natijalar yuqoridagidek bo'ladi.

V.2. Tarkibning doimiylik qonuni

Har qanday modda sifat va miqdor tarkiblari bilan ajralib ular moddalarni tavsiflovchi asosiy kattaliklar qatoriga kiradi. Shuningli, kimyoning asosiy qonunlari qatorida modda tarkibining doimiylik qonuni ham turadi. Bu qonunning asoschilari J. Dalton, S. P. F. Lavuazyedir.

Qonunning ta'rif: Har qanday kimyoviy toza modda va qanday usulda olinishidan qat'i nazar doimiylik sifat va miqdor tarkibga ega bo'ladi.

Bu qonunning ma'nosini quyidagi misol bilan tushuntirish mumkin: — NaCl moddasini quyidagi reaksiyalar bo'yicha hosil qilish mumkin:

- a) $2\text{Na} + \text{Cl}_2 = 2\text{NaCl}$
- b) $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = 2\text{NaCl} + \text{BaSO}_4$
- d) $2\text{NaOH} + \text{ZnCl}_2 = 2\text{NaCl} + \text{Zn(OH)}_2$

Tenglamalardan ko'rinib turibdiki, uchala reaksiya (uchta usul) bilan hosil qilingan NaCl moddasi tarkibida 1 atom Na ga 1 atom Cl ega bo'ladir. Bu modda qayerda saqlanmasin (laboratoriyada, idishda, xotirada, va hokazo), uning tarkibi NaCl ligicha qolaveradi.

"Daltonid"lar - tarkibi doimiy bo'lgan moddalardir. Ular qat'iy kislotalar, asoslar, tuzlar, gazlar kiradi.

"Bertollidlar" - shunday moddalarki, ularni hosil qilishda reaksiya sharoiti (P, T, V, C) ozgina o'zgartirilsa, hosil bo'ladigan modda tarkibi ham o'zgaradi, ya'ni ular tarkibning doimiylik qonuniga bo'ysunmaydilar.

Ular qatoriga og'ir metallarning oksidlari Ti_2O_3 , TiO , TiO_2 , ZrO_2 , $\text{Zr}_{1,2}\text{O}_{2,1}$, $\text{Zr}_{0,9}\text{O}_{2,0}$, sulfidlari Me_2S_3 , $\text{Zr}_{2,5}\text{O}_{2,5}$, $\text{Ti}_{1,8}\text{O}_2$, ko'pchilik qotishma va shishalar kiradi.

Umuman tarkibning doimiylik qonuni har birimizni kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirishda reaksiya sharoitiga, katta ishlab chiqarish jarayonlarida texnologiyada belgilangan parametrlarga to'liq rioya qilish o'rgatadi.

V.3. Avogadro qonuni

Kimyoviy reaksiyalar gazsimon moddalar ishtirokida ham boradi. Gazsimon moddalar ishtirokida boradigan reaksiyalardagi miqdoriy bog'lanishni A. Avogadro o'rganib, quyidagi qonunni yaratgan:

Bir xil sharoit (bir xil bosim va temperatura)da teng hajmdagi turli gazlar molekulalar (atomlar) soni o'zaro teng bo'ladi.

Avogadro qonunidan ikkita xulosaga kelib chiqadi. **Normal sharoitda ($T = 273\text{K}$, $P = 101,325\text{ kPa}$) da har qanday gazsimon moddaning "1 mol" miqdori 22,4 litr hajmni egallaydi va uning gazlarining molyar hajmi deyiladi.** $V_{\text{molyar}} = V_{\text{m}} = 22,4\text{ l/mol}$ holida belgilanadi.

Bo'lsun, ko'ra: 1 mol N_2 gazini sh. da 22,4 l hajmga ega. Uning 0,1 moli esa 2,24 l hajmni egallaydi.

b. Gazsimon moddaning hajmi va miqdori uning tarkibidagi zarracha (molekula, atom)lar soniga bevosita bog'liqdir. Shunga ko'ra ikkinchi xulosaga kelib chiqadi:

Har qanday moddaning "1 mol" miqdori tarkibida $6,02 \cdot 10^{23}$ ta zarracha (molekula, atom, ion) bo'ladi. Bu Avogadro soni deyilib, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ holida yoziladi.

Demak, 1 mol H_2 tarkibida $6,02 \cdot 10^{23}$ ta vodorod molekulalari bor. Uning har bir molekulasi 2 ta vodorod atomi bo'lib, shuning uchun undagi H atomlari soni esa 2 marta ko'p — $12,04 \cdot 10^{23}$ ta bo'ladi. Agar xulosaga bilan 2-xulosani H_2 gazini uchun birgalikda qo'llasak:

1 mol H_2 da $6,02 \cdot 10^{23}$ ta molekula bo'lib, 22,4 l hajmni egallaydi.

10 mol H_2 da $6,02 \cdot 10^{24}$ ta molekula bo'lib, 224 l hajmni egallaydi.

0,5 mol O_2 gazini 16 g bo'lib, unda $3,01 \cdot 10^{23}$ ta molekula bor, ular 11,2 l hajmni egallaydi.

2,24 l Cl_2 gazida $6,02 \cdot 10^{22}$ ta molekula bo'lib, uning miqdori 0,1 mol va massasi 7,1 g bo'ladi.

Gazlarning zichligi va nisbiy zichligi haqida tushuncha

Avogadro qonuni asosida gazlarning zichligi hisoblab topiladi. Har qanday gazsimon moddaning zichligi hajm birligidagi (1 litr) gazsimon moddaning massasi bo'lib, ρ — bilan belgilanadi

Turli gazlarning (m.sh.da) vodorod va havoga nisbatan zichligi

Modda	M, g	V molyar hajm, l	$\rho = M/V$ g/litr	$D_{H_2} = \frac{M}{2}$	$D_{havo} = \frac{M}{29}$
H ₂	2	22,4	0,089	1,0	0,068
O ₂	32	22,4	1,428	16	1,103
N ₂	28	22,4	1,25	14	0,964
CO ₂	44	22,4	1,964	22	1,517
CH ₄	16	22,4	0,714	8	0,552
C ₂ H ₆	30	22,4	1,340	15	1,0345
NH ₃	17	22,4	0,760	8,5	0,586
Cl ₂	71	22,4	3,170	35,5	2,450

Gazlarning zichligiga asoslanib, ularning bir-biriga nisbatan (nisbiy zichligi — D) hisoblanadi. Gazlarning nisbiy zichligi deb sharoitda teng hajmdagi gazlar massalarining o'zaro nisbatiga, yoki gazlarning nisbiy zichligi gazlar molekulyar massalarining nisbatiga

$$D_{(B)} = \frac{r(A)}{r(B)} = \frac{m(A)}{m(B)} = \frac{M(A)}{M(B)}$$

Masalan, kislorodning vodorodga nisbatan zichligi:

$$D_{(H_2)} = \frac{r(O_2)}{r(H_2)} = \frac{1,42857}{0,089285} = 16,00$$

yoki

$$D_{(H_2)} = \frac{M(O_2)}{M(H_2)} = \frac{32}{2} = 16,00$$

Demak, kislorodning vodorodga nisbatan zichligi $D_{H_2} = 16$ — kislorod

gazining 1 litri vodorod gazining 1 litriga nisbatan 16 marta og'ir (yoki kislorodga nisbatan vodorod gazi 16 marta yengil) ekanligini bildiradi.

Ko'pchilik hollarda gazlarning nisbiy zichligi vodorodga nisbatan (D_{H_2}), havoga nisbatan (D_{havo}) yoki boshqa biror gazga nisbatan hisoblanadi. Gazlarning nisbiy zichligidan foydalanib, ularning molekulyar massasi hisoblanadi.

Masala. Tarkibi uglerod va vodoroddan iborat gazsimon moddaning vodorodga nisbatan zichligi $D_{H_2} = 15$ va havoga nisbatan zichligi 1,03448 ga teng bo'lsa, shu gazning molyar va bitta molekulasini hisoblang.

A. Noma'lum gazning vodorodga nisbatan zichligi 15 ga teng deylik:

$$D_{H_2} = \frac{M(\text{gaz})}{M_{H_2}} \text{ dan}$$

$$M_{\text{gaz}} = D_{H_2} \cdot M_{H_2} = 15 \cdot 2 = 30 \text{ g/mol}$$

B. Havoga nisbatan zichligini hisoblashda $M_{(havo)} = 29 \text{ g/mol}$ deb qabul qilinadi:

$$D_{havo} = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{havo}} \text{ dan}$$

$$M_{\text{gaz}} = D_{havo} \cdot M_{havo} = 1,03448 \cdot 29 = 30 \text{ g/mol}$$

V. Avogadro qonuniga asosan bitta molekulaning massasi:

$$6,02 \cdot 10^{23} \text{ ta molekula} \rightarrow 30 \text{ g bo'lsa}$$

$$1 \text{ ta molekula} \rightarrow m \text{ g bo'ladi.}$$

$$m = \frac{1 \cdot 30}{6,02 \cdot 10^{23}} = 5 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

Gazsimon moddalarning "mol" miqdori — n, hajmi — V, massasi — m, molekulyar massasi — M, bosimi — P, temperaturasi — T o'rtasida o'zaro bog'lanish bor. Bu bog'lanish Mendeleyev — Klapeyron va gazlarning umumlashgan holat tenglamalari orqali ifodalanadi.

Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi: Har qanday sharoitda "1 mol" gaz uchun: $PV = nRT$ bo'ladi. Bu formulada $n = m/M$ bo'lib, qiymatlarni o'rniga qo'ysak: $PV = m \cdot R \cdot T/M$ bo'ladi. Bundan gazsimon moddaning molekulyar massasi:

$$M = mRT/PV \text{ kelib chiqadi.}$$

R — universal gaz doimiysi $8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{grad}$ ga teng.

Masala: 22 g CO₂ gazi 10°C da 100 kPa bosimda qanday hajm egallaydi?

Yechish:

Mendeleyev - Klapeyron tenglamasiga asosan gazning hajmi

$$V_{CO_2} = \frac{m \cdot R \cdot T}{M \cdot P} = \frac{22 \cdot 8,314 \cdot 283}{44 \cdot 100} = 9,765 \text{ litr}$$

P, V, T — mavjud sharoitdagi gazning bosimi, hajmi va temperaturasi.

Bu formuladan: $V_0 = \frac{P_0 \cdot V \cdot T_0}{P_0 \cdot T}$ gaz hajmini normal sharoitga keltirish

formulasi kelib chiqadi.

Bu formulalar asosida hisoblashda quyidagi o'lchov birliklari foydalanish mumkin:

Bosim uchun:

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \cdot 10^5 = 1,01325 \cdot 10^5 \cdot \text{Pa} = 101,325 \text{ kPa} = 760 \text{ mmHg}$$

$$\text{Hajm uchun: } 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l} = 1000 \text{ dm}^3 = 1 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ ml} = 1000 \text{ cm}^3$$

Temperatura uchun: t°C — Selsiy shkalasi. T — absolyut (mutlak) temperatura, K (Kelvin shkalasi). Absolyut temperaturani hisoblash:

$$T = T_0 + t^\circ = 273 + t^\circ$$

V.4. Ekvivalentlar qonuni

Agar reaksiya tenglamalariga e'tibor berilsa, ularda moddalar atom miqdoriy nisbatlarda birikib, hosil bo'lgan moddalar tarkibida har bir elementning atomlar soni shu miqdoriy nisbatga to'g'ri kelishini ko'rish mumkin.

Suv hosil bo'lish reaksiyasida: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ 2 mol vodorod va 1 mol kislorod bilan ta'sirlashib, tarkibida 2 atom vodorod va bir atom kislorod saqlagan H₂O molekulasini hosil qiladi. Boshqacha qaralsa, har 2 g H va 16 g O elementlari birikib 18 g H₂O ni hosil qiladi. Buni yanada ham kichikroq miqdoriy nisbatlarda qaralsa, 1 g H va 8 g O elementlari o'zaro qoldiqsiz birikib 9 g H₂O hosil qiladi.

Bundan shunday xulosaga kelish mumkin: har qanday holatda suv hosil bo'lish jarayonida 1 g H elementi (6,02 · 10²³ ta H atomlari) 8 g O elementi (3,0 · 10²³ ta O atomlari)ga kimyoviy jihatdan ekvivalent (teng kuchli) miqdordir.

Agar bu reaksiyada ikkala moddadan birortasi ko'p miqdorda, masalan, 16 g O elementi olinsa aynan yuqoridagi 1 g H : 8 g O miqdoriy nisbatda reaksiya boradi va 16 - 8 = 8 g kislorod ortib qoladi. Shunga asosan moddalarning kimyoviy jihatdan teng kuchli miqdoriy nisbatlarini ifodalash uchun *ekvivalent tushunchasi* kiritilgan bo'lib, E — harfi bilan belgilanadi, "g/ekv" birlikda o'lchanadi.

Moddalarning ekvivalentlarini ifodalashda nisbiy ekvivalent birlik (bir ekvivalent og'irlik) sifatida 1 mol H atomi og'irligi (1 g) yoki 1 mol O — atomi og'irligining yarmi (8 g) qabul qilingan.

Har qanday moddaning ekvivalenti deb, uning 1 g (og'irlik qism — o. q) vodorod yoki 8 g (o. q) kislorod bilan birikadigan (yoki o'rnini oladigan) og'irlik miqdoriga aytiladi.

Shunga ko'ra:

$$E_H = 1 \text{ g/mol}; E_O = 8 \text{ g/mol}; E_{Mg} = 12 \text{ g/mol},$$

$$E_N = 9 \text{ g/ekv}; E_{Cl} = 35,5 \text{ g/ekv bo'ladi}$$

Demak, Mg ning ekvivalenti 12 g/mol deyilgani, uning 12 grammi kislotalar tarkibidan 1 g H ni siqib chiqaradi yoki 8 g kislorod bilan birikishini anglatadi.

Yuqoridagi tushunchalar asosida asosiy qonunlardan biri — **ekvivalentlar qonuni** kelib chiqqan.

Ta'rif: Har qanday modda massa yoki hajm bo'yicha o'z ekvivalentiga proporsional holda reaksiyaga kirishadi.

Bu qonunni quyidagi umumiy tenglama uchun matematik ko'rinishda yozsak:



$$\frac{m_A}{m_B} = \frac{E_A}{E_B} \text{ bo'ladi}$$

Oddiy moddalarning ekvivalentlarini hisoblash uchun elementning atom og'irligini uning valentligiga bo'lish kerak:

$$E = A/V$$

$$\text{Masalan: } E_{Na} = A_{Na}/B = 23/1 = 23 \text{ g/mol},$$

$$E_{Ca} = 40/2 = 20 \text{ g/mol}$$

Agar element biror modda tarkibida berilsa: $\text{Fe}^{\text{II}}\text{Cl}_2$ va $\text{Fe}^{\text{III}}\text{Cl}_3$ temirning ekvivalentligi mos ravishda $E_{\text{Fe}} = 56/2 = 28 \text{ g/mol}$ ga va $E_{\text{Fe}} = 56/3 = 18,66 \text{ g/mol}$ ga teng bo'ladi.

Murakkab moddalarning ekvivalentlarini hisoblash quyida keltirilgan.

A. Oksidlar uchun. $E_{\text{oksid}} = M_{\text{oksid}}/V$ — oksid tarkibidagi atomlarining (summar) umumiy valentligi:

Masalan: $E_{\text{Al}_2\text{O}_3} = M_{\text{Al}_2\text{O}_3} / 3 \cdot 2 = M_{\text{Al}_2\text{O}_3} : 6$

B. Kislotalar uchun: $E_{\text{kisl}} = M_{\text{kisl}}/n_{(\text{H})}$
 $n_{(\text{H})}$ — 1 molekula kislota tarkibidagi H atomlari soni. Agar reaksiya tenglamasida berilsa, 1 molekula kislota tarkibida reaksiyada ishtirok etgan H atomi soni.

Masalan: $E_{\text{H}_2\text{SO}_4} = M/2 = 98/2 = 49 \text{ g/mol}$




$E_{\text{NaOH}} = M/1 = 98/1 = 98 \text{ g/mol}$

V. Gidroksidlar uchun: $E_{\text{gidroksid}} = M_{\text{gidr}}/n_{(\text{OH})}$

$n_{(\text{OH})}$ — gidroksid tarkibidagi OH lar soni.

Masalan: $E_{\text{Al(OH)}_3} = M_{\text{Al(OH)}_3} / 3 = 78/3 = 26 \text{ g/mol}$

Agar reaksiya tenglamasi berilsa, 1 mol gidroksid tarkibida reaksiyada ishtirok etgan OH lar soniga ko'ra:



$E_{\text{Al(OH)}_3} = M_{\text{Al(OH)}_3} / 2 = 78/2 = 39 \text{ g/mol}$

G. Tuzlar uchun:

$E_{\text{tuz}} = M_{\text{tuz}}/\text{umumiy valentlik}$

$E_{\text{FeSO}_4} = M_{\text{FeSO}_4} / 2 = 142/2 = 71 \text{ g/mol}$

$E_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = M_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} / 2 \cdot 3 = 1/6 M_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3} = 400/6 = 66,66 \text{ g/mol}$

Ko'rinib turibdiki, moddalarning ekvivalent massalari bir element yoki bir modda uchun turli qiymatga egadir. Shu jihati bilan u atom yoki molekulyar massadan farq qiladi.



Savollar

1. Atom — molekulyar ta'limotning asosiy qoidalari nimadan iborat?
2. Modda, molekula va atom tushunchalari ta'rifini tushuntiring.
3. "Modda miqdori", "modda massasi" tushunchalari va ularning o'lchov birligi ma'nosini tushuntiring.
4. Moddaning sifat va miqdor tarkibi deganda nimani tushunasiz?
5. Gazlarning molyar hajmi va Avogadro sonining ma'nosini tushuntiring.
6. "Valentlik" deganda nimani tushunasiz, uni aniqlash uchun qanday tushunchalarni bilish zarur?
7. Oddiy moddalarning ekvivalenti qanday hisoblanadi?
8. Qaysi reaksiya tenglamalarida moddalar massasining saqlanish qonuniga noya qilinmagan?
 $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3 = \text{H}_2\text{SO}_4$ $2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3 = 2\text{H}_2\text{SO}_4$
 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_3 = 2\text{H}_2\text{SO}_4$ $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3$
9. 16,15 mol CH_4 gazining hajmi. CH_4 — molekulari, C va H-atamlari soni hisoblansin.
10. $6,02 \cdot 10^{23}$ ta va bitta O_2 molekulasining og'irligini hisoblang. Ular nishda qanday hajmni egallashi mumkin?
11. D. I. Mendeleevning ayrim qo'lyozmalarida* shunday yozuvlarni: AlH^+O^- ; PH^+O^- ; AlH^+O^- ; $\text{Mg}(\text{H}^+\text{O}^-)_2$; $\text{Si}(\text{OH})^+\text{S}^-\text{O}^+$; SH^+O^- uchratish mumkin. Bu yozuvlar tarkibning doimiylik qonuniga to'g'ri keladimi? Hozirda bu moddalar qanday nomlanadi va ularning formulalari qanday yoziladi?

VI bob

ATOM TUZILISHI

Mavzuga doir asosiy tushunchalar: atom yadrosi, izotop, izobara, elektron qavat, elektron qavatcha, Bor postulatlari, kvant sonlari, Gund qoidasi, Pauli prinsipi, ionlanish energiyasi, elektronga moyillik, elektromagnitlik, s-, p-, d-, f-elementlar, davriy qonun, elementlar davriy jadvali.

VI.1. Atomning tarkibi

1895 yili ingliz olimi Kruks gazlarda elektr razryadini o'rganib (Kruks naychasi), manfiy qutb (katod) dan nur chiqishini va uning oddiy nurdan farqlanib, magnit maydoni ta'sirida "og'ishi"ni aniqladi. Bu manfiy zaryadli zarrachalar oqimini Kruks "katod nurlari" deb atadi. J. Tomson bu zarrachalar tabiatini o'rganib, uning zaryadining massasiga nisbati, $(e/m) = -1,76 \cdot 10^{11} \text{ Kl/kg}$ turli gazlarda bir xil ekanligini aniqladi. Bu zarrachani **elektron** — qahrabo, ishqalanganda zaryadlanuvchi modda

M.M.ABDULXAYEVA

nomi bilan atadi. Bu hodisa va fotoeffekt (yorug'lik nuri ta'siri metallardan manfiy zaryadli zarrachalarning chiqishi) hodisalarining kashf etilishi atom tarkibida elektronlar mavjudligini ko'rsatdi.

A. Bekkerel tomonidan 1896 yilda uran o'rganilib, radioaktivlik hodisalarining (α -, β -, γ -nurlari) kashf etilishi atomda elektrondan boshqacha yana kichik zarrachalar (musbat zaryadli zarracha) borligini ko'rsatdi.

1895 yilda nemis fizigi Rentgen katod nurlarining sirtga urilib, yashil nur (X-nur) hosil qilishini va u $\lambda=10^{-10}$ m to'lqin uzunligi bilan tavsiflanishini aniqladi. 1898 yili barcha ma'lumotlarni umumlashtirib, Tomson atomining tarkibi to'g'risidagi dastlabki fikrni ilgari surdi. Atomda musbat zaryadlangan zarrachalardan iborat bo'lib, unda musbat zaryadli zarrachalar orasida manfiy zaryadli zarrachalar joylashgan, deb aytdi.

1909 yilda E. Rezerford va uning shogirdlari G. Geyger va Marsden yopqqa metall folga (plastinka)ni α -zarrachalar bilan ta'sirini o'rganib, zarrachalarning asosiy qismi plastinkadan o'tishini, juda kam qismi (800 tadan bittasi) o'z yo'nalishini o'zgartirishi, hatto orqaga qaytishini kuzatdilar (1-rasm).

Shundan so'ng "atom — bo'linuvchan murakkab zarracha", deb tushuncha paydo bo'ldi va bu murakkab zarrachani o'rganish muammolari yuzaga keldi. Bu muammolarni o'rganish bilan shug'ullangan E. Rezerford o'zining olib borgan aniq tajribalari asosida quyidagi xulosalarga keldi:

— atomning deyarli barcha massasi va musbat zaryadli materiya (zarrachasi) uning kichik hajmli markazida to'planadi, bunga yadro deyiladi;

— atom yadrosining musbat zaryadli materiya uning atrofida aylanib yuruvchi va son jihatidan yadro zaryadiga teng bo'lgan manfiy zaryadli zarrachalar — elektronlar bilan neytrallanadi.

Eng oddiy atom — vodorod atomidir. Eng oddiy yadro ham vodorod atom yadrosidir. Uning zaryadi son jihatidan elektron zaryadiga teng, ishorasi esa teskari bo'ladi. Bu yadroning massasi boshqa barcha atomlar yadro massalaridan ko'proq kichigidir ($m = 1,679 \cdot 10^{-27}$ kg).

1-rasm. α -zarrachalarning metall plastinkalarga urilib og'ishi.

Vodorod yadrosi 1920 yilda Rezerford tomonidan elementar zarracha deb tan olindi va unga "proton" — "birinchi" degan nom berildi. Protonning shartli belgisi — ${}^1_1\text{P}$.

Vodoroddan boshqa elementlarning yadro zaryadi qiymati ular atomlari massasidan farq qilishi aniqlandi va yadroda protondan boshqa yana zaryadsiz, lekin aniq massaga ega bo'lgan zarracha borligi to'g'risida taxmin paydo bo'ldi.

1932 yilda Chedvik Be atomini α -zarrachalar bilan ta'sirini o'rganib chiqib, bunday zarrachaning mavjudligini isbotladi va unga "neytron" (${}^1_0\text{n}$) nomini berdi.

1932 yilda D. I. Ivanenko va Geyzenberg atom yadrosining proton-neytron nazariyasini yaratdilar, ya'ni yadroning tarkibi proton va neytrondan iboratligi tan olindi.

Proton va neytron birgalikda "nuklonlar" deyiladi. "Nuklon" lar yadro tarkibini tashkil etuvchi zarrachalar ma'nosini anglatadi.

3-jadval

Atom tarkibini tashkil etgan elementlar zarrachalarining asosiy tavsifnomalari

Elementar zarracha	Belgisi	Zaryadi, kl	Nisbiy zaryadi	Massasi, kg	Massaning atom birligida
Proton	${}^1_1\text{P}$	$+1,60212 \cdot 10^{-19}$	+1	$+1,6726 \cdot 10^{-27}$	1,0073
Neytron	${}^1_0\text{n}$	0	0	$+1,6750 \cdot 10^{-27}$	1,0087
Elektron	e	$-1,60212 \cdot 10^{-19}$	-1	$+9,1075 \cdot 10^{-31}$	$5,4858 \cdot 10^{-4}$

1913 yilda Mozli yadroning zaryadi atomning raqamiga tengligini va bu elementning tartib raqami ekanligini aniqladi hamda tartib raqamini Z harfi bilan belgilashni taklif etdi.

Biror element atomi yadrosidagi protonlar (musbat zaryadlar) soni N_p elementning tartib raqamiga tengdir. $N_p = Z = N$. Atomining massasi atom yadrosidagi protonlar soni va neytronlar soni yig'indisiga teng: $A = N_p + N_n$.

Bu formuladagi (N_p) o'rniga Z ni qo'ysak, $A = Z + N_n$ kelib chiqadi. Bu formula kimyoviy elementning tartib raqami bilan atom og'irligining o'zaro bog'liqligi isbotidir.

Bu xulosalarning to'g'riligini Na- elementi atomining tarkibini tekshirish bilan tekshirib ko'raylik. Na- elementining tartib raqami $Z = 11$. Uning yadrosida $N_{(p)} = 11$ ta va $N_{(n)} = A - Z = 23 - 11 = 12$ ta. Jami 23 ta nuklon bor. Atomdagi elektronlar soni $N_{(e)} = N_{(p)} = 11$ ta.

Bu ilmiy tajribalar va ular asosida yig'ilgan dalillar atomning tashkil topganligi to'g'risida quyidagi xulosalarga olib keladi:

— atom musbat zaryadli yadro va manfiy zaryadli elektronlar iborat;

— yadro atomning markazida joylashgan bo'lib, proton va neytronlardan tashkil topgan. Yadroda atomning barcha massasi yig'ilgan.

VI.2. Izotop va izobaralar

Atomlar bir kimyoviy elementga tegishli bo'lsa-da, ular yadrolarining tarkibi har xil bo'lishi mumkin. Bu farqlanish, asosan, yadro elementar zarrachalar (nuklonlar) soni har xil bo'lishi sababli yuzaga kelishi aniqlanib, buning oqibatida "izotop" va "izohara" tushunchalari yuzaga kelgan.

Izotop. Yadrosining zaryadi (protonlar soni) bir xil bo'lib, og'irligi har xil bo'lgan bir xil element atomlari izotop deyiladi. Izotoplar deyarli barcha kimyoviy elementlarda mavjuddir. Masalan, vodorodning uchta izotopi mavjud: ^1_1H (deyteriy), ^2_1H (tritium) izotoplari mavjud; kislorodning $^{16}_8\text{O}$ va $^{18}_8\text{O}$ izotoplari mavjud. Izotoplar kelib chiqishining sababi atom yadrosida neytronlar sonining har xil bo'lishidir. Vodorod izotoplarining tarkibi bu fikrni yaqqol isbotlaydi.

Izotop	Nomi	$Z = N(p)$	$N_{(p)}$	$N_{(n)}$	A, u. b.
^1_1H	Vodorod	1	1	0	1
^2_1H	Deyteriy	1	1	1	2
^3_1H	Tritiy	1	1	2	3

Izobara. Shunday atomlar turi mavjudki, ular turli elementlarga tegishli bo'lsalar-da, atom og'irliklari bir xil bo'ladi. Yadro zaryadi turli bo'lib, atom og'irliklari bir xil bo'lgan elementlar atomlari izobaralar deyiladi. Masalan, kaliy elementining $^{39}_{19}\text{K}$ va $^{40}_{19}\text{K}$ izotoplari ham

kaliy elementining $^{40}_{20}\text{Ca}$ va $^{42}_{20}\text{Ca}$ izotoplari ham mavjud bo'lib, ulardan $^{40}_{19}\text{K}$ va $^{40}_{20}\text{Ca}$ atomlari o'zaro izobaralardir. Bu atomlarda nuklonlar soni o'zaro har xil bo'lsa-da, umumiy soni (yig'indisi) bir xil:


Izotoplar	Nomi	$Z = N(p)$	$N_{(p)}$	$N_{(n)}$	A, u. b.
$^{40}_{19}\text{K}$	Kaliy	19	19	21	40
$^{40}_{20}\text{Ca}$	Kaliy	20	20	20	40

Bulardan tashqari, izoton va izoelektron tushunchalari ham mavjud. Tarkibidagi neytronlari soni bir xil bo'lgan zarrachalar izotonlar deyiladi. Masalan, $^{25}_{13}\text{Al}$ da $25 - 13 = 12$ ta, $^{24}_{12}\text{Mg}$ da $24 - 12 = 12$ ta neytron bor. Tarkibidagi elektronlar soni bir xil bo'lgan zarrachalar izoelektronlar deyiladi. Masalan, K^+ va Cl^- . $\text{K}^+ = 19 - 1 = 18$ ta, $\text{Cl}^- = 17 + 1 = 18$ ta elektron bor.


VI.3. Yadro reaksiyalari

Atomlarning yadrolari tarkibi o'zgarishi bilan borib, yangi element yadrolari hosil bo'lishiga olib keluvchi jarayonlar yadro reaksiyalari deyiladi. Yadro reaksiyalari tabiatda va sun'iy usulda ro'y beradi.

Tabiiy radioaktiv elementlar:



Sun'iy radioaktiv elementlar:



bo'lgan elementlar.



Tabiiy yadro reaksiyalari radioaktiv elementlarning parchalanishi (radioaktivlik) tufayli sodir bo'ladi. Radioaktiv elementlar o'zidan uch xil α -, β -, γ -nurlar chiqarib, boshqa element yadrolarini hosil qiladi (2-rasm).

A α -nurlanish (α -zarracha) musbat zaryadli zarrachalar bo'lib, ge- liy yadrosiga to'g'ri keladi. Kuchli ionlash xossasiga ega bo'lib, 0,01 mm qalinlikdagi to'siqlardan o'tadi.


B β -nurlanish (β -zarracha) manfiy zaryadli (-1) bo'lib, elektronlar oqimidan iborat, 0,01 m qalinlikdagi to'siqdan o'ta oladi.

V. γ -nurlanish rentgen nurlariga o'xshash bo'lib, kuchli o'tish (singish) xossasiga ega; 0,1 m qalinlikdagi to'siqdan o'ta oladi.

Yadro reaksiyalari α -parchalanish, β -parchalanish kabi asosiy bo'linadi. α -parchalanishda yangi hosil bo'lgan elementning yadro 2 birlikka kamaysa, massasi 4 birlikka kamayadi:



β -parchalanishda yangi hosil bo'lgan elementning tartib raqami birlikka ortib, yadroning massa soni o'zgarmay qoladi:



Ba'zi yadro reaksiyalarida pozitron (${}^0_{+1}\text{e}$) yoki $(+\beta)$ zarracha bo'lib, tartib raqami bir birlikka kamayadi, ammo yadroning massa soni o'zgarmaydi:



Shunday yadro reaksiyalari ham borki, unda yadro β -zarracha biriktirib oladi. Bunda tartib raqami bir birlikka kamayadi, yadro massa soni o'zgarmaydi:




Bu hodisaga "K-qamrash" deyiladi.




Ayrim elementlar barqaror izotoplari yadrolarining elementlar zarrachalar bilan ta'sirlashuvi natijasida (bombardimon qilinganda) yangi yadro reaksiyalari ro'y beradi. Shunday reaksiyalarni birinchi marta Rezerford 1919 yilda azot atomini α -zarrachalar (He) bilan to'qnashuv amalga oshirgan:



Bu reaksiyani (α, p) turdagi reaksiya deyiladi. α -biriktiruvchi zarracha, p-hosil bo'luvchi zarracha. Shu singari boshqa turdagi (α, n) , (p, α) , (n, α) — reaksiya turlari ham mavjud:



2-rasm. α -, β -, γ - nurlarning elektr maydonida ajralishi.



Yadro reaksiyalari fan va texnikada keng qo'llaniladi. Davriy jadvaldagi 93-elementdan boshlab undan keyingi elementlarning hammasi yadro reaksiyalari natijasida hosil qilingan. Yadro reaksiyalari natijasida Δm — massaning kamayishi va $E = \Delta m \cdot c^2$ formulaga asosan katta energiya ajralib chiqishi tufayli radioaktiv elementlar (atom reaktorlarida) yadro energiyasidan foydalaniladi.

Tibbiyotda rak kasali bilan og'rigan bemorlar ${}^{60}\text{Co}$ -izotopi (γ -nurlari manbai) ta'sirida davolanadi. Jarrohlikda asboblarni sterilashda, nishonlangan atomlar usuli bilan dorilarning organizmga ta'sirini o'rganishda qo'llaniladi.

Texnikada detallarning yemirilish darajasini, qalinligini, suv va neft quvurlarida paydo bo'lgan teshiklarni aniqlashda, moddalar miqdorini topishda (suyultirilgan izotoplar usuli) radioaktivlikdan keng foydalaniladi.

VI.4. Atomning elektron tuzilishi

Atomning elektron tuzilishi to'g'risidagi dastlabki tasavvurni J. Tomson ilgari surgan bo'lsa-da, haqiqatga yaqin fikrni Rezerford (1912 y.) bildirdi. Uning fikricha, atomning markazida musbat zaryadli yadro va uning atrofida elektronlar aylanma harakatda bo'ladi (3-rasm).

Aylanma harakatdagi elektronga F_1 va F_2 kuchlar ta'sir etib, ular elektron yadrodan r-masofada bo'lganda o'zaro teng ($F_1 = F_2$) bo'ladi.

Shu sababli, atom barqaror zarrachadir. Lekin bu tasavvur keladigan atom tuzilishi modeli atom holdagi moddalardan chiqqan nur chiziqli spektrlar hosil qilishini tushuntira olmadi.

Agar atom holdagi metallni qizdirib nurlanadigan holatgacha kelinsa va bu nur prizmadan o'tkazilsa, nur ayrim bo'laklarga ajralib, ya'ni shu nurga to'g'ri keluvchi spektr hosil bo'ladi. Bu spektr chiziqli tuzilishga ega bo'ladi. Bu atomning *chiziqli spektri* deyiladi. Masalan, rasmda vodorod atomining spektri keltirilgan bo'lib, har bir chiziqli o'tiqin uzunligi (λ , nm) va to'liq soni (ν , sm^{-1}) ga ega:

$$(1 \text{ nm} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ cm} = 10 \text{ \AA}).$$

Spektrlarning chiziqli tabiatini tushuntirish uchun Plank (Maks Plank) tomonidan atomlarning energiya yutishi (yoki chiqarishi) uchun bo'l-masdan, bo'laklar (kvantlar) dan iboratligi nazariyasi yaratildi. Bu nazariyaga ko'ra har qanday atom energiya kvantini fotonlar holdida yutadi va chiqaradi. Bu energiya miqdori quyidagicha bo'ladi: $E = h \cdot \nu$ (h — Plank doimiysi = $6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sek}$ $C = 3 \cdot 10^{10} \text{ cm/sec}$).

Rezerford va Plankning xulosalari asosida ularga qo'shimcha ravishda zarrachalar uchun kvant mexanikasi elementlarini qo'llab, Nib (Niels) atomning elektron tuzilishi to'g'risida ikkita postulatini yaratdi va asosida Rezerfordning atom tuzilishi to'g'risidagi modeli o'rnatildi. Bu modelni *planetar (Bor) modelini* taklif etdi.

Borning I postulati: atomda elektron yadrodan ma'lum bir o'zgarishsiz masofada, ya'ni "statsionar orbita" bo'ylab harakatlanadi. Bunda energiya yutilmaydi ham, chiqmaydi ham (atom nurlanmaydi).

Bu fikrga ko'ra, elektron yadro atrofiga orbitalar — elektron qavatlar joylashgan bo'lib, har bir qavat o'ziga xos energiyaga ega. Statsionar orbitalar yadrodan uzoqlashib borgan sari uning va undagi elektron energiyasi ortib boradi (3-rasm):

$$E_1 < E_2 < E_3 \dots < E_n$$

Agar statsionar orbita bo'ylab harakatlanayotgan elektron harakat momenti (impulsi) miqdori:

$$m \cdot v \cdot r = n \cdot \frac{h}{2\pi} \text{ bo'lib, bunda } n = 1, 2, 3 \dots \infty$$

Elektronning e'tiborga olinsa eng kam energiyali orbita $n = 1$ da, ya'ni yadro eng yaqin turgan orbita bo'ladi. Bu vodorod atomi uchun ($n = 1$) hisoblanib, vodorod atomining normal (asosiy) holati hisoblanadi. Agar elektron

$n = 2, 3, 4, 5 \dots$ orbitalarga o'tsa, vodorod atomining "qo'zg'algan holat" deyiladi va ko'p elektronli atomlar uchun mos keladi.

II postulat: atomda elektron bir statsionar orbitadan ikkinchi orbitaga o'tishda energiya yutiladi yoki chiqadi.

Bunda ikki holat bo'ladi: a) elektron yadroga yaqin orbitadan uzoq orbitaga o'tsa: $E_1 \rightarrow E_2$; $E_2 \rightarrow E_3$; $E_4 \rightarrow E_5 \dots E_{n-1} \rightarrow E_n$; energiya kvanti (ΔE) ni yutadi. $\Delta E = h\nu = E_n - E_{n-1}$ bo'ladi.

b) elektron yadrodan uzoqdagi orbitadan yaqin orbitalarga o'tsa: $E_n \rightarrow E_{n-1}$; $E_4 \rightarrow E_3$; $E_5 \rightarrow E_4 \dots E_2 \rightarrow E_1$; atom energiya kvanti (ΔE) ni chiqaradi, ya'ni atom (modda) nur chiqaradi.

$$\Delta E = h\nu = E_n - E_{n-1}$$

Ikkala holda ham har bir o'tish uchun to'g'ri keladigan energiya miqdori ν ning bir xil qiymatiga mos bo'ladi. Bor yuqoridagi formulalar asosida vodorod atomi elektron orbitalari radiuslarini hisoblash formulasini taklif etdi:


$$r = \frac{h^2}{4\pi^2 m e^2} \cdot n^2$$

Shu formula asosida $n=1$ bo'lganda, vodorod atomining radiusi $r = 0,053 \text{ nm} = 0,53 \text{ \AA}$ ekanligini ko'rsatdi. Bu formula asosan: $n=2$ (II qavat) uchun $r = 0,53 \text{ nm}$; $n^2 = 0,53 \cdot 2^2 = 2,12 \text{ nm}$; $n=3$ (III qavat) uchun $r = 4,77 \text{ \AA}$; $n=4$ (IV qavat) uchun $r = 8,48 \text{ \AA}$ kabi bo'ladi.

Atomning elektron tuzilishini yanada to'liqroq tasavvur etish uchun elektronning "to'liq-zarracha" xususiyatini ifodalovchi Lui de Broyl va Shredinger tenglamalari,

Geyzenbergning noaniqlik prinsiplarini bilish zarur. Bu tushunchalar bilan darslikning oxirida berilgan adabiyotlar orqali kengroq tanishish mumkin.

Har bir elektron qavatda elektron(lar)ning qanday joylashganligi va elektron qavatlarining tuzilishini aniq bilish uchun elektronlarning kvant sonlari, Gund qoidasi, Pauli qoidasi (prinsipi) bilan tanishib chiqamiz.



3-rasm. Atomning Rezerford bo'yicha modeli:
 F_1 — yadro bilan elektronning elektrostatik tortishuv kuchi;
 F_2 — aylanma harakatdagi elektronga ta'sir etuvchi markazdan qochuvchi kuch.

VI.5. Kvant sonlari

Atom elektron qavatlaridagi elektronlarning holatini to'liq tushunchalari mavjudligi aniq uchun kvant sonlari (n, l, m_l, m_s) tushunchalari mavjudligi aniq.

Birinci kvant soni — *bosh kvant soni* bo'lib, n — harfi bilan belgilanadi. Bosh kvant son har bir elektron qavatdagi elektronning energiya darajasini belgilaydi va uning yadrodan qanday masofada joylashganini ko'rsatadi. Uning qiymatlari $n = 1, 2, 3 \dots \infty$ bo'lishi mumkin (4-jadval). Kvant soni ortib borishi bilan unga mos keluvchi qavatlarining energiya darajasi ortib boradi: $E_1 < E_2 < E_3 < E_4 < \dots E_n$.

Davriy jadvalda n -element joylashgan davrning raqamiga mos keluvchi elektron qavatlar sonini bildiradi. Masalan: III davr elektronlari uchun $n=3$ bo'lib, ularning atomlarida 3 ta elektron qavat bor. Atami har bir elektron qavat raqamiga mos keluvchi harfiy belgilar ham mavjud: $n=1$ (K-qavat), $n=2$ (L-qavat), $n=3$ (M-qavat), $n=4$ (N-qavat) va sh.k.

Atom elektron qavatlarini tuzilishini o'rganish, ularning qavatlarini (orbital) dan iborat bo'lishini ko'rsatadi. Har bir qavatdagi elektron soni turlicha bo'lib, $N_{\text{elektron}} = 2n^2$ Plank formulasi bo'yicha hisoblanadi.

$n = 1$ qavatda $N_{\text{elektron}} = 2 \cdot 1^2 = 2$ ta

$n = 2$ qavatda $N_{\text{elektron}} = 2 \cdot 2^2 = 8$ ta

$n = 3$ qavatda $N_{\text{elektron}} = 2 \cdot 3^2 = 18$ ta ... bo'ladi.

$N_{\text{orb}} = n^2$. Shunga ko'ra I qavatda 1 ta, II qavatda 4 ta orbital hokazo bo'lishi mumkin (4-jadval).

Kvant sonlari va elektron orbitallari

n	l	0 (s)	1 (p)	2 (d)	3 (f)	Elek. qavat	
						n^2 orb. soni	$2n^2$ elek. soni
1	0	□				1	2
2	0	□	□□□			4	8
3	0	□	□□□	□□□□□		9	18
4	0	□	□□□	□□□□□	□□□□□□□	16	32
m_l	0	-1, 0, +1	-2, -1, 0, +1, +2	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3			

Orbital kvant soni (l)

Yuqorida aytilganidek, har bir elektron qavat bir yoki bir necha elektron orbital (qavatcha) lardan iborat bo'ladi. Bu elektron orbitallarda elektronlar yadro atrofida qanday ko'rinishda harakatlanishi, ya'ni orbitalning fazoviy (tashqi) ko'rinishini aniqlab berish uchun elektron orbital kvant soni qabul qilingan va l (el) — harfi bilan belgilanadi. Orbital kvant sonining qiymati bosh kvant soni qiymatiga bog'liq bo'ladi: $l = 0$ dan $n-1$ gacha bo'ladi.

n	1	2	3	4	...n
l	0	0; 1	0; 1; 2	0; 1; 2; 3	...n-1

Orbital kvant soni har bir qiymatiga aniq ko'rinishdagi elektron orbitallari mos keladi, ular lotincha s, p, d, f ... kabi harflar bilan belgilanadi:

l	0	1	2	3
Orbital belgisi	s	p	d	f

Har bir orbitalga mos keluvchi fazoviy ko'rinish (shakl) 4-rasmda keltirilgan. s-orbital sharsimon, p-orbitallar "gantelsimon" ko'rinishga ega.

4-jadval. Har bir elektron orbital ma'lum sondagi elektronlarni o'zida sig'diradi. Bu elektronlar soni har bir orbital uchun l ning qiymatiga bog'liq bo'lib, $2(2l+1)$ formula bilan hisoblanadi:

s-orbitalda $l = 0$ bo'lib, eng ko'pi bilan $2(2 \cdot 0 + 1) = 2$ ta ;

p-orbitalda $l = 1$ bo'lib, $2(2 \cdot 1 + 1) = 6$ ta (p^{1+4})

d-orbitalda $l = 2$ bo'lib, $2(2 \cdot 2 + 1) = 10$ ta (d^{1+9})

f-orbitalda $l = 3$ bo'lib, $2(2 \cdot 3 + 1) = 14$ ta (f^{1+13}) elektron joylashadi. Orbitaldagi elektronlar s-elektron, p-orbitaldagi elektronlar p-elektronlar bo'ladi va mos ravishda d- hamda f-elektronlar ham bo'ladi.

Magnit kvant soni (m_l)

Bu kvant soni m_l — harfi bilan belgilanib, elektron orbital (bulutlari) ning magnit maydoni ta'sirida biror aniq (fazoning X, Y, Z-o'qlar) bo'yicha nisbatan egallagan holati (proyeksiyalar) sonini ko'rsatadi. Oshqancha aytganda, elektron bulutlari (orbitallari) fazoda X, Y, Z-o'qlari bo'yicha qanday joylashganini ko'rsatadi.

Magnit kvant soni l kvant sonining ($-l$ dan $+l$) gacha qabul qiladi:

$$m_l = -l, 0, +l$$

l	0	1	2	3
m_l	0	-1; 0; +1	-2; -1; 0; +1; +2	-3; -2; -1; 0; +1; +2; +3

Magnit kvant soni har elektron qavat va bir orbitalga to'g'ri energiya holati — energetik yacheykalar sonini bildiradi.

Har bir elektron qavatdagi energetik yacheykalar soni N (orbital soni kabi) bo'ladi (4-jadval).

Har bir orbitaldagi yacheykalar soni $(2l+1)$ ta bo'ladi. Masalan, $l=0$ uchun 1 ta, unga to'g'ri keluvchi yacheyka soni $(2 \cdot 0 + 1) = 1$ ta bo'ladi. $l=1$ uchun 3 ta, d -orbitalda $l=2$, $(2 \cdot 2 + 1) = 5$ ta, f -orbitalda $l=3$, $(2 \cdot 3 + 1) = 7$ ta energetik yacheyka bo'ladi.

Bu hisoblashlar asosida har bir elektron qavatdagi elektron yacheykalar soni va turlarini aniqlab ko'raylik:

I qavatda $n=1$, $l=0$, $m_l=0$ bo'lib, unda $1^2=1$ s-yacheyka bo'ladi. $1s$ holida belgilanadi.


II qavatda $n=2$; $l=0$; $m_l=0$. 1 ta s-yacheyka ($2s$) va 3 ta p-yacheyka, jami $2^2=4$ ta yacheyka ($2s, 2p$) ko'rinishida belgilanadi.

III qavatda hammasi bo'lib $3^2=9$ ta yacheyka, ulardan 1 ta s-yacheyka ($3s$), 3 ta p-yacheyka ($3p$) va 5 ta d-yacheyka ($3d$) bo'ladi.

Bu yacheykalar energiyalari jihatdan farq qiladi: $E_s < E_p < E_d$ (rasm).

Shuningdek, turli qavatdagi bir xil orbital yacheykalar energiyalari bilan ajralib turadilar: $E_{1s} < E_{2s} < E_{3s}$ yoki $E_{1p} < E_{2p} < E_{3p}$ hokazo. Shu sababli atomlarning elektron yacheykalari joylashish rasmidagidek tasavvur qilish va shu ko'rinishda yozish kerak.

Har bir yacheyka elektron orbitalning koordinata o'qlari bo'yida joylashganligiga mos kelgani uchun koordinata o'qlari bilan belgilanadi. Masalan, $2p$ -orbital fazoda uch xil holatda X -o'qi (p_x); Y -o'qi bo'yicha (p_y); Z -o'qi bo'yicha (p_z) holida joylashgan bo'lsa, $2p$ -orbital p_x, p_y, p_z yacheykalardan iborat.



Har bir yacheykada ko'pi bilan 2 ta elektron joylasha oladi. Masalan, $1s$ -yacheykani qaraydigan bo'lsak, $\square$ -bo'sh s-yacheyka; $\square^{\uparrow}$ - qisman to'lgan s-yacheyka va $\square^{\uparrow\downarrow}$ -to'liq s-yacheyka deyiladi. Bu xulosalar d- l -yacheykalar uchun ham taalluqlidir.

Spin kvant soni

Elektron yadro atrofida aylanma harakat qilayotganda o'z o'qi atrofida ham aylanadi (tepilgan futbol to'pini tasavvur qiling). Bu harakat quyi-rasmda keltirilgan.

Elektronning o'z o'qi atrofida qaysi tomonga harakatlanishini ko'rsatuvchi kattalik *spin kvant soni* deyiladi, m_s -harfi bilan belgilanadi. m_s ning qiymati $+1/2$ yoki $-1/2$ bo'ladi. Elektron o'z o'qi atrofida soat so'ngi yo'nalishi (a) bo'yicha harakatlansa, $m_s = +1/2$ bo'lib, u to'g'ri spinli elektron deyiladi. Agar soat millari yo'nalishiga teskari yo'nalish (b) bo'yicha harakatlansa $m_s = -1/2$ bo'lib, teskari spinli elektron ($\downarrow$) deyiladi.

Ko'pchilik hollarda elektronlarning spin kvant soni qiymati berilmaydi, faqat o'rniga ($\uparrow$) ($\downarrow$) belgilar ishlatiladi. Elektronlar energetik yacheykalarga joylashtirilganda ularning spinlari yo'nalishi $\square^{\uparrow}$ (a), $\square^{\downarrow}$ (b) va $\square^{\uparrow\downarrow}$ (v) holida ko'rsatiladi. Shunga ko'ra elektronlar toq spinli (a, b) va juftlashgan (v) spinli bo'ladi. Toq spinli elektronlar turli yacheykalarda, juftlashgan spinli elektronlar bitta yacheykada joylashadi.


Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni aytish mumkin:

- atomdagi har bir elektron 4 xil kvant soni bilan tavsiflanadi;
- kvant sonlari har bir elektronning atomda joylashgan o'rnini, tartibini, energiyasi, harakat shakli, holatini aniq ko'rsatib beradigan asosiy sonlar bo'lib, ular atamliklardir.


VI.6. Elektron qavatlarning elektronlar bilan to'lib borishi. Elektron formulalar

Vodorod elementidan boshlab elementlarning tartib raqamlari ortib borishi bilan atomlardagi elektronlar soni ham ortib boradi. Ko'p elektronli atomlarda elektron qavatlarning elektronlar bilan to'lib borishi elektronlarning energiyalari, kvant sonlari qiymatiga, Pauli, Gund qoidalariga asoslanib aniqlanadi.



Pauli 1925 yilda ko'p elektronli atomlarni o'rganib elektronlarning kvant sonlari tushunchasi va ularning qiymatlari asosida elektronlar joylashuvi to'g'risida quyidagi qoidani yaratdi.



s — elektron orbitalning fazoviy ko'rinishi.



p — elektron orbitalarining fazoviy ko'rinishi.



d — elektron orbitalarining fazoviy ko'rinishi.

4-rasm. Elektron orbitalarining fazoviy ko'rinishlari.

Pauli prinsipi: atomda to'rtala kvant soni bir xil bo'lgan ikki yoki undan ortiq elektronning bo'lishi mumkin emas.

Bu prinsipning qanchalik to'g'ri ekanligini He-atomi misolida ko'rib chiqaylik. Geliy ($Z=2$) atomida 2 ta elektron bo'lib, ikkala elektron ham quyidagi kvant sonlari xos bo'ladi:

Kvant	A		B	
n	1	1	1	1
l	0	0	0	0
m_l	0	0	0	0
m_s	$+1/2(\uparrow)$	$-1/2(\downarrow)$	$+1/2(\uparrow)$	$+1/2(\uparrow)$
Elektron formula	$1s^2\downarrow$		$1s^2\uparrow\uparrow$	

A-holatda Pauli prinsipiga ko'ra dastlabki uchta kvant sonlari o'zaro xil bo'lib, 1 va 11 elektronning faqat to'rtinchi m_s kvant sonlari o'zaro qo'ng'ir bo'ladi. Shu sababli ikkala elektron bitta yacheykada joylashgan, ular teskari yo'nalgan va ular o'zaro juftlashgan holatda He-atomi-ning elektron tuzilishini to'g'ri aks ettiradi.

B-holatda 4 ta kvant soni ham bir xil. Agar bu holat to'g'ri bo'lsa, bitta elektron bitta joyga to'g'ri kelib, ular yonma-yon joylashishlari kerak. Lekin, bizga ma'lumki, ikkita bir xil zaryadli zarracha bitta nuqtada (ustma-ust) joylashishi mumkin emas. Shuning uchun geliy atomidagi elektronlar ham ustma-ust joylasha olmaydi. Agar ular bir xil spinli bo'lsalar, boshqa-boshqa yacheykalarda joylashishlari kerak. Ammo buning imkoniyati yo'q, chunki He uchun $n = 1$ bo'lib, yacheykalar soni $= 1^2 = 1$ dan ortiq bo'la olmaydi.

Shuningdek, He atomi va undan boshqa barcha element atomlari ham B-holat to'g'ri kelmaydi.

Gund qoidasi. Ko'p elektronli atomlarda elektronlar soni ortib borishi bilan ular joylashishi mumkin bo'lgan orbital (yacheyka)lar ham ortib boradi. Bu yacheykalarda elektronlar Gund qoidasiga amal qilgan holda joylashadi.

Ko'p elektronli atomlarda elektronlar yacheykalarga joylashayotganda spinlarini parallel yo'naltirib, spinlar yig'indisi ($\sum m_s \rightarrow \max$) maksimal bo'lishiga intiladilar.

Bu qoidaga asosan yacheykaga kelib joylashadigan har bir elektron atidan bir xil energiyali yacheykani band qiladi. $Z = 5(B)$ dan $Z = 7(B)$ gacha bo'lgan element atomlari 2p-orbitallarining elektronlar bilan

to'lib borishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. B-atomining 2p orbitalida 1 ta elektron $\uparrow\downarrow$ bor.

Keyingi element — C da ($Z = 6$) qo'shilgan bitta elektron elektron yoniga joylashmasdan, keyingi bo'sh yacheykani $\uparrow\downarrow\uparrow$. Shuningdek, $Z = 7$ N-atomida yana bitta qo'shilgan oxirgi bo'sh yacheykani to'ldiradi $\uparrow\downarrow\uparrow\uparrow$. Shunda B atomining yig'indisi $(+1/2) = 0,5$; C-atomida $(+1/2) + (+1/2) = 1$ va N-atomida $2) = 3/2 = 1,5$ bo'ladi.

Atom orbitallarining elektronlar bilan to'lib borish energiyalariga bog'liq bo'lib, "eng kam energiyali holat" qoidasi qo'llaniladi. Bunga ko'ra avval eng kam energiyali (yadroga yaqin) keyin energiyasi ko'proqlari to'lib boradi. Bu tartibni o'zida tomonlama aks ettirgan qoida — **Klechkovskiy qoidasidir.**

Klechkovskiy qoidasi atom elektron orbitallarining energiyasi $(n + l)$ yig'indining qiymatiga bog'liqlik qoidasidir.

1-qoida. Atom orbitallarini elektronlar bilan to'lib borish $(n + l)$ yig'indining eng kichik qiymatiga mos keladigan orbitaldan boshlanadi. $(n + l)$ yig'indining katta qiymatlariga mos keluvchi orbitallar to'ldiriladi. Shunday qilib, $(n + l) = 1 + 0 = 1$; $(n + l) = 2 + 0 = 2$; $(n + l) = 2 + 1 = 3$ qoidasiga mos keluvchi orbitallarni elektron bilan to'lib borishini ko'rib chiqish avval $(n + l) = 1$ orbital (1s); keyin $(n + l) = 2$ orbital (2s), $(n + l) = 3$ orbital (2p) elektronlar bilan to'lib boradi, ya'ni $1s < 2s < 2p$ tartibida.

2-qoida. Agar bir necha orbital uchun $(n + l)$ yig'indining bir xil bo'lsa, n ning kichik qiymatidan boshlab, elektron orbitallari bilan to'lib boradi.


Masalan: $n + l = 2 + 1 = 3$ va $n + l = 3 + 0 = 3$ bo'lsin. Ikkala holatda ham $n + l = 3$. Bu elektron orbitallardan $n = 2$ va $l = 1$ bo'lgan (2p) orbital avval elektron bilan to'ldiriladi, keyin $n = 3$ va $l = 0$ bo'lgan (3s) orbital elektron bilan to'ldiriladi.

Chunki $n + l = 2 + 1$ orbitalning energiyasi $n + l = 3 + 0$ orbitalning energiyasidan kichik, ya'ni $E_{2p} < E_{3s}$, yoki $2p < 3s$ tartibida to'ldiriladi.


Shu singari $n + l = 3 + 2 = 5$, (3d); $n + l = 4 + 1 = 5$ (4p); $n + l = 5 + 0 = 5$ (5s); orbitallarni solishtirsak, avval $n = 3$, keyin $n = 4$ va nihoyatida $n = 5$ bo'lgan 3d; 4p; 5s orbitallar to'lib boradi. Chunki energiyalari $3d < 4p < 5s$ bo'lgan orbitallar quyidagicha joylashadi:

$$\dots 3d < 4p < 5s \dots$$

Yuqoridagilarga asosan elektron orbitallarining energiyalari qatorini ko'ra joylashtirsak, quyidagi qator yuzaga keladi:



5-rasm. Elektron orbitallarni energiyalari bo'yicha joylashuvi.



6-rasm. Elektronning xususiy o'qi atrofida aylanishi.

$$1s < 2s < 2p < 3s < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p < \dots$$

Har qanday element atomi elektronlarining elektron orbitallarda joylashish tartibini shu qator asosida yozilishi atomning elektron konfiguratsiyasi deyiladi. Elektron konfiguratsiyani yozish uchun:

- elementning tartib raqami va elektronlar sonini bilish;
- atomdagi elektron qavatlar sonini aniqlash;
- elektron qavatlar bo'yicha elektronlarning taqsimlanishini ko'rsatish;
- har bir elektron orbital joylashgan qavatni raqami va ulardagi elektron sonini ko'rsatish;
- energetik yacheykalar soni, ularda elektronlarning spinlari bo'yicha joylashishini ko'rsatish kerak.

VII bob

D. I. MENDELEYEVNING DAVRIY QONUNI
VA ELEMENTLAR DAVRIY JADVALI

Davriy qonun 1868 yilda D. I. Mendeleev tomonidan bo'lib, uning klassik ta'rifi quyidagicha: *"Kimyoviy elementlar tomonidan hosil qilgan birikmalarning shakl va xossalari elementlar atomlariga davriy ravishda bog'liqdir"*.

Davriy qonun kashf etilgan davrda hali atomning tarkibi noma'lum edi. Shu sababli elementlarning asosiy tavsifi sifatida atom massalari qabul qilingan. Lekin atom tuzilishi nazariyasi atomning tarkibi (yadro, proton, neytron, elektron) to'g'ri ma'lumotlar yuzaga kelgandan so'ng davriy qonunga berilgan ta'rif hozirgi zamon ta'rifi yuzaga keldi: *"Kimyoviy elementlar va birikmalarining xossa va tuzilishlari element atomlari yadro zaryadlariga davriy ravishda bog'liqdir"*.

Davriy qonunning grafik tasviri sifatida kimyoviy elementlar D. I. Mendeleev 1870 yilda tuzgan. Davriy jadvalning yuzdan ortiq mavjud bo'lib, bu sohada Lotar Meyerning xizmatlari ham katta. U vaqtida davriy jadvalning "qisqa davrli varianti" va "uzun davrli variant"laridan foydalaniladi. Davriy jadval 7 ta davr (gorizont) va 8 ta grupp (ustun)dan iborat ("qisqa davrli variant").

Davr deb, elementlarning ishqoriy metallardan boshlanib, inert gazgacha tugaydigan tabiiy davriy qatoriga aytiladi. Element joylashgan davr raqami uning atomidagi elektron orbita (qavatlar) sonini ko'rsatadi. Ular uchga bo'linadi: kichik (I—III); katta (IV—VI) davrlar va VII davr. VII davr magan (VII) davr.

Davrlar. I davrda 2 ta (H va He), II va III davrlarda 8 ta element, IV va V davrlarda 18 tadan, VI davrda 32 ta va VII davrda 24 ta element bo'lib 110 ta element joylashgan.

Gruppalar deb, davriy sistemadagi katta va kichik davr elementlari o'z ichiga olgan vertikal qatorlarga aytiladi. Har bir gruppada asosiy qo'shimcha (V) gruppalariga bo'linadi. Asosiy gruppachalarida shu gruppadagi elementlar tashqi elektron qavatidagi elektron soni (maksimal valentligi)ga to'g'ri keladi. Qo'shimcha gruppachalarida elektron soni faqat katta davr elementlaridan iborat bo'lib, ularning valentli elektronlari tashqi elektronlar soni o'zaro mos kelmasligi mumkin. Chumchuq tashqi va tashqidan oldingi qavatlardagi $ns(n-1)d$ elektronlar valent elektronlardir. Shu o'rinda I gruppasi asosiy gruppachasi elementlarini


uning tashqi elektron qavatlarida 1 tadan (ns^1) elektronlari bo'lib, II gruppasida doimiy bir valentlik ($NaCl$, $KF...$) namoyon qiladilar. III gruppasi qo'shimcha gruppachasi elementlari (Cu , Ag , Au) esa tashqi va tashqidan oldingi qavatlardagi Cu ($3d^{10}4s^1$); Ag ($4d^{10}5s^1$), Au ($5d^{10}6s^1$) elektronlari hisobiga $CuCl$, $CuCl_2$ (I va II), $AgCl$ (I), $AuCl$, $AuCl_3$ (I va II) valentli birikmalar hosil qiladilar. Bunday holat barcha gruppalar uchun xosdir.

I va qo'shimcha gruppachalari uchun xosdir. Davrlarning elementlar bilan to'lib borishini ko'rib chiqaylik. I davr elementdan (H va He) iborat bo'lib, ularning elektron tuzilishi juda oddiy: $1s^1$ va $1s^2$. He atomida 2 ta elektron o'zaro juftlashgani (dublet) uchun barqaror holat bo'lib, boshqa elementlar bilan birikma hosil qilmaydi.


II davrda 8 ta element bo'lib, ulardan 2 tasi ($1s^1$ va $1s^2$) va $Be(1s^2 2s^2)$ elementlardir. $Z = 5$ B dan boshlab, p-elementlar joylashgan. Ularning elektron tuzilishi bilan yuqorida tanishdik. Oxirgisi Ne bo'lib, uning tashqi elektron qavati 8 ta elektron (oktet qoidasi) bilan tugallangan.

III davr ham 8 ta (2 ta s: Na , Mg) va (6 ta p) elementdan iborat. Bu elementlarining elektron tuzilishi I, II davrlardagi elementlardan 3d orbitalarining bo'sh orbitalari borligi bilan farqlanadi. Ba'zi hollarda, ayniqsa, Si , S , Cl elementlari atomlarida shu 3d-orbitalga 3p- va 3s-orbitalardan elektronlarning ko'chishi tufayli o'zgaruvchan valentli birikmalar hosil qiladilar.


IV davr s-elementlar bilan boshlanib, K (Ar) $4s^1$, Ca (Ar) $4s^2$, 4s-orbital elektronlar bilan to'lgan. $Z = 21$ element (Sc) dan boshlab, 4d-orbitaldan oldingi 3d-orbital elektronlar bilan to'la boshlaydi. Shu bilan d-elementlar qatori boshlanadi. Sc (Ar) $4s^2 3d^1$ da elektron birinchi 3d-orbitalga joylashadi, undan keyingi elementlarda tartib raqam bir birlikka oshib, 4s bilan Gund qoidasiga asosan, elektronlar bittadan bo'sh d-elektron o'chirib boradi. Bu tartib $Z = 26$ Fe atomigacha davom





$Z = 24$ element Cr da bu tartib biroz "buziladi". Ya'ni 4s-orbitaldagi elektron qavatlaridagi elektron tuzilishi $3d^4 4s^2$ o'rniga, 4s-orbitaldagi bitta elektron 3d-orbitalga "o'tib ketishi" natijasida $3d^5 4s^1$ bo'lib, 6 ta toq barqaror elektron tuzilish yuzaga keladi:



Keyingi element Mn da yana 4s-orbitaldagi elektron juftlashib




Temirdan boshlab 3d-orbitaldagi elektronlar juftlashib boshlaydi.



$Z=29$ element (Cu) ga kelib, xromdagi singari $4s^1$ -elektron 3d-orbitalga o'tadi va



bo'ladi. Eng oxirgi 10-elektron rux atomining 4s-orbitalini to'ldirish davrining d-elementlari qatori tugaydi.



Tartib raqami 31-element (Ga) dan boshlab, IV davrning p-elementlari boshlanadi. $_{31}\text{Ga}(\dots 3d^{10} 4s^2 4p^1)$. Bu elementlarning 4p-orbital

bilan to'lib borishi II va III davr p-elementlari singari bo'lib, bilan to'lib borishi $3d^{10} 4s^2 4p^4$ bilan tugaydi.

IV davr elementlari uchun ham elektron orbitallarning elektronlar bilan to'lib borishi IV davrdagidek amalga oshadi.

V davr $Z = 55$ Cs($\dots 6s^1$), $Z = 56$ Ba($\dots 6s^2$) s-elementlari bilan boshlanadi. $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

VI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. VII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

VIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. IX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

X davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XIV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XVI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XVII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XVIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XIX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXIV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXVI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXVII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXVIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXIX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXXI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXXII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXXIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXXIV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXXV davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.


XXXVI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXXVII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XXXVIII davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XXXIX davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

XL davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi. XLI davr $Z = 57$ La — Lantan ($\dots 6s^2 5d^1$) dan keyin tashqaridan boshlanadi.

gan hajmidir (sm^3/mol). Atom radiusi gruppalarida elementlarning tartib raqamiga bog'liq holda o'zgarib b

a. Davrlarda elementlarning tartib raqami ortib borishi bilan atom radiusi kichrayib boradi. Masalan, II davr elementi



Buning sababi, elementning tartib raqami ortishi bilan musbat zaryadi ortadi va elektron qavatlarning soni ($n = 2$) holda tashqi elektron qavatdagi elektronlar soni ham orib b yadro va tashqi elektronlarning tortishuvi kuchayib elektron va atomning (haimi) radiusi kichrayadi.

b. Gruppalarda elementlarning tartib raqami ortishi bilan atom radiuslari ortib boradi. Chunki gruppalarda elementlarning

raqamining ortishi davrlarning raqami ortishiga, ya'ni elektron qavatlarining soni ortishiga olib keladi va bu o'z-o'zidan (hajmi) radiusining (7-rasm) kattalashuviga sabab bo'ladi. Buning natijasi elementlarning elektron tuzilishiga (s, p, d, f-elementlarning elektron konfiguratsiyasiga) ta'sir qiladi. Buni beshinchi guruh elementlari misolida ko'rish mumkin.


As($Z = 33$; $r = 1.48\text{\AA}$) V($Z = 23$; $r = 1.34\text{\AA}$)
Sb($Z = 51$; $r = 1.61\text{\AA}$) Nb($Z = 41$; $r = 1.45\text{\AA}$)
Bi($Z = 83$; $r = 1.82\text{\AA}$) Ta($Z = 73$; $r = 1.46\text{\AA}$)

s- va p-elementlarda atom radiusi keskin, f- va d- elementlarda kam o'zgaradi. f- va d-elementlarda atom radiusining kamlashishi ulardagi tashqaridan oldingi qavatlarda f- va d- orbitalarining "sigilish" hodisasi bilan izohlanadi.

II. Ionlanish energiyasi deb neytral atomdan bitta elektron chiqishida yutiladigan energiyaga aytiladi. U I harfi bilan I (g-mol yoki eV) atom birliklarida o'lchanadi.




Agar atomdan 1, 2, 3 ta elektron ketma-ket ajralib chiqsa, $I_1, I_2, I_3, \dots$ ionlanish energiyasi qiymatlariga ega bo'ladi va $I_1 < I_2 < \dots$ tartibda ortib boradi. Uning qiymati davrlarda



7-rasm. IA grupp elementlari atom va ion radiuslari.

Uning tortishuv kuchi kamayadi va elektronni atomdan chiqarib
tash uchun kam energiya sarflanadi.

III. **Elektronga moyillik** deb neytral atomga bitta elektronning olib chiqadigan yoki yutiladigan energiya miqdoriga aytiladi (I) bilan belgilanib, o'lchov birligi kJ/g-mol va eV/atom.



Amalning bu xususiyati ham davrlarda tartib raqami ortishi bilan
Masalan, II davrda litiyning elektronga moyilligi 0,82 ev bo'lsa,
III davrda — 1,47 va IV davrda — 3,58 ev ga tengdir. Gruppalarda tartib
— ortishi elektronga moyillikning kamayib borishiga (I gruppada: Li
Na = 0,47 ev) olib keladi.

elektr atomlarining yuqoridagi ikki xossasini umumlashtiruvchi elektromanfiylikdir.

Nisbiy **elektromanfiylik** (NEM) deb bir atomning boshqa atom
bilan o'ziga qanchalik torta olish xususiyatiga aytiladi:

$$NEM = 1/2 (I + F)$$

Elementlarning elektromanfiyligi litiyning elektromanfiyligi ($NEM = 1$) nisbatan (*Poling shkalasi*) hisoblangan.

E. m.ning qiymati davrlarda elementlarning tartib raqami ortib boradi. Masalan, III davr elementlari uchun:

$$Na(Z=11) < Al(13) < P(15) < Cl(17) \\ NEM = 0,9 < 1,5 < 2,1 < 3,0$$

Gruppalarda tartib raqami ortishi bilan E. m. kamayib boradi. VII A gruppada:

$$F(Z=9) < Cl(17) < Br(35) < I(53) \\ NEM = 4,1 > 3,0 > 2,6 > 2,4$$

Davriy jadvalda eng yuqori elektromanfiylikka ega element u barcha elementlardan elektron "tortib" oladi va kuchli oksidlanish xossasini namoyon qiladi. Shu sababli fluor inert gazlardan biriga bilan ta'sirlashib, uni oksidlaydi va XeF_4 birikmasini hosil qiladi ham ($NEM=3,5$) fluorga elektron beradi va O^{+2} shartli ioniga OF_2 ni hosil qiladi.

Birinchi gruppning oxirlarida joylashgan Cs elementi eng yuqori NEM ($0,7$) ga ega. Shu sababli u eng aktiv metall, ya'ni o'zining oson elektron chiqarib, kuchli qaytaruvchilik xossasini namoyon qiladi.




Atomlarning NEM lari qiymati kimyoviy elementlarning xossalari (oksidlovchilik, qaytaruvchilik, kislota-asos, metall, metallar tabiatini o'rganishda katta ahamiyatga ega.

Savollar

1. Atomning asosiy tarkibiy qismi nimadan iborat?
2. Bor postulatlarining asosiy mazmuni nimalardan iborat?
3. Atomlar qachon energiya chiqaradi va qachon energiya yutadi?
4. Atom tartib raqamining fizik ma'nosi nimadan iborat?
5. Kvant sonlari atomning elektron tuzilishini izohlashda ahamiyatga ega?
6. Pauli va Gund qoidalarining ma'nosini tushuntiring.
7. Elektromanfiylik nima?

p-, d-, f-elementlar deganda nimani tushunasiz?
Quyidagi element atomlari yadrolari tarkibini aniqlang: xlor, magniy, natriy.

Natru reaksiyalarini tugallang:



Quyidagi keltirilgan atomlardan:

$^1_1H, ^2_1D, ^{17}_{17}Cl, ^{35}_{17}Cl, ^{37}_{17}Cl, ^{40}_{18}Ar, ^{40}_{19}K, ^{39}_{19}K, ^{40}_{20}Ca, ^{42}_{20}Ca$

a) izotoplarni, b) izobaralarni aniqlang.

c) III va IV grupp elementlari ichida qaysilari s-, p-, d-, f- elementlar kimga kiradi?

d) $Fe^{+2}, Na^{+1}, Cl^{-1}, S^{-2}$ va P^{+3} ionlarining elektron formulalarini yozing. e) qanday yacheykalar bo'ylab elektronlarning taqsimlanishini ko'rsating.

f) Cr^{+3} ioni va Cr atomida; Mn^{+2} ioni va Mn atomida; Co^{+3} ioni va Co atomida; qanday tok elektronlar sonini aniqlang. Ulardagi toq elektronlar soni qanday bo'ladi?

g) I A grupp va VII A grupp elementlarining o'zaro hosil qilishi bo'yicha barcha birikmalari formulalarini yozing. Ularning E. m. qaysilari ko'ra ionlari zaryadlarini aniqlang.

VIII bob

KIMYOVIY BOG'LANISH VA UNING ASOSIY TURLARI

Asiy tushuncha va qoidalar: kimyoviy bog'lanish, bog'lanish uzunligi, valent burchagi, tartibi, kovalent bog'lanish, qat'iy kovalent bog'lanish, dipol momenti, kovalent bog'lanishning yuqori va to'yinuvchanligi, molekulararo donor-akseptor bog'lanish, bog'lanish, oriyentatsion, induksion va 'dispersion ta'sir kovalent orbitallarining gibridlanishi, ion bog'lanish, koordinatsion bog'lanish, moddalarning agregat holati va tuzilishi.

VIII.1. Kimyoviy bog'ning asosiy tavsiflari

Har qanday kimyoviy modda — atomlar va ularning birikishi hosil bo'lgan kristallar, molekular va ionlardan tashkil topgan materiyadir. Bular da atomlar bir-birlari bilan ma'lum turdagi bog'lanishlar (kuchlar) vositasida birikadilar. Bu bog'lanishlar yuzaga kelish natijasida tabiati ularda ishtirok etuvchi zarrachalarning turlariga bog'liq bo'lgan necha xil bo'ladi.

Kimyoviy bog'lanishlarga va ularning hosil bo'lishiga atomlar elektron tuzilishi nuqtai nazaridan qarash lozim. Chunki kimyoviy bog'lanishlarning hosil bo'lishida ishtirok etuvchi asosiy turlari elektronlar va elektron bulutlaridir. Umuman, har qanday kimyoviy bog'lanish o'zaro birikuvchi atomlar tashqi (va tashqidan oldingi) elektron qavatdagi 1 yoki bir necha elektron bulutlarining yadrolar orasida qayta taqsimlanishi (bir-birini o'zaro qoplashi) natijasida hosil bo'lgan ko'p yadroli va ko'p elektronli sistemadir.

Kimyoviy bog'lanishlarning asosiy tavsifnomalari qatoriga bog'lanish energiyasi, bog'lanish uzunligi, bog'lar orasidagi burchak (valent burchagi) va bog'lanish tartibi kiradi.

Bog'lanish energiyasi. Kimyoviy bog'ni uzish uchun zarur bo'lgan eng kam energiya miqdoriga bog'lanish energiyasi deyiladi. U belgilanib, kJ/mol va kkal/mol da o'lchanadi.

H₂ — molekulasi da H—H bog'lanish energiyasi $E_{\text{H-H}} = 436$ kJ/mol. Ikki atomli molekular da bog'lanish energiyasi molekularni atomlarga parchalanish (dissotsilanish) energiyasiga teng. H₂ molekulada 2 va undan ortiq kimyoviy bog'lanish mavjud bo'lsa,

energiyasi qiymati umuman molekularning parchalanish energiyasi bog'lanishlari soniga bo'lib hisoblanadi. CH₄ molekulasi da bog'lanish energiyasi 1649 kJ teng. Bu molekulada 4 ta C—H bog'i mavjud. Har bir bog'ning energiyasi $E_{\text{C-H}} = D/4 = 1649/4 = 412.25$ kJ.

Bog'lanish energiyasi qanchalik katta bo'lsa, bog' shunchalik barqaror bo'ladi. Bog'lanish energiyasining qiymati o'zaro birikuvchi atomlarning bog'lanish turi va tartibiga bog'liq bo'ladi. Masalan: H₂O molekulasi da $E(\text{H—O}) = 460.5$ kJ/mol; H₂S molekulasi da $E(\text{H—S}) = 229.4$ kJ/mol; H₂Te molekulasi da $E(\text{H—Te}) = 140.5$ kJ/mol.

Bog'ning uzunligi. Kimyoviy bog'ning uzunligi r-harfi bilan belgilanib, o'lchanadi.

Bog'ning uzunligi deb, kimyoviy bog'lanishning hosil bo'lishida ishtirok etuvchi atomlar yadrolari o'rtasidagi masofaga aytiladi. Vodorod molekulasi da H—H bog'ining uzunligi $r_{\text{H-H}} = 0.074$ nm. Kimyoviy bog'lanishlar soni ortishi bilan bir xil element atomlari hosil qilgan bog'ning uzunligi quyidagicha o'zgaradi:

H₃C—CH₃ da $r_{\text{C-C}} = 0.154$ nm,
H₂C=CH₂ da $r_{\text{C-C}} = 0.135$ nm,
HC≡CH da $r_{\text{C-C}} = 0.121$ nm ga teng.

Valent burchagi. Kimyoviy bog'lanishlar orasidagi burchak valent burchagi (yoki bog'lanish burchagi) deyiladi. Agar H₂O molekulasi olib qilsa, H—O bog'i bir-biriga nisbatan 104.5° burchak ostida joylashadi. CH₄ molekulasi da bog'lar burchaksimon tuzilishga ega bo'ladi. CH₄ molekulasi da burchak 109.5°.

Bog'lanish tartibi. O'zaro kimyoviy bog' hosil qilgan atomlar orasida bo'lgan bog'lanishlar soni bo'lib, birlamchi (qo'sh bog'), ikkilamchi (uch bog') va ba'zi hollarda to'rtlamchi bog'lanish mavjud bo'ladi. Bog'lanishlar tartibi karrali ortishi bilan bog'ning barqarorligi oshadi, uzunligi qisqaradi (yuqoridagi misollarga qarang).

VIII.2. Kovalent bog'lanish

Kovalent bog'lanishning elektron nazariyasi yuzaga kelgandan so'ng 1916 yilda L. Pauli va 1927 yilda V. Geytler va F. London vodorod molekulasi da bog'lanishini nazariy o'rganib, quyidagi fikrni ilgari surdilar.

Ma'lumki, vodorod molekulasida ikkita vodorod atomining elektronlari bir xil element yoki turli element atomlari o'rtasida bir bog', qo'shbog', uchbog' hosil bo'ladi: $H + H = H_2$.

Alohida turgan vodorod atomlarini $H(a)$ va $H(b)$ deb belgilaymiz. Ularning elektron formulasi $1s^1(a)$ va $1s^1(b)$ bo'lib, ular bir xil element yoki turli element atomlari o'rtasida bir bog', qo'shbog', uchbog' hosil bo'layotgan H_2 molekulasining to'liq funksiyasi ikki elektron bo'lishi mumkin. Bu elektronlarning yadrolar o'rtasida almashina holat ro'y beradigan holat.

$$\psi_I = \varphi(a)_I \varphi(b)_I \text{ va } \psi_{II} = \varphi(b)_I \varphi(a)_I$$

Hosil bo'lgan molekulaning funksiyasi bu ikki holat funksiyasi "chiziqli kombinatsiyasi" sifatida yozilishi mumkin:

$$\psi_{\text{molekula}} = c_1 \psi_I + c_2 \psi_{II} = c_1 \varphi(a)_I \varphi(b)_I + c_2 \varphi(b)_I \varphi(a)_I$$


Bundan shunday xulosa kelib chiqadi, vodorod atomlari o'zaro yaqinlashganda 1-vodorod atomining elektroni 2-vodorod atomi yadrosiga, 2-vodorod atomi elektroni 1-vodorod atomi yadrosiga. Shu vaqtda, bir xil zaryadli bo'lgani uchun, elektronlar o'rtasida itarilish kuchlari bilan itarilish kuchlari tenglashadi. Bu holatda 2 yadroli va 2 elektronli yagona sistema hosil bo'ladi. Bu sistemada elektron spinlari ($\uparrow$) to'g'ri yo'nalishda bo'lishi shart. Agar elektron spinlari ($\uparrow\uparrow$) yoki ($\downarrow\downarrow$) ikkala yadro o'rtasidagi elektronlarning zichligi minimal ($\psi_{\text{molekula}} = 0$) bo'ladi va kimyoviy bog'lanish hosil bo'lmaydi (8 a, b-rasmlar).



8-rasm. a — qarama-qarshi va b — bir xil spinli elektron bulutlarining o'zaro qoplanishi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, kovalent bog'lanishga ta'rif berish mumkin. Kovalent bog'lanish — elektron juftlari vositasida hosil bo'lgan bog'. Bunda kimyoviy bog'lanishda ishtirok etuvchi atomlardagi barcha toq spinli elektronlar boshqa atomdagi toq spinli elektronlari bilan juftlanib, har bir elektron jufti bitta kimyoviy bog' hosil qiladi.

Shunga ko'ra, atomlar o'rtasida bir bog', qo'shbog', uchbog' hosil bo'ladi. Elektron juftlari bir xil element yoki turli element atomlari o'rtasida hosil bo'lishi mumkin:



Kovalent bog'lanish hosil bo'lishida atomning tashqi elektron qavatidagi toq elektronlar va ba'zi hollarda juft elektronlar ham ishtirok etadi. Bu elektronlar soniga ko'ra birikmalarda har bir element atomining valentligi (hosil qilgan bog'lanishlar soni) aniqlanadi.


Har qanday kovalent bog'lanish quyidagi xossalari bilan boshqa bog'lanishlardan ajralib turadi.

Kovalent bog'lanish yo'nalganlik xossasiga ega. Kovalent bog'lanish p- d-elektron orbitallardagi elektronlarning o'zaro juftlashuvi sababli hosil bo'ladi. Ma'lumki, bu orbitallar fazoda ma'lum yo'nalish (X, Y, Z) bo'yicha joylashgan. Shu sababli, har bir bog'lanishning hosil bo'lishi toq elektronlar joylashgan elektron orbitallari bir-birlari bilan aniq yo'nalish bo'yicha "qoplanib" kimyoviy bog' hosil qiladi. Agar ularning yo'nalishlari bir-biriga mos kelmasa, bu toq elektronlar o'zaro juftlasha olmaydi va kimyoviy bog'lanish hosil bo'lmaydi.

Hosil bo'lgan kimyoviy bog'lar ham fazoda o'z yo'nalishlariga ega bo'ladi. Bu bog'larning fazoda joylashuviga ko'ra σ — "sigma" va π — "pi" bog'lanishlar bor. Sigma bog'lanish — ikkala birikuvchi atomlarning yadrolarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqli (chiziqlar) bo'ylab joylashgan bog'lanishdir.

π — bog'lanish fazoda σ — bog'lanishga nisbatan perpendikulyar joylashgan tekislik bo'yicha p — elektron orbitallarning o'zaro qoplanishidan hosil bo'ladigan bog'lanishdir. π — bog'lari qo'shbog' yoki uchbog'lar hosil bo'lganda yuzaga keladi. Barcha birlamchi bog'lar, qo'sh va uchbog'lardan bittasi σ -bog'lardir, qolganlari π -bog'lar bo'lib, ular σ -bog'larga nisbatan kuchsizdir (9-rasm).

Kovalent bog'lanish to'yinuvchanlik xossasiga ega. Chunki bu bog'lanish elektronlarning juftlashishi hisobiga hosil bo'lgani uchun atomda mavjud toq elektron bo'lsa, u shuncha kovalent bog' hosil qiladi. Masalan: vodorod atomida 1 ta toq elektron bor, shuning uchun u 1 ta kovalent bog' hosil qiladi, kislorodda 2 ta toq elektron — 2 ta kovalent bog', azotda 3 ta toq elektron — 3 ta kovalent bog' hosil qiladi.



9-rasm. Azot molekulasida sigma σ - va π — bog'larning hosil bo'lishi.

ikkala birikuvchi atomlar bir elementga tegishli bo'lgani uchun ularning elektromanfiyliklari bir-biriga teng. Shu sababli ikkala atom yadrosi bo'lovchi elektronlar juftini barobar kuch bilan o'z tomoniga tortadi. Bu elektronlar jufti ikkala yadroning o'rtasida bir xil masofada joylashgan. Bu zaryadlarning markazi molekula simmetriya o'qi bilan mos tushadi. Shu sababli molekula qutbsiz bo'ladi. Qutbsiz kovalent bog'lanishli moddalar gaz holatida, suyuq (Br_2) va ba'zan (I_2) kristall holatida bo'ladi. Shu holdagilari oson bug'lanadigan, kristall holatidagilari (I_2) bosim bo'lganda suyuqlanmasdan gaz holatiga o'tish (sublimatsiya) xossasiga ega bo'ladi. Ular suvda kam eruvchan moddalar qatoriga kiradi.

Qutbli kovalent bog'lanish. Elektromanfiyliklari bir-biridan farq qiladigan turli elementlar atomlari o'rtasida hosil bo'ladigan kovalent bog' — qutbli bog'lanish deyiladi.

Qutbli bog'lanishli molekullar qatoriga: H_2O , NH_3 , HCl , HF , HJ , H_2S , H_2Se larni kiritish mumkin.

Agar HCl molekulasidagi kovalent bog'ning hosil bo'lishi tahtil bo'lgan vodorod atomining elektromanfiyligi 2,1, xlor atominiki — 3,0 ga teng bo'lsa, Ko'rinib turibdiki, xlorning elektromanfiyligi vodorodnikiga nisbatan qariyb 1,5 marta ko'p. Shu sababli $\text{H}-\text{Cl}$ bog'ini hosil qilgan elek-

Boshqacha qilib aytganda, kovalent bog'lanishda ishtirok etuvchi atomlar toq elektronlari soniga teng bo'lgan qilib, valentliklarim to'yintirilgan. Kovalent bog'lar donor-akseptor bog'lar tizimi bo'yicha ham hosil bo'ladi. Shuning uchun azotning kovalentligi to'rtga teng. Buning uchun azotning kovalentligi ham deyiladi.

Kovalent bog'lanish qutbsiz kovalent bog'lanishga bo'linadi. Kovalent bog'lanishning donor-akseptor bog' mavjud bo'lib, alohida o'rganiladi.

Qutbsiz kovalent bog'lanish

Elektromanfiyliklari bir xil (yoki juda yaqin) bo'lgan elementlar atomlari o'rtasida yuzaga keladigan bog' — qutbsiz kovalent bog'lanish deyiladi. Masalan: H_2 , O_2 , Cl_2 , F_2 , Br_2 , N_2 kabi molekullardagi bog'lanishlar. Elektronlar jufti vositasida hosil bo'lgan



a



b

10-rasm.

Qutbsiz (H_2) molekulasida elektron bulutning taqsimoti (a)
Qutbli (HCl) molekulada elektron bulutining taqsimoti (b).

ini Cl atomi o'z tomoniga tortadi HCl va molekulada zaryadlarning tekis taqsimlanishi tufayli vodorod qisman musbat (δ^+) va xlor atomi (δ^-) zaryadlanib qoladi (10, b- rasm): $H^{\delta+} - Cl^{\delta-}$. Molekula simmetrik bo'lmagan, "ellips" ko'rinishida bo'lib, musbat va manfiy zaryadlarning og'irlik markazlari o'zaro mos tushmay qoladi, molekula qutbli zarracha — "dipol"ga aylanadi.

$$NEM < 0,4 \leq NEM \leq 1,7 \leq NEM$$

qutbsiz

qutbli

ion

Qutbli molekulalardan iborat molekulalar gazsimon (NH_3 , HF , HCl , HBr , HJ , H_2S) va suyuq (H_2O) holatda bo'ladi. Ularning suvda erimchanliklari, reaksiyaga kirishish qobiliyatlari qutbsiz kovalent

bog'lanishli moddalarga nisbatan ancha yuqori. Qutbli molekulalarning qutblanganlik darajasini tavsiflash uchun "dipol momenti" kiritilgan.

Molekulaning dipol momenti (μ)

Qutbli kovalent bog'lanishli molekulalarda musbat va manfiy zaryadlarning asimmetrik taqsimlanishini miqdoriy tavsiflovchi kattalikka molekulaning **dipol momenti** deyiladi. Dipol momenti $\mu = q \cdot l$, bunda, l — dipol uzunligi, m, sm; q — elektron zaryadi.

Agar kimyoviy bog'ning dipol momenti noldan farqli bo'lsa, molekulani **qutblangan** deyiladi. Molekulalarda bog'lar dipol momentining yig'indisi hisobga olinadi.

Shunga ko'ra: CO_2 molekulasi har bir $\text{C}=\text{O}$ — bog'i qutbli, CO_2 — molekulasi qutbsiz molekula, chunki unda 2 ta $\text{C}=\text{O}$ bog'i ular bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida joylashgan; $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ — simmetrik tuzilishli molekula bo'lgani uchun o'zaro qarama-qarshi joylashgan ikki vektorning yig'indisi 0 ga teng. Shu singari CH_4 molekulasi har bir $\text{C}-\text{H}$ bog'i ham qisman qutbli. Lekin CH_4 molekulasi simmetrik (tetraedrik) bo'lgani uchun qutbsiz, CCl_4 molekulasi ham shunday bo'lgan siyatga ega.

Suv molekulasi uchun $\mu = 1,85 \text{ D}$ (> 0). Chunki H_2O molekulasi har bir qutbli $\text{H}-\text{O}$ bog'lari quyidagicha joylashgan:



Dipol momentining o'lchov birligi $q = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$ va bog' uzunligi $l = 1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ ekanligidan foydalanib, $\mu = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl} \cdot \text{m} = 1,6 \cdot 10^{-29} \text{ Kl} \cdot \text{m}$ da o'lchanadi.

Debay sharafiga "debay"larda o'lchanadi va "D" harfi bilan belgilanadi. $1 \text{ D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ Kl} \cdot \text{m}$ ga tengdir.

Ayrim molekulalarning dipol momenti qiymati (D)

Modda	Dipol momenti, μ	Modda	Dipol momenti, μ
Ben	1,84	Brom benzoil	1,64
Acetol	1,48	Toluol	0,37
Dioximetan	1,57	Piridin	2,23
Aeton	2,85	Propan	0,085
Acetonitril	3,90	Propin	0,780

Molekula tuzilishi, konformatsiyasi, izomeriyasini aniqlashda molekulaning dipol momenti qiymatidan foydalaniladi.

VIII.3. Molekulalararo ta'sir turlari

Molekulalar o'rtasida o'zaro **oriyentatsion**, **induksion**, **dispersion** va **o'zaro ta'sir** bo'lishi mumkin.

Dispersion ta'sir. Ma'lumki, vodorod, azot, xlor va inert gazlar ma'lum temperaturada gaz holatidan suyuq holatga o'tadi. Buning sababini tushuntirish uchun London "o'zaro ta'sirlashayotgan molekulalar orasida dispersion kuchlar paydo bo'ladi" degan tushunchani kiritdi. Bu kuchlar har qanday atom va molekulalar o'rtasida yuzaga keladi va ularning kuchiga bog'liq emas. Bu kuchlarning paydo bo'lishiga sabab: molekulalar musbat va manfiy zaryadlangan zarrachalardan tashkil topgan tufayli juda qisqa vaqt yashab turuvchi "dipol" hosil bo'ladi. Ana shu dipollarning kelishilgan bir vaqtda sodir qiladigan o'zaro ta'sir turi **dispersion ta'sir** deyiladi.

Oriyentatsion ta'sir. Bu ta'sir qutblangan molekulalar o'rtasida ro'y beradi. Issiqlik harakati tufayli tartibsiz joylashib qolgan qutbli zarrachalar qarama-qarshi zaryadli tomonlari bilan bir-birlariga tortilib, bir xil zaryadli tomonlari bilan o'zaro itarishadilar. Bu ta'sir "oriyentatsion ta'sir" deyiladi. Molekula qanchalik qutbli bo'lsa, oriyentatsion ta'sir shunchalik kuchli bo'ladi. Temperatura qancha yuqori bo'lsa, oriyentatsion ta'sir shunchalik kuchsizlashadi va aksincha.

Induksion ta'sir. Bu ta'sir induksirlangan dipol momentli zarrachalar orasida sodir bo'ladi. Ya'ni qutbsiz va qutbli molekulalar ta'sirlashib,

qutbli molekula qutbsiz molekulani qutblantiradi. Bu yuzaga keladigan ta'sir kuchlari *Van-der-Vaals kuchlari* deyiladi. Yuqoridagi barcha ta'sir kuchlari *Van-der-Vaals kuchlari* deyiladi. Yuqoridagi barcha ta'sir kuchlari *Van-der-Vaals kuchlari* deyiladi.

Atomlarda elektron almashinuvisiz yuzaga keladigan molekulalararo ta'sir kuchlari *Van-der-Vaals kuchlari* deyiladi. Yuqoridagi barcha ta'sir kuchlari *Van-der-Vaals kuchlari* deyiladi.

Kovalent bog'lanishga nisbatan Van-der-Vaals ta'sir kuchlari Masalan, Cl_2 ning dissotsilanishi uchun 243 kJ/mol energiya zarur. Siqilgan gazdan hosil bo'lgan Cl_2 kristallarining sublimatsiyasi uchun 24 kJ/mol energiya kerak, xolos.

VIII.4. Donor-akseptor bog'lanish

Ba'zi molekular tarkibiga kiruvchi atomlarda kimyoviy bog'lanish ishtirok etmagan — "taqsimlanmagan" elektron juftlari, ba'zi molekulalar esa bo'sh elektron orbitallar mavjud. Shunday ikki turdagi molekular o'zaro ta'sirlashganda ular o'rtasida kimyoviy ta'sir kuchlari yuzaga keladi. Bunday ta'sirni "*donor-akseptor*" ta'sir deyiladi. *Hosil bo'lgan bog'lanish donor-akseptor bog'lanish deyiladi.* Donor-akseptor bog'lanish juda katalitik, solvatatsiya jarayonlarida, kompleks birikmalar hosil bo'lishda yuzaga keladi. Bu ta'sir natijasida hosil bo'luvchi komplekslarning hosil bo'lish mexanizmi, donor-akseptor ta'sirda ishtirok etuvchi tabiatiga, elektron orbitallarining turiga bog'liq.

Buni $[H_3NBF_3]$ molekulasi hosil bo'lishi misolida ko'ramiz.



Bu bog'lanishda ishtirok etuvchi bo'sh orbitali B atomi alohida bo'lgan elektron jufti beruvchi N — atomi donor deyiladi. Kimyoviy ta'sir bunday turi murakkabroq molekular, ionlar o'rtasida ham sodir bo'ladi. Masalan, $[I_2 \cdot C_6H_6]$, NH_4Cl , H_3O^+ , $Cu[(NH_3)_4]SO_4$, $K_4[Fe(CN)_6]$ kabi qator moddalarning hosil bo'lishi shu ta'sir natijasidir.

Bu bog'lanishning energiyasi 6—12 kJ (1,5—3,0 kkal) dan 200 kkal gacha bo'ladi. Bog'lanish energiyasi qiymati turli moddalarda

farqlanishi ega bo'ladi: $[I_2 \cdot CH_3OH]$ uchun $E_{bog} = 8$ kJ/mol bo'lsa, $[NH_3 \cdot HCl]$ molekulasi uchun $E_{bog} = 233$ kJ/mol ga tengdir. Donor-akseptor bog'lanish moddalarning bir agregat holatidan ikkinchi holatga o'tishiga ta'sir qiladi. NH_3 va HCl gaz moddalar, lekin ularning o'zaro ta'siri natijasida NH_4Cl kristall.


VIII.5. Vodorod bog'lanish

Elektromanfiyligi katta bo'lgan (F, O, N, Cl) elementlarning atomi o'zaro bog'lanishda vodorod qisman protonlashadi va qo'shni elektromanfiy atomning elektron qobig'iga tortiladi. Hosil bo'lgan bog'lanish vodorod bog'lanish deyiladi:



bu yerda X = F, O, N, Cl, S, Br atomlari bo'lishi mumkin.



Vodorod bog'lanish Van-der-Vaals kuchlaridan barqarorroq bo'lib ($E_{bog} = 8 - 40$ kJ), kovalent bog'lanishdan kuchsizdir. Vodorod bog'lanish elektromanfiyligi yuqori bo'lgan (F, Cl, O, N, S) elementlarning birikmalarida xosdir. Suv moddasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda har bitta suv molekulasida 4 ta gacha H — bog'lanish hosil qiladi:




Vodorod bog'lanish molekularlarning assotsilanishida, moddalarning erishida, kristallogidratlar hosil qilishida, elektrolitik dissotsilanishda muhim rol o'ynaydi.

Vodorod bog'lanish: molekularlararo va ichki molekulyar vodorod bog'lanish turlariga bo'linadi.

Yuqorida ko'rilgan hamma vodorod bog'lanishni molekularlararo vodorod bog'lanish (MVB) deyiladi. Ichki vodorod bog'lanishga (IVB) masalan, karboksil kislota molekulasi yoki karboksil guruhli birikalarda birgalikda ionlararo vodorod bog'lanish ham mavjud:



O — nitrofenolda



ichki molekulyar, *para*-nitrofenolda esa molekulalararo vodorod bog'lanishi hosil bo'ladi, shu sababdan

$t_{\text{qayn}}(o\text{-nitrofenol}) < t_{\text{qayn}}(p\text{-nitrofenol})$ bo'ladi.

VIII.6. Atom orbitallarining gibridlanishi

Agar davriy jadvaldagi ayrim elementlarning joylashuvi o'rniga namoyon etadigan valentliklariga e'tibor bersak:

Be atomining tashqi elektron qavatida 2 ta *s*-elektroni bo'lib, o'zaro juftlashgan va shu sababli toq elektroni bo'lmagani uchun bog' hosil qila olmasligi kerak, ammo 2 ta kovalent bog'lanish qiladi:

C — atomida 2 ta *s* va 2 ta *p* elektronlar bo'lib, ulardan elektronlarigina toq holatda bo'lgani uchun uglerod atomi bitta faqat ikki valentli bo'lishi kerak edi, lekin uglerod asosan to'rt valentli bo'ladi.

Shu singari ko'pchilik metallarning ionlari oksidlanish darajasi bo'lsa-da, (Cu^{2+}) kompleks birikmalarda $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ to'rt, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ olti valentli (koordinatsion sonli) bo'ladi va bu holatlarda qat'iy nomuvofiqlik bordek tuyuladi.

Agar yuqoridagi holatlarni chuqurroq tahlil etsak va atomlarning toq va qo'zg'algan holatlarining elektron tuzilishi o'rtasida farq mavjud hamda atom orbitallari gibridlanishi mumkinligini e'tiborga olsak savollarga yetarlicha asosli javob berish mumkin.

“Gibridlanish nima” degan savolga uglerod atomi normal va qo'zg'algan holatining elektron tuzilishini o'rganish bilan javob berish mumkin. Gibridlanish molekula hosil bo'layotgan vaqtda ro'y beradi. Masalan, — atomining normal holati va qo'zg'algan holatga o'tishi:




— atomida 4 ta (1 ta *s*, 3 ta *p*) orbitalda 4 ta toq elektron joylashgan.

Lekin bu elektron orbitallar bir-biridan ko'rinishi va energiyasi (asosan *s* va *p*-orbitallar) bilan farq qiladi va ular kimyoviy bog'lanish hosil bo'lishida maksimal darajada boshqa bog'lanuvchi orbitallar bilan “o'zaro qoplangan” olmaydi. Bu “noqulaylik” ni bartaraf etish uchun ko'rinishi va energiyasi bilan farq qiluvchi (*s* va *p*) orbitallarning o'zaro qo'shilib ketib, energiyasi va ko'rinishlari bir xil bo'lgan yangi elektron orbitallar — ko'rish hodisasi atom orbitallarining gibridlanishi deyiladi.

Gibridlanish natijasida hosil bo'lgan orbitallar nosimmetrik — bir katta, ikkinchi tomoni kichik (11-rasm) bo'lib, kimyoviy bog'lanishda katta tomoni bilan ishtirok etadi. Gibridlanishda eng kamida 2 ta *p* yoki boshqa *d*, *f*) orbitallar ishtirok etadi va nechta orbital e'tiborga olinadigan qancha gibrid orbital hosil bo'ladi. Buni quyidagi miqdor ko'rib chiqamiz:

— atomidagi 1 ta *s*- va 1 ta *p*- (3 ta *p* dan) orbital o'zaro gibridlanish natijasida 1 ta *s* + 1 ta *p* = 2 ta *sp*¹ gibrid orbital hosil bo'ladi (12-rasm). 2 ta *p*- orbital gibridlanishda ishtirok etmaydi, ular “gantelsi” ko'rinishda qolaveradi. Hosil bo'lgan 2 ta *sp*¹ gibrid orbitalar bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida joylashadi va ular ishtirok etadigan molekular chiziqli tuzilish bo'ladi. Bularga misol: BeF_2 , C_2H_2 , Cu_2Cl_2 , Ag_2Cl_2 , $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ kabi moddalar misol.

— atomidagi 1 ta *s*- va 2 ta *p*- (3 ta *p* dan) orbitallar o'zaro gibridlansa: 1 ta *s* + 2 ta *p* = 3 ta *sp*² gibrid orbital hosil bo'ladi. Bu orbitallar fazoda



12-rasm.

*sp*¹ — gibrid (a), *sp*² — gibrid (b) va *sp*³ — gibrid orbitalar (d) ning fazoviy ko'rinishlari.

teng tomonli tekis uchburchak ko'rinishida joylashib, uchburchak 120° ni tashkil etadi. Bu gibridlanish hisobiga kimyoviy bog'lanishli molekullar va ionlarga misollar: BCl_3 , AlBr_3 , C_2H_4 (qo'shbog' hosil qilgan barcha uglerod atomlari SO_3^{2-} , CO_3^{2-}).

1 ta s- va 3 ta p- orbitallarning o'zaro ta'sirlashuvi natijada $p = 4$ ta sp^3 gibrid orbitallar hosil bo'ladi. Bu gibrid orbitallar 109° burchak ostida joylashadi va ular asosan tetraedrik tuzilishli molekullarni hosil qiladilar. Bular qatoriga CH_4 , H_2O , NH_3 , NO_2 kiradi.

ClO^- , ClO_2^- , ClO_4^- , $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ barcha to'yingan uglerod sikloparafinlardagi uglerod atomlarini kiritish mumkin.

Ma'lumki, aksariyat metallarning ionlari kompleks hosil qilishga ega. Ularning 4- va 5- elektron qavatlaridagi s-, p-, d- orbitallari gibridlanib, sp^3d , sp^3d^2 kabi murakkab gibrid orbitallarini hosil qiladilar. Shunga asosan ularning tuzilishi sp^3d — bo'lsa, asosi kvadratik prizma ($k = 5$), uch yoqlama antiprizma, sp^3d^2 — gibrid oktaedrik tuzilishli molekula yoki ionlarni hosil qiladi.

Bu moddalar qatoriga d-metallarning turli koordinatsion soni bo'lgan $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ va hokazolar kiradi.

VIII.7. Ion bog'lanish

Kimyoviy bog'lanishning hosil bo'lishida elektromanfiylik farqidan keskin farq qiladigan elementlar (metallar va metallar) o'zaro bog'lanishga ega bo'ladi. Misol tariqasida Na va Cl atomlari o'rtasida bog'lanish hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz (13, a-rasm).

Na davriy jadvalning III davr I gruppasi elementidir. Elektromanfiyligi 0,9 ga teng. Cl shu davrning VII gruppasi elementidir. Elektromanfiyligi 3,0 ga teng. Bu atomlar o'zaro ta'sirlashganda Cl atomining tashqi elektron qavatidagi bitta elektronni Na atomiga beradi.



Natijada Na^+ ion va Cl^- ion hosil bo'ladi. Bu erkin ionlar o'zaro elektrostatik tortishuv kuchlari yuzaga keladi va NaCl kristall bog'i hosil bo'ladi. Ion bog'lanish deb, qarama-qarshi zaryadli ionlar o'zaro bog'lanishini ataydilar.

Ion bog'lanish kuchlari vositasida yuzaga keluvchi kimyoviy bog'lanish deb, ataydilar.

Ion bog'lanishda ishtirok etuvchi elektron(lar) doimo elektromanfiyligi yuqori bo'lgan element atomiga o'tadi. Ion bog'lanishli moddalar (ko'pchilik tuzlar), asosan qattiq holatda bo'lib, ular suvli eritmalarida eriganda ionlarga ajraladi (ionlashadi). Yuqori temperaturada suyuqlanadi.

Ion bog'lanish to'yinish va yo'nalganlik xossalari ega emas. Ma'lumki, ion bog'lanishda zaryad bo'lib, ular zaryad (ionning butun sirti) bo'lib bir xil tarqaladi. Shu sababli bir-biri bilan tortishuvi uchun ionlar ma'lum yo'nalish bo'yicha joylashuvi shart emas, shu sababli o'zaro xohlagan holatda tortishadilar. Bunday tortishuv tufayli ionlar bog'lanish yo'nalishga ega bo'lmaydi.

Ion bog'lanishda zarracha ko'rinishidagi ion(lar) boshqa cheklanmagan ionlar bilan o'zaro tortishuv kuchlari hosil qiladi va atrofida qarshi zaryadli boshqa ionlarning bir nechtasini "ushlab" turadi. Ion bog'lanishning to'yinmovchanligini ko'rsatadi. Bir ion atrofida zaryadli nechta ion joylashganini ko'rsatuvchi son shu ionning koordinatsion soni (k) deyiladi.

NaCl molekulasida har bir NaCl molekulasida 6 ta Cl va har bir Cl ion atrofida 6 ta Na ion bo'lgan. Shunga ko'ra, Na ning koordinatsion soni 6 ga, Cl ionining koordinatsion soni ham 6 ga teng. Koordinatsion sonning qiymati har bir ionning radiusi (r)ga va r larning nisbatiga bog'liq bo'ladi. Agar kation radiusi anion radiusidan katta $r_k > r_a$ bo'lsa, 1 ta kation atrofida anion joylashadi va kationning koordinatsion soni katta bo'ladi. Nisbatga ko'ra koordinatsion son 2, 4, 6, 8 va 12 gacha bo'ladi.



VIII.8. Metall bog'lanish

Metallarning kristall panjaralari tuzilishini, ularning xossalari va ularning kimyoviy bog'lanishning o'ziga xos turi mavjudligini ko'rib chiqamiz.

Metallarning kristall panjaralari tugunlarida "metall atom-ioni" bo'lgan. Bu "atom-ion"lar panjara hosil bo'lishida har bir metall atomidan bir yoki bir necha elektronlarning ajralib chiqishi natijasida hosil bo'ladi. Harakatchan holdagi bu elektronlar esa xuddi gaz molekullari kabi kristall panjaraning bo'shliklarida joylashadi. Kristall panjarada

uning tugunlaridagi metall atom-ionlari bilan elektronlar yuzaga keladigan tortishuv kuchlari metall bog'lanish

Metall bog'lanish kuchli bog'lanish bo'lib, u asosan barcha xossalari belgilab beradi. Metallarda oson harakatlanuvchi elektron qimi borligi uchun ular issiqlikni, elektr tokini yaxshi o'tkazadi. Metallarning yaltiroqligi, turli rangda bo'lishi ham ularning tuzilishi bilan tushuntiriladi. Metall bog' hosil bo'lishida faqatgina elektronlarga emas, ichki qavatdagi elektronlar ham qo'shni atom dig'idagi vakant orbitalar bilan donor-akseptor tipidagi bog' quradi. Shu sababdan metallar yuqori mustahkamlikka va yuqori temperaturasiga ega. Issiqlikni va tokni elektromagnit maydoni

**b**

13-rasm.

NaCl kristalining panjarasi (a).
Metall bog'lanish (b).

Savollar



- Amoviy bog'lanish nima va u qanday hosil bo'ladi?
- Amoviy bog' qanday tavsifga ega?
- Amoviy bog'lanishning qanday turlari mavjud?
- Kovalent bog'lanishning xossalari tushuntiring.
- Donor-akseptor bog'i qanday hosil bo'ladi va u qanday moddalar uchraydi?
- Vodorod bog'lanish nima, uning qanday turlari mavjud?
- " σ " va " π " bog'lanish deganda nimani tushunasiz?
- H_2 , He larning hosil bo'lish-bo'lmasligini qanday asoslash
- Atom orbitalarining gibrirlanishi deganda nimani tushunasiz?
- sp^2 , sp^3 , sp^3d^2 gibrirlanish turi hisobiga hosil bo'lgan molekullarga
- eltirib.
- 11 Ion bog'lanish va uning xususiyatlari nimadan iborat?
 - 12 Molekulaning dipol momenti deganda nimani tushunasiz?
 - 13 NH_4Cl , CH_4 , $[Cu(H_2O)_4]SO_4 \cdot H_2O$ molekullarida qanday bog'lanish gibrirlanish turlari mavjud?
 - 14 Metall bog'lanish deb qanday bog'lanishga aytiladi?
 - 15 Metallarning qanday xususiyatlari ulardagi bog'lanishning o'ziga xosligi to'g'ri tushuntiradi?


IX bob

MODDALARNING AGREGAT HOLATLARI

Moddalar tabiatda uch xil agregat holatda bo'ladilar. Gaz, suyuq va qattiq holatlar moddalarning agregat holatlari bo'lib, ular molekullarining o'zaro ta'siriga nisbatan joylashuvi, molekullararo masofa va tortishuv kuchlariga bog'liq bo'ladi.

IX.1. Gazsimon holat

Gazsimon holat molekullar orasidagi masofa (l) molekullarning o'rtacha masofasi (r) ga nisbatan juda katta ($l \gg r$) va ular orasida yuzaga kelayotgan tortishuv kuchlari (F) juda kam bo'lgan holat. Gazsimon holatda molekullarning kinetik energiyasi yuqori bo'lib, ular siyrak, betartib joylashgan va ular orasidagi masofani o'zgartirish mumkin, ya'ni bosim o'zgartirish va temperatura pasaytirib gazlarni *suyaltirish* (siqish) mumkin. (Turli turdagi kompressor qurilmalarining ishlashi shunga asoslangan.) Bu usul bilan havoni, tabiiy gazlarni suyuq holga o'tkazib, gazlar aralashmasini ajratib olish va etgan komponentlar bir-biridan ajratiladi (*rektifikatsiyalanadi*).



14-rasm. Bosim va hajmning o'zaro bog'liqlik grafiqi

Gazlarning holati turli parametrlar (P — bosim, T — temperatura, V — hajm) orqali tavsiflanadi. Bu parametrlarni o'zaro bog'lovchi ifodalar — gazlarning **holat tenglamalari** deyiladi. Ular quyidagilardir:

a) $PV = \text{const}$. Doimiy temperaturada m — massali gazning bosimiga teskari proporsional (1662 y. R.Boyl, 12a-rasm, suyuqligi).

b) $V/T = \text{const}$ yoki $V = KT$. Doimiy bosimda gazning hajmi temperaturasi bilan ortadi, ya'ni gaz kengayadi: Gey-Lyussak 1802 y. 1787 y.

Bu ikkala qonunning umumlashgan holati:

d) $PV/T = \text{const}$ yoki $P_0 V_0 / T_0 = PV/T$ ideal gazning holat tenglamasi deyiladi. Bu tenglamadan foydalanib gazlarning barcha parametrlarini hisoblash mumkin.

Gazlarning asosiy xususiyatlaridan biri — ularning diffuziyasi. Agar ikki yoki undan ortiq gazlar o'zaro aralashtirilsa, ular bir-biri bilan aralashma hosil qilib, bir gaz molekullari orasiga boshqa gaz molekullari singib ketadi, ya'ni diffuziylanadi.

Grem (1829 y.) gazlarning nisbiy diffuziya tezligi to'g'risida Avogadro qonunini ochdi:

— Bir xil sharoitda ikki (A va B) gazlar diffuziyasining tezligi shu gazlar zichliklarining kvadrat ildiziga teskari proporsional:

$$V_{\text{diff}} = \sqrt{1/\rho_{\text{diff}}} \quad \frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{\rho_B}{\rho_A}}$$

bu yerda: V — gazning diffuziya tezligi; ρ — gazning zichligi.

Gazlarning zichligi ularning molekulyar massasiga proporsionalligini e'tiborga olinsa:

$$V_A/V_B = \sqrt{M_B/M_A}$$

molekullari juda kichik bo'lganligi sababli ular juda kichik o'tish xossasiga ega. Bunga gazlarning **effuziyasi** deyiladi. Effuziyasi ular diffuziyasi (tarqalishi) bilan bog'liq. Gazlarning effuziyasi oson uchuvchan moddalarning effuziyasi juda katta ahamiyatga ega. Gazlarning bu xususiyatidan foydalanib gazlar tarkibiy qismlarga va ^{235}U , ^{238}U izotoplar bir-biridan ajratiladi.

Gazlarning molekullar massalari aniqlanadi. Masalan, juda kichik tirqishdan 146 sek. da noma'lum gazning 50 g o'tadi. Shuncha miqdor CO_2 gazi esa, 115 sek da o'tadi. Shu gazning molekulyar og'irligini hisoblang:

$$V_{\text{CO}_2}/V_{\text{gas}} = \frac{50/115}{50/146} = \sqrt{\frac{M_{\text{gas}}}{M_{\text{CO}_2}}}$$

$$M_{\text{gas}} = 44 \cdot (1,27)^2 = 71 \text{ g/mol}$$

Avogadro qonuni, gazlarning to'g'risida Genri qonuni, parsial bosim qonuni (Dalton qonuni) va gazlarning kinetik nazariyalari, real gazlar uchun Van-der-Hisoblash mumkin. Bu tenglamalari mavjud bo'lib, ular moddaning gazsimon holatini chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi.

IX.2. Moddalarning suyuq holati

Suyuqlarda molekullar gazlardagiga nisbatan o'zaro ancha yaqin joylashgan. Molekullar o'rtasidagi tortishuv kuchlari ham kuchliroq bo'lgach, molekullarning kinetik energiyasi ularning tortishuv energiyasidan kichik ($E_{\text{kin}} < E_{\text{tort}}$) bo'lgani uchun suyuqlik holati mavjud bo'ladi.

Gazlardan farqli ravishda bosim ortishi bilan suyuqlik hajmi deyarli o'zgarib qolmaydi, ya'ni suyuqliklar uchun "siqiluvchanlik" xususiyati xos emas. Bu "siqiluvchanlik" xususiyati xosdir.

Temperatura ortishi bilan suyuqlik bug' holatiga o'tadi. Umuman, suyuqlik temperaturaning har qanday qiymatida o'z bug'ini suyuqlik-bug' muvozanatda bo'ladi. 1 atm (101,3 kPa) bosimda 1 suyuqlikni bug'ga aylantirish uchun sarf bo'ladigan issiqlik **bug'lanish**

issiqligi (entalpiyasi) ($\Delta H_{\text{bug'}}$, kJ/mol; kkal/mol) deyiladi. bug'ga aylanadigan temperatura qaynash temperaturasi moddaning tarkibi va tuzilishiga bog'liq bo'ladi (t_{qayn} , °C).

Temperatura pasayishi bilan suyuqliklar qattiq holatga o'tadi. Qattiq holatdan suyuqlikka o'tish moddaning **suyuqlanishi** deyiladi. 1 atm (101,325 kPa) moddaning qattiq moddaning suyuqlikka aylanishi uchun sarflangan moddaning **suyuqlanish issiqligi** deyiladi ($\Delta H_{\text{suyuqlanish}}$, kJ/mol). Moddaning suyuqlikka aylanish temperaturasi **suyuqlanish temperaturasi** ($t_{\text{suyuqlanish}}$, °C; K).

Suyuq holdagi moddalar qovushqoqlik (η), to'yinchanlik (P), nur sindirish ko'rsatkichi (n), optik zichligi (A), zichligi — ρ (g/cm³) kabi kattaliklar bilan ham tavsiflanadi.

IX.3. Moddalarning qattiq holati

Qattiq moddalar atomlar, ionlar va molekulalardan iborat. Ularda zarrachalarning orasidagi masofa molekula (atomlar) o'rtasiga nisbatan juda kichik bo'lib, molekulalararo tortishuv kuchlari yuqoridir. Zarrachalarning joylashuvi kuchli tartib asosida amorf yoki qattiq moddalar amorf holatda va kristall tuzilishga ega bo'ladi.

Amorf tuzilish. Amorf holatdagi modda aniq biror fazoviy tuzilishga ega bo'lmay, zarrachalarining joylashuvi betartib bo'ladi. Masalan, hollarda ular turli kattalikdagi "dona"lar, yaxlit sirtli yoki kumushsimon ko'rinishga ega bo'ladilar. Masalan, kraxmal, ba'zi sintetik polimerlar, tuproq, shisha kabilar amorf holatdagi moddalardir. Amorf moddalarning sirt yuzasi g'ovak bo'lgani uchun katta bo'ladi. Shu sababli amorf moddalarga ko'pgina boshqa moddalarning qo'shilib qolishi (eritilishi, yutilishi) tufayli, ularning tozalik darajasi past bo'ladi.

Kristall holat. Moddaning kristall holati zarrachalarning o'zaro tartibda aniq masofalarda va burchaklar ostida joylashuvi natijasida (o'lchamli koordinatalarda) yuzaga kelgan tuzilishdir. Har bir kristall tuzilish asosida **kristall panjara** yotadi. Kristall panjara yoqlari, tugunlari, burchaklari, bog'larning uzunligi bilan tavsiflanadi. Moddalar yuqori tozalikka ega.

Kristallarning hosil bo'lishi, tuzilishi va xossalarini o'rganish — "**kristallografiya**" deyiladi.

Kristall panjaralar ulardagi zarrachalarning o'zaro joylashuvi to'liq (zich) yoki bo'sh qoplanishli bo'ladi. Kristall panjaralar

ularning joylashuvi turli geometrik shakllar hosil qilishiga bog'liq. Masalan, yog'li (geksagonal) zich qoplangan, yoqlari markazlashgan kristall panjaralar holida bo'ladi.

Kristall panjaraning o'qlari kesishgan nuqtasi tugunlarida atomlar joylashadi (metallar, olmos, grafit, SiO₂, kabi moddalarning kristall panjara deyiladi. Odatda bu moddalar o'ta qattiq bo'lib, yuqori suyuqlanish temperaturasi ega, suvda kam eriydi.

Kristall panjara tugunlarida ionlar joylashgan bo'lsa, **ionli kristall** deyiladi. Ular qatoriga ionli bog'lanishga ega bo'lgan NaCl, MgF₂, CsF, CsCl, RbCl kabi moddalar kiradi. Ular turli xil xossalarga ega bo'lib, yuqori temperaturada suyuqlanuvchan, suvli erituvchi, tokini o'tkazadigan qattiq moddalardir.

Kristall moddalar bir jinsli bo'lsalar-da, ularning tuzilishlari, xossalari, issiqlik o'tkazuvchanligi, yorug'likka munosabati turli xil bo'ladi. Kristallar xususiyatlarining ularning har bir o'qi (a, b, c) bo'yicha farq qilishi hodisasi kristallarning **anizotropiya** hodisasi deyiladi. Kristallar xossalari o'qlari bo'yicha farq qilmasligi (bir xil xossalarga ega bo'lishi) **izotropiya** hodisasi deyiladi.

Moddaning turli kristall tuzilishga ega bo'lishi **polimorfizm** hodisasi deyiladi. Masalan: SiO₂, S, Fe, NaNO₃ kabilar turli tuzilishdagi moddalarni hosil qilish uchun, bu moddalar **polimorf modda** deyiladi.

Moddalar turlicha bo'lgan moddalarning bir xil kristall tuzilishga ega bo'lishi **izomorfizm** deyiladi. Masalan: olmos va NaCl yoki Na₂CO₃ · 12H₂O, KAl(SO₄)₂ · 12H₂O lar o'zaro bir xil tuzilishli kristall tuzilishga ega bo'ladi. Bu moddalar **izomorf moddalar** deyiladi.

Kristall panjarada atomlar, anion va kationlar koordinatsion songa bog'lanadi.

Koordinatsion son — kristall panjarada har bir atom yoki ion atrofida joylashgan atom (ion) lardan nechitasi joylashganini ko'rsatuvchi kattalikdir. Koordinatsion son anion va kation radiuslari (r_{anion} va r_{kation}) o'zaro nisbatiga bog'liq bo'ladi.

Masalan, silikatlarda [SiO₄]⁴⁻ yacheyka bo'lib, Si ning koordinatsion soni 4, O ning 2. NaCl da 1 ta Na ioni atrofida 6 ta Cl ioni va 1 ta Cl ioni atrofida 6 ta Na⁺ joylashadi. Shuning uchun ularning koordinatsion soni 6 ga teng (11, a-rasm).

Kristall panjara tugunlarida molekulalar joylashgan bo'lsa, **molekulyar kristall panjara** deyiladi. Bunday kristall panjaralar CO₂ (quruq qumush), H₂O (muz) va J₂ kabi moddalar uchun xosdir.

Kristall tuzilishli moddalarda kristall panjarada yacheykalarining o'zaro bog'lanishi ko'ra qavatli (qatlam)li tuzilish, zanjirsimon tuzilishli bo'ladi.


Grafit qatlamli kristall tuzilishdagi, qattiq holdagi SO₂, BeO, zanjirli (polimer) kristall tuzilishdagi moddalardir.

IX.4. Suyuq kristallar

Kristall tuzilishli moddalar aniq suyuqlanish temperaturasi bo'ladi. Lekin shunday kristall tuzilishli moddalar ham borki, ularning temperaturasi oraliqda xira suyuqlanma holatiga o'tib, undan keyin temperaturaning ma'lum qiymatida tiniq suyuqlanmaga aylanadilar. Quyidagi organik moddalar kiradi:




4-asetil — 4-butoksiazobenzol




4,4' — dimetoksiazoksibenzol




N — (4-metoksibenziliden) — 4-sianofenilamin



Para — oktiloksibenzoy kislotasining dimeri



xolesterilbenzoat



4,4'-dianobifenil (xona temperaturasida suyuq kristall).

Suyuq kristallar anizotrop xossaga ega moddalar. Suyuq kristallar ikki turligacha bo'ladi: anizotrop va izotrop (tiniqlanish va tiniqlanish) temperaturasi ega bo'ladi.

Suyuq kristall $\xrightarrow{\text{tiniqlanish}}$ Suyuq kristall $\xrightarrow{\text{tiniqlanish}}$ Suyuqlik

Suyuq kristallar uzun zanjirning oxirida qutblangan ($-CN$, $-OR$, $-NH_2$) gruppalar va qo'shbog'li gruppalar $=C=C=$, $-N=N-$, $-O-$ saqlagan organik moddalardir. Bunday moddalarning dipol momentining yuqoriligi molekulararo tortishuv kuchlarining kuchli bo'lishiga olib keladi. Ularda molekular parallel joylashishi sababli bu moddalar shunday o'ziga xos xususiyatga egadir. *Suyuq kristallar smektik, nematik va xolesterik turlarga bo'linadi.*

Smektik (tozalovchi, yuvuvchi) suyuq kristallar ketma-ket joylashgan qatlamlardan iborat bo'lib, ular bir tekislik bo'ylab siljiydilar. Ular suyuq kristall holatdagidan katta bo'lib, yuqori temperaturaga o'tishda tiniq suyuq holatga o'tadi.

Nematik (ipsimon, tolasimon) suyuq kristallar oquvchan bo'lib, o'ziga xos tekislik ega, ipsimon tuzilishga ega moddalardir.

Xolesterik suyuq kristallar yorug'lik nuri ta'sir ettirilganda, uni qaytarish ega bo'lib, bu xususiyat qavat-qavat joylashgan 500—5000 ta molekular qatlamidan kelib chiqadi. Bunday suyuq kristallar tuzilishi zanjirli, molekulari turli yo'nalishdagi qatlamlarning markaziy qismida bir tomonga burilib joylashishi tufayli hosil bo'lgan spiraldan iborat. Spiralidagi har bir burilish "*qadam*" deyiladi. Shu tuzilish sababli suyuq kristallar yorug'lik nurlarini turlicha qaytaradi.

Bu kristallar temperaturaga ham sezgir bo'lib, kichik temperatura o'zgarishini aniqlashga yordam beradi. Chunki ulardagi turli rangning o'zgarishi (energiya o'zgarishi) temperatura o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, 11°C dan 40°C gacha bo'lgan oraliqda ro'y beradi. Xolesterik kristallar temperatura o'zgarishi sohasi 3°C atrofida bo'lgani uchun, bu moddalar yordamida teri sirtini termografik o'rganish mumkin. Qon tomirida tirqin (tromblar) hosil bo'lishini aniqlash mumkin. Qon tomirida tromba hosil bo'lsa, qon tomirining shu yerida temperatura o'zgarishi uchun, teriga surtilgan suyuq kristall ko'k rangga kiradi. Bunday usul bilan ko'krak bezi raklari, metall buyumlardagi juda kichik

kamchiliklar, metallarni payvandlashda yoʻl qoʻyilgan aniqlanadi.

Termometrlarda xolesterik suyuq kristallar ishlatilganda qarang turli rangdagi raqamlarning paydo bo'lishi.

Raqamli soatlar va mikrokalkulyatorlarning ekran-
tuzilishli kristallar ishlatiladi. Nematik kristallar
molekulalari yuqori qutblanganligi sababli, ular qayta oriyen-
tatsiya uchun juda kam elektr maydoni yetarli bo'ladi. Energiya
o'zgarishi molekulalar oriyentatsiyasini o'zgartiradi va bu
xossasining o'zgarishiga olib kelib, ekrandagi informatsiya
ko'rinishida paydo bo'ladi. Raqamlar o'zgarishi kvars kristal-
lar amalga oshiriladi, chunki ularda oz energiya ta'sirida, 1 sekun-
daga bir marta tuzilish o'zgarishi ro'y beradi. Kvarsli soatlarda harakat
mexanizm yo'q, shunisi bilan ular oddiy mexanik soatlardan farq
Ko'rinib turibdiki, suyuq kristallar hozirgi zamon o'ta sezgir
o'lchov asboblari (tarozi, soatlar, boshqa jihozlar), radiotexnika, o-
sanoatida juda keng qo'llanilayotgan muhim kimyoviy moddalar.

Savollar

1. Gazsimon moddalar qanday asosiy kattaliklar bilan tavsiflanadi?
2. Gazlarning effuziyasi deganda nimani tushunasiz. Uning ahamiyati nimadan iborat?
3. Moddalarning suyuq holati qanday asosiy kattaliklar bilan tavsiflanadi?
4. Qattiq moddalarning tuzilishi nimaga bog'liq bo'ladi?
5. Kristall panjaraning (atom, molekulyar va ionli) turlari qanday?
6. Moddaning kristall va amorf tuzilishlarini izohlang.
7. Izomorfizm va polimorfizm hodisalarini aniq misol bilan tushuntiring.
8. Kristallarning izotropiya va anizotropiyasi deganda nimani tushunasiz?
9. Suyuq kristallar — qanday moddalar?
10. Suyuq kristallarning qanday turlari mavjud?
11. Suyuq kristallarning amaliy ahamiyati nimadan iborat?
12. Suyuq kristallarning o'ziga xos xususiyatli bo'lishini nimadan iborat?

X bob

KIMYOVIY JARAYONLAR ENERGETIKASI

asosiy tushunchalar. Termodinamika tushunchasi. Energiyaning saqlanish qonuni. Ichki energiya va entalpiya. va endotermik jarayonlar. Termokimyo. Gess qonuni va uning hisoblashlarda qo'llanilishi.

X.1 Sistema haqida tushuncha

da ko'rsatilganidek, ushbu mavzuning asosini "sistema" tashkil etadi. *Sistema* — tashqi muhitdan chegara bilan ajratilgan bir qismi bo'lib, u o'zining (tarkibiy qismi) konsentratsiyasi — E , temperaturasi — T , bosimi — P , hajmi — V (erlari) bilan tavsiflanadi. Sistema turli xil bo'lib, ular jumlasiga modda yoki moddalar to'plami, kolbadagi reaksiya (aralashma) oqimidagi gaz va hokazolar kiradi.

temalar tarkibiy qismlarining agregat holatiga ko'ra *gomogen* n sistemalar bo'linadi.

...n sistemalariga bo'linadi.
 sistema bir xil agregat holatdagi moddalar (faqat gazsimon
 faqat qattiq yoki faqat suyuq) moddalardan iborat bo'lsa,
 (bir jinsli) sistema deyiladi. Masalan, havo, turli gazlarning
 imalari, eritmalari, neft. Havo, azot, kislorod, boshqa gazlar ara-
 dan iborat havo-sistema, azot, kislorod, boshqa gazlar —
 ...centlarga kiradi.

Agar turli agregat holatdagi moddalar (gaz-suyuq, qattiq-suyuq, qattiq-solida) bir-biri bilan aralashmasa, geterogen sistema deyiladi. Masalan, loyqa suv (suyiq va qattiq zarrachalari — qattiq, suv — suyuq komponent), oltingugurt va temir kukuni aralashmasi, havodagi chang zarrachalari, kolbadagi cho'kma bilan cho'kma va hokazolar.

energiyasining bir turdan boshqa turga aylanishi sababi va qonunlarini o'rganuvchi fan bo'limiga **termodinamika** deyiladi. Termodinamik tushunchalar, kattaliklar va uning qonunlaridan ishlab chiqarish jarayonlarining energetik balanslarini hisoblashda, ularni bo'lishda va modellashtirishda foydalaniladi.

X.2. Ichki energiya va entalpiya tushunchalari

Ma'lumki, barcha jarayonlar sistema energiyasining o'zgarishini amalga oshadi. Umuman, har qanday jarayonning borishi energiya saqlanish qonuniga bo'ysunadi. Masalan, bir jismga oniqcha ishl (qizdirilsa), avval jism qiziy boshlaydi, ya'ni uning *ichki energiyasi* oshadi. Molekula va boshqa zarrachalar energiyalari yig'indisi oshadi. Keyinchalik bu jism o'zidan atrof muhitga issiqlik chiqaradi, ya'ni tashqi muhitga nisbatan *ish* bajaradi. Bu holatni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$Q = \Delta U + A$$

bunda: Q — sistemaga berilgan issiqlik miqdori; ΔU — energiyasining o'zgarishi; A — sistema tomonidan tashqi kuchlarga bajarilgan ish.

Jarayonlar (reaksiyalar) o'zgarmas hajm ($V = \text{const}$, $\Delta V = 0$) (izoxor jarayon) yoki o'zgarmas bosim ($P = \text{const}$, $\Delta P = 0$) (izobar jarayon) borishi mumkin.

A. Izoxor jarayonda bajarilgan ish $A = P \cdot \Delta V$ ekanligini e'tiborga olib, u holda izoxor jarayonlarning issiqlik effekti: $Q_v = \Delta U + P \Delta V$ bo'ladi. $A = P \cdot \Delta V = 0$ bo'lgani uchun $Q_v = \Delta U$ bo'ladi. Demak, hajm o'zgarmas boradigan jarayonlarning issiqlik effekti shu sistema ichki energiyasining o'zgarishiga teng. Ichki energiya energiyaning boshqa turlari singari holatining funksiyasi hisoblanib, sistemaning dastlabki holati bilan oxirgi holatiga bog'liq: $\Delta U = U_{\text{ox}} - U_{\text{bosh}}$; U_{ox} , U_{bosh} — sistemaning dastlabki holatdagi ichki energiyalari, kJ/mol.

B. Izobar jarayonlar uchun $Q_p = \Delta U + P \Delta V$ bo'ladi. Ularning o'rniga qo'yilsa, $\Delta U = U_2 - U_1$ va $\Delta V = V_2 - V_1$ ekanligini e'tiborga olib, $Q_p = (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1)$ bo'ladi. Bu $(U + PV)$ yig'indi sistemaning biror holatini belgilab: $(U + PV) = H$ tengdir. Bu yerda H — entalpiya (ya'ni sistemaning — moddani doimiy bosimdagi ichki energiyasi deyiladi).

Demak, izobar jarayonlarning issiqlik effekti $Q_p = \pm \Delta H$ bo'ladi, bu yerda ΔH — sistema entalpiyasining o'zgarishiga teng:

$$Q_p = H_{\text{ox}} - H_{\text{bosh}} = \Delta H$$

Har qanday reaksiyaning issiqlik effekti uning qanday va bosqichda borganligiga emas, balki moddalarning boshlang'ich va oxirgi holatlariga bog'liq.

arqa bog'liqdir. Bu **Gess qonuni** deyiladi, bu matematik ko'rinishda shu qatorda yoziladi:

$$H_{\text{re}} = \sum \Delta H_{\text{max}}^{\text{yib}} - \sum \Delta H_{\text{min}}^{\text{yib}}$$

Ushbu ifodada ΔH^{yib} moddalarning "hosil bo'lish issiqligi" bo'lib, uning o'lchov birligi kJ/mol. Bu moddalardan "1 mol" murakkab modda hosil bo'lishida chiqadigan (yoki yutiladigan) issiqlik miqdoridir. Kimyoviy reaksiyalarining issiqlik effektlarini hisoblashda standart hosil bo'lish issiqligi foydalaniladi. Bu yerda: $\sum \Delta H_{\text{max}}^{\text{yib}}$ — reaksiya natijasida

qatnashgan moddalar hosil bo'lish issiqliklarining; $\sum \Delta H_{\text{min}}^{\text{yib}}$ — re-


aksiyaga kirishayotgan moddalar hosil bo'lish issiqliklarining yig'indisi. Standart hosil bo'lish issiqligi standart (25°C yoki 298 va $101,325$ kPa) da o'lchangan hosil bo'lish issiqligi shu moddaning **standart hosil bo'lish issiqligi** deyiladi, yoki $\Delta H_{298}^{\text{yib}}$ holida belgilanadi. Shuni unutmaslik kerakki, oddiy

elementlar (Fe , C , S , Cr , Al , Si , H_2 , O_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , F_2 va hokazo)ning standart hosil bo'lish issiqliklari qiymati nolga teng, ya'ni — $\Delta H_{298}^{\text{yib}} = 0$

deb qabul qilingan. Boshqa ba'zi murakkab moddalar uchun standart hosil bo'lish issiqlari jadvallarda keltirilgan. Shu jadvaldagi qiymatlardan

Gess qonuni matematik ifodasidan foydalanib, har qanday kimyoviy reaksiyada hosil bo'lgan moddalarning issiqlik effekti va biror reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning standart hosil bo'lish issiqligi qiymatlarini hisoblash mumkin.

Agar kimyoviy jarayon natijasida issiqlik chiqsa ($\Delta H < 0$) sistema issiqlanadi, bunday jarayonlar **ekzotermik jarayonlar** deyiladi. Reaksiya tenglamasida — ΔH yoziladi:



Agar kimyoviy reaksiya natijasida issiqlik yutilsa, ($\Delta H > 0$) sistema issiqlanadi (issiqlik saqlami) ortadi. Bu jarayonlar **endotermik jarayon** deyiladi. Reaksiya tenglamasida + ΔH yoziladi:



Agar kimyoviy reaksiya tenglamasida ajralib chiqadigan yoki issiqlik miqdori ko'rsatilsa, bunday tenglama *termokimyoviy* deyiladi. Yuqoridagi tenglamalar termokimyoviy tenglamalarning fanining reaksiyalar issiqlik effektlarini o'rganuvchi bo'limi *termokimyoyo* deyiladi.

X.3. Entropiya haqida tushuncha

Kimyoviy reaksiyalarda gazsimon moddalardan suyuq modda, qattiq moddalardan suyuq yoki gazsimon moddalardan gazsimon va qattiq moddalar hosil bo'lishi natijasida sistemaning "tartibsizlik" darajasi o'zgaradi. Boshqacha aytishda sistemaning *entropiyasi* o'zgaradi.

Sistemada zarrachalarning "tartibsizlik" holatini miqdoriy tafovut sifatida entropiya funksiyasi kiritilgan bo'lib, u S harfi bilan belgilanadi va kJ/mol · K yoki J/mol · K birliklarda o'lchanadi. Jarayonlarning borishi uchun sistemaning entropiyasi reaksiyadan oldingi holatiga nisbatan reaksiyadan keyin oshishi kerak, ya'ni $\Delta S_{kr} > 0$ bo'lishi zarur. Masalan, NaCl kristallari suvda eriganda kristall panjaradagi Na⁺ va Cl⁻ ionlari eritmaga o'tib, betartib harakatlana boshlaydi. NaCl kristall panjaradagiga nisbatan juda yuqori betartib holatga o'tish natijasida entropiya oshadi.

$$\Delta S_{NaCl(k)} < \Delta S_{NaCl(eritma)} \ll \Delta S_{hajratlangan NaCl (Na^+ + Cl^-)}$$

Shu singari suvning agregat holati o'zgarishida

$$DS_{H_2O(muv)} < DS_{H_2O(suyuq)} < DS_{H_2O(qattiq)}$$

Agar $CaCO_3$ ni qizdirsak, $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ o'zgarishi natijasida kristall modda ($CaCO_3$) ikkita: CaO (qattiq) va CO_2 (gaz) moddalarga parchalanadi. Shu sababli sistemadagi zarrachalar soni va tartibsizligi oshib, sistemaning entropiyasi $\Delta S > 0$ bo'ladi.

Kimyoviy reaksiya entropiyasining o'zgarishi ΔS_{kr} holida

X.4. Izobar-izotermik potensial haqida tushuncha

Kimyoviy reaksiyalar sodir bo'layotgan paytda bir vaqtning o'zida sistemaning ham entalpiyasi, ham entropiyasi o'zgaradi. Ana

Agar kimyoviy reaksiya tenglamasida ajralib chiqadigan yoki issiqlik miqdori ko'rsatilsa, bunday tenglama *termokimyoviy* deyiladi. Yuqoridagi tenglamalar termokimyoviy tenglamalarning fanining reaksiyalar issiqlik effektlarini o'rganuvchi bo'limi *termokimyoyo* deyiladi.

Sistemada zarrachalarning "tartibsizlik" holatini miqdoriy tafovut sifatida entropiya funksiyasi kiritilgan bo'lib, u S harfi bilan belgilanadi va kJ/mol · K yoki J/mol · K birliklarda o'lchanadi. Jarayonlarning borishi uchun sistemaning entropiyasi reaksiyadan oldingi holatiga nisbatan reaksiyadan keyin oshishi kerak, ya'ni $\Delta S_{kr} > 0$ bo'lishi zarur. Masalan, NaCl kristallari suvda eriganda kristall panjaradagi Na⁺ va Cl⁻ ionlari eritmaga o'tib, betartib harakatlana boshlaydi. NaCl kristall panjaradagiga nisbatan juda yuqori betartib holatga o'tish natijasida entropiya oshadi.

Sistemada zarrachalarning "tartibsizlik" holatini miqdoriy tafovut sifatida entropiya funksiyasi kiritilgan bo'lib, u S harfi bilan belgilanadi va kJ/mol · K yoki J/mol · K birliklarda o'lchanadi. Jarayonlarning borishi uchun sistemaning entropiyasi reaksiyadan oldingi holatiga nisbatan reaksiyadan keyin oshishi kerak, ya'ni $\Delta S_{kr} > 0$ bo'lishi zarur. Masalan, NaCl kristallari suvda eriganda kristall panjaradagi Na⁺ va Cl⁻ ionlari eritmaga o'tib, betartib harakatlana boshlaydi. NaCl kristall panjaradagiga nisbatan juda yuqori betartib holatga o'tish natijasida entropiya oshadi.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Izobar-izotermik potensialning qiymatiga qarab, standart sharoitda reaksiyaning o'z-o'zicha borish-bormasligi, ya'ni reaksiyaning spontanligi to'g'risida xulosa qilinadi:

Agar kimyoviy reaksiya izobar-izotermik potentsiali o'zgarishining standart qiymati $\Delta G_{298(kr)} > 0$, ya'ni musbat bo'lsa, bu reaksiyalar standart sharoitda o'z-o'zidan bora olmaydi;

Agar $\Delta G_{298(kr)} < 0$, ya'ni manfiy bo'lsa, bu reaksiyalar standart sharoitda o'z-o'zidan boradi. Bu reaksiyalar iqtisodiy va texnologik jihatdan qulay bo'ladi.

Agar $\Delta G_{298(kr)} = 0$ bo'lsa, bunda sistema kimyoviy muvozanat holatida bo'ladi. Muvozanatni zarur reaksiya boradigan tomonga yo'naltirish uchun sistemaning parametrlari (P, T, C, V lar)ni o'zgartirish kerak bo'ladi.


Umuman termodinamik kattaliklarning o'zgarishini bilish boshqarishni o'rgatib, u yoki bu reaksiyalar amalda berish asoslab beruvchi fundamental usuldir.

X.5. Termokimyoviy hisoblashlarga doir masalalar

1-masala. Agar 9,6 g metil CH_3OH spini yonganda 216,02 kJ issiqlik ajralib chiqsa, shu reaksiyaning termokimyoviy tenglamasi Berilgan:

$$\frac{m = 9,6 \text{ g}; \Delta H = 216,02 \text{ kJ}}{\Delta H_{\text{t}} = ?}$$

Yechish. Ma'lumki, termokimyoviy tenglamada 1 mol modda reaksiyaga kirishganda ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik (ΔH_{t}) ko'rsatilishi kerak. Shunga binoan, 1 mol metil spirtning tenglamasi:



Masala shartiga ko'ra:

9,6 g CH_3OH yonsa $\rightarrow 216,02 \text{ kJ}$ issiqlik chiqadi.

32 g CH_3OH yonsa $\rightarrow \Delta H_{\text{t}}$ kJ issiqlik chiqadi.

$$\Delta H_{\text{t}} = (32 \cdot 216,02) : 9,6 = 720,07 \text{ kJ/mol}$$

Hisoblangan qiymat asosida yakuniy termokimyoviy tenglama:



ko'rsatilgan ega bo'ladi.

2-masala.



Berilgan.

$$\Delta H_{\text{CO}}^{\text{f}} = -110,6 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{f}} = -241,8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{CO}_2}^{\text{f}} = -394 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{H}_2}^{\text{f}} = 0$$

$$\Delta H_{\text{t}} = ?$$

Reaksiya tenglamasiga va Gess qonuniga ko'ra, reaksiyaning

$$\Delta H_{\text{reaksiya}} = \sum \Delta H_{\text{modda}}^{\text{f}} - \sum \Delta H_{\text{modda}}^{\text{f}} =$$

$$[-394 + 0] - [-110,6 + (-241,8)] =$$

$$-394 + 352,4 = -41,6 \text{ kJ/mol}$$


Masala: 200 g suvni bug'lantirganda sarflanadigan issiqlikni

$$\Delta H_{\text{bug'lanish}} = -241,8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{bug'lanish}} = -285 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{bug'lanish}} = ?$$

Bu masalani yechish uchun ham ilovadagi $\Delta H_{298}^{\text{x.h}}$ qiymatlaridan foydalaniladi. Suv qaynaganda suyuq holdan bug' holatiga o'tadi va fazaviy o'zgarish ro'y beradi:



o'zgarish uchun Gess qonuni formulasi asosida:

$$\Delta H_{\text{qaynash}} = \Delta H_{\text{bug'}}^{\text{x.h}} - \Delta H_{\text{suv}}^{\text{x.h}} = -241,8 - (-285,8) =$$

$$= +44,0 \text{ kJ/mol ekan.}$$

Yuqoridagi tenglamaga asosan,

200 g suvni bug'lantirish uchun 44,0 kJ/mol issiqlik kerak bo'lsa, 200 g suvni bug'lantirish uchun ΔH issiqlik kerak bo'ladi. Shunga ko'ra:

$$\Delta H = 200 \cdot 44 / 18 = 488,88 \text{ kJ issiqlik sarf bo'ladi.}$$

Savollar

Sistema, komponent, sistema parametrlari deganda nimani tushunasiz?

Termokimyoviy reaksiyaning energetik effekti deganda nimani tushunasiz? Reaksiyalarning issiqlik effekti nima, u qanday belgilanadi. O'choq izohlang.

Reaksiya bo'lish issiqligi nima?

5. Ekzotermik va endotermik reaksiyalar deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring.
6. Gess qonunining ta'rifi va matematik ifodasini izohlang.
7. Entropiya tushunchasini izohlab bering.
8. Izobar-izotermik potensial nima?
9. Gibbs energiyasi qiymatining amaliy ahamiyati nimada?
10. Ichki energiya, izoxor, izobar jarayonlar tushunchalarini bering.

XI bob

KIMYOVIY REAKSIYALAR KINETIKASI

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: kimyoviy kinetika, reaksiya tezligi, reaksiyaning molekulyarligi, tartibi, tezlik doimiyligi, tezlik, reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi faktorlar, moddalar muvozanat qonuni, Vant-Goff qoidasi, faollanish energiyasi, katalizator, katalitik reaksiyalar, zanjir reaksiyalar.

Avvalgi mavzularda kimyoviy jarayonlar (reaksiya)larning ehtimolligini va ularning energetik effektlarini o'rgandik. Lekin tushunchalar reaksiyalar qanday tezlikda borishini va ularning qanday faktorlar (omillar)ga bog'liqligini tushuntirib bera olmaymiz. Shuning uchun boisdan har bir murakkab reaksiyaning haqiqiy mexanizmini aniqlash, reaksiyalarni boshqarish yo'llarini, texnologik jarayonlarni modellashtirish, optimallashtirish, avtomatlashtirish kabi muammolarni hal etish kimyoviy reaksiya tezligini chuqurroq talab etadi.

Kimyo fanining kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganuvchi bo'limi **kimyoviy kinetika** deyiladi.

XI.1. Kimyoviy reaksiya tezligi

Ma'lumki, har qanday kimyoviy hodisa natijasida bir modda moddaga aylanadi. Bu ma'lum vaqt mobaynida dastlabki miqdorining kamayishi va yangi hosil bo'layotgan modda miqdori



ishu bilan ro'y beradi, ya'ni har bir reaksiya ma'lum tezlik bilan mulohazadan kelib chiqib kimyoviy reaksiyalar tezligiga

tezlik. **tezligi deb, vaqt birligi ichida reaksiyaga kirishuvchi (yoki burchi) moddalar konsentratsiyasining o'zgarishiga aytiladi.**

vaqt t (sek) va moddalar konsentratsiyasi — C (mol/l) bilan reaksiya tezligi $V = \pm \Delta C / \Delta t$ bo'lib, o'lchov birligi — mol/bo'ladi. ΔC konsentratsiya o'zgarishi ($C_{\text{soy}} - C_{\text{bosh}}$) mol/l; Δt — vaqt sek.

reaksiya gomogen sistemada, ya'ni bir xil agregat holatdagi moddalar faqat gazsimon yoki suyuq holatdagi moddalar) o'rtasida borsa, tezligi yuqoridagi birlikda ifodalanadi.

reaksiya geterogen sistemada, turli agregat holatlardagi moddalar, qattiq; qattiq-suyuq) o'rtasida borsa, qattiq modda reaksiyada yuzasi orqali gaz (suyuq) modda bilan ta'sirlashadi. Bunday tezligi birligini ifodalashda qattiq moddaning sirt yuzasi hisobga va mol/(m² · s) birlikda o'lchanadi. Bunday reaksiyalarga yonish n. metallarning gazlar (O₂, Cl₂, F₂...) muhitida oksidlanish, CO ishtirokida qaytarilish, metallarning korroziyalanishi misol

in. $aA + bB = pC + dD$ tenglamaga mos keluvchi reaksiya bo'lsa, tezligini dastlabki (A va B) moddalar konsentratsiyalari orqali bo'luvchi (C va D) moddalar konsentratsiyalari orqali ifodalash

tezligi dastlabki moddalar konsentratsiyalari orqali ifodalansa moddalar konsentratsiyalari reaksiya mobaynida kamayib borgan $V = -\Delta C / \Delta t$ ko'rinishda, agar hosil bo'layotgan moddalar (ulaming vaqt o'tishi bilan ko'payib boradi) konsentratsiyalari orqali ifo- $V = +\Delta C / \Delta t$ ko'rinishida bo'ladi.

Kimyoviy reaksiya tezligining bu formulalar asosida hisoblangan qiy- o'racha tezlik" ham deyiladi.

ko'pchilik hollarda juda qisqa vaqt (dt) ichidagi reaksiya tezligini o'zgarishiga to'g'ri keladi. Bu tezlik "ayni vaqt" dagi yoki "oniy tezlik" va moddalar konsentratsiyalari o'zgarishining vaqt bo'yicha hosilasi holida yoziladi.

reaksiyalarining kinetik tavsifnomalariga reaksiya tezligidan tashqari reaksiyaning molekulyarligi va tartibi ham kiradi.


Reaksiyaning molekulyarligi

Kimyoviy o'zgarishlar ro'y berishida reaksiyada ishtirok moddalar molekularining o'zaro to'qnashuv jarayonida, ya'ni "ketma-ket" da bitta molekula, ikkita molekula va uchta molekulaning baravariga o'zaro to'qnashuvi ro'y berishi talab etilishi mumkin. ko'ra, reaksiya bir (mono) molekulyar, ikki (bi) molekulyar, uchta molekulyar turlarga bo'linadi.

Monomolekulyar reaksiya. Bunday reaksiyalarda kimyoviy o'zgarish bitta moddaning bitta molekulasi ishtirok etadi. Umumiy ko'rinishda reaksiya:



Monomolekulyar reaksiyalarga ko'pchilik parchalanish misol bo'ladi:



Bimolekulyar reaksiyalar. Bu reaksiyalarda bir vaqtning o'zida ikkita molekula o'zaro ta'sirlashadi, boshqacha aytganda reaksiya sodir bo'lishi uchun reaksiyaga kirishuvchi modda 2 ta molekulasi o'zaro to'qnashuvi ro'y beradi. Umumiy holda:





yoki



$A + B \rightarrow AB$ ($\text{H}_2 + \text{J}_2 \rightarrow 2\text{HJ}$) ko'rinishda yoziladi.

Yuqoridagilarga ko'ra, reaksiyaning molekulyarligini aniqlash reaksiyaga kirishuvchi moddalar oldidagi koeffitsiyentlarni bilish bilan bog'liq bo'ladi. Haqiqatda esa, har bir kimyoviy o'zgarish bir necha "ketma-ket" yoki "parallel" boruvchi reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Sababli har doim ham reaksiyaning molekulyarligini aniqlashda har bir yo'l tutib bo'lmaydi. Masalan: $2\text{N}_2\text{O}_5 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ reaksiya bimolekulyar bo'lsa-da, bunda ikki reaksiya:



ketma-ket boradi. Bu reaksiyalarning qaysi biri sekinlik bilan reaksiyaning molekulyarligi shu reaksiya molekulyarligi bilan bog'liq bo'ladi.

Trimolekulyar reaksiyalar

Trimolekulyar reaksiyalarning borishida bir vaqtda 3 ta molekulaning o'zaro to'qnashish ehtimolligi juda kam. Shuning uchun ($A + B + C \rightarrow D$) trimolekulyar reaksiya juda kam uchraydi va u sekin ro'y beradi, to'g'ri aksincha reaksiya esa deyarli uchramaydi. Lekin quyidagi reaksiyani trimolekulyar reaksiyaga misol sifatida keltirish mumkin. Bu tabiatda molekulasi ishtirokida ozon gazining hosil bo'lishidir:



Reaksiyada azot molekulasi kislorod molekulasi va atomi ta'sirida chiqadigan ortiqcha energiyani "yutib" oluvchi modda vazifasini o'ynaydi. Aks holda bu energiya qaytadan $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + \text{O}$ ning hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Shu singari $2\text{NO} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NOCl}$ ham uch molekulyar reaksiya bo'ladi.

Reaksiya tartibi

"Reaksiyalarning tartibi" reaksiya tezligi moddalar konsentratsiyasining darajasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Agar $nA + mB \rightarrow qC$ reaksiya tezlik ifodasini

$$V = K \cdot C_A^n \cdot C_B^m$$

ifodada yozsak, n va m larning yig'indisi ($n + m$) shu reaksiyaning tartibi bo'ladi. Reaksiyalar o'z tartibiga ko'ra nolinch, I, II, III va ko'p tartibli bo'lishi mumkin. Agar



reaksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu reaksiya suyultirilgan holatda boradi deb faraz qilamiz. U holda,

$$V = K \cdot C_{\text{NH}_4\text{Cl}} \cdot C_{\text{H}_2\text{O}}$$

ko'inishida yoziladi va darajalar yig'indisi $1 + 1 = 2$ bo'ladi, ikkinchi tartibli reaksiya deb hisoblash mumkin. Aslida, reaksiya molekulalari soni juda ko'p va gidroliz davomida $C_{H_2O} = \text{const}$ uchun bu reaksiyaning tezligi faqat tuzning konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu bimolekulyar va birinchi tartibli reaksiyadir.

Agar reaksiya davomida reaksiya tezligi o'zgarmasa, ya'ni $V_{to'g'ri} = \text{const}$ bo'lsa, bu "nolinchi tartibli reaksiya" deyiladi. Bunday reaksiya qattiq modda sathiga yutilgan moddalar ishtirokida ro'y bo'lgan reaksiyalar kiradi. Reaksiya tartibi asosan eksperimental aniqlanadi.

XI.2. Reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar

Kimyoviy reaksiyalarning tezligi reaksiyaga kirishuvchi moddalarning konsentratsiyasiga, bosimga, temperaturaga, katalizatorga va moddalarning tabiatiga, agregat holatiga (qattiq moddalar uchun maydalanish — dispersligiga) bog'liq bo'ladi.

a) Moddalar konsentratsiyasining ta'siri

Ma'lumki, moddalar bir turdan ikkinchi turga o'tishi, ya'ni kimyoviy reaksiya borishi uchun reaksiyada ishtirok etuvchi moddalar molekulalari o'zaro to'qnashishi kerak. Agar biror hajm (yoki yuza) birligida moddalar vaqt oralig'ida zarrachalarning o'zaro to'qnashuvlar soni qancha bo'lsa, yangi moddaning hosil bo'lishi ham shunchalik ko'p bo'ladi. O'z-o'zidan ayonki, zarrachalar soni bevosita moddalarning konsentratsiyasi (hajm birligiga to'g'ri keladigan "mol"lar soni) ga bog'liq bo'lgani uchun reaksiyaning tezligi ham bevosita moddalarning konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi bog'liqlikni K. M. Guldberg va M. Vaage (1867 y) o'rganib turli reaksiyalar uchun "moddalar konsentratsiyasiga ta'siri" qonunini kashf etgan.

Bu qonunga ko'ra: kimyoviy reaksiyaning tezligi reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsionaldir.

Bu qonun kimyoviy kinetikaning asosiy qonuni deyiladi. $pC + dD$ reaksiya uchun uning matematik ifodasi:


$$V_{to'g'ri} = K_1 \cdot C_A^a \cdot C_B^b \quad (\text{to'g'ri reaksiya uchun})$$

$$V_{teskari} = K_2 \cdot C_C^c \cdot C_D^d \quad (\text{teskari reaksiya uchun}) \quad \text{holida yoziladi}$$

Yuqoridagi formulalarda gazsimon moddalar ishtirok etayotgan bo'lsa, reaksiya o'rtasiga har bir gazning parsial (xususiy) bosimi yoziladi:

$$V_{to'g'ri} = K_1 \cdot p_A^a \cdot p_B^b \quad \text{va} \quad V_{teskari} = K_2 \cdot p_C^c \cdot p_D^d$$

Agar reaksiya qattiq modda ishtirok etsa:



Ushbu reaksiya uchun tezligi ifodasi $V_{to'g'ri} = K \cdot p_{H_2}$ ko'inishida bo'ladi, ya'ni qattiq modda konsentratsiyasi yozilmaydi. Chunki, qattiq modda konsentratsiyasi faqat siri bilan reaksiyaga kirishadi va bunda uning konsentratsiyasi o'zgarib, doimo " C_s , mol/l"ga teng deb olinadi va odatda " C_s "

qattiq modda konsentratsiyasi $C_{(qattiq)} = \frac{n}{V} = \frac{m_k/M}{V_k} = \frac{m_k}{MV_k}$ (m_k — qattiq modda konsentratsiyasi, V_k — qattiq modda hajmi) ga qo'shilgan bo'ladi. $C_{(qattiq)}$ o'zaro proporsional bo'lganliklari uchun ularning nisbatlari har bir reaksiya uchun berilgan temperaturada const bo'ladi.

$$\text{Demak, } C_k = \frac{m}{V} \cdot \frac{1}{M} = \text{const}.$$

Yuqoridagi formulalarda: C — moddalarning molyar konsentratsiyasi, p — gazlarning parsial bosimi, K — reaksiyaning tezlik doimiysi. K — tezlik doimiysi har bir reaksiya uchun asosiy miqdoriy kinetik bog'liqlik bo'lib, uning ma'nosi reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyalari $C = C_s = 1$ mol/l bo'lganda kimyoviy reaksiya tezligidir. $V = K$ bo'ladi. Ba'zi hollarda K ni solishtirma tezlik ham deyiladi. K — har bir reaksiya uchun o'ziga xos qiymatga ega bo'ladi. Uning qiymati, asosan, reaksiyaga kirishuvchi moddalarning tabiatiga, temperaturaga, katalizatorga bog'liq bo'lib, moddalarning konsentratsiyasi va parsial bosimi) ga bog'liq bo'lmaydi.

b) Temperaturaning ta'siri

Kimyoviy reaksiyalarning borishi va ularning tezligi ko'pchilik hollarda temperaturasi bog'liq bo'ladi. Bu bog'liqlik Vant-Goff qoidasi bilan ifodalanadi:

Har bir temperaturasi har 10°C ga o'zgarganda kimyoviy reaksiya tezligi 2-4 marta o'zgaradi. Bu qoidaning matematik ifodasi:

$$V_{ox} = V_{t\ bosh} \cdot \gamma^{\frac{t_{ox} - t_{bosh}}{10}} = V_{t\ bosh} \cdot \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$$

bu yerda: $V_{t_{ox}}$ va $V_{t_{bosh}}$ — temperaturaning oxirgi va boshlang'ich qiymatiga to'g'ri keladigan reaksiya tezliklari; Δt — temperatura o'rtasidagi farq, °C; γ — reaksiya tezligining temperatura koeffitsiyenti, uning qiymati o'rtacha 4 gacha bo'ladi.

$$\text{Formuladagi } \gamma^{\Delta t/10} = \frac{V_{t_{ox}}}{V_{t_{bosh}}}$$

ifoda temperatura Δt birlikka o'zgarganda reaksiya tezligi necha o'zgarishini bildiradi.

Yuqoridagi fikrlardan quyidagi tabiiy savol kelib chiqadi. Nima uchun ko'pchilik hollarda temperaturaning ortishi bilan kimyoviy reaksiya tezligi ortadi?


Bu savolga javob berish uchun har qanday kimyoviy o'zgarishning asosiy sharti bo'lgan — reaksiyaga kirishuvchi modda molekulalar (ionlari)ning o'zaro to'qnashuvi shartligini va bu to'qnashuv vaqtida zarur bo'lgan energiya miqdori haqida ma'lum minimal ortiqcha energiyaga ega bo'lishi kerak e'tiborga olish zarur. Boshqacha aytganda, reaksiyaning faollanish energiyasini bilish kerak.

XI.3. Reaksiyalarning faollanish (aktivlanish) energiyasi

Kimyoviy reaksiyalar ro'y berishining asosiy sharti — reaksiya ishtirok etuvchi zarrachalarning o'zaro to'qnashuvidir. Lekin zarrachalar o'rtasida yuz beradigan har qanday to'qnashuv ham yangi modda hosil bo'lishiga olib kelavermaydi. Juda kamchilik to'qnashuvlarga kimyoviy o'zgarishlarga olib keladi. Bunday to'qnashuvlar **“faol to'qnashuv”** deyiladi.



faol to'qnashuv tufayli dastlabki A va B moddalar molekulalar (ionlari) dastlabki kimyoviy bog'lar uzilib, yangi bog'lar hosil bo'ladi. Bu jarayon amalga oshishi paytida oraliq modda **“faol kompleks”** hosil bo'ladi.



shunday **“faol to'qnashuv”** ro'y berishi uchun zarrachalar o'rtasida faol to'qnashuv uchun zarur bo'lgan eng kichik energiya miqdori kimyoviy reaksiyaning faollanish energiyasi deyiladi.

Faollanish energiyasi E_{faol} holda belgilanadi, kkal/mol yoki kJ/mol shaklida o'lchanadi. E_{faol} kimyoviy reaksiyalarning asosiy kinetik xarakteristika hisoblanadi.

Faollanish energiyasi va reaksiyaning yo'nalishi o'rtasidagi bog'lanish **energiyasi grafigi** deyiladi. E_{faol} faollanish energiyasi dastlabki reaksiya mahsulotiga aylanishidagi asosiy energetik **“to'siq”** hisoblanadi. Agar bu **“to'siq”**ning balandligi (E_{faol} — qiymati) qanchalik kichik bo'lsa, kimyoviy reaksiya shunchalik oson va demak tez amalga oshadi. Ma'lumki, reaksiya boradigan sistema temperaturasining oshishi reaksiya tezligining ortishiga olib keladi, chunki berilgan issiqlik energiyasi faollanish energiyasiga nisbatan ko'proq bo'lgan energiyaga tezroq olib keladi. Bu o'z navbatida agar ular E_{faol} — energiyasiga ega bo'lsa, **“to'siqdan”** **“tez o'tishiga”**, ya'ni reaksiya qisqa vaqtda sodir bo'lib, mahsulot hosil bo'lishiga sabab bo'ladi, shu sababli reaksiya tezligi temperatura ortishi bilan keskin o'zgaradi.

Faollanish energiyasining to'g'ri reaksiya uchun ham ($E_{to'g'ri}$) teskari reaksiya uchun (E_{tesk}) ham o'ziga xos qiymati bor. Ko'pchilik hollarda E_{tesk} bo'ladi. Bu energiyalar o'rtasidagi farq $E_{tesk} - E_{to'g'ri} = \Delta H_{reak}$ bo'ladi. Bu reaksiyaning issiqlik effektiga teng bo'ladi.

Reaksiyalar tezligi E_{faol} qiymatiga bevosita bog'liq. Agar reaksiyaning $E_{faol} < 40$ kJ/mol bo'lsa, bu reaksiya juda tez boruvchi reaksiya bo'ladi. Bunday reaksiyalar o'rtasidagi reaksiyalar, yonish, portlash reaksiyalari misol bo'ladi. Ba'zi hollarda bu reaksiyalarning tezligini o'lchab bo'lmaydi.

Agar reaksiya uchun $40 \text{ kJ/mol} < E_{faol} < 120 \text{ kJ/mol}$ bo'lsa, bular o'rtacha tezlikda boruvchi reaksiyalar bo'lib, ularning tezligini laboratoriya sharoitida o'rganish mumkin.

Masalan: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{S}$ reaksiya borishini laboratoriyada kuzatish, mumkin.

Agar $E_{faol} > 120 \text{ kJ/mol}$ bo'lsa, bu reaksiyalar juda qiyin va uzoq davom etuvchi reaksiyalardir, bu reaksiyalarni amalga oshirish qiyin yoki

ularning tezligini oshirish uchun katta energiya sarflash kerak. Odatdagi hozirgi zamon texnologiyasi uchun bunday juda sekin boruvchi reaksiyalar yaroqsizdir.

XI.4. Katalizatorning ta'siri. Katalitik reaksiyalar

Shunday reaksiyalar borki, agar ikkala asosiy dastlabki moddalar (A va B) o'zaro bevosita ta'sir ettirilsa, ular o'zaro reaksiyaga kirishmaydi. Chunki ular o'rtasida boruvchi reaksiyaning faollanish energiyasi $E_a = 120 \text{ kJ/mol}$. Lekin bu sistemaga uchinchi (K) modda kiritilsa, $(A + B + K)$ aralashmada reaksiya juda katta tezlik bilan boradi. AB — modda hosil bo'ladi va K moddasi o'zgarishsiz ajralib chiqadi:



Bu keltirilgan misoldan ko'rinib turibdiki, reaksiyalar tezligi asosan moddalardan tashqari uchinchi modda ishtirokiga ham bog'liq. Bunday moddalar **katalizatorlar** deyiladi.

Katalizatorlar — reaksiyada qatnashib, uning tezligini o'zgartirish reaksiyadan so'ng o'z holatini saqlagan holda ajralib chiqadigan kimyoviy moddalardir.


Katalizator ishtirok etadigan reaksiyalar katalitik reaksiyalar deyiladi. Katalizator ta'sirida reaksiya tezligining o'zgarishi hodisasi **katalitik hodisa** deyiladi.

Katalizatorlar ikki xil bo'ladi. Musbat katalizator, ya'ni reaksiya tezligini oshiruvchi moddalar. Reaksiya tezligini sekinlashtiruvchi katalizatorlar manfiy katalizatorlar, ya'ni **ingibitorlar** deyiladi.

Fe korroziyasini sekinlashtirish uchun anilin yoki $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ingibitor bo'lsa, HCl sintezini O_2 — ingibitori ta'sirida sekinlashtirish mumkin.

Reaksiyada ishtirok etuvchi moddalar va katalizatorlarning agregat holatiga ko'ra **gomogen va geterogen kataliz** bo'lishi mumkin.

Gomogen kataliz — reaksiyaga kirishuvchi moddalar va katalizator bir agregat holatda bo'lgan katalitik reaksiyalardir. Misol:



CO gazini CO_2 gazigacha oksidlanishida suv bug'i katalizator bo'lgan $2\text{SO}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{SO}_{3(\text{g})}$ reaksiyada NO — gazi katalizator.

Geterogen katalizga tirik organizmda boruvchi barcha katalitik reaksiyalarni kiritish mumkin. Masalan,




Tirik organizmda faoliyat ko'rsatuvchi katalizatorlarni **biokatalizatorlar** yoki **fermentlar** deb aytiladi.

Shunday fermentlar qatoriga "ptialin" dan tashqari "pepsin" moddasi kiradi. Bu katalizator oshqozonda oqsilli moddalarni tezroq parchalanishiga yordam beradi.

Eritmalarda boradigan ko'pchilik katalitik reaksiyalarda erituvchi moddalari katalizator vazifasini o'taydi. Bu jarayonlarda ba'zan H^+ , OH^- va OH^- ionlari ham ishtirok etishi mumkin.

Geterogen kataliz — katalizator va reaksiyalarga kirishuvchi moddalar bir agregat holatlarda bo'lgan sistemalarda boradigan katalitik reaksiyalardir. Bu kataliz turiga ammiak sintezini misol qilib keltirish mumkin:



modda. Kontakt usulida sulfat kislota sintezida:



Shunday reaksiyalar borki, ularda alohida katalizator qo'llanilmaydi, reaksiya davomida hosil bo'ladigan moddalardan birortasi katalizator vazifasini bajaradi. Bu jarayonni "**autokataliz**" deyiladi.

Masalan: permanganat ioni — MnO_4^- bilan boradigan ($\text{pH} < 7$) oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari avval sekinroq borib, bir oz vaqtdan keyin juda tezlashib ketadi:



Chunki, reaksiya natijasida hosil bo'luvchi Mn^{2+} ioni katalizator vazifasini bajarib, reaksiyaning tezlashuviga sabab bo'ladi.

Tabiiyki, katalizator nima sababdan reaksiya tezligini oshiradi, degan savol turadi. Bu savolga javob berish uchun katalitik reaksiyalarning mexanizmi va mexanizmini bilish zarur.


Katalizatorning asosiy vazifasi reaksiyalarning faollanish energiyasini kamaytirishdan iborat. Buning isboti sifatida quyidagi dalillarni keltirib chiqarish mumkin:



Agar reaksiyada katalizator ishlatilmasa, $E_{\text{faol}} = 168 \text{ kJ/mol}$.

Agar katalizator — Au (oltin) bo'lsa, $E_{\text{faol}} = 105 \text{ kJ/mol}$; agar katalizator Pt (platina) bo'lsa, $E_{\text{faol}} = 59 \text{ kJ/mol}$ bo'ladi.

Katalizator "selektivlik" (tanlovchanlik) xossasiga ega. Chunki, ayrim xil moddalarda 2 ta bir xil modda o'rtasida boruvchi katalitik reaksiyada katalizator o'zgartirish bilan turli xil reaksiya mahsulotlarini hosil qilish mumkin.




Shunday moddalar ham borki, ularning o'zlari katalizatorlik xususiga ega bo'lmaydi, biroq katalizatorning faolligini oshiradilar. Bunday moddalarni "promotor"lar deb aytiladi. Masalan: V_2O_5 katalizatorning promotori, Na_2SO_4 tuzidir.

Aksincha, katalizator faolligini keskin kamaytirib yuboruvchi moddalarni "katalizator zahari" deyiladi. Bular — HCN , As_2O_3 , SO_2 va boshqalar.

XI.5. Kimyoviy reaksiyaning mexanizmlari bo'yicha turlari

O'zaro ta'sirlashuvchi moddalarning tabiatiga, "elementar akt"da qatnashuvchi zarrachalar (atom, molekula, radikallar, ionlar) holatiga ko'ra quyidagi reaksiya turlari mavjud.

Oddiy reaksiyalar — bu molekular o'rtasida boruvchi kimyoviy o'zgarishlardir:





Bunday reaksiyalar valentliklari to'yingan zarrachalar o'rtasida borib, ularning faollanish energiyasi ($E_{\text{faol}} = 150\text{--}450 \text{ kJ/mol}$) juda yuqori bo'ladi, shuning uchun ancha qiyinchilik bilan sodir bo'ladi va maxsus sharoitlarda boradi.

Tabiiy hollarda moddalar erituvchida eritilib, reaksiya eritmada boradi. Eritmada moddalar ionlarga parchalangani uchun ionlar o'rtasida ta'sirlashuv $E_{\text{faol}} < 80 \text{ kJ/mol}$ bo'lgani uchun juda tez boradi.




Ba'zi hollarda elektrorazryad, qizdirish, nurlash va mexanik ta'sir o'rtasida moddalar elektron chiqarishi tufayli molekulyar ionlar hosil bo'ladi. Bunday reaksiyalar ham juda tez boradi. Yuqoridagi ta'sirlar o'rtasida molekular tarkibidagi bog'larni hosil qiluvchi elektronlar ta'sir o'rtasida teng taqsimlanmaydi. Bu **geterolitik parchalanish** deyiladi. Shunday reaksiyalar ham borki, ularda kimyoviy reaksiya hosil qilgan elektron jufti atomlar o'rtasida teng taqsimlanadi, bu **gomolitik ajralish** natijasida valentligi to'yinmagan faol zarrachalar **radikallar** hosil bo'ladi. Ko'pchilik reaksiyalar radikal mexanizmida boradi va bu reaksiyalar ($E_{\text{faol}} < 40 \text{ kJ/mol}$) juda tezlik bilan boradi. Radikallar hosil bo'lishiga misollar:




peroksobirikmalar radikallar

Radikal mexanizmida ko'pchilik polimerlanish reaksiyalari va zanjir reaksiyalari boradi.


Zanjir reaksiyalari. Biror faol markaz hosil bo'lib, bu faol markaz reaksiyaga kirishuvchi moddalarning o'zaro ta'sirini bir-biriga uzatilishi boruvchi reaksiyalardir. Misol sifatida HCl sintezini ko'rib chiqaylik. Reaksiyaning umumiy tenglamasi: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$. Reaksiya borishi uchun H_2 va Cl_2 gazlari aralashmasiga ultrabinafsha nur, quyosh nuri, yoki turgan magniy metali ta'sir ettirsa bo'ladi, bunda xlor molekulasidan radikallari hosil bo'ladi:




Hosil bo'lgan $\text{Cl}\cdot$ — atom radikallari vodorod molekulasiga ta'sir etadi:



Shu bilan zanjir reaksiya boshlanib, $\text{H}\cdot$ — atom radikali Cl_2 molekulasiga ta'sir etadi:



Shu tartibda reaksiya davom etaveradi:



Zanjirning uzunligi bir necha yuz ming birlikkacha boradi. He-
bo'lgan radikallarning o'zaro to'qnashuvlari:



zanjirning uzilishiga sabab bo'ladi. Reaksiya sekinlashadi va nihoyatda to'xtaydi. Buni zanjir **rekombinatsiyasi** deyiladi.

XI.6. Kimyoviy reaksiya tezligiga doir masalalar yechish

1-masala. 4 litr hajmli idishda 3 mol H_2 va mo'l miqdorda H_2 bor. Reaksiya boshlanganidan 10 minut keyin azotning konsentratsiyasi 2,5 molga teng bo'lib qolgan bo'lsa, reaksiyaning o'rtacha tezligini hisoblang.

Yechish: a) reaksiya tezligi qoidasiga ko'ra, ortiqcha tezlik

$$V_{\text{dnu}} = \frac{C_{\text{bosh}} - C_{\text{oxir}}}{t_{\text{oxir}} - t_{\text{bosh}}} \text{ mol/l-sek.}$$

vaqt 10 min=600 sek

Yuqoridagi formula bo'yicha V_{dnu} — qiymatini hisoblash uchun azotning boshlang'ich va oxirgi konsentratsiyalarini hisoblaymiz:

$$C_{N_2(\text{bosh})} = \frac{n_{N_2(\text{bosh})}}{V} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ mol/l}$$

$$C_{N_2(\text{ox})} = \frac{n_{N_2(\text{ox})}}{V} = \frac{2,5}{4} = 0,625 \text{ mol/l}$$

azotning konsentratsiyasi o'zgarishi asosida V_{dnu} ni hisoblaymiz:

$$V_{\text{dnu}} = \frac{C_{N_2(\text{bosh})} - C_{N_2(\text{ox})}}{t_{\text{ox}} - t_{\text{bosh}}} = \frac{0,75 - 0,625}{600 - 0} = 0,000208 \text{ mol/l-sek}$$

ammiak hosil bo'lishi: $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ tenglama bo'yicha boradi. ko'ra, 1 mol N_2 sarf bo'ladi. Reaksiyaning o'rtacha tezligiga asosan da $2,08 \cdot 10^{-4}$ mol/l azot sarflangan va undan $4,16 \cdot 10^{-4}$ mol/l hosil bo'lgan. Butun idish bo'yicha $4 \cdot 600 \cdot 2,08 \cdot 10^{-4}$ mol azot sarflangan va $2 \cdot 4 \cdot 600 \cdot 2,08 \cdot 10^{-4}$ mol NH_3 hosil bo'lgan.

2-masala. $Fe_2O_3(k) + 3H_2(gaz) = 2Fe(k) + 3H_2O(gaz)$ reaksiyasida:

- azotning konsentratsiyasi 3 marta oshirilganda,
- sistema hajmi 2 marta oshirilganda,
- temperatura 450° dan 500° gacha oshirilganda ($\gamma=2$) tezlik qanday o'zgarishini hisoblang.

Yechish.

a) sistemada qattiq moddalar konsentratsiyalarini hisobga olmaymiz. azotning dastlabki konsentratsiyasi $[H_2]_{\text{dast}} = X$ mol/l va oxirgisi $[H_2]_{\text{ox}} = 3X$ mol/l bo'ladi.

Massalar ta'siri qonuniga ko'ra:

$V_{\text{bosh}} = K[H_2]_{\text{bosh}}^3 = K \cdot X^3$ bo'ladi. $V_{\text{ox}} = K[H_2]_{\text{ox}}^3 = K(3X)^3 = 27KX^3$ bo'lib, tezlikning o'zgarishi:

$$\frac{V_{\text{ox}}}{V_{\text{bosh}}} = 27 \frac{KX^3}{KX^3} = 27 \text{ marta ortadi}$$

b) sistemada hajmning ortishi $C = \frac{n}{V}$ ga ko'ra, konsentratsiyaning kamayishiga olib keladi. Shu sababli $[H_2]_{\text{bosh}} = X$ mol/l, hajm 2 marta ortganda $[H_2]_{\text{ox}} = X/2$ mol/l bo'ladi.

U holda: $V_{\text{bosh}} = KX^3$, bo'lsa, $V_{\text{ox}} = K\left(\frac{X}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}KX^3$ bo'ladi.

$\frac{V_{\text{ox}}}{V_{\text{bosh}}} = \frac{1}{8} \frac{KX^3}{KX^3} = \frac{1}{8}$ bo'ladi, ya'ni tezlik 8 marta kamayadi.

v) Vant-Goff qoidasiga ko'ra: $V_{ox} = V_{bosh} \gamma^{\frac{\Delta t}{10}}$ bo'ladi.

Bundan $\frac{V_{ox}}{V_{bosh}} = \gamma^{\frac{\Delta t}{10}} = 2^{\frac{500-450}{10}} = 2^5 =$ marta ortadi.

3-masala. $CO + H_2O = CO_2 + H_2$ reaksiyasida moddalarning boshlang'ich konsentratsiyalari (mol/l): $[CO] = 0,2$; $[H_2O]_{bosh} = 0,4$; $[CO_2] = 0,3$ va $[H_2] = 0,1$ ga teng. Reaksiya boshlangach 2 minutdan keyin CO ning 40% i qolgan bo'lsa, aralashmadagi moddalarning oxirgi konsentratsiyalari hisoblanadi.

Berilgan: $[CO] = 0,2$ mol/l; $[H_2O]_{bosh} = 0,4$ mol/l;
 $[CO_2] = 0,3$ mol/l va $[H_2] = 0,1$ mol/l

$[CO] = ?$ $[H_2O] = ?$ $[CO_2] = ?$ $[H_2] = ?$

Yechish. a. Masala shartiga ko'ra, CO boshlang'ich konsentratsiyasining 40% i (0,4 qism)

$[CO] = 0,2 \cdot 0,4 = 0,08$ mol/l bo'lib,
60% (0,6 qism)i CO sarflangan yoki

$[CO]_{sarfl} = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12$ mol/l ga teng.

b). Tenglamaga ko'ra, H_2O dan ham 60% ($0,6 \cdot 0,4 = 0,24$ mol) sarflanib, $0,4 - 0,24 = 0,16$ mol/l qolgan.

v. 1-tenglamaga ko'ra, 1 mol CO sarflansa, 1 mol CO_2 va 1 mol H_2 hosil bo'ladi. Shunga ko'ra, reaksiya davomida 0,12 mol CO dan 0,12 mol CO_2 va 0,12 mol H_2 hosil bo'lib, ularning oxirgi konsentratsiyalari: $[CO_2]_{ox} = 0,3 + 0,12 = 0,42$ mol va $[H_2]_{ox} = 0,1 + 0,12 = 0,22$ mol/ga teng bo'ladi.

Savollar

1. "Kimyoviy kinetika" deganda nimani tushunasiz?
2. "Reaksiya tezligi" nima?
3. Moddalar massalari ta'siri qonunining mohiyatini tushuntiring.
4. Vant-Goff qoidasini tushuntiring.
5. Faollanish energiyasi nima, uning ahamiyati nimadan iborat?
6. Katalizator nima? Uning asosiy "vazifa"si nimadan iborat?
7. Gomogen va geterogen kataliz deganda nimani tushunasiz?


Ingibitorlar nima?

Reaksiyaning molekulyarligi va tartibi deganda nimani tushunasiz?

Zanjir reaksiyalar haqida izoh bering.



XI.7. Kimyoviy muvozanat

Umuman, barcha kimyoviy reaksiyalarni ikki turga: qaytar va qaytmay bo'lish mumkin. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar to'liq reaksiya mahsulotlariga aylanadigan jarayonlar **qaytmay reaksiyalar** bo'ladi. Masalan:



Qaytmay reaksiyalar faqat bir yo'nalishda boradi va bular amalda qaytmay bo'lmaydigan reaksiyalardir. Agar dastlabki moddalar o'zaro metrik nisbatda olingan bo'lsa, reaksiya mahsulotlari dastlabki moddalar bilan ifloslanmagan, ya'ni deyarli toza moddalar hosil bo'ladi. Aksariyat kimyoviy jarayonlar **qaytar reaksiyalardir**. Reaksiyaga kirishuvchi moddalarning bir qismi reaksiya mahsulotlariga aylanib, ayni vaqtida reaksiya mahsulotlari qaytadan dastlabki moddalarga aylanib boradigan kimyoviy jarayonlar **qaytar reaksiyalar** deyiladi.

Masalan: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$




Bu misollardan ko'rinib turibdiki, qaytar reaksiyalar ikkita o'zaro qaytmay-qarshi yo'nalishda boruvchi reaksiyalardan iborat bo'lib, ular o'zaro bir-biriga ko'pchilik birikish, dissotsilanish, gidrolizlanish, kompleks hosil qilish reaksiyalarini kiritish mumkin. Bu reaksiyalar davomida reaksiya olib boriluvchi sistema (avtoklav, kolba)da dastlabki moddalar ham, reaksiya mahsulotlari ham birgalikda uchraydi. Shu sababli aksariyat texnologik jarayonlarda

qaytar reaksiyalarning kechishi ishlab chiqarishni ancha qiyinlashtiradi. Bu qiyinchiliklar, asosan, reaksiya tezligini ma'lum vaqtda hosil qilishida, reaksiya mahsulotlarini ifloslanishida, ishlab chiqarish unumining pasayishida namoyon bo'ladi.

Qaytar reaksiyalarning o'ziga xos xususiyati ularda kimyoviy muvozanat holatining yuzaga kelib qolishidir.


Yuqorida keltirilgan qaytar reaksiyalardan xohlagan birortasini tanlatsak, ularning har birida quyidagi holatni ko'rish mumkin (ammiakning hosil bo'lish jarayonini ko'rib chiqamiz):

1 mol N_2 gazi bilan 3 mol H_2 gazi aralashtirilib, tegishli sharoitda yaratilsa, bu moddalar o'zaro ta'sirlashadi:




Ma'lum vaqt davomida reaksiya boradi, bir ozdan so'ng go'yo reaksiya to'xtab qolgandek tuyuladi. Shu paytda reaksiya aralashmani analiz qilsak, ko'rsatib berilgan moddalar N_2 , H_2 va mahsulot (NH_3) — ammiakning moddasi borligini ko'rish mumkin. Agar sharoit o'zgartirilsa, moddalarining konsentratsiyalari ham o'zgarishi, lekin ularning miqdoriy nisbatlari har bir holatda deyarli bir xil qolishi aniqlangan.

Buning sababi quyidagicha izohlanadi: moddalar aralashtirilib, reaksiya boshlanib, ammiak hosil bo'la boshlaydi (to'g'ri reaksiya):



$$V_{\text{to'g'ri}} = K_1 \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3 \text{ bo'ladi.}$$

Vaqt o'tishi bilan hosil bo'lgan mahsulot — NH_3 ning bir qismi parchalanib, qaytadan dastlabki moddani hosil qila boshlaydi (teskari reaksiya):



$$V_{\text{teskari}} = K_2 [NH_3]^2 \text{ bo'ladi.}$$

Vaqt o'tishi bilan I reaksiya tezligi kamayib boradi. Chunki massa ta'siri qonuniga ko'ra N_2 va H_2 konsentratsiyalari kamayib borishi bilan $V_{\text{to'g'ri}}$ ning qiymati kamaya boshlaydi. II reaksiya tezligi esa, aksincha ortib boshlaydi. Chunki vaqt o'tishi bilan ammiakning konsentratsiyasi ortib boradi va V_{teskari} qiymatining ortishiga olib keladi.

Sistemada shunday holat yuzaga keladiki, bu paytda I va II reaksiyalarning tezliklari o'zaro teng bo'lib qoladi:

$$V_{\text{to'g'ri}} = V_{\text{teskari}}$$

Ma'lum vaqt birligi ichida azot va vodoroddan qancha ammiak hosil bo'ladi, shu vaqt ichida ana shuncha miqdordagi ammiak qayta parchalanib, vodorod hosil qiladi, ya'ni to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari teng bo'lib qoladi. Bunga sistemaning **kimyoviy muvozanat holati** deyiladi. Kimyoviy muvozanat paytida kimyoviy reaksiyalar to'xtab qolmaydi. Vaqt davom etaveradi. Lekin qarama-qarshi reaksiyalarning tezliklari ham teng bo'lib turaveradi. Shu sababli buni **dinamik (harakatchan) muvozanat** deyiladi.

Kimyoviy muvozanatning miqdoriy tavsifnomasi sifatida muvozanat doimiysi — K_{muv} qabul qilingan.

Muvozanat doimiysi. Yuqorida ko'rib chiqilgan reaksiyalar uchun: reaksiya tezligi: $V_{\text{to'g'ri}} = K_1 [N_2] \cdot [H_2]^3$; teskari reaksiya tezligi: $V_{\text{teskari}} = K_2 [NH_3]^2$ bo'lsa, kimyoviy muvozanat sharti $V_{\text{to'g'ri}} = V_{\text{teskari}}$ ga ko'ra: $K_1 [N_2] \cdot [H_2]^3 = K_2 [NH_3]^2$ bo'ladi. Bu tenglikdagi doimiylarni bir tomonga, moddalar konsentratsiyalarini ikkinchi tomonga o'tkazib yozsak:

$K_{\text{muv}} = K_1 / K_2 = [NH_3]^2 / [N_2] \cdot [H_2]^3$ tenglamaga kelamiz. Agar doimiylar har bir (doimiy) o'zgarmas songa teng bo'lishini e'tiborga olsak, reaksiyalar tezlik doimiylarining nisbatlari $K_1 / K_2 = K_{\text{muv}}$ ekanligi aniqlanadi. Buning ma'nosi — **kimyoviy muvozanatda turgan sistemada hosil bo'lgan moddalar konsentratsiyalari ko'paytmasining vaqt o'tishi bilan o'zgarmas bo'ladi. Bu muvozanatda turgan dastlabki moddalar konsentratsiyalari ko'paytmasiga ham ayni temperaturada doimiy sonidir.**

Gazsimon moddalar ishtirok etadigan sistemalar uchun K_{muv} — muvozanat doimiysi. Ushbu doimiyda konsentratsiya o'rnida gazsimon moddaning parsial bosimlari qo'llaniladi. Masalan, umumiy reaksiya: $aA + bB = cC + dD$ uchun

$$K_{\text{muv}} = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

Har qanday reaksiya muvozanat doimiysining qiymati reaksiyada ishtirok etuvchi moddalar tabiatiga va temperaturaga bog'liq bo'lib, moddalar konsentratsiyasiga bog'liq emas.

Umuman, muvozanat doimiysi va reaksiyaning asosiy termodinamik tavsifnomalari (ΔG , ΔH , ΔS) o'rtasida uzviy bog'lanish mavjud.

Ma'lumki, $\Delta G = -RT \ln K_{\text{muv}}$. Agar $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ekanligini eslasak, holda $\Delta H - T\Delta S = -RT \ln K_{\text{muv}}$ kelib chiqadi. Tenglamani ΔH va $T\Delta S$ nisbatan echib K_{muv} qiymatini topsak:

$$K_{\text{muv}} = e^{-\Delta H/RT} e^{\Delta S/R} \text{ kelib chiqadi.}$$

Bu formulada ΔH , ΔS va T lar eksponensialning darajasida turibdi. Bundan ko'rinadiki, K_{muv} ning qiymati temperatura o'zgarishiga sezgir bo'lib, moddalarning tabiati (entalpiya va entropiya) ga bog'liq.

Bu xulosalar har qanday qaytar reaksiya (birikish, parchalanish, sotsilanish, cho'kmaning erishi, kompleks hosil bo'lishi, gidrolizlanish) uchun o'rinlidir.

XI.8. Kimyoviy muvozanatning siljishi. Le-Shatlye prinsipi

Agar muvozanatda turgan sistemaning biror parametri yoki reaksiya muhitning sharoiti o'zgartirilmasa, sistema uzoq vaqt mobaynida muvozanat holatida turaveradi. Agar shu sistemaning biror parametri (sharoiti) o'zgarsa, sistemaning muvozanat holati buziladi. Boshqachagina aytganda, $V_{\text{to'g'}} = V_{\text{tes}}$ (muvozanat holat) sharti o'zgarib, $V_{\text{to'g'}} \neq V_{\text{tes}}$ bo'lib qoladi.

Bu holat faqatgina quyidagi ikki shart: $V_{\text{to'g'}} > V_{\text{tes}}$ yoki $V_{\text{to'g'}} < V_{\text{tes}}$ sharti biri amalga oshganda ro'y beradi. Bunga **kimyoviy muvozanatning siljishi** deyiladi. Muvozanat o'ng yoki chap tomonga siljiydi. Sistema kimyoviy muvozanati moddalar konsentratsiyalari (C), bosim (P) va temperatura (T) o'zgarganda siljishi mumkin. Bu omillar muvozanatning siljishi qanday ta'sir etishini ko'rib chiqamiz.

Kimyoviy muvozanatning siljishiga moddalar konsentratsiyasining ta'siri

Agar ammiak hosil bo'lishi reaksiyasida (muvozanatda turgan) dastlabki moddalardan H_2 (yoki N_2) ning konsentratsiyasini oshirsak, massa ta'siri qonuniga ko'ra $V_{\text{to'g'}} = K_1 [N_2] [H_2]^3$ ifodaga muvofiq to'g'ri reaksiya tezligi ortadi va sistemada N_2 va H_2 miqdori kamaya boshlaydi. NH_3 miqdori muvozanat holatidagiga nisbatan ortadi. Reaksiya tezligi NH_3 miqdorining ortishi o'z navbatida $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ reaksiya tezligi V_{tes} ning ortishiga sabab bo'ladi va ma'lum vaqtdan so'ng sistemada yangi muvozanat holati qaror topadi.

Yangidan muvozanatga kelgan bu sistemada yana H_2 (yoki N_2) miqdorini oshirsak, yana xuddi yuqoridagi singari holat qaytariladi.

Kimyoviy muvozanat o'ng tomonga siljiydi ($V_{\text{to'g'}} > V_{\text{tes}}$) va pirovardida yangi muvozanat qaror topadi ($V_{\text{tes}} = V_{\text{to'g'}}$ holatga keladi).

Chap tomonga siljib, muvozanat buzilib, ammiakning parchalanishi reaksiyasining tezligi ortadi ($V_{\text{tes}} > V_{\text{to'g'}}$) va ma'lum vaqt o'tgandan so'ng qaytadan muvozanat qaror topadi.

Shunday qilib, muvozanatda turgan sistemada dastlabki moddalar konsentratsiyasining ortishi bu moddalar miqdorini kamaytiruvchi reaksiya tezligi ($V_{\text{tes}} > V_{\text{to'g'}}$) ga olib keladi, muvozanat o'ngga, ya'ni ammiak mahsulotlari miqdori ortishi tomonga siljiydi.

Agar dastlabki reaksiya mahsulotlaridan biri miqdorining ortishi, shu mahsulotni kamaytiruvchi reaksiya, ya'ni dastlabki moddalar hosil bo'lishi reaksiya tezligi ($V_{\text{to'g'}} < V_{\text{tes}}$) tezligining ortishiga, muvozanatning chapga tomonga siljishi olib keladi.

Yuqorida aytilgan misolimizda dastlabki moddalar konsentratsiyasining kamayishi teskari reaksiya tezligining ortishiga $V_{\text{to'g'}} > V_{\text{tes}}$, ya'ni ammiak mahsulotlari miqdorini oshiruvchi reaksiya tezligining ortishiga olib keladi.

Hosil bo'lgan mahsulot — NH_3 miqdorining kamayishi $V_{\text{to'g'}} > V_{\text{tes}}$ sharti o'ng tomonga siljiydi.

Kimyoviy muvozanat hollarda gazsimon moddalar ishtirokida boruvchi reaksiya (masalan, bosim o'zgarishining kimyoviy muvozanatning siljishiga ta'siri) ham xuddi yuqorida bayon etilgandek tushunilishi kerak.

Masala: azot, vodorod va ammiakdan iborat kimyoviy muvozanatda ammiakning umumiy bosimi 3 marta (sistema hajmini 3 marta kamaytirish bilan) oshirilganda muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

Yechish: Bunda, bosimning 3 marta ortishi gazsimon moddalar konsentratsiyasining 3 marta ortishiga va muvozanatning siljishiga sabab bo'ladi. Muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

Bosim o'zgarguncha barcha moddalar konsentratsiyasi:

$$C_{N_2} = x \text{ mol/l, } C_{H_2} = y \text{ mol/l, } C_{NH_3} = z \text{ mol/l bo'lsin.}$$

Ushbu holda reaksiyalar tezliklari:

$$V_{\text{to'g'}} = K_1 \cdot C_{N_2} \cdot C_{H_2}^3 = K_1 x y^3 \text{ va } V_{\text{tes}} = K_2 \cdot C_{NH_3}^2 = K_2 \cdot z^2 \text{ bo'ladi.}$$

Gazlarning bosimi 3 marta oshirilganda, ularning konsentratsiyasi $C_{N_2} = 3X$, $C_{H_2} = 3y$ va $C_{NH_3} = 3Z$ bo'ladi. Har bir reaksiyaning tezligi

$$V_{N_2} = K_1 \cdot 3x \cdot (3y)^3 = 81 K_1 X \cdot y^3$$

$$V_{NH_3} = K_2 \cdot (3z)^2 = 9 K_2 Z^2$$

Demak, sistema bosimining 3 marta ortishi to'g'ri reaksiya tezligi 81 martaga, teskari reaksiya tezligini esa 9 marta ortishiga olib keladi. Natijada, to'g'ri reaksiya tezligi teskari reaksiya tezligidan 9 marta yuqori bo'lib, muvozanat buzilib ($V_{N_2} > V_{NH_3}$ bo'lgani uchun) o'ngga siljiydi.

Bu holat reaksiya tenglamasining o'ng va chap tomonlaridagi stexiometrik koeffitsiyentlar ($1 \text{ mol } N_2 + 3 \text{ mol } H_2 \rightleftharpoons 2 \text{ mol } NH_3$) yig'indisi ($4 \text{ mol} \neq 2 \text{ mol}$) o'zaro teng bo'lmagani uchun ro'y beradi.

Agar tenglamada dastlabki moddalar "mol" lar soni hosil bo'lgan moddalar "mol"lari soni bilan teng bo'lsa, masalan,




bosimning o'zgarishi sistema muvozanatining o'zgarishiga olib kelmaydi. Lekin tenglamadagi moddalardan birortasining konsentratsiyasi o'zgarishi muvozanatni u yoki bu tomonga siljitgan bo'lar edi.

Yuqoridagilarga asosan xulosa qilsak, sistema hajmini kamaytirish bilan bosimning ortishi kimyoviy muvozanatni gaz molekullari soni kamayadigan tomonga, ya'ni bosim kamayadigan tomonga siljitadi. Bosimning kamayishi esa muvozanatni bosim ortadigan tomonga siljitadi. **Reaksiyaning o'ng va chap tomonlaridagi stexiometrik koeffitsiyentlar yig'indisi o'zaro teng bo'lsa, bosimning o'zgarishi muvozanat siljishiga olib kelmaydi.**

Temperaturaning ta'siri

Kimyoviy muvozanatning siljishiga temperaturaning ta'siri reaksiyaning endotermik yoki ekzotermik ekanligiga, ya'ni reaksiyaning issiqlik effekti bog'liq bo'ladi.

Agar ammiak hosil bo'lishi reaksiyasini o'rganishni davom ettiradigan bo'lsak:



to'g'ri (o'ngga) reaksiya ekzotermik, teskari (chapga) reaksiya endotermik bo'ladi.

reaksiya issiqlik chiqishi bilan boradi, ya'ni u ekzotermikdir. O). Bu sistemada temperaturani oshirsak, issiqlik yutilishi bilan muvozanat o'ngga siljiydi.



reaksiya tezligi ortadi ($V_{N_2} < V_{NH_3}$) va muvozanat chapga siljiydi.

Temperatura pasaytirilsa, issiqlik chiqishi bilan boradigan jarayon, to'g'ri reaksiya tezligi ortadi ($V_{N_2} > V_{NH_3}$) va muvozanat o'ngga — hosil bo'lishi tomonga siljiydi.

Har qanday muvozanatda turgan sistemada temperaturaning ortishi endotermik reaksiya tezligining ortishiga, temperaturaning pasayishi — ekzotermik reaksiya tezligining ortishiga olib keladi.

Kimyoviy muvozanatning siljishiga olib keluvchi uch omilning ta'sirini hisoblab chiqishdan kelib chiqadigan umumiy xulosa:

Agar muvozanatda turgan sistemaga tashqaridan ta'sir ettirilsa (moddalar konsentratsiyasi, bosimi, temperatura o'zgartirilsa) sistema muvozanatini shu ta'sir kamayadigan jarayon tomoniga siljitadi.

Bunga kimyoviy muvozanatning siljishi to'g'risida **Le-Shatlye prinsipi** (Le Chatelier qoidasi) deyiladi. Bu qoida har qanday kimyoviy muvozanatda turgan sistemalar uchun qo'llaniladi, ularda ro'y berayotgan jarayonlarning muvozanatlashini o'zgartirishning asosini tashkil etadi.

Savollar

1. Qaytar va qaytmas reaksiyalar deb qanday reaksiyalarga aytiladi.
2. Kimyoviy muvozanat, muvozanat doimiysi nima?
3. Le-Shatlye prinsipining mohiyatini tushuntiring.
4. Muvozanatga temperaturaning ta'siri qanday bo'ladi?
5. Qanday sistemalarda muvozanatning siljishi bosimga bog'liq emas?
6. Muvozanatning siljishiga:
 - a) dastlabki moddalar miqdorining ortishi va kamayishi qanday ta'sir etadi?
 - b) mahsulotlar miqdorining ortishi va kamayishi qanday ta'sir etadi?
7. $SO_2 + 1/2 O_2 \rightarrow SO_3 - \Delta H$ reaksiya muvozanatini chapga surish uchun qanday omil, ta'sir, konsentratsiyalarni qanday o'zgartirish kirish?

XII bob

DISPERS SISTEMALAR, ERITMALAR

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *dispers sistema, dispersion muhit, dispers faza, dag'al va nozik dispers sistemalar; suspenziya, emulsiya, kolloid eritma, zollar, chin eritma, qattiq, suyuq, gaz, aralashmalar, eritmalar, gidratlar, solvatlar, erish issiqligi (entalpiya), moddalarning eruvchanligi, Genri qonuni; to'yingan, to'yinmagan, o'ta to'yingan eritma, eritma konsentratsiyasi (foiz, normal, molyar, titr, molyal, molyar qatmosmos hodisasi, Raul qonuni, ebulioskopiya va krioskopiya qonunlari*

XII.1. Dispers sistemalar va ularning turlari

Ko'pchilik moddalar bir-birida (gaz-suyuqlik, suyuqlik-suyuqlik, qattiq modda-gaz, qattiq modda-suyuqlik) tarqaladi. Tarqalish natijasida geterogen yoki gomogen sistemalar hosil bo'ladi.

Bir modda ichida (muhitida) ikkinchi moddaning juda kichik zarrachalar (bo'lakchalar) holida tarqalishi (disperslanishi)dan hosil bo'lgan mikrogeterogen sistemalar *dispers sistemalar* deyiladi (disperslanish tarqalgan, sochilgan, maydalangan degan ma'noni bildiradi). Har qanday dispers sistema dispersion muhitdan va unda tarqalgan modda zarrachalari — dispers fazadan iborat bo'ladi. Dispers sistemalar bir-birida dispersion muhit va dispers fazaning agregat holati, zarrachalarning o'lchami (katta-kichikligi), ya'ni disperslik darajasi bilan farq qiladi (8-jadval).

Disperslik darajasiga ko'ra: dag'al dispers sistemalar ($r=10^{-3}$ sm) mavjud. Bunday sistemalar suspenziyalar (dispers muhit-suyuqlik, dispers faza-qattiq modda zarrachalari) — loyqa suv; uning suvdagi aralashmalar emulsiyalar (dispers faza va dispers muhit-suyuqlik) — bo'yoqlar, sut va shiralar aralashmalar kiradi. Bu dispers noturg'un sistemalar bo'lib, vaqt o'tishi bilan buziladi.

Masalan, loyqa suv ma'lum vaqt tinch tursa tinadi, ya'ni tuproq zarrachalari cho'kadi. Bu sistemalariga chang (qattiq modda — dispers faza, havo — dispersion muhit); ko'piklar (dispersion muhit-suyuqlik — dispers faza-gaz); tuman (dispers faza-suyuqlik-(suv), dispersion muhit-havo) ham kiradi.


8-jadval

Dispers sistemalarning agregat holatlariga ko'ra sinflarga bo'linishi

Dispersion muhit	Dispers faza	Shartli belgisi Dis. faza/dis. muhit	Nomi va misollar
Qattiq	Qattiq	Q/q	Qattiq geterogen sistemalar: mineralar, beton, qatishmalar, sitallar, kompozitsion materiallar
—	Suyuq	S/q	Kapillyar sistemalar: g'ovak jisimga singigan suyuqliklar, tuproqqa yutilgan namlik
—	Gazsimon moddalar	G/q	G'ovak sirtga ega qattiq moddalar: gazsimon muhitdagi adsorbent va katalizatorlar
Suyuq	Qattiq	Q/s	Suspenziya va zollar: sanoat suspenziyalari, pulpa, loyqa, pastalar, iviqalar
—	Suyuq	S/s	Emulsiya: neft, kremlar, sut, mayonez, suyuq bo'yoqlar
—	Gazsimon moddalar	G/s	Ko'piklar: flotatsion, yong'ingaqarshi, sovun ko'piklari
Gaz	Qattiq	Q/g	Aerozolalar: shang, tutun, kukunsimon moddalar (un, kofe, kakao...)
—	Suyuq	S/g	Aerozolalar: tuman, bulut, dezodorantlar
—	Gazsimon modda	G/g	Dispers sistema hosil bo'lmaydi

Nozik dispers sistemalar yoki kolloid eritmalar.

$r=10^{-7}-10^{-4}$ sm yoki $0,1-10,0$ mkm kolloid eritmalarini "zollar" ham deyiladi. Kolloid eritmalar dag'al dispers sistemalariga nisbatan barqarordir. Masalan, qog'oz yelimi (K_2SiO_3 yoki Na_2SiO_3 ning suvli aralashmasi — "silika shisha"), Agl, $Fe(OH)_3$, As_2S_3 — zollari misol bo'ladi. Kolloid eritmada zarrachalar murakkab tarkibli bo'lib, bu zarrachalar "mitsel" deyiladi. KI va $AgNO_3$ tuzlari eritmalarini aralashuvidan hosil bo'lgan zollarni quyidagicha tasavvur etish mumkin.



yadro

granula

mitsella

Mitsellaning zaryadiga ko'ra zollarni "gidrofil zol" (musbat kolloid) va "gidrofob zol" (manfiy kolloid)ga bo'linadi. Bularga misollar sifatida Fe_2O_3 ning gidrofil zoli — $\{[xFe_2O_3] \cdot yH_2O \cdot z \cdot Fe^{3+} \cdot Cl\}$ va As_2S_3 ning gidrofob zoli $\{[xAs_2S_3 \cdot zHS \cdot zH^+]$ ni ko'rsatish mumkin. "Gidrofil" — "suvni yoqtiradi" (suv bilan ta'sirlashadi); "gidrofob" — "suvni yoqtirmaydi" (suv bilan ta'sirlashmaydi), degan ma'noni bildiradi.

Ko'pchilik yuqori molekulyar birikmalar (oqsillar, masalan, tuxum oqsili)ning eritmalarida ular zarrachalarining o'lchamlari katta bo'lganligi uchun bu moddalarning eritmalarini ham kolloid eritmalariga kiritiladi.

Umuman, kimyo fanining kolloid eritmalarining olinishi, xossalari va ishlatilishini o'rganuvchi bo'limi mavjud bo'lib, uni "kolloid kimyo" deyiladi va maxsus o'rganiladi.

O'ta nozik dispers sistemalar. Bu sistemalarda zarrachalarning radiusi $r \leq 10^{-5}$ sm bo'lib, modda ion yoki molekula holida dispersion muhitida tarqalgan bo'ladi. Bu sistemalardagi zarrachalarni hatto mikroskop yordamida ham ko'rib bo'lmaydi. O'ta nozik dispers sistemalarni **(haqiqiy) eritmalar** deb ham atyiladi.

XII.2. Chin eritmalar

Ko'pchilik kimyoviy o'zgarishlar, shu jumladan, texnologik jarayonlar eritmalarida kechadi. Xomashyo va mahsulotlar sifatini nazorat qilish



Ahmedov Karim Sodiqovich
(1914—2003 y.)

Kimyo fanlari doktori, professor. O'zFA akademigi, O'zbekiston Fanlari doktori, professor. Ilmiy xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Fizika-kolloid kimyo sohasida ilmiy ishlar bilan bog'langan. 500 dan ortiq ilmiy maqolalar va 70 ta avtorlik guvohnomalari bilan Davlat mukofotlari sohibi.



Rustamovich Rustamov
(1914 y.)

A Akademigi O'zbekistonda ko'rsatgan fan va texnika arbobi. Fanlari doktori, professor. Ilmiy xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Fizika-kolloid kimyo sohasida ilmiy ishlar bilan bog'langan. 500 dan ortiq ilmiy maqolalar va 70 ta avtorlik guvohnomalari bilan Davlat mukofotlari sohibi.

kimyoviy jarayonlar mexanizmini to'liq o'rganish, moddalarni sintez qilish, ularning xossa va tuzilishlarini aniqlash uchun eng ko'p qo'llaniladigan sistemalar — chin eritmalaridir.

Eritma — ikki yoki undan ortiq komponent (tarkibiy qism) dan iborat bo'lgan gomogen sistemadir. Eritmalar ularni tashkil qiluvchi moddalarning agregat holatiga ko'ra qattiq, suyuq, gazsimon holatlarda bo'ladi. **Qattiq eritmalar** — bular, kristallogidratlari metallarning turli tarkibga ega bo'lgan qotishmalari (po'lat, cho'yan, dyuralyumin, bronza, latun) va tuzlarning yoki oksidlarning "aralashmasi" — shishalardir.

Gazsimon eritmalarga havo (azot, kislorod va boshqa gazlardan iborat) tabiiy gaz va boshqa gazlarning aralashmalari kiradi.

Qattiq va gazsimon eritmalarida qaysi komponentning miqdori ko'p bo'lsa, shu komponent erituvchi hisoblanadi. Masalan, cho'yan — uglerod (4%) ning temir (96%) dagi eritmasi havo — azotdagi (78%) kislorod (21%) va boshqa gazlarning eritmasi.

Eng ko'p o'rganiladigan va ko'p uchraydigan eritmalar suyuq eritmalaridir. **Suyuq eritmalar** — asoslar, kislotalar, tuzlar va organik moddalarning suv yoki boshqa suyuq moddalarda erishidan hosil bo'lgan eritmalaridir. Shu sababli, eritmalar qatoriga ko'pchilik suyuqliklar (suv, spirt-efir, benzol-efir, atseton-suv, atseton-spirt, benzol-benzin va boshqalar) ning o'zaro aralashmalarini kiritish mumkin. Suyuq eritmalar — eritma hosil bo'lish jarayonida agregat holatini o'zgartirmaydigan erituvchi deyiladi. Shunga ko'ra, suv bilan spirtning suvda eritilishidan hosil bo'lgan: 40% li spirt eritmasi — spirtning suvdagi eritmasi bo'lsa, 96% li aralashmasi — suvning (4%) spirtidagi (96%) eritmasi deb tushunilishi kerak. Masalan: suvda osh tuzi eriganda (miqdori qat'iy nazar) osh tuzi kristallari suv ta'sirida kristall holatini qoldiradi, suv esa suyuq holicha qolaveradi. Shuning uchun bunday eritmalar barchasida suv erituvchi bo'ladi.

Agar suyuqliklarning o'zaro aralashuvidan hosil bo'lgan eritma bo'lsa, miqdori ko'p bo'lgan suyuqlik erituvchi hisoblanadi.

XII.3. Eritmalarning hosil bo'lishi

Eritmalarning hosil bo'lishini fizikaviy va kimyoviy (gidrat) nazariyalar quyidagicha tushuntiradi.

Eritma erituvchilarda turli modda molekularining tarqalib ketishi ya'ni erishi natijasida hosil bo'ladi. Qattiq moddalar erishida uning sirtidagi zarrachalar erituvchi molekulari ta'sirida sirtidan "uzilib" eritmaga o'tadi. Diffuziya hodisasi va molekulararo ta'sir tufayli bu zarrachalar eritmaga "ichiga" singib ketib, bir tekis tarqala boshlaydi. Shu tariqa kristall zarrachani tashkil etgan barcha zarrachalar (eritma erigan moddaga to'g'ri keladigan) eritmaga o'tadi va eritma hosil bo'ladi. Bu jarayon natijasida bir jinsli sistema hosil bo'ladi va bunda erituvchining tabiati va qat'iy moddaning tuzilishi, kimyoviy xossasi asosiy rol o'ynaydi.

Suyuq moddalar eritmalarining hosil bo'lishida erituvchi va eritilgan moddalarning molekulari (diffuziya hodisasi tufayli) o'zaro aralashib ketadi. Bu jarayonda moddalarning dipol momenti, qutblanuvchanlik kabi xususiyatlari asosiy o'rinni egallaydi. Shu sababli, qutbli moddalar qutbli erituvchida, qutbsiz moddalar qutbsiz erituvchilarda yaxshi eriydi.

Eritmalarning bir jinsli bo'lishi, erish jarayonida issiqlikning yutilishi yoki ajralib chiqishi eritmalarni **kimyoviy moddalar** deb aytishga asos bo'ladi.

Lekin eritmalar tarkibining har xilligi va o'zgaruvchanligi ularni mexanik aralashmalarga taalluqli, degan xulosaga olib keladi. Shu sababli eritmalarni kimyoviy moddalar bilan mexanik aralashmalar o'rtasidagi "oralik sistema" deb qarash kerak.


Yuqoridagi holatlarda va har qanday eritmalarning hosil bo'lishida erituvchi molekulari bilan eriydigan modda molekulari o'rtasida o'zaro fizik-kimyoviy ta'sir ro'y beradi. Bu ta'sirning mahsuloti sifatida eritilgan modda molekularining **solvatlari** — **erigan modda molekulariga eritilgan molekulari birikishi mahsulotlari** hosil bo'ladi (15-rasm).

Agar A-modda biror erituvchi (lotincha "solvent")da erisa, eritma hosil bo'lgan yangi modda — **solvat** [$A \cdot n \text{ solv}$] ko'rinishida yoziladi. Erituvchi suv bo'lsa, hosil bo'lgan moddalar ($A \cdot n \text{ H}_2\text{O}$) **gidratlar** deyiladi. Eritmalar hosil bo'lishining solvatlar (gidratlar) nazariyasini D. I. Mendeleev yaratgan. Bu nazariyaning rivojlanishiga S. Arrenius va V. Kononovlar ham katta hissa qo'shganlar.

eritmalarida erituvchi va erigan modda o'rtasida o'zaro ta'sir yuz beradigan yana bir isboti suvli eritmalarda kristallgidratlarning hosil bo'lishidir.

Suvli eritmalarda ajratib olingan ko'pchilik kristall moddalar tarkibida molekulalar suv bo'ladi:

$\text{CO}_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$; $\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{MgCl}_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$; $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ va hokazo.



15-rasm. Kristallarning suvda erishi.

Demak, gidratlar (solvatlar) ning tarkibi erigan modda tarkibiga, erituvchining miqdori va tabiatiga bog'liq bo'ladi.

Barcha kimyoviy jarayonlar singari moddalarning erishi ham uning entalpiyasi (ΔH), entropiyasi (ΔS) va izobar-izotermik mahsuloti ΔG o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Termodinamika nuqtai nazaridan biror modda boshqa ikkinchi moddada eriganda shu jarayon o'tayotgan sistema uchun

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0 \text{ shart bajarilishi kerak.}$$

Bundan ko'rinib turibdiki, doimiy temperaturada ΔG ning qiymati jarayonida zarrachalarning tartibsizlik darajasi (ΔS) — entropiyaning o'zgarishidan tashkil topadi.

Bu ikkala kattalikning erish jarayonida o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi. Suyuqlik yoki qattiq modda eriganda ularning zarrachalari tartibsiz holatdan tartibsiz holatga o'tadi, ya'ni erituvchida tarqalib ketadi. Jarayon natijasida sistemaning entropiyasi ortadi ($\Delta S > 0$), bu erish jarayonini o'z-o'zidan borishiga va $\Delta G < 0$ bo'lishida entropiya omilining

ijobiy hissa qo'shishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham aksari hollarda qattiq va suyuq moddalarning erishi temperatura ortishi bilan ortadi.

Gazsimon moddalarning suyuqliklarda erishida zarrachalar (gibb) holatdagi) tartibsiz holatdan tartibi yuqoriroq bo'lgan (suyuqlik) holatga o'tadi va $\Delta S < 0$, ya'ni bu jarayon entropiyaning kamayishiga olib keladi. Bunda ΔG ning qiymatiga entropiya faktorining qo'shadigan hisssasi muhim bo'ladi. Shu sababli gazsimon moddalarning eruvchanligi temperatura ortishi bilan kamayib, temperatura pasayishi bilan ortadi.

Eritma hosil bo'lish jarayonida sistemaning entalpiyasi yoki ortishi $\Delta H > 0$, yoki kamayishi $\Delta H < 0$ mumkin. Agar $\Delta H = \Delta U + p \cdot \Delta V$ ekanligini e'tiborga olsak va erish jarayonida hajm o'zgarmaydi ($\Delta V = 0$) deb qabul qilsak, sistema tashqi muhitga nisbatan ish bajarmaydi ($A = p \cdot \Delta V = 0$) holda erish paytida entalpiya o'zgarishi faqatgina sistema ichki energiyasining o'zgarishidan $\Delta H = \Delta U$ iborat bo'ladi. Boshqachay aytganda, ΔH (erish) asosan moddaning tuzilishi, kristall panjarasi buzilishiga sarflangan energiya — $\Delta H_{\text{tuzilish}}$ bilan yangi hosil bo'lgan moddalarning (solvatlar, gidratlar) hosil bo'lish energiya (ΔH_{sol}) lari farqi $\Delta H_{\text{erish}} = \Delta H_{\text{tuzilish}} - \Delta H_{\text{sol}}$ dan iborat bo'ladi.

Gazsimon moddalar uchun $\Delta H_{\text{tuzilish}} = 0$ bo'lgani uchun $\Delta H_{\text{erish}} = \Delta H_{\text{sol}}$ bo'ladi, ya'ni gazlarning suyuqliklarda erishida gaz molekulalar bilan erituvchi molekulalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir energiyasi asosiy faktor hisoblanadi va shu sababli doimo gazlarning erishi ($\Delta H_{\text{erish}} < 0$) ekzotermik jarayondir.

Shuningdek, shakar, glitserin, spirt, NaOH, KOH, Na_2SO_4 , sulfat xlorid va nitrat kislotalarning erishi ham ekzotermik jarayondir. Chunki molekulalararo Van-der-Vaals kuchlarining energiyasi bu moddalarning solvatlanish (gidratlanish) energiyasidan kichik, ya'ni $\Delta H_{\text{tuzilish}} < \Delta H_{\text{sol}}$.

Ionli kristallardan iborat moddalar (NaNO_3 , NH_4Cl , KCNS , Na_2CO_3 , KNO_3 , NH_4NO_3 , CuSO_4 va boshqalar) da molekulalar orasidagi bog'lanish energiyasi juda katta qiymatga ega. Shuning uchun bu moddalar erishi $\Delta H_{\text{tuzilish}} > \Delta H_{\text{sol}}$ bo'lgani tufayli entalpiya o'zgarishi $\Delta H > 0$ bo'ladi. Bu moddalarning erishi endotermik reaksiyalardir, boshqacha aytganda

* D. Mendeleyev. "O soedineniy spirta s vodoym", Sankt-Peterburg. Izd. To'rtinchi tip. V. Demakova, 1887 yil.

D. Mendeleyev. "Issledovaniye vodnix rasvorov po udelnomu vesu", Sankt-Peterburg. Izd. AN. Moskva, 1959 y. 9- va 379-betlar.

larning erishi temperatura ortishi bilan ortib boradi. Moddalar erishi issiqlikning yutilishidan foydalanib ba'zi bir sovutgich moddalar hosil qilinadi. Agar 60 g NH_4NO_3 ni 100 g H_2O da eritilsa, erituvchi suvning temperaturasi 30°C ga pasayadi, agar 88 g NH_4NO_3 100 g suvda eritilsa, temperaturani 36°C ga pasaytirish mumkin.

Bu moddalarda $\Delta H_{\text{tuzilish}} = -\Delta H_{\text{sol}}$ bo'ladi. Bular molekulyar tuzilishli moddalar bo'lib, ularning erishi entalpiya o'zgarishisiz ($\Delta H = 0$) ro'y beradi. Bu erish jarayonida $\Delta G < 0$ bo'lishi uchun asosan, entropiyaning ortishi ($\Delta S > 0$) hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunga misol sifatida CCl_4 da erishini keltirish mumkin. Bu eritma hosil bo'lganda erituvchi va erigan modda molekulalari o'rtasida yangi modda hosil bo'lmaydi va bunday eritmalar ko'pincha oddiy ikkita moddaning aralashmasiga, ya'ni *ideal eritmalarga* yaqin bo'ladi.

XII.4. Moddalarning eruvchanligi

Har qanday kimyoviy toza modda boshqa moddada eriydi. Moddalarning eruvchanligi shu moddaning va erituvchining tabiatiga va temperatura bog'liq.

Moddalarning eruvchanligi deb, ayni temperaturada 100 g erituvchida erigan moddaning gramm miqdoriga aytiladi. Bunga moddalarning eruvchanlik koeffitsiyenti" deyiladi S-harfi bilan belgilanadi.

Masalan, $S(25^\circ\text{C}) = 45$ kabi. Qavs ichida beriladigan harorat turli erituvchilarda moddaning eruvchanligi har xilligini ko'rsatadi.

Moddalarning eruvchanligi sifatida ayni sharoitda to'yingan eritmaning konsentratsiyasini qabul qilsa ham bo'ladi. Shunga muvofiq, eruvchanlik eritmaning erigan modda massasining to'yingan eritma massasiga nisbatini ko'rsatadi, ya'ni foiz (%) qiymatga tengdir.

1 litr to'yingan eritmadagi erigan moddaning "mol" lar soni moddaning eruvchanligi deyiladi.

Ko'pchilik hollarda erituvchi sifatida suv ishlatilgani uchun moddalarning suvda eruvchanligi quyidagicha tavsiflanadi: agar 100 g suvda 10 g va undan ko'p miqdordagi modda erisa — **yaxshi eruvchan**, 10 g dan 0,001 gacha erisa — **kam (yomon) eriydigan**, agar 0,001 g dan kam erisa — amalda **erimaydigan** modda deyiladi.

Moddalarning eruvchanligi ularning tabiatiga bog'liq. Qutbli moddalar erituvchida (spirt suvda, ammiak suvda, vodorod xlorid suvda) yaxshi eriydi:

Qutbsiz moddalar qutbsiz erituvchilarda (yod xloroformda, yog' suvda, naftalin benzolda) yaxshi eriydi.

Temperatura ortishi bilan moddalarning eruvchanligi ham oshib bora-
Buning sababi moddalarning erish issiqligi mavzusida batafsil bayon qilinadi.

Qattiq moddalarning eruvchanligi bosimga bog'liq bo'lmaydi.

Suyuq moddalar suyuqliklarda eriganda turlicha (cheksiz, cheklangan miqdorda) eriydi yoki aralashadi.

Masalan: spirt suvda cheklanmagan miqdorda eriydi, boshqacha-
ganda, spirt va suv o'zaro xohlagan miqdoriy nisbatlarda aralashadi.

Dietil efir ($C_2H_5-O-C_2H_5$) xona temperaturasida suvda cheklan-
miqdorda eriydi, ya'ni suv va efir aralashmasi ikki qavatdan iborat bo-
Yuqori qatlam — suvning efirdagi to'yingan eritmasi bo'lsa, pastki
lam — efirning suvdagi to'yingan eritmasidir.

Temperaturaning ortishi bu moddalarning bir-birida eruvchanli-
oshiradi va ma'lum temperaturada ikkala modda o'zaro hohlagan nisbatda
aralashadi.

Gazlarning suyuqliklarda erishi ekzotermik jarayon bo'lib, qonuniga bo'ysunadi.

Doimiy temperaturada o'zgarmas hajmdagi suyuqlikda erigan miqdori shu gazning parsial bosimiga to'g'ri proporsional.

$$C=K \cdot P$$

bunda; C — gazning eritmadagi miqdori, P — gazning parsial bosimi
K — proporsionallik koeffitsiyenti yoki Genri doimiysi.

Agar suyuqlikda bir necha gazlar aralashmasi erisa, har bir gazning
eruvchanligi gazlarning umumiy bosimiga emas, balki shu gazning parsial
bosimigagina bog'liq bo'ladi.

Gazlarning eruvchanligi "ml/100 ml" birlikda ifodalanadi.

Eritmalar moddalarning eruvchanlik koeffitsiyentiga ko'ra to'yingan
to'yingan va o'ta to'yingan xillarga ajratiladi.

To'yingan eritma. Ayni temperaturada ma'lum miqdor erituvchi-
erish koeffitsiyentidan kam miqdordagi modda erishidan hosil bo'lgan
eritma — *to'yingan eritma* deyiladi.

Agar eruvchanlik grafigiga e'tibor berilsa, 20°C da 100 g suvda
NaCl eriydi.

7-jadval

Ba'zi gazlarning suvda eruvchanligi "ml/100 ml H₂O"

Gaz	Eruvchanligi		Gaz	Eruvchanligi	
	0°C	20°C		0°C	20°C
Vodorod	2,2	1,8	CO ₂	171	88
Kislorod	4,9	3,1	Cl ₂	461	236
Azol	2,4	1,5	CH ₄	5,5	3,3
Ammiak		700			

* Bu ifodalarda absolut qiymatlarning taqqoslanishi shart ekanligini esda tutish kerak.

shu sharoitda 15 g NaCl eritilsa, to'yingan eritma hosil bo'ladi. Bu eritmada yana qo'shimcha 21 g modda eritib to'yingan eritma qilinadi.

To'yingan eritma — ayni temperaturada ma'lum miqdordagi erituvchida koeffitsiyentiga teng miqdordagi modda erishidan hosil bo'lgan eritma. To'yingan eritmada doimo erigan modda miqdori kristall (erituvchi) modda miqdori bilan muvozanatda bo'ladi, ya'ni eritmaga qo'shilgan zarrachalar soni eritmada kristallga o'tayotgan modda soniga teng bo'ladi.

O'ta to'yingan eritma. Agar to'yingan eritmaga erigan moddadan ko'proq temperatura oshirilib boraverilsa, ortiqcha qo'shilgan modda erib qoladi. Yana modda qo'shib, temperatura oshirilsa, modda yana erib qoladi va natijada o'ta to'yingan eritma hosil bo'ladi. O'ta to'yingan eritma azaldan (T.E.Lovits, 1794 y) ma'lum bo'lib, ular oddiy sharoitda metastabil sistemadir.

Shu tufayli bu eritmaga ozgina mexanik ta'sir (eritma turgan idishga zarb) berilsa yoki ozgina qattiq modda zarrachasi qo'shilsa, temperatura pasaytirilsa eritma buziladi — erigan moddaning ortiqcha qismi qayta kristallanib ajralib chiqadi. Shu usul (qayta kristallash) ko'pchilik moddalar tozalanadi. Bunda ko'pincha kristallogidratlar tozalanadi. Masalan: Na₂S₂O₃ · 5H₂O (natriy tiosulfat kristallogidrat), Na₂SO₄ · 7H₂O (Glauber tuzi), Na₂B₄O₇ · 10H₂O (bura-tanakor), Na₂CO₃ · 5H₂O (mis kuporosi).

XII.5. Eritmalarning konsentratsiyalarini ifodalash usullari

Eritmalarning asosiy miqdoriy tavsifnomasi sifatida ularning konsentratsiyalaridan foydalaniladi. Masalan, osh tuzining 10% li eritmasi, suvning 5% li eritmasi, H₂SO₄ ning 20% li eritmasi, NaOH ning 0,1 molyar, KOH ning 1 molyar eritmaları, degan tavsiflar ko'p uchraydi. Eritma konsentratsiyasini hammasida bitta umumiy tushuncha — "eritma konsentratsiyasi" to'g'risida so'z boradi.

Eritmaning biror hajm yoki massa birligida erigan modda miqdorini erituvchi kattalik eritmaning konsentratsiyasi deyiladi va C — harfi bilan belgilanadi.

Eritma konsentratsiyasini ifodalashning quyidagi turlari mavjud:

erigan moddaning massa ulushi (ω) yoki foiz konsentratsiya (C_g);

molyar konsentratsiya (C_m, mol/l);

normal yoki ekvivalent konsentratsiya (C_n; N, mol-ekv/l);

- e) titr (T, g/ml);
 f) molyal konsentratsiya (m, mol/1000 g);
 g) molyar qism (N, o'lchov birligi yo'q yoki %; ulush birligi %).

Har bir konsentratsiya turini alohida qarab chiqamiz.

Eritmalarga doir masalalarni yechishda qo'llaniladigan asosiy

FORMULALAR

Eritmalar zichligini topish	$\rho = m/V$
Eritma massasi	$m = \rho \cdot V,$
Eritma hajmi	$V = m/\rho,$
Erigan modda massasi	$m = C\% \cdot \rho \cdot V/100,$
Eritmalar ekvivalentligi	$C_1 V_1 = C_2 V_2,$
Dissotsilanish darajasi	$\alpha = n/N$
Foiz konsentratsiya	$C\% = m \cdot 100/V \cdot \rho$
bundan hajmni topish	$V = m \cdot 100/C\% \cdot \rho$
Molyar konsentratsiya	$C_m = m \cdot 1000/M \cdot V$
bundan hajm	$V = m \cdot 1000/C_m \cdot M$
bundan modda massasi	$m = C_m \cdot M \cdot V/1000$
Normal konsentratsiya	$C_n = m \cdot 1000/Ekv \cdot V$

Bir konsentratsiyadan boshqasiga o'tish:

foizdan molyarga	$C_m = C\% \cdot \rho \cdot 10/M$
molyardan foizga:	$C\% = C_m \cdot M/\rho \cdot 10$
foizdan normalga:	$C_n = C\% \cdot \rho \cdot 10/ekv$
normaldan foizga:	$C\% = C_n \cdot ekv/\rho \cdot 10$

Foiz (prosent) konsentratsiya

Har qanday eritmaning 100 grammida erigan moddaning grammi miqdorini ko'rsatuvchi qiymat foiz (prosent) konsentratsiya deyiladi. Eritma konsentratsiya quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$C\% = \frac{m_{\text{mod ula}}}{m_{\text{eritma}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{mod ula}}}{m_{\text{eritvchi}} + m_{\text{mod ula}}} \cdot 100\%$$

Ko'pchilik hollarda bu konsentratsiyani "massa ulushi" holida.



$$w = \frac{m_{\text{modda}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{m_{\text{modda}}}{m_{\text{erituvchi}} + m_{\text{modda}}};$$

adi. Uning ma'nosi — eritma umumiy og'irligining qanchasi erigan da hissasiga to'g'ri kelishini bildiradi.

Ma'lumki, eritmalar suyuq holda bo'lgani uchun uning miqdori hajm da (V , ml, sm^3 , litr) ifodalanadi. Bunday hollarda eritma massasi hajmi o'rtasidagi bog'lanish $m = \rho \cdot V$ holida yoziladi.

Bu yerda ρ — eritmaning zichligi, ya'ni 1 ml (sm^3) hajmdagi erit- ning og'irligi deyiladi va g/ml, g/ sm^3 , kg/ m^3 da o'lchanadi.

Masalan, 98% li H_2SO_4 eritmasining zichligi 1,84 g/ sm^3 ga teng da shu eritmaning 1 sm^3 yoki 1 millilitri 1,84 g massaga ega, deb anish kerak. Yuqoridagilarni e'tiborga olsak, eritmaning foiz kon- ratsiyasi (yoki erigan moddaning massa ulushi — ω):

$$C_{\%} = \frac{m_{\text{modda}}}{V \cdot \rho} 100\% \quad \text{yoki} \quad \omega = \frac{m_{\text{modda}}}{V \cdot \rho} \text{ bo'ladi.}$$

Faraz qilaylik, osh tuzi eritmasining konsentratsiyasi 15% ($\omega=0,15$) sin. Buning ma'nosi, osh tuzi eritmasining 100 grammi 15 g NaCl qismi va 85 g H_2O dan tashkil topgan. Boshqacha aytganda, shu nining 1 og'irlik qismi (g) da 0,15 og'irlik qism (g) NaCl va 0,85 lik qism (g) H_2O bor.

Masala. 300 g suvda 45 g CaCl_2 tuzi erigan. Shu eritmaning foiz ntratsiyasi va CaCl_2 ning massa ulushini hisoblang.

Berilgan:

$$m_{\text{erituvchi}} = 300 \text{ g}, \quad m_{\text{modda}} = 45, \\ C = ? \quad \omega = ?$$

Yechish:

300 g suvda 45 g CaCl_2 eritilib, 345 g eritma hosil qilinganligi

45 g eritmada $\rightarrow$ 45 g CaCl_2 erigan bo'lsa,

100 g eritmada $\rightarrow x$ g CaCl_2 erigan,

$$x = \frac{45}{345} 100 = 13,07\%. \quad \text{yoki} \quad C = 13,07 \%$$

Formula bo'yicha hisoblansa,

$$\% = \frac{m_{\text{modda}}}{m_{\text{eritma}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{modda}}}{m_{\text{suv}} + m_{\text{CaCl}_2}} \cdot 100\% =$$

$$= \frac{45}{300 + 45} \cdot 100\% = 13,07\%$$

v) massa ulushini hisoblaymiz:

$$\omega = \frac{m_{\text{modda}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{45}{(300+45)} = 0,1307$$

2-masala. 250 ml 20% li ($\rho = 1,27 \text{ g/sm}^3$) H_2SO_4 eritmasida erigan sulfat kislotalari va suvning massasini hisoblang:

Berilgan:

$$V_{\text{eritma}} = 250 \text{ ml}$$

$$C\% = 20\%$$

$$\rho = 1,27 \text{ g/sm}^3$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = ? \quad m_{\text{suv}} = ?$$

Yechish: a) eritmaning umumiy og'irligini hisoblaymiz:

$$m_{\text{eritma}} = V_{\text{eritma}} \cdot \rho = 250 \cdot 1,27 = 317,5 \text{ g}$$

b) eritmaning 20% li ekanligiga asoslanib, proporsiya tuzamiz:

$$100 \text{ g eritmada} \rightarrow 20 \text{ g } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ erigan bo'lsa,}$$

$$317,5 \text{ g eritmada} \rightarrow m_{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{ erigan}$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{20}{100} 317,5 = 63,5 \text{ g}$$

v) formula asosida hisoblash:

$$C\% = \frac{m_{\text{modda}}}{V \cdot \rho} = 100\%$$

$$m_{\text{modda}} = \frac{C\% \cdot V \cdot \rho}{100\%} = \frac{20 \cdot 250 \cdot 1,27}{100} = 63,5 \text{ g}$$

eritmada suvning massasi:

$$m_{\text{eritma}} = m_{\text{erituvchi}} + m_{\text{modda}} \text{ ga asosan}$$

$$m_{\text{erituvchi}} = m_{\text{eritma}} - m_{\text{modda}} = 317,5 - 63,5 = 254 \text{ g}$$

Molyar konsentratsiya

Eritmalarning molyar, normal konsentratsiyalari va titr hajmiy konsentratsiyalar qatoriga kirib, eritmaning hajm birligida erigan modda miqdori ifodalaydi.

1 litr (1000 ml) eritmada erigan moddaning "mol" lar miqdorini erituvchi qiymat **molyar konsentratsiya** deyiladi. Uni hisoblash formulasi:

$$C = \frac{n_{(\text{mol})}}{V_{(\text{litr})}} \text{ bo'}$$

Yerda: V — eritmaning hajmi, n — V hajmga ega bo'lgan eritmada erigan moddaning miqdori, ya'ni "mol" lar soni. Agar $n = m/M$ va hajmni ifodalasak, u holda:

$$C = \frac{m_{(\text{modda})}}{M \cdot V_{(\text{mol})}} \cdot 1000 \text{ bo'ladi}$$

Yerda: m_{modda} — erigan modda massasi, g; M — erigan moddaning molar massasi, g/mol.
Masalan, H_2SO_4 ning 0,5 mol/l konsentratsiyali eritmasi deyilsa, har bir litr eritmada 0,5 mol (yoki $0,5 \cdot 98 = 49 \text{ g}$) H_2SO_4 erigan, degan ma'noni bildirish kerak.

3-masala. 300 ml eritmada 6 g NaOH erigan. Shu eritmaning molyar konsentratsiyasini hisoblang.

Berilgan:

$$V_{\text{eritma}} = 300 \text{ ml}$$

$$m_{\text{NaOH}} = 6 \text{ g}$$

$$M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g/mol}$$

$$C_M = ?$$

Yechish: a) proporsiya usuli bilan hisoblash.

300 ml eritmada $\rightarrow 6 \text{ g NaOH} \rightarrow 6/40=0,15 \text{ mol erigan.}$

Agar 300 ml eritmada $\rightarrow 0,15 \text{ mol NaOH bo'lsa, shu eritmada}$
1000 ml da $\rightarrow C_M$ bo'ladi.

Bundan:

$$C_M = \frac{0,15 \text{ mol} \cdot 1000 \text{ ml}}{300 \text{ ml}} = 0,5 \text{ mol} = 0,5 M.$$

Masala. 0,125 molyar eritma hosil qilish uchun 250 ml eritma
necha gramm $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ eritish kerak?

Berilgan:

$$C_M = 0,125 \text{ mol/l}$$

$$V = 250 \text{ ml}$$

$$M_{\text{modalo}} = 250 \text{ g/mol}$$

$$m_{\text{modalo}} = ?$$

Yechish: a) formula asosida hisoblash:

$$C_M = \frac{m_{\text{modalo}} \cdot 1000}{M_{\text{modalo}} \cdot V} \text{ dan}$$

$$m_{\text{modalo}} = \frac{C_M \cdot M \cdot V}{1000} = \frac{0,125 \cdot 250 \cdot 250}{1000} = 7,81 \text{ g}$$

Demak, 7,81 g mis kuporosi kerak.

Normal (ekvivalent) konsentratsiya

Har qanday eritmaning 1 litri (1000 millilitr) da erigan moddaning ekvivalentlar soni (ekvivalent miqdori) ni bildiruvchi qiymatga **normal konsentratsiya** deyiladi. Normal konsentratsiyani hisoblash formulalari:

$$C_H = \frac{n(g.ekv)}{V} \quad \text{yoki} \quad n(g.ekv) = \frac{m_{modda}}{E_{modda}} \quad \text{va}$$

$V = 1000$ ml ekanligini e'tiborga olsak:

$$C_H = \frac{m_{modda} \cdot 1000}{E_{modda} \cdot C(ml)} (H)(g.ekv/l) \text{ bo'ladi}$$

Ushbu konsentratsiyani hisoblash uchun "Kimyoning asosiy qonunlari" mavzusidagi murakkab moddalarning ekvivalentini hisoblash formulalarini bilish shart.

Agar NaOH ning 0,25 n li eritmasi deyilsa, shu eritmaning har 1 lida 0,25 g.ekv (yoki $0,25 \cdot 40 = 10$ g) NaOH erigan, degan ma'noni anglatish lozim.

Masala. 11,2 g KOH 500 ml eritmada eritilgan. Shu eritmaning normal konsentratsiyasini hisoblang. Bu eritmaga 250 ml suv qo'shilsa, eritma konsentratsiyasi qanday bo'ladi?

Berilgan:

$$M_{KOH} = 11,2g$$

$$V = 500ml$$

$$E_{KOH} = 250g/mol$$

$$C_H^1 = ? C_H^2 = ?$$

Yechish: normal konsentratsiya formulasi asosida hisoblash:

$$C_H = \frac{m_{modda} \cdot 1000}{E_{KOH} \cdot V};$$

Bu formula asosida hisoblashda:

$$E_{\text{KOH}} = \frac{M_{\text{KOH}}}{n_{\text{KOH}}} = \frac{56}{1} = 56 \text{ g/ekv bo'ladi. Qiymatlarini o'rniga qo'ysak,}$$

$$C_H^1 = \frac{11,2 \cdot 1000}{56 \cdot 500} = 0,4 \text{ mol - ekv/l} = 0,4n$$

Eritmaga 250 ml suv qo'shilsa, umumiy hajm $500+250=750$ ml bo'ladi. Modda massasi 11,2 g ligicha qoladi. Shunga asosan:

$$C_H^2 = \frac{11,2 \cdot 1000}{56 \cdot 750} = 0,266 \text{ mol - ekv/l} = 0,266 n \text{ bo'ladi.}$$

Molyar va normal konsentratsiyalarning formulalaridan ko'rinib turibdiki, eritmaning konsentratsiyalari eritma hajmiga teskari proporsionaldir, ya'ni ***aniq konsentratsiyali eritmaning hajmi avvalgisiga nisbatan necha marta ortsa, eritma konsentratsiyasi shuncha kamayadi***.

Aksariyat hollarda molyar va normal konsentratsiyalar foiz konsentratsiya bilan almashtirilishi yoki aksincha masalalarni hal etishga to'g'ri keladi. Shunday hollarda quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

$$C_M = \frac{C\% \cdot V \cdot \rho \cdot 1000}{100 - V \cdot M} = \frac{C\% \cdot \rho \cdot 10}{M}$$

$$\text{Bundan, } C\% = \frac{C_M \cdot E}{\rho \cdot 10}$$

Bu yerda, E — erigan moddaning ekvivalent massasi.

Eritmaning titri

Eritmaning 1 millilitr (sm^3)da erigan moddaning gramm miqdorini ko'rsatuvchi qiymatga ***eritmaning titri*** deyiladi.

Yuqoridagi qoidaga ko'ra, xlorid kislota (HCl) eritmasining titri 0,00365 g/ml ga teng deylik. Bu eritmaning 1 ml da 0,00365 g HCl erigan degan ma'noni anglatadi.

Umuman, eritmaning titri bilan molyar va normal konsentratsiyalarni o'rtasida quyidagicha bog'lanish bor:



$$T \cdot \frac{m_{\text{modda}}}{V_{\text{eritma}}} = \frac{C_H \cdot E}{1000} \text{ va } T = \frac{C_M \cdot}{100}$$

Molyal konsentratsiya

Molyal konsentratsiya odatda kam ishlatiladigan konsentratsiya turidir. Molyal konsentratsiya deb, 1000 g erituvchida erigan moddaning "mol" lar soniga aytiladi va $M=n/1000$ g formula bilan hisoblanadi. 1000 g erituvchida 1 mol modda erigan bo'lsa, bu eritmaning konsentratsiyasi "1 molyalli" deyiladi.

Savollar

1. Dispers sistema, disperslik tushunchalarini izohlang.
2. Eruvchanlik koeffitsiyenti nima?
3. To'yinmagan, to'yingan, o'ta to'yingan eritmalarga izoh bering.
4. Molyar, normal konsentratsiyalarni izohlang.
5. Erigan moddaning massa ulushi va eritma titri deganda nimani nazarsiz?
6. Eritmalarda diffuziya va osmos hodisalarining mohiyatini tushuntiring.
7. Eritmalarning muzlash va qaynash temperaturalari deganda nimani nazarsiz?
8. Krioskopik va ebullioskopik konstantalarning ma'nosini tushuntiring.
9. Gazlarning eruvchanligi to'g'risidagi Genri qonunini izohlang.

XIII bob

ELEKTROLITLAR ERITMALARI

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *elektrolit, elektrolitik dissotsilanish, izotonik koeffitsiyent, kation, anion, dissotsilanish darajasi, dissotsilanish doimiysi, kuchli va kuchsiz elektrolitlar, suyultirish qonuni, aktivlik, aktivlik koeffitsiyenti, ion kuchi, suvning ion ko'paytmasi, pH, pOH haqida tushuncha, pH shkalasi.*

XIII.1. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi

Ko'pchilik tajribalar shuni ko'rsatadiki, aksariyat kislota, asos va tuzlarning eritmaları osmotik bosimi, muzlash temperaturasining pasayishi, qaynash temperaturasining ortishi, eritma bug' bosimining nisbiy pasayishi ularning nazariy hisoblangan qiymatiga nisbatan ikki, uch va bir necha marta yuqori bo'ladi.

Buning sababi shuki, bu moddalarning suvli eritmasida (shuningdek, suyuqlanmasida) zarrachalarning soni 2, 3, ... 5 marta ko'p, ya'ni kislota, asos tuzlar eriganda (yoki qattiq holdan suyuqlanmaga o'tganda) musbat va manfiy zaryadli ionlarga ajraladi:



Moddalarni qarama-qarshi zaryadli ionlarga parchalanishi elektrolitik dissotsilanish (ajralish) deyiladi. Eritmada va suyuqlanmada musbat va manfiy zaryadli ionlarga ajralib elektr tokini o'tkazish xossasiga ega bo'lgan moddalarni **elektrolitlar** deyiladi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, NaCl dissotsilansa, uning 1 molekulasida 2 ta ionga, MgCl₂ — 3 ta (1 ta Mg²⁺ va ikkita Cl⁻) ionlarga, Al₂(SO₄)₃ esa — 5 ta (2 ta Al³⁺, 3 ta SO₄²⁻)

Shved olimi S. Arrenius elektrolit eritmalarining elektr tokini o'tkazish xossalarini o'rganib elektrolitik dissotsilanish nazariyasini yaratdi. Uning nazariyasiga ko'ra:


— har qanday elektrolit suvli eritmada yoki suyuqlanmada musbat va manfiy zaryadli ionlarga ajraladi:



— musbat zaryadli ionlar — kation (elektr toki manbaining manfiy qutbi — katodga tortiluvchi ion). Bular H⁺, NH₄⁺ va barcha ularning ionlaridir.

— Manfiy zaryadli ionlar — anion (elektr toki manbaining musbat anodga tortiluvchi ion) deb aytiladi. Bu ionlarga OH⁻ va barcha kislota ularning ionlari kiradi.

Kation va anionlar eritmalar va suqlanmalarda elektr tashuvchi vazifasini o'tadilar va shuning uchun elektrolitlar eritma va suyuqlanmalari elektr o'tkazuvchanlik xossasiga ega bo'ladi. Elektrolitlar ikkinchi tur o'tkazgichlar deb aytiladi.



16-rasm. KCl kristallining suvda erishi.

Elektrolitlarning suvda dissotsilanish mexanizmi molekula-aro ta'sirning induksion, oriyentatsion turlari va eritma hosil bo'lishining nazariyasidan kelib chiqadi.

Suvda erigan elektrolit molekulasida ionlardan yoki qutbli molekulalardan iborat bo'lgani uchun suv molekulari bilan elektrolit molekulari (yoki kristall panjaradagi ionlar) o'rtasida oriyentatsion ta'sir yuzaga keladi. Bu ta'sir natijasida kristall panjaraning "tugun" larida joylashgan ionlar o'rtasidagi elektrostatik tortishuv kuchlari (ion bog'lanish) kuchsizlanadi va elektrolit musbat va manfiy ionlarga ajraladi (16-rasm).

Agar modda molekulasida qutbli bo'lsa, suv molekularining oriyentatsion ta'siri tufayli bunday molekulaning qutbliligi yanada ortadi va natijada elektrolitik dissotsilanadi, musbat va manfiy ionlar hosil bo'la-

Keltirilgan sxemadan ko'rinib turibdiki, eritmaga o'tgan har bir kation yoki anion erkin holda bo'lmaydi. Bu ionlar erituvchi suv molekulari bilan qurshab olingan, ya'ni gidratlangan holda bo'ladi. Shu sababli bu ionlarni



ko'rinishida yozish kerak.

Masalan: kislotalar dissotsilanganda kation sifatida H^+ ionlarini va anion — kislota qoldig'ini hosil qiladi:



hosil bo'lgan vodorod ionining gidrati ($\text{H}^+\text{H}_2\text{O}$) ni H_3O^+ — gidroksoniy ioni deyiladi. H^+ ni gidratlovchi suv molekularining soni 1 dan ortiq bo'lishi ham mumkinligi aniqlangan.

Lekin reaksiya tenglamalarini tuzishda bunday yozuv usuli ortiqcha murakkabliklar va behuda qiyinchiliklar tug'dirishi sababli ionli tenglamalarda suv molekulari yozilmaydi.

Shuni unutmash kerakki, faqatgina suv molekulari dissotsilovchi bo'libgina qolmay, balki ko'pchilik suyuq holdagi moddalar (HNO_3 , HCOOH — chumoli kislotasi, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ — etil spirti, NH_3 — ammiak) ham ionlovchi moddalar (erituvchilar) qatoriga kiradi.

XIII.2. Dissotsilanish darajasi va dissotsilanish doimiysi

S. Arreniusning nazariyasiga binoan elektrolitik dissotsilanish jarayoni qaytar reaksiyadir. Erituvchida eritilgan yoki suyuqlanmadagi elektrolit molekularining hammasi ham ionlarga ajralib ketmaydi.

Elektrolitlarning dissotsilanishini miqdoriy ifodalash uchun dissotsilanish darajasi tushunchasi (α -alfa) kiritilgan. Dissotsilanish darajasi — umuman eritilgan elektrolit molekularidan qancha qismi ionlarga ajralganini ko'rsatadi va ionlangan molekular sonining (n) umumiy eritilgan elektrolit molekulari soni (N) ga nisbatiga tengdir:

$$\alpha = n/N$$

ning qiymati o'lchov birligisiz (0–1) va foizlarda (0–100%) ifodalanadi.

Dissotsilanish darajasining qiymatiga ko'ra elektrolitlarni kuchli, o'rta kuchli va kuchsiz elektrolitlarga ajratiladi.

Agar elektrolitning dissotsilanish darajasi $\alpha < 30\%$ (0,3) bo'lsa — kuchsiz elektrolit, $30 < \alpha < 60\%$ ($0,3 < \alpha < 0,6$) bo'lsa, o'rta kuchli elektrolit, $\alpha > 60$ (0,6) bo'lsa — kuchli elektrolit deyiladi.

Dissotsilanish darajasining qiymati elektrolitning, hamda erituvchining tabiatiga, temperaturaga va eritma konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi.

8-jadval

Elektrolitlarning 0,1 n eritmalaridagi
dissotsilanish darajalari (α)

Elektrolit	α , %	Elektrolit	α , %
HCl	95	NaOH	95
KOH	90	HNO_3	90
$\text{Ba}(\text{OH})_2$	77	H_2SO_4	60
HF	8	NH_4H	1,4
H_2CO_3	0,17	HCN	0,17

Kuchsiz elektrolitlarning dissotsilanishini yanada aniqroq tavsiflash uchun dissotsilanish doimiysi tushunchasi kiritilgan. Har qanday kuchsiz elektrolit uchun dissotsilanish qaytar reaksiya $\text{Kat}_n\text{An}_m \rightleftharpoons n\text{Kat}^+ + m\text{An}^-$ bo'lgani uchun muvozanat doimiysi ifodasi (K_{muz}) kelib chiqadi:

$$K_{\text{muz}} = K_{\text{dis}} = \frac{[\text{Kat}^+]^n [\text{An}^-]^m}{[\text{Kat}_n\text{An}_m]}$$

bunda, $[\text{Kat}^+]$ — kationning muvozanat konsentratsiyasi (mol/l); $[\text{An}^-]$ — anionlarning muvozanat konsentratsiyasi (mol/l); $[\text{Kat}_n\text{An}_m]$ — elektrolitning muvozanat konsentratsiyasi (mol/l).

Bu ifodani kuchsiz elektrolit (CH_3COOH — sirka kislotasi) uchun yozsak:



$$K_{\text{dis}} = K_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{[\text{H}^+] [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 1,78 \cdot 10^{-5}$$

Dissotsilanish doimiysining ma'nosi — ayni temperaturada muvozanatda turgan ionlar konsentratsiyalari ko'paymasining muvozanatdagi elektrolit konsentratsiyasiga nisbati o'zgarmas sonidir.

K_{dis} qiymati erituvchining, elektrolitning tabiatiga va temperaturaga bog'liq bo'lib, eritma konsentratsiyasiga bog'liq emas.

K_{dis} — qiymati qanchalik katta bo'lsa, elektrolit shunchalik kuchli hisoblanadi. Agar $HCOOH$ va CH_3COOH larni o'zaro solishtirsak:

$K_{HCOOH} = 1,8 \cdot 10^{-4}$ va $K_{CH_3COOH} = 1,78 \cdot 10^{-5}$. Bu chumoli kislotasi sirka kislotaga nisbatan 10 marta kuchli ekanligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ko'pchilik kislota va asoslar bosqichli dissotsilanadi. Fosfat kislota (H_3PO_4) ning uch bosqichli dissotsilanishi uchun 3 xil K_{dis} qiymati mavjud, ya'ni har bir bosqich o'ziga xos dissotsilanish doimiysi bilan tavsiflanadi:

I bosqich: $H_3PO_4 \leftrightarrow H^+ + H_2PO_4^-$

$$K_{dis1} = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = 8 \cdot 10^{-2}$$

II bosqich: $H_2PO_4^- \leftrightarrow H^+ + HPO_4^{2-}$

$$K_{dis2} = \frac{[H^+][H_2PO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 6 \cdot 10^{-8}$$

III bosqich: $HPO_4^{2-} \leftrightarrow H^+ + PO_4^{3-}$

$$K_{dis3} = \frac{[H^+][PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} = 1 \cdot 10^{-12}$$

Bunday elektrolitlarning umumiy dissotsilanish doimiysi

$$K_{H_3PO_4} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \frac{[H^+]^3[PO_4^{3-}]}{[H_3PO_4]} \text{ bo'ladi.}$$

Ko'p negizli elektrolitlar uchun dissotsilanish bosqichi tartibi ortib borishi bilan K_{dis} qiymati kamayib boradi, ya'ni ionning dissotsilanuvchanligi kamayib boradi: $K_1 > K_2 > K_3 \dots > K_n$.

Kuchsiz elektrolitlarning dissotsilanish darajasi (α), dissotsilanish doimiysi (K_{dis}) va eritmaning konsentratsiyalari (C) o'rtasida o'zaro bog'lanish mavjud. Bu bog'lanishni sirka kislotasi eritmasi misolida ko'rib chiqaylik:



$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$ ga ko'ra kislota to'liq dissotsilanmaydi. Muvozanatda turgan ionlarning va dissotsilanmay qolgan kislota konsentratsiyasi quyidagicha bo'lsin:

$$[H^+] = C \cdot \alpha; [CH_3COO^-] = C \cdot \alpha;$$

$$[CH_3COOH] = (1 - \alpha) \cdot C.$$

Bu qiymatlarni K_{dis} formulasiga qo'ysak:

$$K_{dis} = \frac{(C \cdot \alpha)(C \cdot \alpha)}{(1 - \alpha)C} = \frac{(C \cdot \alpha)^2}{(1 - \alpha)C} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} C \text{ bo'ladi.}$$

Agar kuchsiz elektrolitlar uchun $\alpha \ll 1$ ekanligini e'tiborga olsak, $(1 - \alpha) \approx 1$ bo'ladi. Shunga ko'ra, $K_{dis} = \alpha^2 C$ kelib chiqadi.

Shundan $\alpha = \sqrt{K_{dis}/C}$ bo'lib, uni *Ostvaldning suyultirish qonuni*

matematik ifodasi deyiladi. Boshqacharoq aytganda, **kuchsiz elektrolitning dissotsilanish darajasi shu elektrolit dissotsilanish doimiysining kvadrat ildiziga to'g'ri proporsional bo'lib, elektrolitning molyar konsentratsiyasi kvadrat ildiziga teskari proporsionaldir.** Bu formulaning ahamiyati shundan iboratki, kuchsiz elektrolitning dissotsilanish darajasini oshirish uchun eritmani suyultirish, ya'ni erituvchi miqdorini kamaytirish bilan eritma konsentratsiyasini kamaytirish kerak.

Shu qoidaning isboti sifatida quyidagi ma'lumotlarni keltirish mumkin. Sirka kislotasining turli konsentratsiyalari uchun 25°C dagi α ning qiymatlari:

C_m	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001
$\alpha, \%$	0,95	1,4	1,9	4,2	6,0	12,4

XIII.3. Ion almashinish reaksiyalari

Barcha elektrolitlar o'zaro aralashtirilsa yoki ularga boshqa moddalar qo'shilsa **ion almashinish reaksiyalari** sodir bo'ladi.

Ion almashinish reaksiyalari quyidagi hollarda amalga oshadi, ya'ni barcha moddalar ionli bo'lsin.

Kam dissotsilanuvchi moddalar yoki suv hosil bo'lsa:

a) $\text{HNO}_3 + \text{KOH} = \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (molekulyar tenglama).

Bu reaksiyani ionli ko'rinishda yozamiz:



(to'liq ionli tenglama)

Tenglamaning ikkala tomonida ham mavjud bo'lgan ionlarni qisqartirib yozamiz. Chunki ion almashinish jarayonida ular ishtirok etmaydi:



Bu tenglama shu reaksiyaning mohiyatini, ya'ni reaksiya aynan qanday ionlar o'rtasida borishini ko'rsatadi.

H^+ va OH^- ionlarining o'zaro birikib H_2O ($\text{pH} = 7$) hosil qilish reaksiyasi *neytrallanish reaksiyalari* deyiladi. Bu reaksiyalardan foydalanib eritmalardagi kislota, ishqor va gidrolizlanadigan tuzlar (Na_2CO_3 , NaHCO_3 , ...) miqdori aniqlanadi. Bu usul neytrallash yoki kislota-asid titrlash usullari deyiladi.


b) $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ reaksiyasi
 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- = \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ yoki
 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ bo'ladi.
 (kuchsiz elektrolit)

d) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCl}$ reaksiyasi
 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{Cl}^- = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
 yoki $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ bo'ladi.
 (kuchsiz elektrolit)

2. Kam eriydigan modda (cho'kma)lar hosil bo'lsa yoki cho'kma erishi

a) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$ (cho'kma hosil bo'lishi)
 $\text{Ba}^{+2} + 2\text{Cl}^- + 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{-2} = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^-$
 $\text{Ba}^{+2} + \text{SO}_4^{-2} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$

b) $\text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{CO}_3 (\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow)$ (cho'kma erishi)



d) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
 $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}^{+2} + 2\text{HCO}_3^-$

e) $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{HCl}$
 $\text{Ba}^{+2} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}^+$

3. Gazsimon moddalar hosil bo'lsa:

a) $\text{Na}_2\text{S} + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{S} \uparrow$
 $2\text{Na}^+ + \text{S}^{-2} + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- = 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{S} \uparrow$
 $\text{S}^{-2} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{S} \uparrow$

b) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 $\text{CO}_3^{-2} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

d) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} = \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$





4. Kompleks birikma (ion)lar hosil bo'lsa:

a) AgCl — yomon eriydigan modda konsentrlangan HCl da eriydi, chunki bu eritmada quyidagi ion almashinish reaksiyasi boradi:



5. Shuningdek, HgI_2 va KJ eritmaları aralashtirilganda ham:



$$K_{\text{dis}} = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = 1,8 \cdot 10^{-16} \quad (t^* = 20^\circ\text{C}) \text{ bo'ladi.}$$

Ko'rinib turibdiki, suvda 1 molekula H_2O dissotsilansa, teng miqdordagi $\text{H}^+(\text{H}_3\text{O}^+)$ va OH^- ionlari hosil bo'ladi, ya'ni suvda doimo $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ bo'ladi.

Aksariyat hollarda suvli eritmalaridagi H^+ va OH^- ionlarining miqdori bilish zarur. Shu boisdan suvdagi H^+ va OH^- ionlari miqdorini K_{dis} formula asosida hisoblash mumkin:

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_{\text{dis}}[\text{H}_2\text{O}] = K_w$$

bo'lib, K_w — *suvning ion ko'paytmasi* deyiladi va suvda doimo H^+ va OH^- ionlari konsentratsiyalarining ko'paytmasi ayni temperaturada o'zgarmas son.

Agar suvda erigan suvning molyar konsentratsiyasini hisoblasak: 1 litr $\text{H}_2\text{O} = 1000 \text{ g } \text{H}_2\text{O}$ bo'ladi, chunki $\rho = 1 \text{ g/sm}^3$.

$$C_m = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} \cdot 1000}{M \cdot V} = \frac{1000 \cdot 1000}{18 \cdot 1000} = 55,56 \text{ mol/l.}$$

Demak, suv eritmasidagi suvning molyar konsentratsiyasi 55,56 mol/l ekan. Suvning juda kam miqdori ionlanishini e'tiborga olsak, muvozanatdagi suvning konsentratsiyasi $[\text{H}_2\text{O}] = C_m = 55,56 \text{ mol/l}$ bo'ladi. Bundan, $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1,8 \cdot 10^{-16} \cdot 55,56 = 1 \cdot 10^{-14}$ kelib chiqadi. Suvda $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ ligini hisobga olsak, u holda

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1 \cdot 10^{-14}} = [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l} \text{ kelib chiqadi.}$$

Ushbu qiymatlarga asosan suvda doimo $[\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$ va $[\text{OH}^-] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$ bo'ladi. Agar suvda biror modda eritilsa va bu modda tarkibiy qismi suv bilan o'zaro almashinuv reaksiyalarga kirishsa, $[\text{H}^+] \neq [\text{OH}^-]$ bo'lib qoladi. Bu hollarda eritmadagi H^+ va OH^- ionlari miqdori quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{[\text{OH}^-]} \text{ va } [\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{[\text{H}^+]}$$

Ko'p hollarda H^+ — ionlarining miqdori shu eritmada borayotgan reaksiyalarning asosiy tavsifnomasi hisoblanadi. Bunday hollarda vodorod ionlari miqdorini o'nli kasrlar holida ifodalash juda ko'p noqulayliklarni

chiqaradi. Shuning uchun amalda oson bo'lsin uchun vodorod ionlari miqdorining ko'rsatkichi (pH) tushunchasi qabul qilingan. *Eritmaning pH deb, shu eritmadagi H^+ -ionlari konsentratsiyasining logarifmining manfiy ishora bilan olingan qiymatiga aytiladi:*

$$\text{pH} = \lg[\text{H}^+] = -\lg C_{\text{H}^+};$$

o'ziga, distillangan suvning pH i: $\text{pH} = -\lg 1 \cdot 10^{-7} = -\lg 1 + (-7 \cdot \lg 10) = -(-7 \cdot 1) = 7$ bo'ladi.

Shunday qilib, shuningdek, OH^- ionlari ko'rsatkichi ham mavjud (pOH) bo'lib, $\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = -\lg 1 \cdot 10^{-7}$ bo'ladi.

Doimo $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ ga teng. Bundan, $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$ yoki $\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ bo'ladi.

Eritmalarning pH i asosiy, muhim kattalik bo'lib, uni eritmaga ta'sir qog'oz ta'sir ettirib aniqlanadi. Indikator qog'oz eritmadagi H^+ yoki $[\text{OH}^-]$ ning qiymatiga qarab turli rangga kiradi. Har bir rangga pH ning aniq qiymatlari mos keladi. Bunga pH - shkala deyiladi.

Asidli muhit $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ $\text{pH} < 7$						Neytral muhit		Ishqoriy muhit $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ $\text{pH} > 7$					
1	2	3	4	5	6	← 7 →	8	9	10	11	12	13	14

Ushbu shkaladan foydalanib eritmalarining muhiti to'g'risida xulosa chiqariladi.

Masala: 0,1 m CH_3COOH eritmasidagi $[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ ni va eritma pH, $[\text{H}^+]$ va $[\text{OH}^-]$ larini hisoblang:

Eritma:

$$C_m = 0,1 \text{ mol/l}$$

$$K_a = 1,78 \cdot 10^{-5}$$

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = ? \text{ pH, pOH} = ?$$

Yechish: a) eritmadagi $[\text{H}^+]$ va $[\text{OH}^-]$ qiymatlarini hisoblaymiz: $[\text{H}^+] = ?$ bo'ladi.

$$\text{Bu yerda, } \alpha = \sqrt{K_a / C_m} = \sqrt{1,78 \cdot 10^{-5} / 0,1} = 1,3310^{-3}$$

bu bir molekula CH_3COOH ionlanganda hosil bo'ladigan H^+ - ioni soni:

$$K_{\text{av}} = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} = 1,8 \cdot 10^{-16} \text{ (} t^{\circ} = 20^{\circ}\text{C) bo'ladi.}$$

Ko'rinib turibdiki, suvda 1 molekula H_2O dissotsilansa, teng miqdordagi H^+ (H_3O^+) va OH^- ionlari hosil bo'ladi, ya'ni suvda doimo $[H^+] = [OH^-]$ bo'ladi.

Aksariyat hollarda suvli eritmalaridagi H^+ va OH^- ionlarining miqdorini bilish zarur. Shu boisdan suvdagi H^+ va OH^- ionlari miqdorini K_w formula asosida hisoblash mumkin:

$$[H^+][OH^-] = K_w [H_2O] = K_w$$

bo'lib, K_w — *suvning ion ko'paytmasi* deyiladi va suvda doimo H^+ va OH^- ionlari konsentratsiyalarining ko'paytmasi ayni temperaturada o'zgarmas sonidir.

Agar suvda erigan suvning molyar konsentratsiyasini hisoblasak: 1 litr $H_2O = 1000 \text{ g } H_2O$ bo'ladi, chunki $\rho = 1 \text{ g/sm}^3$.

$$C_m = \frac{m_{H_2O} \cdot 1000}{M \cdot V} = \frac{1000 \cdot 1000}{18 \cdot 1000} = 55,56 \text{ mol/l.}$$

Demak, suv eritmasidagi suvning molyar konsentratsiyasi 55,56 mol/l ekan. Suvning juda kam miqdori ionlanishini e'tiborga olsak muvozanatdagi suvning konsentratsiyasi $[H_2O] = C_m = 55,56 \text{ mol/l}$ bo'ladi. Bundan, $K_w = [H^+][OH^-] = 1,8 \cdot 10^{-16} \cdot 55,56 = 1 \cdot 10^{-14}$ kelib chiqadi. Suvda $[H^+] = [OH^-]$ ligini hisobga olsak, u holda

$$[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1 \cdot 10^{-14}} = [H^+] = [OH^-] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l kelib chiqadi.}$$

Ushbu qiymatlarga asosan suvda doimo $[H^+] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$ va $[OH^-] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/l}$ bo'ladi. Agar suvda biror modda eritilsa va bu modda tarkibiy qismi suv bilan o'zaro almashinuv reaksiyalariga kirishsa, $[H^+] \neq [OH^-]$ bo'lib qoladi. Bu hollarda eritmadagi H^+ va OH^- ionlarning miqdori quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi:

$$[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{[OH^-]} \text{ va } [OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{[H^+]}$$

Ko'p hollarda H^+ — ionlarining miqdori shu eritmada borayotgan reaksiyalarning asosiy tavsifnomasi hisoblanadi. Bunday hollarda vodorod ionlari miqdorini o'nli kasrlar holida ifodalash juda ko'p noqulayliklarni



chiqaradi. Shuning uchun amalda oson bo'lsin uchun vodorod ion miqdorining ko'rsatkichi (pH) tushunchasi qabul qilingan.

Eritmaning pH deb, shu eritmadaagi H^+ -ionlari konsentratsiyasining logarifmining manfiy ishora bilan olingan qiymatiga aytiladi:

$$pH = \lg[H^+] = -\lg C_{H^+};$$

Bozari, distillangan suvning pH i: $pH = -\lg 1 \cdot 10^{-7} = -\lg 1 + (-7 \cdot \lg 10) = -(-7 \cdot 1) = 7$ bo'ladi.

Shunday qilib, shuningdek, OH^- ionlari ko'rsatkichi ham mavjud (pOH) bo'lib, $pOH = -\lg [OH^-] = -\lg 1 \cdot 10^{-7}$ bo'ladi.

Doimo $pH + pOH = 14$ ga teng. Bundan, $pH = 14 - pOH$ yoki $pOH = 14 - pH$ bo'ladi.

Eritmalarning pH i asosiy, muhim kattalik bo'lib, uni eritmaga qo'shilgan qog'oz ta'sir ettirib aniqlanadi. Indikator qog'oz eritmadaagi H^+ yoki OH^- ning qiymatiga qarab turli rangga kiradi. Har bir rangga pH ning aniq qiymatlari mos keladi. Bunga pH - shkala deyiladi.

Asotli muhit $[H^+] > [OH^-]$ $pH < 7$	Neytral muhit						Ishqoriy muhit $[H^+] < [OH^-]$ $pH > 7$							
1	2	3	4	5	6	← 7 →	8	9	10	11	12	13	14	

Ushbu shkaladan foydalanib eritmalarining muhiti to'g'risida xulosa chiqariladi.

Masala: 0,1 m CH_3COOH eritmasidagi $[H^+] \cdot [OH^-]$ ni va eritma pH, $[H^+]$ ni hisoblang:

Yechilgan:

$$C_m = 0,1 \text{ mol/l}$$

$$K_a = 1,78 \cdot 10^{-5}$$

$$[H^+][OH^-] = ? \text{ pH, pOH} = ?$$

Yechish: a) eritmadaagi $[H^+]$ va $[OH^-]$ qiymatlarini hisoblaymiz: $[H^+] = ?$ bo'ladi.

$$\text{Bu yerda, } \alpha = \sqrt{K_a / C_m} = \sqrt{1,78 \cdot 10^{-5} / 0,1} = 1,3310^{-3}$$

Har bir molekula CH_3COOH ionlanganda hosil bo'ladigan H^+ - ioni soni:



$n = 1$, ya'ni 1 ta H^+ ioni hosil bo'ladi.

Qiymatlarni o'rniga qo'yamiz:

$$[\text{H}^+] = 1,33 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot 1 = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

$$\text{Bundan foydalanib, } [\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-14} / 1,33 \cdot 10^{-4} = 0,752 \cdot 10^{-10} = 7,52 \cdot 10^{-11} \text{ mol/l.}$$

b) pH va pOH ni hisoblaymiz:

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = -\lg 1,33 \cdot 10^{-4} = 4 - \lg 1,33 = 4 - 0,2 = 3,8$$

$$\text{va pOH} = 14 - 3,8 = 10,2 \text{ bo'ladi.}$$

XIII.6. Indikatorlar haqida tushuncha

Eritmalarning muhitini aniqlash uchun kislota asos indikatorlari ishlatiladi. "**Indikator**" — belgi, xabar beruvchi ma'nosini bildiradi. Kislota asos indikatorlari eritmadagi H^+ yoki OH^- ionlari miqdoriga ko'ra o'z rangini o'zgartiradigan kuchsiz kislota yoki kuchsiz asos xossalari moddalaridir.

Indikatorlarning rang o'zgartirishi ular tarkibidagi $\text{H}^+(\text{OH}^-)$ ionlari ajralishi (yoki birikishi) natijasida modda tuzilishi (bog'larning tartibi joylashuvi)ning o'zgarishi bilan tushuntiriladi. Har qanday indikatorlarni HInd umumiy formulasi bilan belgilasak, rang o'zgarishiga olib keluvchi dissotsilanishi:



bunda, HInd — rangli, Ind^- — rangsiz bo'ladi, yoki HInd — rangsiz, Ind^- — rangli yoki HInd va Ind^- turli ranglarga ega bo'ladilar.

Masalan, fenoltalein indikatorlari kislotali eritmada (HInd) rangsiz, shuqoriy muhitda (Ind^-) binafsha rangga ega.

Har bir indikator uchun rang o'zgartirish pH intervali bo'lib, uni aniqlash uchun qiymati indikatorning tuzilishi, tarkibi va dissotsilanish doimiysi K_a ga bog'liq bo'ladi. Uni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\Delta \text{pH}_{(\text{ind})} = \text{p}K_{d(\text{ind})} \pm 1$$

Masalan, $\Delta \text{pH}_{(\text{ind})} = 8,3 - 9,8$ bo'lsa, metiloranj uchun $\Delta \text{pH} = 3,1 - 4,4$ teng, ya'ni metiloranj pH $\geq 4,4$ dan boshlab sariq rangli, pH $\leq 3,1$ qizil rangli bo'ladi.

Savollar

1. Elektrolit va elektrolitik dissotsilanish nima?
2. Izotonik koeffitsientning ma'nosi nimadan iborat?
3. Dissotsilanish darajasi va doimiysi nima va uning ahamiyati nimadan iborat?
4. NH_4OH , H_2CO_3 tipidagi kuchsiz elektrolitlar uchun dissotsilanish nisbati matematik ifodalarini yozing va izohlang.
5. Nima uchun konsentrlangan elektrolit eritmalarining elektr o'tkazuvchanligi kam bo'ladi?
6. Ostvaldning suyultirish qonunining mohiyati nimada?
7. Suvning ion ko'paytmasining matematik ifodasi nimani bildiradi?
8. pH va pOH nima? pH-shkaladan qanday foydalaniladi?
9. $0,01 \text{ mol/l NaOH}$ va HCl eritmalaridagi H^+ , OH^- ionlarining konsentratsiyasi, pH, pOH qiymatlarini hisoblang.
10. Agar BaCl_2 va KNO_3 , BaCl_2 va K_2CO_3 teng hajmli va teng molyarlikdagi eritmaları o'zaro aralashtirilsa, qaysi aralashmada ionlar soni ko'proq bo'ladi?
11. CaCO_3 ga HCl va H_2SO_4 eritmaları ta'sir ettirilganda, ularning qaysi biri erish to'liq bo'ladi?

XIII.7. Tuzlarning gidrolizi

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: tuzlarning gidrolizi, gidroliz mexanizmi, gidrolizlanmaydigan tuzlar, kation bo'yicha, anion bo'yicha, kation-anion bo'yicha gidrolizlanish, gidrolizlanishni kuchaytirish va kamaytirish, gidrolizning molekulyar, to'liq ionli va qisqa ionli tenglama-birgalikdagi gidroliz, gidroliz darajasi.

Tuzlar suvda (yoki boshqa erituvchilarda) eriganda suv molekulalari o'z atomlari bilan tuzning tarkibiy qismlari o'zaro almashinadi va kuchsiz elektrolit (kislota yoki asos) hosil bo'ladi. Bu hodisaga gidroliz deyiladi. Agar erituvchi suvdan boshqa modda (spirt, benzol, atseton, etanol, ...) bo'lsa, bunday reaksiyalar solvoliz deyiladi.

Gidroliz reaksiyalarini quyidagicha umumiy tenglama bilan ifodalash mumkin:





Tenglamadan ko'rinib turibdiki, tuz suvda eriganda u suv molekulari bilan reaksiyaga kirishib, yomon dissotsilanuvchi modda hosil qiladi, ya'ni gidroliz reaksiyasi natijasida eritmadagi $[\text{OH}^-]$ va $[\text{H}^+]$ ionlarini miqdori keskin o'zgaradi. Aniqrog'i gidroliz natijasida eritmaning pH o'zgaradi va bu o'zgarish har qanday tuz gidrolizining mexanizmi tushunishda, gidroliz tenglamasini tuzishda, gidroliz reaksiyalaridan amaliyotda foydalanishda asosiy ko'rsatkich hisoblanadi.

Tuzlar gidrolizining mexanizmi tuz tarkibiga kirgan metall kationi kislota qoldig'i — anionning tabiatiga, aniqrog'i, qutblanuvchanligiga bog'liq. Agar ion qanchalik kuchli qutblangan bo'lsa gidroliz shunchalik tez to'liq boradi. Umuman Kat^+ va An^- lar ishtirokida gidroliz borish jarayoni mexanizmlarini quyidagicha tasavvur etish mumkin.

Ma'lumki, har qanday kation suvli eritmada donor-akseptor ta'sir tufayli gidratlangan holda, ya'ni **akvakompleks** — $[\text{Kat}(\text{H}_2\text{O})_n]^{+}$ holida bo'ladi. Bu kompleksdagi kationning zaryadi qanchalik katta va radiusi qanchalik kichik bo'lsa, uning akseptorlik kuchi shunchalik katta, ya'ni $\text{Kat} = \text{OH}^-$ bog'i barqaror bo'ladi. Bunday kompleks tarkibidagi O—H bog' kuchli qutblanuvchanlik xossasiga egadir. Shu sababli "gidrat qobig'ida"gi $(\text{Kat} \cdot \text{H}_2\text{O} - \text{H}_2\text{O})$ suv molekulari o'rtasidagi vodorod bog'lanishi kuchli bo'ladi.

Bunday o'zaro ta'sirlashuv natijasida kation bilan bevosita bog'langan suv molekulasidagi O—H bog'i kuchsizlanib $[\text{Kat} \cdot \text{HO}^- \cdots \text{H} - \text{H}_2\text{O}]$ vodorod atomi sekinlik bilan ajraladi va "gidrat qobiq"dagi suv molekulari lasi bilan birikib H_3O^+ gidroksoniy ionini hosil qiladi. Kation esa qoldirilgan OH^- bilan kuchliroq kimyoviy bog' hosil qilib $\text{Kat}(\text{OH})_n$ - asosga aylanadi.

Ajralib chiqadigan H_3O^+ — ionlari eritmadagi $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ muvozanatni buzib, $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ bo'lishiga, ya'ni eritmada kislotali muhit pH < 7 yuzaga kelishiga olib keladi.

Bu o'zgarishlar asosan: NH_4^+ , Cu^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Pb^{2+} , Sn^{2+} , Sb^{3+} , Bi^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} ionlari ishtirokida ro'y beradi. Boshqacharoq aytganda, hosil bo'ladigan asoslar $\text{Kat}(\text{OH})_n$ qanchalik kuchsiz bo'lsa, gidroliz shunchalik oson va tez boradi. Aksariyat tuzlar tarkibiga Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Ba^{2+} kationlari va Cl^- , Br^- , NO_3^- , SO_3^{2-} , ClO_4^- , SO_4^{2-} , SiF_6^{2-} kabi anionlar kiradi. Bu ionlar suv molekulari bilan ta'sirlashganda H_2O molekularini H^+ va OH^- ionlarga ajrata olmaydilar. Shu sababli, bu ionlar birgalikda hosil qilgan tuzlar

gidrolizlanmaydi. Bu tuzlar eritmada $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ muvozanatni yoki chap tomonga siljita olmagan uchun pH o'zgarmaydi.

Ma'lumki, tuz — kislota bilan asosning o'zaro ta'siri mahsulotidir. Bunday tuzlarning gidroliz tenglamalarini tuzishda ularning qanday va qanday asosdan hosil bo'lganligiga e'tibor berish kerak.

Kuchli asos (LiOH , NaOH , KOH , RbOH , CsOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Sr}(\text{OH})_2$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$, H), va kuchsiz yoki o'rtacha kuchli kislota (HCN , H_2S , HNO_2 , H_3PO_4 , H_2CO_3 , H_2SiO_3 , HF , CH_3COOH , HCOOH) dan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi. Bu tuzlar tarkibidagi metall kationlari asos hosil qiluvchi bo'lganligi uchun ular suv molekulari bilan ta'sirlashmaydi.

Anionlarning qutblanuvchanligi yuqori bo'lgani uchun ular gidrolizda o'zaro ta'sirlashmaydi. Bunday tuzlarning gidroliz tenglamasini shunday tasavvur etish mumkin:




Agar bunday gidrolizni aniq misolda ko'radigan bo'lsak:



Bunday tuzlar suvda eriganda gidrolizlanadi (bu gidroliz amalda oxirigacha boradi) va birinchi bosqichda deyarli to'xtaydi. Agar eritma qizdirilsa, ikkinchi bosqich boradi va ikkala holda ham eritma ishqoriy muhitga ega bo'ladi (pH > 7).


Bosqichning ionli tenglamasi:




Bunday tenglamadan ko'rinib turibdiki, **kuchli asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo'lgan tuzning gidrolizi anion bo'yicha boruvchi reaksiya bo'lib, gidrolizlanmaydi.** Bunday gidrolizni eritmaga kislota qo'shib kuchaytirish, ishqor qo'shib susaytirish mumkin. Temperaturaning ortishi eritmaning suyultirilishi muvozanatni o'ngga siljitadi, ya'ni gidroliz to'liq oxirigacha borishiga olib keladi. Bu tuzlarning eritmaları doimo ishqoriy muhitli bo'ladi.

Kuchsiz asos (NH_4OH , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Ni}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Sr}(\text{OH})_2$, $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$,

Rb(OH)₃, Sn(OH)₂, Sb(OH)₃, Bi(OH)₃) lardan kuchli kislota (HBr, HI, HClO₄, H₂SO₄, HNO₃) lardan va hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi. Bu tuzlar gidrolizining umumiy tenglamasi:




Bunday tuz tarkibiga kirgan An⁻ ning qutblanuvchanligi past bo'lgan uchun suv molekullari tarkibidagi vodorodni tortib ola olmaydi. K⁺ ning qutblovliligi yuqori bo'lgani uchun suv molekullari bilan ta'riflashadi va OH⁻ ionlarini tortib, biriktirib oladi va eritmaga H⁺ ion ajralib chiqadi. Shuning uchun eritma (pH < 7) kislotali muhitga ega bo'ladi. Aniq misolda ko'rib chiqamiz:




Ko'p valentli metallarning tuzlari gidrolizlanganda II, III bosqichlarning borish ehtimolligi kamayib boradi. Shunga asosan FeCl₃ tuzi suvda eriganda III bosqich deyarli amalga oshmaydi. Agar III bosqich bo'yicha gidroliz borganda edi, FeCl₃ eritmasi tiniq sariq rangli bo'lmagan, balki qo'ng'ir rangli loyqa (zangli suv) ga aylanib qolar edi. Lekin FeCl₃ eritmasi tiniq eritma. Demak, gidroliz I yoki va II bosqich bo'yicha boradi. Aytilganlarni e'tiborga olib I va II bosqich uchun ionli tenglamalarni tuzamiz:

I bosqich uchun to'liq ionli tenglama:




II bosqich uchun:




ali tenglamalardan ko'rinib turibdiki, kuchsiz asos va kuchli kislotalardan hosil bo'lgan tuzning gidrolizi kation ishtirokida ro'y beradigan bo'lib, bu tuz tarkibidagi anion gidrolizda ishtirok etmaydi, kislotali muhitga ega bo'ladi (pH < 7). Bu gidrolizni to'liq oxiriga olib borish uchun temperaturani oshirish, eritmani suyultirish yoki eritmaga qo'shish zarur. Gidrolizni to'xtatish uchun esa eritmaga qo'shish zarur. Shu sababli ZnSO₄, SnCl₂ kabi tuzlarning eritmay tayyorlashda eritmaga mos ravishda H₂SO₄ va HCl eritmalari qo'shiladi. Hosil bo'lgan oq rangli cho'kmalar eritib yuboriladi.

Kuchsiz asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo'lgan tuzlar suvda eriganda ham, anion ham mos ravishda o'rtacha qutblovliligi va qutblanuvchanliklari uchun ikkala ion ham gidrolizda ishtirok etadi. Gidrolizlanish natijasi sifatida kuchsiz asos (cho'kma) va kuchsiz kislota hosil bo'ladi. Uning gidroliz reaksiyasining umumiy tenglamasi:



Aniq misolda ko'rib chiqaylik:




Reaksiya tenglamalaridan ko'rinadiki, kuchsiz asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo'lgan tuz ham kation, ham anion bo'yicha gidrolizlanadi. Bunday tuzlarning gidrolizi to'liq ro'y beradi. Eritmaning muhiti bo'lgan kislota va asosning K_{des} — qiymatiga, ya'ni ularning qanchalik qanday dissotsilanishiga bog'liq bo'ladi. Agar K_{des, kisl} > K_{des, asos} bo'lsa eritma kislotali muhitga (pH < 7), K_{des, kisl} < K_{des, asos} bo'lsa eritma ishqoriy muhitga (pH > 7) ega bo'ladi.

3-turdagi gidroliz reaksiyalari quyidagi hollarda ham boradi. Agar kuchsiz asos va kuchli kislotalardan hosil bo'lgan biror tuz eritmasi bo'lsa — kuchli asos va kuchsiz kislotalardan hosil bo'lgan tuz eritmasi — aralashtirilsa ikkala tuz birgalikda gidrolizga uchraydi. Birgalikda beradigan gidroliz to'liq boradigan gidroliz bo'lib, uni quyidagi ko'rib chiqaylik. Agar AlCl₃ tuzi eritmasiga Na₂S eritmasi qo'shilsa, tezda oq rangli loyqaga aylanib, qo'lansa hid chiqara boshlaydi. Uning sababi AlCl₃ va Na₂S birgalikda gidrolizlanib suvda yomon bo'lgan Al(OH)₃ va qo'lansa hidli H₂S — gazi hosil bo'ladi:



Reaksiyaning ionli tenglamasi:



Qisqa ionli tenglamasi:



Eritmaning muhiti yuqoridagi (3-tur) gidroliz reaksiyalardagi singari hosil bo'ladigan kislota yoki asosning kuchi bilan tavsiflanadi.

Gidrolizlanish jarayonlari faqatgina tuzlar ishtirokida borib qolmasdan, ba'zi (metallarning nitridlari, metallmaslarning birikmalari, PF_3 , PF_5 , PCl_3 , oddiy va murakkab efirlar, yog'lar, kraxmal va sellyuloza kabi) moddalar ham gidrolizlanadi. Bularning ayrimlari tuzlarning gidroliz singari borsa, ayrimlari hech qanday elektrolit xossasiga ega bo'lmagan moddalarni hosil qiladi. Bunday hollar organik moddalarda uchraydi.

a) Metallarning nitridlari Li_3N , K_3N , AlN suvli eritmada:



mexanizmda gidrolizlanib, gidroksid va ammiakni hosil qiladi.

b) Agar PCl_3 suv bilan ta'sirlashsa, gidroliz reaksiyasi




tenglamasi bo'yicha ro'y berib, tegishli kislotalarni hosil qiladi.

v) Agar murakkab efirlar kislotali sharoitda ($\text{pH} < 7$) suv bilan ta'sirlashsa:




tegishli karbon kislota va spirt hosil bo'ladi. Bu reaksiya ishqoriy muhitda olib borilsa, tegishli kislota tuzi (sovun) va spirt hosil bo'ladi:



Bu gidroliz amaliy jihatdan oxirigacha boradigan jarayon bo'lib, yog'lardan sovun olish jarayoni shu reaksiyaga asoslangan.



Kraxmal va sellyulozadan keng miqyosda foydalanish uchun ular sharoitda gidrolizlanadi:



bo'lgan glyukozani biyog'itish bilan etil spirti ishlab chiqariladi. Shuningdek, turli qishloq xo'jalik mahsulotlari (qand lavlagi, shakar qand) dan shakar ishlab chiqarish jarayonlari ham gidroliz jarayonlari foydalanishga asoslangan.

Savollar

1. Tuzlarning gidrolizi deganda nimani tushunasiz?
2. Tuzlarning gidrolizi jarayonining mohiyatini qanday tushunasiz?
3. Kation, anion va kation-anion bo'yicha boruvchi gidrolizga misollar keltirib va izohlang.
4. Nima sababdan gidroliz jarayonida eritma pH ining qiymati o'zgaradi?
5. Gidroliz darajasi deganda nimani tushunasiz va u nimaga bog'liq bo'ladi?
6. Gidroliz doimiysining ma'nosini tushuntiring.
7. Birga gidrolizlanish nima?
8. Gidroliz jarayonini kengroq ma'noda qanday tushunish mumkin?

XIV bob

OKSIDLANISH-QAYTARILISH REAKSIYALARI

Qaraladigan asosiy tushunchalar: oksidlanish darajasi, oksidlanish, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, oksidlovchi, qaytaruvchi, elektron tenglama, elektron balans usuli, ion-elektron usuli, molekulyar, ichki molekulyar va disproporsiyalanish oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.

XIV.1. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari

Biz kundalik hayotda juda ko'p jarayonlar — nafas olish, gaz yoki suyuqlikni yonilg'ilarni yoqish, metall buyumlarning zanglashi kabilarning o'xchilari va guvohi bo'lamiz.

Akkumulyator batareyalaridan foydalanamiz, bularsiz kundalik hayotda tasavvur etolmaymiz. Bu hodisalar bir qarashda bir-biri bilan o'zaro bog'liq emasdek tuyuladi. Lekin bu hodisalar bir-biri bilan bog'liq, ya'ni ularning barchasi asosida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yotadi.

Ma'lumki, deyarli barcha texnologik (terini qayta ishlash, metallar olish, non va qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni nazorat qilish) jarayonlari oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bilan amalga oshiriladi. Shu sababli oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini chuqurroq o'rganish zarur.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deb, elementlarning oksidlanish darajalari o'zgarishi bilan boradigan reaksiyalarga aytiladi.



Reaksiya oksidlanish-qaytarilish reaksiyasidir, chunki I reaksiya birorta elementning oksidlanish darajasi o'zgarmaydi, (II) da Mg va S elementlarning oksidlanish darajasida o'zgargan.

Oksidlanish darajasi nima? *Element atomi (yoki ion) ning oksidlanish darajasi deb, shu elementni o'z tarkibida saqlagan molekula faqat ionlarni iborat deb faraz qilinsa va molekula umumiy zaryadining yig'indisi nolga teng bo'lishi uchun har bir element atomining (ionining) ayni paytda rasmiiy (shartli) zaryadi qiymatiga aytiladi.*

Shuni unutmaslik kerakki, elementning oksidlanish darajasi uning valentligidan farq qiladi. Bu farqni quyidagicha tushuntirish mumkin. Valentlikning ishorasi (musbat yoki manfiy) bo'lmaydi.

Ma'lumki, valentlik biror elementning ikkinchi element bilan nequtbsiz yoki qutbli kovalent bog'lanish hosil qilish qobiliyati. Shuning uchun ko'ra biz bu elementning valentligi musbat, ikkinchisidiki manfiy deb ayta olmaymiz;

- valentlik nolga teng bo'lmaydi;
- elementlar oksidlanish darajasining ishorasi umuman olganda musbat, nol va manfiy, qiymati esa rasmiiy ravishda butun yoki katta songa teng bo'lishi ham mumkin.

Elementlarning oksidlanish darajasini aniqlashda doimo quyidagilarni yodda tutish kerak:

- oddiy moddalarning oksidlanish darajasi doimo nolga teng:




davriy sistema I gruppasi asosiy gruppachasidagi elementlarning oksidlanish darajasi doimo (+1) ga teng, II gruppasi asosiy gruppachasi elementlariniki (+2) ga teng, vodorodning oksidlanish darajasi metall gidridlari (NaH , CaH_2 , AlH_3) da (−1) ga, boshqa hamma elementlarda (+1) ga teng, kislorodning oksidlanish darajasi fluorli birikmalarda (−2) ga, boshqa birikmalarda (−1) ga teng.

Umuman, elementning oksidlanish darajasi ikki holatda o'zgaradi. Birinchi: elektron qabul qilganda uning oksidlanish darajasi kamayadi. Ikkinchi: elektron berish jarayoni deyiladi va uning elektron tenglamasini quyidagicha yozish kerak:



Elektron beruvchi atom (ion) **qaytaruvchi**, elektron qabul qiluvchi atom (ion) **oksidlovchi**. Qaytaruvchi vazifasini odatda barcha metallar: K, Li, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Al, vodorod gazi va xlor ioni Cl^- , yod ioni I^- , oltingugurtning S^{2-} ioni (sulfid ioni), ammiak molekulasini — "is gazi" CO , uglerod C kabilar bajaradi.

Ikkinchi holda element elektron berganda uning oksidlanish darajasi oshadi. Atom yoki ionning elektron berish jarayoni **oksidlanish jarayoni** deyiladi va buni quyidagicha yozish mumkin:



Okidlovchilar tarkibida yuqori oksidlanish darajasidagi atomlar bo'lgan molekula yoki ionlar, metallmaslarning atomlari bo'lishi mumkin. Bularga:

O_3 , Cl_2 , F_2 , Fe^{+3} , KMnO_4 , H^+ , HNO_3 , H_2SO_4 , H_2O_2 , O_3 , Na_2CrO_4 , PbO_2 , PbO_2 kabilar misol bo'ladi.

IV.2. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish


Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalari ikki xil usulda tuziladi.

Elektron balans usuli. Bu usul oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida elektronlar bergan elektronlar soni oksidlovchi qabul qilgan elektronlar soniga tengdir, degan qoidaga asoslanadi.



Quyidagi reaksiyani ko'rib chiqaylik:



a) eng avval reaksiyada ishtirok etayotgan har bir atomning oksidlanish darajasini ularning ustiga yozib chiqamiz va oksidlanish darajasini o'zgarishini aniqlab olamiz:



b) bu elementlarning oksidlanish darajalari o'zgarishini ko'rsatuvchi elektron tenglamalarni tuzamiz;



v) berilgan (2 ta) va qabul qilingan (3 ta) elektronlar sonini o'rtomondagi chiziqdan keyin yozamiz va bu ikkala sonning eng kichik qoldiqsiz bo'linuvchisini topamiz.


Bu son 6 ga teng. Endi 6 sonini 2 ga va 3 ga bo'lib, chiqqan sonlarni ikkinchi chiziqdan keyin yozamiz. Bu oxirgi sonlarni reaksiyaning to'liq tenglamasini tuzishda koeffitsiyentlar holida yozamiz;



2. Quyidagi murakkabroq reaksiya bilan tanishaylik.



Ko'rinib turibdiki, bu reaksiyada Fe^{+2} va S^{+1} ionlari Fe^{+3} va S^{+4} holatga o'tayapti. O_2 molekulasida O^{2-} ionlariga aylanayapti. Bu o'zgarishlarga asoslanib reaksiyaning elektron tenglamasini tuzamiz:



Koeffitsiyentlar (4 va 11) yordamida reaksiyaning to'liq tenglamasini tuzamiz:



Shunday qilib, berilgan va qabul qilingan elektronlar sonini o'zaro tenglashtirib, ya'ni elektronlar sonini "balans" qilib, oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi tenglamasini tuzdik.

1. **Ion-elektron usuli.** Bu usulga binoan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari eritmada ionlar o'rtasida boradi, deb qaraladi.

Bu usulda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalari tuzishni reaksiya misolida ko'rib chiqaylik.

Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamasini ion-elektron usuli bilan tenglashtirib ko'raylik;



a) reaksiya tenglamasini ionli holda yozib olamiz va oksidlanish darajasini va tarkibi o'zgargan ionlarni (*osti chizilgan*) aniqlab olamiz:



b) endi oksidlanish darajasi o'zgargan ionlar uchun oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining elektron tenglamasini tuzamiz.

Reaksiya tenglamasidan ko'rinib turibdiki, MnO_4^{2-} ioni Mn^{+2} holiga o'tayapti.

Agar reaksiya natijasida ion tarkibidagi kislorod atomlari soni kamayib qolsa, ya'ni mutlaqo chiqib ketsa, bu ion eritmada H^+ ionlari bilan bir qatorda va bir vaqtning o'zida elektron biriktirib qaytariladi (ba'zi hollarda elektron chiqarib oksidlanishi ham mumkin);




Agar reaksiya davomida ion o'z tarkibidagi kislorod atomlari sonini o'zgartirmasa, ya'ni NO_2^- dan NO_3^- ga o'tsa, ion eritmada suv molekullari hosil bo'ladi va o'zidan elektron chiqarib oksidlanadi;



Shunday qilib, oksidlanish va qaytarilish reaksiyalari doimo bir vaqtda sodir bo'ladi. Shunday qilib bu ikkala reaksiya tenglamalarini birgalikda yozib tenglamaning to'liq tenglamasini tuzamiz:

chap tomonidagi chiziqdan keyin berilgan (2 ta) va qabul qilingan (5 ta) elektronlar sonini yozib olamiz:



Tenglamalarning birinchisini (yuqorigi) 2 ga va ikkinchisini (pastkisi) 5 ga ko'paytirib ikkalasini qo'shamiz. Qo'shayotgan paytda tenglamalarni ikkala tomonida bir xil molekula va ionlar bo'lsa, ular o'zaro qisqartiriladi. Bu qisqartirish shu molekula yoki ion oldida koeffitsiyentlar ayirmasida yoziladi. O'rganayotgan reaksiyamizda reaksiyagacha 16 ta elektron reaksiyadan keyin 10 ta H⁺ bor. Ularni o'zaro qisqartirsak reaksiyagacha 6 ta H⁺ qoladi; reaksiyadan keyin esa H⁺ ionlari qolmaydi. Xuddi shuningari suv molekulari ham qisqaradi. Bulardan tashqari berilgan elektronlar soni ham qisqaradi va keyin ion tenglamasi tuziladi:



g) bu ion tenglama asosida reaksiyaning oxirgi — asosiy tenglama tuziladi:



Tenglamaning to'g'ri yoki noto'g'riligi reaksiyagacha va reaksiyadan keyingi kislorod atomlari umumiy sonini solishtirish bilan tekshiriladi. Agar ikkala tomondagi kislorod atomlari soni o'zaro teng bo'lsa, tenglama to'g'ri tuzilgan bo'ladi.




Bu usulning afzallik tomoni shundaki, ko'pchilik hollarda talaba reaksiya natijasida qanday moddalar hosil bo'lishi mumkinligini bilmaydilar. Ana shunday hollarda bu usuldan foydalanib reaksiyada ion-elektron tenglamasi tuzilsa, reaksiya natijasida hosil bo'ladigan barcha moddalar osonlik bilan topiladi.

XIV.3. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari turlari


Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari asosan quyidagi turlarga bo'linadi: Molekulararo oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Ikki yoki undan ko'progina modda molekulari o'rtasida boruvchi oksidlanish va qaytarilish reaksiyalari **molekulararo oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari** deyiladi. Yuqorida ko'rib chiqilgan uchchala reaksiya ham molekulararo oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari turiga misol bo'ladi. Chunki 1-misolda oksidlovchi N(+5) atomi HNO₃ tarkibida bo'lsa, qaytaruvchi rux atomlari Zn bo'ladi.

2-misolda oksidlovchi kislorod molekulasidagi kislorod atomlari bo'lsa, qaytaruvchi FeS₂ tarkibida ham temir, ham oltingugurt atomlaridir. 3-misolda oksidlovchi Mn⁺⁷ atomi KMnO₄ tarkibida, qaytaruvchi N⁺¹ atomi KNO₂ tarkibida elektron berish va olishda ishtirok etayapti. Bu reaksiyalar eng ko'p tarqalgan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Bu reaksiyalarga misollar:



a) yonish jarayonlari. Reaksiya natijasida yorug'lik nuri va issiqlik shaklida energiya chiqishi bilan boradigan barcha oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yonish jarayonlari deyiladi.




b) metallarning suvda, kislotalarda va ishqorlarda erishi:



v) oddiy moddalarning oksidlarga ta'siri:




8) metallotermiya reaksiyalari:




d) metallarni metallar tuzi eritmasidan siqib chiqarish:



2. Ichki molekulyar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Oksidlovchi element atomlari ham, qaytaruvchi element atomlari ham bir modda molekulasida bo'lganda kechadigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.



oksidlovchi qaytaruvchi




oksidlovchi qaytaruvchi

3. Disproporsiyalanish (dismutatsiyalanish) reaksiyalari.

Oksidlanish ham, qaytarilish ham bir xil element atomlari ishtirokida boruvchi reaksiyalar "disproporsiyalanish" reaksiyalari deyiladi. Bu reaksiyalarda ishtirok etuvchi oksidlovchi va qaytaruvchi element atomlari ba'zan bitta modda molekulasida, ba'zi hollarda esa ikki xil modda molekulasida ham bo'lishi mumkin:




oksidlovchi va qaytaruvchi Cl — atomlari bitta Cl_2 — molekulasida bo'lib, reaksiyadan keyin Cl ning zaryadi -1 va +1 bo'lib qoladi.




4. Sinproporsiyalanish reaksiyalari.

Misol:



Glyukoza tuzilishi va unadagi uglerod atomlarining oksidlanish darajasi quyidagicha.



jami 24 ta e^- berilgan

Mn + 7 + 5 e^- 5ta e^- qabul qilingan

24 ni Mn bor bo'lgan molekular oldiga qo'yamiz, 5 ni esa hokazo oldida qo'yamiz.



oksidlanish darajalariga ega bo'lgan uglerod atomlari bir xil zaryadli bo'ldi. Ana shunday reaksiyalar Sinproporsiya reaksiyalari deyiladi.

Savollar


1. Oksidlovchi va qaytaruvchi nima?

2. Elektron balans usulining mohiyati nimadan iborat?


3. Ion-elektron usulining afzallik tomonlari nimada?

4. Disproporsiyalanish reaksiyalari qanday reaksiyalar?

5. Quyidagi reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining qaysi turligiga kiradi? Reaksiyani tenglashtiring.



6. Reaksiyalarining tenglamalarini elektron balans usuli bilan tenglashtiring:



7. Quyidagi jarayonlarning reaksiya tenglamalarini tuzing:

a) nitrat kislota (suyultirilgan) eritmasida mis metalining erishi;

b) temir simni mis sulfat eritmasiga tushirilganda, uning sirtini qizil rang qoplanishi;

c) kaliy permanganat eritmasiga sulfat kislota va temir (II) sulfat tuzi qo'shilganda eritma binafsha rangining yo'qolishi.

XV bob

ELEKTROKIMYOVIY JARAYONLAR

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: qo'sh elektr qavat, oksidlanish potentsiali, elektrod, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari elektr yurituvchilik kuchi (EYuK), reaksiyalarning yo'nalishi, Nernst tenglamasi, standart oksidlanish potentsiali, normal vodород elektроди, metallarning kuchlanishlar qatori, galvanik elementlar, elektroliz, suyuqlanma va eritma elektrolitlari, Faradey qonunlari, elektrokimyoviy ekvivalent, eruvchan anod elektrodu, tok bo'yicha unum.

Kimyoning bu bo'limi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining amaliy qo'llanilishiga tegishli bo'lib, bu mavzularni tushunib etish uchun avvalo element (ion) ning "oksidlanish potentsiali" tushunchasini bilish kerak.

XV.1. Oksidlanish potentsiali haqida tushuncha

Har bir element yoki ionning oksidlovchilik va qaytaruvchilik xususiy (kuchi)ining miqdoriy tavsifnomasi sifatida oksidlanish potentsiali qiymat xizmat qiladi. Oksidlanish potentsiali (o. p.) tushunchasini quyidagi misol bilan tushunib olaylik.

Rux metalli bo'lakchasini (xohlagan biror metall bo'lakchasi haqiqatda xuddi shunday xossaga ega) uning tuzi (ZnSO_4) eritmasiga tushirilsa, rux elektrodu hosil bo'ladi va elektrodda metallning sirti bilan eritma bilan chegarasida elektrokimyoviy reaksiya boradi. Bu reaksiya natijasida rux — plastinkasi tarkibidagi rux atomlari 2 tadan elektron chiqarib oksidlanish boshlaydi: $\text{Zn}^0 - 2e^- \rightarrow \text{Zn}^{+2}$.

Elektronlar metall plastinkasida qoladi, eritmaga Zn^{+2} ionlari o'tadi. Natijada eritma bilan metall plastinka sirtida qo'sh elektr (metall manfiy va eritma musbat) zaryadli qavat hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan qo'sh elektr qavatda zaryadlarni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chishi ro'y beradi.

Eritma bilan metall plastinkasi sirt chegaralarida zaryadning (yoki elektronlarning) bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chishi tufayli bajarilgan ish — shu metall (ion)ning oksidlanish potentsiali deyiladi. Har qanday

element (ion) ning oksidlanish potentsiali $E_{\text{oksid/qayt}}$ holida belgilanadi va "volt — v", "millivolt — mv," birliklarda o'lchanadi.

Har bir elektrod potentsialining qiymati elementning yoki eritmadagi ionning tabiati, miqdori (konsentratsiyasi) va temperaturaga bog'liq. Bu bog'lanishini **Nernst tenglamasi** orqali ifodalash mumkin:

$$E = E_{\text{oksid/qayt}}^0 + \frac{2,3RT}{nF} \lg \frac{[\text{oksid}]}{[\text{qayt}]}$$

bu yerda, E — oksidlanish potentsiali, v;

$E_{\text{oksid/qayt}}^0$ — standart oksidlanish potentsiali, v;

R — gaz doimiysi 8,314 J (mol·K);

T — mutlaq temperatura (standart sharoit uchun),

$T=298 \text{ K}$ ($t=25^\circ\text{C}$);

n — berilgan yoki qabul qilingan elektronlar soni;

F — Faradey soni, 96500 Kl;

[oksid] — moddaning oksidlangan shakli konsentratsiyasi, mol/l.

[qayt] — moddaning qaytarilgan shakli konsentratsiyasi, mol/l.

Agar R , T , F larning son qiymatlarini o'rni qo'ysak, Nernst formulasi quyidagi ko'rinishga keladi

$$E = E_{\text{oksid/qayt}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[\text{oksid}]}{[\text{qayt}]} = \text{const.}$$

Metall elektrodlarida qaytarilgan shakl metall atomiga to'g'ri kelgani uchun tenglamadagi $[\text{qayt}] = [\text{Me}^0] = 1 \text{ mol/l}$ ga teng, deb qabul qilinadi va u holda Nernst tenglamasi

$$E = E_{\text{Me}^{+n}/\text{Me}}^0 + \frac{0,059}{n} \lg [\text{Me}^{+n}] \text{ ko'rinishda yoziladi.}$$

Standart oksidlanish potentsiali Nernst tenglamasiga ko'ra, agar eritmada potensial hosil qiluvchi ion (Me^{+n})ning konsentratsiyasi $[\text{Me}^{+n}] = 1 \text{ mol/l}$ bo'lsa, u holda $\lg [\text{Me}^{+n}] = \lg 1 = 0$ bo'ladi va shu sababli $E_{\text{oksid/qayt}} = E^0$ bo'ladi. Boshqacha aytganda, standart oksidlanish potentsiali — bu 25°C da eritmada potensial hosil qiluvchi ion konsentratsiyasi "1 mol/l"ga teng bo'lganda yuzaga keladigan elektrod potentsialidir.

— vodoroddan chapda joylashgan barcha metallar ($E^{\text{oksid/qayt}} < 0$) vodorod ioni (H^+) ga nisbatan qaytaruvchi bo'lib, eritmalardan vodorodni siqib chiqaradi;

— vodoroddan o'ngda turgan ($E^{\text{oksid/qayt}} > 0$) barcha metallar "passiv" metallar bo'lib, eritmadan H^+ ionlarini H_2^0 holida siqib chiqara olmaydi, ya'ni H^+ ga nisbatan qaytaruvchi bo'la olmaydi;

— bu qatordagi har qanday metall o'zidan keyin (o'ngda) turgan har qanday metallni uning tuzi eritmasidan siqib chiqara oladi.

XV. 3. Galvanik elementlar

Galvanik elementlar deb, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari mohaynida ajralib chiqadigan kimyoviy energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi elektrokimyoviy sistemalarga aytiladi.

Galvanik elementlar boshqacha nom bilan *kimyoviy tok manbalari* ham deb aytiladi. Bular qatoriga akkumulyatorlar, batareyalar kiradi. Galvanik elementlarning ishlash prinsipini tushunish uchun mis-rux elementining yasaliishi va ishlash prinsipini o'rganamiz.

Rux metalini rux sulfat tuzi eritmasiga tushirilganda yuz beradigan elektrokimyoviy jarayon bilan yuqorida tanishdik. Bunda rux elektrodi hosil bo'lib, $C_{Zn^{+2}} = 1 \text{ mol/l}$ bo'lganda $E^0 = -0,76 \text{ v}$ ekanligini ko'rdik.

Xuddi shuningdek, mis plastinkasini mis sulfat tuzi eritmasiga tushirilsa, eritmadagi mis ionlari eritmadan plastinka sirtiga ko'chib o'tadi va qo'sh elektr qavat hosil bo'ladi, plastinka musbat zaryadlanadi. Bu ikkala elektrodni KCl eritmasi bilan to'ldirilgan "elektrolitik ko'priq" orqali tutashtirilib, elektrodlar voltmetrga ulansa, quyidagi reaksiyalar boradi: anodda: $Zn^0 - 2e^- \rightarrow Zn^{+2}$ (qaytaruvchi oksidlanadi).

Katodda: $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ (oksidlovchi qaytariladi) potentsiallar farqi yuzaga kelib, elektr yurituvchi kuch (EYuK) paydo bo'lib, uning qiymati: $\Delta E = E^{\text{oksid}} - E^{\text{qayt}} = +0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ v}$ ga teng bo'ladi.

Bunda mis elektrodi musbat zaryadlanib *katod* deyiladi, rux elektrodi manfiy zaryadlanib, *anod* deyiladi. Bu galvanik elementning kimyoviy tuzilish, sxematik formulasi:

(anod) (-) $Zn/ZnSO_4 // KCl // CuSO_4 / Cu$ (+) katod.

Shu sababli $\Delta E = E_{\text{oksid}} - E_{\text{qayt}}$ holida ham hisoblanadi. Har qanday galvanik elementning EYuK i ionlarning konsentratsiyasiga, ionning abiatiga va temperaturaga bog'liq bo'ladi (Nernst tenglamasi).

Galvanik elementlarga tegishli ayrim masalalarni ko'rib chiqaylik.

Masala: 0,01 M $Zn(NO_3)_2$ eritmasiga rux plastinkasi, 0,001 M $AgNO_3$ eritmasiga kumush plastinkasi tushirilganda hosil qilingan galvanik elementning elektr yurituvchi kuchini hisoblang.

Yechish: Ma'lumki, rux plastinkasi o'z tuzi eritmasiga tushirilsa rux eriy boshlaydi, ya'ni oksidlanadi (anod).

$E^0 = -0,76$ v. Ikkinchi — Ag plastinka o'z tuzi eritmasiga tushirilganda eritmadagi Ag^+ ionlari plastinkaga o'tira boshlaydi va u musbat zaryadlanadi (katod), ikkala plastinka o'zaro tashqi zanjir vositasida tutashtirilganda Ag — ionlari qaytariladi.

Umuman rux — kumush galvanik elementi ishlaganda quyidagi reaksiyalar boradi:



Har qanday galvanik elementning EYUK quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$E_{YuK} = E_{katod} - E_{anod} = E_{oksidlovchi} - E_{qaytaruvchi}$ dan kelib chiqib, rux va kumushning standart oksidlanish potentsiallarini bilgan holda Nernst formulasidan foydalanib, har ikkala elektrodning oksidlanish potentsialini hisoblaymiz.


$$E_{katod} = E^0_{Ag^+/Ag^0} + 0,059/n \lg C_{Ag^+} = 0,80 + 0,059/1 \cdot \lg 1 \cdot 10^{-3} = +0,68 \text{ v}$$

$$\text{va } E_{anod} = E^0_{Zn^{2+}/Zn^0} + 0,059/n \lg C_{Zn^{2+}} = -0,76 + 0,059/2 \cdot \lg 1 \cdot 10^{-2} = -0,819 \text{ v}$$

kelib chiqadi. Bulardan foydalanib galvanik elementning

$$E_{YuK} = 0,682 - (-0,819) = 0,682 + 0,819 = 1,501 = 1,50 \text{ v.}$$

Bunday xildagi galvanik elementlar (konsentrlangan element, batareya) quruq element deyiladi. Batareya rux stakan (idish) g'ovak to'siq bilan ajratilib, ichiga quruq NH_4Cl va $ZnCl_2$ — elektrolitlari pasta holida joylashtirilgan. O'rtasida grafit va MnO_2 aralashmasidan yasalgan markaziy elektrod tushirilgan. Batareya ishlaganda quyidagi reaksiyalar borib:




potentsiallar ayirmasi + 1,48 v bo'lgan EYuK hosil qiladi.

Akkumulyator ("Akkumulyator" — "yig'uvchi", "o'zida saqllovchi" ma'nosini bildiradi).

Ko'pchilik hollarda ishlatiladigan akkumulyatorlar qatoriga ishqorli va qo'rg'oshinli kislotali akkumulyatorlar kiradi.


Qo'rg'oshinli akkumulyator sxemasi 17-rasmda keltirilgan. Uning tuzilishi: plastmassa idish, qo'rg'oshin metalidan yasalgan plastinkalar, plastinkalar orasidagi to'siqlar, PbO_2 — bilan to'ldirilgan qo'rg'oshin plastinkalar H_2SO_4 elektrolit eritmasiga tushirilgan.

Akkumulyator ishlaganda (razryadlanganda) quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi boradi:




17-rasm. Qo'rg'oshinli akkumulyator.

Elektrolit pastasi
($NH_4Cl + ZnCl_2$) va
inert to'ldiruvchi



Markaziy elektrolit
 $C_{(grafit)} + MnO_2$

(-) qutb $Pb^0 - 2e^- \rightarrow Pb^{2+}$ (qo'rg'oshin plastinka qaytaruvchi)



Ikkala reaksiya natijasida ham $PbSO_4$ cho'kmasi hosil bo'lib, eritmada H_2SO_4 (elektrolit) miqdori kamayib boradi. Uning miqdorini *areometr* (zichlikni o'lchovchi asbob) bilan elektrolit zichligini o'lchab aniqlab turiladi. Shu bilan akkumulyatorning ishchi holati ham aniqlanadi.

18-rasm.
Batareyaning tuzilishi.

Akkumulyator kuchsizlanib qolganda yoki ishlash jarayonida zaryadlab boriladi. Zaryadlanganda akkumulyatorlarda yuqoridagiga teskari reaksiyalar boradi. Har bir akkumulyator "bankasi" — 2 v kuchlanishli tok beradi. Ularni ketma-ket ulab 3, 6, 12 bankali (6 v, 12 v, 24 v) akkumulyatorlar ishlab chiqariladi.

Ishqoriy akkumulyatorda quyidagi jarayonlar boradi:



elektrolit KOH eritmasi $\Delta E = 1,4\text{V}$



Savollar

1. Metall elektrodlar nima? Ularning oksidlanish potentsiali deganda nima tushunasiz?
2. Oksidlanish (qaytarilish) potentsiali qanday yuzaga keladi?
3. Nernst formulasini yozing va uni izohlab bering.
4. Potensial hosil qiluvchi ionning konsentratsiyasi "1 mol/l" bo'lsa, bu elektrod potentsiali qanday nomlanadi?
5. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining EYuK qanday hisoblanadi va reaksiya to'g'ri yo'nalishda borishi uchun u qanday shartni qo'g'atlantirishi kerak?
6. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida bajarilgan ish va Gibbs energiyasining o'zgarishi qanday bo'lishi kerak?
7. Standart oksidlanish potentsiali nima?
8. Vodorod elektrodi qanday ishlaydi, u nima maqsadda qo'llaniladi?
9. Galvanik element nima? U qanday ishlaydi?

XV.4. Elektroliz


Elektroliz deb, elektrolitning suyuqlanmasi yoki eritmasidan elektr toki o'tganda boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga aytiladi.

Ma'lumki, elektrolitlar eritma yoki suyuqlanma holatida tok o'tkazadilar. Shu sababli elektroliz suyuqlanmada va eritmada borishi mumkin.


Suyuqlanmada boradigan elektroliz natijasida anodda shu modda tarkibiga kirgan anion oksidlanadi, katodda esa shu modda tarkibidagi kation qaytariladi. Masalan, NaCl tuzi suyuqlanmasi:



elektrolizida Na^+ ioni katodda qaytariladi:



Eritmaning elektrolizi. Eritma elektrolizi oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida elektrolit molekullari bilan birgalikda suv (erituvchi) molekullari ishtirok etgani uchun ancha murakkabdir. Eritmada boradigan elektroliz sxemasini tuzayotganda quyidagi qoidalarni bilish zarur:



19-rasm. Osh tuzi suyuqlanmasining elektrolizi.

Katod jarayonlari uchun:

1. Agar eritmada oksidlanish potentsiali vodorodning oksidlanish potentsialidan kichik bo'lgan kationlar (aktivlik qatorida Li^+ dan Al^{3+} gacha) bo'lsa, katodda avval, ular o'rniga suv molekullari qaytarilib: $2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ metall ionlari eritmada o'zgarmasdan qoladi.


2. Agar eritmada standart oksidlanish potentsiali vodorodnikidan kichik, lekin Al nikidan katta bo'lgan kationlar (Al^{3+} dan Pb^{2+} gacha) bo'lsa, u holda katodda bir vaqtning o'zida ham vodorod ionlari, ham metall kationlari qaytariladi.

3. Agar eritmada standart oksidlanish potentsiali vodorodnikidan yuqori bo'lgan kation bo'lsa, katodda avval shu kation qaytariladi (aktivlik qatorida bu kationlar H^+ — dan keyin turadi).

Anod jarayonlari uchun:

1. Agar eritmada kislorodsiz kislotalarning anionlari; Cl^- , Br^- , I^- , F^- ar bilan birga H_2O — molekullari mavjud bo'lsa, anodda avval kislorodsiz kislota anionlari oksidlanadi.


2. Agar eritmada kislorodli kislota anionlari: SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , NO_3^- bo'lsa, bu anionlarning oksidlanish potentsiallari suv molekulasining oksidlanish potentsialidan katta bo'lgani uchun anodda avval (dastlab) H_2O molekullari oksidlanadi:



Endi yuqoridagi qoidalarga amal qilgan holda ba'zi bir elektroliz jarayonlarini ko'rib chiqaylik.

Masala. Osh tuzining suvli eritmasining elektroliz sxemasini tuzing. Anod va katodda boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamasini tuzing.

Yechish. Masalaning shartidan ko'rinib turibdiki, elektroliz eritmada o'ryapti. Osh tuzi (NaCl) molekullari eritmada dissotsilangan holda bo'ladi: $\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. Bu ionlardan Na^+ manfiy zaryadli elektrod-katodga tortiladi, Cl^- esa musbat zaryadli elektrod-anodga tortiladi. Bundan tashqari, eritmada suv molekullari ham bo'lgani uchun ular ham elektroliz jarayonida qatnashadilar, aniqrog'i, suvning dissotsilanishi natijasida hosil bo'ladigan H^+ va OH^- ionlari mos ravishda katod va anodga tortiladi. Buni quyidagi sxemada ko'rish mumkin:



Sxemadan ko'rinayaptiki, katod Na^+ va H^+ ionlari qaytarilishini kutish mumkin.


A. Bulardan Na^+ ionining oksidlanish potentsiali ($E^0 = -2,71 \text{ v}$) vodorod ionining shartli oksidlanish potentsiali ($E^0 = 0 \text{ v}$) dan kichik:

$$E^0_{\text{Na}^+/\text{Na}} < E^0_{2\text{H}^+/\text{H}_2}$$

Shuning uchun katodda vodorod ionlari qaytariladi, eritmada Na^+ — ionlari qoladi: $2\text{H}^+ \rightarrow +2e^- \rightarrow \text{H}_2^0$ (to'g'rirog'i: $2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow \text{H}_2^0 + 2\text{OH}^-$ suv molekullari qaytariladi). Chunki H^+ ionlarining eritmadagi muvozanat

konsentratsiyasi juda kichkina — 10^{-7} mol/l. Tok kuchi yetarli bo'lsa H^+ lar etmay qoladi va ularning o'rniga H_2O molekullari qaytariladi.

B. Anodda xlor anioni va H_2O molekullari oksidlanishi mumkin. Lekin xlor ionlari kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lganligi uchun anodda Cl^- ionlarining oksidlanishi ro'y beradi:



Demak, $NaCl$ tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda H_2O molekullari qaytariladi, anodda xlor ionlari oksidlanadi.

Elektroliz mahsuloti sifatida vodorod va xlor gazlari hosil bo'ladi. Eritmada esa Na^+ va OH^- ionlari qoladi, eritma kuchli ishqoriy muhitga ega bo'ladi:




Endi quyidagi masalani ko'rib chiqaylik.

Masala: $CuCl_2$ tuzi eritmasining elektroliz sxemasini tuzing.

Yechish. Elektroliz qilinayotgan tuz tarkibiga kirgan kation yuqorida ko'rib chiqilgan masaladagi kationdan ancha farq qiladi. Chunki kation (Cu^{+2}) oksidlanish potentsiali qatorida vodoroddan keyin turadi. Cl^- anioni kislorodli kislota qoldig'i. Shuning uchun bu tuz eritmasining elektrolizi quyidagicha boradi. Eritmada tuz dissotsilanadi:



Bu eritmaga elektrodlar tushirilib, ularga tok ulansa, katodga mis (II) ionlari, anodga esa xlor ionlari yo'naladi. Eritmada suv molekullari ham bo'lgani uchun elektroliz jarayonida ular ham ishtirok etadilar.




Yuqoridagi qoidalarga ko'ra elektrodalarda boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamalarini yozamiz.

A. **Katodda:** $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ (eritmada H^+ ionlari qoladi. Chunki, $E^0_{2H^+/H_2} < E^0_{Cu^{+2}/Cu^0}$)

B. **Anodda:** $E^0_{Cl^-/Cl} < E^0_{H_2O/H_2O_2}$ bo'lgani uchun

xlor ionlari oksidlanadi, ya'ni $2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2^0$. Bu elektroliz paytida boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini birgalikda yozib, elektrolizning umumiy tenglamasini tuzamiz:



Demak, $CuCl_2$ tuzi eritmasi elektroliz qilinsa, anodda xlor ionlari oksidlanib xlor gazi chiqar ekan. Katodda Cu^{+2} ionlari qaytarilib mis metali holida katod satxida ajralar ekan. Eritmada suv molekullari qolaveradi.

Ba'zi hollarda elektrolizni elektroliz qilinayotgan tuz tarkibiga kirgan metallardan yasalgan elektrodlar yordamida ham o'tkaziladi. Bunday elektrolizni "eruvchan anod" elektrolizi deyiladi. Bunga quyidagi elektroliz misol bo'ladi.

Masala: $NiSO_4$ eritmasini nikel elektrodleri yordamida elektroliz qilindi. Shu elektrolizning sxemasini tuzing.

Yechish. Eritmada Ni^{+2} , SO_4^{2-} ionlari va suv molekullari bor.

Elektrodarga kuchlanish berilganda:


A. Nikeldan yasalgan anod eriy boshlaydi, ya'ni nikel atomlari oksidlanib, eritmaga nikel ionlari holida o'ta boshlaydilar: $Ni^0 - 2e^- \rightarrow Ni^{+2}$.

B. Eritmadagi nikel ionlari esa katodga tortilib qaytarila boshlaydi: $Ni^{+2} + 2e^- \rightarrow Ni^0$.

Bunda anod erib qancha Ni^{+2} ionlarini hosil qilsa, shuncha Ni^{+2} ionlari katodda qaytarilib nikel metallini hosil qiladi. Eritilgan tuz miqdori va ionlari elektroliz paytida o'zgarishsiz qoladi. Aytilganlarni sxema ko'rinishida yozsak:



Elektrolizning umumiy tenglamasi:



Eriydigan anodlar korroziyadan saqlash uchun metall buyumlar sirtini qoplashda, metallarni tozalashda ishlatiladi. Sirdan nikel qoplashda katodda Ni^{+2} ionlari konsentratsiyasi katta bo'lgani uchun va o'ta kuchlanish sababli H_2 emas, balki Ni ajralib chiqadi. Anodda esa metallning OH^- ioniga nisbatan qaytaruvchiligi kuchli bo'lgani sababli nikeldan yasalgan anod elektron berib, Ni^{+2} ioniga aylanadi, ya'ni anod eriydi.

Bunda katodda: $\text{Ni}^{+2} + 2e \rightarrow \text{Ni}$

anodda: $\text{Ni} - 2e \rightarrow \text{Ni}^{+2}$

Eriydigan anodlar buyumlar sirtiga metall qoplashda metall ioni konsentratsiyasini bir xilda o'zgarmsdan turishini ta'minlaydi, bunda katodda qancha metall ajralib chiqsa, anodda shuncha metall eriydi.

Bu usulda Au, Cu kabi metallarni tozalash mumkin. Eriydigan anod sifatida ifloslangan metall olinsa, katodda toza metall ajralib chiqadi.

Ma'lumki, elektroliz paytida elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar miqdorini hisoblash mumkin. Elektroliz paytida ajralib chiqadigan moddalar miqdori **Faradey qonunlari** asosida keltirib chiqarilgan formulalar yordamida hisoblanadi.

1-qonun. Elektroliz natijasida elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar miqdori eritmadan o'tgan elektr miqdori ($I \cdot \tau$) ga to'g'ri proporsionaldir.

2-qonun. Elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar miqdori shu modda (ion) larning kimyoviy ekvivalentiga to'g'ri proporsionaldir. Modda miqdoriga tegishli bo'lgani uchun ikkala qonunni umumlashtirib elektrodlarda ajralib chiqadigan modda miqdorini hisoblash mumkin:

$m = I \cdot \tau \cdot E/F$. Bu erda: m — ajralib chiqayotgan modda massasi, g; kg; I — tok kuchi, A; τ — vaqt, sekund; F — Faradey soni = 96500 Kl; E — kimyoviy ekvivalent.

Shu formulani gazsimon moddalar uchun ham yozish mumkin:

$$V = (I \cdot \tau \cdot V_e)/F$$

bu yerda, V — ajralib chiqqan gazning hajmi, ml; I , sm³. V_e — ajralib chiqayotgan gazning ekvivalent hajmi.

Formulalarda keltirilgan $I \cdot \tau$ ko'paytma eritmadan o'tayotgan elektr miqdorini ifodalaydi va Q harfi bilan belgilanadi. Agar 1 Kl elektr miqdori elektrolizerdan o'tsa elektrodlarda $E = E/F$ miqdor modda ajralib chiqadi. Bunda E — moddaning "elektrokimyoviy ekvivalenti" deyiladi. Uning ma'nosi, eritmadan 1 Kl elektr miqdori o'tganda ajralib chiqadigan moddalar massasidir.

Masala. Rux xlorid eritmasidan 1 soat davomida 0,6 amper kuchli tok o'tganda elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar miqdorini hisoblang.

Yechish: Avval elektroliz sxemasini tuzamiz:

(-) Katod $\text{Zn}^{+2} \leftarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^-$ Anod (+)

(H₂O-erituvchi)

Bu tuz tarkibidagi Zn^{+2} kationi oksidlanish potentsiali qatorida vodorod bilan Al o'rtasida joylashgan $E = -0,76$ v. Shu sababli katodda bir vaqtda



Rux ionlari va vodorod ionlari (aniqrog'i suv molekulari) qaytariladi. Anodda esa Cl^- ionlari oksidlanadi:

Katodda: $\text{Zn}^{+2} + 2e \rightarrow \text{Zn}^0$ va $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

Anodda: $2\text{Cl}^- - 2e \rightarrow \text{Cl}_2^0$

Elektrolizning umumiy tenglamasi:

$\text{Zn}^{+2} + 2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Zn}^0 + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2^0\uparrow + 2\text{OH}^-$

Demak, katodda rux metali va vodorod, anodda esa xlor gazi ajralib chiqadi. Rux metalining massasini, vodorod va xlor gaz holida chiqqani uchun ularning hajmini hisoblaymiz:

$$m_{\text{Zn}} = \frac{E \cdot I \cdot t}{F} = \frac{32,5 \cdot 0,6 \cdot 60 \cdot 60}{96500} = 0,727 \text{ g}$$

$$V_{\text{H}_2} = \frac{V_e \cdot I \cdot t}{F} = \frac{11,2 \cdot 0,6 \cdot 60 \cdot 60}{96500} = 0,250 \text{ g}$$

$$V_{\text{Cl}_2} = \frac{V_e \cdot I \cdot t}{F} = \frac{11,2 \cdot 0,6 \cdot 60 \cdot 60}{96500} = 0,250 \text{ g}$$

Ba'zi hollarda elektroliz natijasida ajralib chiqadigan modda miqdori nazariy hisoblangandan kam bo'ladi. Buni miqdoriy tomondan tavsiflash uchun elektrolizning tok bo'yicha unumi degan tushuncha kiritilgan. Tok bo'yicha unum η — harfi bilan belgilanib, quyidagicha hisoblanadi:

$$\eta = \frac{m_{\text{tajriba}}}{m_{\text{nazariy}}} \cdot 100 \%$$

bunda, m_{tajriba} — tajribada ajralib chiqqan modda massasi; m_{nazariy} — shu moddaning nazariy hisoblanganda ajralib chiqishi kerak bo'lgan massasi.

Elektrolizning ahamiyati. Elektroliz jarayonlari katta amaliy ahamiyatga

1. Elektrolizdan foydalanib, ko'pchilik metallar (Na, K, Ca, Al, Ag, Cu, Au, Ni) olinadi. Boshqa usullar bilan olingan metallar yuqori tozalikda (99,99%) olish uchun elektroliz usuli bilan **elektrorefinatsiya** qilinadi. Bu asosan, "eruvchan anod" usuli bilan amalga oshiriladi.

2. Cho'yan, po'lat va boshqa qotishma hamda metallarning sirti korroziyaga chidamli metallar bilan qoplanadi. Masalan: nikel, kumush va oltin bilan qoplanadi. Bu jarayonlar **galvanostegiya** va **galvanoplastika** uch ataladi.

3. Turli qiyin yasaladigan detallar, siluetlar, nishonlarning qoliplari ganch, plastmassa, grafitlardan yasali, ularga manfiy zaryadli tok berib (katod) elektrolit suyuqlanmasi eritmasiga tushirib qo'yiladi. Ma'lum vaqtdan so'ng qolip sirtiga metall ajralib chiqishi tufayli ayni shakldagi detal olinadi.

4. Elektroliz usuli bilan Cl_2 , F_2 , O_2 , H_2 kabi metallmaslar ham olinadi, kimyo sanoatining bu moddalarga bo'lgan ehtiyojining ma'lum qismi shu usul bilan ta'minlanadi.

Savollar

1. Elektrolizning mohiyati nimadan iborat?
2. Eritmada boradigan elektroliz uchun qanday qoidalar bor?
3. Eruvchan anod mohiyatini tushuntiring.
4. $CuSO_4$ eritmasini ko'mir va mis elektrodleri ishtirokidagi elektroliz sxemalarini tuzing.
5. Elektrokimyoviy ekvivalentning ma'nosini tushuntiring.
6. Tok bo'yicha unum nima? Uning ma'nosini tushuntiring.
7. Oksidlanish potentsiali qatoridan foydalanib, eng katta EYuK ga ega bo'lgan galvanik element tuzing.
8. Al/Cu galvanik elementi sxemasini tuzing, anod va katodni ko'rsating, EYuK ni hisoblang.
9. Temir sim va sirti tozalangan mis sim limonga tiqib qo'yilgan. Ularning uchlari voltmetrga ulanganda nimani kuzatish mumkin? Buning sababini tushuntiring.
10. KJ eritmasi 10 minut davomida 0,2 A tok kuchi ostida elektroliz qilindi. Elektrodler ajralib chiqqan moddalarning massalarini hisoblang.
11. $MgCl_2$, $CaCl_2$, $CuCl_2$, $CuSO_4$ eritmalari bir vaqtda ketma-ket ulanib, 15 minut davomida 3 A tok kuchi bilan elektroliz qilindi. Qaysi hollarda katodda bir xil va anodda bir xil moddalar ajralib chiqadi. Ularning massa va hajmlarini hisoblang.

XVI bob

METALLMASLAR

XVI.1. Metallmaslar to'g'risida ma'lumot

Davriy jadvaldagi barcha elementlarni shartli ravishda "metallmas" va "metallar"ga bo'linadi. Ularni bir-biridan ajratish uchun davriy jadvaldagi berilliy (Be) elementidan astat (At) ga tomon to'g'ri chiziq (diagonal) o'tkazilsa, chiziqning yuqorisidagi barcha asosiy gruppacha elementlari metallmaslarni va pastdagi elementlar metallarni tashkil etadi.

Atomlarning elektron tuzilishiga ko'ra (s-metallmaslar) metallmaslar atoriga 2 ta s-element H_1 va He ; qolganlariga p-elementlar (p-metallmaslar) radi. ularning o'ziga xos xususiyatlari: gazsimon, suyuq yoki kristall holatda bo'lishi, issiqlikni yomon o'tkazishi, dielektriklik, elektromanfiyligi yuqoriligi, oksidlovchilik xossalarining qaytaruvchilik xossalariga nisbatan ancha yuqori bo'lishidir. Metallmaslar atomlari o'zaro va bir-birlari bilan kovalent bog'lanish ($H-H$, $Cl-Cl$, $H-F$, $N-H$, $H-O$, $H-Cl$), metallar bilan ion bog'lanish ($Na-Cl$, $K-F$, $Na-S$, $Ca-O$, $Al-H$ va h.k.) lar hosil qiladi. Oksidlari asosan kislotalarni hosil qiladi. Moddorodli birikmalari gazsimon (H_2S , NH_3 , CH_4 , C_2H_6 , C_2H_2 , SiH_4) va suyuq (H_2O) holatlarda bo'lib, ko'pchiligining molekullari o'zaro moddorod bog'lanish hosil qiladi.

Metallmaslarning davrlarda tartib raqami ortib borishi bilan ularning elektronga moyilligi va elektromanfiyligi, oksidlovchilik xossasi kuchayib boradi. Gruppalarda aksincha tartib raqami ortishi bilan elektronga moyilligi, elektromanfiyligi susayib boradi va qaytaruvchilik xossalari kuchayadi.

Ularga oddiy moddalar holida turli allotropik shakllarda mavjud bo'lish xosdir. Metallmaslar oddiy moddalarni hosil qilib ular nomolekulyar tuzilishli (C, B, Si) va molekulyar tuzilishli (H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , P_4 , S_8) bo'ladilar.

Nomolekulyar tuzilishli metallmaslar qattiq, atom kristall panjarali moddalar bo'lib, yuqori suyuqlanish temperaturasi ega bo'ladi. Lekin bundan nodir gazlar mustasno!

Molekulyar tuzilishli metallmaslar gazsimon, suyuq va past temperaturada suyuqlanuvchan (yoki bug'lanuvchan J_2) qattiq moddalardir. Ular asosan molekulyar kristall panjaralar hosil qiladilar.

Metallmaslarning bunday xususiyatlar namoyon qilishining asosiy sababi ular atomlari yadrolarining tarkibi va elektron tuzilishining o'ziga xosligidir.

Oksidlari "befarq" indifferent (CO , N_2O , NO , SiO) yoki kislota xossali bo'lib, ularda metallmasning oksidlanish darajasi va davrlarda tartib raqami ortishi bilan kislotalaning kuchi ortadi.

Masalan: HN^+O_2 ga nisbatan HN^+O_3 kuchli; $H_2S^+O_3$ ga nisbatan $H_2S^+O_4$ kuchli kislota va H_2SiO_3 ga nisbatan H_2SO_4 kuchli, H_2SO_3 ga nisbatan HNO_3 kuchli kislotalardir. Gruppalarda bu xususiyat teskari — tartib raqami ortsa,

kislotalaning kuchi kamayadi: HNO_3 ga nisbatan H_3PO_4 kuchsiz, H_2SO_3 ga nisbatan H_2SiO_3 kuchsiz va hokazo.

Metallmaslar atomlarining (erkin holatda yoki birikmalarda) tashqi elektron qavatlarida bir yoki bir nechta bog'lanishda ishtirok eta oladigan (taqsimlanmagan) elektron juftlar mavjud bo'ladi.

Shu sababli ular elektronodonorlik (donor-akseptor bog'lanish hosil qilish) xossalriga ega bo'lib, aksariyat kompleks birikmalar tarkibida ligandlar vazifasini bajaradilar va, shuningdek, vodorod bog'lanishlarini hosil qiladilar.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarning isboti sifatida ayrim metallmaslarning birikma va xossalari bilan yaqindan tanishamiz.

VODOROD VA KISLOROD

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: vodorod, deyteriy, tritiy, suv bug'i, qalldiroq gaz, konversiyalash, kislorod, ozon, peroksidlar, suv, og'ir suv, suvni tayyorlash, havoni rektifikatsiyalash, suvning qattiqligi.

XVI.2. Vodorod (H, Z=1)

Davriy sistemada birinchi element — vodorod (Hydrogenium) bo'lib, uning nomi "suv hosil qiluvchi" ma'nosini bildiradi. Uning atomi eng oddiy elektron tuzilish ($1s^1 \uparrow \square$) ga ega.

Qisqacha tarixiy ma'lumot. Vodorod XVI asrda nemis tabiatshunos-hakimi Paratsels tomonidan ochilgan. 1776 yilda Angliya olimi G. Kavendish uning xususiyatlarini o'rgangan. Lavuaze 1783 yilda eng birinchi bo'lib suvdan vodorod olib, suv vodorod va kislorodning birikmasi ekanligini isbotlagan va shu sababli "Hydrogenium" — "suv hosil qiluvchi" ma'noni anglatadi.



Vodorod elementining asosiy fizik-kimyoviy tavsifnomasi. Ionlanish energiyasi — 13,6 ev, elektromanfiyligi — 2,1, elektronga moyilligi — 0,75, atom radiusi — 0,053 nm. Birikmalarida namoyon qiladigan oksidlanish darajalari -1, 0, +1. Uch xil izotop: ^1H (vodorod yoki protiy); ^2H (deyteriy — D) va ^3H (tritiy — T) holida uchraydi. Uchinchi izotopi radioaktiv xossaga ega bo'lib, yadro reaksiyalari natijasida hosil bo'ladi. Protiiy va deyteriy tabiiy izotoplar bo'lib, ular 1 ta deyteriyga 6800 ta protiiy to'g'ri keladigan miqdoriy nisbatda bo'ladilar.

Vodorodning tabiatda tarqalishi. Tabiatda juda kam miqdorda (tabiiy gazlar va vulqon gazlari tarkibida) erkin holda uchraydi. U juda ko'p miqdorda quyosh sistemasida (termoyadro reaksiyasi tufayli) mavjud.




Quyoshning qariyb yarmi, yulduzlar, Yupiter. Saturn planetalarining asosiy qismi vodoroddan iborat. Vodorod suv massasining 11,12% ini tashkil etadi. O'simliklar va hayvonlar organizmida, neft va gaz tarkibida vodorod asosiy elementlardan biri sifatida mavjud.


Olinishi. Vodorodni laboratoriya sharoitida kislotalarga (HNO_3 dan tashqari) Zn, Mg metallarini ta'sir ettirib olinadi:



Aktiv metallarning suv bilan ta'siri natijasida ham vodorod olish mumkin:



Sanoatda vodorod turli usullar bilan olinadi: a) Suvni elektroliz qilish:





Bu jarayonning unumini oshirish uchun suvda Na_2SO_4 , KNO_3 , KOH , NaOH kabi kuchli elektrolitlar eritilib, elektroliz qilinadi. Bu usuldan foydalanib, laboratoriyada ham vodorod olish mumkin.

b. Suvni konversiyalash (buzish, o'zgartirish). Suv bug'lari cho'g'lanib turgan ko'mir (koks) ustidan o'tkaziladi:




Hosil bo'lgan gazlar ($\text{CO} + \text{H}_2$) aralashmasi "suv gazi" yoki sintez gazi deb ataladi.

v. Metanni konversiyalash bilan:



g. Metanni piroliz qilish va chala oksidlash reaksiyasi yordamida:




Fizikaviy xossalari. Vodorod ikki atomli molekulyar gazsimon modda. Rangsiz, mazasiz, hidsiz, havodan juda engil ($\rho=0,089 \text{ g/l}$), suvda juda oz eriydi (10°C da $0,09 \text{ g}$). $-252,85^\circ\text{C}$ da suyuqlanib, $-259,25^\circ\text{C}$ da qattiq holatga o'tadi.

Kimyoviy xossalari. Vodorodning kimyoviy xossasi uning atomida 1 ta elektron borligi va odatdagi sharoitda 2 atomli molekula — H_2 hamda uning "dissotsilanish" (parchalanish) energiyasi ancha yuqori (435 kJ/mol) ekanligi bilan tushuntiriladi.


Atomar holdagi vodorod xona sharoitida juda qisqa vaqt mavjud bo'lib, tezda H_2 ni hosil qiladi:

$\text{H} + \text{H} \rightarrow \text{H}_2$ ko'pincha atomlar vodorod kislotalarga metall ta'siri, suvning elektrolizi jarayonida hosil bo'ladi.


Vodorodning metallmaslar bilan ta'siri. Molekulyar vodorod havo kislorodi ta'sirida ko'kimtir alanga berib yonadi. 2 hajm vodorod va 1 hajm kislorod gazlari aralashmasi "**qalldiroq gaz**" deb ataladi. Reaksiya portlash bilan boradi, juda xavfli:



Bunda katta issiqlik chiqadi va temperatura 2600°C gacha etadi. Bu reaksiyadan o'tga chidamli metallarni qirqish va payvandlashda foydalaniladi. Vodorod xlor bilan quyosh nuri ta'sirida, boshqa galogenlar bilan bir oz qizdirilganda reaksiyaga kirishib, qaytaruvchilik xossasini namoyon qiladi, gazsimon, suvda eruvchi birikmalarni hosil qiladi:



Oltinugurt, fosfor, azot va uglerod ma'lum sharoitda vodorod bilan birikib, tegishli birikmalarni hosil qiladilar. Bu reaksiyalarda ham vodorod +I oksidlanish darajasiga o'tib, qaytaruvchi xossasini namoyon qiladi:




Bu birikmalarning barchasi odatdagi sharoitda gazsimon moddalar bo'lib, ularda **qutbli kovalent bog'** mavjud, ularning barchasi suvda eriydi.

Vodorod qizdirilganda metallar bilan birikadi. Bunda vodorod atomi metall atomidan elektronni biriktirib olishi tufayli oksidlovchilik xossasini namoyon qiladi:






Bu birikmalar **metall gidridlari** deb ataladi va qattiq holda bo'lib, ularda bog'lanish **ionli tabiatga** ega. Shu sababli bu moddalar suvda yaxshi erish bilan birgalikda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga kirishib, metall gidroksidi va vodorod gazini hosil qiladi:



Yuqoridagi metallar va metallmaslarning vodorod atomi bilan ta'sirlashuvi vodorodning bir vaqtda galogenlarga o'xshash gazsimon holatga o'tishi va ular singari oksidlovchilik xossasini namoyon qilib, (-I) oksidlanish darajasidagi birikmalarining hosil bo'lishi bilan boradi. Ikkinchi tomondan ishqoriy metallar singari bitta elektronini oson berib (qaytaruvchi), (+I) oksidlanish darajasidagi birikmalar hosil qiladi. Shu sababli, davriy sistemada vodorod elementi ham I, ham VII gruppaga kiritilgan.

Vodorod gazi kuchli qaytaruvchi modda sifatida ba'zi metallarning oksidlari bilan ta'sirlashib, metallarni oksidlaridan siqib (ajratib) chiqaradi. Bu reaksiyalardan foydalanib kukunsimon metallar olinadi:




O'simliklardan olinadigan moylar o'z tarkibida bir yoki bir necha qo'shbog'ga ega. Bu moylardan sun'iy yog'lar olish uchun ular vodorod gazi bilan qayta ishlanadi (gidrogenlanadi). Shu usul bilan oziq-ovqat sanoati mahsulotlaridan margarin ishlab chiqariladi. Vodorodning keng

tarqalgan birikmalari qatoriga organik moddalar, neft mahsulotlari, tabiiy gazlar, suv va vodorod peroksidi kiradi. Ularni alohida o'rganib chiqamiz.

XVI.3. Kislorod (O, Z = 8)

Tabiatda tarqalishi. Kislorod tabiatda keng tarqalgan element (52,3%). Turli minerallar, rudalar va suv tarkibida kislorod bo'ladi. Kislorod havoning hajmi jihatidan 20,9% ni tashkil etadi. Litosfera, atmosfera va gidrosferada eng ko'p uchraydigan element kisloroddur. Kislorod uch xil izotop: ^{16}O (99,76%), ^{17}O (0,037%) va ^{18}O (0,203%) holida mavjud.

Olinishi. Kislorod laboratoriyada Bertole tuzi KClO_3 ni, KMnO_4 ni va nitratlarni qizdirish yo'li bilan olinadi:




Bundan tashqari, laboratoriya sharoitida suvni, ishqorlar va kislorodli kislotalar tuzlarining eritmalarini elektroliz qilib kislorod olinadi. Texnikada kislorod suyuq havoni rektifikatsiyalab va suvni elektroliz qilish usuli bilash olinadi. Havoni rektifikatsiyalashda yuqori bosim ostida havo juda past temperaturada suyultiriladi. Shunda havo tarkibidagi har bir gaz suyuq holga o'tadi. Kislorod -183°C da suyuladi va ajratib olinadi.

Fizikaviy xossalari. Kislorod $-218,9^\circ\text{C}$ da qattiq holga o'tadi. Suyuq va qattiq holdagi kislorod paramagnitlik xossasi tufayli magnitga tortiladi. Kislorodning ikki xil allotropik shakli bo'lib, kislorod (dikislorod) — O_2 va ozon (trikislorod) — O_3 dir.

Kislorod rangsiz, mazasiz, hidsiz gaz. Havodan bir oz og'ir ($\rho = 1,4^\circ \text{ g/l}$). Suvda juda kam eriydi. 1 l suvda 20°C da 25 ml kislorod eriydi. Yonmaydi, lekin yonishga yordam beradi.


Kimyoviy xossalari. Kislorodning kimyoviy xossalari uning elektron tuzilishi va davriy sistemadagi o'rni bilan tavsiflanadi ($1s^2 2s^2 2p^4$):



Elektron formulaga binoan har bir kislorod atomida ikkitadan toq elektronlar bo'ladi. Shu sababli kislorod molekulasida uning atomlari orasida ikkilamchi bog' bo'lib, kislorod atomlari II valentli, oksidlanish darajasi nolga teng. Qutbsiz molekula. Suyuq yoki qattiq holga o'tganda $:O \equiv O:$ yoki $:O \equiv O:$ tuzilish ega bo'ladi.

Bu tuzilishga ko'ra har bir kislorod atomida bittadan toq spinli elektron bo'lib, bunday agregat holatlarda kislorod **paramagnit xossali** bo'ladi, ya'ni suyuq va qattiq holdagi kislorod **magnitga tortilish xossasiga** ega bo'ladi. Kislorod molekulasidagi bog'ning uzunligi $r_{(O-O)} = 1,207 \text{ \AA}$ bo'lib, ikkilamchi bog'ga to'g'ri keladi, shu sababli uning atomlarga parchalanish energiyasi 494 kJ/mol . Kislorod molekulasi ultrabinafsha nur ($\lambda = 190 \text{ nm}$) ta'sirida ham atomlarga parchalanadi (fotolizlanadi).

Kislorod odatdagi sharoitda metallar, metallmaslar umuman davriy jadvaldagi *geliy, neon va argondan* boshqa barcha elementlar va turli moddalar bilan reaksiyaga kirishadi. *Bu reaksiyalarda kislorod asosan oksidlovchi xossalarini namoyon qiladi:*



Bu reaksiyalarning barchasida issiqlik energiyasi ($\Delta H < 0$) va yorug'lik energiyasi ajralib chiqadi, ya'ni yonish jarayoni sodir bo'ladi. Yonish jarayonlarida asosiy komponentlardan biri tarkibida kislorod saqlagan gazsimon aralashma — havo bo'lib, havoda kislorod miqdori qanchalik ko'p bo'lsa (toza kislorod qo'shish yo'li bilan) yonish jarayoni tezlashadi va ko'p issiqlik ajralib chiqadi. Yonish reaksiyalarining mahsuloti oksidlardir.


Tabiatda (yoki boshqa hollarda) sodir bo'ladigan chirish, shu'lananish, nafas olish jarayonlarining barchasi molekulyar kislorod ishtirokida borib, ularning asosida ham kislorodning oksidlovchilik xossalari yotadi.

Faqat bitta element — F (ftor) bilan kislorod ta'sirlashsa qaytaruvchi xossasini namoyon qiladi:



Chunki kislorodning elektromanfiyligi (3,5) flornikidan (4,0) kichik bo'lib, kislorod fluor atomiga elektron beradi va +2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. OF_2 — *kislorod fluorid* deyiladi.

Kislorod elektr razryadi ta'sirida ikkinchi allotropik shakli — ozonga aylanadi:




Ozon (O_3) (grekcha “ozonos” — “hidli”, 1840 y, Shyonenbeyn aniqlagan), o'ziga xos hidli, ko'kimtir rangli, mazasiz gaz. Diamagnit, zaharli modda, -112°C da suyuqlanadi, suvda yaxshi eriydi. Suyuq ozon to'q-ko'k rangli suyuqlik, $-192,7^\circ\text{C}$ da binafsha rangli qattiq moddaga aylanadi.


Olinishi. Laboratoriyada maxsus asbob — ozonatorida hosil qilinadi. Uni suvning radiolizi, kislorodning fotolizi natijasida hosil qilish mumkin. Ozon molekulasida barqaror, yuqori konsentratsiyada portlab parchalanadi.




Ozonning oksidlovchilik xossalari kislorodga qaraganda kuchliroq. Shuning uchun odatdagi sharoitda kimyoviy passiv elementlarni ham oksidlay oladi:



Yoki



Ishqoriy metallar ozon bilan reaksiyaga kirishib qizil rangli ozonidlarni hosil qiladi. Masalan:




Ozonning bor yoki yo'qligini aniqlash uchun KJ eritmasi orqali havo o'tkaziladi (yoki eritma ochiq qoldiriladi). Ozon kuchli oksidlovchilik xossasi tufayli



reaksiya natijasida yod ajralib chiqadi, eritma avval sariq, keyin qo'ng'ir rangga kiradi. Bu *ozonni aniqlovchi sifat reaksiyasi bo'lib, asosiy xarakterli*



belgi ozon hidining yo'qolishidir. Undan ichimlik suvini tozalashda, havoni dezinfeksiyalashda qog'oz va ip-gazlamalarni ohorlashda foydalaniladi.




“Ozonlashtirilgan kislorod” da 10% gacha ozon bo'ladi. Yuqori darajada ozonga to'yingan kislorod bilan nafas olish zararli bo'lib, inson o'pkasini teshib yuborishi ham mumkin.

Shu sababli havoda ozonning hajmiy miqdori $1/1000=1/10^3$ (promille- $p.m.10^{-3}$) bo'lishi kerak.

Tabiatda ozon yer yuzidan 10–30 km balandlikda ultrabinafsha nur ta'sirida hosil bo'ladi (osmonning ko'k rangi), bu “ozon qatlami” deyiladi.

“Ozon qatlami” yer yuzida hayotni ta'minlashda juda zarur bo'lib, *birinchidan* — quyosh nuridan keladigan ultrabinafsha nurlarni o'zida yutib qolib kishilarni turli nur kasalliklari (“teri raki”) dan himoya qilsa, *ikkinchidan* — yerning infraqizil nurlarini o'ziga yutib, yer yuzini “sovib ketish” dan saqlaydi. Shu sababli “Ozon qatlami”ning tuzilishi keyingi yillarda katta ekologik muammolarga aylanayapti.

Ozon molekulasida (OO_3) kislorod atomlari turli oksidlanish darajalari va valentlikka ega. Bu molekulani quyidagicha tasavvur etish mumkin:



Molekula burchakli tuzilishga ega, chunki markaziy atom sp^2 gibridlanishga ega. Umumiy oksidlanish darajasi $0+1-1=0$ ga teng. Valentlik esa $1+II+III=VI:3=II$.

Kislorod valentligi II, III va IV bo'lishi mumkinligini gidroksoniy ioni H_2O^+ hosil bo'lishida ham ko'rish mumkin. Bunda kislorod valentligi III ga teng.

XVI.4. Suv (H_2O)

Kislorodning vodorod bilan hosil qilgan asosiy birikmasi suv (H_2O) dir. Suv tarkibida massasi jihatdan 88,8% kislorod va 11,2% vodorod bor.


Fizikaviy xossalari. Suvning $+4^{\circ}C$ dagi zichligi 1 g/sm^3 ga teng. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 1 kal/g yoki $4,18 \text{ J/g}$ ga teng. Demak, 1 g suvni $1^{\circ}C$ ga isitish uchun $4,18 \text{ kJ}$ issiqlik sarf qilinadi. Suv tirik

organizmlar va o'simliklar uchun eng kerakli modda hisoblanadi, chunki suv yaxshi erituvchidir. Tirik organizmlar va o'simliklar ozuqa moddalarni suv orqali tabiatdan qabul qiladilar. Suvning molekulari o'zaro vodorod bog'lari orqali bog'langan. Shu sababli xona temperaturasida suyuq bo'ladi, 0°C da muzlaydi, 100°Cda qaynaydi.

Suvning tarkibidagi vodorod izotoplari turiga ko'ra: H₂O (oddiy), D₂O (og'ir) va T₂O(o'ta og'ir) suv bo'ladi. Lekin tabiatda asosan H₂O holida uchraydi.

Og'ir suvning fizikaviy xossalari: zichligi 1,1005 g/sm³, t_{erit}^o=3,8°C, t_{qayn}^o=101,4°C. Og'ir suvda kimyoviy reaksiyalar sekinroq boradi. H₂O ni uzoq vaqt elektroliz qilganda elektrolizyorda D₂O ham to'planadi. Undan moddalarning spektral xossalari o'rganishda (vodorod — deyteriy almashinuvi) va yadro reaktorlarida neytronlardan sekinlashtirgich sifatida foydalaniladi.

Kimyoviy xossalari. Suv molekulasida vodorod-kislorod bog'i qutbli bog'lanish bo'lganligi va ularning o'zaro 104° burchak ostida joylashganligi sababli uning molekulari qutblangan.




20-rasm. Suv molekulasining qutbliligini ko'rsatuvchi sxema

a — suv molekulasining fazoviy tuzilishi.

b — suv molekulası tashqi elektr mayonida;

d — suv molekulasining qutbli ekanligini va doimiy dipol momentiga ega ekanligini ko'rsatuvchi sxema

Shu sababli oddiy sharoitda metall va metallmaslar (flor va xlor) bilan reaksiyaga kirishadi:




Suv molekulari vodorod bog'lanish orqali bog'langan. Shu sababli oddiy sharoitda suv suyuq modda.

Suvda ko'pchilik moddalar eriydi va suvning molekulari turli ionlar bilan gidratlar hosil qiladi. Suvning bu xususiyatini quyidagi 21-rasmdan ko'rish mumkin.




Suv ishqoriy va ishqoriy-yer metallar bilan ta'sirlashib ishqorlarni hosil qiladi:




Yuqori temperaturada suv bug'i boshqa metallar bilan ham birikib oksid hosil qiladi:




Suv ko'pgina murakkab moddalar bilan reaksiyaga kirishadi:




Bu reaksiyalar natijasida tegishli asos, kislota yoki kristallgidratlar hosil bo'ladi:



Suv ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi vazifasini bajara oladi. Chunki suvning tarkibida H^+ va O^{2-} mavjuddir. Shu sababli suv metall gidridi bilan reaksiyaga kirishib, oksidlovchi:



Kislorodni biriktirib olib vodorod peroksid hosil qilish reaksiyasida qaytaruvchi bo'la oladi:



Sanoatda ichimlik suvni tayyorlash

Iste'mol uchun va texnologik jarayonlarni amalga oshirish uchun suv hayot manbai, erituvchi, xomashyo va energiya tashuvchi vosita vazifalarini

bajaradi. Suvning kundalik hayotda o'ta muhim modda ekanligi e'tiborga olinib, u maxsus tayyorlash jarayonlaridan o'tadi.

Bu jarayon quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:


1. *Tabiiy suvni mexanik qo'shimchalardan tozalash-tindirish.* Bunda oqib keladigan suv katta sig'imli inshootlarga yig'iladi va ma'lum muddat saqlab tindiriladi.

2. *Tindirish bosqichidan keyin suvni unda "muallaq" holda qoladigan mikroeterogen zarrachalardan tozalash uchun bu zarrachalar koagulyatsiyalanadi.* Bu jarayonda suvga $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ va CuSO_4 kabi elektrolitlardan tegishli miqdorda qo'shiladi. Bu moddalar koagulyantlar deyiladi, chunki suvdagi muallaq zarrachalar musbat va manfiy zaryadli bo'lgani sababli, bu kuchli elektrolitlar Fe^{3+} , SO_4^{2-} , Al^{3+} , Cu^{2+} ionlarini hosil qilib, zarrachalarni o'zlari bilan yirik zarrachalar hosil qilib cho'kmaga tushiradi.

3. *Suvni filtrlash.* Ba'zi hollarda yuqoridagi ikkala bosqichda ham suvni mexanik qo'shimchalardan tozalash imkoniyati bo'lmasa u "mato"li, qog'ozli yoki boshqa turdagi filtrlar orqali o'tkazilib, tozalanadi.

4. *Suvni dezinfeksiyalash.* Suvni unda mavjud bo'lgan mikro-organizmlar, mikroblar, zaharli kimyoviy moddalardan tozalash uchun xlor gazi, xlorli ohak solingan naychalar, ozon, kislorod gazi bilan qayta ishlanadi. Bu moddalar kuchli oksidlovchi xossalariga ega bo'lgani uchun mikroblar va zaharli kimyoviy moddalarni oksidlab zararsizlantiradi.

5. *Suvni deaeratsiyalash.* Suv unda erigan CO_2 , SO_2 , O_2 , Cl_2 kabi gazlardan tozalash uchun gazsizlantiriladi. Bunda suv maxsus qurilmalarda aylanma harakatga keltirilib, gazlar chiqarib yuboriladi.



21-rasm. Suv molekularining turli ionlar bilan gidratlar hosil qilishi.



6. *Suvning pH ini aniqlash.* Suvda H^+ va OH^- larning miqdori (pH yoki pOH) maxsus asboblari pH-metr, ionomerlar yordamida doimiy o'lanib, nazorat qilib boriladi.

7. *Suvning qattiqligini aniqlash va uni yumshatish.* Sanoati rivojlangan hududlarda texnologik jarayonlarda foydalanilgan suvlar "oqava suv"lar deyilib, ulardan foydalanish uchun bu suvlarni ham yuqoridagi usullar (birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi usullar) yordamida tozalanadi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, iste'mol va sanoat ehtiyojlari uchun suvni yaroqli holga keltirish katta mehnat va mablag' talab qiladigan ekologik va iqtisodiy tadbirdir. Shu sababli har qanday ishlab chiqarish jarayonida, turmushda suvdan tejab foydalanish zarur!

XVI.5. Suvning qattiqligi va uni yo'qotish usullari

Suvda turli tuzlar, ayniqsa, Ca^{2+} va Mg^{2+} — ionlari tutgan tuzlarning eriganligi tufayli "suvning qattiqligi" yuzaga keladi.

Suvning qattiqligi deb, 1 litr (1000 ml) suvda erigan Ca^{2+} va Mg^{2+} lar tuzlarining "mg · ekv" (milligram ekvivalent) miqdoriga aytiladi.

Shu tushunchaga asosan "suvning qattiqligi" quyidagicha hisoblanadi:

$$\text{Qattqlik} = \frac{|Ca^{2+}|}{20,04} + \frac{|Mg^{2+}|}{12,16} = \frac{m_{Ca^{2+}}}{20,04} + \frac{m_{Mg^{2+}}}{12,16} \quad (\text{mg} \cdot \text{ekv/l})$$

Suvning qattiqligi uch xil: a) *vaqtinchalik*, b) *doimiy*, v) *umumiy* bo'ladi.

a. *Vaqtinchalik qattqlik* suvda erigan $Ca(HCO_3)_2$, $Mg(HCO_3)_2$ (ba'zan $Fe(HCO_3)_2$ bo'lishi ham mumkin) tuzlar tufayli yuzaga keladi. Shuning uchun karbonatli qattqlik ham deyiladi. Buni vaqtinchalik qattqlik deyilishiga sabab, suv qaynatilganda bu qattqlik yo'qoladi:



Shu sababli suv qaynatilgan idishlarda "quyqa", ya'ni suvda erimaydigan karbonat tuzlari hosil bo'ladi. Bu usulda suvni yumshatganda suvning qattqligi 5—7 mg · ekv/l gacha kamayadi.

b. *Doimiy qattqlik* suvda erigan $CaCl_2$, $CaSO_4$, $MgCl_2$ va $MgSO_4$ tuzlari tufayli yuzaga keladi. Bu qattqlik suvni qaynatilganda yo'qolmaydi.

d. Doimiy qattqlik bilan vaqtinchalik qattqliklarning yig'indisi **umumiy qattqlik** deyiladi. Suvning umumiy qattqligiga asoslanib, suv turli qattqlik darajasidagi turlarga ajratiladi.

I. Agar qattqlik 0 dan $4 \text{ mg} \cdot \text{ekv/l}$ (yoki 4°) bo'lsa, *juda yumshoq* suv deyiladi. Bunga distillangan, yomg'ir va qor suvlari kiradi.

II. Qattqligi $4-7 \text{ mg} \cdot \text{ekv/l}$ (4° dan 7° gacha) bo'lsa, bunday suv *yumshoq suv* deyiladi. Bunday suv kishilar iste'mol qilishi uchun yaroqli bo'ladi. Bu suvga ichimlik suvlari, ba'zi daryo va ko'l suvlari kirishi mumkin.

III. Qattqligi $7-14 \text{ mg} \cdot \text{ekv/l}$ bo'lgan suv *qattiq suv* deyiladi. Bu suv iste'mol uchun ham, texnologik jarayonlar uchun ham yaroqsiz bo'ladi.


IV. Qattqligi $14 \text{ mg} \cdot \text{ekv/l}$ dan (14° dan) yuqori bo'lgan suv *o'ta qattiq suv* deyiladi.

Suvning qattqligini yo'qotish uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

Fizikaviy usullar. Suvni qaynatish va distillash bu usulning asosini tashkil etadi. Qaynatganda vaqtinchalik qattqlik yo'qoladi, suv qisman yumshaydi. Distillanganda suvning umumiy qattqligi yo'qoladi, suv to'liq yumshaydi.

Kimyoviy usullar. Bu usullarga ishqorlash, sodalash, fosfatlash va ionitlar bilan ishlash kiradi. Bularning barchasi suvda erigan tuzlarni kimyoviy reaksiya natijasida suvda yomon eruvchi birikma holiga o'tkazishga yoki ionitlar vositasida ion almashuvi tufayli suvli eritmadan chiqarib yuborishga asoslangan.

Ishqorli usulda suvning qattqligini yo'qotish uchun unga tegishli miqdorda NaOH yoki Ca(OH)_2 qo'shiladi. Bunda karbonatli qattqlik yo'qoladi:



Ishqorli usul bilan suvning qattqligini to'liq yo'qotib bo'lmaydi. Bu usul oxirgi vaqtlarda deyarli qo'llanilmaydi.


Sodali usulda suvga uning qattqligi qiymatidan kelib chiqqan holda Na_2CO_3 yoki $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ qo'shiladi:



Ko'rinib turibdiki, sodali usulda suvning umumiy qattqligini ancha ($0,5-0,08 \text{ mg} \cdot \text{ekv/l}$) gacha kamaytirish mumkin.





Fosfatli usulda suvning qattiqligini yo'qotishda suvga tegishli miqdorda Na_2HPO_4 , K_2HPO_4 , NaH_2PO_4 yoki KH_2PO_4 , Na_3PO_4 , K_3PO_4 tuzlari qo'shiladi. Bu usulda Mg^{2+} va Ca^{2+} ionlari fosfatlari holida cho'kmaga tushadi:



Fosfatli usulda suvning qattiqligi 0,1–0,03 mg·ekv/l gacha kamaytiriladi.

Keyingi yillarda polimer moddalar kimyosi keskin rivojlanishi bilan tarkibida Na^+ , H^+ — kationlari, Cl^- , OH^- — anionlari saqlagan polielektrolit moddalar (kationitlar va anionitlar) sintez qilingan. Ularning umumiy formulasi $\text{R}-\text{H}$; $\text{R}-\text{Na}$ va $\text{R}-\text{Cl}$, $\text{R}-\text{OH}$ holida belgilanib, bu moddalar suvga solinsa yoki suv bilan to'ldirilgan "kolonka"lar orqali o'tkazilsa, suvning qattiqligini tashkil etuvchi Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari, SO_4^{2-} , HCO_3^- ,

Cl^- ionlari H^+ (Na^+)lar bilan va OH^- (Cl^-) ionlari bilan almashinib, suvning qattiqligi yo'qoladi:



Ajralib chiqqan vodorod va gidroksil ionlari o'zaro birikib suv hosil qiladi:



Ionitli usul keyingi vaqtda juda keng qo'llanilayotgan, kam xarj va ekologik jihatdan juda qulay usuldur.


XVI.6. Vodorod peroksid

Tarkibida ($-O-O-$) — peroksid gruppasi bo'lgan moddalar peroksidlar deyiladi.

Ularda kislorod atomlari ikki valentli bo'lsalar-da, $-I$ oksidlanish darajasiga ega. Shu sababli bu birikmalar o'ziga xos tuzilishli va xossaligi moddalardir. Eng keng tarqalgan peroksid — vodorod peroksiddir (H_2O_2).

Fizikaviy xossasi. Rangsiz, mazasiz, suvga nisbatan quyuqroq ($\rho_{H_2O_2}=1,44 \text{ g/sm}^3$) suyuqlik. $-0,43^\circ\text{C}$ da muzlaydi. $150,2^\circ\text{C}$ da qaynaydi. Vodorod peroksidning tuzilishi 22-rasmda keltirilgan.


$E_{-O-O-}=210 \text{ kJ/mol}$, $E_{H-O}=468 \text{ kJ/mol}$



22- rasm. Vodorod peroksidi molekulasining tuzilishi.


Suvda yaxshi eriydi. 30% li eritmasi “pergidrol” deyiladi. Ko'pchilik hollarda uning suyultirilgan 3% li eritmasi ishlatiladi.

Olinishi. Hozirgi vaqtda sanoatda asosan persulfat kislota yoki uning tuzlariga suv ta'sir ettirib olinadi.





Dipol momenti $\mu=2,1 \text{ D}$ bo'lgani uchun kuchli qutblangan molekula. Dipol momenti suvnikiga nisbatan kattaroq bo'lganligi uchun molekularlar o'rtasida oriyentatsion ta'sir va vodorod bog'lari kuchliroq bo'ladi va shu sababdan u suvga nisbatan yuqori temperaturada qaynaydi.


Vodorod peroksidning tuzilish formulasi $H-O-O-H$ dir. Kislorod atomlari $-O-O-$ ko'priq orqali birikadi. Kislorod ko'prigining uzilishi natijasida, sharoitga qarab, vodorod peroksid oksidlovchilik yoki qaytaruvchilik xossalari namoyon qiladi:




Bu reaksiyada H_2O_2 oksidlovchi sifatida ishtirok etadi:



Bu reaksiyada H_2O_2 qaytaruvchi vazifasini bajaradi:



Oksidlanish potensialning qiymatiga qarab, peroksidlarning oksidlovchi xossalari qaytaruvchi xossaloriga nisbatan kuchliroq ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin:




Kuchsiz kislota xossasiga ega:



($K_{\text{dis}} = 2,24 \cdot 10^{-12}$). Shu sababli metallarning peroksidlari Na_2O_2 , K_2O_2 ni O_2^{2-} — ionining tuzlari deyish mumkin.

Vodorod peroksid beqaror modda bo'lib, yorug'lik ta'sirida o'zidan kislorod chiqarib (disproporsiyalanib), suvga aylanadi.



Shu sababli uning eritmasi yorug'lik tushmaydigan (qora) idishlarda, salqin joyda saqlanishi kerak.

Vodorod peroksid tibbiyotda, dezinfeksiya maqsadlarida, yoqilg'ilar-ning yonishini kuchaytirishda, raketa yonilg'isida, to'qimachilik va qog'oz

sanoatida oqartirishda ishlatiladi. Peroksobirikmalar kuchli oksidlovchilari sifatida ishlatiladi.

Savollar

1. Vodorodning davriy sistemada o'ziga xos o'rni va qaytaruvchilik xossasini izohlab bering.
2. Vodorod — oksidlovchi ekanligini misollar bilan izohlang.
4. Vodorodni konversiya usuli bilan olishni tushuntiring.
5. Suyuq havoni rektifikatsiyalash bilan qanday moddalar olinadi?
6. Ozonning asosiy kimyoviy xossalarini tushuntiring.
7. Peroksidlar qanday birikmalar?
8. Vodorod peroksidning oksidlovchilik, qaytaruvchilik va kislotali xossalarini tushuntiruvchi reaksiyalar tenglamalarini yozing.
9. O_3 molekulasi tuzilishi, bog'lanishlar tabiatini tushuntiring.
10. Suvning metallar va metallmaslar bilan o'zaro ta'siri reaksiyalarini yozing.
11. Suvni texnologik jarayonlar uchun tayyorlashning asosiy bosqichlarini tushuntiring.
12. Suvning qattiqligi nima? Uning turlarini tushuntiring.

XVI.7. Inert gazlar

yoki VIII A gruppacha elementlari

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *inert (nodir) gazlar, geliy, neon, argon, kripton, ksenon.*

Nodir (inert) gazlar yoki VIII A gruppacha elementlari qatoriga He — geliy, Ne — neon, Kr — kripton, Xe — ksenon va Rn — radon kiradi. Nodir gazlar to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar N. A. Reley (1880 y.), N. A. Morozov (1883 y.) va U. Ramzay (1894 y.) lar tomonidan keltirilgan va ularning mavjudligi isbotlagan.

Nodir gazlar erkin holatda havo, quyosh sistemasida, tabiiy gaz tarkibida bo'ladi va havoni suyuqlantirish yo'li bilan olinadi.

Quyidagi jadvalda havoning tarkibi va nodir gazlarning qaynash temperaturallari keltirilgan.

9-jadval
Havo tarkibidagi gazlar va ularning qaynash temperaturasi

Gaz	Havodagi hajmiy miq. %	$t_{\text{qay}}, ^\circ\text{C}$
Havo	100	-190
N_2	78,09	-195,8
O_2	20,95	-183
CO_2	0,030	-78,5
H_2	0,00005	-252,8
O_3	$1 \cdot 10^{-6}$	-111,9
He	0,0005	-268,9
Ne	0,0018	-245
Ar	0,9325	-185,8
Kr	0,000108	-152,9
Xe	0,000008	-108
Rn	$0,6 \cdot 10^{-17}$	-61,8

Bu elementlar atomlarining geliydan radonga tomon yadro zaryadi va atom radiuslari ortib borishi bilan elektron qobig'ining qutblanishi ham ortib boradi.

Shu ustunda bu elementlarning reaksiyaga kirishuvchanligi ham ortib boradi, ionlanish potentsiali esa kamayib boradi.

10-jadval


Inert gazlarning xossalari

Element	Tartib raqami	tuzilishi	At. rad (nm)	Ionlanish potentsiali (kJ/mol) va nomi
He	2	$1s^2$	0,093	2372 geliy "helios" — "quyosh"
Ne	10	$2s^2 2p^6$	1,12	2081 "neos" — "yangi"
Ar	18	$3s^2 3p^6$	1,54	1521 "argos" — "yalqov"
Kr	36	$3d^{10} 4s^2 4p^6$	1,69	1350 "kryptos" — "yashirin"
Xe	54	$4d^{10} 5s^2 5p^6$	1,90	1171 "xe nos" — "nomalum"
Rn	86	$5d^{10} 6s^2 6p^6$	2,20	1037 "radios" — "nur"

Radonning ionlanish potentsiali ksenonning ionlanish potentsialidan kamroq bo'lsa ham, radioaktivligi sababli radon xossalari ksenonga nisbatan kamroq o'rganilgan. Hozirgi vaqtda nodir gazlarning xossalari asosan ksenon misolida o'rganilgan.

Nodir gazlar ma'lum sharoitda suv bilan klatratlar, ya'ni gidratlar hosil qiladi: $\text{Ar} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Kr} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Xe} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ushbu birikmalar hosil bo'lishida valent bog'lar hosil bo'lmaydi, ammo muz tuzilishidagi bo'shliqlar klatratlar hosil qilishda alohida ahamiyatga ega.

Kimyoviy xossalari. Bu elementlarning tashqi elektron qavatida 8 tadan juftlashgan (oktet sistemasi) elektronlar mavjud. Kimyoviy reaksiyaga kirishmaydi yoki juda qiyin kirishadi. *Geliy* oddiy sharoitda rangsiz, hidsiz, molekulasi bir atomli, inert gaz, ammo atomlari g'alayonlangan holatida molekulyar ionlar He_2^+ hosil qilishi mumkin. Oddiy sharoitda bu ionlar beqaror, etishmaydigan elektronni biriktirib olib, ikkita neytral atomga ajraladi.



Spektral analiz yordamida geliyning Quyosh atmosferasida termoyadro reaksiyalari mahsuloti sifatida mavjudligi aniqlangan:



Geliy atomi ^4_2He shu jumladan α -zarrachalar turli xil yadroviy reaksiyalar olib borishda ishlatiladi. Geliy metallarni payvandlashda inert atmosfera, havo sharlari (dirijabl)ni, meteorologik zondlarni to'ldiruvchi engil, xavfsiz gaz sifatida ishlatiladi.

Neon (Ne) atomi inert gaz u ham kuchli g'alayonlangan holatda molekulyar ion hosil qiladi: Ne_2^+ . Hozirgacha Ne ning birikmalari borligi aniqlanmagan yoki sintez qilinmagan.

Kripton (Kr), **ksenon** (Xe) va **radon** (Rn) ham bir atomli gazlar bo'lib, boshqa elementlar bilan, xususan, fluor va kislorod bilan turli tarkibli birikmalar hosil qiladi.

Ksenonning birikmalari

Inert gazlardan, dastlab Xe ning PtF_6 (kuchli oksidlovchi) bilan reaksiyasi natijasida 1962 yilda kanadalik N. Bartlett $\text{Xe}^+[\text{PtF}_6]^-$ ni sintez




qilgani uchun unga Nobel mukofoti berilgan. Reaksiya tenglamasi: $\text{Xe}^0 + \text{Pt} \cdot 6\text{F} \rightarrow \text{Xe}^{\cdot 1}[\text{Pt} \cdot 6\text{F}_6]^-$. Ksenon fluor atmosferasida alangalanadi, bu reaksiyalar ekzotermik bo'lib, XeF_2 , XeF_4 , XeF_6 , XeF_8 , XeOF_4 , XeOF_2 tarkibli moddalarni hosil qiladi.


XeF_2 rangsiz, barqaror, $t_c = 140^\circ\text{C}$, suvda eruvchanligi 25 g/l, asosli tabiatga ega, suvli eritmada gidrolizlanadi va kuchli oksidlovchi xossasiga ega:





Qizdirilganda disproporsiyalanadi:



Ksenon diflorid XeF_2 o'rin olish reaksiyasiga kirishadi:



Ksenon (IV) ning birikmalari XeF_4 va XeOF_4 rangsiz kristall moddalar. Bularda Xe ning gibrizlanish turiga ko'ra ularning tuzilishi va xossalari o'zaro farq qiladi:



Oksidlanish-qaytarilish (disproporsiyalanish) reaksiyasi bilan boradigan gidrolizlanish xossasiga ega:




Bu moddalar ham kuchli oksidlovchilik xossasiga ega.

XeO_3 — ksenon (VI)-oksidi, oq rangli, juda oson portlovchi modda. Uning molekulasini trigonal piramida tuzilishli bo'lib, kuchli oksidlovchi modda:




Kuchli oksidlovchilar ta'sirida qaytaruvchilik xossasini namoyon qiladi:




XeF_6 oktaedr tuzilishli, XeOF_4 (xona sharoitida) -28°C da kristallanadigan suyuqlik bo'lib, piramidasimon tuzilishga ega modda.


Ksenon geksaftorid amfoter xossalarini namoyon qiladi. O'zidan kuchli kislota xossasiga ega bo'lgan modda bilan reaksiyaga kirishganda, asos xossalarini namoyon etib, kation kompleks hosil qiladi:




O'zidan kuchli asos xossasiga ega moddalar bilan reaksiyaga kirishganda kislotali tabiati ustun chiqib, anion kompleks hosil qiladi:




Ksenon tuzlarining gidrolizi quyidagicha boradi. Reaksiya mahsulotlari Xe ning oksibirikmalari — tuzlari yoki to'liq oksidi va HF hosil bo'ladi:



Bariy oksoksenat Ba_2XeO_6 tuziga sulfat kislota ta'sir ettirib ksenon tetraoksidi hosil qilish mumkin:



Ksenon tetraoksid — XeO_4 ksenon (VIII) ning birikmasi bo'lib, oddiy sharoitda gazsimon modda, asta-sekinlik bilan Xe, XeO_3 va O_2 ga parchalanadi:



Nodir gazlar va ularning birikmalarini ishlatilishi:

Ksenon birikmalari — kuchli oksidlovchi moddalar. Ular yordamida amalda hamma elementlarning (hatto oltinning) eng yuqori oksidlanish



darajasidagi birikmalari hosil qilingan. Masalan: AuF_6 , BrF_3 , lar XeF_2 , yordamida olingan.

So'nggi yillarda nodir gazlarning xossalari Rossiyalik olim akademik V. A. Legasov tomonidan o'rganilgan. Nodir gazlarning fluoridlari fluorlovchi va oksidlovchi moddalar sifatida ishlatiladi. Ksenon oksidlari portlovchi modda, raketa yonilg'isi sifatida qo'llaniladi. Radioaktiv elementlar (asosan ^{235}U va ^{238}U -uran) ni bir-biridan ajratish va toza holda olishda ksenonning florli birikmalari ishlatiladi.

Neon va argon gazlari lampochkalarni, gaz yoritgich naylarni to'ldirishda qo'llaniladi. Neon lampalari qizg'ish rang berib yonadi, argon lampalari esa zangori rangda yonadi.

Nodir gazlarning kimyoviy jihatdan "beparqligi" ning sabablaridan biri ular atomlarining tashqi elektron qavatlarini ikki (Ne) va sakkiz elektron (oktet) bilan to'lib, ularning hammasi o'zaro juftlashganligidir.

Ikkinchi tomondan p-elektronlarning boshqa elektron qavatlariga (yoki orbitallarga) o'tish (toqlashish) energiyasini juda kattaligidir. Buning isboti sifatida Xe atomidagi normal holatdan ($5s^25p^6$) qo'zg'algan holatlar ($5s^25p^56s^1$; $E_{qo'zg} = 795 \text{ kJ}$); ($5s^25p^55d^1$; $E_{qo'zg} = 963 \text{ kJ}$); ($5s^25p^45d^2$; $E_{qo'zg} = 1758 \text{ kJ}$); ($5s^25p^45d^16s^1$; $E_{qo'zg} = 1926 \text{ kJ}$) ga o'tish juda katta energiya talab qiladi.

Bu miqdor energiya ikki elektronli kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'lishi hisobiga "qoplana" olmaydi va shu sababli Xe ning birikmalari uch markazli bog'lanishlar vositasida hosil bo'lgan.

Uch markazli bog'lanish Xe atomining 5p-va 2 ta F atomining 2p-orbitallari ishtirokida 3 ta uch markazli molekulyar orbitallar (MO) (bog'lovchi, bo'shashtiruvchi, bog'lamaydigan) hosil bo'lib, ular 4 ta elektron bilan to'ladi va barqaror ($E_{bog} = 120 \text{ kJ}$) bog'lar hosil bo'ladi. Bunday bog'lar hosil qilish imkoniyati He, Ne, Ar da yo'qligi sababli, bu elementlar birikma hosil qilmaydilar.

Savollar

1. Nodir gazlarning "inert"ligining asosiy sababini atom tuzilishi asosida tushuntiring.
2. Qanday inert gazlar birikmalar hosil qiladi?
3. Xe ning +4 va +6 oksidlanish darajasidagi birikmalari formulalarini yozing.
4. Xe ning birikmalari qanday xossalarga ega?
5. Inert gazlar qanday maqsadlarda ishlatiladi?

XVII bob

VA GRUPPACHA ELEMENTLARI

Asosiy tushunchalar: azot; fosfor; oq; qora va qizil fosfor; ammiak; fosfin; nitrit va nitrat ангидриди; fosfit va fosfat ангидриди; selitra; karbamid; nitrat kislota; fosfat kislota; ammoniy ioni; mineral o'g'itlar; "zar suvi".

XVII.1. VA gruppа elementlarining umumiy xossalari

Beshinchi gruppа asosiy gruppachasi elementlari azot, fosfor, mishyak, surma va vismutdan iboratdir. Ushbu gruppacha elementlarining agregat holatlari, xossalari bir-biridan keskin farq qiladi. Azot gaz holatdagi moddadir. Fosfor qattiq holatdagi metallmasdir. Mishyakdan vismutga o'tgan sari metallik xossalari kuchayadi.

11-jadvalda elementlar xossalari o'zgarishi o'z ifodasini topgan.

11-jadval

V A gruppа elementlarining xossalari

Element	${}_7\text{N}$	${}_{15}\text{P}$	${}_{33}\text{As}$	${}_{51}\text{Sb}$	${}_{83}\text{Bi}$
Elektron formulasi	$(\text{He})2s^22p^3$	$(\text{Ne})3s^23p^3$	$(\text{Ar})3d^{10}4s^24p^3$	$(\text{Kr})4d^{10}5s^25p^3$	$(\text{Xe})4f^{14}5d^{10}6s^26p^3$
$T_{\text{qizil}} \text{ } ^\circ\text{C}$	-195,8	280 (oq) 416 (qiz.)	633	1635	1560
$T_{\text{eritilish}} \text{ } ^\circ\text{C}$	-210	44,1 (oq) 590 (qiz.)	817	630,5	271,3
Zichligi ρ g/sm^3	1,25 g/l	2,3 (qiz.)	5,72	6,68	9,80
$r(\text{atom})$ nm	0,071	0,130	0,148	0,161	0,182
$r(\text{ion})$ E^{+5}	0,015	0,035	0,047	0,062	0,074
Nisbiy E.M.	3,07	2,2	2,1	1,8	1,7
Ionlanish energiyasi ev	14,53	10,49	9,82	8,64	7,3
Oksidlari E^{+5}	N_2O_5	P_2O_5	As_2O_5	Sb_2O_5	BiO_3
Kislotalari	HNO_3	H_3PO_4	H_3AsO_4		



Elementlarning gruppachada tartib raqamining ortishi bilan metallmaslik xossalari susayib, metallik xossalari ortadi. Bu elementlar birikmalarida $-3, 0, +3, +5$ oksidlanish darajalarini namoyon qiladi. Faqat azot -3 dan $+5$ gacha bo'lgan barcha oksidlanish darajasidagi birikmalarni hosil qiladi.

Vodorodli birikmalari: NH_3 , PH_3 , AsH_3 va BiH_3 ning barqarorligi N dan Bi ga tomon kamayadi. Kislородli birikmalarining (E_2O_3 , MEO_3) barqarorligi ortadi, kislotalik xossalari kuchsizlanib, suvda eruvchanligi kamayib boradi.

XVII.2. Azot (N, Z=7)


Azot V A gruppachaning birinchi elementi bo'lib, ko'p o'rganilgan metallmaslar qatoriga kiradi ($1s^2 2s^2 2p^3$).

Tabiatda uchrashi. Azot erkin holatda havoning 78,2% ($4 \cdot 10^{16}$ t) ini tashkil qilib, Yer sharidagi 0,01 og'. qism miqdori birikmalar, minerallar (neft 1,5%, toshko'mir 2,5% og'. qism) tarkibida va tirik organizmlarda uchraydi.


Olinishi. Laboratoriyada azot ammoniy nitritni qizdirib olinadi, reaksiya ikki bosqichda boradi:



Shuningdek, ammiakni Br_2 ta'sirida oksidlab olinadi:



Juda toza azot olish uchun natriy azidni termik parchalash usulidan foydalaniladi:



Sanoatda azot suyultirilgan havoni rektifikatsiyalash yo'li bilan olinadi.


Fizikaviy xossalari. Azot (N_2) rangsiz, hidsiz, mazasiz gaz. Havodan ozgina engil (28 u.b.), yonmaydi, yonishga yordam bermaydi, suvda juda oz eriydi (1 l suvda 15 ml azot eriydi). Temperatura pasayishi bilan eruvchanligi ortadi (11-jadval).

Kimyoviy xossalari. Azot molekulasini N_2 da azot atomlari orasida uchlamchi bog' $N \equiv N$ ($r_{N-N}=0,1055$ nm) bo'lib, ulardan bittasi sigma – σ va ikkitasi π – bog'lardir. Shuning uchun ham azot molekulasini juda barqaror va yuqori temperaturada atomlarga ajraladi:



Hatto 3000°C temperaturada azot molekularining dissotsilanishi 0,1% ni tashkil etadi.

Erkin holdagi azot faqat litiiy metali bilan bevosita birikib: $6Li + N_2 \rightarrow 2Li_3N$ litiiy nitridni hosil qiladi. Bunday nitridlar (Na_3N , K_3N , Mg_3N_2 , Ca_3N_2 , AlN) tegishli metallarni azot atmosferasida qizdirish bilan hosil qilinadi. Bu reaksiyalarda azot oksidlovchi xossalarni namoyon qiladi. Ularda N^{-3} holida bo'ladi. Nitridlar suvda oson gidrolizlanadi:




va tegishli asos hamda ammiakni hosil qiladi.

Azot metallmaslardan H_2 , O_2 , Cl_2 lar bilan ta'sirlashadi. Vodorod bilan ta'sirlashganda oksidlovchi, boshqa metallmaslar bilan ta'sirlashganda qaytaruvchi xossasini namoyon qiladi.

Azotning vodorodli birikmalari. Azot vodorod bilan NH_3 — ammiak, N_2H_4 — gidrazin, N_2H_2 — diimid birikmalarini hosil qiladi. Bulardan eng ko'p o'rganiladigani ammiakdir.

Ammiakning olinishi. Laboratoriya sharoitida ammoniy tuzlariga ishqorlar ta'sir ettirib olinadi (23-rasm):



Sanoatda ammiak havodan ajratib olingan azot va pirolitik vodorod gazi aralashmasini yuqori 200—1000 atm bosim, $500-550^\circ\text{C}$ temperaturada $Fe + Al_2O_3$ katalizatori ishtirokidagi reaksiyasi natijasida olinadi.



Bu qaytar jarayon bo'lgani uchun reaksiya davomida kimyoviy muvozanat yuzaga keladi. Muvozanatni siljitish shartlari to'g'risida "kimyoviy muvozanat" mavzusida batafsil tushunchalar berilgan edi.




Fizikaviy xossasi. Ammiak odatdagi sharoitda havodan engil ($\rho=0,77$ g/l), rangsiz bo'g'uvchi gaz, 1 l suvda 700 l eriydi. -33°C qaynab, -78°C da qattiq holatga o'tadi.


Suyuq ammiak moddasining bug'lanish issiqligi (1,37 kJ/g) katta bo'lgani uchun muzlatgichlarda "sovuqlik hosil qiluvchi modda" "xlado-agent" sifatida ishlatiladi.

Kimyoviy xossasi. Ammiakning kimyoviy xossasi uning elektron tuzilishi bilan izohlanadi. Dipol momenti $\mu=1,46$ D bo'lib, qutbli modda. NH_3 molekulasida uch yoqli piramida tuzilishli $r_{\text{N-H}}=1,015$ Å, $\angle\text{HNH}=107,35^{\circ}$ bo'lib, unda azot atomi orbitalari sp^3 — gibridlanganligi, bir juft elektron kimyoviy bog'lanishda ishtirok etmasdan tetraedrning uchida joylashganligi sababli kuchli elektron donorlik xossasiga ega. (24-rasm)

Bu xossasi tufayli ammiak suvda yaxshi eriydi, kislotalar va ko'pchilik metallarning tuzlari bilan o'zaro birikish reaksiyasiga kirishib turli tuz va kompleks birikmalar hosil qiladi:





Azot atomi bo'sh elektron orbitali bo'lgan vodorod atomiga bog'lanishda ishtirok etmagan elektron juftini berib, donor vazifasini bajaradi, vodorod atomi qisman bo'sh orbitali hisobiga akseptor vazifasini o'taydi. Hosil bo'lgan NH_4OH qisman ionlanadi:




Eritmada $K_d=1,8 \cdot 10^{-5}$, 1 molyarli eritmasida dissotsilanish darajasi 0,4% ni tashkil etadi. 25% li ($\rho=0,9$ g/sm³), $\text{pH}=11,8$ bo'lgan eritmasini suyultirib tegishli konsentratsiyali eritmalar hosil qilinadi. 10% li NH_4OH eritmasi "*novshadil spirti*" deyiladi. *Ammiakning har qanday konsentratsiyali eritmasi zaharlidir!*

Yuqorida aytilganidek, gaz holidagi ammiak turli kislotalar bilan birikib, qattiq holatdagi moddalarni hosil qiladi:



23-rasm. Ammiakni laboratoriyada olish.



Hosil bo'lgan tuzlar "*ammoniy tuzlari*" deyiladi va barchasi suvd yaxshi eriydi. Suvdagi eritmalarida ammoniyli tuzlardan: $\text{NH}_4\text{OOCCH}(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$, NH_4NO_2 , NH_4CNS , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ lar ham kation ham anion bo'yicha gidrolizlanadi. NH_4Cl , NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4ClO_4 kabilar faqat kation bo'yicha gidrolizlanib, eritma muhiti kislota bo'ladi:



Qattiq holdagi ammoniy tuzlarini hosil qilgan kislotalarning kuch ortib borishi bilan ularning termik barqarorligi ham ortib boradi. Shung ko'ra, NH_4NO_2 ga nisbatan NH_4NO_3 , NH_4F ga nisbatan NH_4Cl ung nisbatan NH_4I barqaror moddalardir (25- rasm).

NH_4^+ ionining radiusi $r = 1,43 \text{ \AA}$ bo'lib, kaliy ioni (K^+) radius $r = 1,33 \text{ \AA}$ ga yaqin. Shu tufayli ammoniy birikmalarining xossalari kaliyning birikmalari xossalariга o'xshab ketadi. Bu tuzlardan NH_4NO_3 — *ammoniyli selitra*, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ — ammoniy ortofosfat yoki *ammosfat* $\text{K}(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$ — kaliy diammoniy fosfat azotli va kombinatsiyalangan mineral o'g'itlar sifatida ishlatiladi. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ — ammoniy karbonat nor va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, "g'ovak" tuzilishli mahsulotlar olishchda keng qo'llaniladi:




Ammoniy tuzlari bilan ammoniy gidroksid aralashmasi



eritma muhiti doimiy ($\text{pH} = 9,2$) bo'lgan asosli bufer eritmalar hosil qilishda keng qo'llaniladi.


Gaz holdagi ammiak kuchli qaytaruvchi xossasiga ega bo'lgani uchun ba'zi passiv metallarni olishda ishlatiladi:




Natriy gipoxlorit ta'sirida ammiak molekulasida oksidlanib azotning boshqa vodorodli birikmasi N_2H_4 gidrazin (diamid)ni hosil qiladi:



Kislorod ta'sirida ammiak yonadi:



Katalizatorsiz:





Ammiakning O_2 da oksidlanishidan azotning kislorodli birikmalarini hosil qilishda foydalaniladi.

Azotning kislorodli birikmalari


Azot kislorod bilan besh xil oksid hosil qiladi: N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 , N_2O_5 .

Azot (I)-oksid — N_2O , rangsiz gazsimon modda ammoniy nitrat qizdirilganda hosil bo'ladi:



N_2O kislotalarda va ishqorlarda crimaydi. Befarq oksid.

Azot (II)-oksid — NO gazsimon modda, befarq oksid, laboratoriyada azotni yuqori temperaturada kislorod bilan ta'sirlashishidan hosil bo'ladi:



Asosan, 30—35% li nitrat kislotaga mis ta'sir ettirib olinadi:





Havo kislorodi ta'sirida oson oksidlanadi:

24-rasm.

Ammiak molekulasida elektron orbitallarning fazoviy joylashuvi va molekulaning tuzilishi.



Azot (III)-oksidi — N_2O_3 , ko'k rangli qattiq modda, quyidagi reaksiya bo'yicha hosil bo'ladi:




25-rasm.
 NH_4Cl ning termik parchalanishi.


Azot (IV)-oksidi NO_2 , qo'ng'ir rangli gaz, misni va unga o'xshash passiv metallarning konsentrlangan nitrat kislotada erishidan hosil bo'ladi:




Ba'zi metallar nitratlarining termik parchalanishidan ham NO_2 hosil bo'ladi:




Past temperaturada azot (IV)-oksidi dimerlanadi:




Azot (IV)-oksidi suvsiz nitratlar hosil qilishda, nitrit va nitrat kislotalar hosil qilishda ishlatiladi.




Azot (IV)-oksidida azot +4 oksidlanish darajasida bo'lgani uchun elektron berishi ham (ionlanish energiyasi 9,78 eV), qabul qilishi ham (elektronga moyilligi 2,5 eV) mumkin. Boshqacha aytganda, azot (IV)-oksidi disproporsiya reaksiyalariga kirishadi. Buning isboti sifatida quyidagi o'zgarishlarni ko'rsatish mumkin:



Azot (V)-oksidi (nitrat angidridi) — N_2O_5 — oq kristall, juda kuchli gigroskopik modda bo'lib, quyidagi tuzilishga ega:



Olinishi. 1-usul. NO_2 ning ozon ta'sirida oksidlanishidan N_2O_5 hosil bo'ladi:



2-usul. Nitrat kislotani degidratlab olinadi:




Uning suv bilan birikishidan kuchli nitrat kislotasi hosil bo'ladi:



XVII.3. Azot kislotalari va ularning tuzlari



Azot ikki xil kislota HNO_2 va HNO_3 larni hosil qiladi. Bulardan HNO_2 — nitrit kislota, faqat tuzlarining eritmalariga (KNO_2 , NH_4NO_2 , NaNO_2) kislota ta'sir ettirilganda hosil bo'luvchi kuchsiz kislota, $K_d = 5 \cdot 10^{-4}$:



tuzilishlarda bo'ladi.

Ishqoriy muhitda ionlanish muvozanati o'ngga siljiydi. Shu sababli nitrit kislota nisbatan uning KNO_3 , NaNO_2 va $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$ tuzlari barqaror bo'lib, ko'p ishlatiladi.

Azotning +3 oksidlanish darajasi oraliq qiymat bo'lgani uchun birikmalari ham qaytaruvchi, ham oksidlovchi xossalarini namoyon qiladi.



Nitrit kislota kuchsiz kislota bo'lgani uchun uning barcha eruvchan tuzlari gidrolizlanadi:




shu sababli eritmaları ishqoriy muhitli ($\text{pH} > 7$) bo'ladi. NH_4NO_2 eritmasi neytral muhitli bo'ladi.

Nitrat kislota — HNO_3 kuchli kislota bo'lib, och-sariq tusli, bug'lanib turuvchi, 84°C da qaynab, -42°C da qattiq holatga o'tuvchi eritma holida bo'ladi. Sanoatda 63% va 96% li ($\rho = 1,45 \text{ g/sm}^3$) eritmaları ishlab chiqariladi.

Laboratoriyada olinishi: Nitrat kislota tuzlariga kuchli kislota, asosan H_2SO_4 ta'sir ettirib olinadi:




Sanoatda nitrat kislota ammiakni katalitik oksidlab olinadi



Hosil bo'lgan NO_2 ikki usulda suvga yuttiriladi:




Bunda nitrat va nitrit kislotalari hosil bo'ladi. Nitrit kislota fraksiyasi ajratilib, azotning (III) valentli birikmalari olinadi.



Bu usulda faqat nitrat kislota ishlab chiqariladi. Hosil bo'lgan nitrat kislota yorug'lik nuri va xona temperaturasi ta'sirida qisman parchalanadi:



Nitrat kislota molekulasida azotning oksidlanish darajasi +5, valentligi IV. Unga va NO_3^- ioniga quyidagi tuzilish formulalari mos keladi:



Kuchli kislota bo'lganligi sababli quyidagicha ionlanadi:



Har qanday konsentratsiyali eritmasi oksidlovchi xossasini namoyon etadi. Shu sababli oddiy va murakkab moddalar bilan reaksiyaga kirisha oladi.

Nitrat kislota bilan metallmaslar bilan ta'siri: konsentrlangan nitrat kislota S, C, P kabi metallmaslarni ularning eng yuqori oksidlanish darajasigacha oksidlaydi:



Metallar bilan nitrat kislota bilan ta'siri: metallning faollik qatoridagi o'rni va kislota eritmasining konsentratsiyasiga bog'liq.

a) Ishqoriy va ishqoriy-yer metallari bilan konsentrlangan nitrat kislota:



b) Agar kislota suyultirilgan bo'lsa:



reaksiya mahsulotlarini hosil qiladi.

v) Konsentrlangan HNO_3 eritmasi og'ir metallar (Cu, Hg, Ag, Pb, Cd, Mn, Sn) bilan:



Suyultirilgan kislota eritmasi bo'lsa, quyidagilarni hosil qiladi:



g) Konsentrlangan nitrat kislota Fe, Al, Cr kabi metallar passivlashtiradi va ular bilan reaksiyaga kirishmaydi. Nitrat kislota eritmasi konsentratsiyasidan qat'i nazar Au ga ta'sir etmaydi. Uning t xossasidan foydalanib, Au ni Cu dan ajratishda, tilla buyumlar tekshirishda foydalaniladi.

Konsentrlangan nitrat kislota va konsentrlangan xlorid kislota 1 : 3 hajmiy nisbatdagi eritmalar aralashmasi "**Zar suvi**" deyiladi va juda kuchli oksidlovchilik xossaga ega bo'lgani uchun Au va Pt larni eritadi.



Nitrat kislota deyarli barcha metallar bilan tuzlar hosil qiladi.


Nitrat kislota tuzlari nitratlar (selitra) deyiladi. Nitratlarning barchasi suvda yaxshi eriydi. Nitratlardan ishqoriy va ishqoriy-yer metallar tuzlari suvli eritmada gidrolizlanmaydi. Boshqa metallarning, ammoniy ionining nitratlari kation bo'yicha gidrolizlanadi, eritmalar kislotali ($\text{pH} < 7$) muhitda bo'ladi.

Nitratlarning barchasi temperatura ta'sirida parchalanadi. Parchalanish mahsulotlari metall-ionining tabiatiga bog'liq bo'ladi:

a) Ishqoriy va ishqoriy-yer metallarining nitratlari:



b) Aktivlik qatorida Mg dan Cu gacha joylashgan metallar nitratlari:



d) Ag va Hg kabi metallarning nitratlari:



mexanizmi bo'yicha parchalanadi.

Ishlatilishi. Gaz holatidagi azot tez oksidlanadigan moddalar reaksiyasida va tez ayniydigan mahsulotlarni saqlashda inert muhit sifatida ishlatiladi.

Azot (I)-oksidi N_2O ning oz miqdori bilan nafas olganda inson organizmi og'riqni sezmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun uning kislorodli aralashmasi tibbiyotda **narkoz** sifatida ishlatiladi.

Azot (IV)-oksidi kuchli oksidlovchi. Sulfat kislota olishda SO_3 ni SO_2 ga aylantirishda NO_2 gazidan oksidlovchi sifatida foydalaniladi. Nitrat kislota sintezida asosiy modda sifatida ishlatiladi. Ammiakning suvdagi eritmasi, karbamid $\text{CO(NH}_2)_2$, natriy nitrat, kaliy nitrat, kalsiy nitrat, ammoniy nitrat, ammoniy sulfat — azotli o'g'itlar sifatida ishlatiladi. O'zbekistonning yirik kimyoviy ishlab chiqarish korxonalari. "Navoiy-Azot", Chirchiq "Elektrokimyo" kombinatlarida azotli o'g'itlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Azot va uning birikmalari texnikada portlovchi moddalar tayyorlashda, elektr lampalarini to'ldirishda, organik bo'yoqlar — azobirikmalari va tibbiyotda dori-darmon tayyorlashda ishlatiladi.

Nitrat kislota va azotning boshqa birikmalari kimyo sanoatida keng ko'lamda ishlatiladi.

XVII.4. Fosfor (P, Z=15)

Fosfor V guruhning azotdan keyin turuvchi elementi bo'lib, uning metallmaslik xossasi azotga nisbatan kuchsizroq namoyon bo'ladi. Lekin fosfor atomining elektron tuzilishiga ko'ra tashqi elektron qavatida $3s^2 3p^3 3d^0$ bo'sh d-orbitallarning bo'lishi bu elementning ayrim jihatlari azot elementidan farqli bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu farqlar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, azotning umumiy ionlanish energiyasi yig'indisi (266,8 Ev) fosfornikidan (176,7 Ev) katta bo'lib, fosforning +5 oksidlanish darajasidan past birikmalari qaytaruvchilar, lekin R(5+) holidagi birik


malari oksidlovchilar emas. Shu bilan birgalikda fosforning kislorodli birikmalari ancha barqaror, vodorodli birikmasi esa beqarordir.

Ikkinchidan, fosfor atomida $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 3d^0$ bo'sh orbitallarni bo'lishi natijasida tashqi qavatdagi 2 ta $3s^2$ elektronning toqlashuvi ularning o'zaro gibridlanishi sababli $sp^3 d$ (k.s.=5), $sp^3 d^2$ (k.s.=6) bo'lgan valent imkoniyatlari paydo bo'ladi. Bunga qo'shimcha 3d-orbitallar aseptor vazifasini bajarishi va ularga donor atomlardan elektronlar ko'chirilishi sabab bo'ladi. Shu boisdan fosforning turli polimer tuzilishli birikmalari asosan, kremniy va oltingugurt singari (gorizontal o'xshashlik) kislorod va flor bilan birikmalar hosil qilishga moyilligi kuchli.

Fosforning tabiatda tarqalishi. Fosfor tabiatda erkin holda uchramaydi. Uning asosiy qismi fosforli apatitlar $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$ fosforit $Ca_3(PO_4)_2$, holda, ko'pchilik oqsil, nuklein kislota, fosfolipidlar hamda suyak va tishlarda uchraydi.

Fosforning allotropik shakl o'zgarishlari 3 xil bo'lib, ulardan **oq fosfor (P_4)** — zichligi $1,82 \text{ g/sm}^3$ bo'lgan mumsimon modda. $44,1^\circ\text{C}$ da suyuqlanadi, 275°C da qaynaydi. Qorong'uda shu'lalanuvchi, zaharli modda. Suvda erimaydi. Benzol, uglerod disulfidda, efrida eriydi.

Yorug'lik ta'sirida sekinlik bilan qizil fosforga aylanadi. Bu o'zgarish $280-340^\circ\text{C}$ da juda tez yuz beradi:



Ochiq havoda (35°C) oq fosfor o'z-o'zidan alangalanuvchan bo'lgan uchun suv ostida saqlanadi. Unda P_4 molekulalari $\angle P-P-P = 60^\circ$, $r_{P-P} = 2,2 \text{ \AA}$, $E_{P-P} = 200 \text{ kJ/mol}$. Oq va qizil fosforning tuzilishi quyidagicha:

Qizil fosfor: zichligi $2,2 \text{ g/sm}^3$ bo'lgan, zararsiz, 260°C da yonadigan modda. Qizil fosfor qizdirilsa, 590°C da suyuqlanadi, bug'lar kondensatlanib, oq fosforga o'tadi. Lekin temperatura o'zgarishi bilan to'q-jigarrangdan binafsha rangga o'zgaradi.

Qora fosfor: qizil fosforni 10—12 ming atmosfera bosimda 220°C da qizdirganda hosil bo'ladigan qoramtir-kulrang massa (grafitga o'xshash) zichligi $2,7 \text{ g/sm}^3$, elektr o'tkazuvchan, 490°C da alangalanadigan, qizdirganda asta-sekin qizil fosforga aylanadigan modda. Atom kristal panjaraga ega. $r_{P-P} = 2,18 \text{ \AA}$.



$P_{oq} \rightarrow P_{qizil}$ $-\Delta H = -42 \text{ kJ/mol}$, yarimo'tkazgich ($\Delta E = 0,33 \text{ eV}$) xossaga ega.

Olinishi. Fosfor sanoatda kalsiy fosfatni SiO_2 ishtirokida koks bilan qaytarib olinadi:




Kimyoviy xossalari. Fosfor birikmalarida oksidlanish darajasi $-3, +3, +5$ ga teng bo'ladi. Fosfor metallar bilan ta'sirlashib oksidlanish darajasi -3 ga teng bo'lgan fosfidlar hosil qiladi.

Konsentrlangan NaOH eritmasiga oq fosfor ta'sir ettirib, qizdirish bilan fosfin (PH_3) olinadi, fosfor disproporsiyalanadi



Ko'shimcha gipofosfit kislota tuzi xosil bo'ladi. Fosfidlar gidrolizlanib fosfin hosil qiladi:



Fosfin zaharli gaz, aynigan baliqning hidini eslatadi, suvda kam eruvchan, vodorod bog'i hosil qilmaydi. Fosfin kuchli kislotalar bilan reaksiyaga kirishib **fosfoniy** (PH_4^+) tuzlarini hosil qiladi, bunda fosfin elektrondonor xossalari namoyon qiladi:




Fosforning kislorodli birikmalari. Fosfor kislorod ta'sirida (yonganda) ikki xil oksid P_2O_3 — fosfor (III)-oksidi va P_2O_5 — fosfor (V)-oksidi hosil qiladi:




P_2O_3 oq rangli modda, kuchsiz uch negizli fosfit kislota H_3PO_3 ga to'g'ri keladigan oksid.





Fosfor (V)-oksidi P_2O_5 oq rangli, juda gigroskopik modda **fosfat angidridi** deyiladi. Uning molekulasida P_4O_{10} tarkibga ham to'g'ri keladigan modda. Ikkala holda ham fosfor atomining gibridlanish turi — sp^3 , shiddat bilan suv biriktirib olib, kuchsiz uch negizli **orto-fosfat** kislota H_3PO_4 hosil qiladi. Shuning uchun u suvsizlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Turli nisbatda suv bilan ta'sirlashib turli fosfor kislotalarini hosil qiladi:




Bulardan ahamiyatlisi **ortofosfat kislota**dir. Ortofosfat kislota uchun bo'lganligi uchun quyidagicha ionlanadi:



O'rtacha kuchli kislota bo'lgani uchun ionlanishning keyingi bosqichi deyarli bormaydi. Ishqorlar va ammiak ta'sirida nordon va o'rta tuz hosil qiladi:



Ortofosfat kislota qizdirilganda degidratlanib pirofosfat kislota oxirgi mahsulot — fosfat anhidridiga aylanadi:




XVII.5. Fosfat kislota tuzlari

Fosfat kislota H_2PO_4^- — digidrofosfat-ioni saqlagan digidrofosfat

HPO_4^{2-} — gidrofosfat-ioni saqlagan gidrofosfatlar, PO_4^{3-} — fosfat ioni

saqlagan nordon va o'rta fosfat tuzlarini hosil qiladi. Bulardan ishqor metallarning (litiydan boshqa, litiyning radiusi kichik bo'lgani uchun) Li ionida 2s qavat bo'shligi sababli kristall mustahkam) va ammiak ionining tuzlari suvda yaxshi eriydi, anion bo'yicha gidrolizlanadi. Shu sababli eritmaları ishqoriy muhitga ega bo'ladi.

Fosfat kislota ammoniyli tuzi kation va anion bo'yicha gidrolizlanadi, $\text{pH}=7$. Ko'pchilik metallarning fosfatlari suvda deyarli erimaydi. Bulardan faqat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ suvda yaxshi eriydi. CaHPO_4 suvda kislotali sharoitda eriydi. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ suvda juda kam eriydi. $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ — magniy pirofosfat ham shunday xossaga ega. Shu sabab



P_4 oq fosfor

$(\text{P}_n)_x$ qizil fosfor (polimer)

analitik kimyoda Mg^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+} — ionlarini aniqlashda bu moddalarning hosil bo'lishidan foydalaniladi.

Fosforli o'g'itlar. Fosforning ko'pchilik tuzlari o'g'itlar sifatida ishlatiladi. Ularni ishlab chiqishda kam eruvchi fosfatlar (apatitlar) qayta ishlanadi.

1. Superfosfat — $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4$ tarkibida 50% gacha ballast — CaSO_4 bo'lgani uchun bu o'g'it kam samaralidir.

2. Qo'sh superfosfat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ yaxshi eruvchan bo'lib, uni ekinlar yaxshi o'zlashtiradi.

3. Presipitat $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ quyidagi usullar bilan olinadi:



Hozirgi vaqtda aralash o'g'itlar ishlab chiqarish ko'proq ahamiyat kasb etayapti. Shunday aralash o'g'itlar qatoriga "ammofoska" — $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ (azofoska) — ammofosning kaliyli selitra bilan aralashmasi kiradi. Hayvonlar suyaklarini qayta ishlab olingan kukunsimon modda — $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ suyak uni nomi bilan o'g'it sifatida ishlatiladi. Yuqoridagi fosforli o'g'itlar Qizikum fosforit konida, Samarqand va Qo'qon superfosfat zavodlarida ko'p tonnali mineral o'g'itlar sifatida ishlab chiqariladi.

Fosfor galogenidlari. Fosfor galogenidlari umumiy formula $\text{P}(\text{Hal})_3$, $\text{P}(\text{Hal})_5$ bilan ifodalanadi. $\text{P}-\text{Hal}$ (Hal: F, Cl, Br, I) — bog'larning qutblanganligi quyidagi tartibda kamayadi:



Bu qator fosfor bilan galogenlar orasidagi elektromanfiylik farqiga to'g'ri keladi. Fosfor galogenidlari suv ta'sirida gidrolizlanadi:






Yuqoridagi reaksiya bo'yicha laboratoriyada galogenovodorod olish mumkin. Fosfor galogenidlari spirtlar va karbon kislotalarni galogenidlar bilan emirilishdan saqlab qolishda ishlatiladi.

Fosfor va uning birikmalarini ishlatilishi. Fosfor soatsozlikda, qotishmalarini tayyorlashda, tish qo'yish texnikasida, gugurt sanoatida, mineral va mikroo'g'itlar ishlab chiqarishda, polimerlar sanoatida, larni boyitish va metallarni ekstraksiya usuli bilan ajratishda ishlatiladi. Fosfin toza fosfor olish maqsadida va fosfororganik birikmalar sintezida ishlatiladi.


Fosfidlar yarimo'tkazgich materiallari sifatida va metallarni oksidlanishdan himoya qiladigan qoplamalar tayyorlashda ishlatiladi. Fosfor uning birikmalari biologik sistemalarda katta rol o'ynaydi. Fosfor R va DNK dagi fosfat gruppalarini tarkibiga kiradi, u oqsil sintezi va (genlar) informatsiyasini saqlashda ishtirok etadi.

Mishyak gruppachasi elementlari


Mishyak, surma va vismut tabiatda asosan sulfid minerallari holatida uchraydi. Mishyak gruppachasi elementlari ularning sulfid minerallari quyidagi reaksiyalar bo'yicha olinadi:



Vismut, mishyak, surma kimyoviy passiv elementlardir, elektr tok yomon o'tkazadi. Qizdirilganda bu elementlar vodorod, kislorod, metall va metallmaslar bilan reaksiyaga kirishib +3, +5 oksidlanish darajasini namoyon qiladilar:



Bu elementlarning oddiy moddalarini nitrat kislota va qizdirilgan sulfid kislota bilan reaksiyaga kiritgadi:



Birikmalari. Ishqoriy, ishqoriy-yer metallari vismut bilan reaksiyaga kirishib vismutidlar hosil qiladi. Mishyak va surmaning metallar bilan birikmalari arsenid va stibid deyiladi. Vismutid, arsenid va stibidlar kislotaga ta'sirida vismutin BiH_3 , arsin AsH_3 , stibin SbH_3 moddalarini hosil qiladi.

Bu elementlar E_2O_3 , E_2O_5 umumiy formula bilan ifodalanadigan oksidlar hosil qiladi. Bulardan mishyak angidridi As_2O_3 *margimush* nomi bilan ham ma'lum. As_2O_3 suvda eriydi va arsenit kislotani hosil qiladi. As_2O_3 amfoter xossaga ega ekanligi sababli ham kislota, ham asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Ammo $\text{Bi}(\text{OH})_3$ asos xossalariga ega. U konsentrlangan ishqor eritmalarida juda oz eriydi.

Mishyak va surma fosfor kislotalariga o'xshagan, ammo kuchsizroq kislotalar hosil qiladi. Erkin holatda ajratib olinmagan vismut kislotalar tuzlari mavjud bo'lib, vismutatlar deb ataladi. Bularga KBiO_3 , NaBiO_3 , AgBiO_3 misol bo'ladi. Vismutatlar kuchli oksidlovchidir.

Ishlatilishi. Arsenid va stibidlar yarimo'tkazgich xossasiga ega bo'lgani tufayli quyosh batareyalari, diod, tranzistor va lazer qurilmalarida qo'llaniladi. Mishyak, surma va vismut qotishmalar olishda ishlatiladi. Bulardan tarkibi 25% Sb va 60% Pb, 15% Sn dan iborat bosmaxonalar uchun qotishma katta ahamiyatga ega. Akkumulyatorlar plastinkalarini tayyorlashga surma va mishyakdan foydalaniladi. Bu elementlarning oltingugurtli birikmalari: mishyak sulfidi As_2S_3 , gugurt, sariq bo'yoqlar, shisha tayyorlashda, Sb_2S_3 kauchukni vulqonlashda ishlatiladi. Termoelektr generatorlarda va yadro reaktorlarida vismutdan foydalaniladi.

Vismut birikmalaridan tibbiyotda, qishloq xo'jaligida, kosmetika va boshqa sohalarda foydalaniladi.

Savollar

1. Azot va fosforning elektron tuzilishi asosida o'xshashlik va farqli xususiyatlarini izohlab bering.
2. Azot va fosforning tabiatda tarqalgan birikmalariga misollar keltiring.
3. Ammiak, uning olinishi haqida ma'lumot bering.
4. Nitrit va nitrat kislota va ularning tuzlaridagi o'xshashlik va farqli xususiyatlarga misollar keltiring.
5. Fosfat kislota va uning tuzlarini olinishi hamda xossalari to'g'risida ma'lumot bering.
6. Nitrat kislotaning metallar bilan o'zaro ta'siriga doir reaksiya tenglamalarini yozing.

XVIII bob

MINERAL O'G'ITLAR

Ma'lumki, ko'pchilik kimyoviy elementlar o'simlik va hayvon organizmida hayotni ta'minlashda ishtirok etadilar. O'simliklar o'z uchun zarur kimyoviy elementlarni havodan va aksariyat qisqan tuproqdan oladilar.

Tuproq tarkibida mavjud bo'lib, o'simliklarning o'sishini ta'minlovchi elementlar "ozuqa elementlari" deyiladi. Ozuqa elementlari tuproq tabiiy holda mavjud bo'ladi yoki biror modda ko'rinishida tashqari tuproqqa qo'shiladi.

Tarkibida ozuqa elementlari tutgan tuproqqa qo'shiladigan organik noorganik (mineral) moddalar *o'g'itlar* deyiladi.

Yerdan uzoq foydalanish natijasida undagi ozuqa elementlari miqdori kamayib boradi. Yerning ozuqa elementlari miqdorini oshirish uchun unga o'g'itlar ko'rinishida moddalar kiritish fikri XVIII asrda paydo bo'lib, bu boradagi dastlabki izlanish va yechimlar 1840 yilda Yu. Li tomonidan boshlangan. Hozirgi vaqtda o'g'itlar, ularni ishlab chiqarish va ulardan oqilona foydalanish kimyo fani va sanoatining eng asosiy vazifalaridan biriga aylangan.

XVIII.1. O'g'itlar klassifikatsiyasi

Tarkibida mavjud bo'lgan ozuqa elementlari turi va tarkibiga ko'ra o'g'itlar quyidagilarga bo'linadi.

1. Oddiy (tarkibida faqat bitta ozuqa elementi saqlagan).
2. Kompleks o'g'itlar. Bular uch xil bo'ladi:
 - a) murakkab o'g'itlar — tarkibida ikki yoki undan ortiq ozuqa elementlari saqlagan o'g'itlar (KNO_3 , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$).
 - b) aralash o'g'itlar — turli o'g'itlarning o'zaro mexanik aralashmasi bo'lgan iborat o'g'itlar.
 - v) prolongirlangan organik va noorganik o'g'itlarning o'zaro birikmasi bo'lgan holidagi o'g'itlar.
3. Mikroo'g'itlar (tarkibida mikroelementlar — B, Cu, Co, Mn, Mo, J saqlagan o'g'itlar).

O'g'itlar tarkibidagi ozuqa elementlarining turiga ko'ra **azotli**, **fosforli**, **kaliyli** o'g'itlarga bo'linadi. Agregat holatiga ko'ra **suyuq** (ammiakli suyuqlantirilgan ammiak) va **qattiq** o'g'itlar (KNO_3 , NH_4NO_3 , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ va h.k.). Kelib chiqishiga ko'ra **organik** o'g'itlar (hayvon

qushlar chiqindisi, o'simliklar chirindilari), **noorganik** (mineral) o'g'itlar (tabiatda mavjud bo'lgan yoki sintez qilingan anorganik moddalar).

O'g'itlarning asosiy tavsifnomasi ularning agregat holatlari, gigroskopikligi, eruvchanligi, kislotali yoki asoslilikligi va ozuqa elementining miqdoridir. Ozuqa elementining miqdorini kaliyli o'g'itlar uchun — K_2O , fosforli o'g'itlar uchun P_2O_5 , azotli o'g'itlar uchun — N , kalsiyl o'g'itlar uchun CaO moddalarining foiz miqdori bilan belgilash qabul qilingan. Masalan, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ tarkibidagi ozuqa elementi miqdori quyidagicha hisoblanadi:



Tenglamaga muvofiq 1 mol $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ tarkibida 1 mol P_2O_5 bor:

1 mol $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 = 234 \text{ g}$ bo'lib $\rightarrow 100\%$ ni tashkil etadi.

1 mol $\text{P}_2\text{O}_5 = 142 \text{ g}$ bo'lib $\rightarrow \% \text{P}_2\text{O}_5$ ni tashkil qiladi.

ozuqa elementi: $\% \text{P}_2\text{O}_5 = \frac{142 \cdot 100}{234} = 61\%$

XVIII.2. Azotli o'g'itlar

Tarkibida ozuqa elementi sifatida azot saqlagan o'g'itlar azotli o'g'itlar deyiladi.

Azotli o'g'itlar azot yetishmaydigan yerlarga solinadi. Azot yetishmagan yerdagi ekinlar bargi och-yashil rang, ba'zi ekinlarda (turp, karam, makkajo'xori) sariq-qizil dog'lar, barglari juda kichik, yupqa, gullari nimjon, shoxlari mayda, mevasi muddatidan avval pishib, kichik-kichik bo'lib, barglari tushib ketadi.

Azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish natijasida yuqoridagi kamchiliklar yo'qoladi. Yerlarga azotli o'g'itlar berish me'yorda bo'lishi (30—300 kg/ga), har bir maydonning xususiyatlari va o'g'itga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi shart. Ekinlar azotni NH_3 yoki ionlar holida o'zlashtiradi.

Azotli organik o'g'itlarga go'ng, kompost, parranda axlati kiradi. Suyuq azotli o'g'itlarga suyuq ammiak (82% azot), ammiakli suv (20-24,7% azot), ammiakli selitra (45%)+ karbamid (35%) tarkibli kompleksda jami 32% azot bo'ladi. Qattiq azotli o'g'itlarga ammiakli selitra (34%), natriyli selitra (15,5%), karbamid (46%), kaliyli selitra (13,9%), ammoniy sulfat (21%), kalsiyl selitra (17,5%) va boshqalar kiradi.

Ammiakli va ammoniyli o'g'itlar. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ suyuq eritma bo'lib, odatda oq rangli kristall yoki "dona-dona" modda bo'lib, suvda yaxshi eriydi.

Nitratli o'g'itlar: Natriyli, kaliyli, kalsiyli selitralar (NaNO_3 , KNO_3 , $\text{Ca(NO}_3)_2$). Bu o'g'itlar harakatchan NO_3^- ionlarini saqlaydi (azot sh holida o'zlashtiriladi). Ortiqcha Na^+ , K^+ , Ca^{2+} — ionlari yerning ertiruvchiligi oshiradi. Shuning uchun ular bilan birga yerlarga o'g'itlar berilishi maqsadga muvofiqdir.

Ammoniyli — nitratli o'g'itlar. NH_4NO_3 — ammiakli selitra, suvda nitrat ammoniy ($\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{NH}_4\text{NO}_3$, ohakii — ammiakli $\text{CaCO}_3 \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3$ lar oq rangli moddalar bo'lib, faqat oxirgisining ertiruvchanligi bir oz kamroq. Barcha turdagi tuproq va ekinlarni oziqlash uchun tavsiya etiladi.

Ammoniyli — nitratli — karbamidli o'g'itlar. Ammoniy nitrat karbamidning konsentrlangan eritmasi suyuq o'g'itlar holida qo'llaniladi. O'zbekistonda azotli o'g'itlar "Navoiy-Azot" kombinatida, Chirchik va Olmalik kimyo zavodlarida ishlab chiqariladi.

Ammiakli selitra ishlab chiqarish. $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3$ reaksiyaga asoslangan. Ammiak gazi bilan to'ldirilgan reaktorga azot kislotasi bo'lib-bo'lib mo'l miqdorda yuboriladi va hosil bo'lgan konsentrlangan eritma suyuqlanma holiga keltiriladi, donalash minorasida tomchilarga aylantiriladi. Minoraning balandligi 40–60 m, diametri 10–16 m, ichki yuzasi alyuminiy folgasi bilan qoplangan. Minoraning yuqorisidan ammiakli selitra suyuqlanmasi purkalanib tomchilar holida yuqoridan pastga tusha boshlaydi. Unga teskari oqim pastdan havo berilib, oq rangli dona-dona modda holiga keltiriladi. "dona" chalar gigroskopik bo'lgani uchun suv tortmaydigan modda bo'lib aralashtirilib, "upa"lanadi va qoplarga solinib iste'molchilarga yuboriladi.

XVIII.3. Fosforli o'g'itlar

Fosfor o'simlik dunyosi uchun ham, hayvonot dunyosi uchun ham o'ta zarur bo'lgan element bo'lib, o'simliklarning unga bo'lgan zaruriy turli fosforli o'g'itlar orqali ta'minlanadi.

Agar fosfor etishmasa ekinlarning xlorofill hosil qilishi va CO_2 o'zlashtirishi qiyinlashadi. Fosfor yetishmasligi sababli ekinlarda to'yashil rang ko'kimtir rangga o'tib, xiralashib, qovjiratuvcchi qora dog paydo bo'ladi. gullash va etilish jarayoni kechikadi, o'sishi sekinlashib tana ingichkalashadi.

Inson tanasida o'rtacha 1600 g fosfor bo'lib, undan 1400 g suyaklarda, 130 g muskul to'qimalarida, 12 g miyada, 10 g jigarda, 6 g o'pkada, 44 g qon tarkibida faoliyat ko'rsatadi.

Shunday muhim element saqlagan dastlabki ozuqa — o'g'it Yu. Libix (1857 y.) tomonidan taklif etilgan. Uning fikricha yomon eriydigan $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ni H_2SO_4 ta'sirida eruvchan $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ holatga o'tkazib tuproqqa berish kerak. Shu bilan fosforli o'g'itlar ishlab chiqarishga asos solingan.

Fosforli suvda eruvchan o'g'itlarga oddiy superfosfat, qo'sh superfosfat, ammosfos, ammosfoska, nitrofoska kiradi.

Fosforli kam eriydigan o'g'itlarga presipitat, tomas shlaki, termofosfat kiradi. Erimaydiganlari esa fosforit uni va suyak unidir.

Fosforli o'g'itlar ishlab chiqarishdagi asosiy xomashyo fosforit — $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ lar va apatit — $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ dir. Bunday minerallar O'zbekistonda Qizilqum fosforit konida mavjud. Bularni sulfat kislotasi bilan qayta ishlab oddiy superfosfat — $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4$ va qo'shsuperfosfat — $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ olinadi. Presipitat — $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ suvda kam eriydi, organik kislotalarda yaxshi eriydi. Ammosfos — $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ va $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$. Bu o'g'itlar tarkibida 21%–56% gacha ozuqa elementi P_2O_5 bo'ladi.

XVIII.4. Kaliyli o'g'itlar

Kaliy elementi tirik organizmlarda assimilyatsiya va fotosintez jarayonlarida Ca^{2+} , Mg^{2+} — ionlari bilan birgalikda hujayradagi protoplazma kolloid holatini boshqarib turadi. Kaliyning miqdoriga organizmdagi kraxmal, qand, yog'lar, miqdori bog'liq bo'ladi. Kartoshka, lavlagi, kungaboqar, beda, kanop, tamaki ekinlari kaliy elementiga kuchli ehtiyoj sezgilar, sul, bug'doy va arpa kaliyga kamtalab ekinlardir. Yetishmayotgan kaliyning ko'p miqdori hayvonlar, qushlar, chiqindilari bilan qoplanganda, bu etarli emas. Shu sababli kaliyli o'g'itlarga ehtiyoj katta.

Kaliy saqlagan tabiiy manbalar qatoriga yog'och va ekinlarning yonishidan hosil bo'lgan "kul" va kul suvlarini kiritish mumkin. Asosiy manba — KCl saqlagan silvinit minerali bo'lib, undan galurgiya (tanlab eritish) va flotatsiya (boyitish) usuli bilan ajratib olinadi. Cl^- — ortiqcha bo'lgan yerlarga K_2SO_4 , K_2HPO_4 , KNO_3 holiday o'g'itlar ishlatiladi. Kaliyli o'g'itlar oddiy va kompleks o'g'itlarga bo'linadi.

Oddiy o'g'itlarga o'simliklar kuli, kaliy fosfat, kaliy xlorid kiradi.

Kompleks o'g'itlarga kaliyli selitra, ammosfoska, kaliy fosfat kiradi.

O'g'it ishlab chiqarishda hozirgi zamon muammolari quyidagilardan iborat:

— Ko'p miqdordagi tonnalab o'g'itlarni tashish jarayonida ularni bo'lish, shu maqsadda o'g'it tashish bilan bog'liq transportlarni, o'g'itni qadoqlash turlarini mukammallashtirish va suyuq o'g'itlarni quvurlar orqali yetkazish usullarini ishlab chiqish;

— O'g'itlarning sifatini oshirish, ulardagi ozuqa elementlari miqdorini ko'paytirish, oddiy o'g'itlar o'rniga kompleks o'g'itlardan foydalanishni kengaytirish, tarkibida mikroelementlar bilan birga biostimulyatorlarni tutgan turlarini ishlab chiqarish;

— Sekinlik bilan o'zlashtiriladigan va konsentrlangan suyuq o'g'itlar ishlab chiqarish bilan ishchi kuchi va iqtisodiy tejamlarini hal qilish. Prolongirlangan (karbamiddiformaldegid) va polimer moddalar bilan kapsulalangan o'g'itlar turini va ishlab chiqarishni ko'paytirish;

— Tuproq va o'g'it tarkibidagi azot elementining yo'qolishi (denitrifikatsiya) ni ingibitorlar ta'sirida kamaytiruvchi vositalar ishlab chiqarish.

— Polimikroelement (azot, fosfor, kaliy, magniy, bor, rux, molibden, manganes, mis)lar saqlagan kompleks o'g'itlar ishlab chiqarishni tashkil etish.

Respublikamizda o'g'itlar va ularni ishlab chiqarish muammolari bilan O'zbekiston FA Umumiy va anorganik kimyo institutida akademik M. N. Nabiye (1915—1995) boshchiligida asos solingan yirik bo'linma shug'ullanadi. Bu ilm dargohida akademiklar S. A. To'xtayev, B. M. Berdiyev, professor Sh. S. Namozov, kimyo fanlari doktori A. Erkayev va tanikli olimlar va ularning shogirdlari faol izlanishlar olib borishayapti. Ularning izlanishlari samaralari Chirchiq, Samarqand, Navoiy, Qo'qon, Olmaliq mineral o'g'itlar zavodlarida qo'llanilishi tufayli ko'p tonna mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda va respublikamiz iqtisodiga salmoqli hissa qo'shilmogda.


XIX bob

VI A GRUPPACHA ELEMENTLARI


O'rganiladigan asosiy tushunchalar: xalkogenlar, oltingugurt, vodorod sulfid, sulfat angidridi, sulfat angidridi, sulfat va sulfat kislotalari, persulfatlar, oleum, pirit, nitroza, kontakt usullari, achchiqtoshlar.

XIX.1. VI A gruppacha elementlarining umumiy xossalari

Davriy sistemaning oltinchi gruppasi asosiy gruppachasi elementlari xalkogen(ruda hosil qiluvchi)lar deyiladi. Ular qatoriga kislorod, oltingugurt, selen, tellur va poloniy kiradi. Bu elementlarning elektron formulalari quyidagicha yoziladi:



Bu gruppacha elementlari S, Se, Te va Po atomlarida d-orbitallarning bo'lishi ularning ayrim xossalari kislorod elementi xossalaridan farqli bo'lishiga sabab bo'ladi. Buning isboti sifatida S ning normal va qo'zg'algan holatdagi elektron tuzilishini ko'rib chiqamiz:



Ko'rinib turibdiki, bu elementlarning atomida qo'zg'algan holatda 6 tagacha toq valent elektronlari ($ns^2 np^3 nd^1$) bo'lgani uchun birikmalarda oksidlanish darajalari (-2, 0, +4, +6) ga teng bo'ladi. Lekin kislorod bundan mustasno. Kislorod atomining elektromanfiyligi 3,5 va ionlanish potentsiali katta qiymat (13,62 eV) ga 2—qavatida d-orbitallari bo'lmaganligi uchun kislorod amtomining qo'zg'algan holga o'tish imkoniyati yo'q.

Demak, kislorod atomida elektronlar juda kuchli bog'langan. Kislorod atomi boshqa element atomidan ikkita elektron tortib olib, oksidlanish darajasi — 2 ga teng bo'ladi. Kislorod atomidan elektron tortib oladigan atom faqat flor atomidir.

Qolgan elementlar uchun elektromanfiylik gruppachada yuqoridan pastga qarab kamayib boradi va shu sababli ularda elektron olishdan ko'ra elektron berish xususiyati kuchayib boradi.

Xalkogenlarning metallmaslik xossalari yuqoridan pastga qarab kamayib boradi. Kislorod va oltingugurt metallmaslik, selen va tellur ham metall, ham metallmaslik xossalari, poloniy esa kuchli metallik xossalari namoyon qiladi.

XIX.2. Oltingugurt

Tabiatda oltingugurt erkin holda "S", sulfidlar (FeS_2 , PbS , ZnS , Cu_2S) va sulfatlar




Akademik
Malik Nabiev



($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) holida, tabiiy gaz bida H_2S holida uchraydi.

Olinishi. Oltingugurt asosan erkin holda uchragani uchun bevosita qazib olish va birikmalaridan qaytarish yoki oksidlash usuli bilan olinadi. Tarkibida kolchedan bo'lgan ruda boyitiladi. Boyitilgan konsentrat qum xlorid kislotada ishlanadi. Hosil bo'lgan vodorod sulfid yondiriladi. Yondirilganda hosil bo'lgan SO_2 , H_2S ishtirokida qaytariladi va oltingugurt ajratib olinadi;




Fizik xossalari. Sariq rangli, qattiq, suvda erimaydigan modda. U yod sulfid (CS_2) da eriydi (18-jadvalga qarang).




Kislorod ta'sirida ko'kimtir alanga berib yonadi. Ikki xil allotrop ko'rinishi (rombik, monoklinik) mavjud. Quyidagi rasmlarda ikki allotropik ko'rinishdagi oltingugurtning tuzilishi ko'rsatilgan (26-rasmda).

Oltingugurt $444,6^\circ\text{C}$ qaynaydi.

Kimyoviy xossalari. Oltingugurt kimyoviy faolligi jihatidan kislorod keyin turadi. U metallmas element bo'lsa-da, ham metallar, ham metallmaslar bilan reaksiyaga kirishadi:



Oltingugurt yuqori temperaturada konsentrlangan kislotalar va ishqoriy bilan reaksiyaga kirishadi:




Oltingugurt xalq xo'jaligida keng miqyosda ishlatiladi. Rezina sanoatida, yod tayyorlashda, tibbiyotda, qishloq xo'jaligida hasharotlarni yo'qotish uchun, gugurt tayyorlashda, bo'yoq (ultramarin ko'k rang) tayyorlashda, o'qimachilik sanoatida, kimyo sanoatida sulfat kislotasi ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Oltingugurt qator birikmalar: vodorod sulfid, metall sulfidlari, oqsillar, sulfit, sulfat kislotalar va ularning tuzlari, tiosulfatlar, perokso-sulfatlar hosil qiladi.

XIX.3. Vodorod sulfid


Rangsiz, palag'da tuxum hidli, zaharli gaz. Burchaksimon tuzilishli, qutbli molekula ($\mu = 1,02\text{D}$) bo'lsada, vodorod bog'i hosil qilish xususiyati yuqorikigiga nisbatan kuchsiz. Havodan bir oz og'ir. 1 hajm suvda 25 hajm vodorod sulfid laboratoriyada (Kipp apparatida) temir sulfidga xlorid kislotasi ta'sir ettirib olinadi:



Vodorod sulfidning suvdagi eritmasi *sulfid kislotasi* deyiladi va u ikki negizli kuchsiz kislotasi xossasini namoyon qiladi:




Vodorod sulfid kislorod ta'sirida yonadi:




Ko'pincha o'simlik va tirik organizmlarning chirishi tufayli hosil bo'lgan H_2S havo kislorodi ta'sirida oksidlanadi:




Bu reaksiya tufayli tabiat o'z-o'zini zaharli modda (H_2S) dan tozalab turadi, bu reaksiya ekologik ahamiyatga ega. Vodorod sulfid kuchli qaytaruvchi. Uning bu xossasi quyidagi reaksiyalarda namoyon bo'ladi:




Havo tarkibida vodorod sulfid oz bo'lsada, sof holda mavjudligi kumushdan yasalgan buyumlar vaqt o'tishi bilan qorayadi, ya'ni bo'ladigan kumush sulfid bilan qoplanadi:




Asos va tuzlarning eritmalariga H_2S yuborilganda metall sulfid hosil bo'ladi.




Ammoniy ion i va ishqoriy metallarning sulfidlari suvda yaxshi eriydi boshqa metallar sulfidlari suvda yomon eriydigan o'ziga xos rangli moddalar. MnS — qora, HgS (sariq, qizil), PbS — qora, CuS — qora, ZnS — oq bo'lib, bu metallar kationlari uchun S^{2-} — sulfid ion reagent bo'ladi. Bu reaksiyalardan yuqoridagi kationlarning sifat reaksiyalarida (yoki aksincha) foydalaniladi. Ko'pchilik sulfidlar o'zgaruvchan tarkibli (daltonid) moddalar qatoriga kirib, TiS_2 — metallardek elektr o'tkazuvchan, ZrS_2 — yarimo'tkazuvchi, HfS_2 — dielektrik xossaga ega. Al_2S_3 , Fe_2S_3 , Cr_2S_3 lar qattiq holda erimaydi, chunki ular suvli eritmada to'liq gidrolizlanib, gidroksidlarga aylanib ketadi. Kuchsiz kislota tuzlari sifatida suvda eruvchan sulfidlar gidrolizga uchraydi. Ishqoriy metallar sulfidlari eritmalarini gidroliz natijasida kuchli ishqoriy muhit hosil bo'ladi:




Ion — molekulyar shaklda bu reaksiyalar quyidagicha yoziladi:





Sulfidlar va polisulfidlar (FeS_2)ni oksidlab, oltingugurt (IV)-oksid hosil qilinadi:





Bu reaksiyadan sanoatda cho'yan va sulfat kislota ishlab chiqarishda foydalaniladi. Pirit, ya'ni disulfid FeS_2 da (S_2^{2-} — ionlarida) oltingugurt atomlari o'zaro disulfid bog'lari orqali bog'langan:




Rombik sariq rangli
· tiniq kristall
 $t_c = 113^\circ\text{C}$ (S_8)

Monoklinik oltingugurt
(qahrabo rangidagi).
ignasimon modda
 $t_c = 119^\circ\text{C}$ (S_8)


26-ra.vm. Oltingugurtning allotropik shakllari.

XIX.4. Oltingugurt (IV) birikmalari

Oltingugurt birikmalari ichida oltingugurt (IV)-oksidi SO_2 eng keng tarqalgan bo'lib, rangsiz, o'tkir hidli, havodan og'ir ($\rho=2.926$) bo'g'uvchi gaz, -37°C da suyuqlanadi, -121°C da qattiq holga o'tadi. Yonmaydi va yonishga yordam bermaydi. 1 hajm suvda 40 hajm eriydi va kuchsiz kislota hosil qiladi. U oltingugurt (IV) metall sulfidlarini yuqori natijasida hosil bo'ladi va suvda eriganda kislota hosil qilgani uchun *sulfit anhidridi* ham deyiladi:




Sulfit kislota H_2SO_3 — kuchsiz kislota bo'lib, faqat eritmalarda mavjud bo'ladi. Ikki asosli kislota sifatida ionlanadi:




Suvli eritmalarda $2\text{SO}_3^{2-} + \text{O}_2 - 2e^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-}$ reaksiya tufayli sulfat ioniga aylanadi, ba'zan disproporsiyalanib $4\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{S}^0 + 3\text{SO}_4^{2-}$ erkin oltingugurt hosil qilgani sababli eritmalarda cho'kma hosil bo'ladi. Uning turli metallar bilan hosil qilgan tuzlari barqaror bo'lib, ishqoriy metallar bilan hosil qilgan o'rta tuzlari M_2SO_3 va gidrosulfitlari $\text{M}(\text{HSO}_3)$ suvda eruvchan bo'ladi.

Suvli eritmada bu tuzlar anion bo'yicha gidrolizlanib:




eritma muhiti ishqoriy bo'ladi. SO_2 va SO_3^{2-} ionida S — atomi oraliq (+4).oksidlanish darajasida bo'lgani uchun ham qaytaruvchi:



ham oksidlovchi xossalariga ega:



Sulfitlar yuqori temperaturada disproporsiyalanish xossasini namoyon qiladi:




Oltingugurt (IV)-oksidi sulfat kislota hosil qilishda, qog'oz ishlab chiqarishda, to'qimachilik sanoatida, mevalarni konservalashda va kimyoviy sintezda ishlatiladi.

XIX.5. Oltingugurt (VI) birikmalari

Elektromanfiyligi kattaroq bo'lgan elementlar bilan birlashish natijasida oltingugurt (VI) ning quyidagi birikmalari hosil bo'ladi: SF_6 , SOF_4 , SO_2F_2 , SO_3 . Bulardan ahamiyatlisi oltingugurt (VI) oksididir.

SO_3 — *sulfat anhidrid*. $t_{\text{qaynash}}^\circ = 44,8^\circ\text{C}$ da qaynaydi, va monomer holga o'tadi, suyuq holda $(\text{SO}_3)_3$ — trimer holatida bo'ladi. Suv bilan birikib sulfat kislota hosil qiladi:



monomer (SO_3)


Bulardan monomer tuzilishida S atomi orbitalari sp^2 — gibrirlangan holatda bo'lsa, trimer va polimer tuzilishida sp^3 — gibrirlanishga ega. Kuchli kislotali oksid xossasiga ega. $16,8^\circ\text{C}$ gacha sovutilsa, qattiq holga o'tadi va polimer tuzilishga ega bo'ladi. SO_2 ni oksidlash bilan SO_3 olinadi: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$. Bunda katalizator sifatida NO , V_2O_5 lar ishlatiladi. Bu reaksiya qaytar bo'lgani uchun muvozanatni o'ngga surish uchun bosimni oshirib, temperaturani pasaytirish kerak.

XIX.6. Sulfat kislota

Moysimon suyuqlik bo'lib, kuchli kislota qatoriga kiradi. Suv bilan xohlagan nisbatda aralashadi (H_2SO_4). Sulfat kislota ikki: nitroza va kontakt usulda olinadi.

M.M.ABDULXAYEVA


Nitroza usuli. Oltingugurtni yoki metall sulfidlarini yondirib, gazni hosil qiladi. Hosil bo'lgan SO_2 — azot (IV)-oksid $[\text{NO}_2]$ ishtirokida O_2 bilan ta'sir ettiriladi.



Bu modda sulfat kislota eritmasiga yuttirilib $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SO}_3$ olinadi. Bu moysimon modda suyultirilib turli konsentratsiyali H_2SO_4 eritmasi olinadi.

Bu usul bilan olingan sulfat kislota toza emas, ya'ni 80% li bo'ladi. Bunday kislota, asosan mineral o'g'it ishlab chiqarishga sarflanadi.

Kontakt usuli. Bu usulda sulfit angidrid SO_2 katalizator yordamida oksidlanadi (52-rasm):



Hosil bo'lgan SO_3 konsentrlangan H_2SO_4 ga yuttiriladi:



Hosil bo'lgan mahsulot "oleum" deyiladi va suv ta'sir ettirib sulfat kislota olinadi:





Sulfat kislota molekulasida 4 ta kislorod atomi oltingugurt atomi atrofida tetraedr uchlarida joylashgan bo'lib, molekulalar o'zaro kuchli vodorod bog'lari hosil qiladi.

Sulfat kislota ikki negizli bo'lganligi uchun ikki bosqichda dissotsilanadi:




Ikki xil tuz — o'rta va nordon tuzlar hosil qiladi:



Sulfat kislota xossasi uning eritmasi konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Suyultirilgan sulfat kislota metallarga ta'siri natijasida faqat vodorod ajralib chiqadi, ya'ni H^+ — ionlari oksidlovchi xossasini namoyish etadi.

Konsentrlangan sulfat kislota metallar va metallmaslar bilan reaksiyaga kirishganda S^{+6} ioni oksidlovchi bo'lib, qaytarilish mahsuloti SO_2 , H_2S , S va suv hosil bo'ladi:



Sovuq konsentrlangan H_2SO_4 Fe metaliga ta'sir etmaydi, chunki ularning o'rtasida barqaror oksid parda hosil qilib, reaksiyaning borishiga to'sqinlik qiladi.

Konsentrlangan sulfat kislota kuchli gigroskopik modda bo'lgani uchun o'ziga suvni kuchli shimib oladi. Bu jarayon natijasida o'zgaruvchan tarkibli gidratlar: $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($t_{\text{muz}} = -85^\circ\text{C}$), $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($t_{\text{muz}} = -38^\circ\text{C}$), $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ($t_{\text{muz}} = -27^\circ\text{C}$) hosil bo'ladi. Bu ekzotermik jarayon bo'lgani uchun katta miqdorda issiqlik chiqadi. Shu sababli sulfat kislota eritmasini tayyorlashda distillangan suv ustiga konsentrlangan sulfat kislota eritmasini oz-ozdan qo'shib aralashtirib turiladi!


Konsentrlangan sulfat kislota o'ta gigroskopikligi tufayli organik moddalar, gazlar bilan aralashgan suvni, yog'och, qog'oz tarkibidagi "bog'langan" suvni tortib olish (hatto ularni yondirib yubora olish) xossasiga ega:



Konsentrlangan H_2SO_4 qizdirilganda Pt, Au va ayrim metallardan tashqari, deyarli barcha metallar bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan,



Suyultirilgan H_2SO_4 rux bilan quyidagicha reaksiyaga kirishadi:



Konsentrlangan kislota bilan rux reaksiyasi:



Sulfat kislota K^+ , NH_4^+ , Fe^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} kationlari bilan qo'sh tuzlar: $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$; $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (Mor tuzi) va $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ni hosil qiladi. Bu moddalar "kvasts"lar yoki "ochchiqotishlar" deyiladi. Suvda yaxshi eruvchan bo'lib, qandolatchilik, teri-mo'yna sanoatida, tibbiyotda keng ishlatiladi.

Kaliy sulfat — K_2SO_4 . Rangsiz kristall modda, suvda yaxshi eriydi. Boshqa metall sulfatlari bilan qo'shiloq tuzlar hosil qiladi.

Natriy sulfat — $Na_2SO_4 \cdot 7H_2O$. Glauber tuzi "**achchiq tuz**" deyiladi.

Magniy sulfat — $MgSO_4$, tibbiyotda (**magneziya**), analitik kimyo ishlatiladi. Kristallogidrat — $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ holida ajratib olinadi. Bu suvning doimiy qattiqligini tashkil etadi.

Sulfat kislota xalq xo'jaligida va kimyo sanoatining ko'p sohasida ishlatiladi.

Sulfat kislolaning ko'pchilik tuzlari $FeSO_4 \cdot 7H_2O$, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ **kuporoslar** deyiladi. Ular suvda yaxshi eriydi, ammo $CaSO_4$ ($E.k. = 3 \cdot 10^{-4}$), $BaSO_4$ ($1,1 \cdot 10^{-10}$), $SrSO_4$ ($3,2 \cdot 10^{-7}$), $PbSO_4$ ($1,5 \cdot 10^{-4}$) lar nisbatan juda kam eriydi, ular asosan oq rangli cho'kma hosil qiladi. Shu sababli SO_4^{2-} ioni bu ionlarga xos reagent sifatida ishlatiladi. $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ (**alebastr**) deyiladi. U suv bilan aralashtirilgan $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O + 1,5H_2O \rightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$ **gips** hosil bo'lib, qotadi. Gips qaytadan yuqori temperaturada qizdirilsa yana alebastrga aylanadi. $CaSO_4$ moddalar qurilish materiali sifatida va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Suvda $CaSO_4$ — "**angidrit**" deb ataladi.

Savollar

1. Xalkogenlar deb qanday elementlarga aytiladi?
2. Oltingugurtning elektron tuzilishi va oksidlanish darajasini ko'rsatib.
3. Oltingugurtning kislorodli birikmalari formulalarini yozing.
4. Sulfidlar qanday moddalar, ularning cruvchanligi, gidrolizlanish doir misollar yozing.
5. Sulfat kislolaning tuzilishi qanday? U dissotsilanganda qanday zarrachalar hosil bo'ladi?
6. Konsentrlangan va suyultirilgan sulfat kislolaning metallar bilan ta'siri tushuntiring.
7. Sulfat kislota olishning asosiy bosqichlarini tushuntiring.
8. Oleum nima? Undan qanday qilib sulfat kislota olinadi.

XX bob

VII A GRUPPACHA ELEMENTLARI

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: galogen, xlor, fluor, brom, yod, fluorid kislota, xlorid kislota, floridlar, xloridlar, bromidlar, yodidlar, gipoxlorit kislota, Javel suvi, xloratlar, perxloratlar, xlorli ohak.



XX.1. VII A gruppacha elementlarining umumiy xossalari

Yettinchi gruppasi asosiy gruppachasi elementlariga fluor-F, xlor-Cl, brom-Br, yod-J va astat-At kiradi. Bu elementlar atomlarining tashqi elektron qavatida ettita (ns^2np^5) elektron bo'lib, erkin holatda ularning barchasi ikki atomli molekulalardan iborat bo'ladi, xlor — gazsimon, brom — suyuq, yod — kristall modda. Bu elementlar p — elementlar qatoriga kiruvchi metallmaslardir. Ular *“galogen”lar deyilib, “tuz hosil qiluvchi” degan ma'noni anglatadi.*

Galogenlarning tartib raqami ortishi bilan atom radiusi ortib boradi. Elektromanfiyliklari kamayadi. Shu sababli ularning tartib raqami ortishi bilan metallmaslik (oksidlovchilik) xossalari kuchsizlanib, metallik xossalari (qaytaruvchilik) xossalari ortadi. $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ qatorida galogenlarning o'zaro nisbiy faolligi kamayadi va qatorda chapda turgan galogen o'ngda turgan galogenni uning birikmalaridan osonlik bilan siqib chiqaradi. Yuqoridagi qatorda galogenlarning suvda eruvchanligi ham kamayib boradi. Galogenlar metallar bilan tegishli tuzlarni hosil qiladilar. Bu tuzlarda “metall — galogen” bog'lari, asosan, ionli bog'lanish bo'lib, ular suyuqlanma va suvli eritmalarida kuchli elektrolit xossasiga ega.

Galogenlarning vodorodli birikmalari HF, HCl, HBr, HI gazsimon moddalar bo'lib, barchasi qutbli molekulalardir. Ularning suvdagi eritmaları kislotalar bo'lib, HF dan HI ga tomon o'tgan sayin “vodorod — galogen” bog'ining qutbliligi va energiyasi kamayib borgani uchun ularning kislotalik xossalari kuchayib boradi. Bu birikmalarda galogenlarning tartib raqami ortishi bilan ion (E^-) zaryadi o'zgarmagan holda, ion radiuslari ortib borgani uchun HCl, HBr va HI larning qaytaruvchanlik xossalari ham yuqoridagi tartibda HCl dan HI ga tomon kuchayib boradi.

Galogenlar bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, ular ayrim xossalari bilan o'zaro farq qiladi. Ftorning suv bilan ta'siri xlornikidan farq qilsa, HF ning suvli eritmasi kuchsiz kislota, boshqa galogenlarning vodorodli birikmalari kuchli kislota xossasiga ega. Galogenlarning Ca li tuzlaridan CaF_2 suvda erimaydi, $CaCl_2$, $CaBr_2$, CaI_2 lar esa yaxshi eruvchandir. $AgCl$, $AgBr$, AgI deyarli erimaydigan moddalar bo'lgani holda aksincha, AgF suvda yaxshi eriydi.

Astat esa tabiiy radioaktiv emirilishlarning oraliq mahsulotlari sifatida, yadro reaksiyalari davomida sun'iy ravishda hosil bo'ladi. Radioaktiv xossaga ega, shu sababli astat maxsus kurslarda o'rganiladi. Bu elementlar va ular birikmalarining xossalari alohida o'rganib chiqamiz.

XX.2. Ftor va uning birikmalari

Ftor galogenlar qatoridagi birinchi element bo'lib, "phtoros", "halokat", "buzuvchi" ma'nolarini anglatadi.


Ftorning tabiatda tarqalishi. Tabiatda faqat birikmalar holida tarqalgan. Asosiy minerallari: CaF_2 — suyuqlantiruvchi kriolit — Na_3AlF_6 ftorapatitlar $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ dir.

Olinishi. Ftor faqat elektroliz yo'li bilan olinadi.



Bu reaksiyani amalga oshirish uchun anod ko'mir, katod Ni dan yasalgan idish diafragma bilan ajratiladi. Chunki hosil bo'luvchi H_2 va F_2 gazlari aralashib ketsa, portlash ro'y beradi.

II usul: Dala shpatini qayta ishlash va hosil bo'lgan HF ni kriolitda elektroliz qilishga asoslangan. U quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:




Ftorni kimyoviy jihatdan o'ta faolligi tufayli deyarli hamma materiallarining ta'sirida korroziyaga uchraydi. Ftorni hosil qilish apparatlari, saqlash va tashish uchun idishlar nikel va uning qotishmalaridan yasaladi.


Fizik xossalari. Ftor oddiy sharoitda och-yashil rangli, havodan biroz og'ir, suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishuvchi gaz.

Kimyoviy xossalari. Ftorning kimyoviy xossalari uning yuqori elektromanfiyligi bilan bog'liq. F_2 da bog'lanish energiyasi ancha pastligi (151 kJ/mol) sababli u kimyoviy reaksiyaga oson kirishadi.

a) Ftor atmosferasida, hatto shisha yemiriladi:



b) Oddiy moddalar bilan ftor juda shiddatli reaksiyaga kirishadi. Vodorod bilan ftor qorong'uda portlash bilan birikadi:




d) Oltingugurt va fosfor bilan ftor hatto suyuq havo temperaturasi (-190°C) da reaksiyaga kirishadi:



e) Ftor ba'zi inert gazlarni ham oksidlab, birikma hosil qiladi:



f) Yuqorida aytib o'tilganidek ftorning suv bilan ta'sirlashuvi boshqa galogenlardan farq qilib quyidagi tenglama bo'yicha boradi:




Boshqacharoq aytganda, ftor suv tarkibidagi kislorodni tortib oladi va oksidlaydi, ya'ni suv parchalanadi. Ftor o'z birikmalarida faqatgina — I oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Ftor atomining elektromanfiyligi katta qiymat ($N.E.M=4,01$) ga teng bo'lgani uchun hatto kisloroddan ham elektronni tortib olib, OF_2 tarkibli kimyoviy birikma hosil qiladi. Ftor molekulasining dissotsilanish energiyasi kichikligi (151 kJ/mol) ham ftorning yuqori kimyoviy faollikka ega bo'lish sabablaridan biridir. Reaksiya vaqtida F_2 lar osonlik bilan juda faol erkin atomlariga ajraydi.

Ftorning asosiy birikmalari qatoriga HF va uning tuzlari kiradi:

1. **Vodorod ftorid.** HF qutbli ($\mu=1,91$) molekula. Vodorod bog'lanish tufayli HF molekullari assotsilangan bo'ladi: $\text{HF} \dots \text{HF} \dots \text{HF}$. Shuning uchun oddiy sharoitda HF suyuq holatda bo'ladi ($t_{\text{qaynash}}=19^\circ\text{C}$).

2. **Ftorid kislotaning olinishi.** U quyidagi ion almashinish reaksiyasiga asoslangan holda olinadi:



3. Vodorod ftoridning suvli eritmasi kuchsiz kislotadir:



Ftorid kislota silikatlar tarkibiga kiruvchi kremniy (IV)-oksidi bilan reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiya uning asosiy xususiyatlaridan biridir (shishaning yemirilishiga sabab gazsimon SiF_4 hosil bo'lishidir):



$4\text{HF} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ hosil bo'lgan SiOF_4 eritmadagi HF bilan qo'shilib, H_2SiF_6 ni hosil qiladi: $\text{SiF}_4 + 2\text{HF} \rightarrow \text{H}_2\text{SiF}_6$

Shuning uchun ham fluorid kislota shisha idishda emas, balki qo'rg'oshin, fluoroplast, polietilen idishlarda saqlanishi lozim.

4. Davriy sistemada elementlarning davrlar va gruppalar bo'yicha xossalari o'zgarishi sababli fluoridlarning ham xossalari o'zgaradi. Ion bog'li fluoridlar yuqori suyuqlanish temperaturasi ega bo'lgan kristall moddalar. Kovalent bog'li fluoridlar gaz yoki suyuqlik. Oraliq fluoridlar (AlF_3) ion-kovalent bog'li birikmalardir. Ion bog'li fluoridlar asosli xossaga ega, kovalent bog'li fluoridlar esa kislotali xossaga ega. Buni quyidagi reaksiya misolida ko'rish mumkin:



Ushbu reaksiyada ion bog'li NaF donor (asos), kovalent bog'li SiF_4 esa elektron juftlar akseptori (kislota) vazifasini bajaradi.

Ishlatilishi. Fluor keng ko'lamda uran izotoplarini ajratishda ishlatiladi. Fluor sovutgich moddalar - freonlar, polimer materiallar - fluoroplastlar va xususan teflonni sintez qilishda qo'llaniladi. Fluorid kislota zaharli modda. Fluorid kislota shishalarga naqsh o'yish maqsadida, fluoridlar ishlatiladi.

XX.3. Xlor va uning birikmalari

Galogenlar gruppasidagi ikkinchi element xlor (chloros — "yashil-sariq" rangli) bo'lib, uning atomi tashqi elektron qavatidagi 7 ta elektrondan bittasi juftlashmagan. Shu sababli vodorod va florga o'xshaydi. Ammo III elektron qavatida bo'sh 3d-orbitallari borligi va ularga 3p va 3s-orbitallardagi elektronlarning ko'chishi mumkinligi sababli ulardan foydalanib ham qiladi. Shuning uchun Cl ning oksidlanish darajalari nafaqat -1 balki +1, +3, +5 va +7 bo'ladi. Buni quyidagicha tasavvur etish mumkin. Xlorning elektron formulasi quyidagicha yoziladi:



Yer yuzida tarqalishi. Tabiatda quyidagi minerallar tarkibida uchraydi: osh tuzi NaCl, silvinit $NaCl \cdot KCl$, karnallit $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$. Uning yer qobig'idagi umumiy miqdori 0,02 % ni tashkil etadi.

Tabiiy birikmalarda xlorning ikki xil izotopi mavjud: ^{35}Cl (75,5 %) va ^{37}Cl (24,47 %). Bundan tashqari, xlorning bir necha xil sun'iy radioaktiv izotoplari hosil qilingan. Xlor molekulasini ikki atomdan iborat (Cl_2). U

termik dissotsilash uchun flordagiga nisbatan ko'proq energiya sarf bo'ladi. $E_{Cl-Cl} = 243 \text{ kJ/mol}$, chunki Cl - Cl bog'ining tartibi birdan yuqori. Shuning uchun ham xlor molekulasining atomlarga ajralishi faqat $1000^\circ C$ va undan yuqori temperaturada sodir bo'ladi.


Fizik xossalari. Oddiy sharoitda xlor sarg'ish-yashil rangli gaz. Bir hajm suvda 2,5 hajm xlor eriydi. Sovutilganda suvli eritmalaridan $Cl_2 \cdot 6H_2O$, $Cl_2 \cdot H_2O$ tarkibli kristallogidratlar, ya'ni klatratlar ajralib chiqadi.

Xlorning olinishi. Laboratoriyada HCl ning konsentrlangan eritmasiga yoki qattiq holdagi NaCl, KCl ga kuchli oksidlovchi $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$, MnO_2 larni ta'sir ettirib olinadi:





Sanoatda xlor osh tuzi eritmasi va suyuqlanmasini elektroliz qilib olinadi.

Eritma elektrolizi sxemasi:



Suyuqlanma elektrolizida $2NaCl \rightarrow 2Na + Cl_2$

Kimyoviy xossalari. Xlor atomining elektromanfiyligi ancha yuqori (3) va radiusi kichik bo'lgani uchun kuchli oksidlovchidir, u metallar va ko'pchilik metallmaslarni shiddat bilan oksidlaydi (kislorod, azot va inert gazlar bundan mustasno):




Qaytaruvchilik xossasi faqat fluor bilan birikkanda namoyon bo'ladi. Xlor bevosita kislorod bilan birikmaydi. Xlor suvda eriydi va bu jarayon quyidagicha boradi:



Agar bu reaksiya ishqoriy muhitda olib borilsa, reaksiya to'liq o'ngacha boradi:



Xlor vodorod bilan quyosh nuri ta'sirida (zanjir reaksiya) birikadi:





Hosil bo'lgan modda xlorning eng ko'p tarqalgan, muhim birikmasidir.

Vodorod xlorid — HCl

Fizik xossasi. Oddiy sharoitda rangsiz, havo nomi ta'sirida "bug'lanib" turuvchi gazsimon modda. Vodorod xlorid suvda yaxshi eriydi, oddiy sharoitda bir hajm suvda qariyb 450 hajm HCl eriydi. Vodorod xloridning suvda eritmasi — xlorid kislota deyiladi va u kuchli kislotalar qatoriga kiradi.

Olinishi. Laboratoriya sharoitida osh tuziga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirib olinadi:




Sanoatda ikki usulda olinib, birinchisiga binoan yomg'lik nuri ta'sirida vodorodga xlor ta'sir ettiriladi.




Ikkinchi usul sulfat kislotali usul yoki laboratoriya usulining sanoatda qo'llanilishidir.


Kimyoviy xossalari. A. HCl molekulasida qutbli kovalent $\text{H}^+:\text{Cl}^-$ bog'lanishga ega bo'lgani uchun suvda eriganda ionlarga ajraladi (bo'linadi):



Xlorid kislota kuchli kislota sifatida faollik qatorida vodoroddan chapda joylashgan metallarning hammasi bilan ta'sirlashadi. Masalan:



Metallmaslar bilan ta'sirlashmaydi. Ammo HCl da Cl^- holatda bo'lgan uchun qaytaruvchi xossalari namoyon etadi va kislorodda yonadi:




Bu qaytar reaksiya bo'lib, sistema entropiyasining kamayishi bilan boradi. Shuning uchun $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ tenglamasiga ko'ra, harorat oshgan sari ΔG ning manfiy qiymati son jihatidan kamayib boradi va muvozanat chap tomonga siljiydi.


Xlorning (-I) oksidlanish darajali birikmalari xloridlar deyiladi. Tarkibiga ko'ra ularni metallar va metallmaslarning xloridlariga ajratish mumkin.

Element	Na	Mg	Al	Si	P	S
Xlorid	NaCl	MgCl ₂	AlCl ₃	SiCl ₄	PCl ₅	SCl ₂
Xlorid tabiati	asosli		amfoter	kislotali		



Jadvaldan ko'rinib turibdiki, elementlarning davrlar bo'yicha tartib raqami ortishi bilan xloridlarning xossasi asosidan kislotaligacha o'zgaradi. Ion bog'lanishli xloridlar, yuqori suyuqlanish temperaturasi ega bo'lgan kristall moddalardir. Kovalent bog'li xloridlar kislotali tabiatga ega bo'lib, gaz, suyuq yoki past temperaturada suyuqlanadigan qattiq moddalardir. Ular suv ta'sirida to'liq gidrolizlanib kislotalar hosil qiladilar:



Xloridlar tabiatining har xilligi, ularning o'zaro reaksiyasidan ham ko'rinadi:



Bunday reaksiyalarda asosli xloridlar (Cl^- ioni hisobidan) elektron jufti donori, kislotali xloridlar esa akseptorlik xossalari namoyon etadi. Ion-kovalent bog'li amfoter xloridlar esa oraliq xossalari namoyon qilib, ham kislota, ham asos tabiatli moddalar bilan birika oladi va murakkab tarkibli birikmalarni hosil qiladilar:



HCl ning AgCl, CuCl, AuCl₃, TiCl₄, PbCl₂, Hg₂Cl₂ kabi tuzlari suvda yomon eriydi. Ularning bu xossalari foydalanib analitik kimyoda tegishli

kationlarni aniqlashda va aksincha, ko'pchilik texnologik eritmalarda, oq suvlarda Cl^- ionlarni miqdorini aniqlashda foydalaniladi.

Xlorid kislota texnikada, tibbiyotda, laboratoriya amaliyotida ko'lamda ishlatiladi.

Xlorning kislorodli birikmalari

Xlorning Cl_2O , ClO_2 , ClO_3 , Cl_2O_7 , tarkibli oksidlari HClO (gipoxlorit), HClO_2 (xlorit), HClO_3 (xlorat) va HClO_4 (perxlorat) tarkibidagi kislotalari mavjud, ammo Cl_2O , Cl_2O_7 olingan emas. Bularda xlorning oksidlanish darajalari mos ravishda +1, +3, +5, +7 ga teng. Kislotalar ning metallar bilan hosil qilgan tuzlari ham mavjud.

Xlorning oksidlari bevosita "xlor-kislorod" ta'sirida hosil bo'lmaydi. Ularni olish uchun quyidagi reaksiyadan foydalaniladi:



HClO — kuchsiz kislota, juda kam miqdorda dissotsilanadi:




Oksixlorit ion- $[\text{ClO}]^-$ I va II grupp elementlari bilan gipoxlorit kislota tuzlarini hosil qiladi. Gipoxlorit kislota HClO beqaror, chunki




reaksiya bo'yicha parchalanib atomar kislorodni hosil qiladi, shu sababli HClO — kuchli oksidlovchilik xossasini namoyon etadi.


ClO_2 ni olish uchun quyidagi reaksiyalardan foydalaniladi:




Xlor (IV)-oksidni ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi:




Xlorat angidrid Cl_2O_7 olinmagan, lekin unga mos keluvchi xloratlarni va xlorat kislotalarni quyidagicha olish mumkin:



Ma'lumki, texnologik jarayonlar uchun suvni tayyorlash bosqichlari- dan biri — suvni Cl_2 gazi bilan dezinfeksiyalashdir. Bunda



reaksiyaga muvofiq HClO hosil bo'ladi.



HClO — parchalanish reaksiyasiga ko'ra atomar kislorod chiqaradi. Atomar kislorod suvdagi zaharli zarrachalarni oksidlaydi va suv toza bo'ladi. Ammo xlorli suvga ($\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HClO} + \text{HCl}$) ishqor qo'shilsa, bu qaytar reaksiyaning muvozanati o'nga to'liq siljiydi va reaksiya oxiriga- cha boradi, gipoxlorit kislotalarning barqaror tuzlari hosil bo'ladi:




KClO va KCl ularning birgalikdagi eritmasi "Javel suvi" deb ataladi. Kalsiy gipoxlorit CaOCl_2 ohakli suvga xlor ta'sir ettirib olinadi:




Hosil bo'lgan modda "xlorli ohak" yoki "oqartirgich xlor" deb ataladi. Tuzilish formulasi: $\text{ClO} - \text{Ca} - \text{Cl}$. Gipoxloritlar kuchli oksidlovchi moddalar bo'lgani uchun to'qimachilik sanoatida, tolalar, matolar, qog'ozni oqartiruvchi modda sifatida, dezinfeksiyalashda ishlatiladi.

Xlorning +5 oksidlanish darajasiga Cl_2O_5 , ClF_5 va HClO_5 — xlorat kislota to'g'ri keladi. Xlorat kislota quyidagicha ionlanadi:




U almashinish reaksiyasi natijasida hosil qilinadi (eng yuqori konsentratsiyasi 40% gacha etadi):




Xlorat kislota HClO_3 va xlorid kislota HCl aralashmasi “zar suvi” o‘xshash, kuchli oksidlovchilik xossasiga ega. Uch oksoxlorit ion $[\text{ClO}_3]^-$ tuzlari xloratlar deb ataladi. Amaliyotda Bertolle tuzi — kaliy xlorat KClO_3 ko‘proq ishlatiladi. U issiq ishqor (KOH) ustidan xlorini o‘tkazish bilan olinadi:



Kaliy xlorat suvda yomon eriydi. Xlorat kislota HClO_3 erkin holda ajratib olinmagan. Suvli eritmada HClO_3 kuchli kislota xossasini namoyon qiladi. Xloratlar qizdirilganda dispropor-siyalanish reaksiyasiga kirishadi:



Katalizator ishtirokida xloratlar parchalanadi:




Qizdirilganda xloratlar kuchli oksidlovchi xossasini namoyon qilish bilan ularning qaytaruvchilar bilan aralashmasi portlovchi modda hosil qilinadi:



Bertolle tuzi KClO_3 gugurt sanoatida ishlatiladi.

Xlorning eng yuqori oksidlanish darajasi +7, uning oksidi ClO_4 uch oksoftorid ClO_3F da namoyon bo‘ladi. Xlor (VII)- oksidi ClO_4 boshqa oksidlaridan farqli o‘laroq, rangsiz suyuq modda ($t_{\text{m}} = -93,4^\circ\text{C}$, $t_{\text{qay}} = +83^\circ\text{C}$). Xlor (VII)-oksid suvda eriydi va perxlorat kislota (HClO_4) hosil qiladi. Vodorod bog‘lanish tufayli HClO_4 molekullari dimerlanadi:



Perxlorat kislota — HClO_4 eng kuchli kislota. U konsentrlangan vodorod kislota va kaliy perxlorat tuzi reaksiyasi natijasida hosil bo‘ladi:



HClO_4 quyidagicha dissotsilanadi:




ClO_4^- — perxlorat ioni deyiladi. Ishqoriy va ishqoriy-yer metallari ionlari bilan tuzlar hosil qiladi. Ularning aksariyati eruvchan, lekin “portlovchi” moddalardir. Umuman, $\text{Cl}^{+1}\text{O} \rightarrow \text{Cl}^{+3}\text{O}_2 \rightarrow \text{Cl}^{+5}\text{O}_3 \rightarrow \text{Cl}^{+7}\text{O}_4$ qatorida xlorning oksidlanish darajasi oshgani sayin anionlar va ularning birlashtirilgan barqarorligi oshadi, chunki bu qatorda ClO^- dan ClO_4^- ga tomon Cl atomi elektron orbitallarining gibridlanish turi sp^3 holida qolib, σ - va π -bog‘lanishda qatnashuvchi elektronlar soni oshadi. $[\text{ClO}_4]^-$ anionlarida Cl—O bog‘i tavsifi quyidagicha bo‘ladi:

Anion	Bog‘ uzunligi $r(\text{Cl}-\text{O})$	Bog‘l.energiyasi $E(\text{Cl}-\text{O})$ kJ/mol
ClO^-	1,70	209,0
ClO_2^-	1,64	244,5
ClO_3^-	1,57	243,7
ClO_4^-	1,42	363,5


Xlor atomi atrofida kislород atomlari soni oshgan sari Cl — O bog‘i uzunligi kamayadi va bog‘lanish energiyasi oshadi. Ushbu qatorda ClO^- dan ClO_4^- tomonga qarab ionlarning oksidlovchilik kuchi kamayadi. Masalan, gipoxloritlar har qanday muhitda oksidlanish-qaytarilish reaksiyasiga kirishaveradi:




Ammono xloratlar (ya‘ni ClO_3 ionlari) faqat juda kuchli kislotali muhitda oksidlash xususiyatiga ega:



ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- ionlar qatorida quyidagi bog'lanishni mumkin:



Perxloratlar esa eritmalarda oksidlovchilik xususiyatini namoyon qilmaydi:




$\text{HClO} \rightarrow \text{HClO}_2 \rightarrow \text{HClO}_3 \rightarrow \text{HClO}_4$ qatorida kislotalarning kuch ortib boradi. Buning sababi shundaki, $\text{ClO}^- \rightarrow \text{ClO}_2^- \rightarrow \text{ClO}_3^- \rightarrow \text{ClO}_4^-$ qatorida, markaziy Cl atomi Cl=O bog'la nish elektronlar zichligini o'torgani sababli ion kompaktlashaveradi, O-H bog'ining kuchi susayradi va tegishli kislota oson dissotsilanadi.

Galogenlar qatoriga kiruvchi brom va yod to'g'risida qisqacha ma'lumot. Brom (Br_2) tabiatda birikmalar holida uchraydi, uning NaBr , MgBr_2 birikmalari dengiz suvida ko'proq miqdorda uchraydi. Tabiatda uchraydigan xlor birikmalari konida, masalan, KCl tuzlari konida brom birikmalari ham aralashma holida bo'ladi.

Brom turli organik va anorganik birikmalar tayyorlashda ishlatiladi. Bromdan ba'zi dorilar, antidektonatorlar ishlab chiqarishda, foto va kinematografiya materiallari sanoatida foydalaniladi.

Yod (J_2) oz miqdorda dengiz suvi tarkibida bo'ladi. Dengiz o'simliklari yod birikmalarini o'zida to'playdi. Bunday o'simliklar tanasida 1% gacha yod bo'ladi. Yod inson hayoti uchun nihoyatda zarur elementdir. Organik panjaradagi musbat zaryadli atom-ionlar bilan panjara bo'shlig'idagi "elektronlar to'plami" o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro tortishuv kuchlari mavjud. Shu sababli ular issiqlikni va elektr tokini yaxshi o'tkazadilar. Metallar atomlarining elektron tuzilishiga ko'ra s-metallar (ishqoriy va shqoriy-yer metallari), p-metallar (III—IV gruppalar asosiy gruppachasi metallari), d — metallar, f — metallarga bo'linadi.



Yod turli yod birikmalarini tayyorlashda ishlatiladi. Yodning spirtidagi 5% li eritmasi antiseptik modda sifatida ishlatiladi. Yodning radioaktiv izotopi rak va qalqon bezi (bo'qoq), ateroskleroz kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Yod va bromning hamda ular birikmalarining suvdagi eritmaları (J_2 , KJ , Br_2 , KBrO_3) analitik kimyoda (yodometriya va bromatometriya usullarida) oksidlovchi sifatida ishlatiladi. Galogenlarning xossalari bir-biriga o'xshashligi sababli, faqat xlorning xossalarini o'rganib brom va yodning kimyoviy xossalariga kengroq to'xtalmadik.

Savollar

- Galogenlar deb qanday elementlarga aytiladi?
- Galogenlarning tartib raqami ortishi bilan:
 - oksidlovchilik (qaytaruvchilik) xossalari qanday o'zgaradi?
 - vodorodli birikmalarining xossalari qanday o'zgaradi?
 - flor bilan boshqa galogenlarning o'xshashlik va farqli tomonlari qanday ifozlanadi.

XXI bob METALLAR

XXI. 1. Metallarning umumiy xossalari

Davriy jadvalning katta IV—VI va tugallanmagan VII davrlari qo'shimcha guruhchalariga va I, II, III (bordan boshqa) guruhlarining asosiy guruhchasiga kiruvchi barcha elementlar metallardir.

Metallarga fizikaviy jihatdan yaltiroqlik, qattiq holat, yorug'likni qaytarish, issiqlik va elektr tokini yaxshi o'tkazish, deformatsiyalanish xususiyatlari, kimyoviy jihatdan esa oson elektron berish va qaytaruvchilik xossalari namoyon qilish xosdir. Metallarda metall bog'lanish — kristall panjaradagi musbat zaryadli atom-ionlar bilan panjara bo'shlig'idagi "elektronlar to'plami" o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro tortishuv kuchlari mavjud. Shu sababli ular issiqlikni va elektr tokini yaxshi o'tkazadilar. Metallar atomlarining elektron tuzilishiga ko'ra s-metallar (ishqoriy va shqoriy-yer metallari), p-metallar (III—IV gruppalar asosiy gruppachasi metallari), d — metallar, f — metallarga bo'linadi.

Metallarning davriy jadvaldagi o'rniga ko'ra, ularning xossalari quyidagi tartibda o'zgarib boradi:

— elementlarning davrlarda tartib raqami ortib borishi bilan metallik xossalari kamayib boradi. Chunki tartib raqami ortishi bilan atom radiusi oshadi, elektron qavatlar soni ortib, atom radiusi kattalashadi va tashqi elektron qavatlar osonlik bilan chiqib ketadi. Masalan: Li (ionlanish energiyasi 5,39 ev), Na (5,14), K (4,34), Rb (4,7) va Cs (3,89) qatorida metallarning faolligi ortib boradi. Agar Li — metalli oddiy sharoitda ochiq havoda vaqt o'tishi bilan oksidlanib oq rangli moddaga aylansa, Na — ochiq havoda alanga olib ketadi. Shu singari LiOH ga nisbatan CsOH kuchli asosdir.

Gruppalarda elementlarning tartib raqami ortishi bilan ularning metallik xossasi kuchayadi. Chunki, tartib raqami ortishi bilan atom radiusi oshadi, elektron qavatlar soni ortib, atom radiusi kattalashadi va tashqi elektron qavatlar osonlik bilan chiqib ketadi. Masalan: Li (ionlanish energiyasi 5,39 ev), Na (5,14), K (4,34), Rb (4,7) va Cs (3,89) qatorida metallarning faolligi ortib boradi. Agar Li — metalli oddiy sharoitda ochiq havoda vaqt o'tishi bilan oksidlanib oq rangli moddaga aylansa, Na — ochiq havoda alanga olib ketadi. Shu singari LiOH ga nisbatan CsOH kuchli asosdir.

Katta davrlarning p- va d-metallarida bu xususiyatlar saqlanib qolinsada, ancha kuchsizroq namoyon bo'ladi. s-metallardan farqli o'laroq ular o'zgaruvchan oksidlanish darajalarini namoyon qiladilar. Masalan, IV guruh p-metallari Sn — qalay va Pb — qo'rg'oshin +2 va +4 oksidlanish darajasidagi oksidlanish darajasi ortishi bilan ularning kislotali xossasi kuchayib boradi. Past oksidlanish darajasidagi birikmalari Sn⁺², Pb⁺² qaytaruvchi, yuqori oksidlanish darajasidagi birikmalari Sn⁺⁴, Pb⁺⁴ birikmalari oksidlovchi bo'ladi. Masalan, PbO₂ kuchli oksidlovchi sifatida keng qo'llaniladi.

s-metallarning vodorodli birikmalari (gidridlari—LiH, NaH, CaH₂, GaH₃, BiH₃)da kovalent bog'lanish hisssasi ortadi, ular beqaror bo'ladilar. Metallarning gidridlari deyarli mavjud bo'lmay, ular o'zlarining sirtlarida vodorodni molekulyar (H₂) holda, molekulalararo ta'sir kuchlari vositasi sifatida tutib (adsorbiyalab) turadilar. Masalan: Pt — metalli, H₂ — gazini adsorbiyalab (H₂/Pt) vodorod elektrodining ishlashini ta'minlaydi.

d- va f-metallarning umumiy xususiyatlari

Davriy jadvalning yonaki guruh elementlari qatoriga asosan (n-2)f¹⁻¹⁴(n-1)d¹⁻¹⁰ns¹⁻² elektron tuzilishli d- va f- elementlar kiradi. Bu elementlar katta davrlarning I—VIII yonaki yoki Ib—VIIIb gruppalarida joylashgan turli rangli, noyob, siyrak yer va radioaktiv metallardir.

Ular valent elektronlari tashqi ns va (n-1)d yoki (n-2)f orbitalarida joylashgani uchun o'zgaruvchi valentliklar namoyon qiladilar. Ular ko'pchilik hollarda ularning valentliklari ular joylashgan guruh raqamiga mos kelmaydi. Yonaki guruh metallari birikmalarining kislotali xossalari metallning oksidlanish darajasiga, birikmalarining tarkibi va tuzilishiga bog'liq. Past oksidlanish darajalilari asos, yuqori oksidlanish darajalilari kislotali va oraliq oksidlanish darajalilari amfoter xossa namoyon qiladi.

Masalan: CrO — asos oksidi, Cr₂O₃ — amfoter, Cr₂O₇ — kislotali hosil qiluvchi oksid bo'lsa, ularga mos keluvchi gidroksidlar: Cr³⁺(OH)₃ — asos, Cr⁶⁺(OH)₆ — amfoter, H₂Cr⁶⁺O₄ — kislotali xossasiga ega moddalardir.

Metallmaslardan farqli ravishda metallar birikmalarida ularning atomlari o'zaro bog'lanib (Me — Me — Me) zanjirlar hosil qilish xossalari deyarli uchramaydi. Faqat Hg₂Cl₂ da Cl—Hg—Hg—Cl va ayrim (Mo, Re, Rh...) metallar o'zaro Me = Me, Me = Me, Me — Me bog'lari hosil qiladilar. Lekin ularning ionlarida qisman (yoki butunlay) bo'sh (n-1)d — va np — orbitalarning bo'lishi sababli bu metallarda donor-akseptor ta'sir tufayli kompleks birikmalar hosil qilish xususiyatlari kuchli ifodalangan. Shu boisdan ularning birikmalarining turi va soni juda ko'pdir.

p va d — metallari ionlarining elektron orbitalari erituvchi molekullari (H₂O) bilan oson ta'sirlashgani (oson deformatsiya-ylanishi) sababli bu metallarning suvda eruvchan barcha tuzlari gidrolizlanadi, ionlari gidratlangan gidroksi kompleks [Me(OH)(H₂O)_n]⁺ holda bo'ladi.

d — elektron orbitalari turli modda molekullari (yoki ionlari) bilan ta'sirlashganda, energiyalari bo'yicha bir-biridan farqlanadi (d — ajralish). Bu farqlanish energiyasiga ko'ra, ularning birikmalari turli: [Cu(H₂O)₆]⁺² (ko'k), [Co(H₂O)₆]⁺² (binafsha), [Ni(H₂O)₆]⁺² (yashil), [Fe(H₂O)₆]⁺³ (sariq) rangli bo'ladilar.

Metallarning ko'pchiligi (Na, K, Ca, Co, Ni, Cu, Zn, Mn) tirik organizmlarda hayotni ta'minlovchi muhim elementlardir. Ular mikroelementlar deyiladi.

Fizikaviy xossalari. Metallar xona temperaturasida qattiq moddalar bo'lib, faqat simob — suyuq metall. Metallar yumshoq, oson bolg'alanuvchan va juda qattiq bo'lib, yumshoq metallarga Li, Na, K, Ca, In larni kiritish mumkin (ularni pichoq bilan kesib bo'ladi). Oson bolg'alanuvchan va ishlov berish oson bo'lgan metallar — Al, Cu, Ag, Sn, Pt va oltin, undan 0,003 mm qalinlikdagi yupqa plastinka yoki simlar tayyorlash mumkin. Eng qattiq metall — Cr (xrom), u bilan

shishani kesish mumkin. Zichligiga ko'ra: **yengil** ($\rho < 5 \text{ g/sm}^3$) va **og'ir** ($\rho > 5 \text{ g/sm}^3$) metallarga bo'linadi. **Yengil metallarga:** Li, Na, K, Cs, Mg, Ca, Ba, Al lar kiradi.

Og'ir metallarga: Fe, Zn, Cu, Ag, Au, Hg, In, Mn, Co, Ni, Pb, Mo, W, Ir, Pb, Pd, Os lar kiradi.

Metallar ichida **eng yengillari:** Li (0,534 g/sm³), Na (0,97 g/sm³), K (0,86 g/sm³) lar bo'lib, ular suvdan yengildir. Eng og'ir metallar osmiy Os (22,5 g/sm³).

Elektr o'tkazuvchanlik bo'yicha: **kumush** > **mis** > **oltin** > **alyum** va boshqa metallar turadi.

Suyuqlanish temperaturalariga ko'ra: "oson suyuqlanuvchan" (-30°C), Cs (28,5°), Ga (29,7°), K (63,6°), Na (97,8°), Sn (231,2°), Pb (327,3°) metallarga, "qiyin suyuqlanuvchan" — Ni (1453°), Co (1495°), Fe (1540°), Pt (1769°), Cr (1875°), Mo (2620°), W (3390°C) metallar bo'linadi.

Tabiatda tarqalishiga ko'ra: **kam tarqalgan** (Li, Rb, Cs, Be, Mo, Nb, Hf); **siyrak-yer metallari** (Sc, Y (ittriy)), La va lantanoidlar; **tanmoliyotsozlik** (Ga, In, Tl, Ge), **noyob** (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os) metallar **radioaktiv** (Ra, Th, U, Ac va aktinoidlar) metallarga bo'linadi.

XXI.2. Qotishmalar

Metallar xalq xo'jaligida sof holda va juda ko'pchilik holda qotishmalar (ikki yoki undan ortiq metallarni saqlagan, bir jinsli qotishmalar) holida ishlatiladi.

Ko'p ishlatiladigan metall qotishmalarga quyidagilarni kiritish mumkin. **Cho'yan** — tarkibida 1,7 – 4,4 % uglerod saqlagan temirning qotishmasi. Uning tarkibida Si, P, Mn kabi qo'shimchalari bo'lib, temirga nisbatan qattiq, lekin mo'rt bo'ladi. Undan katta-katta jihozlarning asosi, karlar qurilishi yasaliadi. Po'lat olishda ishlatiladi.

Po'lat — tarkibida 1,7% dan kam uglerod saqlagan temirning boshqa metallar (Cr, Mo, W, B, Be, Li, Na, K, Co, Ni, V) saqlangan qotishmasi. Cho'yanga nisbatan elastik, ishlov berish oson bo'lgan mashinasozlikda qurilish va boshqa sohalarda keng qo'llaniladigan qotishma. Zanglamaydigan po'lat (tarkibida 12% xrom bo'lgan po'lat).

Jez — tarkibida 10% dan 50% gacha rux saqlagan mis qotishmasi. Asbobsozlik, motorsozlikda ishlatiladi.

Bronza — misning tarkibida 20% gacha qalay saqlagan qotishmasi. Oson quyiladi. Podshipnik, porshenlarning xalqalari, klapanlar ishlab chiqarishda va badiiy buyumlar, haykallar, byustlar quyishda ishlatiladi.

Konstantan — 60% Cu, 38–40% Ni dan iborat qotishma.

Nixrom — 60% Ni, 14–18% Fe, qolgani Cr dan iborat qotishma.

Yuqori elektr qarshiligiga ega bo'lgani uchun isticish moslamalari ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Xromel — 90% Ni va 10% gacha Cr li qotishma.

Alyumel — 95% Ni, 1,8–2,5% Al, 1,8–2,2% Mn, 0,88–1,15% gacha Si dan iborat qotishma. Xromel va alyumel elektr xossalari temperatura

o'zgarishiga juda sezgir material bo'lgani uchun termoo'lchagichlar, termoparalar yasashda ishlatiladi.

Babbittlar — 65% gacha Pb, 15–17% Sn, 15–17% Sb, 2% gacha Cu metallari saqlagan qotishmalar bo'lib, podshipnik ishlab chiqarishning asosiy materiali hisoblanadi.

Dyuralyumin — asosiy qismi Al, 3–5% Cu, 1% dan Mg, Ni, Mn metallari saqlagan mexanik ta'sirga chidamli, lekin engil qotishma. Tanmoliyotsozlik, mashinasozlik va asbobsozlikda ishlatiladi.

Silumin — 86–88% Al va 12–14% Si dan iborat qotishma. O'lchov va signal beruvchi moslamalarda ishlatiladi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qotishmalar ishlab chiqarish sharoiti, temperatura, metallarning nisbiy miqdori o'zgarishi bilan tuzilishi va xususiyatlari keskin o'zgaradigan sistemalardir. "Qattiq eritma" — qotishmalarni bu xususiyatlari uchun "bertollid"lar qatoriga kiritiladi.

Shu sababli ishlab chiqariladigan har qanday metall qotishmasi aniq xossa va tarkibga mos kelishi uchun ularni ishlab chiqarishdagi "tarkib-xossa" diagrammalaridan kelib chiqadigan parametrlariga to'la amal qilinishi kerak.

XXI.3. Metallarni olish.

Metallurgiya to'g'risida tushuncha

Metallar tabiatda erkin holda (Au, Ag, Cu, Fe, Hg) va turli birikmalar (oksidlari, sulfidlari va boshqa tuzlari) holida tarqalganlar. Metallarni olish, ular asosida turli qotishma va maxsus birikmalar ishlab chiqarish bilan kimyo sanoatining o'ziga xos sohasi — metallurgiya shug'ullanadi.

METALLURGIYA		
Pirometallurgiya	Gidrometallurgiya	Elektrometallurgiya
Turli oksid, sulfid, xloridlardan qaytaruvchilar yordamida yuqori temperaturada metallarni olish	Metall rudalarini eritma holiga o'tkazib, eritmalaridan kuchli (aktiv) metallar yordamida qaytarib metall olish usuli	Metallarning tuzlari eritma yoki suyuqlanmalarini elektr toki ta'sirida qaytarish (elektroliz) usuli bilan metallar olish
Qaytaruvchilar: C—koks, CO—gaz, Mg (magniytermiya), Al (aluminotermiya), Si (kremniytermiya), Na (natrityermiya), H ₂ (vodorod)	Ajratib olinadigan metallar: Au, Ag, Hg, Cu, Pt, Pd	Ajratib olinadigan metallar: Na, K, Ca, Mg, Al, Ni, Be, Cu

27-rasm. Metallurgiya turlari.

Metallurgiya deb, kimyo sanoatining tabiiy manbalar va rudalardan metallarni olish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan sohasiga aytiladi. Metallurgiya qora (temir va uning asosidagi qotishmalar) va rangli metallurgiyaga bo'linadi.

Rangli metallurgiya yengil, noyob va og'ir metallar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozirgi vaqtda metallurgiya sanoati yordamida xil metall va ular asosidagi turli qotishmalar ishlab chiqarilayapti.

Metallurgiya metallarni olish usullariga ko'ra: *pirometallurgiya*, *gidrometallurgiya* va *elektrometallurgiya* turlariga bo'linadi. Keyingi vaqtda *biometallurgiya* turi ham rivojlanmoqda (27-rasm)

Tarkibida ajratib olinadigan metall saqlagan qazilma boylik — rudalar deyiladi. Rudaning asosiy moddadan tashqari qismi — *bekorchi aralashma* bo'lib, ularga: qum — tuproq, loy, ohaktosh kabilar kiradi.

Rudaning suyuqlanish temperaturasini kamaytirish uchun qo'shiladigan qo'shimcha — *flyus* deyiladi. Flyus bekorchi aralashmalar bilan oson suyuqlanuvchi aralashma — *shlak* hosil qiladi va chiqarib yuboriladi. Agar bekorchi aralashma qum bo'lsa, flyus — ohaktosh (CaCO₃) bo'lsa, va aksincha. Ikkala holda ham *shlak* CaSiO₃ holida chiqarib yuboriladi.

Agar ruda tarkibida ajratib olinadigan metall miqdori kam bo'lsa, ruda boyitiladi yoki konsentrlanadi. Uning *flotatsion*, *gravitatsion* va *magnit* usullari mavjud.

Flotatsion usulda ruda sirt aktiv xossaga ega bo'lgan modda — *flotareagent* qo'shiladi. Bu modda ruda bilan aralashma hosil qilib uning sirtini namlanishdan saqlab, suv va havo oqimi ta'sirida ko'pik hosil qilib, sirtida ruda zarrachalarini suvning sirtiga ko'tarib chiqadi, bekorchi jinslar cho'kadi. Suv sirtidagi boyitilgan ruda ajratib olinadi.

Flotareagentlar — tarkibida qutbsiz va qutbli atomlar gruppalarini saqlagan organik sirt aktiv moddalardir. Masalan, stearin — C₁₇H₃₅—COOH va palmitin — C₁₆H₃₃COOH kislotalari. (C₁₇H₃₅—, C₁₆H₃₃— qutbsiz, —COOH — qutbli gruppalar).

Gravitatsion usul — turli o'lchamli ruda zarrachalarining zichligi (og'irligi) har xilligidan foydalanib, suyuqliklar bilan aralashmalari (suspensiyalari)da ruda zarrachalarining turlicha cho'kishiga asoslangan boyitish usulidir.

Magnitli usul — magnitga tortiluvchi (yoki magnit bilan ta'sirlashmaydigan) zarrachalarga magnit maydoni ta'sir ettirib ajratishga asoslangan usuldir.

O'zbekistonda metallurgiya rangli, o'tga chidamli qotishmalar ishlab chiqarish sohalari rivojlangan.

Chirchiq shahrida "O'tga chidamli va qiyin eruvchan metallar" korxonasi Mo, W, Co, Ni metallarini olish va ular asosida turli qotishmalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.

Olmalik "Tog'-kon metallurgiya kombinati" turli rangli va noyob metallar (Cu, Zn, Au, Ag) olishga ixtisoslashgan.

Navoiy "Tog'-kon metallurgiya kombinati" noyob (Au, Ag) va radioaktiv metallar (uran va uning birikmalari) tutgan fudalarni boyitish, qayta ishlash va tarkibiy qismlarga ajratishga ixtisoslashtirilgan.

Bekobod metallurgiya zavodi, Samarqand Cho'yan zavodida metallar va qotishmalarni qayta ishlash jarayonlari olib boriladi.

XXI. 4. Metallar korroziyasi

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: korroziya, kimyoviy, elektrokimyoviy korroziya, korroziyadan himoyalash usullari (legirlash, plakirlash, protektor himoya, katod himoya).

Metallar va ular asosida yasalgan buyumlar, jihozlar ochiq havoda turganda yoki ishlatilganda yemiriladi, ya'ni korroziyalanadi.

Metallar korroziyasi — metall va metall qotishmalarining tashqi muhit ta'sirida kimyoviy yoki elektrokimyoviy yemirilish hodisasidir. Har qanday korroziyalanish oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining natijasidir.

Metallarning korroziyalanishiga sababchilar: havodagi nam (H_2O), kislorod (O_2), agressiv gazlar (CO_2 , SO_2 , H_2S , Cl_2) va boshqalar.

Korroziya ikki xil bo'ladi: kimyoviy korroziya va elektrokimyoviy korroziya.

Kimyoviy korroziya. Bu korroziyani boshqacha qilib gazlar ta'sirida korroziya ham deyiladi. Bunday korroziyada metall gazlar (O_2 , CO_2 , H_2S , Cl_2) bilan ta'sirlashib o'z sirtida oksid yoki boshqa birikma hosil qiladi va yemirila boshlaydi. Ko'pchilik hollarda metall oksid hosil bo'lib, ular juda barqaror moddalar bo'lgani uchun metall sirtida yupqa "oksid parda" hosil qiladi va metallni keyingi korroziyalanishdan saqlaydi. Masalan: Al metalli sirti Al_2O_3 bilan, Cr-sirti Cr_2O_3 bilan qoplab qoladi. Ba'zi hollarda bu oksidlar "parda" holida bo'lmaydi. Masalan, temir sirtida FeO va Fe_2O_3 — oksidlar hosil bo'lishi mumkin. Lekin bu oksidlar pardalar bo'laklanib "yirtilib" ketishi tufayli temirning korroziyalanish davom etaveradi.

Yuqoridagilarga asosanib shuni aytish mumkinki, gazlar ta'sirida korroziya oksidlovchining kuchiga, hosil bo'ladigan oksid pardaning xosligi va tuzilishiga, kislorod (yoki boshqa gaz)ning metall qatlamiga sirtidan o'tirishi — diffuziyaning kuchiga, metall atomlarining hosil bo'lgan oksid qatlamga diffuziyaning kuchiga va oksidning uchuvchanligiga bog'liq bo'ladi.

Bu o'rinda shuni aytish lozimki, metallar qotishmalari oksid parda yordamida korroziyadan kam yemiriladi. Chunki bunda qo'sh oksidlar (MeO , Me_2O_3) tarkibli birikmalar hosil bo'lib, bu oksidlar Me^{+2} va Me^{+3} larning aralash oksidlaridan iborat birikma — "shpinel" tuzilishli bo'lgani uchun juda barqaror bo'ladi.

Masalan, Mg—Al qotishmasi MgO , Al_2O_3 — tarkibli "shpinel" hosil qilgani uchun bu qotishma korroziyaga juda chidamlidir.

Lekin hamma hollarda ham oksidlarning (yoki boshqa birikmalar) hosil bo'lishi korroziyani to'xtatmaydi, aksincha uni tezlashtiradi. Metallarning fizik-kimyoviy xossalari o'zgarishiga olib keladi. Bunday holat yuqori oksidlanish darajasi (+5, +6, +7) namoyon qiluvchi metallarda kuzatiladi.

Masalan, W — volfram o'tga chidamli, qiyin suyuqlanuvchan metall ($t_{suyuqlanish} = 3390^\circ C$). Gazlarda korroziyalanish tufayli kislorodli muhitda WO_3 , xlorli muhitda WCl_6 birikmalarini hosil qiladi. Bu birikmalar $t_{suyuqlanish}(WO_3) = 1930^\circ C$, $t_{suyuqlanish}(WCl_6) = 347^\circ C$ bo'lgani va oson uchuvchi bo'lgani uchun volframning korroziyalanishini tezlashtiradi va "o'ta chidamli"lik xususiyatini kamaytiradi.


Elektrokimyoviy korroziya — turli metallar o'zaro bir-biriga tegib turganda agressiv muhit ta'sirida elektr potensiallar farqi yuzaga kelishi tufayli sodir bo'ladigan korroziya.

Ko'pchilik hollarda bu korroziyaning asosiy "aybdori" metall sirtini qoplab turgan namlik yoki suv bo'ladi. Chunki $pH = 7$ da suvning qaytarilish normal elektrod potentsiali $E^0 = -0,41$ v ga teng, shu sababli suv oksidlanish potentsiali $-0,41$ v dan kichik bo'lgan barcha metallarni oksidlaydi.

Neytral muhitda ($pH = 7$) suv molekullari ishqoriy, ishqoriy-yer metallarni, Al, Zn, Fe, Mn, Cr va Ti ni korroziyalaydi. Kislotali muhit ($pH < 7$) da suv molekullari Co, Ni, Pb, Mo, W kabi metallarni "yemiradi". Agar suvda kislorod gazi erigan bo'lsa ($O_2 + H_2O$ o'ta agressiv aralashma), korroziyalanish juda tez va keng miqyosda boradi, chunki bu aralashmaning normal oksidlanish potentsiali $E^0 = +0,815$ v ga teng.

Nikellangan temir buyum darz ketganda ro'y beradigan korroziyalanish ham elektrokimyoviy korroziya bo'lib, quyidagicha sodir bo'ladi (28-rasm).

Nikellangan temir buyum darz ketganda havodagi nam (suv molekullari), CO_2 va boshqa gazlarning temir sirtiga o'tirishi tufayli temir asta-sekin yemirila boshlaydi. Bu shunday ro'y beradi: metall sirtidagi CO_2 nam bilan ta'sirlashib oz bo'lsada karbonat kislotasini hosil qiladi ($H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$). Bunda temir va nikel go'yoki biror elektrolit eritmasiga tushirilgandek bo'lib, musbat va manfiy zaryadlangan elektrodlarga aylanadi va ularning standart oksidlanish potentsiallari ($E^0_{Fe^0/Fe^{+2}} = -0,44$ va $E^0_{Ni^0/Ni^{+2}} = -0,25$ v) turli xil bo'lgani uchun galvanik element hosil qiladilar. Bunda temirning oksidlanish potentsiali kichik bo'lgani uchun u o'z elektronlarini nikel sirtiga o'tkazadi, o'zi esa Fe^{+2} ionlari holida eritmaga o'ta boshlaydi: $Fe^0 - 2e^- \rightarrow Fe^{+2}$. Temir — anod, nikel esa katodga aylanadi. Ma'lumki, temir sirtidagi nam va CO_2 kuchsiz kislota hosil qilgani uchun oz bo'lsada H^+ — ionla-




28-rasm. Ni — qoplami buzilgan temir buyum sirtidagi korroziya.

rini hosil qiladi. Bu vodorod ionlari manfiy zaryadli nikel — tortilib, undagi temir atomlari qoldirgan elektronlarni qabul qilib qilinadi:



Bu jarayonda ishtirok etayotgan nikel faqat elektronlarni o'tkazuvchi vazifasini bajaradi, lekin o'zi o'zgarishsiz qoladi. Emirilish natijasida hosil bo'lgan Fe^{2+} — ionlari, suvning dissotsilanishidan hosil bo'lgan OH^- ionlari, suv va havo kislorodi ta'sirida quyidagi moddalarni hosil qiladi:



$\text{Fe}(\text{OH})_3$ havoda parchalanib qizil qo'ng'ir rangli Fe_2O_3 ni hosil qiladi:



Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, havoda suv bug'i va agressiv muhit qanchalik ko'p bo'lsa, korroziyalanish shuncha tez boradi. Bu jarayon temirning hammasi yemirilib bo'lmaguncha davom etaveradi. Bunday korroziyada temir anod vazifasini bajargani uchun bunday korroziyaning asosiy nishni **anod bo'yicha korroziyalanish** deyiladi. Elektrokimyoviy korroziya yuqoridagi holatlardan tashqari yana:

— metall bilan uning biror elektr o'tkazuvchanlik xossasiga ega bo'lgan birikmasi (tuzlari) o'zaro "kontakt" da bo'lganda ham shunday korroziya ro'y beradi. Bunda metallning birikmasi katod vazifasini bajarib, uning sirtida oksidlovchi (korroziyalovchi modda) qaytariladi. Bunday korroziya katod vazifasini metallning oksidlanish reaksiyasi mahsulotlari (oksid, gidroksid, tuzi) bajarishi va tezlashtirishi ham mumkin. Metallning himoyalangan qismi (sirti) anod vazifasini o'taydi. Bunday korroziya "**pardali korroziya**" deyiladi (V. A. Kistiyakovskiy nazariyasi).

— metall sirtining turli qismlari oksidlovchi (kislorod)ni konsentratsiyasi turlicha bo'lgan elektrolit eritmasi bilan ta'sirlashgan turganda ham elektrokimyoviy korroziya ro'y beradi.

— agar metall buyumning turli qismidagi ichki mexanik kuchlanganlik turlicha bo'lsa, aniqrog'i, metallning bir qismi "siqilgan", boshqa qismi "kengaytirilgan" da ham **elektrokimyoviy korroziya** ro'y beradi. Chunki metallning "siqilgan" qismida E ning qiymati yuqori, "kengaytirilgan" qismida E — qiymati shu metallning E^0 qiymatidan kichik bo'ladi. Bunday agressiv muhit ta'sirida "konsentratsion" galvanik elementning hosil bo'lishi

olib keladi va "**siqilgan**" qism — katod, "**kengaytirilgan**" qism — anod vazifasini o'taydi va buyumning shu qismidan metall korroziyalanib boshlaydi.

Yuqoridagi bayon etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, doimiy foydalanishda bo'lgan har qanday metall dan yasalgan buyum va detallar doimo u yoki bu korroziyalanishga uchraydi. Korroziya natijasida uskuna, jihozlar, buyum va detallar yemirilib yaroqsiz holgacha kelib qoladi. Xalq xo'jaligi korroziyadan juda katta zarar ko'radi. Shu sababli kimyo fanining eng asosiy vazifalaridan biri korroziyaga qarshi kurashish muammolarini yechishdan iborat.

XXI.5. Korroziyadan himoyalash usullari

Korroziyadan himoyalashning bir necha usullari mavjud. Bu usullarni qo'llash himoyalangan metallning tabiati, ishlatilish maqsadi, o'rni va sharoitiga bog'liq. Shu usullarning ayrimlari bilan tanishib chiqaylik.

Metallar sirtini legirlash usuli — himoyalangan metall sirtiga yuqori vakuum ostida yoki plazmali purkagich yordamida va termoqayta ishlash bilan korroziyaga chidamli metallni qotishmaga aylantirishdir. Umuman, legirlash uchun "passiv" metallar — Cu, Au, Ag yoki korroziyaga chidamli oksid parda hosil qiluvchi metallar Al, Zn, Sn, Cr, Pb, Ni, V ishlatiladi.

Plakirlash usuli — bu metall prokatlari olish jarayoni bilan birgalikda ularning sirtida himoyalovchi metall qatlamini hosil qilishdir. Bu usulga binoan po'lat, cho'yan sirti Al, Zn yoki Sn bilan qoplanadi. Bu usulning himoyalovchi metallni himoyalovchi metall suyuqlanmasiga tushirib sirtini qoplash ("okunaniye") turi ham mavjud. Agar bu maqsadga himoyalovchi metall suyuqlanmasi sifatida Zn ishlatilsa — "ruxlash", Al qalay metali — Sn suyuqlanmasidan foydalanilsa — "qalaylash", Al metali bo'lsa — "allitirlash"; Cr bo'lsa — "xromlash", Si bo'lsa — "silitsirlash" deb aytiladi.

Oksidlash usuli — himoyalovchi metall sirtini kimyoviy yoki elektrokimyoviy usul bilan yupqa, lekin juda zich parda bilan qoplash usulidir.

Kimyoviy usulda sirti tozalangan metall kuchli oksidlovchi (H_2SO_4 , HNO_3) eritmasiga tushirilib sirtida oksid parda hosil qilinadi. Masalan, himoyalangan (sirti kuchli oksidlovchi modda ta'sirida "oksid parda" bilan qoplangan) po'lat idishlar konsentratsiyasi 75% dan yuqori bo'lgan H_2SO_4 eritmasini po'lat sirtiga surkash bilan hosil qilinadi. Ba'zi hollarda po'lat buyum NaNO_2 (50 g/l) yoki NaNO_3 (200 g/l) va NaOH (800 g/l) moddalar eritmalari aralashmasiga tushirilib 140°C da 90 minut davomida ushlab turiladi va himoyalovchi oksid parda hosil qilinadi.

Elektrokimyoviy usulda himoyaladigan metall oksidlovchi eritma tushiriladi va metallga tokning musbat qutbi ulanib qo'yiladi. Bunda "oksid parda" langan metallni ba'zan anodlangan metallar deyiladi.

Fosfatlash — metallar sirti kimyoviy ta'sirga chidamli va bo'yoq qulay bo'lsin uchun himoyaladigan metallni fosfat kislotaning norg. tuzlar eritmalari bilan ishlash usulidir. Bu ko'pincha temirdan yasalgan jihoz, buyumlarni himoyalashda qo'llaniladi.

Masalan, po'lat sirti $\text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ yoki $\text{Mn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ tuzlari eritmasi bilan qayta ishlansa g'ovak, lekin mustahkam parda (FePO_4) bilan qoplanadi. Bunday po'lat sirti turli bo'yoq (kraskalarni) o'ziga juda yaxshi yopishtirib oladi.

Elektrokimyoviy usullar: protektorli himoya va tashqi kuchlanish usuli.

Protektorli himoya usulida himoyalanuvchi metallga uning oksidlanish potentsiali E° dan kichik potentsialli metall bo'lakchasi kavsharlab qo'yiladi. Bunda ko'pincha aktiv metallar (magniy, rux)dan foydalaniladi.

Oksidlanish potentsiali kichik metall himoyalanuvchi metallga nisbatan aktivroq bo'lgani sababli tez oksidlana boshlaydi va hosil bo'lgan yangi (sun'iy) galvanik elementda anod vazifasini bajaradi, natijada asosiy metall korroziyaga uchramaydi.

Bunday himoyaga agressiv eritma muhitida ishlaydigan temir buyumlarga magniy, rux, alyuminiy metallari yoki ularning qotishmalari bo'laklarining biriktirib qo'yilishi misol bo'la oladi. Okean, dengiz kemalarida shu usulda korroziyadan saqlanadi. Aktivroq metall anod tamom bo'lganda yangi metal bo'lakchasi biriktiriladi.

Tashqi kuchlanish usulida himoyalanuvchi metallga tashqi elektr manbaidan kuchlanish beriladi, ya'ni himoyalanuvchi metall elektr manfiy qutbiga ulanib, "katod" ga aylantiriladi. Natijada oksidlovchi moddalar himoyalanuvchi metall sathida, elektr manbaidan keladigan elektronlar hisobiga qaytariladi va asosiy metall yemirilishdan saqlanadi. Bu usul temir yo'l relslarida ko'p qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan tashqari metallarni korroziyadan saqlash uchun usul sirtiga turli xil moylash vositalari, polimer qoplama-lar, mum qoplama-lar turli bo'yoqlar surkash usullari ham qo'llaniladi.

Eritma muhitini o'zgartirish — elektrolit eritmasiga turli ingibitorlar qo'shib beriladi, ya'ni korroziyani sekinlashtiruvchi moddalar qo'shish bilan metallarni yemirilishdan saqlash.

Ingibitorlar turli organik moddalar (spirtlar) va anorganik moddalar (nitritlar, xromatlar, fosfatlar, silikatlar) dir.

XXI. 6. Lantanoidlar va ularning birikmalari

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: lantanoidlar, aktinoidlar, uran, mis metall qotishmalar.

Davriy sistemaning III B gruppasiga tartib raqamlari 58 dan 71 gacha bo'lgan metallar kirib, ular lantanoidlar (lantansimon, lantanga o'xshash metallar) deyiladi. Ular ittriy bilan birgalikda *siyrak metallar* ham deyiladi.

Lantanoidlar elektron tuzilishi bo'yicha boshqa elementlardan tashqaridan hisoblaganda $(n-2)$ elektron qavatidagi 4f- orbitallarini elektronlar bilan to'lib borishi bilan farq qiladilar. Ularning to'lib bora-yotgan elektron qavatini $4f^{n-1}5s^25p^65d^16s^2$ holida tasavvur qilish mumkin. Tartib raqami $Z = 58$ bo'lgan Seriy elementining elektron tuzilishi $...4f^75s^25p^66s^2$ bo'lsa, eng oxirgi lantanoid $Z = 71$ Lu — lyutesiyning elektron qobig'i $...4f^{14}5s^25p^66s^2$ ko'rinishda tugaydi. Shu sababli bu elementlarning xossalari bir-biriga juda o'xshash bo'lib, ular bitta katakchaga joylashtirilgan.


Tabiatda tarqalishiga ko'ra lantanoidlar ikki gruppachaga bo'linadi. Birinchisi (seriy gruppachasi)ga — La, Ce, Pr, Pm, Sm va ikkinchisi (ittriy gruppachasi)ga Y, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu kiradi. Umuman lantanoidlar tabiatda 170 dan ortiq minerallar holida tarqalgan. Ular ichida atom og'irligi katta va tartib raqami toq bo'lganlari kamroq tarqalgan. Ulardan, monatsit $(\text{Ce, La, Nd})\text{PO}_4$; (Ce, La...) FCO_3 — bastnezit; Ce, Si, O — serit, $(\text{V, Eu, Gd})\text{PO}_4$ — ksenoptimlar ko'p uchraydi.

Bu minerallardan lantanoidlarni ajratib olish ancha murakkab, chunki bu elementlarning kimyoviy xossalari bir-biriga juda o'xshash, atom radiuslari deyarli bir xil va ularni bir-biridan ajratish usullari unchalik takomillashmagan bo'lib, bo'laklab (differensial) kristallashga asoslangan. Bu usulga binoan lantanoidlar nitrat va sulfat tuzlariga o'tkazilib "mishmetall" — lantanoidlarning seriy va lantan bilan hosil qilgan qotishmasi (40—45% Se, 20—25%, La — 15%, Nd — 10% boshqa lantanoidlar va 5% gacha Fe) holida ajratib olinadi. Hozirgi vaqtda xromatografiya va ekstraksiya usullari bilan 99,7—99,9% gacha tozalikuagi lantanoidlar ajratib olinayapti.


Ajratib olingan birikmalardan La lar: a) floridlaridan magniy va kalsiytermiya usuli; b) LaCl_3 larning suyuqlanmasini elektroliz qilish bilan olinadi. Olingan metallning tozalik darajasini oshirish uchun vakuumli qayta ishlash usulidan foydalaniladi.

Fizik xossalari. Lantanoidlarning barchasi kumushsimon oq-yaltir metallar bo'lib, havoda xiralashadi. Seriy gruppachasi metallari plavk va yumshoq bo'lib, tartib raqami ortishi bilan qattiqligi ortib boradi. Itttriya gruppachasi metallari ancha qattiq bo'lib, ulardan itttriya bolg'alanuvchan va juda yuqori elektr o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega metall. Lantanoidlar — paramagnit metallar, lekin Eu, Gd, Er xarakteridagi temperaturasidan pastda ferromagnitlik xossasini namoyon qilsa, Dy temperaturaga bog'liq holda paramagnit, ferromagnit va antiferromagnitlik xossalarni namoyon qiladi. Barcha lantanoidlar yuqori suyuqlanish temperaturasi ega.

Kimyoviy xossalari. Faolligi jihatidan lantanoidlar ishqoriy metallar bo'lib, yaqin turadi va ularning elektrod potentsiyali $\text{La}(-2,483 \text{ v}) - \text{Lu}(-2,28 \text{ v})$ qiymatga ega. Suv bilan juda shiddatli reaksiyaga kirishadi:



HF va H_3PO_4 dan boshqa barcha suyultirilgan kislotalarda eriydi:




Hosil bo'ladigan tuzlari suvda yaxshi eriydi. LaF_3 va LaPO_4 lar suvda erimaydi. Nisbiy elektromanfiyligi 1,2—1,3 qiymatlarni tashkil etadi. Barcha metallmaslar bilan reaksiyaga kirishib, qaytaruvchi xossalarni namoyon qiladilar.

Oksidlari — La_2O_3 juda barqaror birikmalar bo'lib ($\Delta H_{\text{h} \cdot \text{b}} = -1664$ kJ/mol) Al_2O_3 niki bilan tenglashadi. Barcha lantanoidlar juda oson oksidlanadilar:




shu sababli ular benzol ostida saqlanadi.

Barcha oksidlari oq rangli moddalar bo'lib, suvda qiyin eriydi. Erta jarayonida katta issiqlik chiqaradi:




Oksidlarini olish uchun nitratli va fosfatli tuzlari, gidroksidlari termoliz parchalanadi:



Barcha $\text{La}(\text{OH})_3$ lar kuchli asoslar bo'lib, suvda yaxshi eriydi. Gidroksidlarining kuchi lantanoidlarning ion radiusi kamayishi bilan kamayib boradi, shu sababli $\text{Yb}(\text{OH})_3$ va $\text{Lu}(\text{OH})_3$ lar amfoter xossa namoyon qiladi.

Galogenli birikmalari: LaG_3 ($G = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) ichida floridlar erimaydi, boshqalari suvda va spirtlarda yaxshi eriydi.

Vodorodli birikmalari: LaH_3 va LaH_2 tarkibli ion bog'lanishli moddalar bo'lib, ishqoriy-yer metallarining gidridlari singari suvda oson gidrolizlanadi:



Oltinugurt, fosfor va azot bilan LaS , La_2S_3 , La_3S_4 , LaS_2 (metallsimon birikmalar). LaP va LaN tarkibli moddalarni hosil qiladilar. Ularning hammasi o'tga chidamli ($t_{\text{parch}}^0 = 2900^\circ\text{C}$) moddalar bo'lib suv ta'sirida (nam havoda) vodorod sulfid va ammiak hosil qiladilar:



Uglerod bilan LaC_2 tarkibli karbidlari mavjud. Ular suv ta'sirida atsetilen hosil qiladilar.

Bulardan tashqari, La larning qator kompleks birikmalari, qo'sh tuzlari, La^{+4} va La^{+2} larning turli karbonat, perxlorat, aralash oksidlari hamda sulfatlari sintez qilingan.

Lantanoidlarning ishlatilishi: Bu metallar po'latga legirlovchi qo'shimchalar sifatida qo'shilganda uning oksidlanish temperaturasini 1200—1300°C ga chiqaradi.

Magnit va alyuminiyli qotishmalarga itttriya qo'shilsa "mustahkamlovchi"lik xossasini namoyon qiladi.

Atom texnikasida, elektronika, elektro- va radiotexnikada neytronlarni ushlab qoluvchi va turli detallar tarkibida qo'llaniladi.

YbPt_2 , YbRu_2 , LaRu_2 va YIr_2 tarkibli qotishmalari o'ta yuqori elektr o'tkazgich (sverxprovodnik)lar sifatida ishlatiladi. Lantanoidlar keramika sanoatida, CeO_2 radioaktiv nur ta'sirida xiralashmaydigan shisha olishda ishlatiladi.

XXI.7. Aktinoidlar va ularning birikmalari

Aktinoidlar (aktiniyga o'xshash elementlar) VII davrning III gruppacha f-elementlari bo'lib, ularning soni 14 ta va 90 — 10 elementlarni o'z ichiga oladi. Bu metallarda 5f — orbitallar elektron bilan to'lib borib:

Th(...5f⁶6s²6p⁴7s²); Ra(...5f⁶6s²6p⁴6d¹7s²); U(...5f⁶6s²6p⁴6d¹7s²);


Np(...5f⁶6s²6p⁴6d¹7s²); Pu(...5f⁶6s²6p⁴6d¹7s²) va shu taxlit davom etadi. Z = 103 Lr da (...5f⁶6s²6p⁴6d¹7s²) bo'ladi. 5f — orbitallar energiyasi bo'yicha 6d — orbitallarga juda yaqin va faqat 5f — orbitallar elektron bilan to'lib borib uchun bu metallar va ularning birikmalari xossalari o'zaro bir xil. *Ularining barchasi radioaktiv metallardir.*

Tabiatda uchrami. Toriy, protaktiniy va uran juda oz miqdordagi neptuniy va plutoniya tabiatda ko'proq tarqalgan. Ko'p tarqalgan minerallari: (Ce, La, Th...) PO₄ (monatsit, 12% gacha ThO₂), torit (ThSO₄, 77% gacha ThO₂), torianit (Th, U)O₂ (93% gacha ThO₂), torogummit Th(SiO₄)_{1-x}, uranit UO₂, nasturin UO₂ (x = 2,0–2,6), karioxal (K₂(UO₂)₂(VO₄)₂ · nH₂O (n = 1–3), tyuyamunit Ca(UO₂)₂(VO₄)₂ · nH₂O (n = 4–10), otenit Ca(UO₂)₂(PO₄)₂ · nH₂O (n = 8–12).

Toriyning yer po'stlog'idagi miqdori 6 · 10⁻⁴% uzoq yashovchi izotop ²³²Th (T_{1/2} = 1,4 · 10¹⁰ yil), yana 13 xil (223–235) izotopi mavjud. Protaktiniy (²³¹Pa (T_{1/2} = 3,4 · 10⁴ yil)). *Aktinoidlar ichida ko'p o'rganilgan gani uran bo'lib, uning misolida aktinoidlarning xossalari bilan tanishib chiqamiz.*

Uran — ⁹²U radioaktiv element bo'lib, uning 14 xil izotopi (224–237) mavjud. Uran eng uzoq yashovchi izotopi ²³⁸U (99,274%) boshqa (²³⁵U, ²³⁴U) izotoplari bilan birga tabiiy uranni tashkil etadi. Shuningdek 11 xil sun'iy 227–228, 236, 237 izotoplar ham bor. Ulardan ²³³U yadro yoqilg'isi sifatida ahamiyatlidir. Boshqa aktinoidlar sun'iy yo'l bilan olinadi.

Olinishi. Barcha aktinoidlarning tabiatda tarqalish miqdori (0,05–0,05% U) kam bo'lgani uchun ularning rudalari avvalo boyitiladi. Boyitilgan ruda fluorli birikmalar bilan qayta ishlanib UF₄ ga o'tkaziladi. UF₄ dan kalsiy yoki magniy ta'sirida qaytarish bilan texnik uran olinadi.



texnik uran vakuumda qayta haydash usuli bilan tozalanadi. Uranni olishdagi asosiy muammo uning izotoplarini ajratishdir, chunki faqat, ²³⁵U — izotopi yadro bo'linishi reaksiyalariga kirishadi. Buning uchun gazsimon UF₆ tuzi termodiffuziya usuli bilan g'ovaksimon tuzilishli filtrlardan o'tkaziladi. Uranning birikmalari bilan ishlashda uning "kritik massa" sig'a, ya'ni yadro bo'linishi reaksiyasi boshlanadigan eng kam miqdoriga e'tibor berish kerak. *Shunga ko'ra, uning ko'p miqdordagi tuzlari yoki eritmaları bilan ishlash mumkin emas.*


Fizikaviy xossasi. Oqish-kulrang po'lat rangli, og'ir metall (p = 19,12 g/sm³), 1132°C da suyuqlanadi. Uch xil polimorf modifikatsiyasi mavjud:



(ortorombik tuzilishi) (tetragonal) (yoqlarida markazlashgan kub)

Aktiv metallar (E⁰_{U³⁺/U⁰} = -1,789 v) qatoriga kiradi va ko'pchilik elementlar bilan birikmalar hosil qiladi.

Oksidlari. Kislorod bilan birikib qator oksidlar hosil qiladi:




Bularning orasida UO₂ va UO₃, UO₂ — asosli, UO₃ — amfoter (kislotali xossasi yuqoriroq) oksid, H₂U₂O₇ va H₂UO₄ tarkibli kislotalar ni hosil qiladi. Kislotalar bilan UO₂ ta'sirlashib, UO₂SO₄ va UO₂(NO₃)₂ uranil tuzlarini hosil qiladi.

Galogenli birikmalari. Ftor bilan oddiy sharoitda



ni hosil qiladi. Boshqa galogenlar bilan qizdirilganda birikadi. UF₆ va UCl₄ juda aktiv moddalar bo'lib suv ta'sirida gidrolizlanadi va oksigalogenidlarni hosil qiladi:



UO_2^{2+} — uranil (II) ioni deyiladi, kationlarga xos xususiyatlar namoyon qiladi.

Uran S, Se, Te lar bilan ta'sirlashib US , U_2S_3 , US_2 , USe , U_2Se_3 , UTe , U_2Te_3 , tarkibli xalkogenidlarni hosil qiladi.

Uraning tuzlari. Sariq rangli moddalar bo'lib, UO_2SO_4 , $UO_2(CH_3COO)_2$ va $UO_2(NO_3)_2$ suvda yaxshi eriydigan, UO_2HPO_4 , $NaUO_2(CH_3COO)_2$ va $NH_4UO_2PO_4$ yomon eruvchan moddalardir.

Turli tarkibli $[UO_2F_4]^{2-}$, $[UO_2F_6]^{2-}$, $[UO_2(CO_3)_2(H_2O)_2]^{2-}$, $[UO_2(SO_4)_2]^{2-}$, $[UO_2(NO_3)_4]^{2-}$ komplekslari mavjud.

Ishlatilishi. Uran va uning birikmalarini ishlatilish sohasi yadro energetikasidir. ^{233}U va ^{235}U izotoplari "yadro yonilg'isi" va ^{238}U — izotop plutoniy ^{239}Pu — izotopini olish manbaidir. ^{238}U va ^{235}U — izotoplar aralashmasini ishlatish iqtisodiy jihatdan qulay bo'lib, bir vaqtda yadro bo'linishi va plutoniy hosil bo'lishi hisobiga ko'p energiya hosil qilinadi. Shunday maqsadlarda UO_2 , U_3O_8 , UN va UC ham ishlatiladi.

Ba'zi tuzlari UF_4 uran olish maqsadida, UF_6 izotoplarni ajratishda UJ_4 toza uran metalini olishda ishlatiladi.

XXII bob

I A GRUPPACHA ELEMENTLARI

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *ishqoriy metallar — litiy, natriy, kaliy, soda turlari, olinishi.*

XXII.1. Umumiy xossalari

I A gruppaga vodorod, litiy, natriy, kaliy, seziy, fransiy elementlari kiradi. Vodorod metallmas bo'lgani uchun alohida o'rganiladi. Fransiy radioaktiv element bo'lib, uning yarim emirilish davri kichik bo'lganligi sababli kam o'rganilgan. Shu sababli I A gruppacha elementlarning sifatida, asosan ishqoriy metallar bilan tanishamiz.

I A gruppacha elementlari, ularning elektron tuzilishi va ayni xossalari to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Litiy. yunoncha "Lithos" — "tosh" degan ma'noni beradi. Deviy tomonidan (1818 y.) ajratib olingan. *Natriy* qadimgi yahudiy (bibl.) "neter", lotincha "nitrum", arabcha "suwwad", "sodium" — sirka bilan qo'chilsa qaynab ketuvchi ma'nosini anglatadi. *Kaliy* arabcha "alkali" — ishqor "emiruvchi" ma'nosini anglatadi.

Rubidiy lotincha "rubidus" — "qizil" degan ma'noni bildiradi. 1861 yilda, Bunzen, Kirxgof, spektrdagi qizil rang chizig'i bilan aniqladilar, *seziy* lotincha "caesius" — "ko'k" rang ma'nosini bildiradi. (1860 y.) , *fransiy* lotincha "francia" — Fransiya (1939 y. Perey ajratib olib, Fransiya sharafiga atagan).

Bu gruppada metallarining oksidlari (o'zlari ham) suvda yaxshi erib, o'yuvchi moddalar — ishqorlarni hosil qilgani uchun ishqoriy metallar deyiladi. Bu metallarning barchasi s-elementlar oilasiga kiradi. Ularning ichida eng kuchlisi fransiy bo'lib, undan keyin seziy turadi. Litiy birikmalari alangani "qizg'ish", Na "sariq", K "och lola", Rb "qizil" va Cs "ko'k" rangga bo'yaydi.


XXII.2. Litiy (Li)

Litiy aktiv metall bo'lgani uchun tabiatda faqat birikmalar: alyumosilikatli mineral — $LiAl(SiO_3)_2$ (spodumen), fosfatli mineral — $LiAl(PO_4)_2F$ (amblikonit) holida uchraydi.

Olinishi. Litiy asosan $LiCl$ — KCl evtektik aralashmasini elektroliz qilish bilan olinadi: $2LiCl \rightarrow 2Li + Cl_2$.

Fizikaviy xossasi. Oq yaltiroq, yumshoq, eng yengil metall

Kimyoviy xossasi. Litiy kimyoviy jihatdan ancha faol metall. Xona temperaturasida havodagi azot va kislorod bilan ta'sirlashadi va reaksiya mahsuloti sifatida kulrang Li_2O va oq rangli Li_3N hosil bo'ladi. Havoda $200^\circ C$ dan yuqorida, Cl_2 , Br_2 va I_2 atmosferasida oddiy bosimda kuchli alanga hosil qilib yonadi va $LiCl$, $LiBr$, LiI larni hosil qiladi. Suv bilan Li metali reaksiyaga kirishadi:




Aktivlik qatorida litiyning birinchi bo'lishiga sabab, uning atom radiusi kichik bo'lgani uchun ionlanish potentsiali 5,39 Ev ni tashkil etadi va boshqa ishqoriy metallarga nisbatan qiyin ionlanadi. Suvli eritmada hosil bo'lgan Li^+ ioni suv molekulasini bilan katta gidratlanish energiyasi chiqarib, ionlanishida sarf qilingan energiyani qoplaydi va $Li(k) \rightarrow Li^+ + e^-$ muvozanatni boshqa ishqoriy metallarga nisbatan ko'proq o'ngga suradi.

Birikmalari va ularning xossalari. Litiyning ko'pchilik birikmalari rangli bo'lib, ulardan LiF , Li_2CO_3 va Li_3PO_4 suvda oz eriydi. Li peroksidlar hosil qilishga kam moyil element. Lekin Li_2O_2 , Li_2S , Li_2C_2 (perkarbid) lar mavjud.

Litiy oksidi — Li_2O oq rangli gigroskopik, suvda yaxshi eriydigan modda. Havodan namni tortib oladi:



Shuningdek, Li_2O kislotalar, kislotali oksidlar va amfoter oksid gidroksidlar bilan oson ta'sirlashadi va tegishli tuzlarni hosil qiladi:




Litiy gidroksidi — LiOH . Oq kristall, juda kuchli gigroskopik modda suvda yaxshi eriydi va litiy ishqori (o'yuvchi litiy) ni hosil qiladi:



Lekin bu gidroksid o'z kuchi jihatidan shu gruppadagi boshqa element gidroksidlariga nisbatan kuchsizroqdir.

Litiy gidroksidi LiCl eritmasini elektroliz qilish bilan olinadi:



Litiy va uning birikmalarini ishlatilishi. Litiy metali, asosan, atom energetikasida tritiy (^3H) olishda:



va atom reaktorlarida issiqlik tashuvchi sifatida ishlatiladi.


XXII.3. Natriy va kaliy

Natriy — Na. Bu element tabiatda keng tarqalgan elementlar (po'stlog'ida 2,0%) qatoriga kirib, uning quyoshda va yulduzlararo fazolarda ham mavjudligi aniqlangan.


Tabiatda faqat birikmalar: NaCl (tosh tuzi, galit), $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (mirabilit yoki Glauber tuzi), Na_3AlF_6 (kriolit), NaNO_3 (natriyli selit), $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (bura), turli alyumosilikatlar tarkibida uchraydi. Sh

bilan birga gidrosfera (suv)da ham Na yaxshi eruvchan tuzlar holida tarqalgan bo'lib, uning suv havzalaridagi umumiy miqdori $1,5 \cdot 10^{16}$ t ni tashkil etadi. Eng ahamiyatlisi shundaki, natriy tirik organizmlarda asosiy elementlar sifatida Na^+ ioni holida mavjud bo'ladi, uni asosan NaCl holida iste'mol qilinadi. Inson qonida Na^+ ioni 0,32%, suyaklarda 0,6% va hujayra to'qimalarida 0,67—1,5% ni tashkil etadi. Natriy ioni fiziologik jihatdan o'ta ahamiyatli metallar ionlari qatoriga kiradi.

Oddiy modda holida Na oqish-kumushsimon, yaltiroq metall. Juda aktiv, havoda (odatda kerosin ostida, shisha idishlarda saqlanadi) oson oksidlanib:



Br_2 , I_2 , Cl_2 , S , H_2 bilan shiddatli reaksiyaga kirishib, tegishli binar birikmalar (ikki elementdan iborat) NaH , NaCl , NaBr , NaI , Na_2S larni hosil qiladi. Na metali suv bilan juda shiddatli reaksiyaga kirishadi:



Natriy Hg, Sn va boshqa metallar bilan intermetall birikmalarini hosil qiladi. Ular ichida tarkibi 24% Na va 76% K dan iborat evtektik qotishmasi odatdagi temperaturada suyuq ($t^*_{\text{erit}} = 12,6^\circ\text{C}$) holda bo'ladi.

Olinishi. Bu metall, asosan NaCl ning suyuqlanmasini elektroliz qilish bilan olinadi. NaCl ning suyuqlanish temperaturasi 801°C bo'lgani uchun energiya sarfini kamaytirish maqsadida unga CaCl_2 , NaF yoki KCl kristallari qo'shib $t^*_{\text{erit}} = 580^\circ\text{C}$ gacha pasaytiriladi:



Metall holidagi natriy ko'pchilik sintezlarda qaytaruvchi, katalizator sifatida va yadro energetik qurilmalarida issiqlik tashuvchi vosita sifatida ishlatiladi.

Birikmalari. Natriy oksidlanish darajasi +1 bo'lgan birikmalarni hosil qiladi. Birikmalarda ionli bog'lanish hosil qilib, moddalar kristall tuzilishli bo'ladi. Bu birikmalar turli qutbli erituvchilar, ayniqsa, suvda yaxshi eriydi va ionlarga dissotsilanib kuchli elektrolit eritmalarni hosil qiladi. Bunday

birikmalar jumlasiga galogenidlar: NaF , NaCl , NaBr , NaI ; sulfidi Na_2S , disulfid Na_2S_2 , sulfatlari Na_2SO_4 , $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, karbonatlari

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (kristallik soda), Na_2CO_3 soda yoki kalsinatsiyalanagan soda, nitratlari NaNO_3 , nitriti NaNO_2 , kaustik soda yoki natriy gidroksidi — NaOH kiradi.

Natriy gidroksid. NaOH oq kristall modda, o'ta higroskopik bo'lgan. Havoda ochiq qoldirilsa, nafaqat H_2O molekulalarini, ular bilan birga CO_2 gazini yutib oladi va $\text{NaHCO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ni hosil qiladi:




Shu sababli kristall holdagi NaOH bilan ishlaganda juda tez va oq rangli idish qopqog'i yaxshi berkitib qo'yilishi, namuna hal qilishda qachon ochiq havoda qoldirilmagani kerak.

NaOH sanoatda NaCl ning konsentrlangan eritmasini elektroliz qilish usuli bilan olinadi



Kimyoviy usul (ohakli usul) da quyidagi reaksiya:



yordamida olinadi. Shu sababli bu usulda olingan NaOH kaustik (o'yuvchi soda) deyiladi. NaOH ning suvli eritmasi kuchli elektrolit bo'lib, o'zining natriy deb aytiladi:



Chunki bu eritmadagi OH^- ionlari juda agressiv bo'lgani uchun kuchli emiruvchi (o'yuvchi) xossasiga ega.

NaOH va uning ancha yuqori konsentratsiyadagi eritmaları shisha idishlarda saqlanmaydi. Sababi bu idishlarda quyidagi:




reaksiya borib, shisha yemiriladi, tarkibi va konsentratsiyasi buziladi. Agar NaOH eritmasi shisha idishda uzoqroq vaqt saqlansa, eritma ichki oq rangli loyqa hosil bo'ladi va bu eritmani ishlatib bo'lmaydi. Shu sababli NaOH ning quruq holdagisi faqat "kapron" yoki "polietilen" idishlarda saqlanadi.



NaOH sanoatda sovun, bo'yoqlar, sellyuloza ishlab chiqarishda, matolarni ohorlashda keng qo'llaniladi.

Eng ahamiyatli birikmalardan biri NaHCO_3 — ichimlik sodasidir. Bu modda sovuq suvda kamroq, issiq suvda yaxshi eruvchan oq kristall modda bo'lib, gidrolizlanish reaksiyasi quyidagicha:



Eritma ishqoriy muhitga ($\text{pH} > 7$) ega bo'ladi. Shu tufayli bu modda non mahsulotlari ishlab chiqarishda, dori ("jig'ildon qaynashi") ni yo'qotishda) sifatida ishlatiladi.

Ichimlik sodasi ammoniy xloridli usulda sintez qilinadi (Solve usuli.)



Reaksiyada hosil bo'ladigan NaHCO_3 ning sovuq suvda kam eruvchanligi sababli muvozanat o'ngga siljiydi va u usulning asosini tashkil etadi.

Keng ishlatiladigan natriy birikmalari qatoriga kristallik ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) soda, kalsinatsiyalangan (Na_2CO_3) soda kiradi. Bu moddalar yog'larni tozalashda, moddalar tarkibidagi suvni yo'qotishda to'qimachilik, sovun va shisha sanoatida ishlatiladi. Na_2CO_3 suvda yaxshi eriydi, eritmasi kuchli ishqoriy muhitga ega bo'ladi. Chunki quyidagi tenglama bo'yicha gidrolizlanadi:



$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, Na_2CO_3 , NaHCO_3 lar termik ta'sir natijasida o'zgaradi:



Osh tuzi — NaCl . Oq, kubsimon kristall modda. Suvda yaxshi eriydi, lekin uning eruvchanligi temperaturaga deyarli bog'liq bo'lmaydi. Eritmada ko'p ionlanadi va kuchli elektrolitdir:



Osh tuzi oziq-ovqat sanoatida, asosiy xom ashyo sifatida NaOH , H_2 , Cl_2 olishda keng qo'llaniladi.

Natriy nitrat — NaNO_3 va **natriy nitrit** NaNO_2 oq kristall moddalar bo'lib, suvda yaxshi eriydi. NaNO_3 eritmasi neytral, NaNO_2 eritmasi ishqoriy muhitga ega. NaNO_3 selitra (o'g'it) sifatida,

Bu gruppachada elementlarning kimyoviy faolligi ularning atom raqamlari ortishi bilan atom radiusining ortishi va eng tashqi elektronlarining (ns^1) ning ionlanish energiyasi kamayib borishi bilan izohlanadi.

Bu metallar ichida birikmalari eng ko'p ishlatiladigani kaliydir.

Kaliy (K , $Z=19$) oq kumushsimon metall, yumshoq, pichoq bilan kesiladi.

Tabiatda quyidagi birikmalar holida tarqalgan KCl (silvin), $\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$ (silvinit), $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (karnallit); $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (kainit).

KNO_3 kaliyli selitra, portlovchi moddalar olishda va oksidlovchi sifatida ishlatiladi. KNO_3 esa qaytaruvchi xossasiga ega modda holida ko'proq ishlatiladi. CO_3^{2-} ioniga xos analitik reagent sifatida ham keng qo'llaniladi.

Kaliy gruppachasi (K , Rb , Cs) elementlari ham ishqoriy metallar qatoriga kirib, ular ham juda faol metallardir.

Kimyoviy xossasi jihatidan ancha faol bo'lgani uchun barcha metallar bilan oson ta'sirlashadi. Suv bilan ta'sirlashganda katta issiqlik energiyasi ajraladi. Shu tufayli ajralib chiquvchi vodorod gazi suvi ustiga havo ishtirokida yonadi:




Kaliy metalli (rubidiy va sezii ham) qizdirilganda, ular elektronlarni oson yo'qotish xususiyatidan foydalanib fotoelementlar tayyorlashda ishlatiladi.

Olinishi. Kaliy natriytermiya (Na -metali bilan qaytarish) usuli bilan olinadi:



Asosiy birikmalari K_2O , KOH , galogenidlari: KF , KCl , KBr , KI ; K_2CO_3 (potash), K_2SO_4 , KNO_3 (kaliyli selitra).

Kaliy oksidi — K_2O , oq modda suvda yaxshi eriydi, gigroskopik, kuchli asosli oksid. Ko'pchilik kislotaga va amfoter oksidlar bilan ta'sirlashadi, tegishli tuzlarni hosil qiladi:



Olinishi. Kaliy peroksidi (K_2O_2) ni kaliy metalli bilan qaytarib olinadi:



Kaliy gidroksidi — KOH , oq, gigroskopik modda, suvda yaxshi eriydi. Eritmasi o'yuvchi kaliy (kaliy ishqori) deyiladi, kuchli elektrolit:



Kaliy karbonat — K_2CO_3 (potash) o'ziga suvni yutish xossasiga ega bo'lgani uchun organik sintezda, yog'moy sanoatida shisha olishda ishlatiladi. Suvda yaxshi eriydi, gidrolizlanib ishqoriy muhit hosil qiladi.



Kaliy ion — K^+ ko'pchilik o'simliklar, dukkakli ekinlar uchun zarur mikroelementdir. Shu bilan birga, K^+ — inson organizmi uchun ham zarur element (asab reseptorlari) sifatida biologik muhim iondir.

Savollar

1. Ishqoriy metallar qatoriga qanday elementlar kiradi?
2. Ishqoriy metallarni qanday olish mumkin?
3. Ishqoriy metallar havoda qanday o'zgarishlarga uchraydi?
4. Ishqoriy metallarning suvda erishini
5. Soda va unung turlari hamda ularning farqlarini izohlang.
6. Kalsinatsiyalangan soda deganda nimani tushunasiz?
7. Ichimlik sodasining oziq-ovqat sanoatida ishlatilishi uning qanday xossasiga asoslangan?

XXIII bob

II A GRUPPACHA ELEMENTLARI

Asosiy tushunchalar: *ishqoriy-yer metallari, magniy, kalsiy, bo'sh so'ndirilmagan ohak, so'ndirilgan ohak, ohaktosh, magneziya, dolomit, gips, alebstr.*

XXIII.1. Umumiy xossalari

Bu gruppachaga Be — berilliy va ishqoriy-yer metallari — Mg, Ba, Sr, Ra kiradi.

Berilliy, “berill” minerali (izumrud gruppaga kiruvchi) nomi berilgan (1798 yilda Vyoler va Byussilar olishgan). Magniy: yunoncha “magnezi”, joyning nomini bildiradi. Kalsiy, lotincha “calcis” — “ohak” ma’nosini anglatadi. Stronsiy — “Strontion” Shotlandiyadagi joy nomini bildiradi. Bariy, yunoncha “baros” — og‘irlik ma’nosini anglatadi.

Alangani Be — bo‘yamaydi, Mg — ko‘zni qamashtiradigan oq rangda, Ca — qizil g‘isht rangiga, Sr — malina rangiga, Ba — yashil-olma rangida bo‘laydi.

II A gruppacha elementlari tashqi elektron qavatlarida (ns^2) elektronlari bo‘lgani uchun faqat +2 oksidlanish darajasi namoyon qilinadi. Aksariyat hollarda koordinatsion soni 4 va 6 bo‘lgan birikmalarni hosil qiladilar. Bu bilan ular ishqoriy metallardan farqlanadi, buning sabablaridan biri ularning zaryadi, atom (ion) radiusi va III davrdan boshlab tashqari qavatda d — elektron (bo‘sh) orbitallarning mavjudligi bilan izohlanadi. Bu elementlar ichida berilliy amfoter xossaga ega bo‘lgani uchun ishqoriy-yer metallari qatoriga kiritilmaydi. Uning ko‘pchilik xossalari III gruppada element Al — alyuminiyning o‘xshab ketadi. Chunki ular o‘rtasida “diagonal o‘xshashlik” mavjud. Shu sababli, Be alohida o‘rganiladi.

XXIII.2. Berilliy va uning birikmalari


Kulrang metall, yuqori temperaturada suyuqlanadi. Geksagonal kristall panjara hosil qiladi. Odatdagi sharoitda sirtida BeO — oksid parda hosil bo‘lganligi uchun kimyoviy jihatdan ancha passiv element.

Tabiatda turli minerallar: $Be_3Al_2(SiO_3)_6$ (berill), Be_2SiO_4 (fenakit), berill mineralining turli rangli ko‘rinishlari “zumrad”, “akvamarin” bo‘lib qimmatbaho toshlar holida uchraydi.


Olinishi. $BeCl_2$ tuzining suyuqlanmasini elektroliz qilish yoki magniytermiya usuli bilan olinadi.



Berilliyning barcha birikmalari polimer kristallardan iborat. Kristallarda uning koordinatsion soni 4 ga teng. Amfoter xossasiga ega bo‘lgani uchun kislotali eritmalarida $[Be(H_2O)_4]^{2+}$ ioni, ishqoriy muhitda $[Be(OH)_4]^{2-}$ kabi ionlar holida bo‘ladi. Birikmalari qatoriga BeO, $Be(OH)_2$, galogenli birikmalari, sulfatlari kiradi. BeO — oq kristall modda. Juda yuqori suyuqlanish temperaturasi ($2530^\circ C$) ega, shu sababli maxsus tigit va keramika olishda ishlatiladi. Amfoter xossaga ega:




$Be(OH)_2$ — suvda erimaydigan polimer modda. Amfoter gidroksid bo‘lgani uchun kislotali va ishqoriy muhitda quyidagi ko‘rinishlarda bo‘ladi:



Ko‘rinib turibdiki, eritma muhitini (pH) o‘zgartirib berilliyning turli birikmalarini ajratib olish mumkin.

Berilliy birikmalaridan $BeCO_3$ va $Be_3(PO_4)_2$ suvda erimaydi. Ammo $BeCO_3$, ishqoriy metallar va NH_4^+ ning karbonat tuzlarida eriydi:



Be tuzlari zaharli moddalardir. Berilliy qotishmalar olishda legirlovchi vosita, atom reaktorlarida neytronlarni sekinlash-tiruvchi moddalar qatorida ishlatiladi.

XXIII.3. Magniy va kalsiy

Bu elementlarning atomlarida (bo‘sh) d — elektron orbitallarning mavjudligi ularning berilliydan farqli xossalari namoyon qilishlariga sabab bo‘ladi. Ularning hosil qilgan birikmalarida $(Ca)Mg - E$ ($E = O, H, S, \text{galogenlar}$) bog‘i ion tabiatga ega.


Tabiatda tarqalishi. Magniy va kalsiy tabiatda keng tarqalgan (1 va 1,5 %) bo'lib quyidagi izotoplari: ^{24}Mg (78,6%); ^{25}Mg (10,1%); ^{26}Mg (11,29%); ^{40}Ca (96,97%) mavjud. Bu metallar, asosan silikat, karbonat va sulfatli minerallar holida: Mg_2SiO_4 (olivin), $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ (dolomit), MgCO_3 (magnezit), CaSO_4 (angidrit), $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips), CaF_2 (flyorit), $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (F, Cl, OH) (apatit) va boshqalar ko'rinib tarqalgan.

Shu bilan birga gidrosfera (suvda — dengizda) Mg (0,38%), Ca (0,04%) va tirik organizmlarda, suyakda va o'simlik bargida (Mg) mavjud.

Olinishi. Magniy asosan MgCl_2 ni elektroliz qilish bilan olinadi.



Shuningdek, kremniytermiya va ugletermiya usullari bilan ham olinadi.



O'ta toza Mg olish uchun bu usullar bilan olingan magniy sublimatsiyalanadi va 99,999% tozalikdagi metall olinadi.


Kalsiy CaCl_2 ning suyuqlanmasini elektroliz qilish bilan olinadi.




Kalsiy magniyga nisbatan ancha faol bo'lgani uchun kerosin ostida magniy esa oddiy sharoitda shisha idishlarda saqlanadi.

Xossalari. Mg va Ca — oq-kulrang, oson suyuqlanadigan yumshilgan engil metallardir.



Bu metallar kimyoviy jihatdan juda faol bo'lib, suvda magniy qizdirilganda, kalsiy esa shiddatli (yaxshi) eriydi:




Mg ravshan alanga berib yonadi va oq rangli MgO ni hosil qiladi.



Kislotalar bilan bu metallarning ta'siri juda oson va tez boradi. Reaksiyalarda bu metallarning tuzlari va H_2 , angidridlar, nitrat kislota ta'sirida NO , NO_2 va NH_4NO_3 hosil bo'ladi:



Bu reaksiyaning elektron tenglamasi:



Bu reaksiyadan ko'rinib turibdiki, Mg va Ca kuchli qaytaruvchilardir. Shu sababli ular metallarning faollik qatorida vodoroddan ancha chapda joylashgan. Bu metallar ishqorlar bilan ta'sirlashmaydi.

Magniy va kalsiyning asosiy birikmalari: oksidlari, gidroksidlari, turli tarkibli tuzlaridir.

Oksidlari MgO — kuydirilgan magneziya, CaO — kuydirilgan ohak yoki so'ndirilmagan ohak. Oq rangli moddalar, suvda to'liq erimaydi, suvli eritmaları ishqoriy muhitga ega.


Gidroksidlari Mg(OH)_2 va Ca(OH)_2 . Magniy gidroksidi suvda kam eriydi va kuchsiz asos xossasini namoyon etadi. Ca(OH)_2 suvda eriganda juda katta issiqlik ajraladi va oq rangli kuchli ishqoriy muhitga ega eritma hosil qiladi:




Ca(OH)_2 so'ndirilgan ohak deyiladi. Ca(OH)_2 va Mg(OH)_2 gidroksidlarga xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega. Ca(OH)_2 dan ohak sifatida foydalanilganda kislotali oksid CO_2 bilan ta'sirlashadi va oq rangli modda — ohaktosh CaCO_3 ga aylanadi. Bu reaksiyadan foydalanib CO_2 — gaz (sifat reaksiyasi) aniqlanadi.



Kislotalar bilan neytrallanish reaksiyalariga kirishadi:



Amfoter oksid va gidroksidlar bilan qizdirilganda $\text{Ca}(\text{OH})_2$ eritma reaksiyaga kirishadi:



Tuzlari. Mg va Ca ning eng ko'p ishlatiladigan va o'rganilgan tuzlari: MgCl_2 , MgF_2 , $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, CaF_2 , CaBr_2 , CaI_2 ichida fluorid kam eriydi, xloridlar suvda yaxshi eriydi; suyuqlanma va eritma kuchli elektrolitlardir.


$\text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ va $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ dan magniy sulfat suvda yaxshi eriydi, kalsiy tuzlari suvda kam eriydi. Alebastr suv bilan yaxshi aralash tezda qotadi:




gipsga aylanadi. Shu sababli u qurilish material sifatida va "bog'lovchi" moddalar qatorida ishlatiladi.

Gidrokarbonatlari — $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ va karbonatlar MgCO_3 , CaCO_3 o'zaro tarkib jihatdan yaqin bo'lsalar-da, ularning xossalari, aniqrog'i eruvchanliklari keskin farq qiladi.



Gidrokarbonatlari suvda yaxshi eriydi va suvning vaqtinchalik qattiqligini tashkil etuvchi asosiy tuzlardir. Qizdirilganda o'z parchalanadilar:



Bu reaksiyalar suvning qaynash temperaturasi (100°C) da ro'y beradi va suv qaynaganda uning qattiqligi ma'lum miqdorda kamayadi. Hidrokarbonatlar nordon tuzlar bo'lgani uchun ular ishqorlar bilan neytrallanish reaksiyasiga kirishib, o'rta tuzlarni hosil qiladilar. Suvning qattiqligini ishqorli va ohakli usulda yumshatish shunga asoslangan:



Karbonatlar bunday reaksiyalarga kirishmaydi. Ular kislotalar bilan aralashib erib ketadi:



Bu metallarning (ayniqsa, Ca) karbonat tuzlari suvda kam eruvchanligidan foydalanib, eritmalardagi Ca^{2+} , Mg^{2+} ionlari va CO_3^{2-} ionlariga xos sifat reaksiyalarni olib borish mumkin.

Sifat analizida II grupp kationlari: Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} ni aniqlash CO_3^{2-} ionlarining ta'siriga asoslangan. Ana shunday kam eruvchi kationlar qatoriga PO_4^{3-} ionlari bilan hosil qilgan $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ va fosfat ionlari ($\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$) bilan hosil qilgan $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ tuzlari ham kiradi.

Ishlatilishi. Ca va Mg — birikmalari turli maqsadlarda qurilish materiallari, CaCO_3 — marmar tosh, bo'r, $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ — dolomit silikat sanoatida shisha, sement va chinni ishlab chiqarishda asosiy xomashyolar tarkibiga kiradi. Mg^{2+} — ionlari o'simliklar bargidagi xlorofill zarrachalarini tarkibiga kiradi. Ca^{2+} — odam va hayvon suyaklari hamda tishlarining asosini tarkibiga kiradi. $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ning 10% li eritmasi "issiq ukol" sifatida MgSO_4 magniy sulfat tibbiyotda qo'llaniladi.

Ca^{2+} — ionining glyukonkislotali tuzi — "kalsiy glyukonat" ham tibbiyotda dori sifatida ishlatiladi. Ca^{2+} — tuzlari "qonni quyultirish moddasi" (antikoagulyant) xossasiga ega bo'lgani uchun, qon ketishini to'xtatuvchi sifatida qo'llaniladi.

Savollar

1. Ishqoriy-yer metallarining xossalari gruppada qanday o'zgaradi va uning sababini izohlang.
2. Mg va Ca elementlarining tabiiy keng tarqalgan birikmalari va ularning xossalari izohlang.
3. Kalsiy va magniyning eruvchan tuzlari xossalari izohlang. Ca^{2+} ionining erimaydigan tuzlari va ulardan qanday maqsadlarda foydalanilishni izohlang.
4. So'ndirilmagan va so'ndirilgan ohak, ularning olinishi va xossalari izohlang.

XXIV bob

III A GRUPPACHA ELEMENTLARI

Asosiy tushunchalar: bor, alyuminiy, borat angidridi, boratlar, kislota, alyuminiy, alyuminatlar, boksit, korund, kriolit, gips, alyuminotermiya, dyuralyumin.

XXIV.1. Umumiy xossalari

Uchinchi gruppacha asosiy gruppachasi elementlari ham p-elementlar oilasiga mansubdir. Ularga bor, alyuminiy, galliy, indiy va talliy kiradi.

Bor gruppachasi elementlaridan bor metallmas xossalarini namoyon qiladi. Bu gruppachaning qolgan elementlari metallardir. Bu esa ularning atom radiuslarini ortishiga va tashqi elektronining yadrodan "ekstrudatsiyasi"ga bog'liq. Bor gruppachasi elementlari birikmalarida +3 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Faqat talliy +3 va +1 oksidlanish darajalarini namoyon qiladi. Buning sababi elementlarning atom radiuslari B — Al — — In — Tl qatorida ortib borishidir (Ga dan tashqari).

Atom radiusi ortgan sari s — elektron orbitallari bilan p — elektron orbitallari orasida energiya farqi orta boradi. Shuning uchun talliy 6p¹ — elektroni birinchi valent elektronga aylanib (Tl⁺), keyin 6s² elektronlari kimyoviy bog'lanishda ishtirok etishi tufayli Tl⁺ holatida bo'ladi.

Bu gruppacha elementlarining tartib raqami B (Z=5) dan Tl (Z=81) gacha ortib borishi bilan ularning oksid va gidroksidlarining asosli xossalari kuchayib, kislotalik xossalari kuchsizlanib boradi. Masalan: bor oksidi kislotali xossa namoyon qiladi, alyuminiy oksidi amfoter, qolgan oksidlar (Ga₂O₃, In₂O₃, Tl₂O₃) asosli xossa namoyon qiladi. H₃BO₃ — kislota, Al(OH)₃ — amfoter gidroksid. Bu qatordagi gidroksidlar kislotalarda eriydi. Buning sababi Al³⁺ dan Tl³⁺ ga o'tgan sayin ion radiuslarining kattalashib borishidir.

Gidroksid va oksidlarning asoslik xossasi yuqoridan pastga o'tib kuchayib boradi.

XXIV.2. Bor va uning birikmalari

Borning tabiatda tarqalishi. Bor, asosan birikma holida tarqalgan bo'lib, ular qatoriga: Na₂B₄O₇ · 10H₂O — bura, Na₂B₄O₇ · H₂O — kerolit, H₃BO₃ · 4H₂O — sassolin. Borning yer po'stlog'idagi miqdori 5 · 10⁻² %.

ki izotop ¹⁰B (19,6%) va ¹¹B (80,40%) ko'rinishidan iborat va borning h xil allotropik shakli borligi aniqlangan.

Olinishi. Bor asosan metallotermiya usuli bilan olinadi:



Metallotermiya usuli bilan olingan bor uncha toza bo'lmaydi. Toza borni xolatdagi bor uning birikmalarini suyuqlantirib elektroliz qilish usuli bilan olinadi. Juda toza holdagi borni, bug' holatdagi bor bromidni suyuqlantirib, o'g'latilgan tantal simi ustida vodorod bilan qaytarib olish mumkin:



Bundan tashqari, vodorodli birikmalarini termik parchalab ham olish mumkin:





Kimyoviy xossalari. Bor amorf va kristall tuzilishga ega. Bor inert modda, oddiy sharoitda faqatgina fluor bilan birika oladi. Qizdirilganda bor oksidi, xlor, brom va oltingugurt bilan reaksiyaga kirishadi. Borga suyultirilgan kislotalar ta'sir etmaydi. Qizdirilganda, konsentrlangan sulfat, nitrat kislotalarda va "zar suvi"da eriydi:




Oksidlovchi moddalar ishtirokida bor ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi:




Bor oksidi B₂O₃ ning hosil bo'lishini Gibbs energiyasi yuqori bo'lganligi tufayli (ΔH₂₉₈ = -1178 kJ/mol) SiO₂, P₂O₅, CO₂ kabi barqaror oksidlar bilan ham reaksiyaga kirishib, kuchli qaytaruvchi xossalarini namoyon qiladi:



Birikmalari. Borning vodorodli birikmalari *boranlar* deb ataladi. U xo'jaligida ko'p ishlatiladigan B_2H_6 **diborandir**. U quyidagicha oq...




Borovodorod (**boran**)lar juda shiddatli reaksiyaga kirishadi. Ularning ko'pchiligi hatto ochiq havoda o'z-o'zidan alangalanib, katta issiqlik ajratib yonadi. Shu sababli bu moddalar yoqilg'isi sifatida ishlatiladi:







Diboran ishqoriy va ishqoriy-yer metallari va ularning gidroksidlar bilan reaksiyaga kirishadi:



Diboran kislotalar bilan bosqichli almashinish reaksiyalariga kirishadi:



Diboran galogenlar bilan ta'sirlashib, borning galogenidlari hosil qiladi. Bor galogenidlari ammiak va ishqoriy metallar galogenidlari bilan birikib, kompleks birikmalar hosil qiladi:



Bor galogenidlari suv ta'sirida yaxshi gidrolizlanadi va kislotalarni hosil qiladi:



Bor oksidi va borat kislotasi


Bor oksidi B_2O_3 — oq kristall modda, suvda eriydi, kislotali oksid, borat anhidridi deyiladi.

Borning kislorodli birikmalari asosan polimer tuzilishli bo'lib, $>B-$ bog'lari molekulaning asosiy tuzilishini belgilaydi.

Shunga asosan bor oksidi (B_2O_3) tarkibga mos keladi. (B_2O_3) juda osonlik bilan H_2O molekulalari bilan ta'sirlashadi. Buni gidratlanish reaksiyasi deyiladi. (B_2O_3)_n ning gidratlanish reaksiyasi natijasida bor kislotalari — polimetaborat poliortoborat va ortoborat kislotalari hosil bo'ladi.

Bu kislotalardan ko'p ishlatiladigani ortoborat kislota — H_3BO_3 . Oddiy holida oq rangli, qo'lga tegsa yog'simon iz qoldiruvchi, qavat-qavat tuzilishli modda. Bu H_3BO_3 tarkibidagi vodorod va kislorod atomlarining H — bog'ini hosil qilishiga asoslangan.

Borat kislotaga ishqor ta'sir ettirganda poliboratlar, agar NaOH ta'sir etilsa natriy tetraborat kristallogidratlari hosil bo'ladi:



Bor tuzlariga kislota ta'sir ettirganda borat kislota hosil bo'ladi:




Aksariyat borat kislotalari metallar bilan turli tarkibli tuzlarni hosil qiladi. Ulardan bin natriy tetraborat — $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ bura (tanakor)dir. Bu tuz suvda yaxshi eriydi, aniqrog'i, gidrolizlanadi:




ionli holda $B_4O_7^{2-} + H_2O \rightarrow H_2B_4O_7 + 2OH^-$

Ikkinchi bosqichda: $H_2B_4O_7 + 5H_2O = 4H_3BO_3$

Bu tuz eriganda NaOH hosil bo'lishi sababli uning eritmasi ishqoriy muhitga (pH>7) ega bo'ladi. $Na_2B_4O_7$ ga kuchli kislotalar ta'sir ettirib ortoborat kislota olinadi:



Bura hosil qilish uchun bor kislotalari NaOH bilan 2 : 1 nisbatda eritiladi va qayta ishlanadi:



Bura ko'pincha metallarni kavsharlashda, o'tga chidamli shisha olishda va analitik kimyoda moddalar analizida ishlatiladi.

Borning ishlatilishi. Bor atomi yadrosi osonlikcha neytron bosqichida ajralib chiqadi va grafitni uglerod oksidlarigacha oksidlaydi. Bor Cr, Zr, Ti kabi ko'pchilik d- va f-metallarni qattiq qotishmalaridan reaktiv dvigatellarning gaz turbinalarining parraklari tayyorlanadi. Ba'zi boridlar katalizator, elektron asboblarning katodlarini yasashda ishlatiladi.

Boranlar raketa yoqilg'isi sifatida ishlatiladi. Bor oksidi, bor shisha tarkibiga qo'shilganda (3–12% B_2O_3) kimyoviy ta'sir va temperaturaga bardoshli shisha turlari tayyorlanadi. Borat kislotasi tibbiy-ro'zg'orda, hasharotlarga qarshi kurashda ishlatiladi.

Bor bilan uglerod birikmasi *boruglerod* deyiladi, ular temperaturaga bardoshli karboranli polimerlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bor karbidi B_4C — yuqori temperaturaga bardoshli ($T_{\text{suyug'}}$ = 2623 K) yuqori qattqlikka ega bo'lgan birikma. Azot bilan bor birikib bor nitrid (BN) hosil qiladi. Bor nitridning qattqligi olmosnikiga yaqin. Bor metallarni kesishda ishlatiladi.



XXIV.3. Alyuminiy

III A gruppachaning ikkinchi elementi alyuminiydir. Alyuminiy atom radiusi boranikidan kattaroq bo'lgani sababli, ionlanish energiyasi kichikroq, shuning uchun ham alyuminiyning metallik xossalari boranikidan qattiqroq namoyon bo'ladi. Alyuminiy amfoter element.

Al ning tabiatda tarqalgan birikmalari: $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ — boksit (korund), $\text{Me}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7]$, $\text{Me}_4[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}]$, $\text{KAl}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH})_2$ — muskovit, $\text{K}_2[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7]$ — nefelin, $\text{Al}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2$ — kaolinit, $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ — lit. Al ning yer po'stlog'idagi umumiy miqdori 5,5 at % ni tashkil qiladi. Alyuminiy tabiatda faqat birikma holida uchraydi.

Olinishi. Alyuminiy, asosan boksit $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ dan elektroliz usuli bilan olinadi. Boksitning suyuqlanish temperaturasi pasaytirish usuli bilan olinadi.

Boranlar CaF_2 , MgF_2 , AlF_3 qo'shiladi, elektroliz jarayoni quyidagicha o'tadi:




Elektrolizer korpusi katod vazifasini bajaradi. Unda alyuminiy suyuq uglerod ajralib chiqadi ($T_{\text{suyug'}}$ = 660°C). Grafitdan yasalgan anodda kislorod ajralib chiqadi va grafitni uglerod oksidlarigacha oksidlaydi.


Xossalari. Al — oq, kumushsimon, plastik (yumshoq), yengil, elektrni o'tkazuvchan, havoda oksidlanuvchi metall. Kimyoviy xossalari o'rtacha aktivlik qatorida ishqoriy-yer metallaridan bevosita keyin tursan. Sirtida oksid parda hosil qilgani uchun passiv metall hisoblanadi. Al — metallmaslar bilan reaksiyaga kirishadi:




Alyuminiy, ishqoriy metallar kabi, gidrid hosil qilish xossasiga ega, oddiy va kompleks gidridlar holida bo'ladi:



Alyuminiy amfoter xossaga ega bo'lganligi sababli ham kislota, ham asoslar bilan reaksiyaga kirishadi:




Shuningdek, kation kompleks va anion kompleks hosil qiladi:



Hosil bo'lgan kompleks tuz — natriy geksagidroksosulyumat deb ataladi. Al — metalli ishqorlar bilan kislotalarga nisbatan osonroq reaksiyaga kirishadi.

reaksiyaga kirishadi, chunki alyuminiyning kislotali muhitdagi nish potentsiali qiymati ishqoriy muhitdagidan katta. Alyuminiy oksid pardasini o'tkir asbob yordamida, yoki amalgama hosil qilishda tashlansa, alyuminiy shiddat bilan suvda eriydi:





Nitrat va sulfat kislotalar bilan alyuminiy ta'sirlashganda har ikkala sirtida oksid parda hosil bo'ladi va bu oksid himoya qavat va bajaradi. Shu sababli alyuminiy metali bu kislotalar bilan qiyin ta'sirlashadi, sovuq eritmalarida reaksiya bormaydi.



Alyuminiy oksidi — Al_2O_3 oq rangli, suvda erimaydigan modda va kristall holatda mavjud bo'lib, kislota va ishqorlarda eriydi, temperaturaga chidamli modda. Tabiatda Al_2O_3 — boksit nomi bilan tanilgan mineral holida bo'ladi. Ko'pincha $\text{Al}(\text{OH})_3$ termik parchalanadi:



Bu usul bilan olinadigan Al_2O_3 *glinozem* deyiladi. Alyuminiy amfoter oksidligi sababli kislota va ishqorlarda eriydi:





Alyuminiy gidroksidi — $\text{Al}(\text{OH})_3$ suvda ($\text{pH}=7$) erimaydigan, xossalari, oq amorf modda. Lekin eritma muhiti keskin o'zgarsa ($\text{pH}<7$) kislotalar va ($\text{pH}>7$) ishqorlar ta'sirida eriydi:



Barcha suvda erimaydigan gidroksidlar kabi alyuminiy gidroksid alyuminiy tuzlariga ishqor ta'sir ettirib olinadi:



Reaksiya uchun olingan reagentlar tuz: ishqor = 1:3 qat'iy ekvimolyar nisbatda bo'lishi shart. Bu reaksiya quyidagicha boradi. Al — tuzlari suvda erimaydigan Al^{3+} ionni gidratlangan $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ holda bo'ladi va reaksiyada bu ion ishtirok etadi:



Hosil bo'lgan kompleks birikma $[\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot (\text{H}_2\text{O})_3]$ polimer tuzilishli bo'lib, $\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ tarkibga to'g'ri keladi. $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ — amfoter modda, kislota va ishqorda erishini quyidagi umumiy (sxema) tenglama bilan tushuntirish mumkin:



geksaakvoaluminium(III)



geksagidroksaaluminat(III)



Bu tenglamaga asosan kislotali ($\text{pH}<7$) eritmalarida alyuminiyning kristallogidratlari: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ olinadi. Ishqoriy ($\text{pH}>7$) eritmalarida turli alyuminat tuzlari $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4(\text{H}_2\text{O})_2]$, $\text{Na}_3[\text{Al}(\text{OH})_6]$ olinadi.

Alyuminiy tuzlari gidrolizlanadi. Gidroliz reaksiyalari bosqichli tarzda boradi. Buni $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ tuzi misolida ko'rib chiqaylik:

I bosqich:



Hosil bo'lgan kompleks ion — pentaakvo-gidroksoaluminat ion eritmaning pH iga, temperaturaga va tuzning konsentratsiyasiga bog'liq holda gidrolizlanishda davom etadi:


II bosqich:



tetraakvogidroksoaluminat-ion



III bosqich:



Lekin oxirgi bosqich juda kam darajada ro'y beradi. Odatda I—II bosqichlarda to'xtaydi va alyuminiyning gidroksotuzlari $[\text{Al}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{SO}_4$; $[\text{Al}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{SO}_4$ hosil bo'ladi. Agar gidroksotuz oxirigacha bog'anda edi, $\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ suvda deyarli erimaydigan moddalar hosil bo'lar edi. Lekin Al^{3+} ning ko'pchilik tuzlari tiniq eritmalar hosil qiladi. Buning sababi alyuminiy tuzlari gidrolizining oxirigacha borib yetishidir.

Alyuminiy gidroksidining degidratlangan, ya'ni suvsizlantirilgan shakli "alyumogel" texnikada adsorbent sifatida ishlatiladi. Alyumogel mexanik va kimyoviy jihatdan barqaror bo'lishining sababi



bog'larining temperatura ta'sirida juda barqaror "oksi" bog'lar ($> \text{Al} - \text{O} - \text{Al} <$) aylanib ketishidir.

Alyuminiy qator gidroksi, o'rta va qo'sh tuzlar hosil qiladi. Bular halqali, galojenli, sulfatli, nitratli, atsetatli tuzlar suvda yaxshi eriydi.

Alyuminiy qo'sh tuzlar - achchiqtoshlarni hosil qiladi. $(\text{NH}_4)_2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ bu moddalar terini oshlartirish va to'qimachilik sanoatida gazlama bo'yashda, qandolatchilikda ishlatiladi.

Alyuminiy va birikmalarining ishlatilishi. Alyuminiy oksidi Al_2O_3 ning tabiatda kristall holatda uchraydigan turi korund deb ataladi. Qo'sh aralashgan mayda korund "jilvir" deyiladi. Ozgina xrom qo'shimchasi bo'lgan korund kristallari "yoqur" deb ataladi.

Alyuminiy ko'p ishlatiladigan soha aviatsiya sanoatida. Samolyotlarning 2/3 qismi alyuminiydan va alyuminiy qotishmalardan yasalanadi. Shuning uchun alyuminiyni **qanotli metall** ham deyish mumkin. Alyuminiydan kabellar, simlar tayyorlanadi. Mis bilan elektr o'tkazuvchanligi juda yaqin bo'lgan alyuminiy buyumlarining massasi mis buyumlarnikidan ikki marta yengil bo'ladi.


Alyuminiy korroziyaga uchramasligi sababli undan mashinasozlikda turli detallar, nitrat kislota tashiladigan idishlar yasalanadi. Avtobus, trolley

va vagonlarning korpuslari alyuminiydan yasalanadi. Alyuminiydan oziq-ovqat sanoatida turli xil idishlar va choynaklar yasalanadi.

Alyuminiy va uning qotishmalari harbiy sohada tanksozlikda, artilleriyada, portlovchi moddalar, yorituvchi va yondiruvchi snaryadlar tayyorlashda ham ishlatiladi.


Temir buyumlarni korroziyadan saqlash uchun ularning sirti alyuminiy kukunidan tayyorlangan kumushsimon bo'yoq bilan qoplanadi.

Metallurgiyada ko'pgina metallar alyuminiy yordamida ajratib olinadi. U ko'pchilik metallarning oksidlaridan kislorodni tortib oladi. Metallarni ularning oksidlaridan alyuminiy yordamida qaytarib olish usuli alyuminotermya deyiladi:



Xrom, marganes, vanadiy, titan va boshqa metallarni ularning oksidlaridan qaytarib olishda, maxsus po'latlarni olishda alyuminotermya usuli qo'llaniladi.

Alyuminiy kukunini Fe_3O_4 — temir kuyundisi bilan ekvimolyar nisbatlarda aralashtirilib metall (temir) sim ustiga qoplanilsa elektrpayvandlashdagi elektrod hosil bo'ladi. Metall sirtidagi qotishma **termit** deyiladi. Elektrpayvandlashda quyidagi reaksiya boradi.



Bu reaksiyada $\Delta H = -3300 \text{ kJ}$ miqdorda ajralib chiqadigan issiqlik temir simni suyuq holga keltirib, temirdan yasalgan boshqa buyumning sirtiga qotib qolishiga sabab bo'ladi.

XXV bob

AYRIM QO'SHIMCHA GRUPPACHALAR METALLARI

XXV.1. Xrom va uning birikmalari

Asosiy tushunchalar: xrom, xromatlar, bixromatlar, xrom angidridi, xromli achchiqtosh, xrompik.

Xrom — Cr ($Z = 24$) VI B gruppacha elementi bo'lib, bu gruppachaga yana Mo (molibden) va W (volfram) kiradi. Ular tipik d-elementlar qatoriga kirib, tashqi elektron tuzilishlari $\text{Cr}(3d^4 4s^1)$, $\text{Mo}(4d^5 5s^1)$ va $\text{W}(5d^4 6s^2)$ ko'rinishga ega. Bu metallar kimyoviy jihatdan ancha passiv va

yuqori temperaturada suyuqlanuvchan bo'lgani uchun korroziyaga va "o'tga chidamli" metallar (Mo va W) deyiladi. Birikmalarining jihatdan bir-biriga o'xshash va keng qo'llanilgani uchun faqat xromning birikmalari xossalari to'xtalamiz.

Xrom turli fizik va kimyoviy xossalari namoyon qiladi. U boshqa d — metallardan farqli yoki ularga o'xshashligining sababi elementining davriy sistemada joylashgan o'rni va atomining elektron tuzilishi bilan tushuntiriladi:




Ko'rinib turibdiki, (Cr^0) metall holidagi xrom (atomi)da toq elektronlar soni 6 ta bo'lib, boshqa barcha elementlardagidan ko'proq sababli xromli qotishmalar magnit xossalari ega. Cr^{3+} — birikmalarda o'tganda toq elektronlar soni kamayadi, lekin magnit (paramagnit, ferromagnit) xossalari yo'qolmaydi, ammo Cr^{3+} ionida bo'sh orbitalar $4s$, $3d$ — soni ortgani uchun uning kompleks hosil qilishi va oktaedrik tuzilishli birikmalari soni ortadi.


Cr^{6+} da toq elektronlar yo'q, shu sababli uning magnit xossasi yomon aksariyat birikmalari sp^3 — gibridlanish tufayli tetraedrik birikmalar hosil qiladi.

Tabiatda uchrashi. Bu metall asosan oksidli birikmalar $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$ "xromit", $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ — xromli temirtosh; PbCrO_4 — krokent holida uchraydi.

Olinishi. a) xrom asosan alyuminotermiya usuli bilan olinadi:




b) Ko'pchilik hollarda temirning xromitli birikmasi qotishmalar xromtemirtoshdan olinadi, uni elektr pechida uglerod bilan qayta xrom olinadi:



Oddiy birikmalari: Cr-Mo-W qatorida bu metallarning qattiqligi o'tga chidamliligi ortadi. Buning sababi metallar kristall panjarasida Me-Me kovalent bog'ining barqarorligini d-elektronlar hisobiga kuchaytiradi. Shu qatorda bu elementlarning kimyoviy faolligi kamayib boradi. Bu ularning korroziyaga chidamliligini ortishiga olib keladi.

Xrom HCl va suyultirilgan H_2SO_4 eritmalari bilan reaksiyaga kirishadi:




Konsentrlangan HNO_3 va H_2SO_4 xromni passivlashtirib qo'yadi. Sababi, uning sirtida oksid parda Cr_2O_3 ning hosil bo'lishidir.

Juda maydalangan Cr kislorod ta'sirida oksidlanadi va Cr(III)- oksidini hosil qiladi.



Murakkab birikmalari. Cr(II), Cr(III) va Cr(VI) birikmalari holida bo'lib oksidlari, oksibirikmalari, kislota, gidroksidlari, tuzlari va kompleks birikmalari ko'rinishida mavjuddir.

Oksidlari. CrO , Cr_2O_3 va CrO_3 . Bu oksidlardan CrO asosli, Cr_2O_3 — amfoter, CrO_3 — kislotali xossalari namoyon qiladi.

Gidroksidlari. $\text{Cr}(\text{OH})_2$ (asosli), $\text{Cr}(\text{OH})_3$ (amfoter) va H_2CrO_4 (xromat kislota). Ko'rinib turibdiki, birikmalarda xromning oksidlanish darajasi ortib borishi bilan asosli xossa kuchsizlanib, kislotali xossa ortib boradi: $\text{Cr}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CrSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (faqat kislota bilan ta'sirlashadi). Cr_2O_3 va $\text{Cr}(\text{OH})_3$ amfoter moddalaridir Cr_2O_3 kislotalarda va ishqorlarda eriydi:



Cr(II) ning birikmalari qaytaruvchilardir. Uning oksidlanish potentsiali ($E^\circ = -0,41\text{V}$) suvli va kislotali eritmalarda tez oksidlanish imkonini beradi:




Cr(III) ning birikmalari o'z tarkibiga ko'ra turli rangga ega bo'ladi. Bu uning kompleks birikmalari va qattiq holda ajratib olinadigan kristallogidratlariga ham tegishlidir. Akvakompleks ion $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ko'kimtir-binafsha rangli bo'lsa, $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ binafsha rangga ega.

Xrom (III) ning keng tarqalgan birikmalari qatoriga sulfatli qo'shaloq tuzlari — xromli "achchiqtosh" lar kiradi.

Ularga $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (kaliy xromli achchiqtosh), $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (xrom ammoniyli achchiqtosh) misol

bo'ladi. Ular quyidagi reaksiya bo'yicha eritmada hosil bo'ladi va olinadi:



Bu tuzlar xromning boshqa nitratlari, xloridlari va atsetatlari suvda yaxshi eruvchanligi bilan o'ziga xosdir. Ular suvli eritmalarida erish jarayonida gidrolizlanadilar. Hosil bo'ladigan xromgidroksidlar kuchsiz asos xossali bo'lgani uchun aksariyat hollarda bu eritma kislotali muhitga ega bo'ladi (pH<7):



Hosil bo'ladigan gidroksopentaakvaxrom(III) kompleks ion bo'linishining tuzilishi ko'pincha dimer yoki polimer holida bo'ladi. OH kislotada qoldig'i anionlari Cr^{3+} ionlari o'rtasida "ko'priq" vositasini bildiradi. $Cr(III)$ birikmalarining charm sanoatida "oshlovchi modda" sifatida ishlatilishi shunday kompleks birikmalar hosil bo'lishiga asoslanadi. Ularda ko'pincha suv molekullari o'rnini teri tarkibiga kiruvchi "ko'priq" ning aminokislota qoldig'i egallaydi va hosil bo'lgan xromli kompleks birikma teri to'qimalarini bir-biriga "tikuvchi" vosita rolini bajarib, uning mustahkamligini keskin oshiradi, terining charmga aylanishini ta'minlaydi.



Xrom(III) ning karbonat va sulfid tuzlari qattiq holda mavjud. Chunki ularni olishda bu tuzlar eritmada hosil bo'ladi va tezda gidrolizlanadi. $Cr(OH)_3$ (cho'kma) va SO_2 yoki H_2S gazlarini hosil qiladi:





Xromning +6 oksidlanish darajasidagi birikmalari CrO_3 qizil rangli suvda kam eriydigan, sulfat kislotada yaxshi eriydigan, oksidlovchi xossasiga ega kristall modda. Sulfat kislotadagi eritmasi "xrompik" deb ataladi. Eritmada H_2CrO_4 (xromat) yoki $H_2Cr_2O_7$ (bixromat) kislotalar holida bo'ladi. Shu sababli CrO_3 xromat angidridi deb ham aytiladi.





Xromat kislotasi o'rtacha kuchli kislotasi, ionlanadi:



Xromat va bixromat ionlari Na^+ , K^+ , NH_4^+ ionlari bilan suvda yaxshi eruvchan tuzlar hosil qiladi. Bu tuzlarning eritmalarida kuchli oksidlovchi xossaga ega:





qaytaruvchi



Umuman, kislotali eritmalarda $Cr(VI)$ ionining oksidlovchilik xossasi



reaksiya bilan izohlanadi. Suvli eritmalarda xromatlar bixromatlarga o'zaro aksincha aylanib turadi. Bu eritmaning muhiti (pH) ga bog'liq. Agar xromatlarning (sariq rangli) eritmasiga kislotasi (pH<7) eritmalarini qo'shilsa, qizil rangli eritmaga ($Cr_2O_7^{2-}$) aylanadi. Agar bixromat eritmasiga H_2O (ko'p) yoki ishqor eritmasi qo'shilsa, och sariq rangga kiradi, bunda CrO_4^{2-} xromatlar hosil bo'ladi:



CrO_4^{2-} — ionni $Ba(II)$, $Rb(II)$, $Ag(I)$ ionlari bilan sariq, sarg'ish, qizil rangli cho'kmalar hosil qiladi. Bu xromat va $Ba(II)$ ionlariga sifat reaksiyasi sifatida qo'llaniladi:



Agar xromatlar eritmalarida H^+ — ionlari (kislotasi) miqdori oshirilsa, bixromatlardan tashqari, trixromat ($K_3Cr_3O_{10}$), tetraxromat ($K_4Cr_4O_{11}$) lar hosil bo'ladi. Bu birikmalarning o'xshashlik tomoni shundaki, ular CrO_4^{2-} gruppasi tetraedrik tuzilishga ega bo'lib, ular o'zaro kislorod atomlari orqali bog'lanib trimer, tetramer moddalarni hosil qiladilar.

Xrom va uning birikmalari quyidagi sohalarda ishlatiladi. Xrom qotishmalar korroziyaga chidamli maxsus po'latlar holida ishlatiladi. Xrom legirlovchi metall vazifasini bajaradi. Sirti xromlangan detallar mehanika ishqalanishga chidamli bo'lib, uzoq vaqt ishlaydi. Cr(III) tuzlari chidamli bo'lib, sanoatda oshlovchi modda, Cr(VI) birikmalari oksidlovchi metallar sifatida qo'llaniladi. Xromning barcha birikmalari zaharli!

Savollar

1. Xromning elektron formulasi asosida uning namoyon qiladigan oksidlanish darajalarini ko'rsating.
2. Xrom (III)ning birikmalari amfoterlik xossalarini ifodalovchi tenglamalarini yozing.
3. Xromatlar va bixromatlarning xossalarini ko'rsatuvchi tenglamalarini yozing.
5. Xromli "achchiqtosh"larga misollar keltiring. ular qanday qotishmalar ishlatiladi?

XXV.2. Temir va uning birikmalari




Asosiy tushunchalar: temir triadasi, temir cho'yan, po'lat, ferritlar, sianoferritlar, qizil qon tuzi, sariq qon tuzi.

Elementlar davriy jadvalining VIII B gruppachasi tuzilishi va uning elementlarning joylashuvi bilan boshqa barcha gruppalardan keskin farqlanadi. Chunki bu gruppachaga kirgan elementlar **vertikal o'xshashlik** o'rniga **gorizontal o'xshashlik** namoyon qilgani uchun undagi 9 ta element "uchta oila" ga, ya'ni "triada" ga bo'linadi.

Ular quyidagilar: temir triadasi (Fe, Co, Ni); palladiy triadasi (Ru, Rh, Pd) va platina triadasi (Os, Ir, Pt). Shu triadalardan "temir triadasi" (triadasi) elementlari bilan yaqindan tanishamiz.

Tabiatda tarqalishi. Temir oilasi elementlaridan faqat temir tabiiy (osmon jismlari) erkin holda uchrashi mumkin (meteoritlar). Temir alyuminiydan keyin tabiatda keng tarqalgan 2-element bo'lib, oksidlar va sulfidlar holida mavjud: Fe_2O_3 (magnitli temirtosh), Fe_3O_4 (temirtosh-gematit), $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (qo'ng'ir temirtosh), FeCO_3 (temirtosh-siderit), FeS_2 (temir kolchedani yoki pirit).

Olinishi. Temir sulfidli rudalardan oksidlarga o'tkazilib, oksidlar CO gazi yordamida qaytarib olinadi:



Metall holidagi temir 4 xil modifikatsiyada bo'ladi. Xona temperaturasidan 770°C gacha α -Fe modifikatsiyada mavjud bo'lib, hajmiy markazlashgan kubsimon tuzilishli, ferromagnit xossaga ega bo'ladi.


770°C dan 910°C gacha β -Fe modifikatsiyada ferromagnitlik xossasi yo'qolib paramagnit xossali bo'ladi, ammo kristall panjara deyarli o'zgarmaydi.

910°C dan 1390°C gacha temirda polimorf o'zgarishlar ro'y berib, γ -Fe modifikatsiyaga o'tadi. Kristall panjara yoqlari markazlashgan kub bo'lib, temirning paramagnit xossasi saqlanib qoladi.

1390°C dan boshlab yana polimorf o'zgarish ro'y berib, δ -Fe modifikatsiya hosil bo'ladi. Bu modifikatsiyada asosiy kristall panjara turi — hajmiy markazlashgan kub bo'lib, u temir suyulguncha (1536°C) saqlanib qoladi.

Temir boshqa d — elementlar singari turli qotishmalar hosil qiladi. Bu qotishmalar qatoriga Fe ning uglerod bilan hosil qilgan birikmalari kiradi. Bular sementit — Fe_3C (xom cho'yan), austenit — α -Fe ning C bilan qattiq eritmasi. ferrit — β -Fe ning C bilan qattiq eritmasi shular jumlasiga kiradi. Bu qotishmalarning tarkibini, hosil bo'lish temperaturasini, sharoitini o'zgartirish bilan turli fizik-kimyoviy xossalarga bo'lgan qotishmalar olinadi.

Temirning o'ziga xos xususiyatli oddiy va murakkab birikmalar hosil qilishi sababli, uning tashqi elektron qavatining $3d^6 4s^2 (4p^0)$ tuzilishi bilan tizohlanadi.



o'tganda tashqi qavatdagi $4s^2$ — elektronlar kimyoviy bog'lanishda ishtirok etadi, bu bog'lanish ionli bog' bo'ladi. Bunda Fe^{2+} — ko'pchilik s — metallarga o'xshash xossali (rangsiz yoki juda kuchsiz rangli) birikmalar hosil qiladi. Ko'pchilik birikmalari suvda eriydi va oksidi asos xossasini namoyon etadi. Birikmalari qaytaruvchi bo'lib, oson oksidlanadi va $3d$ — orbitaldagi 6 ta elektrondan 1 tasini berib, barqaror oksidlanish darajasiga $[3d^5 4s^0]$ o'tgan Fe^{3+} ionida toq elektronlar soni 5 tani tashkil etadi. Bu Fe^{3+} — ning magnit xossalari va rangli (d — metallar singari) birikmalar hosil qilishiga sabab bo'ladi.

Temirning oksidlanish darajalari +2, +3 va +6 bo'lgan birikmalar mavjud.

Fe(II) ning asosiy birikmalari qatoriga FeO (qora), FeS (qora), FeCO₃ (ko'kimtir-oq), FeCl₂ (oq), FeSO₄ · 7H₂O (och ko'kimtir-oq), Fe(CIO₄)₂ · 6H₂O, Fe(NO₃)₂ · 6H₂O, (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ · 6H₂O (Mor tuzi) kabi moddalar kiradi.

FeO — asosli oksid. Suvda erimaydi. Kislota muhitli suvda eriydi. Geksaakvaferat (II) kompleks ionini hosil qiladi:




Fe(OH)₂ — temir (II) gidroksid asosli xossaga ega modda. Suvda erimaydi. Yangi tayyorlangan Fe(II) — ionli birikmalar (tuzlar) eritmada ishqorlar ta'sirida hosil bo'ladi. Lekin tez orada oksidlanib, qon tusga kiradi, chunki quyidagi jarayonlar boradi:



FeS — kam eruvchan modda bo'lib, Fe²⁺ ga H₂S gazi yoki suvda eritmasi ta'sirida hosil bo'ladi:



Bu modda hosil bo'lishining o'ziga xos tomoni shundaki, agar havoda H₂S ning miqdori ko'payib ketsa, bu havodan nafas olgan kishilar zaharlanib, noxush oqibatlariga sabab bo'lishi mumkin. Chunki havodagi H₂S bilan nafas olinganda vodorod sulfid kishi qoniga o'tib, qonning asosiy tarkibiy qismini tashkil etgan gemoglobindagi Fe²⁺ ionlari bilan ta'sirlashadi va bu qonning buzilishiga, oqibatda ko'ngilsiz hodisaga olib keladi. Shu sababdan havoda H₂S ning miqdori yo'l qo'yilganidan (0,001%) (C_{H₂S} = 10⁻³) oshmasligi kerak. FeCO₃ va FeS lar ham tez buzilib, boshqa moddalarga aylanadi:



Fe(II) ioni K₃[Fe(CN)₆] — qizil qon tuzi ta'sirida "turnbul ko'k" nomli yomon eriydigan birikmani hosil qiladi.

Bu reaksiyadan analitik kimyoda Fe(II) ionini aniqlashda foydalaniladi.



Fe(II) ioni qaytaruvchilik xossasiga ega. Ayniqsa, kislotali muhitda Fe²⁺ — o'q bo'lgani uchun Fe²⁺ — e⁻ → Fe³⁺ reaksiya oson boradi. Fe(II)ning bu xususiyatidan foydalanib turli namunalar tarkibidagi temir miqdorini hajmiy analizning permanganometriya usuli bilan aniqlash mumkin:




Ikkinchi yarim reaksiya MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O ning E₀ = +1,51 bo'lganligi uchun galvanik juftida bu jarayon ro'y berayotgan elektrod katod (+) rolini o'ynab, unda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi. Elementning EYuK E = 1,51 - (-0,46) = 1,976 V. Tenglamasi keltirilgan oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi shubhasiz, o'ng tomonga yo'nalgandir.

Fe(II) ning kompleks birikmalari [Fe(NH₃)₆]Cl₂, [Fe(H₂O)₆]SO₄ va K₃[Fe(CN)₆] dan oxirigisi eng barqaror (K_{stab} = 4 · 10⁻³⁶). Unga kislota H₂[Fe(CN)₆] — oq kristall modda mos kelib, suvda yaxshi (150g/100 g H₂O) eriydi va kuchli kislota xossasiga ega. Uning kaliyli tuzi — K₃[Fe(CN)₆] sariq qon tuzi nomi bilan ataladi.


Sariq qon tuzi qonga temir qipig'ini K₂CO₃ bilan qo'shib qizdirish natijasida olingani sababli shunday nomlanadi. Bu tuzning Cu(II), Fe(II), Zn(II) ionlari bilan hosil qilgan analoglarida CN⁻ — ionlari bevosita bu ionlar bilan kimyoviy bog' hosil qiladi. Shunga ko'ra ularni aralash tuzlari deyish ham mumkin. Bu moddalar suvda yomon eriydi va zaharli.

Fe(III) ning birikmalari Fe₂O₃ — qizil qo'ng'ir rangli, suvda yomon eriydigan, kislota va ishqorlarda eriydigan qisman asos xossali amfoter oksid. Uning turli polimorf holatlari α — Fe₂O₃ (gematit), β — Fe₂O₃ (magnetit) xossali (magnetit lentalaridagi jigarrang) modda ko'rinishlari mavjud. Bu modda tabiatdagi temir rudasining asosiy qismini tashkil etadi. FeS va FeS₂ ni kuydirish bilan ham hosil qilinadi, temir va uning qotishmalarini olishda asosiy xomashyo hisoblanadi.

Fe(OH)₃ — qizil-jigarrang modda (zang), temir (III) gidroksidi deyiladi. O'zgaruvchan tarkibga Fe₂O₃ · xH₂O ega. Sharoitga qarab, haroratga bog'liq holda tarkibidagi H₂O ni yo'qotib, FeO(OH) tarkibli oksigidroksid hosil qiladi. Yuqori temperaturada qizdirilsa Fe₂O₃ ga aylanadi:




Kislotalarda Fe_2O_3 va $\text{Fe}(\text{OH})_3$ erib tuzlar hosil qiladi:



$\text{Fe}(\text{III})$ tuzlarining suvli eritmasi sariq rangli bo'ladi. Yangi qilingan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ishqorlarning konsentrlangan eritmalarida ham



geksagidroksioferrat (III) kaliy hosil bo'ladi. Xuddi shuningdek, Fe (amfoterligi sababli) kuchsiz kislotali oksidlar singari ishqorlar va kaliy karbonatlari bilan qo'shib qizdirilsa ferrit (MFeO_2) lar hosil q




Bu moddalar suvda yaxshi eriydi. $\text{Fe}(\text{II})$ ning ferriti $\text{Fe}(\text{FeO})_2$ Fe_3O_4 — magnetit (temirning aralash $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ oksidi) deyiladi. B d — metallarning Co, Ni, Cu, Mn) $\text{M}(\text{FeO}_2)_2$ tarkibli ferritlari ferrom nit xossaga ega bo'lgani uchun texnikada turli magnitlar va mas lentalar tayyorlashda ishlatiladi.

Suvli eritmadan ajratib olingan tuzlari $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $\text{Fe}(\text{ClO}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ kabi kristallogidratlar holid bo. Tarkibida suv saqlanmagan tuzlari: $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ — to'q-qizil qon ra FeCl_3 qo'ng'ir — jigarrang, FeF_3 — to'q-yashil rangli moddalar. tuzlarning deyarli hammasi suvda yaxshi eriydi. Suvli eritmalarida Fe va $\text{Fe}(\text{III})$ tuzlari gidrolizlanadi. Gidroliz kation bo'yicha boradi, er muhiti kislotali ($\text{pH} < 7$) bo'lib, gidroliz I yoki II bosqichida to x Temperatura ta'sirida oxirigacha borishi mumkin, juda ko'p qizdiris uzoq vaqt turishi natijasida bu tuzlar eritmasida qo'ng'ir rangli cho $\text{Fe}(\text{OH})_3$ hosil bo'ladi. Agar biror kislota eritmasi qo'shilsa, yana sariq rangli eritma hosil qiladi. Gidroliz reaksiyasi:




Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga binoan mazkur eritmada bor reaksiya, quyidagicha yozilsa, to'g'ri bo'ladi:



Har bosqichda $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ tarkibidagi bitta suv molekulasini OH^- va H^+ ioniga ajralib gidroksi birikma hosil qiladi. Gidroksi birikmalarda OH^- ionlari Fe^{3+} ionlarini bir-biriga bog'lovchi "ko'prik" vositasini o'taydi va bunday birikmalar polimer tuzilishga ega bo'lib, suvda eruvchanligi kam bo'ladi.


$\text{Fe}(\text{III})$ ning turli kompleks birikmalari: $\text{M}^{2+}[\text{FeF}_6]$; $\text{M}^{2+}[\text{FeCl}_4]$; $\text{M}^{2+}[\text{Fe}(\text{SCN})_6]$; $\text{M}^{2+}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ mavjud. Ular ichida eng barqarori $K_{\text{st}} = 1 \cdot 10^{21}$ bo'lgan $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ — kaliy geksatsianoferat (III) bo'lib, u qizil qon tuzi deyiladi. Suvda yaxshi eriydi.



Bu tuz $\text{Fe}(\text{II})$ ionini aniqlashda (turnbul ko'kini hosil qilgani tufayli) ishlatiladi. $\text{Fe}(\text{III})$ ning barcha birikmalari oksidlovchi xossalariga ega:



Shu jumladan komplekslari ham:



Fe^{3+} ionini aniqlash uchun sariq qon tuzi $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ eritmasidan qo'shilsa, to'q-yashil rangli cho'kma "Berlin lazuri" $\text{Fe}_4^{2+}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3^{10-}$ hosil bo'ladi: $4\text{Fe}^{3+} + 3\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] = \text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 + 12\text{K}^+$


XXV.3. Cho'yan ishlab chiqarish

Temirning asosiy qismi cho'yan va po'lat olishga sarflanadi. Cho'yan ishlab chiqarish domna pechlarida olib boriladi. Domna jarayoni 29-rasmda aks ettirilgan. Domna pechi balandligi 30 m, kengligi 6 m va ichki qismi o'tga chidamli g'ishtdan iborat. Yuqori qismi "shaxta", yuqori tuynugi "koloshnik", keng qismi "raspar" va tubi "gorn" deyiladi. Pech ruda — Fe_2O_3 , koks va flyus — suyuqlanish temperaturasi pasaytiruvchi moddalar bilan to'ldiriladi. Koks ham yonilg'i, ham qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Gorn orqali pastdan 600—800°C dagi havo yuboriladi. Koks yonadi:



Temperatura yuqorilashib CO gazi yuqoriga chiqib boshlaydi va Fe_2O_3 ni qaytaradi:





Shu bilan birga ruda tarkibida boshqa elementlar (Si, Mn, P, S) ham bo'lib, ular ham qaytariladi. Pechning shaxta qismida hosil bo'lgan temir 1000°C da sekin-asta yuqori haroratli qismi rasparga tusha-laydi va suyuq holga o'tib, 1800°C da koks bilan ta'sirlashib suyuq cho'yan hosil qiladi. Suyuq cho'yan oqib gorngga tushadi va shlakdan quvurdan quyib olinadi yoki po'lat ishlab chiqarish uchun Ma-pechlariga yuboriladi. Cho'yan kulrang, yaltiroq, mexanik jihatdan qotishma. Cho'yan tarkibi 4% gacha C, 92—95% gacha Fe va H. lardan iborat. Cho'yanning turlari uning tarkibidagi uglerodning ho-ko'ra: oq, kulrang cho'yanlarga bo'linadi.

Oq cho'yanda uglerod, asosan sementit tarkibida bo'lib, "Fe" aralashmasi suyuqlanmasini tezlik bilan sovutish tufayli hosil bo-sirti oq. Bu cho'yan yuqori bosimli sharoitlarda ishlovchi detallar yorlashda ishlatiladi.

Bolg'alanuvchan cho'yan. Oq cho'yanni 1000°C gacha 10—12 qizdirib, 700°C gacha sovutilib, 20—30 soat saqlab turilsa va unga legir-qo'shimcha Si, Ni, Cu, Al, Co, Ti lar qo'shilsa yaxshi deformatsiyala-holida chiqib ketadi. Suyuq metallga turli qo'shimchalar — Mo, W, V, Cr, cho'yanga aylanadi. Undan avtomobil, traktor va mashinasozlikda dalaniladi.

Kulrang cho'yan. Tarkibida uglerodning "plastik simob" tuz-saqlagan bo'lib, silindr, vtulka va jihozlarining statik asoslarini yas-ishlatiladi. Kulrang cho'yanga turli modifikatorlar (kukunsimon M, Ca, Ce) qo'shib "yuqori chidamli" cho'yan olinadi ($G=100\text{ MPa}$)

Cho'yanning korroziyaga chidamliligini oshirish uchun Ni va-ishqor va kislotaga chidamliligini oshirish uchun Ni va Cr; chidamliligini oshirish uchun Al, Si, Mo; antifriksion xususiyatini osh-uchun Si, Mn, Cu qo'shimchalar qo'shib maxsus cho'yanlar olin-Ishlatilish maqsadlariga ko'ra cho'yan qayta ishlanadigan ($C>4\%$ bo'-ni uchun qayta ishlanib po'lat olinadi) va quymakorlik cho'yani ($C<2,3,8\%$) ga bo'linadi. Quymakorlik cho'yanidan turli quyma buyu-detallar olishda, mashinasozlikda foydalaniladi.

Cho'yan ishlab chiqarish jarayoni unumdorligini oshirish uchun havo oqimi kislorod bilan boyitiladi va ishlab chiqarish 1,5 marta-tezlashadi. Shaxtaning yuqori qismidan chiqadigan koloshnik gazlari sanoatining turli mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun yuborilsa,

oqali chiqarib olinadigan shlaklar turli qurilish materiallari ishlab chiqa-isha yuboriladi.

Domna jarayoni "uzluksiz" (bir ishlatilsa, bir necha yil to'xtatilmaydi) ishlab chiqarish turiga kiradi, uning umumiy hajmi 2000 m^3 , unda 7000 t konerat, ruda va boshqa moddalar aralashmasi 2000 t koks ishlatilib, bir-unda 4000 t gacha cho'yan ishlab chiqariladi (minutiga $2,5\text{ t}$ cho'yan).

XXV.4. Po'lat ishlab chiqarish

Cho'yan tarkibida ko'p miqdorda (5%gacha) uglerod va oz miqdorda bo'lsa-da, Si, P, S lar bo'lgani uchun "mo'rt" bo'lib, elastik deformatsiyalanmaydigan, mexanik ishlov berish qiyin bo'lgan qotishma bo'lgani uchun uni po'latga aylantiriladi. Cho'yanni po'latga aylantirishning usida ortiqcha uglerod, Si, P, S — larni oksidlab chiqarib yuborish, ma'-lum xususiyatlar berish uchun turli qo'shimcha metallar (legirlovchi modda) qo'shish yotadi.

Po'lat ishlab chiqarishning Marten va Bessemer usullari mavjud.

Marten usuli (fransuz muhandisi P. Marten tomonidan ishlab chiqilgan)

yicha: pechga qayta ishlanadigan po'lat bo'laklari, ruda, cho'yan solinib, qizdirilgan havo yuboriladi va suyuq yoqilg'i purkaladi. Yuqori haroratli alanga ($1800 - 1900^\circ\text{C}$) vositasida suyuq holga o'tadi, aralashmalar CO_2 , SiO_2 , P_2O_5 holida chiqib ketadi. Suyuq metallga turli qo'shimchalar — Mo, W, V, Cr, Ni, B, Be — qo'shib, turli markadagi po'lat ishlab chiqariladi. Po'latning korroziyaga va mexanik ta'sirga chidamliligini oshirish uchun unga quyidagi legirlovchi qo'shimcha (Cr, Mn, Co, Ni, Mo, W, Si) lar qo'shiladi.

Bessemer (yoki konvertor) usulida suyuqlantirilgan cho'yan orqali qizdirilgan havo purkaladi. Cho'yan tarkibidagi qo'shimchalar oksidlanib, gaz yoki shlaklar holida chiqarib yuboriladi.


XXVI bob

IV A GRUPPACHA ELEMENTLARI

Asosiy tushunchalar: uglerod, olmos, grafit, kremniy, qo'rg'oshin, qalay, karbid, siltsiy, karbonat, silikatlar, gidrokarbonatlar, qum-tuproq, kvarts, shisha, sement, chinni, karbonat angidridi, is gazi, suyuq shisha.

XXVI.1. Umumiy xossalari

Uglerod gruppachasi ugleroddan tashqari kremniy, germaniy, qalay va qo'rg'oshin elementlaridan iborat.





Bu gruppacha elementlari atomlarining oxirgi elektron qavatida 4 ta (ns^2np^2) valent elektronlar mavjud. Shu boisdan, ular o'z birikmalarida atomlarining tashqi pog'onasidagi juftlashmagan ikkita elektroni hisobiga, odatdagi holatda ikki valentli, qo'zg'algan holatida esa to'rtta juftlashmagan elektronlari hisobiga to'rt valentli, oksidlanish darajalari $-4, 0, +2, +4$ bo'ladi.

Leikin uglerod ayrim hollarda III valentli (CO) va -4 dan $+4$ gacha (sakkiz xil) oksidlanish darajasidagi birikmalarni hosil qiladi.

Bu elementlarning vodorodli birikmalar hosil qilish ehtimolligi va ularning barqarorligi C dan Pb ga tomon kamayadi, chunki bu qatorda element atomlarining radiusi keskin ortib, elementning elektromanfiyligi kamayib boradi.

Qizig'i shundaki, bu gruppada C dan Pb ga borgan sari aynan bir element atomlarining o'zaro kimyoviy bog'lanish hosil qilishga moyilligi kamayadi. Deyarli barcha elementlardan farqli o'laroq, C atomlari o'zaro birlamchi (C—C), ikkilamchi (C=C), uchlamchi (C≡C) bog'lar hosil qilish bilan to'g'ri, tarmoqlangan va halqasimon (gomotsep) "zanjir"lar hosil qiladi. Bu katenatsiya hodisasi deyiladi. Buning sababi uglerod atomining tashqi elektron qavatidagi valent elektronlar soni (4 ta) valent orbitalar (1 ta s va 3 ta p) soni (4 ta) ga teng bo'lib, C—C bog'larining energiyasi juda yuqori 350,0 kJ/mol ekanligidir. Shuning uchun ham uglerod birikmalarining turi va soni boshqa elementlarnikiga nisbatan beqiyos ko'pdir.

Bu gruppada elementlarida grupp raqamidan past valentlik (II) namoyon qilishga moyillik C dan Pb ga tomon kuchayadi. Bunday xususiyatning yuzaga kelishiga atom yadro zaryadi ortishi bilan tashqi elektron qavatidagi ns^2 elektronlarning kimyoviy bog' hosil bo'lishida ishtirok etish imkoniyatining kamayib borishi, ya'ni "*inert elektron juftligi*" effekti sabab bo'ladi. Shuning uchun Pb(IV)ning birikmalari kuchli oksidlovchi bo'lib, osonlik bilan Pb(II) birikmalariga aylanadi.

Bu gruppada C, Si, Ge, Sn, Pb qatorida metallmaslik xossalari kuchsizlanib, metallik xossalari kuchayadi. Bu o'zgarishlar ularning oksidlari va gidroksidlari xossalarida ham namoyon bo'ladi. Agar CO_2 — gazi suvda erib, kuchsiz kislota hosil qilsa, PbO asosli xossasi yuqoriroq bo'lgan amfoter oksiddir.

Bu elementlar oddiy birikmalarining xossalari o'ziga xos bo'lib, elementlarning tartib raqami ortishi bilan suyuqlanish temperaturallari kamayib boradi.

XXVI.2. Uglerod

Uglerod IV gruppaning dastlabki elementi bo'lib, p-metall qatoriga kiradi. Uning Er sharidagi umumiy miqdori 0,14% ni tashkil etib, tabiatda erkin holatda va birikmalar tarkibida uchraydi. Asosan xil barqaror izotoplar: ^{12}C (98,892%) va ^{13}C (1,108%) holida bo'lgan kosmik nurlar ta'sirida β — radioaktiv izotopi ^{14}C ham mavjud. Quyidagicha hosil bo'ladi:



Bu izotopning miqdoriga asoslanib, o'simlik qoldiqlarining yulizi aniqlanadi. Tarkibida uglerod saqlagan tabiiy manbalar qatoriga oq uglevodlar, nuklein kislotalar, tabiiy gazlar, neft, toshko'mir va CaCO_3 — ohaktosh, magnezit — MgCO_3 , dolomit — $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ lar kiradi. Erkin holatda uglerod uch xil allotropik shakllar: grafit, olmos, karbin ko'rinishida uchraydi.

Grafit — uglerod atomlari sp^2 — gibrid orbitalarining o'zaro qoplashi tufayli hosil bo'lgan olti a'zoli halqalarning bir-biriga tutashuvidan hosil bo'lgan qabatlardan tashkil topgan oddiy modda (30, b-rasm). Qabatlardagi C — atomlari harakatchan $2p$ — elektronlar vositasida harakatlanadi. Bunday bog' tufayli grafit metallik, yaltiroqlik, anizotrop elektr o'tkazuvchanlik xossasiga ega. Qattiq holda bo'lsada, ancha mo'rt bo'lgan qog'oz sirtida qora iz qoldiradi.

Olmos — kristall panjarasida sp^3 — gibridlanish tufayli uglerod atomlari tetraedrik joylashgan, kubsimon tuzilishli oddiy modda (30, a-rasm).

Olmos — qattiqligi ko'pchilik moddalarnikidan yuqori bo'lgan, o'ta shafqatli, yorug'lik nurini kuchli qaytaruvchi qimmatbaho tosh (*brilliant*)dir, uning zichligi $3,5 \text{ g/sm}^3$ ga teng. Og'irligi "karat"larda o'lchanadi (1 karat = 0,2 g). Tabiatda ba'zan "qora olmos" namunalari ham uchraydi. Olmosning atmosfera bosimda va 2500°C da grafitdan *sun'iy olmos* olinadi.


Olmosning kristall panjarasida uglerod atomlarining koordinatsion soni 4 ga, grafitda 3 ga va karbinda 2 ga teng.

Karbin — qora kukun. Uning tuzilishini quyidagicha tasavvur etish mumkin: $-\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}-$ (poliatsetilen) va $-\text{C}=\text{C}=\text{C}=\text{C}-$ (polikumularen). Uglerod atomlari elektron orbitalarining gibridlanishi — sp^1 , toshko'mir va qora qurum uglerodning karbin ko'rinishini saqlaydi.

Karbin yarimo'tkazgich, yorug'lik ta'sirida uning o'tkazuvchanligi oshadi.

Agar yog'och yonib cho'g'ga aylangan holatida suv sepib o'chirilsa, toshko'mir yoki yog'och quruq haydalsa qora rangli, engil, g'ovak tuzilishli mahsulot — *yog'och (pista) ko'miri* yoki *aktivlangan ko'mirga* aylanadi. Aktivlangan ko'mir g'ovakligi tufayli juda katta sirt yuzasiga ($1000 \text{ m}^2/\text{g}$) ega bo'lgan uchun o'z sirtiga gazsimon va suyuq (yoki suyuqliklarda erigan) moddalarni singdirib olish xossasiga ega. Buni 1785 yilda T. E. Lovits aniqlagan. Bu hodisa — *adsorbsiya* hodisasi bo'lib, pista ko'mir *adsorbent* deyiladi. Sirtiga moddalarni yutib olish xossasiga ega bo'lgan ko'mir *aktivlangan ko'mir* deyiladi. Uglerodning bu xossasidan foydalanib turli eritmalardagi qo'shimchalar, rangli moddalar ajratib olinsa, havo zaharli gazlardan (karbonat gaz yordamida) tozalanadi. Tibbiyotda organizmning zaharlanishi (karbonat gaz yordamida) tozalanadi. Tibbiyotda organizmning zaharlanishi (karbonat gaz yordamida) tozalanadi. Tibbiyotda organizmning zaharlanishi (karbonat gaz yordamida) tozalanadi.


Uglerodning kimyoviy xossalari. Uglerod oddiy sharoitda inert modda bo'lib, qizdirilganda kimyoviy faolligi ortadi. Chunki ortiqcha energiya ta'sirida normal holatdagi uglerod atomi:



holatga o'tadi va reaksiya qobiliyati oshadi.

Uglerod atomlari reaksiyaga kirishayotgan modda xususiyatidan kelib chiqib, elektron olishi (oksidlovchi) yoki berishi (qaytaruvchi bo'lishi) mumkin. Bu reaksiyalar uchun uglerod grafit yoki koks (ko'mir) ko'rinishida ishlatiladi.

a) Metallarning oksidlari bilan ko'mir qizdirilganda uglerod oksidlanadi va *qaytaruvchi* xossasini namoyon qiladi. Metall sof holda olinadi. Bu usul karbotermiya (ugletermiya yoki karbotermiya) deb ataladi. Bu usul bilan Cr, Fe, Si, P — elementlarini olish mumkin. Masalan:




b) Yuqori temperaturada uglerod metallmaslar bilan birikadi. Kislorod ta'sirida yonadi:




CO_2 , CCl_4 , CS_2 larda uglerod +4 oksidlanish darajasiga ega. Bu reaksiyalarda uglerod qaytaruvchilik xossasini namoyon etadi.

d) Vodorod bilan reaksiyaga kirishib, metan hosil qiladi:



CH_4 da C^{-4} holida bo'lib, bu yerda *oksidlovchi* xossasini namoyish qilgan.


e) Uglerod kuchli oksidlovchilar ta'sirida oksidlanadi:



XXVI. 3. Karbidlar

Uglerod ko'pchilik metallar bilan yuqori temperaturada Me_2C tarkibidagi birikmalar — **karbidlarni** hosil qiladi. Bularndan p — elementlarning karbidlari Be_2C , Al_4C_3 — **metanidlar**; s- va d-metallarning karbidlari Ag_2C_2 , CaC_2 — **asetilenidlar** deyiladi.

Metanidlar suv ta'sirida gidrolizlanib metan (CH_4) gazini hosil qiladi.






Atsetilenidlar suv ta'sirida gidrolizlanib atsetilen gazini hosil qiladi.



Bu bilan ular kuchsiz kislota xossalarini namoyon qiladilar. Karbontuzilishi bilan ham bir-biridan farq qiladi. Metanidlarda uglerod atomi o'zaro bog'lanmagan, ya'ni ularda uglerod atomlari faqat metall atomi bilan bog'lanadi, ya'ni $C - C$ bog'lari yo'q (a).

Atsetilenidlarda bir vaqtda $\text{Me}-\text{C}$ va $-\text{C} \equiv \text{C}-$ bog'ları mavjud.





30-rasm.

a — Olmosning kristall panjarasi.
b — Grafitning kristall panjarasi

Karbidlarning xillari. a) d-metallarning oddiy tarkibli karbidlari: ZrC , HfC , VC , Mo_2C , W_2C , Mn_3C , Fe_3C (xom cho'yan); Co_3C yuqori qattiqlikka ega bo'lgan metallsimon qotishmalar bo'lib, elektr toki issiqlikni yaxshi o'tkazuvchan va elektr qarshilikning musbat termik effitsiyenti bilan tavsiflanadi.

b) murakkabroq tarkibli Cu_2C , Ag_2C_2 , Au_2C_2 , HgC_2 karbidlar kush mexanik ta'sir natijasida kuchli portlash xossasiga ega.

Mo , W , V , Nb larning karbidlari issiqlikka bardoshli, q suyuqlanuvchan $2000-3500^\circ C$ va korroziyaga chidamli qotishmalar bo'lib, Fe , Mn , Co ning karbidlari termik va kimyoviy jihatdan ancha chid qotishmalardir.

Karbidlarni olishda turli reaksiyalardan foydalaniladi:



ushbu usul bilan yuqori kuchli elektr toki ta'sirida elektr pechlarda k karbid olinadi.

Metallmaslar ham uglerod bilan *binar birikma** (karbid)lar h qiladi. Kremniy karbidi SiC va bor karbidi B_4C da kovalent bog'lar mavjud. Bu birikmalar juda qattiq, yuqori suyuqlanish temperatur ega bo'lib, kimyoviy jihatdan passivdir. Kremniy karbidi — karbon yarimo'tkazgich xossasi tufayli elektron texnikada va yuqori temperatur ishlaydigan yarim-o'tkazgichlar tayyorlashda qo'llaniladi. Karbidlar d lerodning oksidlanish darajasi har xil: -4 , -3 , -2 , -1 bo'ladi. Eng od qiladi: kovalent bog'li karbidlar qatoriga metanni ham kiritish mumkin.

XXVI.4. Uglerodning kislorodli birikmalari

Uglerod kislorod bilan ikki xil: uglerod (II) oksidi va uglerod (I oksidlarini hosil qiladi.

Uglerod (II) - oksidi CO (is gazi) rangsiz, hidsiz, mazasiz, indiffer gaz. Havodan bir oz engil ($\rho = 1,25$ g/l), suvda juda oz eriydi bo'g'uvchan xossaga ega, $-192^\circ C$ da qaynaydi.

Laboratoriyada olinishi.


Chumoli kislotasiga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirib o mumkin:




oksalat kislotani termik parchalab olinadi:




Sanoatda asosan uglerodni chala yonishi va ko'pchilik metall oksidlarini koks ishtirokida qaytarish, metanni suv bilan konversiyalash natijasida oraliq mahsulot sifatida hosil bo'ladi:




Kimyoviy xossasi jihatdan CO befarq (indifferent) oksidlar qatoriga kirib, unda uglerodning oksidlanish darajasi $+2$ va valentligi 3 ga teng, chunki $C \rightleftharpoons O$ tuzilishga ega. $r_{C-O} = 0,113$ nm. Bog'larning ikkitasi kovalent bog', bittasi donor-akseptor tabiatga ega. Is gazi havo kislorodi ishtirokida yonadi:



CO kuchli qaytaruvchilik xossasiga ega:



CO befarq oksid bo'lsa-da, yuqori bosimda va temperatura ta'sirida $NaOH$ va vodorod bilan birikadi va natriy formiat va metil spirtini hosil qiladi:



Shu sababli organik moddalar sintezida asosiy xomashyo hisoblanadi. CO gazi ko'pchilik metallar bilan $Ni(CO)_4$, $Fe(CO)_5$ kabi karbonil komplekslarini hosil qiladi. Uning bu xususiyatidan metallarning uchuvchan birikmalari va toza metallar olish texnologiyasida foydalaniladi.

CO ning boshqa gazsimon moddalar bilan aralashmasi kimyo sanoati uchun juda zarur xomashyo va yonilg'ilar qatoriga kiradi:

Koks gazi — $35\% H_2$, $20\% CO$, $15\% CH_4$, $18\% CO_2$, $11\% H_2O$;


Havo (generator) gazi — $30\% CO$, $60\% H_2$, $10\% CO_2$;

Suv gazi — $50\% H_2$, $40\% CO$ va 10% boshqa gazlar aralashmasidan iborat.


Uglerod (IV) - oksidi — CO_2 rangsiz, mazasiz, havodan og'ir ($\rho = 1,977$ g/l), yonmaydigan, yonishga yordam bermaydigan, bo'g'uvchi gaz. 1 l suvda $0^\circ C$ da $1,7$ l eriydi. Yuqori bosim va past temperaturada ($t^\circ_{mayus} = -56,5^\circ C$,

$t_{\text{qat}}^{\text{subl}} = -78,5^{\circ}\text{C}$ qattiq holga o'tadi. Molekulyar kristall panjarali "muz" deb nomlanadigan moddaga aylanadi. Chiziqsimon tuzilishga ega, $r_{\text{C-O}} = 1,162 \text{ \AA}$ va $\mu=0$ qutbsiz molekula. Uglerod atomi elektron orbitallari sp^1 — gibridlangan.

Kimyoviy xossalari. CO_2 atmosferasida kislorod atomi bilan bog'lanish hosil qiluvchi metallar yonadi (oksidlanadi):




CO_2 fotosintez hodisasida ishtirok etuvchi eng asosiy modda bo'lib, o'simliklar havodan CO_2 ni va suvni o'zlashtirishi natijasida O_2 , glyukoz va polisaxaridlar hosil qiladi:



CO_2 — "karbonat angidridi" deb nomlanadi. Chunki uning suv bilan erishidan kuchsiz karbonat kislota hosil bo'ladi. CO_2 kislotali oksid bo'lib, xos barcha xususiyatlarni namoyon qiladi.


Asos (ishqor) va asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi, tuz va gidrokarbonatlar hosil qiladi. Ayniqsa $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bilan reaksiyasida:



CaCO_3 (cho'kma) hosil bo'lishi havodagi CO_2 miqdorini aniqlash uchun qo'llaniladi. CO_2 gazidan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun muhit hosil qilishda, turli ichimliklar tayyorlashda foydalaniladi.

Olinishi. Uglerod (IV)-oksidi tabiatda organik moddalarning oksidlanishi, o'simliklar va hayvonlar qoldiqlarining chirishi, nafas olish yoqilg'i yonishi natijasida hosil bo'ladi.

Laboratoriyada (Kipp apparatida) marmartosh (ohaktosh, bo'r)ga kislota ta'sir ettirish yo'li bilan olinadi:



Sanoatda uglerod to'rt oksidi ohaktoshni qizdirish usuli bilan olinadi:



Karbonat kislota — H_2CO_3 beqaror, faqat eritmalarda mavjud bo'ladigan, kuchsiz kislota. Bu modda yuqori bosim ostida CO_2 gazini suvga yuttirish natijasida hosil qilinadi (gazli suv). Shuning uchun uni CO_2 aq holida ham yoziladi. Bu eritma kuchsiz kislota xossasiga ega:





$$K_1' = 4,1 \cdot 10^{-7}; \quad K_2' = 5,6 \cdot 10^{-11}$$



Karbonat kislota va uning gidrokarbonat, karbonat ionlarida uglerod va kislorod atomlari tekis uchburchakda joylashgan bo'lib, unda uglerod atomi orbitallari sp^2 — gibridlangan:




Ikki negizli kislota bo'lganligi sababli karbonat kislota o'rta va yuqori tuzlar hosil qiladi:



Hosil bo'lgan tuzlar gidrokarbonat (bikarbonat) lar $\text{Me}(\text{HCO}_3)_n$ va karbonatlar MeCO_3 deyiladi.

Kuchsiz asoslar bilan H_2CO_3 emas, balki uning angidridi — CO_2 ta'sirlashib, ko'pincha asosli tuzlar hosil qiladi. Shulardan biri $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$ malaxitdir. Ishqoriy metallar karbonatlari suvda eruvchan bo'lib, gidrorlizlanishi sababli eritmaları ishqoriy muhitga ega ($\text{pH} > 7$):



Karbonat kislota tuzlari o'ziga xos xususiyatlarga ega:


- a) I grupp metallari Na, K, Rb, Cs ning gidrokarbonatlari kam eruvchan, karbonatlari esa yaxshi eruvchanlik xossasiga ega.
b) II grupp metallari (Mg, Ca, Ba, Sr)ning gidrokarbonatlari yaxshi eriydi, lekin karbonatlari juda yomon eruvchan moddalardir.

$$EK_{CaCO_3} = 3,8 \cdot 10^{-9} \quad EK_{SrCO_3} = 1,1 \cdot 10^{-10} \quad EK_{BaCO_3} = 4 \cdot 10^{-10}$$

Bu tuzlarning kam eruvchanligidan foydalanib, analitik kimyo grupp kationlari (Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+})ni aniqlashda va aksincha CO_3^{2-} anionini aniqlashda foydalaniladi.

d) Al^{3+} va ba'zi d- metallar ionlari (Fe^{3+} , Cr^{3+})ning gidrokarbonat va karbonatlari umuman mavjud emas. Chunki bu tuzlar yaqin gidrolizlanish xossasiga ega bo'lgani uchun ularni umuman qattiq holatda ajratib olib bo'lmaydi.

e) kalsiy karbonat $CaCO_3$ suvda erimaydi, shuning uchun o'z suvdan CO_2 o'tkazilganda loyqa hosil bo'ladi (ohakning oqartiruvchi xossasi ham shunga asoslangan):



Ammo CO_2 davomli o'tkazilaversa, eritma tiniqlashadi. Buning sababi gidrokarbonatning hosil bo'lishidir:



f) suvda kam eruvchan metall karbonatlari sirka kislota — CH_3COOH eritmasida eriydi. Bu reaksiyadan foydalanib karbonatlar hamda ular bo'lgan quyqalar (bug' qozonlari, uy-ro'zg'or buyumlari) tozalanadi:




$CaCO_3$ — kristall holatda (marmartosh) va qisman amorf holatda (ohaktosh, bo'r) mavjud bo'lib, asosan tabiiy mineral sifatida qazib olinadi. U karbonat ангидриди, so'ndirilmagan ohak olishda, qurilish materiali, yoki quroli sifatida keng ishlatiladigan modda.

Natriy karbonat Na_2CO_3 — soda yoki **kalsinatsiyalangan soda** nomi bilan yuritiladi. Uning kristallogidrat $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ **kristallik soda** deyiladi. Soda kimyo sanoatining asosiy mahsulotlaridan biridir. U shuning

bilan, sovun, qog'oz ishlab chiqarishda, to'qimachilik sohasida, neft kam eruvchan, karbonatlari esa yaxshi eruvchanlik xossasiga ega.

Uglerodning ahamiyatga ega bo'lgan birikmalaridan yana biri karbamid yoki mochevina — $CO(NH_2)_2$ oq kristall, suvda yaxshi eriydigan, elektrolitmas modda bo'lib, quyidagi reaksiya bo'yicha olinadi:



Karbamid qishloq xo'jaligida azotli o'g'it sifatida va chorva mollari oziq-ovqatiga qo'shib beriladigan qo'shimcha tariqasida ishlatiladi. Karbamid amiddan arzon plastmassa (karbamid smolasi) olinadi. Karbamid organik, dorivor moddalar olishda xomashyo sifatida ishlatiladi.

Bulardan tashqari, uglerod galogenlar bilan CCl_4 , $COCl_2$ — **fosgen**, CF_4 — **freon**, uglerod (IV)-sulfidi — CS_2 va sianid kislota — HCN , ularning tuzlari — KCN , $NaCN$; tiotsianid (rodanid)lar — $KSCN$, $NaSCN$. NH_4SCN kabi birikmalarni ham hosil qiladi. Bu birikmalar qimmatli bo'lib, o'ziga xos maqsadlar uchun ishlatiladi.


Tabiatda uglerodning asosiy qismi — organik moddalar tarkibiga kiradi.

XXVI. 5. Kremniy (Si)

IV guruhning keng tarqalgan elementlaridan yana biri kremniydir. Kremniy tabiatda qumtuproq (SiO_2) va turli silikatlar tarkibida uchraydi, eritma tarkibining 26% ni tashkil etadi.

Tabiiy silikatlar: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ (kaolin); $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ (ortoklaz); $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ (albit); $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ (anortit); $3MgO \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ (serpentin); $MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$ (talk).


Olinishi Sanoatda kremniy uning oksidini magniy, alyuminiy kabi metallar bilan qaytarib olinadi:



Fizik xossalari. Si to'q-kulrang yoki jigarrangli kristall (ba'zan amorf) modda.

Kimyoviy xossalari. Kremniy amorf va kristall holatda bo'ladi. Metallmaslar va metallar bilan turli sharoitda reaksiyasi:


a) Kristall holatdagi kremniy fluor bilan oddiy temperaturada, klor, oltingugurt bilan esa 400—600°gacha qizdirilganda reaksiya kirishadi:



b) Kremniy yuqori temperaturada metallarning suyuqlanmalarida silitsidlarni hosil qiladi:



Bu silitsidlarda kremniy (–4) oksidlanish darajasida bo'lib, ular ta'sirida kremniyning vodorodli birikmalarini hosil qiladilar:



Bu birikmalar qatoriga kiruvchi:


Kremniy karbidi (karborund) SiC — qattiq, qiyin suyuqlanadigan modda. Uning qattiqligi olmosga yaqinlashadi. Karborund yarimo'tkazgich bo'lib, ega. U abraziv material sifatida, elektr pechlarda, o'tga chidamli buyumlarda ishlab chiqarishda, diod va fotodiodlarda keng qo'llaniladi.

Kremniy nitrid Si₃N₄ — kimyoviy reaksiyalarga bardoshli va yuqori temperaturaga chidamli birikma. Unga HF, ishqor eritmasi, ta'sir etmaydi. Ular o'tga chidamli buyumlar, yuqori temperaturada chidamli yarim-o'tkazgichlar tayyorlashda ishlatiladi.

d) Silanlar Si_nH_{2n+2} to'yingan uglevodorodlarga o'xshash gaz moddalar, kuchli qaytaruvchi bo'lib, havoda o'z-o'zidan alangalanadi.




e) Kremniy ishqorlar bilan shiddatli reaksiyaga kirishib, silitsidlar hosil qiladi va vodorod ajralib chiqadi:




f) Kremniy kislotalar ta'siriga chidamli bo'lib, faqat HNO₃ larning konsentrlangan eritmalarida aralashmasida eriydi:



H₂[SiF₆] — geksافتورosilikat kislota deyiladi, suvda eriydigan modda. Kremniy (IV)-oksidi — SiO₂, qumtuproq, kvars, tog' xrustali, glinozem deb ham ataladi. Oq amorf kukun yoki chiroyli shaffof atom panjarali kristall holida uchraydi:




Shu sababli yuqori qattiqlikka ega, kislota (HF dan tashqari) lar ta'siriga chidamli. Lekin, HF va ishqorlar ta'sirida eriniladi:




SiO₂ ning kvars ko'rinishi 1800°gacha chidamli modda. Kislotali eritmasiga ega. Suvda erimaydi.

Kremniy oksidi yuqori temperaturada kislotali oksidlarni ularning yordamida siqib chiqaradi:



XXVI.6. Kremniy kislotalari

Ortosilikat — H₄SiO₄ va metasilikat — H₂SiO₃ kislotalari mavjud bo'lib, ular kuchsiz kislotalardir. Umuman, kremniy kislotalari [SiO₂ · mH₂O] (m ≤ n) formula bilan ifodalanib o'zgaruvchan tarkibga ega. Lekin har qanday holda ham uning asosiy tarkibi [SiO₄⁴⁻] gruppadan iborat, polimer tuzilishli modda:




Ularning suvda erimaslik sababi ham shunda. Lekin ishqoriy eriydi va tegishli metallarning tuzlarini hosil qiladi. Tuzlari deyiladi.


Silikat kislota tuzlaridan ishqoriy metallarning silikatlarini eritib, bu tuzlarga xlorid yoki sulfat kislota ta'sir ettirilsa, silikat kislota holatida ajralib chiqadi:



Natriy va kaliy silikatlarini eruvchan shisha, ularning eritmalar shisha deb ataladi, ular yelim (kley) sifatida ishlatiladi. Eruvchan shishadagi reaksiyalar asosida olinadi:



Natriy va kaliy silikatlarini suvda eriydi va anion bo'yicha gidrolyzlanadi. Eritma tiniq bo'lmasdan kolloid eritma holida bo'lib, suyuq yoki qog'oz elimi (kleyi) sifatida ishlatiladi:



Sun'iy ravishda olinadigan silikatlar katta ahamiyatga ega. Ular asosiysi shishadir.

Qumtuproq, natriy oksidi (karbonat) va kalsiy oksidi (karbonat) qo'shib yuqori temperaturada hosil qilingan suyuqlanma juda tez sovitsa, shishaga aylanadi. Xomashyo sifatida kvars qumi, ohaktosh soda ishlatiladi.

Xomashyoga PbO qo'shilsa, billur (xrustal) shisha hosil bo'ladi. Tik shisha PbO, BaO, B₂O₃ oksidlari qo'shib olinadi. Volfram, molibden oksidlari qo'shilsa, yuqori temperaturaga chidamli shisha hosil bo'ladi. Xrom (III)-oksid qo'shilganda yashil rangli, kobalt (II)-oksid qo'shilganda ko'k rangli shisha olinadi.

Ishqoriy metallar oksidlari Li₂O, Cs₂O bilan shishani qo'shib turli xossalari "sitallar" — kristall shisha olinadi, ular oddiy shishadan optik tiniqligi, radiatsiya ta'siriga befarqligi bilan farq qiladi. Sitallardan truboprovodlar, naylar, elektroizolyatorlar, teleskoplar, kimyoviy reaktorlar, uy-ro'zg'or buyumlari va optik tolalar tayyorlanadi.

Xalq xo'jaligida keng qo'llaniladigan silikatlar qatoriga yana sement, chinni, sopol, fayans, g'isht kabi mahsulotlar kiradi.

Chinni, fayans va sopol buyumlar kremniy birikmalari (qumtuproq) asosida tayyorlanib, shixta turli miqdoriy nisbatlarda aralashtirilgan moddalar aralashmasiga suv qo'shiladi va yetarli darajada ishlov beriladigan qorishma loy holiga keltiriladi, shakl beriladi, quritiladi va dastlab yuqori temperatura (900—1000°C) da pishiriladi. Bu buyumning asosi hisoblanib, uning sirtiga turli rang beruvchi maxsus oksidlar aralashmasidan surtiladi. So'ngra ikkinchi marta 1320—1350°C da tobiga etkaziladi va tayyor buyum holiga keltiriladi.

Bunday buyumlar qatoriga Toshkent va Samarqand chinni zavodlari mahsulotlari, chinni idish-tovoqlar, yodgorlik buyumlari, vazalar, izolyatorlar, Buxoro, Xiva, Quva shaharlarida ishlab chiqariladigan turli sopol idishlar, yodgorlik buyumlari, pardoqlash materiallari kiradi.

G'isht ishlab chiqarishda yuqoridagidek ma'lum tarkibga mos keluvchi shixta (aralashma) tayyorlanadi va aniq shakl berilgan xom mahsulot quritiladi, "xom g'isht" hosil bo'ladi. Qurtilgan xom g'isht 900—1050°C da pishiriladi. Yuqori temperaturaga chidamli maxsus g'ishtlar ishlab chiqarish uchun 93—96% SiO₂, 4—7% CaO va boshqa qo'shimchalari bo'lgan xomashyo 1300—1400°C da pishiriladi. Bu mahsulot "dinas" g'ishti deyiladi va 1690—1720°C ga chidamli bo'ladi.

Qumtuproq bilan maydalangan shamot aralashmasi (1:1 dan to 1:3 nisbatgacha) tayyorlanadi, 1300—1400°C da pishiriladi. Bunday g'isht "shamot"li g'isht deyiladi va u 1730°C ga chidamli bo'ladi va o'tga chidamli g'isht ham deyiladi. Pishirilgan g'ishtlarga turli shakl berilib, ularning sirtiga maxsus aralashmalar (CoO, Fe₂O₃, Cr₂O₃, Al₂O₃, ZrO₂, TiO₂, NiO) asosida tayyorlangan "glazur" (sirlar) surtilib yuqori temperaturada qayta ishlanadi. Bular sirlangan g'ishtlar bo'lib, Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent, Termiz, Qo'qon shaharlaridagi qadimiy yodgorliklarda ishlatilgan va hozirda ularni qayta tiklash va ta'mirlash uchun ishlab chiqarilmoqda.

Sement — tabiiy silikatlar, qumtuproq, ohaktosh — CaCO₃ birgalikda aralashtirilib, 1400—1450°C da qizdirib, maydalab olinadigan

kukunsimon mahsulot. Sement ishlab chiqarish uchun tarkibida 67% CaO, 21—24% SiO₂, 4—7% Al₂O₃ va 2—4% Fe₂O₃ saqlagan ker hosil qilish uchun mos keluvchi *shixta* (aralashma) tayyorlanadi. Yuqoridagi temperaturada qizdiriladi. Hosil bo'lgan qizdirish mahsuloti — klinker, asosan, kalsiy silikati va alyuminatlaridan iborat qattiq mahsulot bo'lib, tegirmonda maydalanadi.

Hosil bo'lgan mahsulot — sement turli markalar bilan tavsiflanadi: 200, 250, 300, 400, 500 va 600. Buning ma'nosi, shu sement tayyorlangan va 28 kun qotirib qo'yilgan qotishmaning har 1 sm² 200, 250, 300, 400, 500 va 600 kg yukni ko'tara oladi.

Sementning chag'irtosh, "shebenka" — maxsus maydalangan tosh o'troqning suv bilan aralashmasi (bog'lovchi modda) *beton* deyiladi. Bu beton aralashmasi "temir armatura"li karkaslar bilan quyilsa, "temir beton" hosil bo'ladi. Sement tarkibidagi Al, Fe, Mn — elementlari miqdori o'zgartirib, turli rangdagi va turli maqsadlarda ishlatiladigan sementlar hosil chiqariladi.

Respublikamizda sement ishlab chiqaradigan yirik korxonalar Navoiy va Quva sement zavodlari hisoblanadi.


Silikat kislotaning tabiatda hosil bo'luvchi tuzlari *seolitlar* va *silikagel* deb aytiladi.

Seolitlarning asosiy qismini kremniy oksidi tashkil etadi. Seolitlar M₂Al₂Si₄O₁₂ (M=Na, K) adsorbentlar, ion almashtirgichlar, katalizator sifatida ishlatiladi.

Kremniy organik birikmalar

Molekulasida bitta yoki bir nechta kremniy atomi to'g'ridan-to'g'ri yoki boshqa elementlar atomlari orqali uglerod atomlari (organik radikallar bilan) bog'langan birikmalar *kremniy-organik birikmalar* deyiladi. Ularning tarkibi va turi xilma-xil bo'ladi.

Kremniy organik polimerlarning zvenolari quyidagicha bo'lishi mumkin:



Kremniy-organik birikmalar nihoyatda qimmatli xossalarga egadir. Ularning o'ziga xos temperaturada ta'siriga ham, yuqori temperatura ta'siriga ham bardosh bera oluvchi polimerlardir. Ularni suyuq holda ishlatish uchun ularni parda hosil qilinib (masalan: etilsiloksan suvi bilan) qog'oz gazlama va boshqa jihozlarning sirlari shunday qilib qoplanganda, ular suv ta'sir etmaydigan bo'ladi. Kremniy-organik polimerlarning ko'pchiligi ochiq alangada yonmaydi. Kremniy-organik birikmalar tibbiyotda va farmatsevtikada ko'p qo'llanilayapti. Ularning protezlari, nam tortmaydigan maxsus moddalar tayyorlanadi. Kremniy-organik birikmalar yarimo'tkazgich sifatida radiotexnikada ishlatiladi.

XXVI.7. Germaniy, qalay, qo'rg'oshin

Bu elementlarning metallik xossalari, germaniydan qo'rg'oshingacha o'tgan bo'lib, ortib boradi. Germaniyaning o'zi ko'proq ishlatiladi. Qalay va qo'rg'oshin birikmalaridan xloridi, oksidi, sulfidlari va Pb(NO₃)₂, C₂H₅Cl, sanoat ahamiyatiga ega.

Olinishi. GeCl₄ gidrolizlanganda, GeO₂ hosil bo'ladi.



GeO₂ quritiladi va vodorod bilan qaytariladi:



Qalay bilan qo'rg'oshin quyidagi reaksiyalar yordamida olinadi:




Xalq xo'jaligida qo'llaniladigan qalayning anchagina miqdori bo'sh qazilma bankalarini xlor bilan qayta ishlab olinadi.


Xossalari. Germaniy metall yaltiroqligiga ega bo'lgan mo'rt modda. Qalay bilan qo'rg'oshin esa oson suyuqlanuvchan yumshoq metallardir. Germaniy elementlarning II va IV valentli birikmalari mavjud, II valentli birikmalari qaytaruvchi va 4- valentli birikmalari esa oksidlovchi xossaga ega.

siga ega. PbJ_4 va $PbBr_4$ lar mavjud emas. $PbCl_4$ — juda boqir. Qo'rg'oshin va uning dioksididan qo'rg'oshinli akkumulyator tayyorlanadi.


Qalay va qo'rg'oshinning II va IV valentli oksid hamda gidroksidlar amfoter xossaga ega, ya'ni ular ham kislota, ham asos bilan reaksiya kiritishga qodir. Reaksiya tenglamalarining umumiy ko'rinishi quyidagidek:



$Ge(II)$ va $Sn(II)$ qaytaruvchi sifatida:



Xususan, kislotali muhitda $Pb(IV)$ -oksidi kuchli oksidlovchi ega:



Ishlatilishi. Germaniy yarimo'tkazgich material, diodlar, termo-, fotorezistorlarda, linzalar ishlab chiqarishda ishlatiladi. organik birikmalari keng qo'llaniladi.

Qalay ko'pgina qotishmalar latun, bronza, oq tunuka tayyorlashda, badiiy buyumlar, quvurlar tayyorlashda ishlatiladi.

Qo'rg'oshin elektr kabellar tayyorlashda, kimyoviy apparat qoplashda, bosmaxonalarda, akkumulyator sanoatida, pigment tayyorlashda — Pb_3O_4 , xrom sarig'i — $PbCrO_4$, optik shisha, billur tayyorlashda, yarimo'tkazgichlar, yadro texnikasida, PbO , PbO_2 qattiq sanoatida oksidlovchi sifatida ishlatiladi.

Savollar

1. Uglerod va kremniyning elektron tuzilishi asosida o'xshashlik jihatlari taqqoslang.
2. Karbidlar qanday moddalar, ularning turlari va xossalari tushuntirilsin.
3. Karbonat angidridi, is gazining olinishi va xossalari tushuntirilsin.
4. Karbonat va silikat kislotalari, xossalari va dissotsilamishini tushuntirilsin.
5. Silikatlar, eruvchan va erimaydigan silikatlar xossalari tushuntirilsin.
6. Shisha va sementning asosini tashkil etuvchi moddalarning formulalari yozing va xossalari tushuntirilsin.
7. Sementning asosiy turlari va markasining ma'nosini tushuntirilsin.
8. Karbonat kislotasining eruvchan va erimaydigan tuzlari formulalari yozing va xossalari tushuntirilsin.
9. Qo'rg'oshin va qalayning eng ko'p ishlatiladigan birikmalari formulalari yozing va xossalari tushuntirilsin.

XXVII bob

KOMPLEKS BIRIKMALAR

Organiladigan asosiy tushunchalar: kompleks birikmalar, markaziy atom (atom), ligand (addend), dentatlik, ichki sfera, tashqi sfera, koordinatsion son, kompleks birikmalarning nomenklaturasi, valent bog'lanish nazariyasi, komplekslarning barqarorlik doimiysi.

XXVII.1. Kompleks birikmalar haqida tushuncha

Ma'lumki, kimyoviy birikmalar hosil bo'lishida barcha atomlar o'z valentliklariga muvofiq ma'lum sondagi kimyoviy bog'larni hosil qiladi.

Lekin shunday birikmalar borki, ulardagi atomlar valentlik talablariga "bo'ysunmay" donor-akseptor bog' hosil bo'ladi.

Masalan: $PtCl_2 \cdot 2KCl$; $PtCl_4 \cdot 2NH_3$; $CrCl_3 \cdot 6NH_3$; $CuSO_4 \cdot 5H_2O$; $CoCl_2 \cdot 4NH_3$ va hokazo.

Bunday "odatdan tashqari" moddalar o'ziga xos kimyoviy va fizikaviy xossalarga ega bo'lishi, shuningdek, ranglari bilan ham farq qiladilar. Bir element Co — kobalt xlor va NH_3 bilan quyidagi turli rangdagi birikmalarni hosil qiladi:

$CoCl_2 \cdot 6NH_3$ — sarq; $CoCl_2 \cdot 5NH_3$ — to'q-qizil; $CoCl_2 \cdot 4NH_3$ — yashil; $CoCl_2 \cdot 4NH_3$ — binafsha rangli.

O'ziga xos bunday moddalarni *kompleks birikmalar* deyiladi. Kompleks birikma deb, qattiq holatda va eritmalarda mustaqil mavjud bo'la oladigan va tarkibida kompleks ion yoki molekula saqlagan murakkab birikmalarga aytiladi.


Kompleks birikmalar elementlarning asosiy valentligidan tashqari bir nechta valentliklar namoyon qilishi natijasida hosil bo'ladi. Kompleks birikmalarning mavjudligi va ularning hosil bo'lishi to'g'risidagi dastlabki koordinatsion nazariyani A. Verner va S. Yergensen yaratgan. Shuning uchun A. Verner (1913 yilda) kimyo fani sohasida Nobel mukofoti bilan ta'riflangan.

Yuqoridagi olimlarning aniqlashicha, har qanday kompleks birikma markaziy — ion (atom) (M) dan va bir necha ligand-L (addend) dan iborat bo'ladi, ularning soni — n bilan belgilanadi. Umumiy holda kompleks birikmalar $Kat[MeL_n]$, $[MeL_n]_A$ va $[MeL_n]$ formula bilan belgilanadi.

Har bir kompleks hosil qiluvchi ion oksidlanish darajasi (*koordinatsion soni* (k.s.) bilan tavsiflanadi. Markaziy ionning oksidlanish darajasi — shu ionning ayni paytdagi zaryadiga tengdir.

Markaziy ionning *koordinatsion soni* — uning mazkur kompleks birikmada ligandlar bilan hosil qilgan umumiy bog'lanishlar sonidir.

Masalan, $K_2[PtCl_4(NH_3)_2]$ kompleks birikmada Pt — markaziy ionning oksidlanish darajasi +2, koordinatsion soni $4(Cl) + 2(NH_3) = 6$ ga teng. Pt²⁺ ioni 4 ta Cl⁻ ioni va 2 ta NH_3 molekulasini bilan 6 ta kimyoviy bog'lanish hosil qilgan:



Markaziy ion koordinatsion sonining qiymati shu ion radiusi, oksidlanish darajasiga, atom orbitallarining gibrizlanish turiga, ligandlarning tabiati va dentatligiga bog'liq bo'ladi.

Ko'pchilik hollarda oksidlanish darajasi +1 bo'lgan (Ag^+) ionlarning koordinatsion soni 2, oksidlanish darajasi +2 va +3 bo'lgan (Hg^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} , Cr^{3+} , Al^{3+} , Co^{3+} , Ni^{2+} , Ni^{3+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Pt^{2+} , Pd^{2+}) ionlarning koordinatsion soni 4, 5, 6 oksidlanish darajasi +4 va +6 bo'lgan ionlar (Pt^{4+} , Pd^{4+} , Ir^{4+} , Os^{4+} , Ru^{4+} , MoO_4^{2-} , WO_4^{2-}) ning koordinatsion soni 6, 8 va ba'zan 12 gacha etishi mumkin.


Kompleks birikmalarning asosiy tarkibiy qismlaridan biri ligandlar. **Ligandlar** — bular atomlarida bir yoki bir necha (kimyoviy bog'lanishga ishtirok etmagan) elektron jufti bo'lgan manfiy zaryadli ionlar (Cl^- , I^- , F^- , CNS^- , CN^- , OH^- , SO_4^{2-} , NO_2^- , NO_3^- , CO_3^{2-} , S^{2-} , CH_3COO^- , $HCOO^-$) va neytral molekullar (H_2O , NH_3 , CO , NO , C_6H_6 , C_2H_4 , $NH(CH_3)_2$ — dimetilamin, $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$ — etilendiamin, Ph_3P — trifenil fosfin va yana boshqa tarkibida azot, kislorod, oltingugurt atomlari saqlagan ko'pchilik moddalardir. Kompleks birikma hosil bo'lishida bu ion va molekullar markaziy ion bilan ham kovalent (ion) bog'lanish, ham *koordinatsion bog'lanish* hosil qiladilar va markaziy ion koordinatsion sonining ma'lum qismini band qiladilar.

Har bir ligandning markaziy atom koordinatsion sonining qancha (nechta) sini band qila olish xususiyati *dentatligi* deyiladi.

Yuqorida keltirilgan ligandlardan: Cl^- , Br^- , I^- , F^- , CN^- , NO_2^- , NO_3^- , NH_3 , CO , NO , H_2O , $NH(CH_3)_2$ kabi molekula kompleks birikmada markaziy ionning 1 ta koordinatsion sonini band qiladi va *monodentat ligandlar* deyiladi.


SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , $H_2NCH_2CH_2NH_2$, $H_2NCH_2COO^-$ kabi ion va molekullarda ikkita bo'sh valentlik yoki 2 ta va undan ortiq elektronlar jufti bo'lgani uchun bir vaqtda 2 ta koordinatsion joyni band qiladilar, ular *bidentat ligandlar* deyiladi.

Shunday molekullar ham borki, ular tarkibida 2 va undan ortiq donor atomlar bo'lgani uchun ko'p dentatlik namoyon qiladilar. Bunday ligandlarni *polidentat ligandlar* deyiladi. Bunday ligandlarga misollar:





Uch dentatli ligand
(Tridentat)

Polidentat ligandlarni "komplekson" lar ham deyiladi. Shunday kompleksionlarga etilendiamintetrasirka kislotaning ikki natriyli tuzi (Trilon B) ham tegishli bo'lib, uning kompleksi quyidagicha:



To'rt dentatli
(tetridentat) ligand

Ba'zi hollarda bir markaziy ionga koordinatsiyalangan (bog'langan) ligand ayni vaqtda boshqa markaziy ion bilan ham koordinatsiyalanadi. Bunda ligand ikkala ionni bog'lovchi "ko'priq" vazifasini o'taydi. Shu sababli bunday ligandlarni "*ko'priksimon*" ligandlar deyiladi. Ularning dentatligi 2 va undan yuqori bo'ladi:



Diatsetato — μ-diatsetat mis (II)

Yuqoridagi birikmalarda OH, Cl va CH₃COO⁻ ionlari "ko'priks" liganddir. Nomlashda ligand nomiga "o" qo'shimchasi qo'shib ko'priksimon ligandlar oldiga μ- belgisi qo'yilib, keyin aytiladi.

XXVII.2. Kompleks birikmalar nomenklaturasi

Kompleks birikmalarning nomlanishi ma'lum qoida va talab asoslanadi. Ular quyidagicha:

Agar ligand sifatida manfiy zaryadli ionlar bo'lsa, Cl⁻-xloro, Br⁻-brom, I⁻-yodo, F⁻-floro, CN⁻-siano, CH₃COO⁻-atsetato, HCOO⁻-formiato, SO₄²⁻-sulfato, NO₂⁻-nitro, NO₃⁻-nitrato, CO₃²⁻-karbonato holida aytiladi.

Agar ligand H₂O bo'lsa "akva", NH₃ ammin, CO — karbonil, NO — nitrozo deb nomlanadi.

Agar bir xil metall ionlari turli oksidlanish darajasida kompleks birikma hosil bo'lsa, past oksidlanish darajasidagi birikmada shu metall ionlari "II", yuqori oksidlanish darajasida "at" qo'shimchasi qo'shib aytiladi.

Umuman, kompleks birikmalarni nomlashda avval ligand soni (1 ta — "mono" yoki ba'zan soni aytilmaydi, 2 ta — "di", 3 ta — "tri", 4 ta — "tetra", 5 ta — "penta", 6 — "geksa" deb aytiladi va yoziladi) va keyin markaziy ionning nomi va oksidlanish darajasi, oxirida tashqi sferadagi kation yoki anionning nomi aytiladi. Masalan: [Al(H₂O)₆]Cl₃ — tetraammin rux xlorid; [Al(H₂O)₆]Cl₃ — geksaakvaaluminium xlorid; (NH₄)₃[FeF₆] — triammoniy temir (III)-geksafluorid; Fe(CN)₆ — kaliy geksasianoferrit (II) (yoki kaliy geksatsianoferrit); [Co(NO₂)₆] — natriy geksanitrokobaltat (III).

Agar kompleks — ion tarkibiga ligand sifatida bir vaqtda neytral molekula va anionlar kirgan bo'lsa, avval manfiy zaryadli ion soni va nomi, keyin neytral molekula soni va nomi yozilib, oxirida metall ionlari va tashqi sferadagi ion nomi yoziladi. Masalan:

[Zn(NH₃)₄]Cl₂ — tetraammin rux xlorid; [Pt(NH₃)₄Br₂]Cl₂ — nomotetraammin platina (IV)-xlorid; [Cr(H₂O)₃(NH₃)Cl₂]NO₃ — triakvaammin xrom (III)-nitrat;

Na₂K[Co(NO₂)₄(H₂O)₂] — dinatriy kaliy tetranitrodiakvakobaltat (III); Agar ligand sifatida murakkab tarkibli organik moddalar ishlatilsa, ular kompleks birikmalarning nomlanishi ancha murakkab va o'ziga o'xshash bo'ladi.

XXVII.3. Kompleks birikmalarning hosil bo'lishini tushuntiruvchi nazariyalar

Kompleks birikmalarning hosil bo'lishini (aniqrog'i kompleks birikmalarda M—L bog'ining hosil bo'lishini) tushuntiruvchi quyidagi nazariyalar mavjud: valent bog'lanishlar usuli, kristall maydon nazariyasi, molekulyar orbitalar usuli. Bu nazariyalar kompleks birikmalarda M—L bog'lanishining hosil bo'lishi, ularning tuzilishi, spektral va boshqa kimyoviy xossalari tushunib olishda asosiy o'rinni egallaydi.

Ma'lumki, kompleks birikmalar hosil bo'lishi to'g'risidagi dastlabki nazariyalar A. Vernerning bog'lanish nazariyasi bo'lib, uning asosiy qoidalari:

1. Metall ionlari asosiy valentligidan tashqari qo'shimcha valentliklar hosil qilishi mumkin va ularning yig'indisi markaziy ionning koordinatsion soni deyiladi.

— Markaziy ion atrofida barcha ligandlar ma'lum masofada joylashadilar. Bu joylashuv ma'lum geometrik shakl (tetraedrik, oktaedrik, kvadrat piramida va h. k.) ga mos keladi.

— Markaziy ion atrofida ligandlar joylashuvining tartibi har bir kompleks birikmada turlicha bo'lishi mumkin. Bu kompleks birikmalarning ko'pincha quyidagi usuli deyiladi.

Lekin A. Verner nazariyasi nima sababdan ayni bir markaziy ion ba'zan 4 ga, ba'zan 6 ga teng k. s. namoyon etishini va kompleks birikmalar ayrim xossalari tushuntira olmadi. Bu savollarga valent bog'lanish usuli javob beradi.



Valent bog'lanishlar usuli

Kimyoviy bog' hosil bo'lishining kvant-kimyoviy tasavvuri asoslanib, Lyuis kimyoviy bog' elektronlar jufti vositasida hosil bo'ladi. Bunda har bir atom bir (yoki bir nechta) toq elektronini beradi, bu fikrni bildirdi (1916). Bunday bog'lanish *kovalent bog'lanish* deyiladi. Bu nazariyani (1927) Geytler va London kvant mexanik hisoblarini tasdiqlab, bog'lanish spinlari antiparallel yo'nalgan elektronlar jufti ($\uparrow\downarrow$) asosida hosil bo'ladi, degan nazariyani aytdilar. Bu nazariya Poling va Sleter ko'p elektronli atomlar uchun qo'llab, bu nazariya kimyoviy bog'lanishning "*valent bog'lanishlar (VB) usuli*" nomini oldi.

Bu nazariyani L. Poling kompleks birikmalar hosil bo'lishini tushuntirishga qo'lladi. Uning fikricha, har qanday kompleks birikma (elektronlar juftini beruvchi zarrachalar — ligandlar L) va Lyuis kislotasi (bo'sh elektronlar orbitallari bo'lgan metall ionlari — M) ta'sirlanib, bog'lantiruvchi moddalardir. M va L o'rtasida kovalent bog' ($M-L$) hosil bo'ladi. Ligandlar kimyoviy bog'lanishda ishtirok etadigan elektron (taqsimlanmagan) elektron juftini metallning bo'sh elektron orbitallari "uzatadi" (donor-akseptor ta'siri). Metall ionida nechta bo'sh elektron bo'lsa u shuncha elektron juftni qabul qila oladi. Bu orbitallar asosan metallning tashqi elektron orbitallarining o'zaro ta'sirlashishi — (chiziqli gibridlanish) gibridlanishi natijasida hosil bo'ladigan va fazoda yo'nalish va energiyaga ega bo'lgan "gibrid" orbitallardir. Markaziy ionning koordinatsion soni va kompleksning tuzilishi ana shu gibridlanish ishtirok etuvchi (s, p, d) orbitallarning turi va soniga bevosita bog'liq bo'ladi.

Bu nazariyaning isboti sifatida quyidagi komplekslarning hosil bo'lishi ko'rib chiqaylik:


$Ni^{2+} + 4Cl^{-} \rightarrow [NiCl_4]^{2-}$ kompleks ion hosil bo'lishida elektron tuzilishi $3d^8 4s^0 4p^0$ bo'lgan Ni^{2+} ioni 1 ta 4s va 3 ta 4p bo'sh orbitallarining gibridlanishi tufayli hosil bo'lgan 4 ta orbitalga 4 ta Cl^{-} ionining 4 juft elektronini qabul qilib oladi:



Hosil bo'lgan kompleks ionda Ni^{2+} ning gibridlanish turi sp^3 bo'lgani uchun, $[NiCl_4]^{2-}$ ning tuzilishi tetraedrik ko'rinishda bo'ladi. Bog'lanishda ishtirok etmagan 3d — orbitalda 2 ta toq spinli elektronlar bo'lgani uchun $[NiCl_4]^{2-}$ kompleks ioni paramagnit xususiyatga ega bo'ladi.

Co^{3+} ionini NH_3 — molekullari bilan hosil qiladigan kompleksini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Co^{3+} ionining elektron tuzilishi $3d^6 4s^0 4p^0$ ko'rinishda bo'lib, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ kompleksi hosil bo'lishida avval 3d holatdagi 4 ta toq spinli d-elektronlar o'zaro juftlashadi va 2 ta 3d-orbital bo'sh bo'lib qoladi. Bu 2 ta bo'sh 3d-orbital, 1 ta 4s va 3ta 4p orbital (hammasi 6 ta) o'zaro gibridlanib, 6 ta d^2sp^3 -gibrid orbitallarni hosil qiladi.

Bu bo'sh gibridlana oladigan orbitallarga 6 ta NH_3 — molekulasidagi 6 juftdan elektronlar uzatilishi natijasida 6 ta Co-N donor-akseptor bog'i hosil bo'ladi, Co^{3+} atrofida d^2sp^3 gibridlanishga mos ravishda oktaedrik simmetriya shaklida joylashadilar:



$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ da barcha Co-N bog'lari bir xil energiya va uzunlikka ega, molekulaning tuzilishi — oktaedrik. 3d-orbitalda toq spinli elektronlar bo'lgani uchun kompleks diamagnit xossaga ega.

XXVII.4. Kompleks birikmalarning barqarorligi

Kompleks birikmalar turli erituvchilarda eriganda ularning eritmada hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda kompleks birikmalarni sintez qilish eritmada olib boriladi. Kompleks birikmalarning eritmada holati o'ziga xos bo'lib, bu eritmada ular o'zlarini ko'p negizli elektrolitlar singari tutadilar. Ularning eritmada erishi, dissotsilanishi yoki, aksincha, hosil bo'lishi ko'p bosqichli qaytar jarayonlardan iborat bo'ladi.

Umumiy holda eritmada kompleks hosil bo'lishi $M^{m+} + nL \rightleftharpoons [ML_n]^{m-n}$ tenglama bilan ifodalansa, bu reaksiyaga massalar ta'siri qonunini qo'llasak:

$$K_{\text{hosil}} = \frac{[ML_n]^{(m-n)}}{[M^{m+}] \cdot [L^-]^n}$$

K_{hosil} — kompleks hosil bo'lish reaksiyasining muvozanat konstantasi yoki kompleksning barqarorlik doimiysi — K_{bar} deyiladi va ko'pchilik hollarda β — harfi bilan ifodalanadi.

Har qanday kompleksning K_{bar} qiymati qanchalik katta bo'lsa (K_{bar} — qancha kichik bo'lsa) bu kompleks shunchalik barqaror bo'ladi.


Masalan: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ uchun $K_{\text{bar}} = 1 \cdot 10^{-37}$ va $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ uchun $K_{\text{bar}} = 1 \cdot 10^{-12}$ bo'lgan birikmalardan birinchisi barqaror hisoblanadi.

$$K_{\text{bar}} = \frac{[Cu^{2+}] \cdot [NH_3]^4}{[[Cu(NH_3)_4]^{2+}]} = 1 \cdot 10^{-12}$$


$$K_{\text{bar}} = \frac{[Fe^{2+}] [CN^-]^6}{[[Fe(CN)_6]^{4-}]} = 1 \cdot 10^{-37}$$

Kompleks birikmalarning K_{bar} — qiymati kompleks birikmaning tarkibiga, temperaturaga, erituvchining tabiatiga bog'liq bo'lib, kompleksning, metall ionining va ligandning eritmada konsentratsiyasiga bog'liq emas.

Kompleks birikmalar elektrolit moddalar singari eritmada bosqichma-bosqich ionlarga ajraladilar. Kation va anion kompleks birikmalar dissotsilanganda avval tashqi sferadagi ionlarga va ichki sferaga ajraladilar.




Keyingi bosqichda ichki sfera ham bosqichli ajraladi, ya'ni metall ioniga va ligandlarga bo'linib ketadi:



va umumiy holda $[Cu(NH_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons Cu^{2+} + 4NH_3$

Ikkinchi kompleks misolida:



Shu bosqich uchun K_{bar} ifodasi:

$$K_{\text{bar}} = \frac{[[Fe(CN)_5]^{3-}] [CN^-]}{[[Fe(CN)_6]^{4-}]}$$



$$K_{\text{bar}} = \frac{[[Fe(CN)_5]^{3-}] [CN^-]}{[[Fe(CN)_6]^{4-}]} \quad \text{va hokazo.}$$

Shu taqlidda dissotsilanish davom etadi va yakuniy tenglama:



Yuqoridagi tenglamalardan ko'rinib turibdiki, ichki sferaning, ya'ni kompleks ionning dissotsilanishi xuddi kuchsiz elektrolitlarning dissotsilanishi singari qaytar jarayondir. Bu qaytar jarayon o'ziga xos muvozanat konstantasiga ega. Shu muvozanat konstantasi kompleksning beqarorlik doimiysi deyiladi.

Savollar


1. "Kompleks birikma" deganda nimani tushunasiz?
2. Kompleks birikmalarning asosiy tarkibiy qismiga nimalar kiradi?
3. Anion, kation va neytral komplekslarga misollar keltirib, bu iboralarni izohlang.
4. Kompleks birikmalar hosil bo'lishini Verner nazariyasi qanday tushuntiradi?
5. Ligandlar deb nimaga aytiladi, ularning turlarini aniq misollar yordamida izohlang.
6. Ligandlarning dentatligi deganda nimani tushunasiz?
7. Kompleks birikmalarning barqarorligi nimalarga bog'liq?

• Modda molekulasini tarkibiga kirgan atomlar yoki atomlar guruhlarini bir-biriga ta'sir etib turadi. Moddaning fizik-kimyoviy xususiyatlarini shu ta'sirga bog'liq.


• Moddalarning tuzilishini uning xossalari bilan o'rganish bilan amalda mumkin va aksincha.

Organik moddalarning o'ziga xosligi








Ma'lumki, uglerod atomining asosiy holatda elektron tuzilishi bo'lib, kimyoviy bog' hosil qilishda qo'zg'alangan holatga (b) o'tishi 2s² elektronlari toqlashib, 4 ta toq elektronli holat yuzaga keladi. Bu toq elektronlar soni Al, N, B, Be, uglerod atomida qavatdagi orbitalar soniga tengdir.



Har bir toq elektron boshqa uglerod, vodorod, kislorod, azot, oltingugurt, fosfor kabi elementlar atomidagi toq elektronlar bilan juftlashib, sakkiz elektronli, tugallangan barqaror elektron qavat hosil qiladi. Shu bilan birgalikda tashqi qavatdagi 1 ta 2s va 3 ta 2p orbitalarining o'zaro gibrizlanishi natijasida sp³, sp² va sp¹ — gibriz orbitalar hosil qilib, ular ishtirokida barqaror kimyoviy bog'lar hosil qiladi. Moddalarning tuzilishi va xossalari ulardagi uglerod atomlarining gibrizlanish turiga bog'liq bo'ladi:



a) shu sababli organik birikmalarda uglerod atomlari bir-biri bilan birlamchi, ikkilamchi (qo'sh bog') va uchlamchi (uch bog') orqali bir-biri bilan bog'lanib, turli uglerod zanjirlarini hosil qiladilar.




Anorganik moddalarda uglerod singari kislorod, azot atomlari ham shunday zanjirli H—O—O—H va H₂N—NH₂ birikmalar hosil qilsalar-da, ammo ular uzun va tarmoqlangan zanjirlar hosil qila olmaydilar.


b) organik moddalarda uglerod atomlari to'rt valentli bo'lib, uglerod atomlari orasidagi va boshqa elementlar atomlari bilan hosil qilgan bog'larini (E_{C—C} = 355,6 va E_{C—H} = 413,7 kJ/mol) bo'lgani uchun organik moddalarning reaksiyaga kirishish xususiyati anorganik moddalardagiga nisbatan kuchsizroq namoyon bo'ladi.

Organik moddalarning tarkibi va tuzilishi *empirik, tuzilish va elektron formulalari* yordamida ifodalanadi:


Masalan: C₂H₆ — etanning empirik formulasi,



Organik moddalarning tuzilishi formulalari to'liq va qisqa tuzilish formulalari ko'rinishida yoziladi.



Masalan, C_4H_{10} — butan uchun qisqa tuzilish formulalari:



ko'rinishlarga ega bo'ladi. Tuzilish formulalarida elektron formulalar har bir elektron jufti bitta kimyoviy bog' (chiziqcha) ko'rinishida yoziladi.
 b) organik moddalar qizdirilgan ($400-600^\circ C$)da parchalanadi yoki "ko'mirlanadi". Bu jarayon kislorod ishtirokida yonish reaksiyasiga aylanadi. CO_2 va H_2O hosil bo'ladi (agar modda tarkibida boshqa elementlar bo'lsa, ular ham oksidlanadi — azot N_2 sof holda ajralib chiqadi).

d) organik moddalarning o'ziga xos tomoni yana shundaki, uglerod atomlari to'g'ri va tarmoqlangan zanjirlar hosil qilgani uchun ular izomerlar hosil qiladilar. Shu sababli ularning turi va soni anorganik moddalarga nisbatan juda ko'pdir.

Izomeriya hodisasi


Tuzilish nazariyasida e'tirof etilganidek, organik moddalarning xossalari faqatgina ularning tarkibiga bog'liq bo'lmasdan ulardagi atomlarning o'zaro qanday tartibda bog'lanishiga ham bog'liqdir. Buning isboti sifatida C_4H_{10} tarkibiga mos keladigan ikkita moddani ko'rib chiqaylik.

Bu formulaga quyidagi tuzilish formulalari mos keladi:





Ularning tuzilishlari har xilligi sababli, bu moddalar fizikaviy va kimyoviy xossalari bilan o'zaro farq qiladilar.

Masalan: etil spirtida OH — gruppning bo'lishi uning metallar kislotalar, ishqorlar bilan reaksiyaga kirishishiga sabab bo'lib:



Dimetil efiri esa bunday xossalarni namoyon qila olmaydi. Tarkibi bir xil, ammo tuzilishi har xil va shu sababli xossalari bir-biriga farq qiladigan moddalar izomerlar deyiladi. Moddalarning turli tuzilishlar hosil qilishi izomeriya hodisasi deyiladi. Yuqoridagi misolimizda dimetil efirga izomer va aksincha.

Izomeriya hodisasi barcha turdagi organik moddalarda uchraydi. Masalan, to'yingan uglevodorodlardan pentan — C_5H_{12} ni ko'rib chiqsak, uch xil tuzilishdagi moddalar (izomerlar) to'g'ri keladi:



tetrametilmetan (neopentan).

Umuman, organik modda molekulasida uglerod atomlari soni ko'payib borishi bilan ularning hosil qiladigan izomerlari soni ortib boraveradi: C_4H_{10} — butanda 2 ta, C_5H_{12} — pentanda 3 ta, C_6H_{14} — geksanda 5 ta izomer bo'lsa, $C_{10}H_{22}$ — dekanda 75 ta, $C_{20}H_{42}$ — da 36319 ta izomer bo'ladi.

Organik moddalarda faqatgina tuzilish izomeriyasi uchramasdan, izomeriyaning boshqa turlari ham kuzatiladi. Ular qatoriga geometrik (fizikaviy) izomeriya stereoizometriya, konformatsion izomeriya, optik izomeriya va qaytar izomeriya yoki tautomeriya hodisalarini kiritish mumkin. Izomeriyaning bu turlari bilan tegishli mavzularda tanishamiz.

Yuqorida aytilganidek, umuman hozirgacha mavjud bo'lgan organik moddalar soni $2 \cdot 10^4$ dan ortiq. Shu sababli ularni alohida o'rganish qiyinchilik tug'dirgani uchun, bu moddalarni turlarga bo'lib o'rganiladi.

Organik moddalarning funksional gruppalar bo'yicha turlari


Umumiy formulasi	Funksional gruppalar	Organik moddalarning turi
Kislorodli organik moddalar		
$R-OH$	$-OH$ (gidroksil)	Spirtlar: birlamchi, ko'p atomli, aromatik, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi
$R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ (aldegid)	Aldegidlar: to'yingan, to'yinmagan, aromatik
$R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-H$ (karboksil)	Karbon kislotalari: to'yingan, to'yinmagan, aromatik, birlamchi, ko'p atomli
R^1-O-R^2	$-O-$ oddiy efir	Oddiy efirlar
$R^1-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-R^2$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-$	Murakkab efirlar
$R-CO-R$	$=C=O$ (karbonil)	ketonlar
Azotli organik moddalar		
$R-NH_2$	$-NH_2$ (aminogruppa)	Aminobirliklar: birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi
$R-NO_2$	$-NO_2$ nitrogruppa	Nitrobirliklar: mono-, di-, tri-
Aralash funksional gruppali moddalar		
$H_2N-R-COOH$	H_2N- va $-COOH$	Aminokislotalar
$R-CO-NH_2$	$>C=O$ va $-NH_2$	Amidlar
$C_n(H_2O)_m$	$-OH, -C=O, -CHO$	Uglevodlar

XXVIII.2. Organik moddalarning asosiy turlari

Organik moddalarni turlarga ajratishda a) uglerod zanjirining turi va b) funksional gruppalarining turi e'tiborga olinadi.


1. Uglerod zanjirining turiga ko'ra organik moddalar quyidagi asosiy turlarga bo'linadi.

Alifatik birikmalar — tarkibida chiziqsimon yoki tarmoqlangan uglerod zanjiriga ega bo'lgan moddalar. Bu moddalar o'z navbatida: a) to'yingan b) to'yinmagan uglevodlar yoki ularning hosilalaridan iborat bo'ladi:




Karbonsiklik birikmalar — molekulari faqat uglerod atomlaridan iborat bir yoki undan ortiq halqa (sikl)lar saqlagan organik moddalardir. Bu birikmalar:

A. **alissiklik** — (to'yingan yoki to'yinmagan uglerod halqalari saqlangan) birikmalarga:



B. **aromatik** (tarkibida benzol xalqasi tutgan) uglevodlarga bo'linadi:






Geterotsiklik birikmalar — halqa tarkibida uglerod atomlaridan tashqari boshqa (N, O, S, P, As) "begona" (getero) elementlar atomlari saqlangan chiziqsimon tuzilishli organik moddalar:

Bu asosiy uch gruppalar birikmalari o'z tarkibi va funksional gruppalariga ko'ra yana boshqa turlarga bo'linadi.

Biror organik modda turi tarkibiga kirgan va ikki yoki undan ortiq element atomlaridan iborat, o'ziga xos xususiyatli gruppalar funktsional gruppalar deyiladi.


Getero halqali birikmalarga misollar.




XXVIII.3. Organik moddalar ishtirokida ro'y boradigan reaksiyalar

Organik moddalar ishtirokida boradigan reaksiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:



1. Birikish reaksiyalari. Bu reaksiyalarda tarkibida qo'shbo'g' uch bog'i bo'lgan moddalar ishtirok etadi:






Birikish reaksiyalari bir xil molekulalar ishtirokida ham boradi, bunda yuqori molekulyar birikmalar hosil bo'ladi:



2. O'rin olish reaksiyalari. Bu reaksiyalar uglevodorodlar va ularning turli hosilalari va funksional gruppalar saqlagan moddalar ishtirokida sodir bo'ladi:




3. Ajralish reaksiyalari. Bu reaksiyalar uglevodorod va ularning turli hosilalari va funksional gruppalar saqlagan moddalar ishtirokida sodir bo'ladi:



Reaksiyalar ular natijasida hosil bo'ladigan moddalar turiga ko'ra ham xillarga bo'linadi. Bular to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli mavzularda ta'rif bayon etiladi.

4. Reaksiyalar moddalardagi kimyoviy bog'lanishlarning uzilish mexanizmlariga ko'ra ham turlarga bo'linadi. Agar organik modda molekulasi tarkibidagi C—C, C=C, C—H, C—X (X = F, Cl, Br, J) bog'larini hosil qiluvchi elektron juftlari ajralish natijasida hosil bo'ladigan atomlar yoki qutblar o'rtasida barobar taqsimlansa, gomolitik parchalanish deyiladi va radikallar hosil bo'ladi. Bunday reaksiyalar *radikal mexanizmli reaksiyalar* deyiladi.

Ko'pchilik ajralish, polimerlanish, birikish reaksiyalari radikal mexanizmida boradi:




Tarkibida juftlashmagan elektroni bo'lib, juda yuqori reaktivlikka ega bo'lgan, qisqa vaqt ichida mavjud bo'luvchi zarracha ozod radikallar deyiladi. Odatda radikallar H, Cl, CH₃, C₂H₅ yoki R holidan hosil bo'ladi. Radikallar qutbsiz yoki juda kuchsiz qutbli kovalent bog'lanishda yuqori temperatura yoki radiatsiya ta'sirida, uzilishidan hosil bo'ladi.

5. Molekulasida qutbli yoki oson qutblanuvchi bog'lar moddalar (qutbli va yuqori dielektrik singdiruvchanlikka ega erituvchi muhitida) kovalent bog'larni hosil qilgan elektron juftlarining taqsimlanib uzilishi *geterolitik taqsimlanishi* natijasida turli zaryadli ionlar hosil qiladilar. Bu ionlar ishtirokida boruvchi reaksiyalar *mexanizmda boruvchi reaksiyalar* deyiladi. Bunga misol sifatida quyidagi reaksiyalarni ko'rsatish mumkin:





CH_3^+ — metil kationi yoki H_3C^- — metil anioni hosil bo'lishi radikal bilan birikkan atomlarning tabiatiga (elektromanfiy-ligiga) bog'liq bo'ladi.

6. Organik moddalar ishtirok etadigan reaksiyalar qatoriga oksidlanish va qaytarilish reaksiyalari ham kiradi. Umuman, organik moddalarning tarkibidagi uglerod atomlarining oksidlanish darajalari C^{-4} dan C^{+4} gacha bo'lib, ular oksidlovchilar (asosan kislorod atomlari) ta'sirida oksidlanib, CO va CO_2 hosil qilsalar, vodorod atomlari suv hosil qiladi. Organik moddalarning bevosita kislorod ta'sirida bo'ladigan oksidlanish reaksiyalarida katta issiqlik va yorug'lik energiyalarining chiqishi "yonish reaksiyasi" deyiladi.



Shu bilan birgalikda "sekinlik" bilan boradigan oksidlanish reaksiyalari ham borki, ular natijasida organik moddalarning bir turdan boshqariga o'tishi kuzatiladi:





sirka aldegidi

sirka kislotasi



7. Qaytarilish reaksiyalarida molekula tarkibidagi uglerod atomlarining oksidlanish darajasi kamayadi. Bu asosan vodorod bilan birikishi natijasida sodir bo'ladi. Bunday reaksiyalar tufayli uglerodlar spirtlarga to'yinmagan uglevodorodlar to'yingan uglevodorodlarga aylanadi va hokazo:



XXIX bob UGLEVODORODLAR

Tarkibi faqat uglerod va vodorod elementlarining atomlaridan iborat organik birikmalar uglevodorodlar deyiladi.

Uglevodorodlar alifatik birikmalar qatori (to'yingan, to'yinmagan), siklik birikma (sikloparafinlar) va aromatik uglevodorodlarga bo'linadi.

XXIX.1. To'yingan uglevodorodlar

Bu moddalarning reaksiyaga kirishish xususiyati ancha past bo'lgani uchun ularni parafinlar yoki xalqaro nomlashga ko'ra alkanlar ham deyiladi.

Gomologik qatori. Tuzilishi va xossalari bilan bir-biriga o'xshash bir-biridan bir yoki bir necha CH_2 — gruppaga farq qiladigan organik moddalar gomologlar deb aytiladi. CH_2 — gruppaga gomologik gomolog moddalar esa gomologik qator deyiladi.

Molekulasidagi uglerod atomlari o'zaro birlamchi bog'lar bilan bog'lanib, qolgan valentliklari vodorod atomlari bilan to'yingan uglevodorodlar to'yingan uglevodorodlar deyiladi.

To'yingan uglevodorodlarning gomologik qatoriga kiruvchi moddalarning tarkibi $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ umumiy formulaga to'g'ri kelib, ularning xossalari va ularga mos kelgan radikallar 13-jadvalda keltirilgan.

Qatorning birinchi moddasi metan bo'lgani uchun bu qatorni *metanning gomologik qatori* deb ham yuritiladi.

Bu qator moddalar tarkibidan bir (ikki uch) vodorod atomi olinishi natijasida bir (ikki, uch) valentli radikallar hosil bo'ladi. Radikallar nomi va formulalari jadvalda keltirilgan.

Metan gomologik qatorining xossalari

Formulasi	Nomi	Agregat holati	$t_{\text{q}}^{\circ}\text{C}$	Radikali	Nomi
CH_4	Metan	Gaz	-162	$\text{CH}_3\cdot$	Metil
C_2H_6	Etan	Gaz	-89	$\text{C}_2\text{H}_5\cdot$	Etil
C_3H_8	Propan	Gaz	-42	$\text{C}_3\text{H}_7\cdot$	Propil
C_4H_{10}	Butan	Gaz	-0,5	$\text{C}_4\text{H}_9\cdot$	Butil
C_5H_{12}	Pentan	Suyuq	36	$\text{C}_5\text{H}_{11}\cdot$	Pentil
C_6H_{14}	Geksan	Suyuq	69	$\text{C}_6\text{H}_{13}\cdot$	Geksil
C_7H_{16}	Geptan	Suyuq	98	$\text{C}_7\text{H}_{15}\cdot$	Geptil
C_8H_{18}	Oktan	Suyuq	126	$\text{C}_8\text{H}_{17}\cdot$	Oktil
C_9H_{20}	Nonan	Suyuq	151	$\text{C}_9\text{H}_{19}\cdot$	Nonil
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	Dekan	Suyuq	174	$\text{C}_{10}\text{H}_{21}\cdot$	Dezil

Radikallarni nomlashda to'yingan uglevodorod nomidagi qo'shimchasi — "i" qo'shimchasiga almashtiriladi. Masalan,



Ikkita vodorod atomi chiqarib yuborilishi natijasida hosil bo'lgan ikki valentli radikal $\bullet\text{CH}_2\bullet$ bo'lsa, — "ilen" qo'shimchasi qo'shib *metilen radikali* deyiladi.

Uchta vodorod chiqib ketishidan hosil bo'lgan uch valentli radikal — "an" o'rniga — "in" qo'shib $\cdot\text{CH}\cdot$ — *metin* deb aytiladi.

Propan C_3H_8 ning izomerlari yo'q. Lekin bu molekuladan bir vodorod chiqib ketsa C_3H_7 — propil radikali hosil bo'ladi. Bu radikallarning nomi va formulalari jadvalda keltirilgan.

Agar vodorod atomi 1- yoki 3- o'rinidan ajralsa chiziqli tuzilishli

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\cdot$ n-propil radikali, agar 2-uglerod atomidan ajralsa,

qo'shilgan tuzilishli

$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\cdot$ izo-propil radikali hosil bo'ladi. Shuning uchun

ularning izomerlari soni uglevodorod izomerlari sonidan ko'p bo'ladi.

Nomenklaturasi. To'yingan uglevodorodlarni nomlashda asosan, trivial, sistematik IYuPAK nomenklaturalardan foydalaniladi. Nomenklaturaning asosiy vazifasi moddaning individual ekanligini e'tirof qilish.

Uning tuzilish formulasini to'g'ri yozish yoki yozilgan formulasi ularni nomlash ko'nikmalarini hosil qilishdan iboratdir.

To'yingan uglevodorodlarning gomologik qatoridagi dastlabki to'rtta modda **metan, etan, propan, butan** trivial tarixiy nomga ega. Gomologik qatorning boshqa a'zolarini nomlashda molekula tarkibidagi uglerod atomi soni ko'rsatib beriladi.

Uning grekcha nomi asos qilib olingan. Ularda n = 5 bo'lsa, nomenklaturada 6 — *gek*sa, 7 — *gept*a, 8 — *ok*ta, 9 — *non*a, 10 — *deka* so'zlariga qo'shimchasi qo'shib uglerod nomi hosil qilinadi. Shunga asosan

5 — pentan, C_6H_{14} — geksan, C_7H_{16} — geptan, $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ — dekan va boshqalar. Bunday nomlash "normal" tuzilishdagi hamda "izo" tuzilishdagi uglevodorodlarga taalluqli bo'lib, to'g'ri zanjirli uglevodorod nomi oldiga

(normal), tarmoqlangan zanjirli uglevodorod nomiga "izo" — old qo'shimchasi qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.


Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.




Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.

Agar bir xil radikallar ikki, uch, to'rttadan bo'lsa, ular "di", "tri" va "tetra" qo'shimchalari qo'shib aytiladi.



metiketilpropil metan



Bu nomenklaturani murakkab tuzilishli uglevodorodlarni nomlashda qo'llab bo'lmaydi, chunki nomukammaldir.

Sistematik (IYuPAK) nomenklatura. Bu nomenklatura eng keng tarqalgan organik moddalardan boshlab murakkab tuzilishli birikmalarni nomlashgacha qo'llaniladi, hozirgi vaqtda asosan shu nomenklatura ishlatiladi.


Sistematik nomenklatura bo'yicha uglevodorodlar nomlanishi har bir uglevodorodni to'g'ri (asosiy) zanjirdagi bir yoki bir necha uglerod atomlari o'rniga turli radikallar birikishidan hosil bo'lgan moddalarni ko'rsatib beradi.

- Asosiy zanjir sifatida eng ko'p uglerod atomlari saqlangan zanjir tanlanib, uglerod atomlarini raqamlash tarmoqlanish yaqin bo'lgan tomon (chap yoki o'ng)dan boshlanadi.


— Uglevodorodning nomini keltirib chiqarishda, avvalo, eng katta radikal, keyin katta radikallar turgan uglerod atomlari raqamlari ko'rsatib beriladi. Agar shu atomga bu radikaldan ikkita birikkan bo'lsa shu atom raqamini ikki marta vergul bilan takrorlanadi.

— Shundan so'ng radikal(lar)ning nomi aytiladi. Bir xil radikal ikki marta takrorlansa "di", uch marta — "tri", to'rt marta takrorlansa "tetra" qo'shimchalari qo'shiladi.


— Oxirida asosiy zanjirga to'g'ri keluvchi uglevodorod nomi aytiladi. Yuqoridagi aytilganlarga amal qilgan holda quyidagi moddalarni nomlash keltiramiz:



2-metil propan (izobutan)



3,3,4-trimetil,4-etil heptan



2,4-dimetil — 4-etil — 3-izopropilgeksan

Metan va gomologlarining olinishi



Metan va uning gomologlari tabiiy manbalardan yoki sun'iy usullar bilan olinadi. To'yingan uglevodorodlarning asosiy tabiiy manbalariga toshko'mir, tabiiy va yo'ldosh gazlar kiradi. Ularni tabiiy manbalardan sof holda ajratib olishda asosan haydash va rektifikatsiya usullari foydalaniladi.

To'yingan uglevodorodlarni sanoat miqyosida va laboratoriya miqyosida uchun quyidagi sintez usullaridan foydalaniladi:

1. Uglerod bilan vodorodni bevosita biriktirib olish. Bunda uglerod vodorodni kukun holatidagi nikel katalizatori ishtirokida 500°C da qizdirilsa metan hosil bo'ladi:




2. Uglerod (II)-oksid nikel yoki kobalt katalizatorlari bilan vodorod bilan qaytarilsa, turli to'yingan uglevodorodlar aralash bo'ladi.





Hosil bo'lgan uglevodorodlar aralashmasi organik sintez uchun xomashyo vazifasini o'taydi.

3. To'yinmagan uglevodorodlarga katalizatorlar ishtirokida biriktirib, $n \geq 2$ ta uglerod atomlari saqlangan alkanlar olinadi.




bunday reaksiyalarni *gidrogenlash reaksiyalari* deyiladi.

4. Monogalogenli hosilalarga natriy metalini ta'sir ettirsak, nisbatan ko'p C — atomlari tutgan alkanlar hosil bo'ladi (Vyur).





Agar ikkita galogenli hosila tarkibidagi uglerod atomlari soni bo'lsa, reaksiya natijasida uch xil alkan aralashmasi hosil bo'ladi.



bo'lgan reaksiya mahsulotlarini individual ravishda bir-biridan ajratishning amaliy qiyinligi bu usulning eng asosiy kamchiliklaridan biri.

Alkanlarning turli hosilalarini yuqori temperaturada vodorod yodid bilan qaytarib, metan va uning gomologlari olinadi (Bertlo reaksiyasi):




Karbon kislotalarning quruq tuzlari quruq holdagi o'yuvchi — ohak bilan aralashtirib qizdirilsa, dekarboksillanish hisobiga birikib olingan karbon kislota tuziga nisbatan tarkibida *bir atom uglerod* bo'lgan alkan hosil bo'ladi:



Metanni laboratoriyada olish shu reaksiyaga asoslangan.

Metallarning uglerodli birikmalari — Al_4C_3 alyuminiy metanidni laboratoriya sharoitida metan olinadi:



Fizik xossalari. To'yingan uglevodorodlarning fizik xossalari ularning tuzilishiga bog'liq. 30-jadvaldan ko'rinib turibdiki, to'yingan uglevodorodlarning gomologik qatorida $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ uglerod atomlarining soni ortishi bilan ularning fizikaviy xossalari ham o'zgaradi, ya'ni $n = 1$ — gazsimon, $n = 5 - 16$ gacha suyuq, $n > 16$ dan boshlab qattiq moddalardir.

Bu o'zaro bog'liqlik miqdor o'zgarishining sifat o'zgarishlariga o'tishi tabiiy dialektikasi qonunining yorqin dalilidir.

Bu molekuladagi (a) — bilan belgilangan CH_3 lardagi C atomi — birlamchi; (b) bilan belgilangan CH_2 — dagi C atomi — ikkilamchi; (c) bilan belgilangan CH — dagi C atomi — uchlamchi; (r) bilan belgilangan C atomi — to'rtlamchi uglerod atomlaridir.

To'yingan uglevodorodlardagi turli uglerod atomlari bilan bog'langan H atomlarining reaksiyaga kirishish qobiliyati bir-biridan farq qilib



qatorda ortib boradi. Chunki shu qatorda C—H bog'ining energiya

$$423 > 402 > 394 > 373 \text{ kJ/mol}$$

tartibda kamayib boradi. Uglevodorod molekulalaridagi uglerod atomlarining valentliklari to'la to'yinganligi sababli, ular birikish reaksiyalarida mutlaqo kirishmaydilar. Shu sababli aksariyat kimyoviy agressiv reagentlar (H_2SO_4 , ishqorlar, HCl , HBr) alkanlarga ta'sir etmaydi.

To'yingan uglevodorodlar uchun almashinish, oksidlanish va reduksiya reaksiyalari xosdir.

Almashinish reaksiyalari.


1. *Galogenlash*. Galogenlar yorug'lik nuri ta'sirida to'yingan uglevodorodlardagi vodorod atomlari bilan birin-ketin o'rin almashtirib, galogenlarning elektromanfiyliklariga bog'liq holda birinchi reaksiyaga juda tez portlab, xlor va brom bilan ancha oson, yod bilan esa reaksiyaga qiyin kirishadi.

Shu bilan birga reaksiyaning ekzotermikligi darajasi ham ortib borib o'tiradi. $\Delta H < 0$ bo'lishi $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ tenglamasidagi ΔS ning reaksiya natijasida kuchli darajada kamayishini ta'minlaydi.



Almashinish reaksiyasi bosqichli borib, alkanlarning turli galogen hosilalari aralashmasi va vodorod xlorid ajralib chiqishi bilan davomlaydi. Bu reaksiyani metanga xlorning ta'siri misolida ko'rib chiqamiz.



a) *Degidrogenlash*. To'yingan uglevodorodlar katalizatorlar qizdirilsa, bir molekula vodorod ajralib chiqishi sababli to'yingan uglevodorodlar hosil bo'ladi. Vodorod ajralib chiqishi bilan reaksiyalar degidrogenlash reaksiyasi deyiladi.



Metanni degidrogenlash reaksiyalari yuqori temperaturada kirmagan sharoitda olib boriladi. Bunda metan vodorodlarni yoki to'liq chiqarib yuboradi:



Bu reaksiyalar metanning *pirolizi* deyiladi. *Piroliz moddalarini* sharoitda qizdirib parchalash jarayonlaridir. Kreking.


b) *Yuqori temperaturaning ta'siri*. Yuqori molekuli to'yingan uglevodorodlar 450–550°C atrofida qizdirilsa, ularning yirik molekullari "kichik bo'laklar"ga bo'linadi. Bu jarayon *kreking*. Kreking jarayonida bir vaqtda C–C va C–H bog'lari uzilgani kreking natijasida kichik molekulyar massali to'yingan va to'yingan uglevodorodlar hosil bo'ladi:



Uglevodorodlarni krekinglashdan hosil bo'lgan moddalar sanoatida xomashyo va yonilg'i sifatida ishlatiladi.

Oksidlanish reaksiyalari. A. Kuchli oksidlovchilar yuqori temperaturada alkanlarga asta-sekin ta'sir qiladi. Bunda molekullarni bir qismida uglerod atomlari o'rtasidagi bog' uziladi, hosil bo'lgan alkanlarning oksidlanishi natijasida turli xil organik moddalar hosil bo'ladi.


Masalan, metan havo kislorodi bilan 400–600°C da oksidlanganda metanali aldegid hosil bo'ladi:



Oksidlanish va yonish reaksiyalarini bir-biridan farqlash uchun oksidlanish reaksiyalarida kislorod [O] va yonish reaksiyalarida [O₂] holida bo'ladi.

1. Qattiq uglevodorodlar 100°C atrofida kislorod bilan oksidlanishi natijasida ochiq zanjirli organik kislotalar hosil bo'ladi. Bu usulda olingan organik yog' kislotalaridan asosan sovun ishlab chiqarishda foydalaniladi.

D. To'yingan uglevodorodlar havodagi kislorod qatnashuvida barcha organik moddalar singari yonib, CO₂ va H₂O hosil qiladi va ko'p miqdorda energiya ajraladi. Kundalik hayotimizda ishlatiladigan metan gazining yonish shunday reaksiyalarga misol bo'la oladi:



Shu sababli to'yingan uglevodorodlardan issiqlik energiyasi (yonilg'i) manbai sifatida foydalaniladi.

XXIX.2. Yopiq halqali alkanlar

To'yingan uglevodorodlarning to'g'ri va tarmoqlangan zanjirli alkanlardan tashqari, uglerod atomlarining o'zaro birikishi tufayli turli shakllarda hosil qilgan turlari — *sikloalkanlar* ham mavjud.





Tarkibi vodorod va faqat uglerod atomlaridan iborat halqasimon tuzilgan to'yingan uglevodorodlar *sikloalkanlar* deyiladi.

Sikloalkanlar, asiklik (ochiq zanjirli) alkanlardan ikki atom vodorodi kamligi bilan farqlanib, ularning tarkibida eng kamida uchta uglerod atomlari bo'ladi. Sikloalkanlar gomologik qatorining umumiy formulasi C_nH_{2n} bo'lib (n ≥ 3), gomologik qatorning eng birinchi vakili C₃H₆ — siklopropan bo'ladi.

Agar sikloalkanlarning tarkibiga e'tibor berilsa, ular asosan ikki va uch atomli metilen (–CH₂–) radikallarining o'zaro birikishidan hosil bo'lgan alkanlarga o'xshaydi. Shu sababli

ularni *polimetilenlar* deyiladi. Bundan tashqari ularni sikloparafinlar, siklanlar ham deb nomlanadi.

Sikloalkanlarning molekularida uch-, to'rt-, besh-, olti-, undan ko'p a'zoli halqalar bo'ladi. Ularning barqarorligi uch a'zoli a'zolitigacha ortib borib, 7 a'zolidan boshlab yana kamayib ketadi.




Sikloalkanlar tarkibidagi uglerod atomlari valent elektronlari sp^3 -gibridlangan bo'lib, halqa va halqadan tashqaridagi bog'lar bog'lanishdir. $r_{C-C} = 0,154$ nm. Lekin, bog'lar orasidagi burchak 109° kichikroq bo'ladi.

Izomeriyasi. Sikloalkanlarning izomeriyasi halqaning o'lchamidan tashqari (yonaki zanjir)dagi radikallar turiga bog'liq. Siklopropaning siklik izomeri yo'q, lekin uning tarkibiga kiruvchi to'yinmagan uglevodorodlar qatoridagi propilen to'g'ri kelgani uchun o'zaro izomer sifatida qabul qilish mumkin.



a) *halqa izomeriyasi* — bu bir xil tarkibga to'g'ri keluvchi o'lchamdagi halqalar saqlagan moddalar izomeriyasi.

Siklobutanning 2 xil siqiy (halqa) izomeri bor.




Metilsiklopropan


halqa va unga birikkan yonaki zanjir (o'rinsosar) izomeriyasi:




metil siklobutan



1, 2 — dimetil siklopropan




1, 1 — dimetil siklopropan




etil siklopropan

d) *yonaki zanjirda sikloalkanlarda* halqadagi C—C bog'i atrofida halqani aylantiruvchi guruhlarning erkin aylanish imkoniyati yo'q. Shu sababli o'rinsosarlar turli holatda joylashib qolishi sababli sikloalkanlarda cis- va trans (geometrik) izomeriya hodisasi ro'y beradi. Buni 1, 2-dimetilsiklopropan misolida ko'ramiz:



sis-izomer



trans-izomer

Nomenklaturasi. Tarixiy nomenklaturaga ko'ra tegishli alkan nomi oldiga "siklo" so'zi qo'shib aytiladi. Sistematiq nomenklaturaga binoan yonaki zanjir sifatida eng ko'p uglerod atomi saqlagan halqa tanlanib, bu halqaning tarmoqlangan uglerod atomi sanoq boshi sifatida qabul qilinadi. Tarmoqlangan uglerod atomi raqami, keyin eng kichik radikal (yonaki zanjir)ning nomi aytilib, oxirida halqaga to'g'ri keluvchi sikloalkan nomi aytiladi.




Buning isboti sifatida yuqoridagi siklobutan va izomerlar nomlanishi keltiriladi.


Olinishi. Sikloalkanlar tabiatda asosan neft tarkibida uchraydi va mahsulotlaridan haydash usuli bilan ajratib olinadi.

Sun'iy usulda quyidagi reaksiyalar natijasida olinadi:


a) to'yingan uglevodorodlarni degidrogenlab, siklik birikma aylantirish;



b) to'yingan uglevodorodlarning birinchi va oxirgi uglerod atomlari galogenlar tutgan hosilalarini Na yoki Zn metali bilan degalogenatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi:



d) olti a'zoli sikloalkanlar benzol va uning gomologlarini gidrogenatsiya olinadi:




Fizikaviy xossalari. Sikloalkanlarning fizik xossalari alkanlarning xossalari o'xshaydi. Sikloalkanlar suvda, kislota va ishqorlarda erimaydi, ularning zichliklari suvnikidan kichik.


Kimyoviy xossalari. Sikloalkanlar kimyoviy xossalari bilan ham alkanlarga o'xshash. Ular ko'pchilik reagentlar ta'siriga chidamli, asosan allaqancha xos reaksiyalarga kirishadi. Ammo sikloalkanlarning dastlabki ikki a'zoli

va siklobutan kimyoviy xossalari jihatidan, to'yingan alifatik uglevodorodlarga o'xshaydi.

1) siklopropan va siklobutanga galogenlar ta'sir ettirilganda, halqalari uzilib, uglerodlarning bo'sh qolgan bog'lariga galogen atomlari birikadi va ochiq zanjirli birikma hosil bo'ladi:




2) siklopropaning gomologlariga vodorod galogenid ta'sir ettirilganda, halqalari uzilib, uglerodlarning bo'sh valentliklariga vodorod va galogen atomlari birikadi va ochiq zanjirli birikma hosil bo'ladi:




A. Bayerning (1885 y.) halqalar o'ta "tarang"ligi nazariyasiga ko'ra, siklopropaning birikish reaksiyalariga kirishishiga sabab, undagi 3 a'zoli halqaning "tarang"ligidir, ya'ni oson ochilib ketishga moyilligidir.


3) siklopentan va undan yuqori sikloalkanlarga galogenlar ta'sir ettirilganda, ulardagi halqa nisbiy barqarorligi tufayli uzilmaydi, balki vodorod atomi galogenga almashinadi:



4) siklopentan va undan yuqori sikloalkanlar vodorod galogenid bilan reaksiyaga kirishmaydi, chunki halqa barqaror bo'lganligi sababli ochilib ketmaydi. Uch, to'rt va besh a'zoli sikloalkanlar — katalizatorlar ishtirokida degidrogenlanganda halqalari uzilib, tegishli alkanlar hosil bo'ladi:



5) sikloalkanlar oksidlovchilar ta'sirida oksidlanish reaksiyasini kirishadi. Buning natijasida halqa uzilib, molekulasidagi uglerod atomlari oksidlangan sikloalkandagi uglerod atomlari soniga teng bo'lgan ikki asosli kislotalar hosil bo'ladi:



6) siklogeksan yuqori temperaturada katalizator ishtirokida degidrogenlanib, benzolga aylanadi. Bu reaksiya xalq xo'jaligida ahamiyatga ega bo'lgan neftni aromatlash — riforming jarayonini tashkil etadi:



XXIX.3. To'yinmagan uglevodorodlar

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: alkenlar (etilen), alkinlar (atsetilen), Markovnikov qoidasi, Kucherov reaksiyasi, alkadiyen (butadiyen, izopren), sintetik va tabiiy kauchuklar, rezina.

Tarkibida C va H atomlari saqlab bir yoki bir necha qo'shbog' saqlagan organik moddalar to'yinmagan uglevodorodlar deb ataladi. To'yinmagan uglevodorodlar: alkenlar (molekulasida bitta qo'shbog' bor), alkadiyen (diyen uglevodorodlar) lar (molekulasida ikkita qo'shbog' bor) va alkin (molekulasida uchbog'i bor) larga bo'linadi. To'yinmagan uglevodorodlarning o'ziga xosligi ular molekulasida qo'shbog'lar borligi bilan izohlanadi.

Alkenlar

Molekulasida bitta qo'shbog' bo'lgan etilen qatori uglevodorodlari alkenlar yoki **olefinlar** deyiladi. Alkenlarning gomologik qatori C_nH_{2n} umumiy formulaga ega bo'lib, birinchi vakili etilendir.

Etilen. Etilen molekulasining tuzilishi. To'yingan uglevodorodlarda C va C—H bog'lari hosil bo'lishida qo'zg'algan uglerod atomi ($1s^2 2s^2 2p^2$) dagi 2s va 2p orbitallarning 4 talasi ham gibridlanishda ishtirok etishini ko'rgan edik. Shunday holatlar ham bo'ladi, uglerod atomidagi 3 ta 2p-orbitallarning hammasi ham gibridlanishda ishtirok etadi. Aniqroq qilib aytganda 1 ta 2s- va 2 ta 2p (p_x, p_y) orbitallardan 3 ta sp^2 — gibrid orbitallar hosil bo'ladi va 1 ta 2p, — orbital gibridlanishda qoladi (31-rasm).


Etilen molekulasi hosil bo'lishida ikkala C-atomining tekislikda joylashgan 1 tadan sp^2 — gibrid orbitalari o'zaro qoplanib, C—C σ bog'i yuzaga keladi. Qolgan 2 ta sp^2 — orbitalar H-atomlarining s-orbitallari bilan 2 tadan C—H bog'larini hosil qiladilar. C—H bog' hosil bo'lishi bilan bir vaqtda C atomlaridagi gibridlanmagan 2p, orbitalar o'zaro juda qisqa masofada turganliklari uchun bir-birlarini σ -bog'lar tekisligiga nisbatan perpendikulyar tekislik bo'yicha qoplaydilar. Ikkinchi C—C bog' — π - bog'ni hosil qiladilar (32-rasm).

Shu tariqa to'yinmagan uglevodorodlarda qo'shbog' hosil bo'lib, uning uzunligi $r = 1,34 \text{ \AA} = 0,134 \text{ nm}$ ga tengdir. σ -bog'ga nisbatan ($E_{\sigma} = 350 \text{ kJ/mol}$) π -bog'i kuchsizroq ($E_{\pi} = 257 \text{ kJ/mol}$) bo'lib, kimyoviy reaksiyalar vaqtida ancha oson uziladi va shu sababli to'yinmagan uglevodorodlarning reaksiyaga kirishish qobiliyati to'yinganlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi.


Sistematik nomenklaturaga (IYuPAK) ko'ra alkenlarni nomlashda alkenning nomi tegishli to'yingan uglevodorodlar nomidagi — “an” qo'shimchasini — “en” qo'shimchaga almashtirish orqali hosil qilinadi. Qo'shbog' tutgan eng uzun uglerod zanjiri asosiy zanjir deb olinadi. Uglerod atomlarini raqamlash zanjirning qo'shbog' eng yaqin turgan uchidan boshlanadi.

Agar zanjir tarmoqlangan bo'lsa, raqamlash zanjirning tarmoqlangan uchidan yaqin qismidan yoki qo'shbog'ga qaysi o'rinbosar yaqin turgan uchidan boshlanadi.


Umuman, bu moddalar nomini keltirib chiqarishda avval tarmoqlangan C-atomi raqam (lar)i, radikal(lar) nomi, asosiy zanjirga keluvchi alken nomi va oxirida qo'shbog' turgan uglerod atomi soni ko'rsatiladi.



3-metilbuten-1 (izo-penten-1)










3-metilpenten-2 (izo-geksen-2)




4-metil-4-izopropilgeksen-1

Alkenlar molekularidagi bir atom vodorod chiqib ketsa, radikal hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan radikallar uglevodorod nomiga — "il" qo'shib aytiladi. Radikal bo'sh valentlikka ega bo'lgan uglerod atomi boshlab raqamlanadi. Masalan:

31-rasm. sp^3 -gibrid orbitallarning hosil bo'lishi.

32-rasm. Etilen molekulasida p-va s- bog'larning hosil bo'lishi (a) va ularning fazoviy joylashuvi (b)

Izomeriyasi. Alkenlarda o'rinbosar (tuzilish) izomeriyasi, qo'shbo'g' izomeriyasi va geometrik izomeriyalar uchraydi. Alkenlarning dastlabki a'zosining — etilen va propilenning izomerlari yo'q, lekin propenil a'zoning 2 ta izomeri mavjud (yuqoriga qarang). Butilen quyidagi izomerga ega:




2-metilpropen-1


1 va 2 - o'zaro tuzilish izomerlari. 1 va 3- o'zaro qo'shbog' izomerlari. Pentenning 5 ta, geksenning 13 ta, nonenning 154 ta izomeri.

Geometrik izomeriya haqida tushuncha. Alkenlarda alkanlardagidek ravishda uglerod-uglerod qo'shbog'i atrofida molekula bo'laklarining erkin a' harakati ro'y berishi juda qiyin, u amalga oshmaydi. Shuning uchun atomlari va radikallar (funktional gruppalar) qo'shbog' atrofida har bir holatlarda joylashadilar. Natijada qo'shbog' tekisligiga nisbatan yonali o'rinbosarlarning bir tomonlama (sis-) va ikki tomonlama (trans-) joylashgan izomerlari hosil bo'ladi. Bunday izomeriyani *geometrik izomeriya* deyiladi. *trans* izomeriyasini 2-buten misolida quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Geometrik izomeriya quyidagi moddalarda ham uchraydi:



$\text{ClHC}=\text{CHCl}$ 1,2-dixlor-etilen



$\text{ClCH}=\text{CHNO}_2$ — 1-xlor-2-nitroeten uchun ham geometrik izomer yozish mumkin:




Sis-izomerida bir xil tabiatli o'rinbosarlar fazoda o'zaro yaqin joylashganligi uchun ular orasida itarilish kuchlari tufayli molekula energiyasi yuqoriroq, molekulalararo tortishish kuchi kamroq bo'ladi. Shu sababli, trans-izomerlar sis-izomerlarga nisbatan barqarordir. Sis-izomerlar fizikaviy va kimyoviy xossalari bilan bir-biridan farq qiladi.


Etilen va uning gomologlarini olinishi

Alkenlar tabiiy va yo'ldosh gazlar, neft va neftni qayta ishlashda olinib chiqadigan gazlar tarkibida bo'ladi va ulardan sanoat miqyosida olinadi. Ularni, shuningdek, quyidagi sintetik usullar bilan ham olish mumkin.


1. *Uglevodorodlarning galogenli hosilalaridan galogenovodorodni ajratish (degidrogalogenlash).* Galogenli hosilaga ishqorning absolyut eritmasi ta'sir ettirilganda vodorod galogenid ajralib, alkenlar hosil bo'ladi:




2. *Digalogenli birikmalarni degalogenlash*
Digalogenli birikmalarga rux yoki magniy kukuni ta'sir ettirilganda alkenlar ajralib chiqib, alkenlar hosil bo'ladi:



3. *Spirtlarni degidratlash*: a) spirtlarga oddiy sharoitda sulfat kislotasi ta'sir ettirilganda dastlab sulfat kislotasi efiri, so'ngra to'yingan uglevodorod hosil bo'ladi:





b) spirtlar 300—400°C da alyuminiy oksidi ustidan o'tkazilganida hosil bo'ladi. Bu reaksiyalarda, Zaysev qoidasiga ko'ra, vodorod OH—gruppasiga yaqin, lekin vodorod atomlari kam uglerod atomlari ajraladi:



4. To'yingan uglevodorodlarni degidrogenlash.

Alkanlarni gaz yoki bug' holida 300—400°C da qizdirilib, Ni xrom oksidi ishtirokida katalitik degidrogenlanish natijasida etilen boshqa alkenlar hosil bo'ladi. (Bunda: H—atomlari kam vodorod soni C-atomlaridan ajraladi):



5. To'yingan uglevodorodlarni krekingsh.

To'yingan uglevodorodlar, masalan, n-butan 500°C da krekingshda uglerod-uglerod bog'i uziladi va radikallardagi vodorod atomlari ajralib, alkan hamda alkenlar aralashmasi hosil bo'ladi:



Assetilen uglevodorodlarini katalizatorlar yordamida gidrogenlash. Assetilen qatori uglevodorodlari platina va palladiy katalizatorlari ishtirokida gidrogenlanib, alkenlarni hosil qiladi:





Fizik xossalari. Alkenlarning fizik xossalari to'yingan uglevodorodlar xossalari o'xshash. Alkenlar gomologik qatorining dastlabki uch vakili ($\text{C}_2\text{—C}_3$) gaz, C_4 dan C_{11} gacha bo'lganlari suyuqlik, C_{12} va undan yuqorilari esa qattiq moddalardir.

Gomologik qatorning birinchi vakili **etilen** — rangsiz shirinroq ta'mli, suyuq engil gaz suvda kam eriydi. Alkenlarning molekulyar massasi ortishi bilan qaynash temperaturasi va zichligi oshib boradi. Alkenlarning chiziqli va tarmoqli — hosilalari tarmoqlangan hosilalariga nisbatan, *sis-izomerlari* — *trans-izomerlariga* nisbatan yuqori temperaturada qaynaydi. Alkenlarning yuqori molekulyar massaga ega bo'lganlari suvda erimaydi, organik erituvchilarda (metil spirtidan tashqari) yaxshi eriydi.

Alkenlarning barchasi yaxshi yonadi. Etilen va propilen esa tutab yonadi, havo bilan portlovchi aralashma hosil qiladi. Etilen dumbul uzilgan meva (nok, olma, limon) pomidor, qovunlarning pishishini tezlashtirish xossasiga ega bo'lgani uchun issiqxona havosiga qo'shib turiladi.



Kimyoviy xossalari. Etilen va uning gomologlari molekulasida qo'shbog' borligi uchun ular to'yingan uglevodorodlarga nisbatan kimyoviy reaksiyaga oson kirishadi. Etilen va boshqa alkenlarning kimyoviy aktivligi qo'shbog'dagi π -bog'ining nisbiy beqarorligi, ya'ni uning oson uzilishi va $>\dot{\text{C}}-\dot{\text{C}}<$ uglerod atomlarining hosil bo'lgan bo'sh valentliklariga boshqa atom va gruppalarining birikishiga olib keladi. Har qanday alken uchun birikish reaksiyasi xosdir.

1. Vodorodning birikishi — gidrogenlanish. Alkenlar katalizatorlar (platina, palladiy, nikel) ishtirokida vodorod biriktirib, alkanlar hosil qiladi. Buni umumiy holda va etilen uchun quyidagicha yozish mumkin:






2. Galogenlarning birikishi. Alkenlarga galogenlar birikkan digalogenli hosilalar, ya'ni ikkita yonma-yon turgan uglerod ikkita galogen atomlari birikkan birikmalari hosil bo'ladi:



Bromning alkenlarga birikishi shunisi bilan ahamiyatli, a) bromli suvga ta'sir etganda uning qo'ng'ir qizil rangi yo'qoladi reaksiya qo'shbog'ga xos sifat reaksiyasi hisoblanadi.

3. Vodorod galogenidlarning birikishi. Etilenga vodorod galogenidlar bilan birikib, etanning galogenli hosilalarini vujudga keltiradi.




Agar alkenlar molekulasidagi C-atamlari soni ikkitadan ortiq bo'lsa, ularning vodorod galogenidlar bilan birikishi V. V. Markovnikov qoidasi bo'yicha boradi.

V. V. Markovnikov alkenlarga vodorod galogenidlarning birikish reaksiyalarini o'rganib, quyidagi qoidani yaratdi: to'yinmagan uglevodorodlarga vodorod galogenidlar birikkanda, vodorod qo'shbog' hosil qilgan eng ko'p vodorodli uglerod atomiga, galogen esa vodorodi eng kam (yoki vodorod atomi bo'lmagan) qo'shbog'ga hosil qilgan uglerod atomiga birikadi. Bu qoidaga asosan propilengalogenidlar HX (X = F, Cl, Br, I) birikishini ko'rib chiqaylik.


$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ molekulasida qo'shbog'ning bo'lishi A. M. Butlerovning tuzilish nazariyasi III bandiga binoan molekuladagi atomlar elektron buluti taqsimotini o'zgartiradi. CH_3 -radikali (elektron doimiyligi) ta'sirida qo'shbog' elektron buluti 1-C atomi tomoniga siljib, 2-C atomidagi elektron zichligining eng katta bo'lishiga olib keladi. 1-C atomy zaryadi δ^- -qiymatga ortadi. 2-C atomidagi elektron zichligi kamayib, qisman δ^+ zaryadli bo'lib qoladi. $\text{H}-\text{Cl}$ molekulasidagi bog' qutblanadi:

1-C atomi uchun ular qarama-qarshi zaryadli uglerod atomlari bilan bog'lanish qo'shbog'ning uzilishi hisobiga birikib, 2-xlorpropan hosil bo'ladi:




4. Suvning birikishi. Alkenlarga suv molekulasining birikishi, etilenga suvning birikishi H_2SO_4 — ishtirokida boradi. $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HOSO}_3\text{H} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OSO}_3\text{H}$ (etilsulfocfir)

Hosil bo'lgan sulfocfir gidrolizlanib, etil spirti va kislotaga aylanadi:




Alkenlarga turli katalizatorlar (sulfat kislotasi, fosfat kislotasi, rux xlorid va boshqalar) ishtirokida Markovnikov qoidasi bo'yicha suv birikkanda spirtlar hosil bo'ladi.



5. Oksidlanishi. Alkenlar qo'shbog' hisobiga alkanlarga qaraganda oson oksidlanadi. Alkenlarning tuzilishiga va oksidlanish sharoitiga qarab, reaksiya turlicha boradi:


a) alkenlarning yonishi. Alkenlar havoda alkanlar singari yonadi va yonish mahsulotlari (CO_2 va H_2O) ni hosil qiladilar:



b) alkenlarga ishqoriy yoki neytral muhitda kaliy permanganatning suvli eritmasi ta'sir ettirilganda, ulardagi qo'shbog' uziladi, eritma rangsizlanadi va ikki atomli spirtlar — glikollar hosil bo'ladi (Vagner




reaksiyasi). Bu reaksiya ham alkenlarning to'yinmaganligini
lovchi reaksiyadir.




s) alkenlar kuchli oksidlovchilar bilan ($KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$,
kislotali muhitda HNO_3 ta'sirida) oksidlansa, ularning

qo'shbog'i turgan joyidan (uglerod zanjiri) uziladi va tarkibida
bo'lgan organik moddalar (kislota, aldegid va keton) hosil bo'ladi.
reaksiyalar yordamida qo'shbog'ning o'rni va molekulaning tuzilishi
aniqlanadi.

— Agar alken to'g'ri zanjirli bo'lsa, faqat kislotalar hosil bo'ladi.




— Agar zanjir tarmoqlangan va shu uglerod atomi qo'shbog'
qilgan bo'lsa, keton va kislota hosil bo'ladi.




2-metil buten-2

e) alkenlar $250^\circ C$ da kumush katalizatori ishtirokida oksidlanib
organik oksidlar (epoksidlar) hosil bo'ladi:



6. Polimerlanishi. Etilen va alkenlar qo'shbog'dagi π -bog'ning uzilishi
hisobiga polimerlanish reaksiyasiga kirishadi. Tarkibida qo'shbog'

bo'lgan quyi molekulyar birikma (monomer) larning o'zaro birikishi
natijasida yuqori molekulyar birikmalar (polimerlar) hosil bo'ladi. Bu
reaksiya **polimerlanish** deyiladi. Polimerlanish reaksiyasi borishida
qo'shbog'ning π -bog'i gomolitik yoki geterolitik uzilib, ikkala uglerod
atomlarining har birida bittadan bo'sh valentliklari bo'lgan radikallar
yoki karboniy ioni hosil bo'ladi. Bu radikallar yoki ionlar o'zaro birikib
uzun zanjirli **yuqori molekulyar birikma** (YuMB) — polimerlarni hosil
qiladi:



bu yerda, n — monomer molekulalar (zvenolar)ning soni yoki **polimerlanish**
darajasi deyiladi. Alkenlarning polimerlanishi katalizatorlar (yoki
initsiatorlar) ta'sirida boradi. Polimerlanish natijasida hosil bo'lgan yuqori
molekulyar modda **polimer** (ko'p o'lchamli) deyiladi. Umumiy holda:





Polimerlanish reaksiyalari mexanizmlariga ko'ra radikal (initsirlangan)
ionli bo'lishi mumkin.


1. **Radikal polimerlanishda** monomerga radikallarga ajraladigan modda
(initsiator $R-O:O-R \rightarrow R-O^\cdot + R-O^\cdot$) ta'sir etadi: (zanjirning
boshlanishi) $R-O^\cdot + CH_2=CH_2 \rightarrow R-O-CH_2-CH_2^\cdot$
2. **Zanjirning o'sishi:** $ROCH_2-CH_2^\cdot + nCH_2=CH_2 \rightarrow$
 $\rightarrow RO-(CH_2-CH_2)_n-CH_2-CH_2^\cdot$

Zanjirning uzilishi:


• **disproporsiyalanish** —




b) monomerga zanjir uzatish:




v) polimer makromolekulasiga zanjir uzatish:



g) erituvchiga zanjir uzatish:




Endi:




Yana zanjarning o'sishi ro'y berishi mumkin.

Zanjir shu tariqa o'sib boradi. Agar erkin radikallar o'zaro birlashib zanjirning o'sishi to'xtaydi.


II. Ionli (yoki katalitik) polimerlanishda monomerga biror ta'sir etib, uni ionlaydi va shu ionlangan monomer boshqa monomer molekulalari bilan ta'sirlashib polimer zanjirini hosil qiladi. HAlCl_4 ta'sirida etilen kation polimerlanadi:




Zanjirning o'sishi quyidagicha boradi:



Zanjirning uzilishi anion va kationlarning o'zaro birikishi tufayli sodir bo'ladi. b) ayrim ishqoriy metallar Na yoki metalloorganik birikmalar $\text{R}-\text{Mg}$ ta'sirida anion polimerlanish ro'y beradi:



Zanjirning o'sishi:



Zanjirning uzilishi qarama-qarshi zaryadli ionlarning birikishi yoki eroliz reaksiyasi natijasida ro'y beradi.

Etilenning polimerlanish mahsuloti — polietilen rangsiz kislota, ishqorlar, suv ta'siriga chidamli plastik modda, termik va mexanik ishlov berishga juda moyil materialdir. Unga turli rangli moddalar qo'shib turli plyonka va plastmassalar olinadi.

Ular asosida turli quvurlar, idishlar, buyumlar tayyorlanadi. Polietilenning past bosimda va yuqori bosimda olinadigan turlari mavjud. Past bosimda olingan polietilenda katalizatorlarning qoldiqlari qolib ketgan uchun undan texnik maqsadlardagina foydalaniladi.


Yuqori bosimli polietilen kimyoviy toza bo'lgani uchun, undan oziq-ovqatlarni saqlash va tibbiyotda foydalaniladi.

XXIX.4. Asetilen va uning gomologik qatori

To'yinmagan uglevodorodlar molekulalarida uglerod atomlari o'zaro uchbog' orqali bog'langan birikmalar alkinlar yoki asetilen uglevodorodlar deyiladi.

Asetilen molekulasining tuzilishi. Asetilen uglevodorodlarining gomologik qatori $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ umumiy formulaga ega. Alkinlarning gomologik qatori eng oddiy tuzilishga ega bo'lgan asetilendand boshlanadi. Uning struktura formulasida uchbog' $\text{C}=\text{C}$ mavjud bo'lib, uning ikkitasi π - va bittasi σ -bog'dir. Ularning hosil bo'lishini shunday tasavvur qilish mumkin.

Asetilen molekulasidagi uglerod atomlari sp^1 -gibridlangan bo'lib, bu gibrid orbitallar 1 ta 2s va 1 ta 2p orbitallarning o'zaro gibridlanishi natijasida hosil bo'ladi. Ular fazoda bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida joylashgan. Ikkita uglerod atomlaridagi bittadan sp^1 -gibrid orbitallari o'zaro qoplanib, σ -bog' hosil qiladilar. Bo'sh qolgan yana bittadan sp^1 -orbitallari ikki tomondan H-atomlarining s-orbitallari bilan qoplanib, $\text{C}-\text{H}$ bog'lari (σ -bog'i)ni hosil qiladilar.



33-rasm.

Asetilen molekulasida π - va σ - bog'larning hosil bo'lishi.

Shu tariqa asetilen molekulasida 3 ta σ - bog' bor. Uglerod atomlari gibridlanishda ishtirok etmagan ($2p_x$, $2p_y$) p - orbitallar bo'lib, ular (lendagidek) o'zaro perpendikulyar tekisliklar bo'ylab qoplanadilar va ularning o'zida 2 ta π - bog'lar (π_1 va π_2)ni hosil qiladilar (33-rasm).

Umuman, asetilen molekulasi chiziqsimon tuzilishli bo'lib, bog' orasidagi burchak 180° ni tashkil etadi va $r_{C-C} = 0,120 \text{ nm} = 1,20 \text{ \AA}$, $r_{C-H} = 1,0 \text{ \AA}$ ga tengdir.


Asetilen molekulasida uchbog'ning bo'lishi molekulaning xususiyatini aniqlab beradi va $C-H$ bog'ining elektron zichligini o'ziga etilendirmoqchi kuchliroq tortadi. Shu sababli asetilen ham uch bog', ham $C-H$ bog' hisobiga kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadi.

Asetilenning etilen qatori uglevodorodlari singari kimyoviy reaksiyalarda kirishish qobiliyatining yuqori bo'lishi, uning molekulasida 2 ta π - bog'ning borligi va σ - bog'larga nisbatan π -bog'larni uzilishi bilan energiya sarflanishi bilan tushuntiriladi.

Nomenklatura va izomeriyasi. Alkinlarning nomi tegishli to'g'ri uglevodorodlar nomidagi "an" qo'shimchasi o'rniga — "in" qo'shimchasi qo'shish bilan hosil qilinadi: $CH \equiv CH$ (etin), $CH_3 - C \equiv CH$ (propin).


Alkinlarni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlashda uchbog' zanjir asosiy zanjir deb olinadi va uglerod atomlarini raqamlash zanjir uchbog'ga yaqin tomonidan boshlanadi. Zanjir tarmoqlangan bo'lsa, birinchi tarmoqlangan uglerod raqami, keyin radikal nomi, undan keyin asosiy zanjir nomi va oxirida uchbog' turgan uglerod atomi raqami ko'rsatiladi.

Masalan:



Alkinlarning tuzilishiga ega bo'lgan quyi alkinlar ko'pincha ratsional nomenklaturaga (qavs ichida berilgan) binoan nomlanadi. Ratsional nomenklaturaga muvofiq ular asetilenning bir yoki ikkala vodorod atomi o'rniga uglevodorod radikallariga almashingan hosilalari deb qaraladi va radikal soni va nomiga "asetilen" so'zi qo'shib aytiladi.

Izomeriyasi. Alkinlarda uglerod zanjirining tuzilishi hamda uchbog'ning joylashuviga ko'ra izomeriya kuzatiladi. Yuqoridagi misolda butin-1 va butin-2 lar hamda quyidagi pentin-1, pentin-2 lar qo'shbog' bo'yicha izomerlar bo'lib, faqat pentin-1 va 3-metilbutin-1 o'rinbosar (izomer) izomerlardir:



Shuni aytish lozimki, asetilen qatori uglevodorodlar tarkibiga ko'ra uglevodorodlar o'zaro izomer moddalardir.

Asetilen va uning gomologlarini olinishi. 1) laboratoriya va sanoatda asetilen ko'pincha kalsiy karbidning gidrolizlanish reaksiyasi natijasida olinadi:






Shunday usul bilan avtogen payvandlashda ishlatiladigan Asetilen olinadi.

2) hozirgi vaqtda sanoatda Asetilen ancha arzon xomashyodan — etan gaz tarkibidagi metanni yuqori temperaturada piroliz qilish bilan




3) bundan tashqari boshqa usullar: alkinlar, vitsinal (galogen atomlari ikki qo'shni uglerod atomlariga birikkan) galogenli va geminal (galogen atomi ham bitta uglerod atomiga birikkan) hosilalariga va gidroksidlarning spirtidagi eritmasi yoki natriy amid ($\text{Na}-\text{NH}_2$) bilan ham Asetilen olinadi:



Fizikaviy xossalari. Alkinlarning dastlabki uch vakili oddiy sharoitda gaz, C_3 dan C_5 gacha bo'lganlari suyuqlik, C_6H_{10} dan boshlab esa qattiq moddalardir. Alkinlarning fizik-kimyoviy xossalari alkanlar va alkenlardan xossalardan ancha farq qiladi. Alkinlar suvda erimaydi, organik erituvchilarda (efir, benzol, uglerod (IV)-xloridda) yaxshi eriydi.


Kimyoviy xossalari. Alkinlarning kimyoviy xossalari uchbog'ning tuzilishi va uglerod atomlarining sp^1 - gibrirlanish xususiyatlari bilan belgilanadi. Molekulasida ikkita π - bog' borligi tufayli asetilen qatori uglevodorodlardan qutblanishga moyil bo'lib, reaksiyaga kirishishi alkenlarga nisbatan yuqoridir. Shu sababli qutbli molekular (suv, spirt, aminlar va hokazo) bilan reaksiyaga oson va to'liq kirishadi. Bu holat asetilen qatori uglevodorodlar molekularining o'ziga xos elektron tuzilishi bilan tushuntiriladi. asetilen qatori uglevodorodlar uchun birikish, oksidlanish, polimerizatsiya, alash va almashinish reaksiyalari xosdir.

I. **Vodorodning birikishi.** Alkinlarga vodorodning birikishi palladiy, platina va nikel katalizatorlari ishtirokida oson boradi. Birikish reaksiyasi 2 ta π - bog' hisobiga ikki bosqichda boradi:






II. *Galogenlarning birikishi.* Alkinlarning galogenlar bilan birikish reaksiyalari ham ikki bosqichda boradi. Reaksiyaning birinchi bosqichida har bir molekula galogen birikadi va alkenlarning galogenli hosilasi hosil bo'ladi. Reaksiyaning ikkinchi bosqichida ikkinchi molekula galogen bilan birikadi, alkanlarning tetra galogenli vakili hosil bo'ladi:




Bu reaksiyada bromli suvning qo'ngir rangi yo'qoladi va bu asetilen molekulasida uchbog' borligining isbotidir.

III. *Vodorod galogenidlarning birikishi.* Alkinlarga vodorod galogenidlar qo'shilishi shartli ravishda birinchi bosqichda alkenlarning galogenli hosilalari, so'ngra ikkinchi vodorod galogenid molekula-birlikidan Markovnikov qoidasiga ko'ra ikkala uglerod atomida galogen atomi saqlagan birikmalar hosil bo'ladi:



IV. *Suvning birikishi.* Asetilen uglevodorodlari katalizatorlar ishtirokida, masalan, simob tuzlari ishtirokida suvni oson biriktiradi. Asetilenga suv birikishini birinchi marta M. G. Kucherov o'rgangan uchun *Kucherov reaksiyasi* deyiladi. Reaksiya natijasida asetilendan sirka aldegid, Asetilen molekulasidan esa ketonlar hosil bo'ladi.


Asetilenga suv birikishi reaksiyasining birinchi bosqichida beqaror spirti hosil bo'ladi (sirka aldegidning enol shakli), so'ngra u aylanib, sirka aldegidga aylanadi:






Sirka aldegidni oksidlab sirka kislotasi, qaytarib etil spirti hosil qiladi.


V. Asetilen va uning gomologlari π — bog'lar hisobiga o'zaro birikishi xossasiga ega. Agar 2 ta asetilen molekulasini o'zaro biriksa (a) vinil asetilen, agar 3 molekula asetilen qizigan ko'mir ustidan o'tkazilsa, trimetilbenzolni hosil qiladi (b):



(b) reaksiyada asetilenning gomologlari $R-C \equiv CH$ ishtirok etadi. Reaksiya mahsuloti sifatida simmetrik benzol gomologlarini hosil qiladi.




VI. Oksidlanishi. a) kuchli oksidlovchi, masalan, $KMnO_4$ eritmasi orqali asetilen gazi o'tkazilsa, eritma binafsha rangining yorqinlashi asetilendagi uchbog'ga xos sifat reaksiyasi bo'lib, ikki asosli oksidlanish reaksiyasi hosil bo'ladi:



b) 2,5 hajm havo kislorodi ta'sirida 1 hajm asetilen tutab, sof kislorodni oq alanga berib yonadi va juda katta issiqlik ajralib chiqadi ($t=3500^\circ C$). Bu reaksiyadan metallarni qirqish yoki payvandlash uchun ishlarida foydalaniladi:



VII. Vodorod sianidning birikishi. Asetilen katalizatorlar (NH_3 va Cu_2Cl_2) ta'sirida vodorod sianidni biriktirib, akrilonitrilni hosil qiladi:




akrilonitril sanoatda sun'iy tola — nitron va sun'iy kauchuklar ishlab chiqarishda qimmatli xomashyo hisoblanadi.

VIII. Almashinish reaksiyalari. Asetilenda etilen va etanga nisbatan kimyoviy xossalari ancha kuchli. Chunki, tuzilish nazariyasining III qonuniga asosan asetilen molekulasidagi uchbog' o'z tomoniga $C-H$ bog'ining elektron zichligini tortadi. Bu $C-H$ bog'ining kuchli qutblanishi asetilen molekuladagi N-atamlari harakatchanligini ortishiga olib keladi. $C-H$ bog'ining bunday qutblanganligi asetilenning kislotaga xossasini namoyand qilishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun uchbog' bilan bog'langan atomi o'ziga birikkan vodorod atomini metallarga almashtirib, almashinish reaksiyalariga ham kirishadi:




Propin esa $CH_3-C \equiv CNa$ ni hosil qiladi.

b) Asetilen mis (I) xloridning ammiakli eritmasi orqali o'tkazilsa, qizil-qora rangli mis asetilenid hosil bo'ladi:



v) agar asetilen gazi kumush oksidining ammiakli eritmasi orqali o'tkazilsa, och-sariq rangli kumush asetilenid hosil bo'ladi:



Asetilenidlar kuchli portlovchi moddalardir. Lekin ular ichida eng qimmatli CaC_2 — kalsiy karbid bo'lib, asetilen olishda eng asosiy xomashyodir.


XXIX.5. Diyen uglevodorodlar

Molekulasida ikkita qo'shbog' tutgan to'yinmagan uglevodorodlar diyenlar yoki diyen uglevodorodlar deb ataladi.

Diyen uglevodorodlar asetilen qatori uglevodorodlariga o'xshab C_nH_{2n-2} umumiy formulaga ega. Lekin molekulada ikkita qo'shbog' bo'lishi kerak. n kamida uchta uglerod atomi, ya'ni $n \geq 3$ bo'lishi kerak. $n \geq 3$ dan

boshlab asetilen qatori uglevodorodlari diyen uglevodorodlar bilan izomer moddalardir. Shu sababli diyen uglevodorodlar ikkita qatori bo'lib, ularning bir-biriga nisbatan joylashishiga va kimyoviy xossalari qat'iy bo'linadi:



1. Zich (kumullashgan) qo'shbog'li $>C=C=C<$ diyenlar. Bular $H_2C=C=CH_2$ va uning gomologlari kiradi. Ularda qo'shbog'lar ket joylashib, ular beqaror moddalar, ya'ni osonlik bilan alkinlarga gruppalanadi:



2. Ajralgan (izolyatsiyalangan) qo'shbog'li $>C=C-C-C=C<$ diyenlar. Bular ikkita qo'shbog' o'zaro ikkita va undan ortiq oddiy bog' bilan ajralgan bo'lib, ularning eng oddiy vakili $n=5$ pentadiyen-1,4 ($H_2C=CH-CH=CH-CH_3$) dir.

3. Oralatma (konyugirlangan) qo'shbog'li $>C=C-C=C<$ diyenlar. Bular ikkita qo'shbog' bitta oddiy $C-C$ bog'i bilan ajralgan bo'lib, ularning eng oddiy vakili divinil ($n=4$) yoki butadiyen-1,3. Uning hozirgi nomi "divinillar" yoki "1,3-butadiyenlar" ham deyiladi.

Nomenklaturas. Diyen uglevodorodlar ko'pincha sistemaviy nomenklatura bo'yicha nomlanadi. Ularning nomi tegishli to'rtinchi uglevodorodlar nomidagi oxirgi "n" harflini "diyen" qo'shimchasi bilan almashtirish orqali hosil qilinadi. Agar zanjir tarmoqlangan bo'lsa, u sanoq qo'shbog' va tarmoqlanish yaqin bo'lgan tomondan boshlanadi. Avval yonaki zanjir turgan uglerod atomi raqami, keyin radikal bo'lgan atomi, so'ngra asosiy zanjirga mos keluvchi diyen uglevodorod nomi va oxirgi qo'shbog' hosil qilgan uglerod atomlari raqami ko'rsatiladi:




Nomenklatura bo'yicha: $CH_2=CH-CH=CH_2$ divinil;




izopren deb nomlanadi.

Diyen uglevodorodlardan izopren tabiatda mavjud. U butadiyen-1,3 gazsimon modda, Divinil tabiatda mavjud emas. Butadiyen-1,3 gazsimon modda, uning turli sintetik olinish usullari ishlab chiqilgan.


Neft mahsulotlari krekingida hosil bo'ladigan va ayrim tabiiy gazlar aralashmasi tarkibidagi butan va butilenni yuqori temperaturada xrom — alyuminiyli katalizatorlar ishtirokida degidrogenlash bilan olinadi:




2. Sanoat miqyosida butadiyen-1,3 S. V. Lebedev usuli (1928 y.) ham olinadi. Bu usulga ko'ra etil spirt bug'lari $400-500^\circ C$ da katalizatorlar (ZnO , MgO , Al_2O_3) ustidan o'tkazilsa, butadiyen-1,3 hosil bo'ladi. Bunda degidratlanish va degidrogenlanish reaksiyalari birgalikda, uni umumiy holda quyidagicha yozish mumkin:




3. Butandiol-1,3 yoki butandiol-1,4 ni gaz holatida fosfatlangan katalizatorlar ustidan o'tkazilsa, degidratlanish natijasida butadiyen-1,3 hosil bo'ladi:



4. Butadiyen-1,3 olishda n-butanni bir bosqichda degidrogenlash birinchi jihatdan qulay hisoblanadi. Bunda katalizatorlar sifatida alyuminiy oksidlari ishlatilib, reaksiya $590-620^\circ C$ da olib boriladi:




5. Diyen uglevodorodlarning ayrimlari, masalan, izopentadiyen-1,3 sanoatda olish uchun izopentanni degidrogenatsiya usulidan keng foydalanilmoqda. Izopentan (neftni qayta ishlashda olinadigan pentan-amilen fraksiyasi tarkibidagi n-pentan izomeri) yuqori temperaturada xrom oksidi ishtirokida degidrogenlanadi:




Kimyoviy xossalari. Diyen uglevodorodlar to'yninmagan uglerodlarga xos barcha xossalarni namoyon qiladilar. Ularning xossalari 1,3-butadiyen-1,3 misolida ko'rib chiqamiz. Uning uchun avval 1,3 ning tuzilishi va boshqa tavsiflari bilan tanishaylik.

Butadiyen-1,3 da barcha uglerod atom orbitallari sp^2 -gibrid bo'lib, $r_{\text{C-C}} = 1,34 \text{ \AA}$; $r_{\text{C-H}} = 1,08 \text{ \AA}$; $r_{\text{C-H}} = 1,06 \text{ \AA}$; bog'lar orasidagi burchaklar 120° ni tashkil etadi.




Bu molekulada 1- va 4-C atomlarining oksidlanish darajasi 2- va 3-larniki (-1) bo'ladi.

1. **Birikish reaksiyalari:** a) diyen uglerodlarga katalizatorlar ishtirokida vodorod atomi birikkanda ikki xil birikish mahsulotlari aralashmasi — birikish va (asosan, 1,4 — birikish mahsuloti) hosil bo'ladi:




1,2-birikishda 2 ta vodorod atomi butadiyen-1,3 dagi 1- va 2-atomlariga birinchi qo'shbog'ning uzilishi hisobiga biriksa, 1,4-birikishda 2 ta vodorod atomi, 1-va 4-uglerod atomlariga birikib, bog'lar o'zini o'zgaradi.

1,3-diyenlar vodorod galogenidlar bilan ham birikish reaksiyasiga kirishadi. Bunda ham 1,2-birikish va asosan 1,4-holatdagi birikish mahsulotlari hosil bo'ladi. Lekin F, Cl, Br, J qatorida HHal larning birikish salmog'i ortadi:



c) galogenlarning birikishi ham 1,4- va 1,2-holatlarda boradi va oxirgi mahsulot sifatida tetragalogenli birikmalar hosil bo'ladi:



XXIX.6. Tabiiy va sintetik kauchuklar


Diyen uglevodorodlarda bir juft qo'shbog'ning bo'lishi ularning o'ziga o'xshash polimerlanishiga sabab bo'ladi. Bu monomerlar metallar (Na) va anorganik birikmalar katalizatorligi, hamda anorganik va organik peroksidlar (R-O-O-R) initsiatorligida ham 1-2-, ham 1-4-holatlar polimerlanish reaksiyalariga kirishadilar. Hosil bo'lgan polimerlar (qatoridagi monomerlarning polimerlaridan farqli ravishda) zveno-

larida bittadan qo'shbog'i bo'ladi ular *kauchuklar* deyiladi. Kauchuklar sintetik va tabiiy kauchuklarga bo'linadi.

Sintetik kauchuklar. Lebedev usuli va butanni degidrogenlash olingan sintetik diyen uglevodorodlar (va boshqa monomerlar) birgalikda polimerlanishidan hosil bo'luvchi moddalardir.


Ularning dastlabki vakili *butadiyen kauchugidir*. Butadiyen kauchukning monomeri butadiyen-1,3 bo'lib, polimerlanganda quyidagi mahsulotni hosil qiladi:

a) 1—2 polimerlanish bo'yicha:





Molekulaning qo'shbog' saqlagan qismi yonaki zanjirida bo'ladi.

b) 1—4 polimerlanish bo'yicha:




Qo'shbog' polimerning asosiy zanjirida bo'lib, bunday tuzilishga xosdir.

v) 1—2 va 1—4 polimerlanish bir vaqtda borganda:




yonaki, ham asosiy zanjirida qo'shbog' saqlagan polimer hosil bo'ladi. bir zanjirida va uning turli qismlarida k, l, m lar har xil bo'la oladi. Yuqorida (b) aytilgandek sintetik kauchuk asosan 1—4 polimerlanish mahsuloti bo'lib, uning tuzilishi stereoregulyar ko'rinishga (sis — tizilishga) ega:




Sintetik divinil kauchukning bunday tuzilishli ekanligi, Garriyes tomonidan ozonlash reaksiyasi va uning xossalari tabiiy kauchuk bilan deyarli xiliga asoslanib xulosa qilingan.

Tabiiy kauchuk $(-\text{C}_4\text{H}_6-)_n$, asosan, izopren (C_4H_8) ning polimerlanish mahsulotidir. Izoprenning polimerlanishi 1—4 mexanizmda



izopren (2-metil butadiyen-1,3) poliizopren (tabiiy kauchuk)

Tabiiy kauchukning tuzilishi sis — izomerga to'g'ri keladi va uning mahsuloti lateks deyiladi.




sis-poliizopren

Lateks oq rangli, yopishqoq, uzoq turib qiyomsimon aylanadigan suyuq modda.

Tabiiy poliizoprenning trans — tuzilishli holati ham mavjud *guttapercha* deyiladi. O'zining tezda qotishi (kristallanishi) poliizoprendan farq qiladi.


Keyingi yillarda sintetik kauchuklarning fizik-kimyoviy yaxshilash maqsadida butadiyen — 1,3 ning stirol — $\text{CH}_2=\text{CH}$ (benzinga chidamli), akrilonitril — $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH})$ (yog'lar va ta'siriga chidamli), izobutilen yoki izopren (kimyoviy moddalarga chidamli) bilan sopolimerlanish reaksiyalari mahsulotlari olingan.



trans-poliizopren (guttapercha)

Sopolimerlanish, deb ikki yoki undan ortiq turdagi monomer birgalikda polimerlanib bitta yangi polimer hosil qilish reaksiyasi ataladi. Shu usul bilan butadiyen stirol kauchugi olinadi.

Butadiyenstirol kauchugi (BSK)ning hosil bo'lishi:




kauchuklarda qo'shbog'larning bir-biriga nisbatan joylashuvi shi va yonaki zanjirda katta hajmli C_6H_5 — radikalining bo'lishi oddiy butadiyen kauchugiga nisbatan elastik va fizik-kimyoviy ancha farqli bo'lishiga sabab bo'ladi.

Sintetik va tabiiy kauchuklar xalq xo'jaligida asosan rezina va uning buyumlar (avtomobil va aviatsiya shinalari) ishlab chiqarishda sifati qo'llaniladi. Rezina hosil qilish uchun kauchuk maxsus oviy ishlanadi.

19 yilda Ch. Gud'ir yopishqoq tabiiy kauchuk qizdirilib oltingugurt (cha) bilan qayta ishlansa, yopishmaydigan va elastikligi kauchukdan bo'lgan mahsulotga aylanishini aniqlagan. Bu jarayon kauchukni vulqonlash deyilib, hosil bo'lgan mahsulot *rezina* deyiladi.

Kauchukni vulqonlashning mohiyati — chiziqsimon tuzilishli va bir-biriga juda zich joylashgan uzun kauchuk makromolekulalari tarkibidagi qo'shbog'larning bir qismi uzilishi hisobiga oltingugurt atomlari birikishi natijasi o'zaro yonaki zanjir ko'rinishida "tikiladi". Natijada to'rsimon tuzilishli, juda elastik — kuchli qaytar deformatsiyalanuvchi material — rezina hosil bo'ladi:



Agar vulqonlash jarayonida ko'p miqdorda oltingugurt qo'shilsa, kauchukning elastikligi yo'qoladi va qattiq plastmassa — *ebonit* hosil bo'ladi.

XXIX.7. Aromatik uglevodorodlar

Organiladigan asosiy tushunchalar: aromatik uglevodorodlar, benzol, toluol. Kekule formulasi, geksaxloran, nitrobenzol, stirol, polistirol, kumol.

Tarkibida bir yoki bir nechta benzol halqalariga ega bo'lgan uglevodorodlar *aromatik uglevodorodlar* deyiladi.

Aromatik uglevodorodlarning birinchi vakili benzol — C_6H_6 dir. 1825 yilda Maykl Faradey o'ziga xos hidli modda "bicarburet of hydrogen"

nomli C_6H_6 tarkibli moddani oldi. So'ngra E. Mitcherlix shunday moddani — benzoy kislotani parchalab oldi va unga "benzen" deb nom berdi. Keyinchalik "benzen" benzol deb ataldi va ko'pincha xushbo'y hidli moddalarning asosini tashkil etgani uchun aromatik vodorodlarning dastlabkisi, deb qabul qilindi.

Bu moddaning o'ziga xosligining sababi nimada, degan savolga javob berish uchun organik moddalarning tuzilish nazariyasiga murojaat etish lozim. Chunki moddaning tuzilishi uning xossasini belgilab beradi. Shu sababli benzol (va uning gomologlari)ning xossalari o'rganish uchun uning tuzilishi ni bilishimiz kerak.


Benzol halqasining tuzilishi

Benzol halqasining tuzilishi 1865 yilga kelib nemis kimyogari Kekule tomonidan aniqlangan. Ungacha benzol halqasi tuzilishi to'g'risida turli qarashlar va modellar bo'lishiga qaramay, *Kekule taklif qilgan olti a'zoli halqasimon tuzilish benzolning xossalari to'g'ri izohlab bera oldi.*


Bu tuzilishga ko'ra 6 ta uglerod atomi bir tekislikda sp^2 — gibrid orbitallari orqali bog'lanib olti a'zoli halqa hosil qiladi. C—C atomlari orasidagi bu bog'lanish σ — bog'i bo'lib, uning uzunligi $r = 1,40$ A ni tashkil etadi. Teng tomonli olti burchakning uchlari bo'ylab yo'nalgan uchinchi sp^2 — orbitallari vodorod atomlarini bog'lab turadi ($r_{C-H} = 1,08$ A) (34-rasm).

Bog'ning uzunligi $r_{C-C} = 1,54$ A o'rniga $1,40$ A ligi benzol xalqasida C — atomlari o'zaro birlamchi bog'dan yuqori tartibda bog'langanligiga to'g'ri keladi. Demak, uglerod atomlarining o'zaro bog'lanishida yana boshqa orbitallar ishtirok etadi.

Halqadagi qo'shimcha bog' hosil bo'lishida, gibridlanishda qatnashmagan




34-rasm. Benzol molekulasida C—H (a) va C—C (b) bog'larining uzunligi, ularning o'rtasidagi burchak bo'lishi, ularning joylashuvi (v)




— orbitallari halqa tekisligiga perpendikulyar joylashib, uning ustida o'zaro qoplanib yaxlit va yagona elektron bulutini hosil qiladi. Bu ikki xil bog'lar birgalikda benzol halqasini hosil qilib, π bog'larining yuqori darajada yaxlit (umumlashgan)ligi benzol va uning gomologlarining aromatlilik xossasining asosini tashkil etadi. Yozuvda qulay bo'lish uchun bu halqaning ikki xil shartli belgisi (I va II) dan foydalaniladi: **Benzol va gomologlarining nomlanishi va izomeriyasi**

Benzol gomologik qatorining umumiy formulasi C_nH_{n-6} bo'lib, benzol halqasidagi bir yoki bir necha vodorod atomlari boshqa uglevodorod atomlari bilan almashib, gomologlarini hosil qiladi. Ular qatoriga C_6H_5- toluol (metil benzol), $C_6H_4-(CH_3)_2$ ksilol yoki dimetil benzol, $C_6H_3-(CH_2)_2$ etil benzol kiradi. "Ular"ni umumiy nom bilan arenlar ham atiladi.

Bulardan tashqari, aromatik birikmalar qatoriga molekulasida 2 va undan ortiq benzol xalqalari tutgan uglevodorodlar kiradi. Ular ham benzolning gomologlari hisoblanadi:




Naftalin
 $C_{10}H_8$



Antrasen
 $C_{14}H_{10}$

Fenilbenzol





$C_{12}H_{10}$ (difenil)


Izomeriyasi. Aromatik uglevodorodlarda o'rinbosar izomeriyasi va zanjirlarning tuzilish izomeriyasi mavjud.

a) tarkibida ikkita radikal saqlagan aromatik uglevodorod benzol halqasida radikalarning joylashishiga ko'ra uch xil izomerga ega bo'ladi. Agar o'rinbosarlar halqada yonma-yon (1,2-holatda) joylashgan bo'lsa, **o**-izomer;

— bita uglerod atomidan keyin (1,3-holatda) joylashsa, **meta**-, m-




n — propil benzol




izopropilbenzol (kumol)

— o'rinbosarlar benzol halqasidagi ikki uglerod atomi bilan ajratilgan bo'lsa (1,4-holatda joylashsa), **para-**, **p**-izomer deyiladi.

b) benzol halqasiga birikkan yonaki zanjirning izomeriyasi izomeriyada halqaga birikkan R — radikalning tuzilish izomeriyasiga e'tiborga olinib, uni C_6H_5 tarkibli benzol gomologi misolida keltirib chiqamiz:



1-metil — 2-etilbenzol



1, 2, 3 — trimetilbenzol

Agar bular qatoriga 1-metil — 2-etilbenzolning yana ikkita, trimetilbenzolning uchta holat izomerlarini qo'shsak, bu moddaning umumiy izomerlar soni 8 taga etadi. Shu izomerlarni yozishga o'zingiz harakat qiling.

Nomenklaturasi. Benzol va uning hosilalarini nomlashda trivial, xarakteristik va sistematik nomenklaturadan foydalaniladi.

Trivial nomenklaturaga ko'ra $C_6H_4(CH_3)_2$ — ksilol, $C_{10}H_8$ — naftalin, C_7H_8 — kumol va hokazo.


Radikal nomenklaturaga ko'ra benzolning gomologlari undagi bir yoki bir nechta vodorod atomlarini boshqa radikalga almashinuvidan hosil bo'lgan birikmalar deb qaraladi. Avval radikal nomi aytilib, oxiriga "benzol" qo'shiladi: $CH_3-C_6H_5$ (metil benzol); $C_2H_5-C_6H_5$ (etil benzol) va $(CH_3)_2CH-C_6H_5$ (izopropil benzol).

Sistematik nomenklatura bo'yicha benzol halqasidagi o'rinbosar o'rinbosarlar bilan ko'rsatilib, radikallar nomi kichigidan boshlab aytilib, benzol halqa nomi (benzol) aytiladi. Yuqoridagi misollarda keltirilgan moddalarni nomlashda sistematik nomenklatura ishlatildi.

Benzol molekulasidan bitta vodorod atomi chiqib ketsa, bir valentli benzil (C_6H_5-) radikali hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda benzol hosilalarini nomlashda shu radikal nomidan foydalaniladi: C_6H_5OH — fenol; C_6H_5- — fenil; C_6H_5COOH — fenilsirka kislotasi, $C_6H_5-C_6H_5$ — fenil benzol, $C_6H_5-CH=CH_2$ — feniletilen yoki stirol.

Benzol va uning gomologlarini olinishi. Benzol va uning gomologlari qayta ishlab hamda toshko'mirmi pirolizlab olinadi. Shu bilan benzolni quyidagi usullar bilan ham olish mumkin:

1. Ta'yinlangan uglevodorod — geksanni avval sikllab, keyin siklogeksan degidrogenlab olinadi:



2. N. D. Zelinskiy va B. A. Kazanskiy usuli bo'yicha asetilenni qizitib olinadi (havosiz sharoitda) o'tkazib olinadi:



Agar asetilen qatori uglevodorodlari $R-C\equiv CH$ ishlatilsa, benzolning simmetrik tuzilishli gomologlari hosil bo'ladi.

3. Benzoy kislota tuzi va natriy gidroksidni birgalikda qo'shish bilan olinadi:



4. Alkil radikalli hosilalari (gomologlari) Vyurs-Fittig reaksiyasi bilan olinadi:



5. Sh.Fridel va D.Krafts usuli bo'yicha sanoatda va laboratoriyada benzol va uning gomologlarini quyidagicha olish mumkin:



bu reaksiyada $AlCl_3$ dastlab metil xloridga birikib kompleks hosil bo'ladi, keyin benzol bilan ta'sirlashib, toluol $C_6H_5-CH_3$ hosil bo'ladi.

Fizik xossalari. Aromatik uglevodorodlar odatda o'ziga xos rangsiz suyuqliklar, ularning ayrim qattiq vakillari ham uchraydi. ularning zichligi va sindirish ko'rsatkichi alkanlar va alkenlarnikiga qaraganda ancha yuqori. Aromatik uglevodorodlarda uglerod miqdori ko'p bo'lgani uchun ular tutab yonadi.


Suvda erimaydi va suvli aralashmada suvning sirtida qatlam hosil bo'ladi, lekin organik erituvchilar — spirt, xloroform va hokazolar bilan aralashib ketadi. Bug' holdagi benzolning havo bilan aralashmasi kuchli partlaydigan xossasiga ega.

Benzol bug'i bo'g'uvchi xossaga ega, zaharli modda. Benzolning eruvchanligi toluol 110°C da qaynaydi. Izomerlarining qaynash temperaturasi biriga yaqin bo'lsada, suyuqlanish temperaturasi o'zaro katta farq bo'ladi. Ko'pincha para-izomer va meta-


izomerga qaraganda yuqori temperaturada suyuqlanadi. Gomologlarning eruvchanlik farqi 1 ta CH_2 ga teng bo'lsa mazkur ikki gomologning qaynash temperaturasi ~30°C ga farq qiladi.

Kimyoviy xossalari. Benzol va uning gomologlarini kimyoviy reaksiyalar bilan benzol halqasining elektron tuzilishiga, unga birikkan o'rinbosarlar ta'siriga o'rni va tabiatiga bog'liq. Shu bilan birga aromatik uglevodorodlar to'yingan va to'yinmagan uglevodorodlarning ayrim kimyoviy xossalari bilan farqlanadirlar.

1. **Almashinish reaksiyalari:** A. Benzol halqasidagi H-atamlari benzolning uglevodorodlardagi singari, almashtirish xossalari ega. Lekin aromatik birikmalarda reaksiya tezroq boradi.




B. $AlCl_3$ katalizatori Cl_2 bilan benzol reaksiyaga kirishsa, barcha H-atamlari Cl atomlariga almashinadi:




Geksaxlorbenzol rangsiz kristall modda, ekinlar urug'larini va yog'ochni qaynatishda dorilovchi modda sifatida ishlatiladi.

V. Benzolga HNO_3 va H_2SO_4 aralashmasi (nitrolovchi aralashma) ta'sir ettirilsa nitrobenzol hosil bo'ladi:



Benzolning gomologlari almashtirish reaksiyalariga benzolga nisbatan oson va "chuqurroq" kirishadi. Chunki, halqada yonaki o'rinbosarlar ta'sir bo'lishi halqadagi vodorod atomlariga ta'sir etib, ularning oson almashtirishiga sabab bo'ladi (organik moddalarning tuzilish nazariyasi, II-band).



2. **Birikish reaksiyalari.** Aromatik birikmalar to'yinmagan uglevodorodlar bilan birinchi o'ringa hisobiga birikish reaksiyalariga kirishadilar.

- a) gidrogenlanish reaksiyalariga kirishib, sikloalkanlarni hosil qiladi





- b) quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida benzol xlorni biriktirib olib, geksaxlorsiklogeksan (geksaxloran) kukunsimon moddaga aylanadi. Bu modda hasharotlarga qarshi kurashda ishlatiladi:



3. **Oksidlanishi.** a) benzol va uning gomologlari havo kislorodi ta'sirida tutab yonadilar, katta issiqlik ajralib chiqadi:



- b) oksidlovchilar ta'siriga benzol chidamli. Lekin toluoldan boshlab gomologlari kislotali muhitda $KMnO_4$ ning eritmasi ta'sirida oksidlanadi. Oksidlanish mahsuloti sifatida benzoy kislota hosil bo'ladi. Shu xususiyatdan foydalanib, benzolni boshqa gomologlardan ajratiladi:



4. Benzol va uning gomologlari o'rin olish reaksiyalarida turli izomerlarni hosil qilishi mumkin. Bu narsa benzol halqasida o'rinbosarlar turiga bog'liq. Shu asnda o'rinbosarlar yoki oriyentatsiya nazariyasi yaratilgan. Bunga ko'ra birinchi va ikkinchi tur oriyentatsiya ya'ni yo'naltiruvchilar mavjud.

Birinchi tur oriyentatlarga: $-OH$, $-NH_2$, $-NHR$, $-NR_2$, $-OR$, $-R$, $-SH$, $-SR$, $-NHCOR$, $-Cl$ kiradi. Agar benzol halqasida ana guruhlar mavjud bo'lsa, ular o'zidan keyin halqaga kirib kelayotgan atom yoki guruhlarini halqaning aynan orto- va para-holatlariga qo'yish yo'naltiradi. Shu sababli ushbu oriyentatlarni orto- va para-oriyentatsiya deyiladi. Birinchi tur oriyentatlarning juft elektronlari benzol halqasida aynan orto- va para-holatdagi atomlarda elektron zichligini oshiradi. Natijada shu holatlardagi vodorod atomlarining harakatchanligi ortadi, ularning reaksiyaga kirishish qobiliyati ortadi.

Ikkinchi tur oriyentatlarga: $-NO_2$, $-SO_3H$, $-CHCl_2$, $-CHO$, $-COOH$, $-COOR$, $-CN$ kiradi. Agar benzol halqasida ana shu o'rinbosarlar mavjud bo'lsa, ular o'zidan keyin halqaga kirib kelayotgan atom va guruhlarini meta-holatga yo'naltiradi va shuning uchun ularni meta-oriyentatsiya deyiladi.

Agar benzol halqasida ikkita o'rinbosar mavjud bo'lsa, ular halqaga birinchi keluvchi keyingi atom yoki guruhni kelishgan holda ma'lum bir holatga yo'naltirishi yoki kelishmagan holda turli holatga yo'naltirishi mumkin.

Ishlatilishi. Benzol va uning gomologlari kimyo sanoatida dorivor moddalar, bo'yoqlar, erituvchilar, sintetik yuvuvchi vositalar, plastmassa moddalariga qarshi kurashishda dori (zaharli) moddalar ishlab chiqarishda, erituvchi sifatida ishlatiladi. Vinilbenzol (stiro) $CH_2=CHC_6H_5$ erituvchi sifatida ishlatiladi. Vinilbenzolning polimeri polistirolni hosil qiladi. Polistirolni butadiyen bilan hosil qiladigan sopolimeri sintetik kauchuk sifatida ishlatiladi. Izopropil benzol (kumol) fenol va atseton sintezida xomashyo sifatida ishlatiladi. Nitrobirikmalari portlovchi moddalar sifatida, turli moddalar sintez qilishda (anilin asosidagi bo'yoqlar) qo'llaniladi.

Savollar

1. Aromatik uglevodorodning asosiy xususiyatlarini tegishli reaksiyalar yordamida izohlang.
2. Benzol halqasining tuzilishini tushuntiring.
3. Alkanlar va alkinlar asosida aromatik uglevodorodlar olish reaksiyalarini yozing. Moddalarni nomlang.
4. Benzol, uning hosila va gomologlari, izomerlari formulalarini yozing.
5. 22,4 l metan gazidan olingan benzolni nitrolaganda hosil bo'luvchi modda massasini hisoblang, tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
6. Zichligi $0,88 \text{ g/sm}^3$ bo'lgan 200 ml geksandan hosil bo'ladigan benzolning massasini hisoblang (reaksiya unumi 75%).
7. Benzol, etilbenzol va toluolni $KMnO_4$ eritmasi bilan ta'sirlashishi natijasida hosil bo'ladigan moddalarni ko'rsating. Bu reaksiyalarni qanday usul bilan aniqlash mumkin? Ularning ahamiyati bor?

XXX bob
UGLEVODORODLARNING
TABIYY
MANBALARI

**O'rganiladigan asosiy
tushunchalar: neft, neftni
haydash, gazolin, benzin,
ligroin, kerosin, gazoyl,
mazut, gudron, rektifikatsiya,
kreking, riforming, piroliz,
tabiiy gaz, yo'ldosh gaz,
toshko'mir, toshko'mir
smolasi, koks, koks gazi.**

Uglevodorodlarning tabiiy manbalari qatoriga neft, tabiiy gazlar va toshko'mir kiradi.

XXX.1. Neft va neftni qayta ishlash

Neft qora-qo'ng'ir rangli, zichligi 0,73—0,97 g/sm³ bo'lgan, suvda erimaydigan o'ziga xos hidli, tez yonadigan moysimon suyuqlik. Neft va u asosidagi mahsulotlar dunyo bo'yicha mavjud yoqilg'ining 40 % ni tashkil etadi.

Tabiatda neft er ostida mavjud bo'lib, tarkibi jihatidan uglevodorodlarning aralashmasidan iborat: gaz, suyuq va qattiq moddalar bo'lgan eritma.



Abdurasuleva Amina Rahimovna
(1912—1990).

Kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Axborot, energiya va uglevodorodlarga, fenollar va ularning fizik-kimyoviy sikloalkanlash muammolari bo'yicha ko'p sonli ilmiy asarlar, amalga oshirgan 120 ilmiy maqolasi va 100 dan ortiq mualliflik guvohnomasi bor Davlat mukofotlari sohibasi.

* Aromatik birikmalarning almashinish reaksiyalariga kirishishi, ularning hosilalarini sintez qilish va o'rganish muammolari bilan O'zMU kimyo fakulteti kimyo kafedrasida xodimlari prof. A. R. Abdurasuleva boshchiligidagi (prof. X. P. Yo'ldoshev, H. Tojimuhamedov, A. Abdushukurov) samarali natijalarga erishildi.

tarkibida to'yingan uglevodorodlar, sikloparafinlar, aromatik uglevodorodlar, anorganik moddalar, gazsimon, kislorodli, azotli moddalar saqlaydi va bu moddalarning miqdoriga ko'ra tur-
linadi.

Umuman, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari quyidagi fizik, kimyoviy xususiyatlari bilan tavsiflanadi: o'rtacha molekulyar og'irligi, kimyoviy elementlar bo'yicha tarkibi, mexanik qo'shimchalar miqdori, suv, oltingugurt va azotli moddalar, smola, parafinlar miqdori, yanilish temperaturasi, qotish temperaturasi, kul hosil qiluvchanligi, yaniluvchanligi, zichligi, turli temperaturada qovushqoqligi va kislota-

Neft tarkibidagi kerakli moddalarni ajratib olish uchun u qayta
qilinadi.

Neftni qayta ishlash: birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash turlariga

Birlamchi qayta ishlashning asosini neftni haydash tashkil etadi. Bunda neft tarkibiga kirgan moddalarning qaynash temperaturalariga ko'ra uni turli fraksiyalarga ajratiladi. Neftni haydashda avval rangsiz moddalar fraksiyalari:

- gazolin ($t_{\text{qayn}} = 40-70^\circ\text{C}$) (C_3-C_6);
- benzin (C_6-C_{11} gacha uglerod atomlari saqlaydi, $70-180^\circ\text{C}$ da qaynaydi) ajratib olinadi.

Ulardan keyin rangli fraksiya mahsulotlari:

- ligroin ($t_{\text{qayn}}^* = 120-240^\circ\text{C}$, C_6-C_{14})
- kerosin ($t_{\text{qayn}}^* = 180-300^\circ\text{C}$, C_8-C_{16})
- gazoyl (solyar moyi) ($t_{\text{qayn}}^* = 280^\circ\text{C}$) ($\text{C}=16$ yoki undan kichik)

Neftni haydash reaktivatsiya kolonnasida olib boriladi. Bunda neft qizdirish pechi (quvurli pech)da $320-350^{\circ}\text{C}$ da qizdirilib bug' va suyuqlik aralashmasi holida balandligi 40 metr bo'lgan kolonnaga yuboriladi. Unda teshiklari bo'lgan gorizontol holda joylashtirilgan lipecha (tarelka)lar qo'yilgan bo'lib, ular orqali qizigan neft bug'i yuqoriga ko'tariladi va sovib suyuqlikka aylanadi. Eng avval oson uchuvchan (gazovi) fraksiyasi, keyin kerosin fraksiyasi, keyin ligroin, benzin va gazolin fraksiyalari ajratib olinadi. Ajratib olingan benzinning bir qaytadan kolonnaga sovitgich sifatida yuboriladi. Bu bosqichda benzin atigi 20% i benzin sifatida ajratib olinadi. Mahsulotni kam qoladigan bu bosqichning kamchiligidir. Oxirida qolgan quyuq massa —


Mazut tarkibida qolgan moddalarni ajratib olish uchun *haydash* usulidan foydalaniladi. Haydash mahsulotlari sifatida turli moylari, parafin (qattiq alkanlar) va vazelinlar olinadi. Mazutni natijasida qolgan qoldiq "*neft kuli*" yoki *gudron* deb aytiladi. Asfalt ishlab chiqarishda asosiy tarkibiy qism (material) sifatida ishlatiladi.

Ajratib olingan har bir fraksiya mahsuloti o'zining ishlatilish ega.

Benzin — avtomobil va avia yonilg'isi, erituvchi, ekstraksiya material — suyuq uglevodorod sifatida ishlatiladi.

Benzinning havo bilan aralashmasi avtomobil dvigatellarida bosim ostida siqiladi. Bu siqilish natijasida yonilg'i aralashmasi o'tirib chiqariladi. Bu siqilish natijasida yonilg'i aralashmasi o'tirib chiqariladi. Bunda benzinning siltash kuchi yuzaga kelib, kuchli tovush chiqadi, dvigatelning ish pasayadi. Bu hodisaga benzin *detonatsiyasi* deyiladi. Detonatsiya kelib chiqishiga sabab benzinda to'g'ri zanjirli uglevodorodlarning darajada borligi va ularning oson yonib ketishidir.

Benzin tarkibida tarmoqlangan uglevodorodlar miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, detonatsiya shuncha qiyin ro'y beradi. Uglevodorodlar ichida detonatsiya bermaydigan (antidenotatsiya xossali) modda — izooktan yoki 2,2,4-trimetilpentandir:



Benzin tarkibidagi izooktanning massa ulushi *oktan soni* deyiladi. Umuman, izooktanning oktan soni 100 ga teng, kuchli detonatsiya beradigan to'g'ri zanjirli uglevodorod — heptan ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) ning oktan soni esa nol (0) ga teng deb qabul qilinadi. Shu ikki uglevodoroddan turli nisbatdagi standart aralashma (76% izooktan va 24% heptan, 93% izooktan va 7% heptan) lar tayyorlanadi. Bu aralashmalarning yonish xususiyati bilan ishlab chiqarilgan benzinning yonish xususiyati solishtiriladi va benzinning shartli oktan soni aniqlanadi. Turli markalarga (AI-72, AI-76, AI-93) ajratiladi. Benzinning oktan soni qancha katta bo'lsa, uning sifati ham shunchalik yuqori baholalanadi.

Benzinning detonatsiyaga qarshi xususiyatini oshirish uchun har 1 litriga 1g antidetonator — $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$ tetra etilqo'rg'oshin mo-

laylanadi. Bu modda benzindagi to'g'ri zanjirli uglevodorodlarning detonatsiyalanish xususiyatini kamaytiradi. Dvigatelda qo'rg'oshin birikmalarini yig'ilib qolishini kamaytirish uchun 1,2-dibrom etan $\text{Br}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Br}$ qo'shiladi. Bu modda ta'sirida PbBr_4 -qo'rg'oshin (IV)-bromid: $\text{CH}_3-\text{PbBr}_3$ hosil bo'lib, chiqindi gaz holida chiqib ketadi. Oson uchuvchan modda hosil bo'lib, chiqindi gaz holida chiqib ketadi. Lekin bu atrof muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shu sababli keyingi vaqtda bu moddani benzina qo'shmaslik va boshqa antidetonatorlar ishlatish choralarini ko'rilayapti.

Ligroin — dizel yonilg'isi, lak-bo'yoq sanoatida erituvchi va benzin xomashyo sifatida ishlatiladi.

Kerosin — reaktiv dvigatellar, uy-ro'zg'orda yonilg'i, erituvchi sifatida, tibbiyotda ishlatiladi.

Solyar moylari — motor yonilg'isi sifatida ishlatiladi. **Vazelin** — tarkibida $\text{C}_{12}-\text{C}_{20}$ uglerod atomlari bo'lgan suyuq va qattiq uglevodorodlar aralashmasi, tibbiyot va texnikada ishlatiladi.

Parafin — tarkibida uglerod atomlari C_{16} dan ko'p bo'lgan qattiq uglevodorodlar aralashmasi. Tibbiyotda, yog'ochga ishlov berishda, qalam, gugurt, sham ishlab chiqarishda qo'llaniladi.


Mazut — benzin, surkov moylari olishda xomashyo va issiqlik (bug') manjalarida yonilg'i sifatida ishlatiladi.

Neftni haydash bilan olingan benzin juda kam va sifat jihatidan talabni qondirmasligi sababli neft mahsulotlari ikkilamchi qayta ishlanadi.

Ikkilamchi qayta ishlash. Neftdan olinadigan benzin miqdorini oshirish va neftni haydashdan qolgan mahsulotlar tuzilishini o'zgartirish maqsadida neft ikki usulda qayta ishlanadi. Bular — neftni krekinglash va nforminglashdir.

1. **Neftni krekinglash** — neft tarkibidagi katta molekulyar massadagi (C_{12} dan boshlab) uglevodorodlarni kichik molekulyar massadagi uglevodorodlarga aylantirishdir.

Krekinglash ikkiga bo'linadi: a. **Termik krekinglash.** Mazutni 450—500°C va P=2—7 MPa da qizdirish natijasida kichik molekulyar massali to'yinagan va to'yinmagan uglevodorodlarga aylantirishdir:



Termik kreking natijasida neftdan olinadigan benzin oshiriladi va kimyo sanoati uchun xomashyo — to'yinmagan uglevodorodlar olinadi.

b. *Katalitik krekinglash*. Bunda neftni birinchi qayta ishlash natijasida olingan gazoyl fraksiyasi katalizator (alyumosilikatlar) ishtirokida qayta ishlanadi. Shu usul bilan aviatsiya benzini olinadi.

Katalitik krekingda to'g'ri zanjirli uglevodorodlar tarmoqlangan zanjirli birikmalarga aylanib, uning yonuvchanlik xossasini (oktan va neftdan benzin olish unumini 80% gacha oshiradi).

Kreking jarayonida tarkibida C_1-C_4 atomlari bo'lgan to'yinmagan yoki to'yinmagan uglevodorodlar hosil bo'ladi. Bu gazlar aralashma *kreking gazi* deyiladi. Kreking gazi kimyoviy sanoat uchun xomashyo sifatida ishlatiladi.

2. Al_2O_3 , Mo va Pt katalizatori ishtirokida to'g'ri zanjirli (C_5-C_{10}) uglevodorod va sikloparafinlar aromatik uglevodorodlarga aylanib, benzin sifati yaxshilanadi. *Bu jarayon neftni riforminglash* deyiladi.

Neftni qayta ishlash turlariga neft pirolizi ham kiradi. Bunda havosiz sharoitda qizdiriladi. Piroliz mahsulotlari sifatida to'yinmagan uglevodorodlar (etilen, asetilen) va aromatik uglevodorodlar (benzin, toluol, ksilol) olinadi. Shu sababli bu jarayon *neftni aromatlash* deyiladi.

Neft faqat yoqilg'i mahsulotlari olinuvchi tabiiy manba bo'lmagan kimyoviy moddalar olish uchun xomashyo hamdir. Shu maqsadga erishish uchun Respublikamizning asosiy neft zahiralari saqlangan janubiy hududlarida Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va uning atrofida katta kimyo korxonalari ishlab chiqarish majmualari barpo etilyapti. Bularga Farg'ona va Oltin yo'l neftni qayta ishlash zavodlari kiradi. Bu yirik ishlab chiqarish majmualarining barpo etilishi O'zbekiston Respublikasining neft mahsulotlari qilligini ta'minlaydi.

XXX.2. Tabiiy gaz va uni qayta ishlash

Uglevodorodlarning tabiiy manbalari qatoriga tabiiy gazlar ham kiradi. Dunyo bo'yicha shartli yoqilg'ining 22% ni gaz tashkil etadi. O'zbekiston Respublikamizdagi yirik tabiiy gaz konlari Gazli, Muborak, Sho'rtan, Ko'kdumaloqda bo'lib, ularning tarkibida 90%—96% gacha metan, qolgan qismi C_2H_6 , C_3H_8 , H_2S , H_2 , CO_2 , H_2O va boshqa moddalardan iboratdir.

Tabiiy gazlar qatoriga neft va toshko'mir konlarida mavjud bo'lgan gazlar ham kiradi. Bu gazlar tarkibida metanning miqdori 30—40% ni tashkil etadi, etan, propan, butan ko'p bo'ladi. Qo'shimchalar sifatida H_2 , CO , H_2O lar bo'ladi.

Tabiiy gazni qazib chiqarilgandan so'ng avvalo yonmaydigan qazilmalardan tozalanadi. Gaz tarkibidagi namlik miqdori kamaytirilib, CO va, asosan H_2S dan tozalanadi. Chunki oltingugurt borligi sababli gazni ishlashga yaroqli emas.

Shu sababli gazlar birinchi qayta ishlash jarayonida H_2S va CO dan tozalanib, tabiiy gaz bilan birgalikda oltingugurt moddasi ham ishlab chiqariladi. Muborak gazni qayta ishlash zavodi Sho'rtan va Ko'kdumaloqda Muborak gaz konlaridan chiqadigan gazni qayta ishlashga rejalashtiriladi.

Ikkinchi bosqichda to'yingan C_3H_8 , C_4H_{10} uglevodorodlar tozalanib etilen, propilen butadiyengacha aylantiriladi va plastmassalar, kauçuk hamda tolalar ishlab chiqarishda va oksidlash reaksiyalari uchun spirt organik kislotalar ishlab chiqariladi. Tabiiy gazning asosiy qismi issiqlik energiyasi manbai — yonilg'i sifatida ishlatiladi. O'rta hisobda 1 m³ tabiiy gaz yonsa, 544000 kJ energiya ajralib chiqadi.

XXX.3. Toshko'mirni qayta ishlash

Uglevodorodlarning tabiiy manbalariga toshko'mir ham kiradi uning yonilg'i shartli yonilg'i energetikasidagi hissasi 27% ni tashkil etadi. Toshko'mirni qayta ishlash — uni havosiz joyda qizdirish (pirolizlash) dan iborat. Bunda asosan *koks, toshko'mir smolasi va koks gazlari* olinadi. Toshko'mirni pirolizlaganda tarkibidagi moddalar parchalanib, toshko'mir smolasiga va uchuvchan moddalarga aylanadi.

Uchuvchan moddalar "gaz yig'gich"da yig'iladi. Toshko'mir smolasini tozalanib tarkibiy qismlarga ajratiladi, undan asosan benzol, fenol hamda toshko'mir gomologlari olinadi. Gaz yig'gichdagi suyuq aralashma tarkibida toshko'mir, vodorod sulfid va fenol bo'lib, bu aralashmani qayta haydab tozalanib boshqa moddalar ajratib olinadi.

Qizdirish natijasida qolgan oxirgi qattiq tarkibiy qism *koks* deyilib, uning 95% toza ugleroddan iborat bo'ladi. Koks yonilg'i sifatida, metallurgiyada qaytaruvchi sifatida va kimyo sanoatida xomashyo sifatida ishlatiladi.


XXXI bob. KISLORODLI ORGANIK BIRIKMALAR SPIRTLAR

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: spirtlar, birlamchi, uchlamchi spirtlar, bir atomli, ko'p atomli spirtlar, metanol, etanol, glitserin, oddiy efirlar, fenollar, aromatik spirtlar.

Tarkibida kislorod atomlari tutgan organik moddalardan binoan avval uglevodorodlardagi bir yoki undan ortiq vodorod atomining bir yoki bir necha hidrokسيل gruppalariga almashtirilishi natijasida hosil bo'lgan organik moddalar spirtlar deyiladi.

Molekulasidagi hidrokسيل gruppalarining soniga qarab, spirtlar birlamchi — CH_3OH , ikki atomli — $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$ va ko'p atomli — $\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH}$ bo'ladi.

Gidrokسيل gruppasi bilan bog'langan radikal turiga ko'ra, spirtlar to'yingan, to'yinmagan, atsiklik va siklik bo'ladi. Ular hidrokسيل gruppasi qanday uglerod atomi bilan bog'langanligiga qarab, birlamchi, ikki atomli va uchlamchi spirtlarga bo'linadi:




Aromatik oksibirikmalar ham mavjud bo'lib, ular jumlasiga fenollar, aromatik spirtlar kiradi. Fenollarda $\text{C}_6\text{H}_5-\text{OH}$ hidrokسيل gruppasi benzol halqasiga bevosita bog'langan bo'lib, aromatik spirtlarda ular yonida $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{OH}$ bog'lanadi.

XXXI.1 Bir atomli to'yingan spirtlar

Bir atomli spirtlar to'yingan uglevodorod molekulasidagi bitta vodorod atomini hidrokسيل gruppasiga almashishidan hosil bo'ladi. Umumiy formulasi $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ yoki $\text{R}-\text{OH}$, bunda $\text{R}-$ alkil radikali ($\text{C}_n\text{H}_{2n+1}-$).

To'yingan uglevodorodlarga o'xshab, bir atomli spirtlar ham gomologik qatorda hosil qiladi. Bu qatordagi barcha a'zolar bir-biridan bir yoki bir necha $(-\text{CH}_2-)$ gruppaga farq qiladi.


Spirtlarda izomeriyaning ikki turi, uglerod zanjirining izomeriyasi va zanjiridagi hidrokسيل gruppasi holatining izomeriyasi uchraydi. Masalan, etil spirtning izomerlari yo'q, propil spirti ($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$) ikkita izomerga ega:



Butil spirtning izomerlari yuqorida keltirilgan edi.

Nomenklaturasi: oddiy spirtlarning tarixiy nomi hidrokسيل gruppasi bilan bog'langan uglevodorod radikallari nomiga spirt so'zini qo'shib olinadi. Masalan: yuqoridagi spirtlar propil spirti va izopropil spirti nomlanadi.

Sistematik nomenklaturaga binoan avval tarmoqlangan uglerod atomi nomiga, keyin unga birikkan radikal nomi, undan keyin tegishli to'yingan uglevodorodlar nomiga "ol" qo'shimchasini qo'shib, hidrokسيل gruppasi bilan bog'langan uglerod atomining raqami ko'rsatiladi. Zanjimi raqamlash hidrokسيل gruppasiga yaqin tomondan boshlanadi.





Olinish usullari

To'yingan bir atomli spirtlarning olinish usullari va xossalarini metanol misolida o'rganamiz.

Eterifikatsiya reaksiyasi qaytar jarayon bo'lib, bunda murakkab birikmalar o'zaro ta'sirlashib (gidrolizlanib), spirt va kislota ga aylanadi.


3. Spirtlarga vodorod galogenid va fosforli galoid birikmasi bilan ta'sirlashib, ta'sirida aldegid, ikkilamchi spirtlar oksidlanganda hosil bo'ladi:



Birinchi reaksiya ham qaytardir. Reaksiya oxirigacha borishi spirt to'yingunga qadar gazsimon vodorod galogenidlar (kislota) yoki spirt vodorod galogenid kislota ning konsentrlangan eritmasi qizdiriladi.


4. Spirtlarga suv tortib oluvchi moddalar yoki katalizatorlar bilan ta'sirlashib, ta'sirida aldegid, ikkilamchi spirtlar oksidlanganda hosil bo'ladi.

a) spirtlar mo'l miqdordagi konsentrlangan sulfat kislotasi bilan ta'sirlashib, ta'sirida aldegid, ikkilamchi spirtlar oksidlanganda hosil bo'ladi ($t^{\circ} > 140^{\circ}\text{C}$):





Spirtlar o'zaro reaksiyaga kirishib oddiy efirlarni hosil qiladi.

b) *Tarkibi $\text{R}^1\text{—O—R}^2$ ga to'g'ri keladigan organik moddalar efirlar deyiladi.* Oddiy efirlar spirtlarning o'zaro reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Masalan: mo'l miqdordagi etil spirt konsentrlangan sulfat kislotasi bilan ta'sirlashib, ta'sirida aldegid, ikkilamchi spirtlar oksidlanganda hosil bo'ladi ($t^{\circ} < 140^{\circ}\text{C}$):



Dimetil efiri gazsimon modda bo'lib, dietil efiri oson uchmoq moddadir, ular yonishga xavfli moddalar hisoblanadi. Dietil efiri anesteziya bo'shashtirish xossasiga ega bo'lgani uchun *narkoz efiri* ham deyiladi. Tibbiyotda qo'llaniladi.

Spirtlar oksidlanadi. Birlamchi spirtlar oksidlanganda kuchli oksidlovchilar (KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) ta'sirida yoki Pt, Cu — katalizatorlari ta'sirida kislorod ta'sirida aldegid, ikkilamchi spirtlar oksidlanganda hosil bo'ladi:



Spirtlar havo kislorodi ishtirokida yonadi:



Bir atomli spirtlarning muhim vakillari

Metil spirti (metanol) CH_3OH rangsiz, o'ziga xos hidli suyuqlik. Metil spirti turli organik moddalarni (formaldegid) sintez qilish uchun asosiy reagent sifatida ko'p miqdorda ishlatiladi. Undan farmatsevtikada, foto-reaktivlar, bo'yoq moddalar sintezida foydalaniladi.


Etil spirti ko'pincha erituvchi sifatida va turli kimyoviy birikmalar sintez reagenti sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari, etil spirtidan dastlabki xomashyo sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari, etil spirtidan qat sanoatida, konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda ham foydalaniladi. Sintetik kauchuk ishlab chiqarishda, parfyumeriya, lak-bo'yoq ishlab chiqarishda, anatomik namunalarni saqlashda konservant sifatida keng qo'llaniladi.

Ko'p atomli spirtlar

Gidrovodorod molekulasi dagi ikki yoki undan ortiq vodorod atomlarini o'z ichiga olgan spirtlarni ko'p atomli spirtlar deyiladi. Molekulasi dagi gidroksil gruppasining soniga qarab ular bir atomli (diollar), uch atomli (triollar), hokazo spirtlarga bo'linadi. Bir atomli spirtlar glikollar, uch atomli spirtlar glitserin deyiladi.

XXXI.2. Ikki atomli spirtlar (diollar yoki glikollar)

Ikki atomli spirtlar (glikollar) molekulasida ikkita gidroksil guruh bo'lib, umumiy formulasi $C_nH_{2n}(OH)_2$ ga to'g'ri keladi. Ikki spirtlarning ratsional nomlari tegishli olefinlarning nomlariga glikol qo'shish bilan tuziladi:




Sistematik (IYUPAK) nomenklaturaga ko'ra to'yin uglevodorodlarning nomiga diol qo'shimchasi qo'shib aytiladi. Gidroksil guruh birikkan uglerod atomlari raqamlar bilan ko'rsatiladi. (Yuqorida qavslar ichida ko'rsatilgan nomlanishga qarang.)

Ikki atomli spirtlarning eng muhim vakili **etilenglikol** hisoblanadi. Etilenglikol rangsiz, shirin ta'mli, qovushqoq suyuqlik. Vodorod bo'linishi sababli 197°C da qaynaydi. Suv va spirtlar bilan yaxshi aralashadi.

Olinish usullari: 1. a. Etilenni kaliy permanganat eritmasi bilan oksidlab olinadi:




b. Sanoatda etilen (neft krekingi mahsuloti) dan etilenglikolning olinishi quyidagi reaksiyalarga asoslangan:



d. Bu reaksiyani ishqoriy muhitda ham olib borish mumkin:




Etilen oksidi kislotali muhitda suv bilan birikishi tufayli glikol hosil bo'ladi:



Fizik xossalari. Spirtlar molekulasiga ikkinchi gidroksil guruh qo'shishi natijasida ikki atomli spirtlarda bir atomli spirtlarga xos bo'lgan xossalarga qo'shiladi va shirin ta'mli bo'lib qoladi. Quyi glikollar moysimon moddalar bo'lib, suvda yaxshi eriydi. Yuqori glikollar qattiq kristall moddalardir. Glikollar yuqori temperaturada qaynashi, juda past temperaturada muzlashi xususligining yuqori bo'lishi bilan tegishli bir atomli spirtlardan farq qiladi.


Kimyoviy xossalari. Glikollar bir atomli spirtlarga xos bo'lgan barcha kimyoviy xossalarga kirishadi. Lekin ularning molekulasida ikkita gidroksil guruh bo'lgani uchun reaksiyada bitta yoki ikkala gidroksil guruh ham qatnashishi mumkin.

1. Etilenglikolga ishqoriy metallar ta'sir ettirilganda glikolyatlar hosil bo'ladi:




Aynan shunday reaksiya NaOH ishtirokida borib, vodorod gazi o'rinda dinatriyetilenglikolyat hosil bo'ladi.

2. Etilenglikolga yangi tayyorlangan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ta'sir ettirilsa, ko'k mis chirkama hosil bo'ladi. Bu diollarga xos sifat reaksiyasidir:





3. Agar nitrat kislota bilan aralashtirilsa, murakkab efir — lenglikol hosil bo'ladi:



Dinitroetilenglikol tibbiyotda yurak-qon tomirlarini kengaytirish vosita va portlovchi modda sifatida ishlatiladi.


4. Glikollarga konsentrlangan sulfat kislota yoki rux xloridi qo'shilganda suv ajralib chiqadi. Natijada alkilenoksid yoki alkenon hosil bo'ladi. Masalan, etilenglikol degidratlanishi natijada etilen oksid yoki reaksiya sharoitiga qarab sirkaldegid hosil bo'ladi:

bir molekula suvning ajralishi natijasida etilen oksidi yoki sirkaldegid hosil bo'ladi:



Etilenglikolning ishlatilishi. Etilenglikolning suvli eritmasi juda past temperaturada muzlash xossasiga ega bo'lgani uchun *antifriz* sifatida tayyorlashda foydalaniladi.


Etilenglikol murakkab efirlar, lak-bo'yoq va sun'iy tolalar tayyorlashda muhim xomashyo hisoblanadi:



XXI.3. Uch atomli spirtlar (triollar). Glitserin


Glitserin — turli uglerod atomlarida uchta gidroksil gruppaga bo'lgan uch atomli spirtlar ($\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_3$) uch atomli spirtlar deyiladi. Uch atomli spirtlar eng oddiy vakili — glitserin — $\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH}$. Uning IUPAK nomenklaturasiga ko'ra propantriol — 1, 2, 3 deb ataladi. Glitserin tabiatda erkin holda uchramaydi, lekin murakkab organik birikmalarning tarkibiga kiradi.

Glitserin sanoatda yog' va moylarni ishqoriy muhitda gidrolizlash natijasida olinadi:



R — yog' yoki moy tarkibiga kirgan kislota radikali.

Hozirgi vaqtda glitserin sanoatda kreking gazlari tarkibidagi etilen oksid bilan oksidlanib olinadi:




Glitserin quyruq, moysimon, shirin mazali suyuqlik, zichligi 1,26 g/cm³, 290°C da qaynaydi. Gigroskopik modda, suv bilan istalgan nisbatda aralashadi, spirtlarda eriydi, lekin efir va xloroformda erimaydi. Kimyoviy xossalari jihatidan glitserin spirtlarga xos bo'lgan barcha xossalarga kirishadi. Uning kimyoviy xossasi bir



atomli spirtlarnikiga o'xshash, lekin glitserinning bir, uchchala gidroksil gruppasi ham reaksiyaga kirishishi mumkin.

Shuning uchun ham glitserin mono-, di- va tri- almashirilgan birikmalar hosil qiladi:

a) glitseringa ishqor ta'sir ettirib, glitseratlar olinadi. Bunda reaksiyaga kirishayotgan gidroksil gruppalarining soniga qarab monoglitseratlar, diglitseratlar va triglitseratlar hosil bo'lishi mumkin.




b) glitserin diollar singari ikki valentli mis gidroksid ta'sirida glitseratlar (kompleks birikmalar) hosil qiladi:




Mis (II) diglitserati

reaksiyasidan glitserinni spirtlardan farq qilish uchun foydalaniladi.

Glitseringa anorganik va organik kislotalar ta'sir ettirilganda murakkab birikmalar hosil bo'ladi:



1, 2, 3-trinitroglitserin




Glitserinning nitroefirlari og'ir moysimon suyuqlik, portlovchi moddalar, lekin spirtli eritmasi portlamaydi, dori sifatida ishlatiladi, organik moddalar bilan hosil qilgan efirlari — yog'lar va moylardir.


Glitserin oziq-ovqat sanoatida vino, likyor, limonad, ichimliklarga mazali maza berishda, to'qimachilik sanoatida matolarga pardoz berishda, tibbiyot texnika sanoatida, parfyumeriya, tibbiyot va kundalik turmushda foydalaniladi.

XXXI.4. Fenollar

Gidroksil gruppasi bevosita aromatik halqadagi uglerod atomlariga bog'langan organik moddalar *fenollar* deyiladi. Fenollar ham spirtlar singari bir atomli (fenol), ikki atomli (pirokatexin, uch atomli (pirogallol) va ko'p atomli bo'ladi:



Piropatexin



Piropagallol


Fenol va uning xossalari.

Bir atomli fenollarning eng oddiy vakili — fenoldir.


Fizik xossalari. Fenol o'ziga xos hidli rangsiz kristall, lekin turishi natijasida havo kislorodi ta'sirida och-binafsha rang hosil bo'ladi. 42,3°C da suyuqlanadi va 182°C da qaynaydi. Suvda (1 g/100 g suv) eriydi. Teriga tegsa yallig'lantiradigan zaharli modda, antiseptik xossaga ega.

Nomenklaturasi. Fenol va uning hosilalari ko'pincha tarqalgan nom bilan ataladi. Agar halqada o'rinbosarlar bo'lsa, benzol halqasi o'rinbosar gruppasi turgan joydan boshlab raqamlanadi va avval o'rinbosar uglerod atomi raqami, keyin o'rinbosar nomi, oxirida esa "fenol" qo'shib aytiladi.

Izomeriyasi. Fenolning izomeri yo'q. Fenol gomologlarining izomeriyasi halqadagi o'rinbosarlar holati va yonaki zanjirining izomeriyasidan kelib chiqadi. Shunga ko'ra, fenolning gomologlari tilfenol — $\text{CH}_3\text{—C}_6\text{H}_4\text{—OH}$ — *krezolning uchta izomeri* mavjud.



2-metilfenol
(o-krezol)




3-metilfenol
(m-krezol)




4-metilfenol
(p-krezol)

Agar krezoldagi OH-gruppasi yonaki zanjirga o'tgan holatda modda *benzil spirti* deyiladi. Boshqacha aytganda *aromatik spirt*. Aromatik spirtlarning tuzilishi va xossalari fenollardan farq qilib (to'yingan) spirtlarga o'xshashdir. Ularga misollar:



Benzil spirti
(fenilmetanol)




Feniletil spirti
(2-feniletanol)

Tabiatda fenollar asosan toshko'mir tarkibida uchraydi. Shu toshko'mir fenol va uning gomologlari toshko'mir smolasi haydalganda hosil bo'lgan ikkinchi fraksiya (qoramoy fraksiyasi)ni ishqorlar bilan qayta ishlash natijasida fenollarga aylantirilib, ularni kislotalar bilan qayta ishlash natijasida fenol va atseton olinadi.

Fenolni olishning sintetik usuli — *kumol* usulidir. Kumol — izopropil benzoat bo'lib, undan fenol olish juda qulaydir. Bunda avval benzol propilen bilan birikib kumolga aylanadi, so'ngra uni katalitik oksidlab gidroperoksidi — oraliq mahsulotga o'tkaziladi. Bu modda kislotali muhitda ishlash natijasida fenol va atseton olinadi:



Kumol




gidroperoksidi


Fenol

Aceton

Shunday qilib, fenol Kekule usuli bo'yicha benzol sulfo-kislota natriyli o'zlashuvchi natriy qo'shib, suyuqlanguncha qizdirish bilan olinadi:




Aromatik galogenli birikmalar (xlorbenzol)ni gidroliz qilib ham fenol olinadi:




Reaksiya natijasida qisman $\text{C}_6\text{H}_5\text{—O—C}_6\text{H}_5$ — difenil efiri ham hosil bo'ladi.

Kimyoviy xossalari. Fenollarning kimyoviy xossalari molekulasida OH-gruppasi mavjudligi va benzol halqasining tabiati bilan bog'liqdir. Ma'lumki, tuzilish nazariyasining uchrida binoan molekuladagi atomlar va atomlar gruppallari bir-biriga ta'sir etib, moddalarning xossalari shu ta'sirga bog'liq edi. Shuning uchun fenollarda ham benzol halqasi OH-gruppasining elektron bulutini o'zidan benzol halqasiga siljituvchi gruppalar kiritilgan holda benzol halqasiga OH-gruppasining birikishi halqaning elektron siljishiga olib keladi va shu sababli 2,4,6-holatlardagi H-ning harakatchanligi ortadi (b). Shuning uchun fenol benzoldan holda brom, nitrat kislota bilan ancha tez ta'sirlashib, uchta atomini almashtiradi:

Shu sababdan fenol ($K_a = 1 \cdot 10^{-10}$) dan alifatik spirtlar (etanol $K_a = 10^{-16}$) dan farqli holda kuchsiz kislotalik xossasini yorqin namoyish etadi. Uning nomini **karbol kislota**si deyilishining sababi ham shundaki:




(a)




(b)

Buning isboti sifatida fenolga natriy ishqori ta'sir ettirilsa, qattiq natriy fenolyat hosil bo'lib, uni ajratib olish mumkin. Lekin e'tibor bilan bu reaksiya faqat eritmada borib, qaytarligi sababli natriy fenol ajratib olib bo'lmaydi:




Ammo, natriy fenolyat tuzi ochiq havoda qoldirilsa, havodagi CO₂ namlik ta'sirida qaytadan fenolga aylanadi:




Chunki, fenolga nisbatan kuchliroq bo'lgan karbonat kislota hosil bo'lib, siqib chiqaradi. Fenolning kislotalik xossasi juda kuchsizligi sababli eritmasi lakmus rangini o'zgartira olmaydi.

Agar fenollarning benzol halqasi tarkibiga elektron bulutini o'zidan benzol halqasiga siljituvchi gruppalar —NO₂, —CHO, —CN kiritilsa, uning kislotalik xossasi kuchayadi.


Elektron bulutini o'zidan benzol halqasiga siljituvchi gruppalar kiritilsa, fenolning kislotalik kuchi kamayadi. Shuning uchun fenol benzoldan holda brom, nitrat kislota bilan ancha tez ta'sirlashib, uchta atomini almashtiradi:




Tribrom fenol suvda erimasligi sababli oq rangli geterogen faza holida bo'ladi.




bu reaksiyada nitrat kislota suvultirilgan eritmasi ishlatilsa, o-nitrofenol (o-nitrofenol) va paranitrofenol aralashmasi hosil bo'ladi. Fenolga sulfat kislota ta'sir ettirilsa, orto- va parafenol sulfokislotalar aralashmasi hosil bo'ladi:





bu moddalar organik sintezda va sintetik yuvish vositalari ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Fenol yuqori bosim, temperaturada va nikel katalizatori yordamida vodorodni biriktirib, qaytariladi va siklogeksanolga aylanadi:





Fenollarga xos sifat reaksiya. Fenollarga FeCl_3 ning eritmasi qo'shilgan holda, qizil rangli kompleks birikma hosil bo'ladi. Bu reaksiya fenollarga xos reaksiya sifatida foydalaniladi.

Fenolning ishlatilishi. Fenol zaharli modda bo'lgani uchun antiseptik modda sifatida foydalaniladi. Uning hosilalaridan turli plastmassalar va smolalar (fenoplastlar), qurilish materiallari, oshlovchi moddalar, yuvish vositalari sintez qilinadi va ishlatiladi.

ALDEGID VA KETONLAR

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: aldegidlar, karbonil guruh, kumush-ko'zgu reaksiyasi, chumoli va sirka aldegidi, poliformaldegid, paraldegid, polikondensatsiyalanish reaksiyasi, fenolformaldegid.

Aldegid va ketonlar oksobirikmalar sinfiga kirib, ularda funksional guruh — karbonil gruppasi $>\text{C}=\text{O}$ dir. Ularni uglevodorodlardagi ikkinchi atomi kislorod atomiga almashingan hosila deb qaraladi. Aldegidlar karbonil gruppasi bir tomondan uglevodorod radikali, ikkinchi tomondan vodorod bilan bog'langan bo'ladi. Ketonlarda esa karbonil gruppasi ikki tomondan uglevodorod radikallari bilan bog'langan bo'ladi:



Aldegid va ketonlar ochiq va yopiq zanjirli (atsiklik, siklik) to'yingan bo'lishi mumkin: aldegid va ketonlarda asosiy funksional guruh ($>\text{C}=\text{O}$) karbonil gruppasi bo'lgani uchun kimyoviy xossalari bir xil bo'lib, ularning yagona oksobirikmalar sinfi ekanligidan dalolat beradi.

Lekin ayrim xossalari bilan o'zaro farqlanib alohida-alohida organik qatorlar qatorini tashkil etadilar.

To'yingan aldegid va ketonlarning gomologik qatori bir xil umumiy formulaga $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ ga ega va ular $n>3$ dan boshlab o'zaro izomer bo'ladi.

XXXI.5. Aldegidlar

Tarkibida uglevodorod radikali va aldegid gruppasi saqlagan organik moddalar aldegidlar deyiladi.

14-jadval


Aldegidlarning gomologik qatori va fizikaviy xossalari

Nomi	Formulasi	$t_{\text{mayuq}}^\circ\text{C}$	$t_{\text{qayn}}^\circ\text{C}$	Zichligi d, g/sm ³	Sind. ko'rsatkichi, n
Chumoli aldegid	$\text{H}-\text{CHO}$	-92	-21	—	—
Sirka aldegid	CH_3-CHO	-122	21	0,781	1,331
Propion aldegid	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$	-81	49	0,807	1,364
Moy aldegid	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CHO}$	-99	76	0,817	1,384
Izomoy aldegid	$(\text{CH}_3)_2-\text{CH}-\text{CHO}$	-66	62	0,794	1,373



Nomenklaturasi va izomeriyasi. Aldegidlarni *trivial nomenklatura* nomlashda tegishli karbon kislotalar nomidagi "kislota" so'zini "al" so'zi bilan almashtirish orqali hosil qilinadi, chunki aldegidlar oksidlanish natijasida tegishli kislotalarga aylanadi.

Sistematik nomenklaturaga ko'ra, aldegidlar nomi ularga mos bo'lgan uglevodorodlar nomiga "al" qo'shimchasi qo'shish bilan hosil qilinadi.

Uglerod atomlari aldegid guruhdagi C — atomidan boshlab raqamlanadi.



Aldegidlarning izomeriyasi uglevodorod zanjiridagi radikalning izomeriyasiga bog'liq. Chumoli, sirka va propion aldegidlarning izomeriyasi yo'q. Molekulasida to'rtta uglerod atomi bo'lgan aldegid ikki izomer, beshta uglerod atomi bo'lgan aldegid esa to'rtta izomerga ega.



Aldegidlarning olinishi

1. Chumoli aldegidi laboratoriyada metanolni CuO bilan o'zaro oksidlanish natijasida olinadi:




2. a) sanoatda chumoli aldegidi (formaldegid) metanolni oksidlash yo'li bilan olinadi. Buning uchun metanol 300°C da kislorodi bilan gaz fazasida mis yoki kumush katalizatorlari ishtirokida oksidlanadi:




b) chumoli aldegidni sanoatda olishning yana eng arzon usuli — oksidlab olishdir:



3. Chumoli va sirka kislotalari bug'lari aralashmasi 300—350°C da MnO₂ katalizatorlari ishtirokida qizdirilsa, sirka aldegidi (atsetaldegid) hosil qilinadi:



4. Sirka aldegidni sanoat miqyosida olishda Kucherov reaksiyasidan foydalaniladi:




Aldegidlarning fizik xossalari. Aldegidlar gomologik qatori birinchi — chumoli aldegidi o'ziga xos o'tkir hidli gaz. Sirka, moy, valeriyal aldegidlari suyuq moddalar bo'lib, yuqori molekulyar massaliklari suyuq moddalardir. Aldegidlar tarkibidagi uglevodorod radikalining o'lchami bilan ularning suvda eruvchanligi kamayadi. Aldegidlar spirt va suvda yaxshi eriydigan moddalardir. (14 jadval).

Aldegidlar funksional gruppasining vodorod bog'lanish hosil qilish qobiliyatlari pastligi sababli ular tegishli spirtlarga nisbatan past temperaturada qaynaydi. Bu aldegidlarning tuzilishiga (normal yoki tarqalganligiga) ham bog'liq.

Yuqori aldegidlar o'ziga xos xushbo'y hidli moddalardir.

Kimyoviy xossalari. Aldegidlarning kimyoviy xossalari ularning karbonil gruppasi elektron tabiati bilan izohlanadi. Karbonil gruppasi — >C=O — x-bog' ko'proq qutblangan bo'lib, shu bog'ning oson uzilishi hisobiga aldegidlar turli xossalarni namoyon qiladilar.




Polikondensatsiyalanish reaksiyalari

Aldegidlardagi karbonil gruppasi bir tomondan boshqa modda harakatchan vodorod atomlari bilan birikib spirt gruppasi, tomondan esa boshqa radikalni biriktirib yangi modda hosil qiladi. Reaksiyalar polikondensatsiyalanish mexanizmda borib, o'ziga xos xarakterli yuqori molekulyar birikmalar sintezining asosiy usullaridan hisoblanadi. Shunday moddalar qatoriga fenolformaldegid smolasi bo'ladi.


Funksional gruppalar saqlagan kichik molekulyar massali moddalar (monomerlar) ning o'zaro birikib past molekulyar massali moddalar (HCl , NH_3) ajralib chiqishi bilan birga yuqori molekulyar birikmalar hosil qilishi **polikondensatsiyalanish reaksiyasi** deyiladi.

Bunday reaksiyalar natijasida fenolformaldegid smolasi, polifenolformaldegid, poliefir tolalar, oqsillar, nuklein kislotalar, kraxmal va sellyuloza hosil bo'ladi.

Formaldegidning fenol bilan o'zaro ta'sirlashuv reaksiyasi quyidagicha boradi. Harakatchan vodorod atomlari saqlagan fenol formaldegid bilan karbonil gruppasi bilan ta'sirlashadi:



Fenolformaldegid



Polifenolformaldegid smolasi

Hosil bo'lgan yuqori molekulyar modda yengil, lekin mexanik zarbga chidamli plastmassa — **fenoplast** sifatida keng ishlatiladi. Ushbu plastmassadan qurilish materiallari, mashina detallari, izolyatsiyalovchi materiallar, nozik jihozlarni transportirovka qilish (tashish)da himoyalovchi vositalar hamda uy-ro'zg'or buyumlari tayyorlanadi.

XXXI.6. Ketonlar

Organiladigan tushunchalar: *ketonlar, aseton.*

Ketonlar deb, tarkibida karbonil gruppasiga turli radikallarning birikishi bilan hosil bo'lgan organik moddalarga aytiladi. Ularning umumiy formulasi C_nH_mO bo'lib, $R'-C(O)-R''$ ko'rinishda yoziladi.

Ketonlarning gomologik qatori va ularning ayrim xossalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

15-jadval

Ketonlarning asosiy xossalari




Nomi	Formulasi	$t_{suyuq}, ^\circ C$	$t_{qayn}, ^\circ C$	Zichligi d, g/sm ³	Sind. ko'rsatkichi, n
Dimetilketon	$CH_3-C(O)-CH_3$	- 95	56	0,792	1,364
Metiletileteton	$CH_3-C(O)-C_2H_5$	- 86	80	0,805	1,384
Metilpropilketon	$CH_3-C(O)-C_3H_7$	- 76	102	0,809	1,389
Dietileteton	$C_2H_5-C(O)-C_2H_5$	- 42	103	0,816	1,388

Fizik xossalari. Ketonlarning kichik molekulyar massali vakillari suyuq, rangsiz, xos hidli, rangsiz moddalardir. Katta molekulyar massaliliklari qattiq moddalardir. Ketonlarning dastlabki vakillari suv bilan yaxshi aralashadi. Barcha ketonlar spirt va efirlarda yaxshi eriydi.

Nomenklaturasi. Ketonlarning nomi karbonil gruppasiga birikkan radikallari (avval kichigi, keyin kattasi) nomiga qo'yiladi.


“keton” so’zi qo’shish bilan hosil qilinadi. Birinchi keton dimetilketon *trivial nomga* ega bo’lib, *atseton* deyiladi.

Sistematik nomenklaturaga binoan ketonlarning nomi ularning uglevodorodlar nomiga “on” qo’shimchasini qo’shish bilan hosil qilinadi. Bunda karbonil gruppining zanjirdagi holati raqam bilan ko’rsatiladi. Raqamlash karbonil gruppaga yaqin tomondan boshlanadi.




Ketonlarning izomeriyasi. Ular tarkibidagi radikallarning izomeriyasi va karbonil gruppining asosiy zanjirda joylashgan o’rniga bog’liq bo’ladi. Bu holatlar yuqoridagi keltirilgan pentanonning izomerlari misolida ko’rsatilgan.

Ketonlarning olinishi. 1) ikkilamchi spirtlarni oksidlab, ketonlar olinadi:




2) ikkilamchi kislotalardan boshqa karbon kislotalar o’zaro qo’shib, ketonlar hosil bo’ladi:



3) karbon kislotalarning tuzlari quruq qizdirilsa, ketonlar hosil bo’ladi:

$$(\text{CH}_3-\text{COO})_2\text{Ca} \xrightarrow{t^\circ} \text{CH}_3-\text{C}(\text{O})-\text{CH}_3 + \text{CaCO}_3$$

4) atsetilen gomologlarining Kucherov reaksiyasi bo’yicha simob ishtirokida gidratlanishidan turli ketonlar hosil bo’ladi:



Ishlatilishi. Aseton (dimetilketon) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{O})-\text{CH}_3$, rangsiz o’ziga hidli, 56°C da qaynaydigan suyuqlik. Suv bilan xohlagan nisbatda erishadigan gigroskopik modda. Shu sababli ayrim sintezlarda suv toruluvchi modda sifatida ishlatiladi. Aseton qator organik moddalar (spirtlar, yog’lar, lak-bo’yoqlar) uchun yaxshi erituvchi sifatida ishlatiladi. Shu boisdan bu modda organik sintezda va kimyo sanoatida keng qo’llaniladi. Shu singari ketonlarning boshqa gomologik vakillari ham moddalar va turli erituvchilar qatorida ishlatiladi.

Aldegid va ketonlarni bir-biridan farqlash uchun kumush-ko’zgu yoki Feling suyuqligidan foydalaniladi.

Fel’g suyuqligi. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ va vino kislotasining Na va K li tuzi bilan qatnashmasi bo’lib (kompleks birikma), uning ishtirokida aldegidlar ketonlarga kirishib, ko’k rangli cho’kma sarg’ish-qizil rangli moddaga aylanadi.



Bu reaksiyalar faqat aldegidlar ishtirokida borib, ketonlar bunday reaksiyalarda qatnashmaydilar. Shundan foydalanib, bu moddalar bir-biridan ajratiladi.

Savol va mashqlar

1. Aldegidlar deb, qanday moddalarga aytiladi?
2. $C_5H_{11}C(O)H$ aldegidning izomerlarini yozing, ularni nomlang.
3. Sirka va chumoli aldegidlarini olishga doir barcha reaksiya tenglamalarini yozing.
4. 7,1 g noma'lum aldegid 2,16 g kumushni qaytargani ma'lum bo'lsa, shu aldegidning nomini aniqlang va izomerlari formulalarini yozing.
5. Metandan sirka aldegidni olish mumkinmi? Javobingizni aniqlang tenglamalari bilan asoslang.
6. Ketonlar deb qanday moddalarga aytiladi?
7. Atsetonni olish reaksiya tenglamalarini yozing. Unga izomer bo'lgan moddani nomlang va uning kimyoviy xossalari haqida qisqacha ma'lumot berib, moddani formulasi bilan yozing. Ularning kimyoviy xossalari haqida qisqacha ma'lumot berib, moddani formulasi bilan yozing.
8. Ketonlar aldegidlar bilan bir xil tarkibga ega bo'lsalar-da, "ketonlar" reaksiyasiga kirishmaydi. Sababini tushuntiring.

XXXI.7. Karbon kislotalar

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *karboksil gruppasi, karbon kislotalar, chumoli va sirka kislotalari, palmitin, stearin, olein kislotalari, angidridi, atsil radikali, formiatlar, atsetatlar, akril kislota, metakrilat, benzoil kislota.*

Karbon kislotalar deb, molekulasida uglevodorod radikali bilan bir yoki bir necha karboksil gruppalarini saqlagan birikmalarga aytiladi. Karboksil gruppasi *karbonil* $\rightarrow C=O$ hamda *gidroksil* $-OH$ gruppalarining birikishidan hosil bo'ladi: $-COOH$.

Karbon kislotalardagi karboksil gruppalarining soni kislotalarning asosligini belgilaydi. Uning soniga ko'ra bir asosli — monokarbon ($R-COOH$) va ikki asosli — dikarbon ($HOOC-R-COOH$) va ko'p asosli — polikarbon ($R-(COOH)_n$) kislotalar bo'ladi. Radikalning turiga ko'ra to'yingan, to'yinmagan va aromatik karbon kislotalar bo'ladi. Ularning boshqa turlari ham mavjud.

To'yingan karbon kislotalar

To'yingan karbon kislotalar uglevodorodlarning $-COOH$ gruppalarini saqlagan hosilalari bo'lib, bir asosli kislotalarning umumiy formulasi $C_nH_{2n-1}COOH$.

To'yingan karbon kislotalar gomologik qatoriga quyidagilar kiradi:

$H-COOH$ — chumoli kislota, metan kislota;
 CH_3-COOH — sirka kislota, etan kislota;
 CH_3-CH_2-COOH — propion kislota, propan kislota;
 $CH_3-(CH_2)_2-COOH$ — moy kislota, n-butan kislota;
 $CH_3-CH-COOH$ — izomoy kislota;
 $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ — valerian kislota, pentan kislota;
 $CH_3-(CH_2)_4-COOH$ — palmitin kislota (geksadekan kislota);
 $CH_3-(CH_2)_{16}-COOH$ — stearin kislota (oktadekan kislota).

Bu qatorning ayrim vakillari o'simlik va hayvon yog'lari va moylar tarkibida uchragani uchun ularni "yog' qatori" kislotalari ham deyiladi.

Nomenklaturasi va izomeriyasi

To'yingan bir asosli karbon kislotalarni nomlashda ko'pincha trivial nomenklaturadan foydalaniladi. Bu nomlashda kislota, dastlab qanday (xomashyo) tarkibida bo'lishi (yoki olinishi)ga asoslangan. Masalan: chumoli kislota — chumolidan, sirka kislota — uzum sirkasidan.

Sistematik nomenklatura (IYUPAK) ga asosan nomlashda:


- kislota nomi karboksil gruppasidagi uglerod atomi birinchi deb olinib, uning uzun zanjirning boshqa uglerod atomlari raqamlab chiqiladi;
- agar zanjir tarmoqlangan bo'lsa, avval tarmoqlangan uglerod atomi raqami, keyin yonaki zanjirdagi (eng kichik radikal nomidan boshlab) (radikal) nomi, asosiy zanjirga to'g'ri keluvchi kislota nomi aytiladi.

Masalan:

1 2 3 noto'g'ri


3 2 1 to'g'ri

CH_3-CH_2-COOH propan kislota





2,3-dimetilpentan kislota


Karbon kislotalarning izomeriyasi asosan uglevodorod radikal izomeriyasiga bog'liq. To'yingan uglevodorodlardagi singari izomerlari butan (moy) kislotasidan boshlanadi. Uning ikkita bor:

izo-moy kislota
2-metilpropan kislota


Pentan (valerian) kislota izomerlari:



3-metilbutan kislota




2-metil butan kislota

neopentan kislota
2,2-dimetil propan kislota

Karbon kislotalarning fizik xossalari. Alifatik karbon kislotalar dastlabki 10 ta vakili (C_1-C_{10}) suyuq, undan yuqorilari esa moddalardir. Konsentrlangan sirka kislota 17°C dan pastda qattiq moddada bo'ladi, shuning uchun "muzlagan sirka kislota" deyiladi. Uning molekulyar og'irlikka ega bo'lgan kislotalar nordon ta'mli, o'qir bo'lg'uvchi, zaharli


Karbon kislotalarning molekulari kuchli molekulararo va molekulyar vodorod bog'lari, suvli eritmada suv bilan ham vodorod bog'ini hosil qiladilar:



Shu sababli ular suyuq bo'lib, kichik molekulyar massaga ega bo'lgan kislotalar suvda yaxshi eriydi. Molekulasida uglerod atomlari soni ortib borishi bilan ularning suvda eruvchanligi kamayib boradi.

Kimyoviy xossalari. Karbon kislotalarning kimyoviy xossalari, karboksil gruppasi va unga birikkan uglevodorod radikali tuzilishi va tarkibiga bog'liq. Karbon kislotalarning kimyoviy xossalarini bilish uchun karboksil gruppasi tuzilishi va elektron tabiatini bilish kerak.

Karboksil gruppasi quyidagicha tuzilgan:




Unda uglerod atomining elektron orbitallari sp^2 -gibridlangan bo'lib, uglerod atomi oksidlanish darajasi (+3). Faqat chumoli kislotada +2 dir. Uglerod atomi va ikkita kislorod atomi "uchburchak tekisligida" joylashgan. Karbonil gruppasi uglerod va




kislorod atomlari o'zaro σ - va π -bog'lar (qo'shbog') orqali bog'langan. Gidroksil gruppasi uglerod bilan faqat σ — (birlamchi) bog'langan.

Karboksil gruppadagi "karbonil kislorodi" o'ziga elektron bulutib, ortiqcha (δ^-) zaryadga ega bo'ladi. Bu o'z navbatida gruppasi elektron buluti zichligini uglerod tomonga siljitadi. Vod atomi bilan kislorodning bog'lanishi kuchsizlanib qoladi. Buning sida vodorod atomi oson ajraladi va karboksil gruppasi karboksilat gruppasi aylanadi:



Ayrim hollarda $-\text{COOH}$ dagi OH-gruppa butunlay chiqib ketish natijasida "atsil" radikali hosil bo'ladi:




Misol sifatida $\text{H}-\text{C}=\text{O}$ (formil); $\text{CH}_3-\text{C}=\text{O}$ (atsil)

radikallarini keltirish mumkin.

Karbon kislotalarning gidroksil gruppasi hisobiga namoyon qiladigan kimyoviy xususiyatlari:



1. Karbon kislotalar metallar, metall oksidlari va karbonatlar bilan kislotalar, gidroksidlari singari reaksiyaga kirishadi. Tegishli karboksilat tuzlarini hosil qiladi:





Oringi (v) va (g) reaksiyalar karbon kislotalarga xos reaksiyalar bo'lib, ular faqat fenollar bunday reaksiyalarga kirishmaydi. (Sababini o'ylab ko'ring.)

Shu bilan birga, bunday reaksiyalar nitrat, sulfat va xlorid kislotalari bilan bormaydi. Chunki chumoli va sirka kislotalari karbonat kislota (H_2CO_3) ga nisbatan kuchli, lekin nitrat, sulfat va xlorid kislotalarga nisbatan kuchsizdir.

2. Karbon kislota tuzlari qizdirilsa, to'yingan uglevodorodlar yoki birikma (keton)lar hosil bo'ladi:




3. Karbon kislotalar spirtlar bilan suv tortib oluvchi modda (H_2SO_4) yordamida qizdirilganda reaksiyaga kirishib, suv va murakkab efirlar hosil qiladi:





Bunda kislotalardan OH-gruppasi, spirtlardan H-atomi reaksiyaga kirishadi. Oxirgi reaksiyada CH_3OH tarkibiga kislorodning ^{18}O izotopini kiritib, uning hosil bo'lgan efir tarkibida saqlanib qolishi (izotop almashinuvi) bilan isbotlangan.

4. Agar karbon kislotalar kuchli suv tortib oluvchi (P_2O_5) yoki tegishli katalizatorlar ishtirokida qizdirilsa, ular dehidratlanib (chiqib ketib), kislotalarning *angidridlari* hosil bo'ladi:




Karbon kislotalarning angidridlari suv bilan shiddatli birikib, kislotalarga aylanadi.

5. Karbon kislotalar ammoniy karbonat bilan yoki ularning niytili tuzlari bilan qizdirilganda kislotalarning amidlari hosil bo'ladi:




II. Karbon kislotalar galogenlar bilan ta'sirlashganda radikal yodod atomi galogenlarga almashinadi. Bunda —COOH guruh nisbatan eng yaqin (α-holatda) joylashgan yodod atomlarining harakatchanligi tufayli shu H atomlari galogen bilan oson almashtiriladi va *galogen-karbon kislotalar* hosil bo'ladi:



Shu tartibda $\text{Cl}_2\text{CH—COOH}$ (dixlor sirka kislota) va $\text{Cl}_3\text{C—COOH}$ (trixlor sirka kislota)lar hosil bo'ladi.


Bu kislotalarda galogen (Cl) atomi o'ziga Cl-C bog'ining elektronegativligi tufayli tortgani uchun (E.M.=3,0) karboksil gruppada O—H bog'ini yanada kuchsizlanib, H atomi "protonlashib", uning "harakatchanligi" ortadi va sirka kislota nisbatan galogenli hosilalarining kuchini ortadi:



Shu sababli kislotalarning kuchi $\text{CH}_3\text{COOH} < \text{CH}_2\text{ClCOOH} < \text{CHCl}_2\text{COOH} < \text{CCl}_3\text{COOH}$ qatorda ortib boradi.

Umuman, galogenli karbon kislotalar kuchi radikal tarkibidagi galogen atomining tabiati (E.M.) ga kuchli bog'liq bo'lib, ularning kuchi quyidagicha bo'ladi: $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$. M: $\text{FCH}_2\text{COOH} > \text{ClCH}_2\text{COOH} > \text{BrCH}_2\text{COOH} > \text{ICH}_2\text{COOH}$.

III. Karbon kislotalar spirtlar va aldegidlarga qaraganda oksidlovchi qaytaruvchilar ta'siriga ancha "chidamli" moddalar. Faqat chumoli kislotalar (boshqa barcha karbon kislotalardan farqli holda) tarkibida ham aldegid ham kislotaidek gruppasi bo'lgani uchun *aldegid-kislota* xossasini namoyon qiladi. Shu sababli chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasiga kirishadi (qaytaruvchi):



Bunda oraliq modda sifatida karbonat kislota — H_2CO_3 hosil bo'lib, beqaror bo'lgani uchun parchalanadi.

Karbon kislotalarning olinishi


I. Chumoli kislota, dastlab chumolidan ajratib olingan. Lekin hozirgi kunda quyidagicha sintez qilinadi:




Hosil bo'lgan natriy formiat tuzi sulfat kislota ta'sirida chumoli kislota chiqariladi:



2. Sirka kislota asosan Kucheroov reaksiyasi bo'yicha olinadi:




Ayrim hollarda sirka kislota uzum va mevalarni biyg'ishi hosil bo'ladigan spirtning oksidlanish mahsuloti (sirka essensiyasi) olinadi:




Bu "sirka essensiyasi" da sirka kislota miqdori kamroq bo'lib, lashmani haydash yo'li bilan ajratib olinadi. Yuqorida aytilganidek, sirka kislota deyilishi ham shundan kelib chiqqan.

3. Keyingi yillarda neft va gazlarni qayta ishlash natijasida bo'lgan butanni katalitik oksidlash (iqtisodiy jihatdan qulay) usuli ishlab chiqariladi (Kat=Mn⁺², Co⁺²; 6–8 MPa, 165–200°C):



4. Kislotalar gomologik qatorining boshqa a'zolari aldegid va birlashmalar spirtlarni oksidlab olinadi:



5. Ayrim yuqori karbon kislotalar yog'larni gidrolizlab olinadi (XO ga qarang).

TO'YINGAN KARBON KISLOTALARNING AYRIM VAKILLARI VA ULARNING ISHLATILISHI

Chumoli kislota — rangsiz, o'tkir hidli suyuqlik, 100,5°C da qaynaydi. Suvda yaxshi eriydi. Terini kuydiradi. Bu kislota, dastlab qizil chumolga ajratib olingan. Bu kislota, o'simliklar

o't archa) qisman asal tarkibida uchraydi. Teri va kimyo sanoatida kislota va qaytaruvchi modda sifatida ishlatiladi.

Sirka kislota — o'tkir hidli, rangsiz, 118,5°C da qaynaydigan, 17°C da qattiq holda bo'ladigan zaharli modda. Qadimda bu modda sharbatini "biyg'itish" usuli bilan olingan. Uning 70–80% li eriguzi sirka sharbati (sirka essensiyasi) deb ishlatilgan. Lekin odatda 5% li (suyultirilgan) eritmasi uy-ro'zg'orda, poliz, go'sht, baliq konservalash va tayyorlashda ishlatiladi.

Sirka kislota kimyo sanoati uchun juda zarur modda bo'lib, murakkab organik birikmalar, sirka ангидриди, bo'yoq (indigo), sun'iy tolalar, dorilar (aspirin), d'neriya mahsulotlari, olishda va erituvchi sifatida qo'llaniladi.

Sirka kislotalarning tuzlari: alyuminiy atsetat, temir (III)-atsetat — metallarni bo'yashda, Pb(OOCCH₃)₂ oq rangli bo'yoqlar olishda, K, Cu, Zn, Mn, Co li tuzlari kimyoviy reaktiv va ayrim tibbiy preparatlar tayyorlashda; Cu-atsetati qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalariga qarshi kurashda keng qo'llaniladi.

Sirka kislotalarning 2,4-dixlorfenoksi hosilasining Na li tuzi Cl₂C₆H₃—COONa gerbitsid (begona o'tlarga qarshi kurash vositasi) sifatida ishlatiladi.

To'yinmagan va aromatik karbon kislotalar

Tarkibida bir yoki bir necha qo'sh bog' (uch bog') saqlagan karbon birikmalar to'yinmagan karbon kislotalar deyiladi.

Ularning dastlabki vakillari:





Yuqori to'yinmagan karbon kislotalar ham mavjud bo'lib, ular qatoriga:



$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\overset{13}{\text{CH}}=\overset{12}{\text{CH}}-\overset{11}{\text{CH}_2}-\overset{10}{\text{CH}}=\overset{9}{\text{CH}}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$
linol kislota ($\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$) lar kiradi.


Bu kislotalardan oxirgi ikkitasi tabiatda keng tarqalgan bo'lib, ular (paxta, zig'ir, kunjut, zaytun) moylari glitserin bilan murakkab ester tarkibida uchraydi. Shu efirlarni gidrolizlab olinadi. Ular tarkibida bog'ning bo'lishi, olein va linol kislotalari tuzilishi va xossalari to'yingan (stearin, palmitin) kislotalardan farqli bo'lishiga olib keladi. Masalan, a) stearin kislota fazoviy izomerlari yo'q, lekin kislota *sis* - va *trans*-izomerlar holida bo'ladi:



b) olein kislota katalizator ishtirokida gidrogenlab stearin kislota aylantirish mumkin:





d) Fazoviy to'siq tufayli propen kislota va uning efirlari polimerlashmaydi, lekin akril kislota (efirlari) polimerlanib shaffof polimer moddalar hosil qiladi:



shishalar (polimetilmetakrilat) shunday moddalar asosida

to'yingan kislotalar tarkibida qo'sh bog' bo'lgani uchun ular rangsizlantiradilar (to'yingan kislotalar bunday xossaga ega



to'yingan karbon kislotalar yog'ochni qayta ishlash (piroliz) suyuq aralashma holida (olifa) ajratib olinadi. Bu aralashma yog'och olishda va yog'ochga qayta ishlov berishda ishlatiladi. Tarkibida to'yingan karbon kislota miqdori qancha ko'p bo'lsa, yog'och tez quriydi. Qurish jarayonida bu kislotalar oksidlanadilar. Bu kislotalar Mn, Pb va, ayniqsa, Co tuzlari qo'shilganda ancha tezlashadi. Aromatik karbon kislotalar deb, tarkibida benzol halqasi saqlagan kislotalarga aytiladi. Ularning ichida keng tarqalgani benzoil kislota ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) dir. Benzoil kislota suvda eriydigan, oq rangli, hidsiz modda. Boshqa kislotalar qatori suvli eritmada ionlanadi:



Benzoil kislota ta'sirida tegishli metallarning benzoat tuzlarini hosil qiladi:



Benzoil kislota antiseptik xossaga ega, uning Na li tuzi tibbiyotda ishlatiladi. Bu kislota ko'pchilik aromatik efirlar, bo'yoqlar, organik sintezda keng qo'llaniladi.

Turli karbon kislotalar va ularning
hosilalari dissotsilanish doimiylari

Kislota	K_a	pK_a
H—COOH	$1,80 \cdot 10^{-4}$	3.75
CH ₃ —COOH	$1,78 \cdot 10^{-5}$	4.76
CH ₃ —CH ₂ —COOH	$1,34 \cdot 10^{-5}$	4.30
(CH ₃) ₂ C—COOH	$1,00 \cdot 10^{-5}$	5.00
F—CH ₂ —COOH	$2,00 \cdot 10^{-3}$	2.70
F ₂ C—COOH	$5,00 \cdot 10^{-1}$	0.55
Cl—CH ₂ —COOH	$1,50 \cdot 10^{-3}$	2.86
Cl ₂ C—COOH	$2,00 \cdot 10^{-1}$	0.65
I—CH ₂ —COOH	$7,50 \cdot 10^{-4}$	3.13
C ₆ H ₅ —COOH	$1,40 \cdot 10^{-5}$	4.20
4—O ₂ N—C ₆ H ₄ —COOH	$4,63 \cdot 10^{-4}$	3.43
4—CH ₃ —C ₆ H ₄ —COOH	$1,30 \cdot 10^{-5}$	4.34

Agar jadvalga e'tibor berilsa:

- alifatik kislotalar aromatik kislotalarga nisbatan kuchliroq kislotalardir;
- alifatik kislotalar tarkibidagi uglevodorod radikalidagi atomlarining soni ortishi bilan kislota kuchi kamayadi;
- alifatik kislota tarkibidagi uglevodorod radikalining tarmoqlanish darajasi ortishi bilan kislota kuchi kamayadi;
- alifatik kislota tarkibiga elektromanfiyligi yuqori element kiritilsa va ularning soni ortib borsa, kislota kuchi ham ortib boradi;
- aromatik kislota tarkibiga OH⁻, NO₂⁻, F⁻, Cl⁻, Br⁻ elektronakseptor o'rinbosarlar kiritilsa kislota kuchi ortadi;
- aromatik kislota tarkibiga NH₂—, CH₃—, C₂H₅—, (CH₃)₂C— elektron donor o'rinbosarlar kiritilsa kislota kuchi kamayadi. Bu xulosaga kelinadi.

XXXI.8. Murakkab efirlar

asosiy tushunchalar: murakkab efirlar, lavsan, murakkab efirlar gidrolizi.



tarkibida murakkab efir gruppasi — C—O—R¹ saqlagan organik efirlar murakkab efirlar deyiladi. Murakkab efir karbon kislotalar va spirtlarning o'zaro ta'siri — eterifikatsiya reaksiyasi mahsulotidir: $R-CO-OR^1$

Nomenklaturasi. Murakkab efirlarni nomlashda ratsional nomenklaturadan foydalaniladi.

— avval kislota qoldig'i nomi aytilib, keyin tegishli spirt tarkibidagi spirt nomi oxirida "efiri" so'zi qo'shib aytiladi;

— avval spirt tarkibidagi radikal nomi, keyin tegishli kislota anionining nomi aytiladi:


CH_3COOCH_3 — chumoli kislotaaning metil efiri, metil formiat, $CH_3COOCH_2CH_3$ — sirka kislotaaning etil efiri, etilatsetat.

Murakkab efirlarning **izomeriyasi** ularning tarkibiga kirgan radikallar (R¹) izomeriyasidan iborat.


Sirka etil (etilatsetat) efirining izomerlarini ko'rib chiqaylik (empirik formulasi $C_4H_8O_2$). Bu tarkibga mos keluvchi birinchi modda:



Uning izomeri — sirka kislota qoldig'idagi CH₃ guruhi spirt qoldig'iga qo'shilishidan hosil bo'ladi.



Uning tarkibiga to'g'ri keladigan keyingi izomer modda:



4-izomer birinchi formuladagi spirt radikalidan bitta CH₃ radikalini kislota qoldig'i radikaliga qo'shilishidan hosil bo'ladi:




4) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—C(O)—O—CH}_3$ propion metil efiri
(metil propionat)

Murakkab efirlar tarkibiga ko'ra to'yingan bir asosli karbon bilan izomer moddalardir.


Ko'rib chiqilgan efirlarning izomeri $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—COOH}$ kislotasidir. Agar moy kislota izo-moy kislota deb izomerga ega bo'lsa, murakkab efirlarning izomerlari ular tarkibiga kirgan kislota va spirtning izomerlaridan ko'pligi bilan keskin ajralib turadi.

Olinishi 1. Murakkab efirlar asosan eterifikatsiya reaksiyasi orqali olinadi:




Hosil bo'layotgan efir unumini oshirish uchun dastlabki kislota mo'l miqdorda olish va reaksiya natijasida ajralib chiqqan suvni yutib oladigan modda, masalan, konsentrlangan H_2SO_4 ishlata kerak.

2. Karbon kislota tuzlari bilan uglevodorodlarning galogenli hosil o'zaro ta'sirlashishi natijasida ham murakkab efirlar hosil bo'ladi.



kumush atsetat etil xlorid etilatsetat

3. Alkenlarga karbon kislotalarning birikishi murakkab efirlar hosil bo'lishiga olib keladi.




1,1—dimetil
etilen

sirka
kislota


uchlamchi butil
atsetat

Murakkab efirlar faqat karbon kislotalar bilan spirtlarning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'lmasdan, mineral kislotalar (H_2SO_4 , HNO_3) ning ta'siri bilan ta'siri mahsuloti hamdir.

uning isboti sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:
spirti sulfat kislota bilan ta'sirlashib dietil sulfoefir hosil qiladi:



Benzo- va etilenglikolning mono-, di- va trinitroefirlari ham murakkab efirlar qatoriga kiradi. Murakkab efirlar ko'p asosli kislota va atomli spirtlar o'rtasida ham hosil bo'ladi. Bunday efirlar qatoriga etilenglikol bilan 1,4 — benzo-dikarbon (tereftal) kislotasining o'zaro ta'siri mahsuloti kiradi:



Polietilentereftalat — lavsan poliefir tolasi.

Lavan sintezida ishlatiladigan toza tereftal kislotasini olish qiyin bo'lgani uchun uning o'rniga dimetiltereftalat ishlatilib, bir murakkab efir boshqariladi.

Bunday efirlar poliefirlar deyiladi. Poliefirlar monoefirlardan ko'proq nafaolligi va muhim fizikaviy xossalari bilan keskin farq qiladi.


Fizik xossasi. Murakkab efirlar molekulyar massasiga qarab qattiq yoki suyuq moddalardir. Past va o'rta molekulyar massali kislota yoki spirt

gomologlarining efirlari xushbo'y, gul yoki meva hidini eslatuvchi moddalardir, shu sababli ular oziq-ovqat va atir-upa sanoatida ishlatiladi.


Murakkab efirlar ularni hosil qilgan spirt va karbon kislota ta'siri natijasida suvda yomon eriydi.

Kimyoviy xossasi. Murakkab efirlar uchun quyidagi kimyoviy reaksiyalar xosdir.


1) Hidrolizlanish kislotali muhitda suv ta'sirida gidrolizlanish:




2) Inqoriy muhitda gidrolizlanishning mahsulotlari sifatida spirt va kislota hosil bo'ladi:




2. Ammonoliz — murakkab efirlarga ammiak ta'sir ettirish kislota amidlarining va tegishli spirtning hosil bo'lishidir:



3. "Mis — xromli" katalizatori ishtirokida vodorod bilan qayta natijasida murakkab efirdan tegishli spirtlar hosil bo'ladi:



4. Murakkab efirlarni qayta eterifikatsiyalash. Mineral kislota (muhitda) yoki spirtlar (ishqoriy muhitda) ishtirokida efirlar alkoksi ($\text{R}'-\text{O}-$) gruppalarining almashinishi sodir bo'ladi:



yangi efir va yangi spirt hosil bo'ladi.

Ayrim vakillari

Sirka kislota efiri (etilatsetat) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ — rangsiz, suyuqlik. Organik erituvchilar bilan yaxshi aralashadi. Etilatsetat spirtlarini, xlorli kauchukni, yog', moy, mumlarni eritish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, etilatsetat atsetosirka efirini hamda oziq-ovqat konservalari uchun ishlatiladi.

Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik. Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



va atir-upa sanoatida xushbo'y hidli modda sifatida

xushbo'y hidli organik moddalarga quyidagi murakkab efirlar kiradi: Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.




Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.



Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.




Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.




Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.




Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik. Sirka kislota efiri (etilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik.




2. Ammonoliz — murakkab efirlarga ammiak ta'sir ettirish kislota amidlarining va tegishli spirtning hosil bo'lishidir:



3. "Mis — xromli" katalizatori ishtirokida vodorod bilan qaynatilgan natijasida murakkab efirdan tegishli spirtlar hosil bo'ladi:



4. Murakkab efirlarni qayta eterifikatsiyalash. Mineral kislota (yoki muhitda) yoki spirtlar (ishqoriy muhitda) ishtirokida efirlar alkoksi ($\text{R}'-\text{O}-$) gruppalarining almashinishi sodir bo'ladi:



yangi efir va yangi spirt hosil bo'ladi.

Ayrim vakillari

Sirka kislota efiri (etilatsetat) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ — rangsiz, suyuqlik. Organik erituvchilar bilan yaxshi aralashadi. Etilatsetat efirlarini, xlorli kauchukni, yog', moy, mumlarni eritish uchun Bundan tashqari, etilatsetat atsetosirka efirini hamda oziq-ovqat olishda ishlatiladi.

... kislota efiri (izoamilatsetat) rangsiz tiniq suyuqlik hidiga ega:



... oziq-ovqat va atir-upa sanoatida xushbo'y hidli modda sifatida

... xushbo'y hidli organik moddalarga quyidagi murakkab efirlar kiradi:

... kislota efiri (etil formiat)



... kislota efiri, amil formiat



... kislota efiri, izoamilformiat



... kislota efiri, etilbutirat



... kislota efiri, izoamilbutirat



... kislota efiri, izoamilizovalerat



... formiat



... formiat



... atsetat



... efirlarning ba'zilar konditer va atir-upa sanoatida ishlatiladigan ... efirlarning ba'zilar konditer va atir-upa sanoatida ishlatiladigan

XXXI.9. Yog'lar va moylar

Organiladigan asosiy tushunchalar. Yog'lar, moylar, yod kislota soni, yog'larning gidrolizi, sovunlanish, sovunlar, sintetik vositalari.

Glitserin va yuqori yog' kislotalardan hosil bo'lgan murakkab — triglitseridlar yog'lar deyiladi. Ularning umumiy formulasi quyidagicha:



Yog'lar: $\text{R}=\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$, masalan $\text{C}_{17}\text{H}_{35}$, $\text{C}_{15}\text{H}_{31}$

Moylar: $\text{R}=\text{C}_n\text{H}_{2n-1}$, masalan $\text{C}_{17}\text{H}_{33}$, $\text{C}_{15}\text{H}_{29}$

Hayvon yog'lari to'yingan yog'lar bo'lib, oddiy sharoitda suyuq moddalardir. Ularning tarkibi asosan stearin va palmitin kislotalaridan iborat. O'simliklardan olinadigan yog'lar suyuq bo'lgan uchun ular moylar deyiladi va to'yinmagan radikallar saqlaydi. Ular linol va linolen kislotalari qoldiqlaridan tashkil topgan. Bular qattiq paxta, kungaboqar, zaytun, zig'ir, bodom, kokos kabi o'simliklardan olinadigan moylar kiradi.

Fizik xossasi. Yog'lar suvda erimaydi, biroq ular emulsiya hosil qilish mumkin. Ularning oqsil moddalar bilan birgalikdagi tabiiy emulsiyasi sut bo'ladi. Yog'lar efirlarda, benzinda, toluol, benzol va uglerod sulfitda eriydi. Yog'larning suyuqlanish temperaturasi va tashqi ko'rinishi ularning tarkibiga kirgan kislotalar tarkibi va tuzilishiga bog'liq.

Tabiiy yog'lar turli triglitseridlarning aralashmasidan iborat bo'lgan uchun ma'lum temperatura oralig'i (interval)da suyuqlanadi. Yog'lar suyuqlanish asosiy tavsifi sifatida ularning qotish temperaturasi ishlatiladi. Yog'lar suyuqlanish asosiy fizik-kimyoviy tavsifnomalari qatoriga suyuqlanish, qotish temperaturasi, kislota, sovunlanish (gidrolizlanish) va yod soni kiradi.

Yog'lar odatda neytral moddalar bo'lib, ular qayta ishlash va saqlanishi natijasida gidrolizlanadi yoki oksidlanib, ulardan kislotalar hosil bo'ladi.


Yog'ning kislota soni deganda 1 g yog'ni neytrallash uchun KOH ning milligramm miqdori tushuniladi.

Yog'ning gidroliz soni deb, 1 g yog'ning gidrolizlanishidan hosil bo'lgan yog' kislotalarini neytrallash uchun sarf bo'lgan KOH ning milligramm miqdoriga aytiladi. Masalan: faqat glitserin trioleatidan tashkil topgan yog'ning gidroliz soni 192 ga teng.

Yog'ning gidroliz soni deb, 100 g yog'dagi qo'sh bog'larga birika oladigan yodning grammi miqdoriga aytiladi.


Kimyoviy xossasi. 1. Yog'lar va moylarning eng asosiy xususiyati ularning suv va ishqoriy muhitda gidrolizlanishidir.

Yog'lar kislotali muhitda gidroliz mahsuloti sifatida tegishli karbon kislota va atomli spirt — glitserin hosil bo'ladi:





Yog'lar juda sekin va bosqichli gidrolizlanadi. Masalan, tristearin yog' gidrolizlanganda avval bitta, keyin ikkita va oxirida uchinchi kislota qoldig'i chiqib ketadi.

Yog'lar suvda hollarda gidroliz jarayoni 100—120°C va ishqoriy muhitda (NaOH , Na_2CO_3 , KOH , K_2CO_3) olib boriladi. Bu gidroliz jarayoni gidroliz bo'lib, reaksiya mahsuloti sifatida yog' tarkibiga kirgan karbon kislotalarning Na li yoki K li tuzi va glitserin hosil bo'ladi. Yog'lar suvda sovunlanish reaksiyasi deyiladi:



Yog'lardan farqli ravishda moylar tarkibida bir yoki undan ortiq bog'lar bo'lganligi sababli ular yuqori bosim, katalizator (Ni) va ta'sirida vodorodni biriktirib olish xususiyatiga ega. Bu jarayonning gidrogenlanishi deyiladi:





Moylarni gidrogenlash sanoatda katta ahamiyatga ega bo'lib, yilga oshib borayotgan yog'ga bo'lgan ehtiyojni qondirishning echimidan biridir. Gidrogenlangan moylar asosida olingan mahsulotlar "margarin", "salolin", "salomas" nomlari bilan ataladi. Ular tabiiy myoviy xossalari bilan tabiiy yog'larga o'xshaydi. Chunki ular (masalan, margarinni) qo'shimcha mahsulotlar: sut, tuxum sarig'i, va boshqa organizm uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalar qo'shilishi sababli margarin to'yimlilik, xushbo'ylik, oson hazm bo'lishi uchun foydaliligi bilan tabiiy sariyog'ga yaqin turadi.




XXXI.10. Sovunlar

Yog' molekulyar massali yog' kislotalarining ishqoriy metallar (Na^+) tuzlari bilan hosil qilgan tuzlari *sovunlar* deyiladi. Kislotalarining **natriyli tuzi** — *qattiq sovun*, **kaliyli tuzi** — *suyuq sovun* deb aytiladi. Oddiy sovun, asosan palmitin, olein, stearin kislotalarining natriyli tuzlari aralashmasidir. Sanoatda sovun olishda xomashyo sifatida hayvon yog'lari, paxta, moyi, gidrogenlangan yog'lar ishlatiladi. Sovunlar suvli eritmada emulsiya hosil qiladi, eritma ishqoriy muhitga ega bo'ladi:



a)



b)

35-rasm.

Yog'ning suv sathida hosil qilgan ko'pik qatlami, b) sovun zarrachalari bilan "yog' zarrachasi" ning hosil qilgan mitsellasi.

Yog' molekulyar massali karbon kislotalarning uglevodorod radikali sovun molekulasi (gidrofob)* qismini tashkil etsa, oksig'li gruppasi "zaryadli bo'lak" (gidrofil)** qismini tashkil etadi. Sovun suvda erishi natijasida suvning sirt tarangligini kamaytirib, emulsiya hosil qiladi (35-rasm). Keyingi yillarda iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan usullar bilan sovun chiqarilayapti. Bunda yog'larni yuqori bosimda

suv ta'sirida gidrolizlab hosil bo'lgan yuqori karbon kislotani soda ta'sirida sovunga aylantiriladi.

Agregat holatiga ko'ra qattiq, suyuq, quyuq hamda kukunsimon sovunlar bo'ladi. Ishlatilish maqsadiga ko'ra: xojalik sovuni (atir sovun) va atir sovun bo'ladi.

Kir sovun. Tarkibi 60—70% C_{16} — va undan ortiq uglerod atomi tutgan yog' kislotalarining tuzlari bo'lib, qattiq va kukunsimon bo'lib ishlab chiqariladi. Unga qo'shimchalar sifatida turli moddalar qo'shib yuvish xususiyatlari oshiriladi.

Atir sovun. Tarkibida 74—80% C_{10} — C_{14} ta uglerod atomlari saqlaydigan yog' kislotalarining tuzlari bo'lib, qattiq va suyuq holda turli xushbo'y hidli holatda ishlab chiqariladi. Ular sovuq va issiq suvda yaxshi ko'pirish xususiyatiga ega, chunki ularga qo'shimcha kokos moyi va quyi molekulyar sun'iy yog' kislotalari ham qo'shiladi. Rang berish maqsadida ularga anilin bo'yoqlar, rodamin qizili, metanil sarig'i qo'shiladi.



Dezinfeksiyalovchi xususiyat hosil qilish uchun atir sovunlarga formalin, krezol va bor kislotasi qo'shiladi.

Suyultirilgan atir sovunlarni bug'latish usuli bilan kukunsimon sovunlar ishlab chiqariladi. Ularning ko'pik hosil qilish xususiyatini oshirish maqsadida ularga qo'shimcha — 5% kraxmal, 0,5% gacha anilin (xushbo'y) hid beruvchi moddalar qo'shiladi.

Sintetik yuvish vositalari

Suvda Mg^{2+} va Ca^{2+} ionlari juda ko'p miqdorda bo'lib, suvning yuvish qobiliyatini kamaytirib beradi. Bunday suvlarda sovun ishlatilsa Mg va Ca so'dalari stearat (palmitat) tuzlari hosil bo'lib, ular kam eruvchan bo'lib, yuvishni to'xtatib qo'yadi. Bunday suvlarda sovunlarning yuvish xususiyatini kamaytirib yuboradi. Bunday suvlarning yuvish xususiyatlarini oshirish uchun sun'iy yuvish vositalari (SYuV) ishlatiladi.

Bunday yuvish vositalari neftni qayta ishlash mahsulotlari asosida sintez qilinadi. Ular sovunlar singari yuqori molekulyar sulfokislotalarning natriyli tuzlari bo'lib, ular quyidagi tarkibga ega:



SYuV ning yuvish xususiyatlari sovunlarniki singari bo'lib, ularning tarkibi sovunlar tarkibidagi karbon kislotalar radikal o'rniga suv va tuproq bakteriyalar ta'sirida tezda o'zgarib (chirib), parchalanib ketadi. SYuV lardagi radikallar tarkibida uchlamchi va to'rtlamchi uglerod atomlari borligi sababli bakteriyalar ta'sirida juda kam o'zgaradi va atrof muhitni ortiqcha kimyoviy moddalar bilan ifloslanishiga sabab bo'ladi.

XXXII bob UGLEVODLAR

Organiladigan asosiy tushunchalar: uglevodlar mono- va disakharidlar, monoza, dioza, polioza, dezoksiriboza, glyukoza, fruktoza, kraxmal, glikogen, dekstrin, selluloza, atsetat tokasi, piroksilin, seluloz, selluloid, viskoza, trimetil (etil) selluloza.

Uglevodlar uglerod va suvdan iborat bo'lib, $C_n(H_2O)_n$ umumiy formulaga ega bo'lgan organik moddalar uglevodlar deyiladi. Uglevodlar aralash moddalar bo'lib, ular tarkibida spirt — (OH), aldegid va keton $>C=O$ gruppallari mavjud. Uglevodlar qatoriga: glyukoza — $C_6H_{12}O_6$, saxaroza — $C_{12}H_{22}O_{11}$, kraxmal va selluloza kiradi.

Bunday moddalar borki, ularning tarkibi uglevodlarning umumiy formulasi bilan to'g'ri keladi: $C_2H_4O_2$, CH_2O (chumoli aldegidi), lekin ular uglevodlar emas. Shu sababli yuqoridagi umumiy formula — $C_n(H_2O)_n$ uglevodlarning umumiy tarkibini ko'rsatuvchi shartli formula sifatida qo'llaniladi.

Uglevodlar tabiatda keng tarqalgan organik moddalar bo'lib, ularning 80% ni, odam va hayvon organizmining 2% ni tashkil qiladi. Tirik organizmlarda kechadigan biokimyoviy jarayonlarda muhim


ahamiyatga ega, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari tarkibining 70% ni
kil etadi. Uglevodlarni *saxaridlar* ham deyilib, ular tarkibi va xos
ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) monosaxaridlar (glyukoza, fruktoza, riboza, dezoksiriboza) yoki monozalar;
- 2) disaxaridlar (saxaroza, maltoza, laktoza) yoki diozalar;
- 3) polisaxaridlar (kraxmal, selluloza, dekstrin, glikogen) yoki poliozalar.


Monosaxaridlar

Suvda eriganda molekulasini bitta saxarid molekulasini hosil qiluvchi uglevodlar — monosaxaridlar deyiladi. Eng oddiy monosaxaridlar besh a'zoli (C_5) saxaridlar — riboza va dezoksiriboza va olti a'zoli (C_6) saxaridlar — glyukoza va fruktozalar kiradi.*

Riboza va dezoksiriboza nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi **saralash** bo'lib quyidagi tuzilishga ega:



Ribonza




Dizoksiriboza

Besh a'zoli halqa hosil qilgani uchun pentoza (furanaza) a'zoli getero halqali uglevodlar ham deyiladi.

XXXII.1. Glyukoza

— $C_6H_{10}O_4$ eng ko'p tarqalgan va o'rganilgan 6 a'zoli saxarid (furanoz) lar qatoriga kiruvchi uglevoddir.


uzum tarkibida ko'p bo'lgani uchun *uzum shakari* ham deyiladi. Odam organizmida qon tarkibida, oz miqdorda hujayra tarkibida bo'ladi. Tabiiy fotosintez jarayoni natijasida hosil bo'ladi:



Fizik xossalari. Oq rangli, suvda yaxshi eriydigan, shirin ta'mli modda. Suvli eritmadan $C_6H_{12}O_6 \cdot H_2O$ kristallgidrat holida ajralib

Glyukozaning tuzilishi (α -, β -glyukoza)

Glyukoza tarkibidagi funksional gruppalari turiga ko'ra aldegidospirt (glikoz) bo'lib, uning tuzilishi quyidagicha:



omnib turibdiki, 1—C atomi aldegid gruppaga tarkibiga kirib (zanjirni bosh shu atomdan boshlanadi) uning gibridlanish turi sp^1 , bosh darajasi (+1). Boshqa uglerod atomlari (C_2 — C_6) to'yingan porodlardagidek sp^1 -gibridlangan, 6—C atomi (—1), boshqalari 0 bosh darajasiga ega. Yuqoridagi tarkibga ko'ra, glyukoza — aldegid, 1—C atomlariga birikkan 5 ta OH gruppalari sababli glyukoza spirtidir. Shu sababli, glyukoza kimyoviy xossalari jihatidan spirt, ham spirtlarga xos reaksiyalarga kirishadi, ya'ni aldegid —

...ayrim hollarda aldegidospirt tuzilishiga xos bo'lgan
...namoyon etmaydi. Faqat spirt gruppalari hisobiga reaksiyaga


kirishib, ularning vodorodini metil gruppasiga almashtirishi glyukozaning aldegidlik xossasini yo'qqa chiqarib qo'yadi. Bularning har biri ham bir xil koza molekulasi sharoitga qarab turlicha tuzilishga ega bo'lishi mumkin degan xulosaga olib keldi.

Haqiqatdan ham glyukoza ikki xil — aldegid (chiziqsimon) va halqasimon (piranoza) tuzilishga ega modda: bu tuzilishlar bir-biri bilan o'tib turadi. Bular glyukozaning ikki tautomer holati hisoblanadi.

Modda molekulasi turli tuzilishga ega bo'lib, bu tuzilishlar muayyan sharoitda ayni sharoitda bir-biriga aylanib turishi tautomeriya (tautomerizatsiya) hodisasi deyiladi. Har bir holatga to'g'ri kelgan tuzilish holat deyiladi.

Glyukozaning halqali tuzilishi quyidagicha hosil bo'ladi: ochiq tuzilish molekuladagi I—C atomiga birikkan karbonil gruppasi π -bog'ining ta'siri hisobiga C_5 dagi OH — gruppasining vodorod atomi $>C=O$ ga ko'chib ketadi va C_1-OH ni hosil qiladi.


C_1 ning bo'sh qolgan bitta valentligi C_5-O — bilan birikib C_1-O-C_5 bog'lari hosil bo'ladi va glyukozaning halqasimon tuzilishi hosil bo'ladi:




Halqasimon tuzilishda C_1 - atomiga birikkan ("yangi") gidroksil gruppasi halqa tekisligiga nisbatan pastda joylashgan bo'lsa α -glyukoza, yuqorida joylashsa β -glyukoza deyiladi.

Glyukozaning bu ikki halqasimon ko'rinishlari uning kimyoviy xossalari, undan di- va polisaxaridlar hosil bo'lishini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega.


Kimyoviy xossalari: 1. Glyukozaning aldegidlik xossalari:





1. Glyukoza aldegidlar singari vodorod biriktirib (qaytarilib), 6 atomli — sorbitga aylanadi:



2. Ag_2O ning ammiakli eritmasi ta'sirida oksidlanib glyukon kislotaga aylanadi:





3. Yangi tayyorlangan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bilan qaynoq eritmada aldegidlarga o'xshash reaksiyasiga kirishadi:







II. Glyukozaning spirtlarga xos xususiyatlari:

a) ko'p atomli spirtlar singari metallarning gidroksidlari almashinuv reaksiyalariga kirishib, tegishli metallarning (glikonat) tuzlarini hosil qiladi. Bunda almashinuv reaksiyasida glyukozaning birinchi gidroksil gruppasiga yaqin turgan $(C_2-C_1)OH$ gruppalari orqali amalga oshiriladi. Masalan: $Ca(OH)_2$ bilan reaksiyaga kirishadi va hosil bo'lgan Ca -glikonat tibbiyotda dori sifatida ishlatiladi:



b) shunday reaksiya xona temperaturasida $Cu(OH)_2$ bilan ham



Bu reaksiyadan biokimyoviy analizlarda glyukoza (qand) miqdori aniqlashda foydalaniladi.

Glyukozaning o'ziga xos kimyoviy xususiyati yana shundaki, achituvchi bakteriyalar ta'sirida va reaksiya sharoitiga qarab turli mahsulotlarini hosil qiladi. Glyukoza to'rt xil biyog'iydi.


Glyukozaning biyog'ishi. Monosaxaridlarning har xil mikroorganizmlar ta'sirida parchalanishi biyog'ish deyiladi. Biyog'ish jarayonida CO_2 kabi gazlar ajraladi, turli organik moddalar hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan mahsulotlarning turiga qarab, monosaxaridlarning biyog'ishi quyidagicha bo'ladi:

1. Spirtli biyog'ish jarayoni davomida glyukoza etil spirti bilan angidridga aylanadi:



Bunday biyog'ish turli achituvchi bakteriya va zamburug'lar yordamida borib, juda murakkab jarayon, bir nechta bosqichdan iborat. Bunda spirtli biyog'ishdan foydalanib, etil spirti va spirtli ichimliklar (vino) ishlab chiqariladi.

2. Sut kislotali biyog'ish — glyukozani sut achituvchi bakteriya fermenti yordamida biyog'ish yo'li bilan sodir bo'ladi:




Sut kislotali biyog'ish natijasida sutdan turli sut mahsulotlari (kefir, tvorog) olinadi. Shuningdek, pomidor, karam va bodring tuzlanganda ham sut kislotali biyog'ish jarayoni ro'y beradi.

3. Moy kislotali biyog'ishda glyukozadan moy kislota hosil bo'ladi:




Moy kislota taxir ta'mga ega. Shuning uchun ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari va chorvachilik oзуqalari (silos) turib qolishi tufayli taxir bo'lib qoladi va yuqoridagi reaksiya sababli mahsulot sifati buziladi.

4. Limon kislotali biyog'ish:




Bunday biyog'ish sanoat uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, maxsus zamburug'lar (sitromisetlar) ta'sirida amalga oshiriladi.

Keng tarqalgan monosaxaridlarga fruktoza — meva shakari ham kiradi. Fruktoza juda shirin, suvda yaxshi eruvchi, oq rangli kristall modda. Fruktoza ($C_6H_{12}O_6$) tarkibiga ko'ra ketosprit bo'lib, glyukozaning



Glyukozadan farq qilib, fruktoza 1- C-atomida spirt, 2- C-atomida esa keton gruppasi saqlagan modda. Shu sababli aldegidlarga reaksiyalarga kirishmaydi va qiyinroq oksidlanish xossasiga ega.

Fruktoza ham glyukoza singari chiziqsimon va halqasimon modda:



Lekin fruktoza 5-a'zoli (*furanoza*) halqa hosil qiladi.


Monosaxaridlarning olinishi

Monosaxaridlar tabiatda erkin va birikmalar holida ko'p tarqalgan. Uzun va boshqa mevalar tarkibida glyukoza erkin holda uchraydi. Fruktoza (glyukoza bilan birgalikda) asalda bo'ladi.


Ayrim hollarda har bir monosaxaridni alohida ishlatish ehtiyoj tug'iladi. Bunday hollarda ularni tabiiy manbalardan ajratib olishga to'g'ri keladi. Monosaxaridlar olishning asosiy usuli, disaxaridlar va polisaxaridlar gidrolizi hisoblanadi. Polisaxaridlar fermentlar ishtirokida gidrolizlanganda mos monosaxaridlar hosil bo'ladi.

Sanoatda glyukoza asosan kartoshka yoki arpa kraxmalini kislotalar ishtirokida gidrolizlash yo'li bilan olinadi, chunki kraxmal molekulasida juda ko'p miqdorda glyukoza molekulasining qoldig'i bo'ladi.


1) *kraxmalning gidrolizlanish* jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin:



2) disaxarid — *maltoza gidrolizlanganda* ikki molekula glyukoza bo'ladi:



glyukoza birinchi marta A. M. Butlerov tomonidan formaldegid va kalsiy gidroksidi ishtirokida o'zaro ketma-ket birikishi sun'iy usulda sintez qilingan:




Bu reaksiya natijasida monosaxaridlarning murakkab aralashmasi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan aralashmadan alohida monosaxarid ajratib olish bo'lganligi uchun bu reaksiya faqat nazariy ahamiyatga ega.

XXXII.2. Disaxaridlar. Saxaroza

Saxaroza suvli eritmada gidrolizlanganda bir molekulasidan ikki molekula monosaxarid hosil bo'ladigan saxaridlar disaxaridlar deyiladi.


Tabiiy disaxaridlar lavlagi yoki shakarqamish shakari — saxaroza, solod — maltoza, sut shakari — laktoza va sellobioza hisoblanadi. Bu disaxaridlarning umumiy formulasi — $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ bo'lib, bulardan eng mashhurlari saxarozadir.

Saxaroza (shakarqamish yoki lavlagi shakari) — oddiy monosaxaridlar glyukoza va fruktoza qoldiqlarining birikishidan hosil bo'lgan. Buning xususiyatida saxarozaning suvli eritmasi kislotalar ishtirokida qizdirilsa, qaynatilgan moddaga aylanadi. Ulardan biri $\text{Cu}(\text{OH})_2$ va Ag_2O ning ammiy eritmasi bilan ta'sirlashadi, ya'ni aldegid gruppaga ega bo'lgan modda. Bunday xususiyatni namoyon etmaydi. Ko'rinib turibdiki, saxaroza suvli eritmada gidrolizlanib, glyukoza va fruktozani hosil qiladi:



Saxaroza qand lavlagi (16–20%), shakarqamish (14–26%), ma

Saxaroza oq shaffof kristall modda bo'lib, 160°C da suyuqlashib, 160°C da suyuqlashib Saxaroza gidrolizlanganda teng miqdordagi glyukoza va fruktoza aralashmalariga aylanadi. Bu aralashma qutblangan nurning qutblanish tekisligini chapga buradi. Saxarozaning gidrolizlanishi *shakar* inverting deyiladi. *Shakar*ning gidrolizi (inversiyasi) natijasida hosil bo'lgan miqdordagi glyukoza va fruktoza aralashmasi "inversiyalangan shakar" deyiladi:




Tabiiy inversiyalangan shakarga "asal" misol bo'ladi. Asaliy vaqtning o'zida glyukoza va fruktoza birgalikda 80% mavjud bo'lib, sezgin oziq-ovqat mahsuloti sifatida katta ahamiyatga ega.

Sanoatda saxaroza ishlab chiqarish

1. Tozalangan qand lavlagi maxsus kesgich (pichoq) mos yordamida maydalanadi va diffuzor — qayta ishlash moslamasi bilan qaynagan suv bilan ishlanadi. Qand lavlagi tarkibidagi shakar va boshqa moddalar (rang beruvchi, oqsil, kislotalar) suvli eritmaga o'tadi.

2. Turli qo'shimchalar va keraksiz moddalardan tozalash uchun diffuzordagi eritma "ohak suti" — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ eritmasi bilan aralashirilgan kam eruvchan moddalar hosil bo'lib, cho'kmaga tushadi, shakar eritmasi eritmada ancha tozalanib, Ca ning saxarati (Ca ioni spirt gruppasi bilan hisobiga birikadi) $\text{Ca C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ holida bo'ladi.

3. Eritmadan ortiqcha $\text{Ca}(\text{OH})_2$ va shakar tarkibidagi Ca^{2+} — Ca^{2+} chiqarib yuborish maqsadida eritma orqali CO_2 — gazni o'tkaziladi, Ca^{2+} hosil bo'lib cho'kmaga tushadi;



4. Hosil bo'lgan cho'kma filtrlab ajratib olinadi. Eritma moslamasida bug'latiladi. Hosil bo'lgan shakar kristallari sentrifug usuli bilan ajratib olinadi.

Ushbu eritmada qolib ketadi. Bu eritma "melassa" deb aytiladi. Uning turli moddalar (limon kislota) olinadi.

... olingan shakar moddasi sarg'ish rangli bo'ladi. Chunki tarkibida rang beruvchi qo'shimchalar qisman qolgan bo'ladi. Bu shardan shakarni tozalash uchun qaytadan eritiladi va eritma aktiv-... ko'mir (adsorbent) bilan qayta ishlanadi. Eritma qaytadan eritiladi va qayta kristallash usuli bilan toza shakar olinadi. Saxaroza chiqarishni quyidagi sxema ko'rinishida tasavvur etish mumkin:

Polisaxaridlar

Polizlanganda molekulası ko'p sonli monosaxaridlar molekulariga bog'langan moddalar polisaxaridlar deyiladi.


Polisaxaridlar gruppasini tashkil etuvchi uglevodlar o'zining makro-
molekulyar tuzilganligi bilan ajralib turadi. Ular tabiiy yuqori molekulyar
moddalarga bo'lib, tabiatda, ayniqsa, o'simliklar tarkibida juda ko'p miq-
darda uchraydi. Ular shirin ta'mga ega bo'lmagan polimer moddalardir.
Ular erimaydi, lekin bo'kadi. Polisaxaridlar monosaxaridlarning juda
ko'p sonli molekullari o'zaro polikondensatlanishidan hosil bo'ladi. Po-
lisaxaridlardan eng ahamiyatlisi α - va β -glyukozalardan tarkib topgan
starch va kraxmaldir.

XXXII.3. Kraxmal

Kraxmal — $(C_6H_{10}O_5)_n$ umumiy tarkibga mos kelib, $n = 200-2000$ o'ziga xos moddasi sifatida o'simliklar tarkibida uchraydi. Kraxmal asosiy qat mahsulotlari — non, kartoshka, un tarkibidagi asosiy ugle-


amorf tuzilishli, oq kukun, suvda erimaydi, issiq suvda ivitilsa
eritma — kraxmal kleysterini hosil qiladi. Kraxmal yod ta'sirida
qizilga kiradi. Shu reaksiya yordamida kraxmal va yod aniqlanadi,
qaytaruvchi xossasiga ega emas.

Kraxmal individual modda emas, u bir-biriga o'xshash ikki polisaxarid — amiloza va amilopektindan tarkib topgan. Kraxmalda amiloza 15% — amilopektin 75% — 85% ni tashkil etadi. Bularning hammasi α -glukozaning polikondensatsiyalanishidan hosil bo'lgan moddalar bo'lib, ularning molekulasining hosil bo'lishi (α — glyukozaning kondensatsiyalanishi) ni umumiy holda quyidagicha tasavvur etish mumkin:




Hosil bo'lgan kraxmal polimerining zvenosi (α — glyukoza qoldig'i)dagi 2,3 va 6—C atomlariga birikkan OH gruppallari yana α — glyukoza molekullari bilan birikib molekula zanjirini tarmoqlanishga olib keladi. Shu sababli (erkin OH — gruppallari bo'lgani yoki kamligi sababli) kraxmal efirlar hosil qilmaydi va eruvchan juda kam.

Kraxmal tabiatda fotosintez jarayoni natijasida hosil bo'lib, quyidagicha amalga oshadi:



Kraxmalning asosiy xususiyati — issiq suvda, bakteriyalar ta'sirida kislotali muhitda monosaxaridlar yoki molekulyar massasi katta bo'lgan boshqa mahsulotlarga gidrolizlanishidir. Kraxmalning asta-asta gidrolizlanib, glyukoza hosil bo'lish jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin:



Bu jarayon ko'pchilik oziq-ovqat mahsulotlarini kishilar organizmida o'zlashtirilishi mobaynida amalga oshadi.

Yuqorida aytilganidek kraxmalning asosiy tarkibiy qismi amiloza va amilopektinlardir.

Amiloza $(-\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5-)_n$ molekullari glyukoza qoldiqlarining chetaroq simon yoki juda kam tarmoqlangan uzun zanjiridan iborat bo'lib, glyukoza qoldiqlari 1 va 4 holatdagi kislorod atomlari orqali bog'langan.

Amilopektin $(-\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5-)_n$ molekullari, amiloza molekullari kabi, glyukoza qoldiqlari zanjiridan iborat. Lekin ularning zanjirida

amiloza tuzilishga ega.

Amilopektin issiq suvda o'zlashtirilishi

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin esa yod bilan

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Amilopektin molekulyar massasi

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin


Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin



Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin

Glikogen asosan amilopektin


Glikogen asosan amilopektin

Sellyulozaning olinishi. Sellyuloza, asosan yog'ochni olinadi. Buning uchun maydalangan yog'ochni $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$ yoki NaHSO_3 — natriy gidrosulfit eritmasi bilan 150°C bosim ostida qayta ishlanadi. Bunda yog'och tarkibidagi barcha moddalar, shu jumladan, birinchi navbatda lignin eritmaga parchalanib ketadi. Sellyuloza o'zgarmasdan qoladi va ajratiladi, yuviladi, quritilib keyingi ishlashga yuboriladi.

Sellyuloza molekulasidagi glyukoza qoldiqlarining umumiy hisobda 6000—1700000 ga teng va undan katta bo'lishi Sellyuloza mexanik va kimyoviy ta'sirlarga etarli darajada mazasiz, hidsiz, tolasimon oq modda.


U ayrim erituvchilar, masalan, *Shveyser reaktivi* — mis-ammiak eritmasi (II)-gidroksidi bilan konsentrlangan ammiak aralashi $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$ xlorid kislotalaning ba'zi tuzlari eritmali, konsentrlangan sulfat, fosfat kislotalarda va kadmiyning kompleks birikmasi — doksenda eriydi. Eritgan selluloza qayta cho'ktirilsa uning ustki qatlam kulyar tuzilishi o'zgaradi.

Sellyuloza mineral kislotalar ishtirokida qizdirilganda u juda to'liq gidrolizga uchrab, qisman β — glyukoza hosil qiladi:




Hosil bo'lgan glyukozani biyg'itib etil spirti olinadi.

Sellyuloza makromolekulasining tuzilishi. Sellyuloza kram
tuzilishi bilan farq qiladi, uning molekulari 1,4 — holatda bir
— glyukoza qoldiqlaridan iborat. Sellyuloza molekulari chiziqli
tuzilishli bo'lib, undagi har bir β — glyukoza qoldiqlarida uchta
3, 6 — C atomlaridagi) erkin OH — gruppallari bor.



ko'ra, uning qisqartirilgan formulasi uch atomli polispirt $\text{C}_3(\text{OH})_4$, ko'rinishda yoziladi. Uchta spirt gruppasi hisobiga turli kislota ($\text{CH}_3\text{CO}-\text{OH}$, HNO_3) yoki anhidridlar bilan (mono-, di-, tri-) efirlar hosil qiladi:




selluloza triatsetati

aldegidlarga xos reaksiya bermaydi.

Sellyuloza asosan ip va kanop gazlamalar tayyorlashda, har xil qog'oz, ishlab chiqarishda ishlatiladi. Sellyuloza viskoza, atsetat va boshqa materiallar ishlab chiqarishda dastlabki xomashyo hisoblanadi. Uning efiri asosida juda ko'p miqdorda kinoplyonkalar va tiniq plastik materiallar atsetat tolasi (atsetat ipagi) ishlab chiqariladi.

Atsetat tola olish. Buning uchun sellyuloza triatsetati (oq rangli, il. kukunsimon modda) atseton yoki dixlormetanda eritilib, ilgan quyuq massa katta bosim ostida mayda teshikli moslama — orqali o'tkaziladi va undan chiqayotgan tola shaxtaga yuboriladi. Tola tushishi yo'alinishiga teskari holda pastdan issiq havo yuboriladi. Tola quritiladi. Bir necha tutam tola yigiruv moslamasi orqali yigilib, ipga aylantiriladi. Bu ip turli rangli eritmalar bilan qayta rangli ipaksimon ko'rinishga keltiriladi. Olingan mahsulot sun'iy yoki *atsetat ipagi* deyiladi.


nitro efirlari texnikada katta ahamiyatga ega. Bu efir nitrat va sulfat kislota aralashmasi ta'sir ettirib olinadi. Reaksiya olingan kislotalarning miqdori va boshqa sharoitlarga qarab sel-molekulasining har bir zvenosidagi bitta, ikkita yoki uchta gidroksil guruhining hammasi eterifikatsiya reaksiyasiga kirishadi, natijada mono-nitrotsellyulozalar hosil bo'ladi:



...ning mono- va dinitroefirlari (%N=11—12%) aralashmasi deb ataladi. U nitrolaklar ishlab chiqarishda, shuningdek,

spirt-efirli eritmasi — “*kollodiy*” tibbiyotda ishlatiladi. Kolloksilini maqulroqda (1/3 nisbatda) va spirt aralashtirilib “*selluloid*” deb ataluvchi mahsulot hosil qilinadi. Undan keng iste'mol mollari ishlab chiqarishda foydalaniladi. Trinitrotsellyuloza (piroksilin) (%N= 13—13.6) tutqich sifatida ishlab chiqarishda asosiy komponent hisoblanadi.

Sellyulozaning yana bir muhim hosilasi (NaOH va CS₂ bilan) — sellyuloza ksantogenati minglarcha tonnalar miqdorida ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida ishlatiladi:



sellyuloza ksantogenati (viskoza)

Viskoza eritmasidan hosil qilingan parda “*sellofan*” deb ataladi. Oziq-ovqat mahsulotlari, gullarni o'rashda va yarimo'tkazgich parda sifatida ishlatiladi.

Sellyuloza xlorosirka kislotasi bilan turli oddiy efirlar hosil qiladi. Karboksimetilsellyuloza $[C_6H_7O_2(OH)_2-O-CH_2-COOH]_n$ shu efirlar qatoriga kiradi. Karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi sintetik yulduzchi vositalar xossalari yaxshilash uchun ularga qo'shiladi. Shuningdek, tozalangan karboksimetilsellyuloza tish pastalari va kinofotomateriallar tayyorlashda, neft quduqlarini burg'ulashda sirt faol moddalar sifatida ishlatiladi. Shuningdek, sellyulozaning boshqa oddiy efirlari $[C_6H_7O_2-(OCH_3)]_n$ trimetilsellyuloza va $[C_6H_7O_2-(OC_2H_5)]_n$ dietilsellyuloza to'qimachilik va lak bo'yoq sanoatida keng qo'llaniladi.

Respublikamizda ko'p miqdorda va har yili yangidan yetishtiriladigan paxta tolasi ko'rinishidagi xomashyo bazasining mavjudligi paxta to'la (momi) ni kimyoviy qayta ishlash va kimyo sanoati uchun reagent sifatida qobiliyati yuqori bo'lgan paxta sellyulozasi ishlab chiqarish va uning asosida sellyulozaning oddiy va murakkab efirlari (karboksimetil-, metil-, etil- va atsetilsellyuloza) ni olish, ana shu hosilalar asosida xalq xo'jaligi sohasida keng qo'llaniladigan muhim mahsulotlarni olish uchun imkoniyatlar beradi.

Ana shu ilmiy muammolarni hal qilish borasida o'zbek kimyoviy olimlari juda ko'p ishlarni amalga oshirdilar va salmoqli muvaffaqiyatlar erishdilar. Paxta sellyulozasining (sobiq) Kimyo va texnologiya institutida akademik X. U. Usmonov rahbarligidagi o'limlar

sil-sellyuloza ishlab chiqarish, sellyuloza diatsetati, triatsetati, sellyuloza pardalari olish, oziq-ovqat, parfyumeriya, farmatsevtika mahsulotlarini keng qo'llaniluvchi yuqori sifatli mikrokristallik sellyuloza olish usullari haqida ilmiy tahlildan boshlab, maxsus texnologiyalar asosida ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan ilmiy ishlarni amalga oshirdilar.

Hozirgi kunda ushbu muammolar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida akademik Rashidova boshchiligidagi guruh tomonidan hal qilinmoqda. Farg'ona shahrida Furan sellyuloza zavodi asosida umumiy quvvati 30 ming tonnagacha bo'lgan sellyuloza zavodi ishlab chiqaruvchi kompleks ishga tushish arafasida tashabbus qilinmoqda. Shuningdek, past navli paxta tolalarining katta miqdorda mavjudligi jahon bozorida yuqori sifatli tibbiyot paxtasiga bo'lgan katta talabni qondirish imkoniyatini beradi. Olimlarimiz tomonidan yuqori gidrofil paxta paxtasini ishlab chiqaruvchi yangi texnologiyalar yaratilmoqda. Yuqori sifatli paxta sellyulozasining mavjudligi mamlakatimizda qog'oz ishlab chiqarishga bo'lgan talabni to'la qondirishga asos bo'la oladi.

XXXIII bob


AZOTLI ORGANIK MODDALAR

XXXIII.1. Nitrobirikmalar

Nitrobirikmalar — azot atomi bevosita uglerod atomi bilan bog'langan nitrogruppaga — NO₂ — bog'langan organik moddalar nitrobirikmalar deyiladi.

Nitrobirikmalar azot atomi uglevodorodlardagi vodorod atomi o'rnini nitrogruppaga olishi natijasida hosil bo'lgan moddalar deyish mumkin. Nitrogruppalar soniga ko'ra mononitro-, dinitro- va polinitrobirikmalar bo'ladi.

Nitrobirikmalarning nomi boshlang'ich uglevodorodlar nomiga “nitro-” qo'shimchasi qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi. Masalan:




Nitrobirikmalarning umumiy formulasi R—NO₂. Yuqorida ko'rsatilganidek nitrobirikmalarda nitrogruppaning azot atomi uglerod

atomi bilan bevosita bog'langan. Shuning uchun dinitroglitserin va sellyuloza trinitratini, ularning tarkibida $-\text{NO}_2$ gruppasi ligiga qaramay, nitrobirikmalar jumlasiga kiritib bo'lmaydi. "Dinitroglitserin", "nitroglitserin" degan nomlar noto'g'ri: haqiqatda esa bu nitroglitserin kislota efilari bo'lib ular nitrogruppaning azot uglerod bilan kislorod atomi orqali ($-\text{C}-\text{O}-\text{NO}_2$) bog'langan Olinishi. Asosan nitrolash reaksiyalariga asoslangan.

Organik modda molekulasiga nitrogruppa kiritish nitrolash deyiladi. Nitrolash konsentrlangan nitrat kislota bilan sulfat kislota bilan (birlamchi nitrolovchi agent, ikkinchisi suvni tortib oluvchi vosita) iborat nitrolash chizi aralashma vositasida amalga oshiriladi.


Nitrolash — nitrobirikmalar olishning asosiy usulidir. Asosiy uglevodorodlar va ularning hosilalari eng oson nitrolanadi. Masalan:



Nitrogruppaning formulasini $-\text{NO}_2$ tarzida yozishda shuni tutish kerakki, unda azot to'rt valentli, nitrogruppadagi ikkala atomi teng qimmatli va har qaysisi bir elektronning yarimtadan zaryad tashiydi. Azot atomidagi musbat zaryad va kislorodning ikkala atomi manfiy zaryad nitrobirikmalarining qutbli tabiatga ega ekanligiga bo'ladi (nitrobirikmalar — qutblangan erituvchilar).

Trinitrotoluol kuchli portlovchi modda sifatida yaxshi ma'lum. U detonatsiya ta'sirida portlaydi. Ochiq havoda dudli alanga ko'rsatib portlamasdan yonadi.


To'yingan uglevodorodlar M. I. Konovalov reaksiyasi bo'yicha nitrolanadi:




Asosiy uglevodorodlarga suyultirilgan nitrat kislota ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan nitrolovchi agent (yoki yuqori bosimda) sodir bo'ladi. Nitrobirikmalar galogenalkillarning kumush nitrit bilan o'zaro reaksiya natijasida ham hosil bo'ladi:



Nitrogruppa qanday uglerod atomi bilan bog'langaniga qarab birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi nitrobirikmalar bo'ladi:




Xossalari. Nitroparafinlarning quyi gomologlari rangsiz, suyuqlik, xushbo'y, spirt va efir bilan yaxshi aralashadi. Ular elektr tokini o'tkazmaydi, suvda yomon eriydi. Birlamchi va ikkilamchi nitrobirikmalar suv bilan o'yuvchi ishqorlar eritmasida eriydi va ishqorni neytrallovchi. Birlamchi va ikkilamchi nitrobirikmalar molekulasidagi nitrogruppa birikkan uglerod atomidagi vodorod atomi metallarga almashina




Ushbu tushgan kristall cho'kma — metall hosila suvda oson eriydi va suv bilan aralashadi va lakmus bilan tekshirilganda neytral reaksiya beradi. Ular kuchli kislotalarning tuzlaridir.

Nitrobirikmalar qaytarilganda aminlar hosil bo'ladi:




Nitrat kislota efilari qaytarilganda esa spirt, ammiak va suv hosil bo'ladi:



XXXIII.2. Aminlar

Ammiak molekulasidagi bir yoki undan ortiq vodorod atomlari uglevodorod radikallariga almashinuvidan hosil bo'lgan organik molekulalar *aminlar* deyiladi. Ular molekulasidagi uglevodorod radikallarining soniga qarab, *birlamchi* (uglevodorod radikali bitta), *ikkilamchi* (uglevodorod radikali ikkita), *uchlamchi* (uglevodorod radikali uchta) aminlarga bo'linadi.




Birlamchi aminlar tarkibiga kiruvchi $-\text{NH}_2$ gruppasi $-\text{NH}_2$ aminogruppa deb ataladi.








Aminlar molekulasidagi radikallarning turiga ko'ra alifatik ($\text{R}-\text{NH}_2$) va aromatik aminlar ($\text{Ar}-\text{NH}_2$)ga bo'linadi.

Alifatik va aromatik aminlar


Nomenklatura va izomeriyasi. Odatda aminlarning nomi uglevodorod radikallari nomiga "amin" so'zini qo'shib hosil qilinadi. Masalan





Sistematik nomenklatura (IYUPAK) bo'yicha nomlashda aminogruppa tutgan uglerod atomi raqami, keyin "amino" so'zi qo'yiladi, undan keyin tarmoqlangan uglerod atomi raqami, undagi radikal va oxirida asosiy zanjirning nomi aytiladi.



Aromatik halqa bilan bog'langan aminlar *aromatik aminlar* deyiladi. Ular ham aromatik radikallar soniga qarab birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi bo'ladi:




Bulardan tashqari, bitta uglevodorod radikaliga ikki va undan ortiq aminogruppaga birikkan moddalar ham bor:



1, 2, 3-triaminopropan

Aminobirikmalarning izomeriyasi uglevodorod radikali tomonidan izomeriyasi va $-NH_2$ gruppining zanjirdagi o'rniga bog'liq bo'ladigan isboti sifatida yuqorida butil aminning izomerlari keltirilgan.

Olinishi. Gofman reaksiyasi. Bu usulda aminlarni olish alkilgalogenga ammiakning spirtidagi eritmasi ta'sir ettirilib, qoldiriladi. Bunda quyidagi reaksiyalar natijasida birlamchi amin hosil bo'ladi:



reaksiya uchun olingan galogenalkil miqdori oshirilsa, birlamchi amin ikkilamchi aminga aylanadi:




shu tariqa uchlamchi amin hosil bo'ladi.

2. Nitrobirikmalarni qaytarish yo'li bilan ham aminobirikmalarni olish mumkin:





3. Quyi spirtlarning ammiak bilan ta'siri natijasida metilamin va birlamchi aminlar olinadi:




Bu reaksiyada moddalar miqdoriy nisbatlarini o'zgartirib birlamchi aminlarni ham olish mumkin.

4. Aldegid va ketonlarni qaytarib aminlash usuli bilan birlamchi aminobirikmalar hosil qilinadi:




alkilaminlarda ammiak o'rniga birlamchi amin ishlatilsa, ikkilamchi amin hosil bo'ladi.

Alkilaminlar. Alkil aminlarning dastlabki uch vakili CH_3NH_2 , $(CH_3)_2NH$, $(CH_3)_3N$ lar xona sharoitida gazsimon moddalar, etilamindan birlamchi amin moddalaridir. Aminlar juda qo'lansa (aynigan baliq, go'sht) moddalar. Kichik molekulyar massalıkları suvda yaxshi eriydi, ularning massasi ortib borishi bilan eruvchanligi kamayadi. Aminlarning molekullari vodorod bog'larini hosil qiladi:





eritmada:





aminlarning molekulasida radikallar soni ortishi bilan vodorod bog'i hosil bo'lishi kamayib boradi. Uchlamchi aminlar o'zaro H-bog'lari orqali birlamchi aminlarnikidan past bo'ladi:





Alkilaminlar. a. Aminlar, ammiak singari azot atomida bir juft erkin elektronlari hisobiga suv molekulasini birlashtirib olib, suv namoyon qiladi. Shu sababli, ularni organik asoslar de-




b. Aminobirikmalar kislotalar bilan birga tegishli tuzlar hosil bo'ladi:



d. Bu hosil bo'lgan moddalar qattiq holatda bo'lib, ammonyak singari, suvda yaxshi eriydi va eritmaları elektr tokini o'tkazadi, ular dissotsilanadi:




e. Aminlarning ammoniy tuzlariga o'xshash yana bir xususiyat ularning tuzlarga ishqorlar ta'sir ettirilsa, qaytadan tegishli aminlarga ajralib chiqadi:



Aminlarning bu xususiyatlari boshqa organik moddalarda kuzatiladi. Ularning bu xususiyatidan foydalanib, aminobirikmalarni boshqa organik moddalar bilan aralashmalaridan ajratib olinadi.

f. Aminobirikmalar ammiakdan farqli ravishda havoda ishtirokida yonganda azot molekulasi hosil qiladi:



nitrobenzol sof azotgacha oksidlanadi. Bu holni hosil bo'layotgan azot (N) ning eng barqaror molekulalardan biri ekanligi bilan tushuntiriladi.

XXXIII.3. Aromatik aminlar


Aminlarning eng ko'p ishlatiladigan va o'rganilgan vakili




aminobenzoldir — $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ yoki

anilin o'ziga xos hidli suyuqlik. $t_{\text{eritilish}} = 6^\circ\text{C}$, $t_{\text{qaynash}} = 184^\circ\text{C}$. Uzoqroq vaqt qorayadi. Anilinni tarkibiga ko'ra ammiakdagi bir vodorod atomini fenil radikaliga almashinuvidan hosil bo'lgan modda yoki radikalidagi bir atom vodorodi aminogruppaga almashingan hosilasi bo'ladi.

Aromatik birlamchi aminlar, shu jumladan, anilin ham anilinni N. N. Zinin tomonidan kashf qilingan reaksiya asosida sintez qilinadi. Zinin reaksiyasi — aromatik nitrobirikmalarni $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ — ammiak sulfid ta'sirida qaytarishdir:



Anilin sintez qilishning boshqa usuli ham mavjud bo'lib, u nitrobenzolni cho'yan qirindisi va xlorid kislota aralashmasi ishtirokida amalga oshiriladi:



Anilinning keyingi yillarda yaratilgan qulay usuli — nitrobenzolni gazli bilan katalizator ishtirokida qaytarishdir:




Anilin bilan anilinning gomologlaridan toluidin ($\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$) va toluidin lak-bo'yoq sanoatining asosiy xomashyosidir. Anilin kimyoviy xossalari. Anilin kimyoviy xossalari — NH_2 va benzolning elektron tuzilishlari hamda ularning bir-biriga ta'siri bilan tushuntiriladi.


1. Benzol halqasi NH_2 — gruppasi elektron zichligini o'ziga uchun aminogruppaning asoslilik xususiyati (kamayadi) sababli anilinning suvli eritmasi lakmusni ko'k rangga bo'yo. Lekin juda kuchsiz asos sifatida kislotalar bilan tuzlar hosil



Hosil bo'lgan tuz *anilingidroxlorid* deb ham aytiladi, uning eruvchan tuz bo'lib, elektrolit xossasiga ega. Mo'l ishqor ta'sirida anilinga aylanadi:




2. Anilin benzol halqasi hisobiga almashinish reaksiyasida oson kirishadi. Agar anilinga brom ta'sir ettirilsa, $-\text{NH}_2$ nisbatan orto- va para-holatdagi vodorod atomlari bromga almashtiriladi:




Alifatik va aromatik aminobirikmalarining asosli xossalarini qiyoslash

Ammiak (H_3N) va aminobirikmalar molekulari ($\text{R}-\text{NH}_2$, R_2N)dagi azot atomlarining elektron tuzilishi o'xshash bo'lib, azot atomida bir juft taqsimlanmagan elektronlari hisobiga asoslilik xossasini namoyon qiladi. Alkil aminlarning asoslik xossasi ammiakdan kuchli:



ammiak molekulasidagi vodorod atomining alkil radikali almashirilishi azot atomi tomon elektronlarning siljishiga olib keladi. Azot atomining asoslik xossasi kuchayadi. Azot atomi elektron buluti zichligiga ega bo'lgani uchun suv molekulasidagi vodorodga kuchli tortib, OH^- — ionini osonlik bilan ajralishiga olib keladi:



alkil radikali (CH_3) kiritilishi bu xususiyatni yanada kuchaytiradi. Birinchi amin (ikkilamchi amin) metilamin (birlamchi amin) ga nisbatan kuchliroq asos xossasiga ega bo'ladi.


alkil radikali kiritilishi uchlamchi alkil aminning asoslilik xossasiga kuchli ta'sir oshirib borishi kerak edi. Ammo uchta alkil radikali bitta azot atrofida joylashganligi fazoviy jihatdan unda elektronlarning va demak manfiy zaryadning stabilashuvini qiyinlashadi. Bu o'z navbatida azot atomini suv molekulari tomonidan osonlik bilan o'ziga tortib olishiga to'sqinlik qiladi va aminning asos xossasining biroz kuchayishiga sabab bo'ladi.

alkil radikali kiritilishi uchlamchi alkil aminning asoslilik xossasining sezilarli oshishiga olib keladi.

alkil aminlarda benzol halqasining borligi azot atomidagi elektron bulutining uchinga siljishiga va azotning asoslik xossasi (suv molekulasidagi vodorod atomini o'ziga tortish xossasi)ni kuchsizlantiradi:



alkil halqalar sonining ortishi kutilganidek, aminlarning asoslilik xossasini kamaytirib boradi:



$1,8 \cdot 10^{-4}; 4,2 \cdot 10^{-4}; 6,0 \cdot 10^{-4}; 6,0 \cdot 10^{-4}$ dan ham kichik.

Anilin molekulasidagi benzol halqasida NH_2 — gruppada CH_3 — radikalining kiritilishi uning asoslik xossasini kamaytiradi, *para*- holatda bo'lishi esa aromatik aminning asosligini oshiradi.

Anilin molekulasiga Cl — yoki NO_2 — kabi elektron o'rinbosarlarning *para*-holatda kiritilishi mos ravishda ($K_{\text{as}} = 1,0 \cdot 10^{-13}$) asoslik xossasini kamaytiradi.

XXXIII.4. Amidlar

Kislotalar tarkibidagi karboksil gruppaning gidroksil aminogruppaga almashinuvidan hosil bo'lgan organik moddalarga deyiladi

Amidlar tarkibida amid gruppasi — $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ bo'lib,

umumiy formulasi $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ ga to'g'ri keladi.

Amidlarning nomlari tegishli kislota anoni nomiga "amid" qo'shish bilan, yoki tegishli kislota nomiga "amidi" so'zi qo'shish bilan.

$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ formamid, chumoli kislota amidi

$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ atsetamid, sirka kislota amidi



$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ propamid, propion kislota amidi

$\text{C}_6\text{H}_5-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}_2$ benzamid, benzoy kislota amidi

Amidlarning izomeriyasi amid gruppaga birikkan izomeriyasidan kelib chiqadi.

Amidlarning olinishi

1. Karbon kislotalarning ammoniyli tuzlarini qizdirib amidlarni olish.





ammoniy atsetat

atsetamid

Karboxil efirlarga ammiak ta'sir ettirish (ammonoliz) usuli bilan kislota mahsuloti sifatida kislota amidi va tegishli spirt hosil bo'ladi.

umumiy holda:



atsetamid

etilspirt

Karboksil anhidridlariga ammiak ta'sir ettirib olinadi:




Amidlarning xossalari. Chumoli kislota amidlaridan boshqa barcha amidlar suvda eriydigan moddalardir. Chumoli kislota amidlari o'ziga xos xossaliklar, kuchli erituvchilik xossasiga ega.

Amidlarning moddalari. dimetilformamid $\text{HC}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 153°C da qaynaydigan moddalarni tanlab erituvchanlik xossasi bo'lgani uchun


asetilenni (25°C da 1 l da 31,4 l asetilen eriydi) gazlar aralashmasini ajratishda ishlatiladi.

Kimyoviy xossalari. Amidlarning kimyoviy xossasi amid xususiyati va tuzilishi bilan izohlanadi.


1. Suv tortib oluvchi moddalar ta'sirida amidlar suvni nitrillarga aylanadilar:



2. NH_2 — gruppada tarkibidagi N-atamlari harakatchan bo'lgan ayrim metallar yoki ularning oksidlari ta'sirida metall bilan (amid) lar hosil qiladilar.




3. Amidlar kislotali va ishqoriy gidrolizlanib kislota va unun aylanadi:



Amidlar qatoriga yuqorida keltirilganlardan tashqari kislotalaning diamidi $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ — mochevina ham kiradi. Mochevina organizmdan asosan azotli moddalar almashinuvi natijasida chiqadi. Texnikada *karbamid* nomi bilan ham yuritiladi. Oq rangli, suvda eruvchan kristall modda. Tarkibida 46,6% azot elementi bo'lgan azotga eng boy o'g'it sifatida ishlatiladi.


Karbamid kimyo sanoatining eng muhim xom ashyosi formaldegid bilan polikondensatsiyalanib karbamid smolasini hosil qiladi.

amini sanoatda olish:



mochevina tibbiyot sanoatida dorilar (verenal — uyqu keltiruvchi) sifatida ishlatiladi.

Amid gruppalarini saqlangan moddalar qatoriga ikki asosli karbon diaminobirikmalarning o'zaro ta'sir mahsuloti *poliamidlar* kiradi. Masalan: "Naylon — 6,6" poliamid tolasi quyidagicha olinadi:




poligeksametilen adipinat (Naylon—6,6)

Naylon 6,6 — raqamlarining birinchisi — kislota tarkibidagi uglerod sonini, ikkinchisi — aminobirikma tarkibidagi uglerod atomlari sonini bildiradi.

XXXIII.5. Aminokislotalar

Amidlar asosiy tushunchalar. Aminokislota, bipolyar (svitter) tuz, peptid bog'i, peptidlar.

Aminokislotalar — organik molekulalar, ularning molekulasi glevodorod radikaliga birikkan amino — NH_2 va karboksil — COOH gruppalaridan tarkib topgan organik moddalar *aminokislotalar* hisoblanadi. Aminokislotalar quyidagi umumiy formulaga ega:






Aminokislotalar "amino" — va "karboksil" gruppalarining soniga qarab turiga qarab monoaminoamino, diaminoamino, aminodikarbon ularning alifatik, aromatik va siklik bo'lishiga qarab, geterohalqali amino-kislotalar sinfiga bo'linadi. Molekulalarida NH_2 — gruppasi va bitta — COOH gruppasi aminokislotalar aminomonokarbon kislotalar deyiladi (17-jadval).

Nomenklatura. Aminokislotalarni karbon kislotalar molekulasidagi H-atomi NH_2 — gruppaga almashinuvidan hosil bo'lgan molekulasidagi sifatida qaraladi. Shu sababli aminokislotalar empirik nom bilan ataladi. Ratsional nomenklaturaga ko'ra tegishli karbon kislota nomiga "amino" so'zi qo'shish bilan hosil qilinadi.

Aminokislotalar tarixiy nomlanishga ham ega. Aminosirka kislota tarixiy nomi — *glitsin*, aminopropion kislota — *alanin*, aminoisovalerian kislota — *valin* deb nomlanadi. Qarag'ay (trivial) nomlarni ko'pincha holda lotincha qisqartirilgan holda (gly, ala kabi) yozib qo'yiladi.





Molekulasi bitta — NH_2 va ikkita — COOH gruppali aminokislotalar ikki asosli aminokislotalar deyiladi. Masalan, $\text{HOOC}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ — asparagin kislota yoki aminoqahrabo kislota ham deyiladi.

Sistematik nomlashga ko'ra, aminokislota molekulasidagi bitta COOH gruppasining C-atomi birinchi raqamlanib, keyin aminogruppa bo'lgan uglerod atomi raqami, undan keyin tarmoqlangan zanjirdagi C-atomi (r) raqami va radikallar nomi aytilib, oxirida asosiy zanjirga to'g'ri kislota nomi aytiladi.


Bu nomlashga ko'ra: *glitsin* — 2-aminosirka kislota, *alanin* — 2-amino-3-metilbutan kislota, deb nomlanadi.

Aminokislotalarning izomeriyasi. Bu moddalarning izomeriyasi asosan, aminogruppaning joylashgan o'rnini va uglevodorod zanjirining izomeriyasi bilan bog'liq.

a) aminokislotalarda NH_2 — gruppasi karboksil gruppalariga bo'lgan masofa bo'yicha 1-C atomi (α -holat)da; 2-C atomi (β -holat)da; 3-C atomi (γ -holat)da joylashishi mumkin. Shunga ko'ra alaninning ikkita izomeri mavjud:

 α -aminopropion kislota β -aminopropion kislota β -alanin (β -ala)





Alanin uglerod zanjirining izomeriyasiga ko'ra aminokislotalarning izomeriyasi bo'lmaydi. Tarkibi $\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$ aminokislotalarning quyidagi izomerlari mavjud:




leysin (leu)

 α -amino- γ -metil pentan kislota.


Ikki izomer oqsillar tarkibiga kiruvchi tabiatda mavjud 22 aminokislota qatoriga kiradi. Lekin umuman aminokislotalarning soni 22 bo'lmaydi, chunki ularning bir qismini e'tiborga olsak, bu tarkibga yana quyidagi α -aminokislotalar kiradi:

2-amino-3,3-dimetilbutan kislota
 α -metil- β -(dimetil)butan kislota2-metilpentan kislota yoki
 α -metilpentan kislotaasparagin kislota (asp)
(α -aminoqahrabo kislota)glutamin kislota (glu)
(α -aminoglutar kislota)

Aromatik aminokislotalar tarkibida benzol halqasi, amino va funktsional gruppalar bo'lad. Funktsional gruppalar halqada yoki yon joylashgan bo'lishi mumkin:



α -amino- β -fenilpropionat



tirozin
 α -amino- β -(n-oksid)
propion kison


Geterohalqali aminokislotalar tarkibida geterohalqali yadro, α - va karboksil gruppalari bo'ladi. Aminogruppa geterohalqa tarkibida yon zanjirda joylashgan bo'ladi (37-jadval).

Ko'rinib turibdiki aminokislotalarning turi ko'p bo'lib, ular aminokislotalar muhim fiziologik ahamiyatga ega. Chunki, har qanday oqsil molekulasida α -aminokislotalar asosida tuzilgan.


Olinishi. 1. Aminokislotalar olish uchun asosiy tabiiy manba moddalar hisoblanadi. Ular gidrolizlanishi natijasida α -amino aralashmasi hosil bo'ladi. Bu aralashmalardan sof holdagi aminokislotalar ion almashinish xromatografiyasi usuli bilan ajratib olinadi.

Sintetik usulda aminokislotalar quyidagicha olinadi:

2. Tarkibida α -holatda galogen atomlari saqlagan karbon ammiak ta'sir ettirilsa α -aminokislota hosil bo'ladi:



3. Aldegidlarga ammiak ishtirokida malon kislota ta'sir etishi bilan bog'liq reaksiya shartlarini o'zgartirib, β -aminokislotalar olinadi (*Rodionov reaksiyasi*).



u ham asosli NH_2 — xossaga ega gruppalar borligi bilan o'ziga
b. ular *amfoter organik moddalardir*. Aminokislotalar ishqoriy
karboksil gruppining deprotonlanishi (H -atomi chiqib ketishi)
zarvadli *anionga* aylanadi.


etali muhitda aminokislotalar eritmadagi H^+ — ionlarining NH_2 — gacha birikishi natijasida kationga aylanadi.

holda aminokislota molekulasining $-\text{COOH}$ gruppadagi H^- molekuladagi NH_2^- gruppaga ko'chadi (migratsiyalanadi) va ikki qarama-qarshi zaryadli ionga aylanadi, bunday holatni yoki **svitter ion (s)** ko'rinish deyiladi.


“*ichki tuzlari*”ni aminokislotalarning “*ichki tuzlari*” ham deb aytiladi. Kislotalarning eritmada bipolyar ion holida bo‘lishi kislota yoki amfolyar miqdori, aniqrog‘i eritma pH i qiymatiga bog‘liq bo‘ladi.

amino kislotalar bipolyar ion holiga o'tadigan eritma pH ining izoelektrik nuqta (pH) deyiladi. Masalan: $pI_{gly} = 5,97$ demak, molekulasi suvli eritmaning muhiti $pH = 5,97$ bo'lganda bipolyar qiladi. Aminokislotalarning pI qiymatlari 17-jadvalda keltirilgan.

kinishib, aminobirikmalar singari ammoniy tuzlarini hosil



aminokislotalar asoslar bilan reaksiyaga kirishib, karboksil hisobiga (karbon kislotalardek) karboksilat tuzlarni hosil qiladi:







spirtlar bilan reaksiyaga kirishib murakkab efirlar

Keng tarqalgan α -aminokislotalar $R-CH(NH_2)COOH$


№	Nomi (qisqacha nomi)	R	pl
1.	Glitsin (glikokol (gly))	H	5,97
2.	Alanin (ala)	CH ₃	6,02
3.	Valin (val) ^a	(CH ₃) ₂ -CH-	5,97
4.	Leysin (leu) ^a	(CH ₃) ₂ HCH ₂	5,98
5.	Izoleysin (ileu) ^a	CH ₃ -CH ₂ CH(CH ₃)-	6,02
6.	Fenilalanin (phe) ^a	C ₆ H ₅ -CH ₂ -	5,88
Ikki asosli (kislotali) aminokislotalar			
7.	Asparagin kislotali (asp)	HOOC-CH ₂ -	2,871
8.	Glutamin kislotali (glu)	HOOCCH ₂ CH ₂ -	3,221
Oksi aminokislotalar			
9.	Serin (ser)	HO-CH ₂ -	5,68
10.	Treonin (thr) ^a	CH ₃ CH(OH)-	6,53
11.	Tirozin (tyr)	HO-C ₆ H ₄ -CH ₂	5,65
Amidoaminokislotalar			
12.	Asparagin (asn)	H ₂ NC(O)CH ₂ -	5,41
13.	Glutamin (gln)	H ₂ NC(O)CH ₂ CH ₂ -	5,63
Asosli aminokislotalar			
14.	Lizin (lyz) ^a	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	9,74
15.	Arginin (arg)	$ \begin{array}{c} \text{HN} \\ \parallel \\ \text{C} - \text{NH} - (\text{CH}_2)_3 - \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{N} \end{array} $	10,76
Oltinugurtli aminokislotalar			
16.	Metionin (met) ^a	CH ₃ -S-CH ₂ CH ₂ -	5,73
17.	Sistein (cyst)	HS-CH ₂ -	5,82
18.	Sistin (cys-syc)	-CH ₂ -S-S-CH ₂ -	5,06



Geterosiklik aminokislotalar


Prolin* (pro)		6.10
Hydroprolin* (hyrpo)		5.78
Triptofan ^a		5.88
Gistidin		7.58

– birinchi karboksil gruppaga uchun qiymat berilgan.
 qaynay olmaydigan aminokislotalar.



α-alanin


metil spirti



metil-α-alaninat

α-aminokislotalar uchun ularning mis (II)- gidroksid bilan
 olinuvchi to'q-ko'k rangli kompleks tuzi hosil bo'lishi xosdir.
 kompleks tuzlar *xelatlar* deyiladi:


ularning to'liq formulalari keltirilgan



Mis (II) glitsinat


Bunday (ichki kompleks) birikmalarni boshqa aminokislotalar qator boshqa 3d- metallar ionlari bilan ham hosil qilish xossasiga ega.

4. Aminokislotalarga nitrit kislota ta'sir ettirilganda oksikislota bo'lib, suv va azot ajralib chiqadi:




Bu reaksiyadan aminokislotalardagi aminogruppalarning aniqlashda foydalaniladi. Buning uchun ajralib chiqayotgan azotning o'lchanadi.


5. γ , δ yoki ϵ -aminokislotalarda aminogruppa bilan —COO gruppasi bir-biridan uzoqda joylashadi. Lekin, ular qizdirilganda uglevodlar radikalining bukiluvchanligi hisobiga bu gruppalarining o'zaro ta'siri shu tufayli halqasimon tuzilishli organik moddalar — laktamlar hosil bo'ladi:



6. Aminokislotalarning amino- va karboksil gruppalari o'zaro ta'siri bir molekula suv chiqib ketishi tufayli ikki (yoki undan ko'p) aminokislota molekullari birikib peptidlarni hosil qiladilar. Peptidlarni hosil qilishda —NH—C(O)— gruppasi (amid bog'i) yoki peptid bog'i deyiladi:




Peptid hosil bo'lishida ikki xil aminokislota ishtirok etsa, 4 xil peptid hosil bo'ladi. Misol: glitsin va α -alanindan hosil bo'ladigan peptidlarni ko'raylik:




Peptidlarni nomlashda avval birinchi turgan aminokislota qoldig'i, so'ngra ikkinchi aminokislota nomi aytiladi.


Peptidlar kislotali muhitda gidrolizlanib, qaytadan dastlabki aminokislotalarni hosil qiladi:



Peptidlarning hosil bo'lishi aminokislotalarning juda muhim xossasi bo'lib, oqsillar hosil bo'lishining asosini tashkil etadi.

Shu bilan birga, amid bog'larining hosil bo'lishi, sanoat jihatidan katta amaliy ahamiyatga ega, chunki amid bog'lari hosil bo'lishi poliamid tolalar (kapron, naylon tolalari) olinadi. Kapron tola uchun monomer sifatida ϵ -aminokapron kislota yoki uning laktam — kaprolaktam ishlatiladi:





Monomer sifatida kaprolaktam ishlatilsa, halqadagi ichki amid bog' uzilishi hisobiga polikondensatsiyalanish reaksiyasi boradi.

XXXIII.6. Oqsillar

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: oqsillar, polipeptidlar, birlamchi ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi tuzilish, protein, proteid, oqsil gidroliz, denaturatsiya.

Organik moddalar ichida shunday birikmalar ham borki, ular tarkibi tuzilishi, xossalari jihatidan biror organik modda sinfiga tegishli bo'lmay alohida turni tashkil etadi. Bular oqsillardir.

α — Aminokislotalarning polikondensatsiyalanishidan hosil bo'lgan va polipeptid bog'lari saqlagan tabiiy yuqori molekulyar moddalar oqsillar deyiladi.


Oqsillar tirik organizmlar hayotini ta'minlab turuvchi asosiy moddalar bo'lib, ularning tuzilishi juda murakkabdir.

Ayrim oziq-ovqat mahsulotlaridagi oqsil moddalarning miqdori (hisobida)

Go'shtda	12,9—14	No'xatda	22
Jigarda	18—19	Sutda	3,4
Buyrakda	16—17	Sholida	8
Tuxumda	12	Makkajo'xorida	8
Kartoshkada	2		

Har qanday oqsilning o'ziga xos eng asosiy qismi — uning — NH — peptid bog'idir. Peptid bog'larning hosil bo'lishi yuqoridagi mavzuda tushuntirib o'tildi.

Oqsillar — polipeptidlardir, ya'ni ko'p sonli (200—10000000) α-aminokislotalarning qoldiqlaridan tashkil topgan polimer moddalar. Umumiy holda polipeptidlarni quyidagicha tasvirlash mumkin:



R^I, R^{II}, R^{III}, R^{IV} — α — aminokislotalarning tarkibiga kiruvchi radikallar. Tik chiziqlar bilan polipeptidni hosil qilgan aminokislota qoldiqlari belgilangan.

Oqsil makromolekulasida aminokislota molekulari qoldiqlari o'rtasida peptid bog'lari mavjudligi gipotezasini A. Ya. Danilevskiy (1888 y.) aytgan. XX asrning boshlarida nemis olimi E. Fisher 19 aminokislotalardan polipeptidni sintez qilib, bu gipotezaning to'g'riligini isbotladi. Ular tarkibiga turli sonli 22 xil α-aminokislota qoldiqlari kiradi. Masalan: insulin — 51, mioglobin — 140 ta aminokislota qoldig'idan tuzilgan bo'lsa, qon gemoglobinining tarkibi (C₇₃₈H₁₁₆₆O₂₀₈N₂₀₃S₂Fe)₄ — 4 ta — 2 ta α — va 2 ta β-gemoglobin birikmasidan iboratdir (M_r = 16312—65248).

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, oqsillar juda "katta" molekullar bo'lib, ular tarkibiga ko'p sonli α-aminokislota qoldiqlari kiradi. Shunday molekullarning tuzilishi juda murakkabdir.

Oqsillarning tuzilishi. Oqsillarning tuzilishi ularning gidrolizlanish mahsulotlarini o'rganish bilan aniqlangan. Gidrolizlanish oqsillarning asosiy xossalariidan biri bo'lib, oqsillardagi peptid bog'lari suv molekulalari ta'sirida uzilib, reaksiya mahsulotlari sifatida α — aminokislotalar hosil bo'ladi.

Oqsillarning birlamchi tuzilishini F.Senger kashf etgan. U birinchi marta 1951—1953-yillarda C₂₅₄H₃₇₇N₆₅O₇₅S₆ tarkibli insulin oqsilining aminokislotalar ketma-ketligini aniqladi.

Insulin sulfid bog'lari bilan tutashgan 2 ta polipeptid zanjiridan tuzilgan, zanjirda 21 ta, 2-zanjirda 30 ta aminokislota qoldig'i, jami 51 ta aminokislota bor. Keyinchalik oqsilning birlamchi tuzilishini avtomatik usulda aniqlaydigan analizatorlar va shu axborot do'yicha tegishli oqsillarning birlamchi tuzilishi aniqlangan. Masalan, sitoxrom 104

— peptid gruppada $r_{C-N}=1,32$ Å bo'lib, bu qiymat birlamchi bog' uzunligi $r_{C-N}=1,47$ Å dan kichik, lekin haqiqiy qo'shbog' $r_{C-N}=1,27$ Å dan kattadir.

— peptid gruppasi bilan bog'langan $C_\alpha-C$ va $N-C_\alpha$ bog'lari ham birlamchi bog'lar bo'lib, bu bog'lar atrofida atomlar (yoki atomlar gruppasi) erkin "aylanishi" yoki o'z holatini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib, oqsil molekulasining bukiluvchanligini ta'minlaydi.

Ikkilamchi tuzilish. Uzun zanjirli polipeptid molekulasi bukiluvchi sababli, "lenta" ga o'xshash, spiralni hosil qiladi. Bu oqsillarning ikkilamchi tuzilishi bo'lib, spiralning yo'nalishi soat millari bo'yicha bo'lsa (o'ng spiral) α — spiral, teskari yo'nalish bo'yicha bo'lsa (chap spiral) β — spiral deyiladi (36-rasm).

Spiral hosil bo'lishida spiral yo'nalishidan tashqariga chiqib qolgan peptid gruppalarining tarkibidagi kislorod va vodorod atomlari o'zaro H-bog'lari hosil qilib bu bog'lar spiralning barqarorligini ta'minlaydi (36-rasm). H-bog'lari har to'rtta aminokislota qoldiqlarida mavjud bo'ladi, keyin takrorlanadi. Spiralidagi aminokislota qoldiqlari o'zaro 100° burchak ostida, bir-biridan 1,5 Å masofada joylashadi, spiralning bir o'rni 3,6 Å ta aminokislota qoldig'iga to'g'ri kelib, uzunligi 5,4 Å ni tashkil etadi (36, a-rasm).

Oqsil molekulalarida α — spiralning uzunligi turlicha bo'ladi. Masalan, mioglobin va gemoglobinda 40 Å ni tashkil etsa, ba'zi oqsillarda uzunligi 1000 Å va undan katta bo'ladi (37, a, b-rasm).



37-rasm. Mioglobin (a), gemoglobin (b)

uchlamchi tuzilish. Ikki yoki undan ortiq α — spirallar bir-biri atrofida joylashib, oqsillarning uchlamchi tuzilishini tashkil etadi. Bu spirallar yonaki zanjirni tashkil etgan funksional gruppalar o'zaro tuz ko'priklari ($>NH$, ... $OOC-$), vodorod bog'lari ($NH \cdots O=C$) va disulfid ($-C-S-C-$) bog'lari orqali bog'lanadilar. Bunday uchlamchi oqsillarga soch tolasi keratini, miozin, muskullar, teri epidermisi, fibroin, elastin, qon qotishmasi kiradi. Ko'p sonli spirallarning yonaki bog'lanishi ta'minlovchi to'qimalarning asosini, mexanik mustahkamlikni ta'minlovchi to'qimalarni tashkil etadilar. Bundan tashqari, uchlamchi tuzilishi ularning biologik va o'ziga xos xususiyatlarini belgilay beruvchi asosiy sababchisidir.

Neytning yillarda (L. Poling va R. Kori) olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida oqsillarning β — yoyma tuzilishi mavjudligi aniqlandi.

β — yoyma tuzilish α — spiral tuzilishidan farq qilib, polipeptid zanjiri yoyilgan holatda bo'lib, tekis ko'rinishga ega (37, b-rasm).

β — yoyma o'q bo'yicha joylashgan aminokislota qoldiqlari o'rtasidagi masofa 3,5 Å (α — spiralda 1,5 Å)ga teng. Bu tuzilishining o'ziga xos shundaki, $-NH$ va CO — peptid gruppalar o'rtasida hosil bo'luvchi H-bog'lari ikki qatorda parallel ($\rightarrow$) yoki antiparallel yo'nalishda yon-yon joylashgan 2 tadan 5 tagacha polipeptid zanjirlari o'rtasida mavjud bo'ladi. Bunga misol sifatida ipak tolasi fibrionini keltirish mumkin. Bundan tashqari, oqsillarning *kollagen* spiral tuzilishi ham mavjud bo'ladi, suyak, teri, paylar tarkibida uchraydi.

Oqsillarning molekulalari o'ta bukiluvchanligi bilan ajralib turadi. Bu bukiluvchan oqsil molekulalarida to'rtta aminokislota qoldig'i o'rtasida joylashgan $-NH-$ va $-CO-$ gruppalar o'zaro vodorod bog'lari hosil qilishi natijasida polipeptid zanjirlari yo'nalishi 180° ga teskari tomonga) o'zgaradi. Bu hodisa β — bukilish deyiladi. β — bukilish natijasida polipeptid zanjiri "U" — simon (soch shpilkasi) shakliga ega bo'ladi va keyingi β — bukilish zanjir yo'nalishini yana o'zgartiradi. Oqsillarning bunday xususiyati tufayli ularning globulyar tuzilishi yuzaga keladi. Bunday tuzilishli oqsillar "aylana o'ram" shaklida ko'rinishga ega bo'lib, ularda vodorod bog'laridan tashqari tuz ko'priklari, disulfid bog'lari ham mavjud bo'ladi. Globulyar tuzilishli oqsillar fermentlarni kiritish mumkin.

Tetramchi tuzilish. Oqsil molekulalarining ayrimlari o'zaro bog'lanish natijasida yirik agregatlar hosil qiladilar. Bunda oqsil molekulalari monomerlar singari o'zaro birikib yirik molekulyar (to'rtlam-

chi) tuzilishni yuzaga keltiradilar. To'rtlamchi tuzilish asosan yonma funksional gruppalarining o'zaro ta'siri (H-bog'lanish, tuz ko'priklari, gidrofob ta'sirlar) natijasida yuzaga keladi.

Oqsillarning asosiy xususiyatlari

Oqsillarning fizik xossalari. Oqsillar oddiy sharoitda suyuq (qon, tuxum oqsili, qon, silliq pardali sut oqsili, fermentlar) va qattiq (suyaklar, jun, ipak tolasi, teri, paylar, muskullar) holida bo'ladi. Oddiy suyuq oqsillar globulyar, qattiqlari — fibrillyar (tolasimon) tuzilishga ega bo'ladilar.

Oqsillarning asosiy fizik xususiyatlari qatoriga ularning eruvchanligi ham kiradi. Oqsillar suvda turlicha eriydi. Masalan, globulyar tuzilishli tuxum oqsili, fermentlar suvda eriydi. Fibrillyar tuzilishli oqsillar suvda erimaydi.

Oqsillarning eritmalari amfoter xossaga ega, ya'ni zanjirining boshlanishidagi amino gruppasi ($-\text{NH}_2$), oxiridagi karboksil gruppasi ($-\text{COOH}$) holatida bo'ladi.

Oqsillarning asosiy kimyoviy xususiyatlari qatoriga ularning gidrolizlanishi va denaturatsiyasi kiradi.

Oqsillarning gidrolizlanishi to'g'risida yuqorida qisman so'z yuritildi. Gidrolizlanish reaksiyalari asosan suvli eritmalarida ro'y beradi. Oqsillarning gidrolizi tirik organizmda maxsus oqsil moddalar biologik katalizator — fermentlar ta'sirida boradi. Gidroliz mahsulotlari sifatida ketma-ketlik bilan polipeptid → oligopeptid → dipeptid → aminokislotalar hosil bo'ladi.

Sun'iy gidroliz reaksiyalari 6M HCl ta'sirida (110°C) 24 soat davomida olib boriladi. Gidroliz mexanizmi yuqoridagi singari bo'lib, so'nin mahsulot α — aminokislotalar aralashmasi hosil bo'ladi. Bu aralashma dan aminokislotalar ion almashinish xromatografiyasi usuli bilan ajratiladi.

Oqsillar denaturatsiyasi. Turli kimyoviy va fizikaviy ta'sirlar natijasida oqsil molekulalarining tabiiy tuzilishi va biologik xossalari yo'qolishi oqsil denaturatsiyasi deyiladi.

Oqsil denaturatsiyasi uning ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi tuzilishlarining buzilishi bilan sodir bo'lib, faqat birlamchi tuzilishli polipeptid zanjiri saqlanib qoladi. Masalan: sutning, tuxumning ayirilmagan yoki pishishi; qonning quyuqlashuvi va qotishi; go'sht mahsulotlari qotishi yoki aynishi va hokazolar.

Oqsil denaturatsiyasiga olib keluvchi sabablar:

a) fizik ta'sirlar:

- temperatura o'tishi (qizdirish, qaynatish);
- ultratovush;
- radiatsiya;
- kuchli mexanik ta'sir (kuchli aylanma yoki tebranma harakat).

b) kimyoviy ta'sirlar:

- oksidlovchi yoki qaytaruvchilar ta'siri;
- eritma pH qiymati (H^+ yoki OH^- ionlari miqdori)ning o'zgarishi;
- oqsil tarkibidagi H — bog'larini buzuvchi moddalar, masalan, chevinina ta'siri;

— oqsil tarkibidagi gidrofob ta'sirlarni buzuvchi moddalar ta'siri;

— og'ir metallar Zn^{2+} , Pb^{2+} , Hg^{2+} — ionlarining ta'siri.

Bu ta'sirlar natijasida ro'y beradigan denaturatsiya jarayonlari qaytar qaytmay bo'lishi mumkin.

Kuchli temperatura ta'sirida (tuxum oqsili — albuminning qotishi, go'sht mahsulotining pishishi) og'ir metallar tuzlari bilan zaharlanish, denaturatsiya ta'sirida sodir bo'ladigan denaturatsiya qaytmay denaturatsiya bo'ladi.

Bunda oqsil o'zining biologik funksiyasini yo'qotadi.

Ayrim hollarda oqsil moddalarning unchalik "chuqur" bo'lmagan qaytarishlarga uchrashi, ya'ni qaytar denaturatsiya sodir bo'ladi. Masalan,

— ini qayta ishlash (sochlarni pardozlash, bo'yash) jarayonlarida asosan ulardagi disulfid ($-\text{C}-\text{C}-$) gruppalarini buzib SH — sulfidril

guruhga o'tkaziladi (qaytaruvchilar ta'siri). Keyin oksidlovchilar (peroksid eritmasi) ta'sirida qaytadan $-\text{C}-\text{C}-$ gruppalarini tiklanadi, oqsil

asl holatiga qaytadi.

Ba'zi hollarda oqsillar eritmalariga NaCl, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ kabi tuzlar, chevinina va boshqa moddalar qo'shilsa, oqsillar cho'kadi va ayrim

xususiyatlarini yo'qotadi. Agar suv qo'shib eritmadagi bu moddalar konsentratsiyasi kamaytirilsa, qaytadan oqsil eritmaga o'tadi va xossalari

qaytadan tiklanadi.

Oqsillarning turlari va ularning asosiy vazifasi

Oqsillar tarkibi, organizmda bajaradigan vazifasi (funksiyasi) va tuzilishiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Tuzilishiga ko'ra:

- Fibrillyar oqsillar (jun, ipak tolasi, suyak, muskul, pay to'qimalar, tolaloxsimon moddalar);

— **Globulyar oqsillar** (tuxum albumini, fermentlar sut tarkibida oqsillar):

2. **Organizm**da bajaradigan vazifasi (funktsiyasi)ga ko'ra:

— **Fermentlar** (organizmda boradigan reaksiyalarni tezlashtiruvchi biokatalizatorlar). Tripsin, emulsin, pepsin, amilaza, lipaza va hokazo.

— **Organizm tuzilishini va harakatlanuvchanligini ta'minlovchi oqsillar** (teri, soch, tirnoq, tuyoq, shoxlarni hosil qiluvchi keratin, pavlansin, qiluvchi kollagen, fibroin, miozin, aktin);

Regulyator (boshqaruvchi) oqsillar — organizmda kechadigan oqsillar va nuklein kislotalar sintezini va siljishini boshqaruvchi oqsillar.

— **Reseptor oqsillar**. Tashqi muhitdagi o'zgarishlar haqida asab tizimiga ma'lumotlar beruvchi hujayralar tarkibiga kirib, asab tizimi faoliyatini va harakatini yo'naltiruvchi oqsillar rodopsin, yodopsin).

Transport (tashuvchi) oqsillar. Qandimon moddalarni, turli ionlarni, lipidlarni, aminokislotalarni, kislorodni, energiyani tashuvchi va uzatuvchi oqsillar (gemoglobin, mioglobin, sitoxromlar).

— **Oziq oqsillar**. Organizmga zarur oziq moddalar vazifasini bajaruvchi oqsillar (sut oqsili -kazein, prolamin, tuxum oqi -albumin, bug'doyda -gliadin, makkajo'xorida -zein, qonda -ferritin).

— **Himoyalovchi oqsillar**. Organizmning tashqi muhit o'zgarishlariga kasalliklarga qarshi himoya xususiyatini (immunitetini) ta'minlovchi oqsillar (immunoglobulinlar, interferonlar, trombin, fibrin).

3. **Tarkibiga ko'ra oqsillar**:

— **oddiy (proteinlar)** — gidrolizlanganda faqat aminokislotalarni hosil qiluvchi oqsillar; masalan, suvda eriydigan albuminlar-tuxum, bug'doy, no'xat oqsillari;

— **Murakkab (proteidlar)** — gidrolizlanganda aminokislotalar va boshqa nooqsil moddalar (uglevodlar, nuklein kislotalar, metallarni ionlari, fosfat kislotalar qoldiqlari, lipidlar, pigmentlar) ni hosil qiluvchi oqsillarga bo'linadilar. Masalan, nukleoproteidlar (xromosoma) oqsil va nuklein kislotadan tuzilgan, xromoproteidlar - rangli oqsillar (gemoglobin, mioglobin) oqsil va temir ionli pigmentdan iborat, lipoproteidlar (karotin) oqsil va lipiddan, glikoproteidlar oqsil va uglevoddan, fosfoproteidlar (kazein-sut oqsili, vitellin - tuxum sarig'i oqsili) oqsil va fosfat kislotadan tuzilgan.

Tuzilishi bo'yicha suvda, namakobda eriydigan **yumaloq-globulyar oqsillar** (gemoglobin, albumin, globulin, fermentlar); suvda erimaydigan



Sadiqov Obid Sodiqovich
(1913—1987)

Obid Sodiqov doktori, professor. O'zRFA a'zosi. 600 dan ortiq ilmiy maqolalari, 10 ta xalqaro ilmiy guvohnomasi bor. 10 ta ilmiy kitobi va 80 ta fan nomzodlarini tayyorlagan. G'ozadan ajratib olingan kompleks kimyoviy tekshirish uchun D. I. Mendeleyev nomidagi oltin medali bilan mukofotlangan.

tolasimon- fibrillyar oqsillar (keratin, kollagen, fibroin, miozin) mavjud. Oqsillar suvda kolloid eritma hosil qiladi.

Oqsillarni aniqlovchi sifat reaksiyalari.

— **biuret reaksiyasi**: idishdagi oqsil eritmasiga 10% li ishqor eritmasidan 1-2 ml qo'shib, ustiga 2% li CuSO_4 eritmasidan tomchilatib qo'shilganda, eritma rangi ko'k bo'lishi dipeptidni, binafsha rang bo'lishi tripeptidni, qizil rang bo'lishi esa yuqori molekulyar oqsillarni ko'rsatadi;

— **ksantoprotein reaksiyasi**: konsentrlangan nitrat kislotasi ta'sirida oqsillar sariq rangga, konsentrlangan ammiak eritmasida esa to'q sariq rangga kiradi;

— **milon reaksiyasi**: simob nitrat tuzining nitrat va nitrit kislotalaridagi eritmasiga oqsilni qo'shib qizdirilganda, oqsil bir joyda to'planib, pushti-qizil rangli cho'kma hosil qiladi. Bu tirozin va triptofan uchun xos bo'lgan reaksiyadir;

— **ningidrin reaksiyasi**: oqsillarni ningidrin eritmasi bilan qo'shib qizdirilsa, eritma ko'k rangga bo'yaladi. Oqsillar va umuman, tabiiy organik birikmalar kimyosi bilan reserchamizda marhum akademik O. S. Sodiqov boshchiligidagi qator olimlar (H. A. Aslonov, P. Yo'ldoshev) va ayni vaqtda O'zRFA "Bioorganik kimyo" instituti xodimlari shug'ullanib salmoqli natijalarga erishgan.

Savollar

1. Aminokislotalar deb, qanday moddalarga aytiladi?
2. Tabiatda asosan necha xil aminokislotalar mavjud?
3. Aminokislotalarning bipolyar ion (svitter-ion) holatlarini izohlang.

4. Aminokislotalarning izoelektrik nuqtasi (pI) deganda nimani tushun kerak?
5. Aromatik va geterotsiklik aminokislotalarga misollar keltiring.
6. Aminokislotalarning izomeriyasi (turlari) ni izohlang.
7. Peptid bog'lari deganda nimani tushunasiz?
8. a-ala, gly va b-ala dan necha xil dipeptid va tripeptidlar hosil bo'ladi?
9. Kapron tolasi monomeri formulasi va uning polimerlanish reaksiyasini yozing.
10. b-ala va asparagin kislotalarining NaOH va HCl bilan reaksiyalarini tenglamalarini tuzing. Hosil bo'lgan moddalarni nomlang.


XXXIV bob

GETEROSIKLIK BIRIKMALAR

O'rganiladigan asosiy tushunchalar: *geterotsiklik birikma, pirrol, furan, tiofen, piridin, purin, adenin, guanin, sitozin, timin, uratsil, nukleotid, DNK va RNK.*

Tarkibida uglerod atomlaridan tashqari boshqa element (getero) atomlari saqlagan halqasimon tuzilishli moddalarga geterotsiklik birikmalar deyiladi. Geteroatom sifatida N, O, S, P, As kabi element atomlari bo'ladi.


Geterotsiklik birikmalar ichida eng ko'p tarqalganlari kislorod, azot va oltingugurt atomlari tutgan besh va olti a'zoli halqalilardir. Ular quyidagilar:



Bu birikmalardagi halqani hosil qilgan barcha atomlardagi elektron orbitallari sp^2 gibridlangan bo'lib, ular bitta tekislikda joylashgan. Gibridlanishda ishtirok etmayotgan p — elektron bulutlarining (barcha)

halqalarga nisbatan perpendikulyar joylashuvi sababli umumiy tashqari (π -bog'lar o'rami) hosil bo'ladi va barcha geterotsikliklar aromatik xossaga ega bo'ladilar.

6 a'zoli geterohalqalarning tuzilishi va undagi bog'larning uzunligi va ichki burchaklari quyidagicha:



Geterotsiklik birikmalarda halqadagi geteroatom birinchi, keyin uning komonidan atomlar raqamlanadi (yuqoriga qarang).

Pirrol, furan va tiofen suvda erimaydigan, o'ziga xos hidli suyuq moddalardir.

Ular moddalar halqadagi vodorod va geteroatomlar hisobiga turli xossalarga ega bo'lib, turli maqsadlarda ishlatiladi.


Geterotsiklik birikmalar ichida azotli geterobirikmalar ko'proq qimmatli bo'lgani uchun ular bilan yaqindan tanishib chiqamiz.

XXXIV.1. Azotli geterotsiklik birikmalar


Bu moddalar qatoriga halqasida bir yoki undan ortiq azot atomlari bo'lgan bir yoki ikki halqali birikmalar kiradi. Ular: pirrol, piridin, pirimidin, purinlardir. Pirrol va piridinining formulalari yuqorida keltirildi. Ular quyida keltiriladi.

Pirrol — rangsiz, 130°C da qaynaydigan, suvda erimaydigan, xloroformda eriydigan, eslatuvchi suyuqlik. Tabiatda toshko'mir smolasi va suyak moyi tarkibida bo'ladi. Pirrol — "qizil moy" ma'nosini anglatadi.

Qizil moy a) ammiakni butin -2 diol — 1,4 bilan katalizator ishtirokida oksidlash natijasida hosil qilinadi:




b) qahrabo (yantar) kislota imidini rux kukuni bilan qizdirish natijada olinadi:



Kimyoviy xossalari jihatdan pirrol anilonga o'xshaydi. Lekin anilonga farqli ravishda pirrolning iminogruppadagi vodorod atomi kislotalar bilan singari metall atomiga almashinadi:



Pirrolning kislotalik kuchi ($K_{\text{dis}} = 5,4 \cdot 10^{-15}$) fenolniki ($K_{\text{dis}} = 1,3 \cdot 10^{-10}$) dan kam. Halqadagi qo'shbog'lari hisobiga gidrogenlanib to'yinib, geterotsiklik modda — pirrolidinga aylanadi:




Pirrolidin kuchli asos xossasiga ega, suyuq modda ($t^\circ_{\text{qay}} = 40^\circ$, $K_{\text{as}} = 1,3 \cdot 10^{-3}$). Pirrolidinning eng muhim tabiiy hosilasi prolin oksiprolin (aminokislotalar)dir.

uning qisman (chala) vodorod birikishidan hosil bo'ladigan — pirrolin biologik ahamiyatga ega bo'lgan modda bo'lib, xlorofill va xlorofill zarrachasi tarkibiga kiruvchi porfirin halqasining tashkil etadi. Bular qonga to'q-qizil, barglarga yashil rang beruvchi pigmentlar (pigmentlar) vazifasini bajaradi. Tarkibida pirrol asosidagi porfirin halqasi saqlagan moddalarga yana *gemin* (qon rangli pigment) va *B₁₂* ($\text{C}_{63}\text{H}_{90}\text{O}_{14}\text{N}_{14}\text{PCo}$) (jigardan ajratib olinuvchi, qon rakini davolashda ishlatiladigan modda) kobalt ioni kompleks birikmasi ham

Pirrolin. Olti a'zoli geterotsiklik modda bo'lib, suvda eriydigan, badbo'y, 115°C da qaynovchi suyuqlik.

Pirrolin molekulasining tuzilishi benzolning tuzilishiga o'xshash bo'lib, uning yuqori dipol momenti (2,2D) ga ega.



Tuzilishi benzolga o'xshash bo'lsada, ayrim xossalari bilan undan farq qiladi.

1. Etil spirti muhitida Na — metall bilan etanol ta'sirida ajralib chiquvchi atomi vodorodni biriktirib piperidinga aylanadi: $\text{C}_4\text{H}_5\text{N} + 6\text{H} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}\text{NH}$ (piperidin).


2. HJ bilan qo'shib qizdirilsa, n — pentanni hosil qiladi:



3. Ni katalizatori ishtirokida gidrogenlanib, amilamin (n — amino)ni hosil qiladi:



4. Pirrolin (uning gomologlari) uchlamchi aminlar singari asos xossasiga ega. Shu sababli kislotalar bilan birikib, piridiniy ioni hosil qiladi.




Piridin pikrin kislotalari (2, 4, 6 — trinitrofenol) bilan oddiy ta'sirlashuvda HgCl_2 , PtCl_2 , AuCl_3 lar bilan qo'shtuz hosil qilishidan foydalaniladi.

Tarkibida ikki va undan ortiq azot geteroatomlari bo'lgan (tuz) geterotsiklik birikmalar

Bu birikmalar qatoriga **pirimidin** va **purin** qatori geterotsiklik birikmalar kiradi.


Pirimidin: $\text{C}_4\text{H}_4\text{N}_2$. Olti a'zoli geterohalqaga ega bo'lgan birikma.



Oq rangli, $t^{\circ}_{\text{sayuq}} = 21^{\circ}\text{C}$, $t^{\circ}_{\text{qay}} = 124^{\circ}\text{C}$,

suvdan eruvchan modda


Purin $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_4$. Ikkita geterohalqa (6 — a'zoli va 5 — a'zoli) birikishidan (kondensatlanishidan) hosil bo'lgan modda:



Pirimidin va purin yon zanjiri (halqadan tashqari)da karbonil va amino gruppalarini saqlagan birikmalarni hosil qiladilar. Bu moddalar nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi organik (azotli) asos qoldiqni tashkil etib, biologik jihatdan tirik organizmlarning hayotini ta'minlab turuvchi asosiy moddalardir. Ular qatoriga

— pirimidin asosidagi birikmalar (timin, sitozin, uratsil);

pirimidin asosidagi birikmalar (adenin va guanin)lar kiradi 38-rasm). Ularlardan (pirimidin asosidagi 1—N-atomidan va purin asosidagi 9—N-atomidan) vodorod atomlarining ajralishi natijasida radikal (timil, sitozil, uratsil, adenil va guanil) hosil bo'lib, kislotalarining azotli asos qoldiqlari vazifasini bajaradi.



38-rasm. Purin va pirimidin asosidagi geterotsiklik birikmalar va ularning shartli belgilari.

Respublikamizda geterotsiklik birikmalar olish va ularning xossalari olish borasida marhum akademiklar O.S.Sodiqov va S. Yu. Yunusov o'qitgan va hozirda professor X. M. Shoyimov rahbarligidagi O'zRFA O'simlik moddalari kimyosi va O'zRFA "Biorganik kimyo" institutlari olimlari muvaffaqiyatli ilmiy ishlar olib borishayapti.

XXXIV.2. Nuklein kislotalar

Uning 50-yillarigacha tirik organizmlarda boradigan barcha o'zgaruvchan jarayonlar faqat oqsillar ishtirokida boradi, deb o'ylanar edi. Keyingi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar muhim biolo

gik hodisalar: oqsillarning sintezi, irsiy xususiyatlarning nasidan o'tishi, hujayralarning ko'payishi va bu jarayonlar tezliklarini belgilovchi oqsillar bilan birgalikda yana "boshqa" moddalar ishtirokida oshishi aniqlandi. Bu o'ta muhim "boshqa" moddalar nuklein kislotalardir, chunki ular hujayra yadrosi tarkibida topilgan.

Nuklein kislotalarning molekulyar massasi 10.000 dan 10.000.000 gacha bo'lib, tarkibi, fizik-kimyoviy xossalari va biologik funktsiyalari bilan oqsillardan farq qiladilar.

Nuklein kislotalarning umumiy tarkibini quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Oddiy qilib aytganda, nuklein kislota bir necha nukleotid qoldig'ining fosfat kislota qoldiqlari orqali birikishidan (polikondensatsiyalashidan) hosil bo'lgan polimer moddadir.

Nukleotid va nukleoziddagi tarkibiga ko'ra nuklein kislotalar ikki turga bo'linadi: a) ribonuklein kislota (RNK), b) dezoksi-ribonuklein kislota (DNK).

Nuklein kislotalarning tuzilishi


DNK — molekulasining tuzilishi. DNK molekulasini molekulalar dezoksiribonukleotidlar (yoki dezoksiribotidlar) bo'lib, ular:

D — dezoksiriboza (pentoza)ning 1—C atomidagi glikozid guruhga (purin yoki pirimidinli) azotli asos qoldig'i (shartli N belgilangan) ga almashinuvi, C₃ va C₅ — atomidagi gidroksilning kislota qoldig'i (HO)₂P(O)O shartli

— P bilan efilanishidan hosil bo'lgan. Masalan: nukleotidlar orasida adenzin nukleotidi (adenin+riboza)ning bir (AMF), ikki (ADF) va uch (ATF) fosfatli turi mavjud. Adenzin fosfatlar tirik organizmlarda energiya zaxirasi energiya manbaidir. Bu dezoksiribonukleotidlar o'zaro polikondensahlanib, yuqoridagi DNK molekulasini hosil qiladi. Nukleotid gruppalarining o'zaro ketma-ket birikib hosil qilgan uzun (molekulyar) zanjiri

nuklein kislotalarning birlamchi tuzilishi deyiladi. Birlamchi tuzilishni tashkil etgan nukleotidlar ketma-ketligi va ularning nisbatan tirik organizm uchun o'ziga xos bo'lib, DNK molekulasining biologik kimyoviy xossalari jihatidan har xil bo'lishini ta'minlaydi.

chi tuzilishlar bitta nuklein kislota makromolekulasi yanada o'ziga ega bo'lishi uchun ikkinchi nuklein kislota o'ziga o'ziga zanjiri bilan o'ralib spirallashib ikkilamchi tuzilishni hosil qiladi. Bunday tuzilish ikkala nuklein kislota azotli asos qoldiqlarining gidrofil va gidrofob bog'lar hosil qilishi tufayli yuzaga keladi. Birinchi zanjirdagi purin asosidagi azotli asos qoldig'i II zanjirdagi pirimidin asosidagi azotli asos qoldig'i bilan batartib joylashgan vodorod bog'lanishli "ko'priklarni" hosil qilib, juda "mustahkam tuzilma"ga aylanadi (39-rasm).




39-rasm. Nuklein kislota spirali ikkilamchi tuzilishning hosil bo'lishi

birinchi zanjirdagi azotli asos qoldig'i ikkinchi zanjirdagi azotli asos qoldig'iga tuzilishi va vodorod bog'i hosil bo'lishi jihatidan mos kelishi azotli asos qoldiqlarining

komplementarligi deyiladi. DNK molekulasi spirali hosil bo'lganida quyidagi komplementarlik sharti bajariladi: adenin (A) — timin (T), guanin (G) — sitozin (C) va aksincha, timin (T) — adenin (A), sitozin (C) — guanin (G) (40-rasm).



40-rasm. DNK — molekulasida H — bog'larining hosil bo'lishi (komplementarlik shartining bajarilishi)



41-rasm. Nuklein kislotalar replikatsiyasi.

komplementarlik natijasida "adenin-timin" va "timin-adenin" bog'larini 2 ta, "guanin-sitozin" va "sitozin-guanin" o'rtasida 3 ta vodorod bog'larini hosil bo'ladi (41-rasm). Har bir azotli asoslar juftliklari hosil qilgan bog'lari tekisliklari o'zaro 3,4 Å masofada joylashib, spiralning umumiy uzunligi 10 ta nukleotid juftligidan iborat bo'lib, 34 Å ni tashkil etadi. Spiralning radiusi 10 Å ga teng.

Vodorod bog'lari uzilib, spiralni tashkil etgan zanjirlar ikkiga ajraladi. Shu paytda har bir ajralgan asosli qoldiqlarga mos keluvchi nukleotid hosil bo'lib, uzilgan joyni to'ldiradi va nuklein kislota-ning spiralidan ikkita spiral hosil bo'ladi (88-rasm). Bu hodisaga DNK molekulalarining replikatsiya si deyiladi. Bu jarayonlar asosan organizmlarning hujayralari (xromosomasi) da ro'y beradi va ularni taqdim etib beradi.

DNA — molekulalarining tirik organizmdagi asosiy vazifasi oqsil sintezida oqsil tarkibini boshqarish va irsiy belgilarning uzatilishini taqdim etib beradi.



Ribonuklein kislotalar (RNK)

RNK molekulasi asosini ribonukleotid (ribonukleotid) deb ataladi, ular riboza (pentoza) molekulasi C_5 dagi OH gruppasi azotli asoslarga, C_2 va C_3 dagi OH gruppasini fosfat kislotasi almashinuvidan hosil bo'ladi.

RNK molekulasi tuzilishi ham xuddi DNK molekulasi o'zaro birlamchi va ikkilamchi tuzilishlardan iborat bo'lib, faqat RNK spiralsimon tuzilishi hosil bo'lishida o'zaro komplementar azotli juftligida: adenin (A) — uratsil (U) yoki uratsil (U) — adenin (A) va sitozin (C) — guanin (G) yoki guanin (G) — sitozin (C) ishtirok etadi. Hozirgi organizmdagi RNK molekulalari ribonukleotidlar ketma-ketligi va ular soni bilan farqlanadi. Shu sababli ular biologik va kimyoviy o'z xususiyatlari, funksiyasi bilan ajralib turadi.

RNK molekulalari o'zlariga xos kimyoviy va biologik xususiyatlar hujayra ichida bajaradigan vazifasiga ko'ra bir necha turga bo'linadi.

— *Ribosomal RNK (r-RNK)*. r-RNK hujayradagi umumiy RNKning 80—85% ini va ribosoma tarkibini tashkil etadi. Ularning molekulyar massasi 0,5—1,5 mln oralig'ida bo'ladi. Turli organizmlardagi r-RNK larning nukleozid tarkiblari o'zaro yaqin bo'ladi.

— *Eruvchan yoki transport RNK (t-RNK)*. Hujayra suyuqligi tarkibida kirib, 10—15% ni tashkil etadi. t-RNK oqsillar sintezi uchun zarur bo'lgan aminokislotalarni tashuvchilik vazifasini bajarib, 20.000—30.000 molekulyar massaga ega bo'ladi.

— *Informatsion RNK (i-RNK)*. Umumiy RNK miqdorining 1—3% ini tashkil etib, eng yuqori molekulyar massaga (2 mln) ega. Hujayra ko'payishi va oqsillar sintezi paytida irsiy belgilar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlagan, "kod"langan aminokislotalar ketma-ketligini hosil qilishni etkazish vazifasini bajaradi.

Organizmda barcha biokimyoviy jarayonlar bir vaqtda RNK va aminokislotalar molekulalari va oqsillar ishtirokida amalga oshiriladi.

XXXV bob

XXXV bob. YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR POLIMERLAR

To'yinmagan organik birikmaning molekulasi bir yoki bir nechta xuddi shunday molekulalar birikishi natijasida tarkibi o'zgarib, molekulyar massasi katta bo'lgan moddalarning hosil bo'lishi deb ataladi. Polimerlanish reaksiyasi deb ataladi.



G'osho Xandam Usmonovich
(1916—1990)

Uzbekiston Respublikasi doktori, professor, akademik. O'zbekistonda yashagan fan arbobi, 1951 yildan O'zbekistonda birinchi bo'lib o'qituvchi, Polimerlar laboratoriyasini tashkil etgan. Kimyoviy, fizik va radiatsion kimyo bo'yicha ko'p marta chet ellarda xalqaro konferensiyalarda ma'ruza qilgan. O'zbekiston Respublikasi faxriy fuqarosi.

Polimerlar — bu ko'pincha qattiq holatda bo'lgan, o'z-o'zidan so'rilib ketuvchi tikish uchun ishlatiladigan tolalar. Ularning hosil bo'lishida paydo bo'lgan tiqinlarni olib tashlab, qon tomirlari qisqartirib, polimerlar bilan yopishtirishda, ko'z kasalliklarini davolash uchun ko'z gavharlari va linzalari tayyorlashda, davolash sohasida bosuvchi, optik tolalar sifatida informatsion kommunikatsion tarmoqlarida telefon, telegraf aloqalarini o'rnatishda asosiy rol o'ynaydi. Polimerlar bosuvchi polimer moddalarni tayyorlashda, dori moddalari muddatini uzaytirishda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari,

hosil bo'lgan katta molekulyar massali mahsulot **polimer** deb ataladi, polimer hosil qilish uchun bir-biri bilan birikuvchi kichik molekulyar massali modda esa **monomer** deb ataladi.

Xalq xo'jaligida keng qo'llaniladigan plastik massalar, kimyoviy tolalar, kauchuk va boshqa texnik ahamiyatga ega bo'lgan moddalarning kelib chiqishi bilan polimerlar kimyosi faniga bo'lgan qiziqish yanada ortdi. Natijada polimerlar kimyosi va uning rivojlanishi plastmassalar, sintetik kauchuklar, kimyoviy tolalar, qoplovchi moddalar, metallarning o'rnini bosuvchi texnik parametrlarga ega bo'lgan moddalar, tibbiyot sohasida qo'llaniluvchi moddalar olish uchun asos bo'ldi.

Hozirgi kunda sanoatning rivojlanishini, radiotexnika va elektronika sohasini, televideniye, avtomobilsozlik va mashinasozlik, samolyotsozlik, kosmik kemalar yaratish, xalq xo'jaligini polimer moddalarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Turli xil kimyoviy tolalar (kapron, lavsan, nitron va boshqalar) qimmatbaho tabiiy xomashyo bo'lgan paxta, jun va ipak o'rnini bosadi, ulardan to'qilgan matolar g'ijimlanmaydi, yaxshi bo'yaladi, yuvganda ran-

polimer moddalar oziq-ovqat sanoatida, masalan, kolbasa, sosiska va boshqalarni o'rovchi turli materiallar, pardalar, to'ldiruvchi moddalar sifatida, muzqaymoq tayyorlashda ishlatiladi.

O'zbekistonda polimerlar kimyosi tarixi qariyb yarim asrlik davmi o'z ichiga oladi. 40-yillarning oxiridan boshlab O'zbekistonda polimerlar kimyosining asoschisi akademik X. U. Usmonov va u boshchilik qilgan olimlar bu sohadagi ilk izlanishlarni olib bordilar. 1951 yilda X. U. Usmonov rahbarligida O'zbekistonda birinchi polimerlar laboratoriyasi tashkil etildi. Laboratoriya tadqiqotlarida O'zbekiston va O'rta Osiyo uchun qimmatli tabiiy xomashyo bo'lgan polimer modda — paxta sellulozasi asos qilib olindi. Tabiiy va sun'iy tolalar tuzilishi, sellulozaning fizik-kimyoviy xossalari, o'zgarishlari, texnologiyasi kabi muammolar bu ilmiy tekshirish ishlariga mavzu qilib olindi. X. U. Usmonov shogirdlari bilan birgalikda polimerlanish va sopolimerlanish, yonuvchan selluloza materiallari, tibbiyot maqsadlarida qo'llaniluvchi polimerlar bo'yicha ko'pgina fundamental va ilmiy-amaliy ishlarni o'tkazdi va qimmatli xulosalar berdi. Ilmiy tadqiqotlar natijalari va erishilgan yutuqlar to'g'risida akademik X. U. Usmonov ko'p marta chet mamlakatlarda qaro ilmiy anjumanlarda ma'ruza qildi.

Akademik K. S. Ahmedov polimerlar kimyosi sohasida tuproq va dispers sistemalarni tashkil etuvchi gidrofil polimer moddalar va aralashmalaridagi kolloid-kimyoviy holatlarni o'rganuvchi yo'nalishda rivojlantirishga katta hissa qo'shgan olimlardandir.

Akademik olimlarimizdan M. A. Asqarov, Yu. T. Toshpo'latov, S. Sh. Rashidova, S. S. Ne'matov, T. M. Mirkomilovlar polimerlar kimyosi va fizik-kimyosi sohasida paxtachilik sanoati chiqindisi hisotilgan selluloza olish, uning kimyosi va texnologiyasini o'rganish, suvda eruvchan polimerlar kimyosi va fizikasi, qishloq xo'jaligida tibbiyot uchun zarur bo'lgan polimer-metall komplekslar



Mirhoji Asqarov
(1931 y.)

Kimyo fanlari doktori, O'zFA akademigi. Tabiiy va sun'iy polimerlar sohasida ilmiy ishlar qilgan. O'zbekiston polimerlar kimyosi faniga asos solgan tanikli olimlardan biri.



R. S. Tillayev
(1927 y.)

Kimyo fanlari doktori, professor. Kimyo fanlari elektrokimyoviy korroziyaga qarshi kurash sohasiga



A. A. Yo'lbeyev
(1932 y.)

Kimyo fanlari doktori, professor. Kimyo fanlari elektrokimyoviy korroziyaga qarshi kurash sohasiga

pozitsion polimer materiallar olish, radikal polimerlanish va sopolimerlanish kabi yo'nalishlarni rivojlantirdilar.

O'zbekiston Milliy Universiteti kimyo fakulteti olimlari polimerlar kimyosi sohasida ulkan muvaffaqiyatlarga erishdilar. Kimyo fanlari doktori R. S. Tillayev boshchiligidagi olimlar guruhi yuqori molekulyar birikmalar eritmalarini termodinamikasi ustida izlanishlar olib bordi, yangi xil payvandli polimerlarni qildilar. Hozirda elektrokimyoviy jarayonlar, ya'ni elektrokimyoviy korroziya va unga qarshi kurashish sohasida ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Tarkibida flor saqlagan polimerlar sintezi va ularni o'rganish sohasida universitet professori A. A. Yo'lbeyev boshchiligidagi olimlar guruhi salmoqli natijalarga erishdilar.

Ayni kunda O'zbekistonda o'ndan ortiq polimerlar kimyosi markazlari ishlab turibdi. Bu markazlarda jami 6 ta akademik olim, 50 ta fan doktorlari, 120 ta fan nomzodlari va ko'pgina ilmiy xodimlar ish olib bormoqdalar. Ular erishgan muvaffaqiyatlar O'zbekistonda polimerlar sanoati rivojining yangi bosqichlarini ta'minladi.

XXXV.1. Polimerlanish reaksiyasi va uning mexanizmi


Yuqori molekulyar birikmalarga murakkab kimyoviy tuzilishga ega bo'lgan va molekulyar massasi 10^4 — 10^6 atrofida bo'lgan moddalar kiradi. Tarkibi va tuzilishiga ko'ra yuqori molekulyar birikmalar organik, anorganik va element-organik birikmalarga bo'linadi.

Eng oddiy organik yuqori molekulyar birikmalarga polietilenni misol qilib kel-

tirish mumkin. Etilenning polimerlanishi natijasida hosil bo'lgan birikma juda keng qo'llaniladi. Bunda bir nechta etilen molekulyar o'zaro birikish reaksiyasiga kirishib, molekulyar massasi katta birikma hosil qiladi. Yuqori molekulyar birikmalarning hosil bo'lishi quyidagi umumiy formula bilan ifodalash mumkin:



Bunda, M - bir-biri bilan birikib, katta molekulyar massali polimer modda hosil qiluvchi boshlang'ich kichik molekulyar massali modda yoki monomer. n - bir-biri bilan birikkan **monomer**- molekulyar soni. Bunday polimerlanish darajasi deb ataladi. Polimerlanish bir xil molekulyar o'zaro ketma-ket birikib, yirik o'lchamli molekulyarlarga aylanishidir. Ikki monomer molekulyasi o'zaro biriksa **dimer**, uchta monomer molekulyasi biriksa **trimer**, ko'p monomer molekulyalari o'zaro biriksa **polimer** hosil bo'ladi. Polimerlanish reaksiyasi ikki qo'shni uglerod atomi o'zaro bog' bilan birikkan moddalar orasida sodir bo'ladi. Polimerlanish darajasi 5000 dan 10000 gacha va undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Polimerlanish darajasi yuqori bo'lgan birikmalar **yuqori polimerlar** deb ataladi, polimerlanish darajasi past bo'lgan birikmalar **oligomerlar** deb ataladi. Yuqori polimerlar juda katta — 10^4 — 10^6 molekulyar massaga egadirlar. Molekulyar massasi katta bo'lganda birikmalarning tuzilishini yozishda boshlang'ich zvenolarni hisobga olmay turib, bir necha yoki hatto bitta doimiy takrorlanuvchi zvenoni ko'rsatish mumkin. Masalan, etilenning polimerlanishi quyidagicha yozish mumkin:




Polimerlarni nomlashda monomer nomi oldiga "**poli**" so'zi qo'shiladi. Masalan, polietilen, polipropilen va hokazo.

Molekulyar massasi ortib borayotgan makroradikalga navbatan monomerlar turlicha kelib birikishi mumkin. Bunda chiziqli tarmoqlangan va to'rsimon tuzilishli polimerlar hosil bo'ladi.


Chiziqli polimerlar hosil bo'lishida barcha monomerlar to'g'ri chiziqli bo'ylab ketma-ket kelib birikadi. Agar monomer zvenosini A harfi bilan belgi-lasak, chiziqli polimerning hosil bo'lishi quyidagicha amarga o'tiriladi:



Tarmoqlangan tuzilishli polimerlarning hosil bo'lishi:



Tarmoqliy yoki to'rsimon polimerlar bir-biri bilan fazoda ko'ndalang bog'lar orqali birikkan zanjirlardan hosil bo'ladi:



Polimerlar makromolekulalari bir xil tarkibli monomerlardan tashkil topgan bo'lsa, ularni **gomopolimerlar**, agar har xil tarkibli zvenolardan tashkil topgan bo'lsa, ularni **aralash polimerlar** yoki **sopolimerlar** deyiladi.


Agar polimer zanjiri har xil monomerlardan tashkil topgan bo'lib, bu monomer zvenolari bir-biri bilan tartibsiz ravishda birikkan bo'lsa, bunday polimerlar statistik (tartibsiz) tuzilishli **sopolimerlar** deyiladi:




Agar to'g'ri chiziqli bo'ylab bir necha monomer zvenolarining doimiy ravishda takrorlanib keluvchi polimer tuzilishi **bloksopolimerlarga** xosdir:




Agar polimer makromolekulasi tuzilishi tarmoqlangan bo'lib, asosiy zanjirda monomer zvenolari, yonaki zanjirlarda ikkinchi xil monomer zvenolari bo'lsa, bunday polimerlar **payvandli sopolimerlar** deyiladi:



Agar polimerning asosiy zanjirini bir xil atomlar tashkil etgan bo'lsa, bunday polimer *gomozanjirli polimer* deyiladi. Masalan, asosiy zanjirida faqat uglerod atomlari tashkil etsa, bu polimer *karbozanjirli polimer* deyiladi:



Agar asosiy zanjir turli elementar atomlardan iborat bo'lsa, bu polimer *geterozanjirli polimer* deyiladi:




Polimerlar, shuningdek, tuzilishiga ko'ra *regulyar*, *noregulyar*, *stereoregulyar* polimerlarga bo'linadi. Polimer makromolekulasini etuvchi monomer zvenolari bir-biriga birikayotgan paytda "boshi" prinsipi bo'yicha birikanda, regulyar tuzilishli polimer hosil bo'ladi.

Masalan, monomer zvenosi $|\text{—CH}_2\text{—CH—}|$ bo'lsa, ular




quyidagicha, ya'ni keyingi monomer zvenosining bosh tomoni oldingi zvenosining oxiriga kelib birikishi mumkin:



Bu *regulyar tuzilishli polimer* bo'radi.



Agar har keyingi monomer zvenolarining bosh qismi o'zidan o'ziga monomer zvenosining bosh qismiga kelib ulansa: ya'ni "boshi bosh" prinsipida biriksa, quyidagi polimer hosil bo'ladi:



Bunday polimer noregulyar tuzilishli polimer deyiladi.

bo'lgan polimerlarda barcha zvenolar va tarmoqdagi o'rinsoslar tartibli qat'iy bir tartibda joylashadi. Agar zvenolar va o'rinsoslar tartibli joylashgan bo'lsa, bunday polimerlar *stereonoregulyar polimer* deyiladi.

Irregulyar polimerlarda qurilmalar tartibli joylashadi:



8 gruppalar bir tomonda joylashishi mumkin (izotaktik tuzilish), tomonda doimiy ravishda navbatma-navbat takrorlanib kelishi (sindiotaktik tuzilish) va har ikkala tomonda tartibsiz joylashishi mumkin (ataktik tuzilish).

Polimerlanish reaksiyasining bir necha turi mavjud. Bulardan radikal polimerlanish reaksiyasi ustida to'xtalamiz.

polimerlanish zanjirli jarayonning boshlovchilari (initsiatorlari) zanjir mexanizmi bo'yicha boradi. Boshlovchi sifatida ko'pincha birikmalar ishlatiladi. Bu birikmalar parchalanib, erkin radikalni bo'sh valentlikka, juflanmagan elektronga ega bo'lgan zarrachalar ajratiladi.

Asalan, atsetil peroksiddan erkin radikallar hosil bo'lishini quyidagicha mumkin:




Radikalni shartli ravishda R' deb qabul qilsak, radikal hosil bo'lishi bo'linishda quyidagicha bo'ladi:



radikal tepasidagi yukduzcha juftlashmagan elektronni, erkin

Polimerlanish reaksiyasi zanjir mexanizmda uchta bosqichda kechadi.

I. Zanjir reaksiyasining boshlanishi. Boshlovchining erkin radikal paydo bo'lganidan keyin bu zarrachalar o'zicha mavjud bo'la olmaydi, o'zlari uchun qulay bo'lgan tinch holatga o'tib olishga harakat qiladi. Darhol qo'sh bog'ga ega bo'lgan to'yinmagan organik monomer molekulasiga bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Natijada qo'sh bog' uziladi va erkin radikalning bittasi monomer molekulasiga birikadi:




Hosil bo'lgan va juftlashmagan elektronga ega bo'lgan yangi zarracha *radikaldir*.

II. Zanjirning o'sishi. Hosil bo'lgan faol zarracha erkin juftlashmagan elektronga ega bo'lganligi tufayli uzoq mavjud bo'la olmaydi va u boshqa monomer molekulalari bilan juda katta tezlikda ketma-ket reaksiya siyaga kirishadi:



Bu jarayon uzluksiz davom etishi mumkin va erkin radikallar faolligi juda yuqori bo'lgani sababli makroradikallar hosil bo'lish tez ham juda katta bo'ladi. O'suvchi zanjirlar soni orta borgan sari qo'shiluvchi molekulalar soni ham ortib boradi.


III. Zanjirning uzilishi. Tez kechayotgan zanjirli jarayon makroradikal to'qnashganda yoki makroradikal bilan boshlovchi radikal to'qnashganda to'xtaydi:



Har ikkala holda ham zanjir uziladi va katta o'lchamga ega bo'lgan makromolekula hosil bo'ladi. Bu makromolekula *polimer* deb ataladi.


merlanish jarayonida *zanjirning uzatilishi* hodisasi ham ro'y berishi mumkin. Polimerlanish jarayonida radikal faolligi

u to'vinadi. Erkin valentlik boshqa molekulaga o'tadi. Natijada boshqa o'sadigan yangi radikal hosil bo'ladi. Bunday reaksiya *zanjirning uzatilishi* deyiladi. Zanjirning uzatilishi turli yo'llar bilan, ya'ni boshqa modda molekulasi vositasida, monomer yoki polimer orqali ham mumkin. Erituvchi sifatida, masalan, uglerod tetraxlorid CCl_4 yoki xloroform $CHCl_3$ qo'llansa, o'sayotgan polimer radikali erituvchi molekulasi bilan to'qnashishi natijasida zanjir uzatiladi. Bunda o'sishdan tashqari polimer va uning o'rniga faol bo'lib qolgan erituvchi radikali bo'lib, u zanjir reaksiyasini boshlab berishi mumkin:




Polimerlanish reaksiyalari ba'zan faqat temperatura oshirilganda boradi, ba'zilar hollarda esa katalizatorlar ishtirokida va yuqori bosimda boradi. Polimerlanish reaksiyasiga tarkibida faqat qo'sh bog' emas, uch bog'lar ham va beqaror siklik birikmalar ham kirishadi.



Polimerlanish jarayonida *zanjirning tarmoqlanishi* kuzatilishi mumkin. Zanjirning o'sishi to'g'ri chiziqli bo'ylab bormasdan, bir necha yo'lga qarab tarmoqlanib o'sishi mumkin. Bunda zanjirlardan biri asosiy zanjir, qolganlari yonaki zanjirlar bo'ladi:



Polimerlar qatorida makromolekulalar *zanjirning tikilishi* natijasida hosil bo'luvchi polimerlar mavjud bo'lib, bunga misol tariqasida polimerlarni keltirish mumkin. S. V. Lebedev birinchi bo'lib divinil bi- (CH₂=CH-CH=CH₂) polimerlash yo'li bilan sintetik kau- chukni olib chiqardi. Divinil polimeri zanjiri quyidagicha ifodalanadi:



Kauchuk molekulasi zanjiridagi qo'sh bog'lar maxsus ishlab chiqarish jarayonida oltingugurt atomlari bilan reaksiyaga kirishadi va molekulalari orasida o'ziga xos ko'priklarni hosil qiladi:



Bu jarayon kauchukni rezinaga aylantiradi va u texnikada vulkanizatsiya deb ataladi. Vulkanizatsiya qilingan kauchuk oson cho'ziluvchan va salqinlashib qoladi. Tikilish natijasida alohida-alohida egiluvchan polimer zanjirlari o'zaro bog'lanib, mustahkam panjara hosil qiladi. Oltingugurt ko'priklari soni ko'p miqdorda (32% gacha) bo'lgan holatda qattiq va chidamli ebonit olinadi.

Polimerlanishda bu jarayonni o'ziga xos ravishda tezlashtiruvchi va sekinlashtiruvchi moddalar mavjuddir.

Polimerlanish jarayonini tezlashtiruvchi moddalar *polimerlanish initsiatorlari* deb ataladi. Initsiatorlarning vazifasi polimerlanishni boshlatishdir. Bu moddalar parchalanib, erkin radikallar hosil qiladi. Initsiatorlar katalizatorlardan farq qiladi va polimerlanish vaqtida sarf bo'lmaydi. Ular hosil qilgan radikallar polimerlar tarkibiga kiradi. Eritmada va qattiq holatda boradigan jarayonlarning initsiatorlari sifatida peroksidlar va persulfatlar ishlatiladi.

Polimerlanish jarayonini sekinlashtiruvchi moddalar *ingibitorlar* deb ataladi.


Ingibitorlar polimerlanish jarayonida hosil bo'layotgan faol markazlarni yo'qotadi va shu yo'l bilan o'sayotgan zanjirlarni uzadi. Ingibitorlar

qo'shib qilib fenollar, xinonlarni keltirish mumkin. Ayrim regulyatorlar polimerlanish jarayonini to'xtatish maqsadida qo'shiladi. Bu moddalar polimerlanish jarayonining bir tekisda borishiga va bir xil tarkibli polimerlarning hosil bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Regulyatorlar odatda monomer og'irligining 2–6% miqdorida qo'shiladi.


Polimerlanish reaksiyalari uch xil usulda: massada (blokda), erituvchida va emulsiyada olib boriladi.

XXXV.2. Sopolimerlanish reaksiyalari

Sopolimerlanish reaksiyalari muhim xossalarga ega bo'lgan yangi polimer moddalar olish uchun imkoniyat beradi. Polimerlanish reaksiyasiga bir nechta holda kirishmaydigan monomerlar ham (masalan, malein anhidrid) sopolimerlanish reaksiyasiga kirishadi. Misol tariqasida xlorvinil $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ va vinilatsetat $\text{CH}_2=\text{CHOCOCH}_3$ ning sopolimerlanishidan vinilit nomli polimer olinadi:



Payvand sopolimerlar. Payvandlangan sopolimerlar olishda bir polimer zanjiriga boshqa bir polimer zanjiri yon tomonidan payvandlanadi. Buni umumiy tarzda quyidagicha ifodalash mumkin:




Masalan, yuqori molekulyar polietilen (A) plyonkasi yuzasiga polistirolning yon butoqlarini payvandlab, xossalari o'zgargan polimer olish mumkin. Hosil bo'lgan yangi polimerda yuqori temperaturaga va yon tomonlarga chidamlilik xossalari kuzatiladi. Yon zanjirlar sonini va uzunligini o'zgartirish yo'li bilan polimerlarning xossalari turlicha o'zgartirish mumkin.

Bu zanjir polimerlarning sinishini kamaytirish va egiluvchanligini oshirish maqsadida bir polimer ikkinchisiga payvandlanadi. Polistirol va polivinil-

xlorid qattiq va tez sinadigan materiallardir. Ammo ularni payvandlash natijasida egiluvchan va zarbga chidamli polimer olish mumkin. Shunday aytib o'tish joizki, polimer materiallarning chidamliligini bir necha o'n barobar oshirish uchun ularga juda oz miqdorda boshqa monomerlar payvandlash kifoyadir.


Blok sopolimerlar. Blok sopolimerlar hosil bo'lishida, masalan, A va B monomerlarning har qaysisi bir necha marotaba takrorlanadi. Bu umumiy tarzda quyidagicha ifodalanadi:




XXXV.3. Polikondensatlanish reaksiyalari

Polimer moddalar olishda ayrim kichik molekulyar massali uchuvchan moddalar, masalan, suv, ammiak, HCl ajralib chiqishi natijasida polikondensatlanish reaksiyasi ketadi. Ko'p marta takrorlangan kondensatlanish reaksiyasi *polikondensatlanish* deb ataladi. Kichik molekulyar massali moddalar ajralib chiqishi natijasida kimyoviy tarkib o'zgaradi. Dastlabki monomer va hosil bo'lgan polimerning tarkibi bir xil bo'luvchi odatdagi polimerlanish reaksiyalaridan polikondensatlanish reaksiyasining farqi ham ana shunda.


Polikondensatlanish jarayoniga fenol C_6H_5OH va formaldegid CH_2O orasida boradigan reaksiyani misol qilib keltirish mumkin:



Bo'lgan fenolospirt, fenol va formaldegid bilan yana o'zaro reaksiya ketadi:



Polikondensatlanish jarayonining keyingi bosqichlarida novolak smolasi hosil bo'ladi:



Bu reaksiya kislotali muhitda sodir bo'ladi. Novolak smolasi yuqori temperaturada yumshaydi va sovutilganda qotadi, ammo bunda kimyoviy o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Bunday smolalar *termoplastik smolalar* deb ataladi. Fenol va formaldegidning ishqoriy muhitdagi polikondensatlanishi natijasida rezol smolalar hosil bo'ladi. Rezol smolalar yuqori temperaturada kimyoviy o'zgarishga uchraydi. Bunda rezol smolalar uch o'lchamli tuzilishga ega bo'lib qoladi va qizdirganda yumshash xossasini yo'qotadi. Bu smolalar *termoreaktiv smolalar* deyiladi.


Fenolformaldegid smolalar keng ko'lamda ishlatiladi, ulardan *fenoplastlar* ataluvchi plastmassalar olinadi, elim va laklar olish uchun ishlatiladi.

XXXV.4. Yuqori molekulyar birikmalar klassifikatsiyasi

Polimer moddalarni klassifikatsiyalashda ular asosiy zanjirining tuzilishiga ko'ra, quyidagi uch gruppaga bo'linadi:

1. **Karbozanjirli polimer birikmalar.** Bunda polimer molekulasidagi asosiy zanjir faqat uglerod atomlaridan tashkil topgan. Misol tariqasida polietilen va polibutadien keltirish mumkin.

Polietilen molekulas:



Polietilen sanoatda ikki usulda olinadi:


1. Etilenni yuqori bosimda kislorod ishtirokida polimerlash usuli.
2. Past bosimda kompleks metallorganik katalizatorlar ishtirokida polimerlash.

Polietilen oq rangli, tashqi ko'rinishi parafinga o'xshaydi. U suvdan engil. Polietilen dielektrik xossaga ega. Sovuqqa, kimyoviy reagentlar ta'siriga chidamli. Havoni va namlikni o'tkazmaydi. Suyuqlanish temperaturasi 100–110°C.

Yuqori temperaturada polietilen yumshaydi. Qisman oksidlanadi va uning xossalari o'zgaradi. Polietilendan turli xil plyonkalar,

elektr izolyatsiya materiallari, xalq xo'jaligida keng qo'llaniluvchi buyumlar tayyorlanadi.


Karbozanjirli polimerlarga yana misol qilib polistirolni keltirish mumkin. **Polistirol** qattiq, shaffof modda. U stirolni blok yoki emulsiyada polimerlash orqali olinadi:



Stirol eng ko'p tarqalgan plastiklardan biridir. Undan elektrotexnika dielektriklar sifatida, kislotalar ta'siriga chidamli turli buyumlar ishlab chiqarishda foydalaniladi.



Karbozanjirli polimerlarga misol tariqasida yana **polivinilxlorid** keltiramiz. Polivinilxlorid oq kukun modda. U vinilxlorid $\text{CH}_2 = \underset{\text{Cl}}{\text{CH}}$

polimerlab hosil qilinadi:



Polivinilxlorid erituvchilar va ko'pchilik kimyoviy moddalar ta'siriga chidamli polimer materialdir. Undan tayyorlangan vinilplast kabellar, leum ishlab chiqarishda, kimyoviy moddalar ta'siriga chidamli qurilmalar, elektrolizda ishlatiladigan vannalar, kislota va ishqorlarni saqlash uchun ishlatiladigan idishlar, akkumulyator detallarini tayyorlashda qo'llaniladi.

Polivinilftorid vinilftorid ($\text{CH}_2 = \text{CHF}$) ni polimerlash orqali olinadi. Polivinilftoridni 1-ftor – 1,2- dioxloretdan ham olish mumkin. Bu modda katalizator ishtirokida qizdirilganda bir molekula xlor ajralib chiqadi va vinilftorid hosil qiladi. Uni radikal mexanizmida zanjirli polimerlab polivinilftorid olinadi:



Polivinilftorid yuqori temperaturaga va, ayniqsa, quyosh nuri ta'siriga chidamli, past temperaturada elastikligini saqlash kabi xossalarga ega modda uchun keng qo'llaniladi. Elektrotexnika sohasida vinilftoridning boshqa monomerlar bilan hosil qilgan sopolimerlari ko'p ishlatiladi.


Politetraftoretillen tetraftoretillenning juda oson polimerlanishidan hosil bo'ladi. Tetraftoretillen tetraoxloretilendagi xlor atomlarini ftor atomlarga almashinuvidan hosil qilinadi:



Tetraftoretillen oddiy sharoitda gaz modda. Politetraftoretillen oq kristall modda. Shuningdek, u teflon, ftorplast-4, algoftlon, sereftlon deb ham ataladi. Uning mexanik xossalari boshqa polimerlarga qaraganda kuchli. Teflon 320°C da o'zgina yumshaydi, 400°C dan yuqorida parchalana boshlaydi. Teflon hatto ochiq alangada yonmaydi va suyuqlanmaydi. Politetraftoretillenning kimyoviy moddalar ta'siriga chidamliligi oltin va platina bilan ham yuqoridir. Buning sababi ftorli YuMB da kuchli ($E=510 \text{ kJ/mol}$) C-F bog'lari mavjudligidir va yuqori kristalligidir. Kimyo sanoatida, energetikasini yaratishda, radiotexnika, elektro texnika, kosmik va tibbiyotda keng qo'llaniladi.

2. *Geterozanjirli polimer birikmalar.* Asosiy zanjirida uglerod atomlaridan tashqari, kislorod, azot, oltingugurt, fosfor atomlari ham bo'ladi. Misol tariqasida sellyuloza, oqsillar, poliamidlar, polieftirlar keltirish mumkin.

Molekulasi tarkibida ikkita aminogruppa bor bo'lgan birikmalar diamin, uch aminogruppa bor bo'lgan birikmalar triamin va hokim deb ataladi. Gesametilendiamin va adipin kislota $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ dan hosil bo'ladigan polimer moddadan naylon tolasi olinadi. Bu reaksiya quyidagicha ifodalanadi:




Naylon poliamidlarga kiradi. Naylonni tabiiy ipak va tabiiy jun o'rinda ishlatish mumkin. Naylondan tayyorlangan matolar g'ijimlanmaydi, elastik bo'ladi, sovuqqa chidamli.


Tarkibida bir necha funksional gruppalar bo'lgan organik moddalar *aralash funksional birikmalar* deb ataladi. Masalan, aminokislotalar tarkibida ham asos xossasiga ega bo'lgan NH_2 -gruppa, ham kislota xossasiga ega bo'lgan COOH -gruppa bor. Aminokislotalar amfoterlik xususiyatiga ega. Ma'lum bir sharoit yaratilganda aminokislotalar siklik birikmalarga — laktamlarga aylanadi. Masalan, aminokapron kislotasidan kaprolaktam hosil bo'ladi:



ϵ -aminokapron kislota



Kaprolaktam poliamidlarga kiradigan polikaprolaktam, ya'ni kapron chiqarishda xomashyo hisoblanadi. **Kapron** olishda kaprolaktamdagi uziladi va to'g'ri chiziqli polimer hosil bo'ladi:




Hosil qilingan polimerdan tolalar olinadi. Kapron tolalari o'zining hqligi, elastikligi bilan ajralib turadi.

Polimer tolalardan yana biri — **lavsandir**. Tereftal kislota ning dimetil




etilenglikol $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ ning polikondensatlanishi natijasida polietilentereftalat yoki lavsan hosil bo'ladi:



Lavsan dielektrik xususiyatga ega. Lavsan plyonkalari havo o'tkazmaydi. Lavsan tolalaridan qilingan matolar pishiq va g'ijim bo'lmaydi.

3. *Element-organik polimer birikmalar.* Makromolekulasining asosiy zanjirida kremniy, titan, alyuminiy, germaniy va boshqa elementlar bo'ladi. Masalan, kremniy-organik polimerlar yoki polisiloksanlar katta amaliy ahamiyatga egadir. Bir necha silanol molekulasining o'zaro kondensatlanishi natijasida polisiloksan hosil bo'ladi:



bu yerda, R — organik radikal. Polisiloksanlar tarkibidagi radikalarning xususiyati va soniga qarab, turli xil xossalarga ega bo'ladi. Agar polisiloksanlar tarkibida uglerod atomlari soni ko'p bo'lsa, ularning elastiklik xususiyati yuqori bo'ladi. Uglerod atomlari soni kamayishi polimerlarning cho'ziluvchanligini oshiradi, polimerlarning eruvchanligi kamayadi va mo'rt bo'lib qoladi. Polisiloksanlardan surkov moylari tayyorlashda foydalaniladi. Kremniy-organik polimerlardan olingan plyonkalar suv, havo va gazni o'tkazmaydi. Yuqori temperaturaga chidamli. Ulardan elektroizolyatsion materiallar sifatida va tibbiyotda foydalaniladi.

XXXV.5. Tibbiyotda qo'llaniluvchi polimer moddalar

70-yillarning o'rtalaridan hozirgi kungacha fanning yangi sohasi — kimyo, biologiya va tibbiyot fanlari mushtarakligida vujudga kelgan tibbiy biologik polimerlar kimyosi rivojlanib kelmoqda. Bu fanga bo'lgan qiziqish hozirgi zamon tabiatshunosligining fundamental aspektlari bo'lgan jonli va jonsiz narsalarning o'zaro ta'siri va tibbiyot hamda sog'londirishda turli xil sun'iy polimerlarni qo'llashdan kelib chiquvchi amaliy xulosalar bilan izohlanadi.

Bu sohani shartli ravishda besh asosiy ilmiy yo'nalishga bo'linish mumkin:

1. Inson organizmining murakkab sistemalariga ta'sir etuvchi sun'iy makromolekulalarni o'rganuvchi umumbiologik yo'nalish;

2. Yo'naltirilgan ta'sirga ega bo'lgan fiziologik faol va dorivor polimerlar;



Dori moddalari berilishini nazorat qiluvchi makromolekulyar tizimlar;

Organlar va to'qimalarni endoprotezlash uchun mo'ljallangan va kontaktlashuvchi polimer materiallar va konstruksiyalar;

Tashqi protezlash uchun hamda yordamchi materiallar vazifasini o'ynovchi polimer materiallar.

Ana shu yo'nalishlarning har birini alohida-alohida ko'rib chiqamiz:

I. Fanning mazkur sohasi kompleks sohadir va u organik hamda anorgan kimyosi, kimyoviy texnologiya, biokimyo, biofizika, fiziologiya va tibbiyot fanlarining mushtarakligiga asoslanadi.

70-yillar oxirida shunday ma'lumotlar paydo bo'ldiki, bunda sun'iy makromolekulalar, xususan, ayrim polielektrolitlar, o'z kimyoviy tuzilishi bilan o'zaro issiq qonli jonotlar organizmiga yot bo'lishiga qaramay, kam hadda oqsil moddalar bilan kombinatsiyada organizmga kiritilganda organizmning immunologik xususiyatini juda ham oshirib yuborishi kuzatiladi. Vaholanki, o'sha oqsillarning o'zi bu xususiyatni kam o'zgartiradi. Organizmning immunologik sistemasi faolligi 100—1000 barobar ortib ketadi, ammo buning mexanizmi hali to'la o'rganilmagan. Bu ma'lumotlar o'ziga xos antigenlar, effektiv vaksinalar va boshqa dorivor hamda biologik dorilarning yaratilishiga olib keladi.

II. Yo'naltirilgan ta'sirga ega bo'lgan makromolekulyar dorivor moddalar o'z-o'zida yuruvchi va unga birikkan faol dorivor moddadan iboratdir.

Bu moddalardan birinchi bo'lib makromolekulyar trombolitik preparatlar, ferment asosiga ega bo'lgan streptodekaza va polisaxarid hosilasi bo'lgan dekstrandan olingan preparatni misol qilib keltirish mumkin. Bunday moddalar ko'pgina kasalliklarni davolashda muhim rol o'ynaydi.

Kichik molekulyar massaga ega bo'lgan dorivor moddalarning organizmdagi ta'sir muddatini uzaytirish maqsadida ular polimer moddalarga bog'lanadi va bu usul dorivor modda ta'sirini *prolongatsiya qilish* deb ataladi. Bunda yuqori molekulyar birikmaga tikilgan dori moddasining organizmda erib so'rilish muddati uzayadi, dori moddasi organizmda uzoqroq qoladi va o'z ta'sirini uzoq vaqt davomida yo'qotmaydi. Shuning uchun kasallik davomida dori moddasini kam qabul qilib, uning samarasini oshirishga erishiladi.

Fiziologik aktiv polimerlar kimyosi bilan ko'pgina chet eldagi nufuzli ilmiy tekshirish muassasalari va yaqin hamdo'stlik mamlakatlaridagi institutlar bilan bir qatorda, O'zbekiston Milliy Universiteti kimyo fakulteti, Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, Bioorganik kimyo instituti, Makromolekulyar kimyosi instituti va boshqalarning olimlari shug'ullandilar hamda o'z yutuqlarga erishdilar.

Fanning bu yangi sohasida erishilayotgan yutuqlar bilan bir qatorda, albatta, hali ko'pgina muammolar ham mavjud.

Ayrim polimer birikmalar kichik molekulyar massali dorivor moddalarni ta'sir etishi lozim bo'lgan joyga olib borish uchun transport vazifasini o'taydi, ya'ni organizmning ma'lum bir nuqtasiga etib borganidan so'ng erishni va dori moddasini ajratib chiqarishni boshlaydi.

III. Odatdagi kichik molekulyar massali dorivor moddalar organizmda uzoq vaqt bo'lishi nazarda tutilmaydi. Ular organizmdan tezda chiqarib yuboriladi yoki o'zgarishlarga uchraydi. Shunda dorining effektini oshirish uchun uni tez-tez qabul qilishga majbur bo'lamiz. Bunda dorining organizmdagi konsentratsiyasi doimo o'zgarib turadi: qabul qilingan vaqtda yuqori va qayta qabul qilish oldidan kam bo'ladi. Terapevtik muvaffaqiyatga erishish uchun dorining organizmdagi miqdorini ma'lum vaqt davomida (bir necha soat yoki bir necha oy) bir xil tutib turish zarur. Shu maqsadlarda yaratilgan polimer moddalar plyonkalar, shariklar, plastinkalar ko'rinishida bo'ladi.

Bunga misol qilib ko'z kasalliklarida qo'llaniluvchi dorivor plyonkalarni keltirish mumkin. Bu plyonkalar fiziologik aktiv moddani ko'zning shilliq qavati orqali bevosita qon aylanish sistemasiga olib o'tish vazifasini o'taydi. Qandli diabet kasalligida insulin etishmovchiligini ignasimon korrektsionalovchi o'zida insulin tutgan dorivor plyonkalar yaratilmoqda. Sanoatda va tibbiyotda polimer-membranalarining ahamiyati juda katta. Bunda polimer mem-branasi sifatida xohlagan plyonka, tolalar, bo'linadigan zarracha va boshqalarni tushunish mumkin. Polimer membranalarining vazifasi qandaydir komponentlarni ushlab qolish yoki tanlab o'tkazish xususiyatiga ko'ra murakkab aralashmalarni ajratishdir.

Kuyish natijasida vujudga kelgan yaralarni davolashda zamonaviy usullar teri kons-truksiyalari bir vaqtning o'zida yaraga kislorod kiritishni ta'minlaydi, bakteritsid ahamiyatga ega va to'qimalarning enirilishini ta'minlaydi. Kichik molekulyar massali fiziologik aktiv moddalar bilan polimer-sulotlarini so'rib olib, namlikni me'yorida saqlab turadi. Masalan, AQSh



O. N. Musayev
(1936-2007 y.)

Kimyo fanlari doktori, professor ilmiy izlanishlari tibbiy polimerlar bo'yida bag'ishlangan.



Oygora Sharafovna Rashidova
(1943 y.)

Kimyo fanlari doktori, O'zFA akademika, tibbiy polimerlar sohasida ko'p yillik ish olib borgan. Yuzdan ortiq ilmiy maqolalar va monografiyalar muallifi.

Amerikalik jarrohlarning ma'lumotlariga ko'ra, AQSh da 1961—1981 yillarda davomida yurak klapanlarini almashtirish bo'yicha 2135 ta jarrohlik amaliyoti olib borilgan, shunda 12% kasallar ikkinchi marta protezlangan. Ularning 43% i 15 yil va undan ko'proq yashagan, shu jumladan, 27% ulardan ikkinchi marta protezlangan odamlar bo'lgan. Bu shuni ko'rsatadi, yurakning polimer klapanlari muvaffaqiyat bilan qo'llanilmoqda.

O'zbekistonda tibbiyot polimerlari yaratish sohasidagi ilmiy izlanishlar O'zbekiston Milliy Universitetida professor O. N. Musayev rahbarligida O'zFA "Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti" va "Bioorganik kimyo" instituti olimlari tomonidan olib borilgan va bugungi kunda talabachalari bu ishlarni muvaffaqiyatli davom ettirmoqdalar. O'zbekistonda fiziologik aktiv polimerlar kimyosi ikki yo'nalishda rivojlandi: polimerlash usuli, ya'ni turli xil dori moddalari, masalan, alkaloidlarning hosilalarini olish, ularni polimerlash va sopolimerlash.

Kichik molekulyar massali fiziologik aktiv moddalar bilan polimer-sulotlar zanjiridagi polimeranalogik o'zgarishlar usuli.

O'zbek kimyogarlarining ushbu sohadagi sezilarli muvaffaqiyatlarini 1973 yilda Toshkentda "Tibbiyot ahamiyatiga ega bo'lgan sun'iy polimerlar" I Butunittifoq simpoziumining o'tkazilishiga sabab bo'ldi. 1978 yilda esa Toshkentda makromolekulyar kimyo bo'yicha xalqaro JUPAC simpoziumi o'tkazildi.

Fiziologik aktiv preparatlar yoki dorivor polimerlar turli usullar bilan hosil qilinishi mumkin: 1) polimerlash va sopolimerlash; 2) polimerizatsiya; 3) polimeranalogik o'zgarishlar.

Professor Sh. Najmiddinov boshchiligidagi tarkibida faol elektrofil gruppalar bo'lgan «polimer-olib yuruvchilar» hosil qilindi va xossalari o'rganildi. O'tkazilgan fizik-kimyoviy tekshiruvlar ko'pchilik polimer-olib yuruvchilar uchun ularni hosil qilish va ajratib olish jarayonida o'z-o'zidan sodir bo'luvchi molekulalararo va molekulalar ichidagi o'zgarishlar xos ekanligini ko'rsatdi.

Qon to'xtatuvchi dorivor polimerlar hosil qilish alohida ahamiyatga ega. Bunday dorilar jarrohlikda va qon ketishi bilan bog'liq bo'lgan turli xronik kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. O'zbekiston Milliy Universiteti kimyogar olimlari polimer — antige-parin preparatlarini hosil qildilar.

Qon o'rnini bosuvchi hamda davolash xususiyatiga ega bo'lgan dorivor polimerlar hosil qilish muammolari bilan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi institutidagi akademik S. Sh. Rashidova rahbarligida olimlar jamoasi shug'ullandilar. Qisqa vaqt ichida yuzdan oshiq fiziologik aktiv polimer preparatlarning tibbiy-biologik xossalari o'rganildi. Ular bu preparatlarning o'tkir va xronik toksikologik xususiyatlarini, asosiy biokimyoviy va gematologik jarayonlarga ta'sirini, buyrak-jigar va boshqa hayotiy muhim ahamiyatga ega bo'lgan a'zoga ta'sirini, preparatlarning organizmdagi taqsimotini, organizmdan chiqarib yuborish yo'llari va tezligini hamda bu preparatlarni uzoq vaqt qo'llashda organizmda yig'ilib qolish ehtimolligini o'rgandilar. Ilmiy izlanishlar natijasida suyak to'qimalari va ilik regeneratsiyasini faollashtiruvchi preparatlar gruppasi ajratib olindi.

O'zbekiston Milliy Universitetida professor O'. N. Musayev boshchiligidagi olimlar gruppasi jarrohlikda tirik organizm ichki a'zolari protetiklashda keng qo'llaniluvchi tayyor polimer mahsulotlarning tibbiy-biologik xususiyatlarini yaxshilash borasida sistematik izlanishlar olib bordilar. Qon o'tkazuvchi kateterlar, polietilen, polipropilen, lavsan va florlonlavsan asosidagi tomirlarning qon bilan chiqishuvchanlik xususiyatlarini yaxshilash maqsadida polimerlashning radiatsion usuli qo'llanildi va bu borada ijobiy natijalarga erishildi.

O'zbekiston Milliy Universitetida professor O'. N. Musayev boshchiligidagi olimlar gruppasi jarrohlikda tirik organizm ichki a'zolari protetiklashda keng qo'llaniluvchi tayyor polimer mahsulotlarning tibbiy-biologik xususiyatlarini yaxshilash borasida sistematik izlanishlar olib bordilar. Qon o'tkazuvchi kateterlar, polietilen, polipropilen, lavsan va florlonlavsan asosidagi tomirlarning qon bilan chiqishuvchanlik xususiyatlarini yaxshilash maqsadida polimerlashning radiatsion usuli qo'llanildi va bu borada ijobiy natijalarga erishildi.

Jarrohlikda qo'llaniluvchi amaldagi iplar o'zining etarlicha pishiq bo'lishi, tez so'rilib ketib qolishi, bu iplar bilan tikilgan yaralar atrofida organizmning turli noxush reaksiyalar berishi, allergik holatlarning vujudga kelishi kabi kamchiliklarga ega ekanligi bu sohada maqsadga muvofiq keluvchi yangi sifatli iplar yaratish muammosini keltirib chiqardi. Bu muammo paxta sellyulozasidan uning karboksimetil efirini hosil qilish va bu efir asosida olingan iplarning fizik-mexanik hamda tibbiy-biologik xossalari chuqur o'rganish orqali hal etildi (Sh. Najmiddinov, A. Burimsoqov, A. S. To'rayev). Olingan iplarni turli ichki organlarni tikilishda ko'z kasalliklari jarrohligi va boshqa sohalarda muvaffaqiyatli qo'llash mumkin.

O'zbekistonda tibbiy polimerlar sohasidagi ilmiy izlanishlar bir necha yildan beri davom etmoqda. Qon o'rnini bosuvchi polimerlar, qon bosimiga ta'sir etuvchi yurak-qon tomir preparatlari hamda jarrohlik materiallari yo'naltirilgan olib borilmoqda.

XXXVI bob

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI ISTIQBOLLARI VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI

Respublikamizning qator viloyatlaridagi xom ashyo imkoniyatlari (polimer materiallari) kimyo sanoatini rivojlantirish, xalq xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va sanoat sohasida katta talabga va ehtiyojga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyat beradi. Qashqadaryo viloyatidagi Muborak gazni qazib olish zavodi, Sho'tongaz-"Kimyo" majmui, Navoi-"Azot" kombini, Toshkent viloyatidagi Olmaliq "Mineral o'g'itlar" kimyo zavodi, rudalardan metallar ajratib olish kimyo zavodlari, Chirchiq "Elektrokimyoviy zavod", Buxoro, Samarqand, Farg'ona viloyatlaridagi mavjud yirik kimyo zavodlari O'zbekiston iqtisodiyotida to'la mustaqillikka erishish borasida muhim faxrimiz hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik va taraqqiyot kafolatlari" nomli asarida shunday deyilgan: *"Ekologik muammo dunyoning hamma burchagida ham dolzarb. Faqat uning keskinlik darajasi dunyoning turli mamlakatlari va mintaqalarida turlichadir"*.*

Markaziy Osiyoda ekologik xavfning g'oyat xatarli zonalaridan biri muammo borligini aytib o'tish joizdir. Bu xavfning mohiyati shundaki, bu holat, avvalo, deyarli yarim asrga teng vaqt ichida mamlakatimizning ekologik muammosi borligini inkor etish va tan olmaslik natijasida kelib chiqqan. Ekologik jihatdan tahdidli holatga qarshi zudlik bilan chora-tadbirlar ko'rilishi lozimligi Prezident I. A. Karimov asarida atroflicha yoritilgan.

Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonimizda iqtisodiy islohotlar izchil bilan amalga oshirilmoqda. Xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari tezkorlik bilan rivojlanayotganligi ekologik muhitga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. *Atrof muhit ekologiyasining buzilishiga asosiy sabablardan biri tabiiy boyliklardan foydalanishda moddiy va ma'naviy javobgarlikni his qilmaganlik, sanoat sohasida katta hajmda mahsulotlar ishlab chiqarish ilinjida vaqti-vaqti bilan chiqindilarini zararsizlantirish masalalariga e'tibor hermaslikda*

Atmosferani ifloslantiruvchi asosiy manbalardan biri ishlab chiqarish korxonalaridir. Respublikamizda joylashgan o'nlab kimyo zavodlarining hammasida ham atrof muhitga chiqarilayotgan zararli chiqindilar muammosi hal etilgan emas. *Atrofga tarqalib ketayotgan zararli chiqindilarning mavjudligi sabablaridan biri deyarli 50—60 yillardan beri ishlab chiqarilayotgan eski ishlab chiqarish texnologiyalaridir.*

Ba'zida bu korxonalarga yangidan o'rnatilgan zamonaviy tozalovchi va ushlab qoluvchi qurilmalar ham tegishli natijani bermayapti. Bunday qurilmalarni qo'llash, aksincha, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar taqsimotini oshirib yubormoqda.

Shu maqsadlarda tezkorlik bilan chiqindisiz ishlovchi ilg'or texnologiyalarni joriy etish, bu texnologiyalarni o'zimizda yaratish va muammolarini hal etish eng dolzarb masaladir.

Bugungi kunda 1 milliard tonnadan ortiq ishlab chiqarish va maishiy xo'jalik chiqindilari yig'ilib qolgan. Masalan, faqat Olmaliq va Samarqanddagi kimyo zavodlarida 60 million tonnadan ortiq fosfor chiqindisi yig'ilgan. Respublikamizda har yili 30 million tonna maishiy-kommunal chiqindilar, chorvachilik kompleksida 20 million tonna yuqori chiqindilar vujudga keladi. Ular yer usti suvlarini ifloslantiruvchi asosiy manbalar hisoblanadi.

Ayni vaqtda turli chiqindilardan xalq xo'jaligi uchun foydali bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish, chiqindilarni zararsizlantirish to'g'risida



hazir tomonidan berilayotgan takliflar va konkret qadamlar juda

hazir xo'jaligini kimyolashtirish, hosildorlikni oshirish maqsadida kimyoviy o'g'itlarni ularning zararli oqibatlarini tasavvur qilmay turib o'g'itlarni salbiy ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Bu o'g'itlar qo'llash mumkin bo'lgan chegarasi va zararli ta'sirini tushunib olmay yiliga tuproqqa 20—25 kg/ga, ayrim viloyatlarda esa 40—45 kg/ga

zaharli kimyoviy moddalar, 400—450 kg/ga mineral o'g'itlar solindi. Hozirda Respublikamizda mavjud xo'jaliklar yiliga 1,3-1,4 million

mineral o'g'itlar va 80-85 ming tonna pestitsid ishlatmoqdalar. Mineral o'g'itlar tarkibida, masalan, fosforitda ko'p miqdorda flor, og'ir

metallar mavjud. Zaharli kimyoviy moddalar va mineral o'g'itlar taxmi- 20—25 yil davomida nazoratsiz ishlatilib kelindi. Aniqlanishicha,

pestitsidlarning faqat 0,1 foizi maqsadga muvofiq bo'lib, qolganlari suv, tuproq, havoni ifloslantiradi, hayvonot va o'simliklar dunyosini beayov

qiladi, inson va hayvonlarda zararli irsiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Tuproqqa solingan mineral o'g'itlarning 30—40 foizi o'simliklar

hosildorligi uchun foydali bo'lib, qolgan qismi tuproqni parchalaydi, tuproqning hosildorligi yil sayin pasayib boraveradi.

Bundan tashqari, mineral o'g'itlar, pestitsidlarni tashish va saqlashda xavfli xatoliklarga yo'l qo'yilishi kuzatilmoqda.

Ayrim ilg'or mamlakatlarda yer bilan ish ko'ruvchi fermerlar o'zlariga qashli yerlar tarkibidagi makro- va mikroelementlar miqdori haqidagi

ma'lumotlarga egalar. Bu ularning ekologik jihatdan toza bo'lgan foydali xo'jalik mahsulotlarini etishtirishlariga imkon beradi.

Yuqoridagi muammolarni hal etishda kimyo fani oldida ko'plab dolzarb masalalar mavjud bo'lib, avvalo, har bir kimyoviy sanoat mahsulotini

ishlab chiqarishda chiqindi moddalarni qayta ishlashga e'tibor berish, atrof muhit va havoga chiqarib yuboriluvchi moddalarni vaqtda zararsizlantirishga katta talablar qo'yiladi.

Kimyo komplekslaridan chiqarib yuboriluvchi zararli oqava suvlar o'simliklar va hayvonot dunyosi uchun nihoyatda xavflidir.

Ular suvlar tarkibidagi moddalar suv ekologik sistemasida zaharli moddalarning ko'payishiga, suvning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlari

o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bunday o'simliklar uchun zarur bo'lgan suv, xo'jaligi va insoniyat uchun zarur bo'lgan ichimlik suvi muammo

ga kelib chiqishi tabiiy. Hozirgi kunda yangi sohalar bo'lmish biokimyo va biotexnologiya

va ekologiyani asrash, atrof muhitni zararsizlantirish va kelgusi avlodlar uchun sol havo, yashil tabiat va musaffo osmonni ta'minlash maqsadida ilmiy izlanishlar olib bormoqda.

UMUMIY KIMYO. KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHALARI QONUNLARI

(mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechish)

1. (98-2-3). Tarkibida 20% qo'shimchalari bo'lgan 1 kg pirinchi (n.sh.) da 90% unum bilan qancha (litrl) sulfid angidrid olish mumkin?

Yechish: 1) qo'shimchalar 20% bo'lsa, toza modda 80% bo'ladi.

$$2) \text{FeS}_2 = 1000\text{g} \times 0,80 = 800\text{ g}$$

$$3) \text{FeS}_2 \text{ ----- } 2\text{SO}_2$$

$$120\text{g} \text{ ----- } 44,8\text{ l}$$

$$800\text{g} \text{ ----- } x = 298,67\text{ l}$$

$$4) 298,67 \times 0,90 = 268,8\text{ l}$$

Javob: 268,8 l

2. (98-2-19). Bir element oksidi tarkibida 50,45% kislorod bor. Bu elementning nisbiy atom massasi 55 ga teng bo'lsa, uning valentligi nechaga teng bo'ladi?

Yechish: 1) agar kislorod 50,45% bo'lsa, unda noma'lum element 49,55% bo'ladi.

$$2) \text{element} \quad \text{kislorod}$$

$$49,55\% : 55 = 0,90 \quad 50,45\% : 16 = 3,15$$

Endi chiqqan ikkala sonni kichik songa, ya'ni 0,90ga bo'lamiz

$$0,90 : 0,90 = 1 \quad 3,15 : 0,90 = 3,5$$

kasr sonni yo'qotish uchun ikkala sonni 2 ga ko'paytiramiz

$$1 \times 2 = 2 \quad 3,5 \times 2 = 7$$

Demak, oksid formulasi E_2O_7 . Bunda element valentligi 7ga teng.

Javob: 7

3. (98-2-38). Agar 2,02 g suvsiz kalsiy xlorid 4,38 g kristall suv bilan hosil qilsa, tuz tarkibida necha mol suv bo'ladi?

Yechish: 1) $\text{CaCl}_2 \text{ ----- } \text{CaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

$$2,02\text{ g} \text{ ----- } 4,38\text{ g}$$

$$2) m_{\text{H}_2\text{O}} = 4,38 - 2,02 = 2,36\text{ g}$$

$$3) \text{CaCl}_2 \text{ ----- } n\text{H}_2\text{O}$$

$$2,02\text{g} \text{ ----- } 2,36\text{g}$$

$$111\text{g} \text{ ----- } x = 129,68 \approx 130\text{g}$$

$$4) n_{\text{suv}} = 130 : 18 = 7\text{ mol}$$

demak, formula $\text{CaCl}_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ Javob: 7

7-10-24). FeS ning massa ulushi 88% bo'lgan 1 kg temir sulfididan sharoitda o'lchangan necha litr vodorod sulfid olish mumkin?

Yechish: 1) FeS va H_2S lar tarkibida bittadan S borligi uchun tenglamasini yozish shart emas.

$$2) \text{toza FeS } m = 1000\text{g} \times 0,88 = 880\text{ g}$$

$$3) \text{FeS} \text{ ----- } \text{H}_2\text{S}$$

$$88\text{g} \text{ ----- } 22,4\text{ l}$$

$$880\text{g} \text{ ----- } x = 224\text{ l}$$

Javob: 224 l

97-10-40). Yuqori oksidi EO_3 formulaga ega bo'lgan va vodorod 2,47% vodorodli birikma hosil qiladigan element nomini toping.

Yechish: 1) EO_3 formulaga ega bo'lgan oksidlarni VI guruh elementlari qilar va ular vodorod bilan H_2E tarkibli birikmalar hosil

H_2E tarkibidagi 2 ta vodorod 2,47% ni tashkil etsa, unda

$$\text{E} = 100 - 2,47 = 97,53\%$$

$$2\text{ g H} \text{ ----- } 2,47\%$$

$$1\text{ g E} \text{ ----- } 97,53\% \quad \text{bundan } x = 79\text{ g}$$

Bu selen (Se). Javob: Se

97-11-27). Massasi 4 g bo'lgan ikki valentli element oksidini vodorod uchun xlorid kislotadan 7,3 g sarf bo'ldi. Eritish uchun qaysi elementning oksidi olingan?

Yechish: 1) $\text{MeO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MeCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

$$4\text{g} \text{ ----- } 7,3\text{ g}$$

$$x \text{ ----- } 73\text{ g}$$

$$\text{bundan } x = 40\text{ g, ya'ni } M_{\text{MeO}} = 40$$

$$2) \text{Me} = 40 - 16 = 24\text{ g} \quad \text{bu magniy. Javob: Mg}$$

97-11-189). Qalay va misning qotishmasida har bir atom qalayga 1 ta mis to'g'ri kelishi uchun shu qotishmada necha foiz qalay bo'lishi

Yechish: 1) $\text{Sn} \text{ ----- } 5\text{Cu}$

$$119\text{ g} \text{ ----- } 320\text{ g}$$

$$2) m = 119 + 320 = 439\text{ g qotishma}$$

$$3) \omega_{\text{Sn}} = (119 : 439) \times 100 = 27,1\%$$

Javob: 27,1

97-1-46). Natriy gidrofosfat $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ da 11,57% fosfor bo'lgan hidrat tarkibidagi n ning qiymatini toping.

Yechish: 1) Modda tarkibida 1 atom fosfor bor. Demak,

$$\begin{array}{rcl} 11,57\% & \text{-----} & 31 \text{ g P} \\ 100\% & \text{-----} & x = 268 \text{ g} \end{array}$$

2) $M_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = 142$


3) $m_{\text{suv}} = 268 - 142 = 126$

4) $n_{\text{suv}} = 126 : 18 = 7 \text{ mol}$

Javob: 7

9. (00-1-49). Massasi 1,287g bo'lgan kristall holidagi sodaga miqdorda xlorid kislotasi ta'sir ettirilganda, 100,8 ml (n.sh) gaz chiqdi. Dastlabki kristallgidratning formulasini aniqlang.

Yechish:



bundan $x = 286 \text{ g}$.

2) $m_{\text{suv}} = 286 - M_{\text{xonda}} = 286 - 106 = 180 \text{ g}$

3) $n_{\text{suv}} = 180 : 18 = 10 \text{ mol}$

Javob: $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

10. (01-3-38). Glauber tuzi deb ataladigan tuz $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ tarkibida natriyning massa ulushi 16,08% ga teng. Bu tuz tarkibida necha mol bor?

Yechish: 1) Modda tarkibida 2 atom natriy bor. Demak,

$$\begin{array}{rcl} 16,08\% & \text{-----} & 46 \text{ g Na} \\ 100\% & \text{-----} & x = 286 \text{ g} \end{array}$$

2) $m_{\text{suv}} = 286 - M_{\text{tuz}} = 286 - 142 = 144 \text{ g}$

3) $n_{\text{suv}} = 144 : 18 = 8 \text{ mol}$

Javob: 8

11. (01-3-41). Temir (III)-sulfat $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ tarkibida oltin bilan temirning massa ulushi 37,0% ga teng bo'lsa, n ning qiymati qancha bo'ladi?

Yechish: 1) Modda tarkibida 3 ta S va 2 ta Fe bor.

Ularning umumiy massasi $3 \times 32 + 2 \times 56 = 208 \text{ g}$

2) $37,0\% \text{ ----- } 208 \text{ g}$

$100\% \text{ ----- } x = 562 \text{ g}$

3) $m_{\text{suv}} = 562 - M_{\text{tuz}} = 562 - 400 = 162 \text{ g}$

4) $n_{\text{suv}} = 162 : 18 = 9 \text{ mol}$

Javob: 9

1-3-71). Tarkibida 88% sof alyuminiy karbid bo'lgan 20 g alyumina mo'l miqdor suv ta'sir ettirilgan. Reaksiya unumi 85% hosil bo'lgan gazning n.sh.dagi hajmi qancha bo'ladi?

Yechish: 1) $m_{\text{Al}_2\text{C}_3} = 20 \times 0,88 = 17,6 \text{ g}$



$$\begin{array}{rcl} 144\text{g} & \text{-----} & 67,2 \text{ l} \\ 17,6\text{g} & \text{-----} & x = 8,21 \text{ l gaz} \end{array}$$

$100\% \text{ ----- } 8,21 \text{ l}$

$85\% \text{ ----- } x = 6,98 \text{ l}$

Javob: 6,98

00-10-15). $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ kristallgidratdagi suvning massa ulushi ni tashkil etsa, n ni aniqlang.

Yechish: 1) $\omega_{\text{tuz}} = 100 - 62,94 = 37,06\%$

2) $M_{\text{tuz}} = 106$

3) $37,06\% \text{ ----- } 106 \text{ g}$

$62,94\% \text{ ----- } x = 180 \text{ g suv}$

4) $n_{\text{suv}} = 180 : 18 = 10 \text{ mol}$

Javob: 10

01-6-18). Vodorodli birikmasining formulasi HE bo'lgan uning yuqori oksidi tarkibida 41,17% kislorod bor. Bu qaysi element?

Yechish: 1) HE tarkibli birikmani VII guruh elementlari hosil qiladi. Ularning yuqori oksidi formulasi E_2O_7 bo'ladi.

2) ta kislorod $16 \times 7 = 112 \text{ g}$

3) $\omega_{\text{E}} = 100 - 41,17 = 58,83 \%$

$41,17\% \text{ ----- } 112 \text{ g}$

5) $M_{\text{E}} = 160 : 2 = 80$, bu brom

$83\% \text{ ----- } x = 160 \text{ g}$

Javob: Br

01-8-23). Reaksiyaning har bir bosqichida unum 80% bo'lgan 72 g grafit bilan kalsiy oksid aralashmasi yuqori temperaturada qanday olingan mahsulotning suv bilan reaksiyasida hosil bo'lgan hajmini (litrlar) toping.



$36 \text{ g} \text{ ----- } 22,4 \text{ l}$

$72 \text{ g} \text{ ----- } x = 44,8 \text{ l}$

$= 44,8 \times 0,80 \times 0,80 = 28,67 \text{ l}$

Javob: 28,67 l

16. (02-1-18). Yer po'stlog'i tarkibidagi kaliy va natriyning foiz taxminan baravar. Yer po'stlog'ida kaliy atomlari ko'pmi yoki natriy atomlari? Taxminan necha marta ko'p?

Yechish: 1) $A_K = 39$ $A_{Na} = 23$ $39 : 23 \approx 1,7$

Na atomlari yengil. K ga qaraganda 1,7 marta ko'proq uchraydi.
Javob: Na, 1,7

17. (02-4-6). Hajmi 1000 m³ suv gazini olish uchun tarkibida massa ulush uglerod tutgan ko'mir massasini (kg) toping.

Yechish: 1) $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$ (1000 m³ = 1000 000 l)

12 g ————— 44,8 l gazlar

x ————— 1000 000 l

$x = 267857 \text{ g} \approx 268 \text{ kg}$

2) 268 kg C ——— 0,95

x ——— 1,00 bundan $x = 282 \text{ kg C}$ Javob: 282

18. (02-10-38). 0,2 mol XO₂ birikmasi 9,2 g kelsa. 1 mol X necha gramm keladi?

Yechish: 1) 0,2 mol ————— 9,2 g

1,0 mol ————— x = 46 g demak, $M_{XO_2} = 46$

2) $A_X = 46 - O_2 = 46 - 32 = 14$

3) X_2O_5 ning massasi $14 \times 2 + 16 \times 5 = 108$ Javob: 108

19. (02-10-47). Tarkibida Ca, Cl va O bo'lgan birikmaning grammida 1,6 g Ca va 0,08 mol xlor atomi bo'lsa, unung formulasini toping.

Yechish: 1) 1 mol Cl ————— 35,5 g

0,08 mol ————— x = 2,84 g

2) $m_O = 7 - 1,6 - 2,84 = 2,56 \text{ g}$

3) $\omega_{Ca} = (1,06 : 7) \times 100 = 22,86\%$ 4) $\omega_{Cl} = (2,84 : 7) \times 100 = 40,57\%$

5) $\omega_O = (2,56 : 7) \times 100 = 36,57\%$

6) Har bir atomning foizini o'z atom og'irligiga bo'lamiz.

Ca : Cl : O

(22,86:40) (40,57:35,5) (36,57:16)

0,57 11,4 2,29

endi hamma sonlarni eng kichigi (0,57) ga bo'lamiz

1 : 2 : 4

Demak, 1 ta atom Ca, 2 ta atom Cl va 4 ta atom O bor.
Formula $CaCl_2O_4$ yoki $Ca(ClO_2)_2$ Javob: $CaCl_2O_4$

(02-12-58). 0,05 mol oddiy modda yondirilganda, metandan marta og'ir bo'lgan 67,2 l (n.sh) gaz hosil bo'lgan. Oddiy moddani toping.

Yechish: 1) $M_{metan} = 16$

2) $m_{metan} = 16 \times 2,75 = 44$

3) $C + O_2 \rightarrow CO_2$

4) 0,05 mol ——— 36g

12g ——— 22,4 l

1,00 mol ——— x = 720g C

x ——— 67,2 l

5) $n_C = 720 : 12 = 60$

x = 36g

Demak, C_{60} Javob: C_{60}

(02-12-59). 0,1 mol oddiy modda yondirilganda, kislorodning ulushi 43,6% bo'lgan 0,1 mol oksid hosil bo'lgan. Bu oddiy moddani va havoga nisbatan zichligi 7,6 bo'lgan oksidning formulasini toping.

Yechish: 1) $M_{havon} = 29$ $M_{oksid} = 29 \times 7,6 = 220$

2) 0,1 mol modda ——— 0,1 mol oksid

1 mol modda ——— 1 mol oksid

Demak, 1 mol oksidning tarkibida ham 43,6% kislorod bor.

3) 220g oksid ——— 100%

x g kislorod ——— 43,6% bundan $x = 96g$

4) $n_O = 96 : 16 = 6$ ta atom kislorod

5) $m_E = 220 - 96 = 124g$ element

6) $n_E = 124 : 4 = 31$ (fosfor)

Demak, oksid formulasini P_4O_6 oddiy modda esa P_4 .

Javob: P_4 ; P_4O_6

(03-1-14). Oksidlanish darajasi 3 ga teng bo'lgan noma'lum elementning 19,4 g oksidi hosil bo'lishida 1,4 l O₂ (n.sh) sarf bo'ladi. Elementni toping.

Yechish:

Oksidlanish darajasi +3 bo'lgan element oksidining formulasini toping.

Formula E_2O_3 bo'ladi.

$4E + 3O_2 \rightarrow 2E_2O_3$

19,4 g O₂ ——— 22,4 l

x g ——— 1,4 l

bundan $x = 2 \text{ g}$ kislorod sarflangan

$M_E = 32 \text{ g}$

19,4 g - 2 = 17,2 g element

5) 4 ta E ----- 3 ta O,
 17,2 g ----- 2 g
 x ----- 96 g bundan x = 826 g
 1 ta element massasini topish uchun buni 4 ga bo'lsak,
 $826 : 4 = 206,4$ g, bu (vismut) Bi.

23. (03-4-3) Xona temperaturasiidagi oltingugurt bug'i tarkibidagi molekula S_x ning massasi 4,2610-22 ga teng. Oltingugurt atomi 5,32 ? 10-23 ga teng bo'lsa oltingugurtdagi «x» ning qiymatini toping.
 Yechish:

1) $M_{S_x} = 4,26 \cdot 10^{-22} = 42,6 \cdot 10^{-23}$
 2) $n_s = 42,6 \cdot 10^{-23} : 5,38 \cdot 10^{-23} = 8$ ta atom
 demak, molekula formulasi S_8 .

24. (03-12-8) Tarkibida 96% sof $MgSO_4$ bo'lgan texnik $MgSO_4$ sulfatdagi magniyning massa ulushini (%) toping.

Yechish: 1) $M_{MgSO_4} = 24 + 32 + 64 = 120$

2) $MgSO_4$ ----- Mg
 120 g ----- 24 g
 96 g ----- x x = 19,2 g Mg

3) 100 g ----- 100%
 19,2 g ----- x = 19,2% Mg

25. (03-12-21) 1 t suvsiz sulfat kislota olish uchun tarkibida oltin-gugurt bo'lgan temir kolchendanidan qancha (kg) kerak chiqarishdagi isrofgarchilikni 5 % deb hisoblang.

Yechish:

1) H_2SO_4 ----- S
 98g ----- 32g
 1000 000 g ----- x = 327 000 g = 327 kg S

2) 327 kg S --- 45%
 x --- 100% x = 726,7 kg FeS_2 ,

3) umum $\eta = 100\% - 5\% = 95\%$

4) 726,7 kg --- 95%
 x --- 100% x = 764 kg FeS_2 kerak



(03-12-40). Sodaning 2,5 g kristallgidrati tarkibidagi suvni suvchiqarib yuborilgandan keyin 0,962 g suvsizlantirilgan sodi. Soda tarkibidagi kristallizatsiya suvining massa ulushini (%) toping. Soda kristallgidrat formulasini toping.

1) $m_{suv} = 2,5g - 0,962g = 1,538g$

2) $\omega_{suv} = (1,538 : 2,5) \times 100 = 61,52\%$ suv

Na_2CO_3 --- H_2O
 106 g --- 18 g
 1,538 g --- x = 1,70 g

$= 170 : 18 \approx 10$ mol

Javob: 61,52%, $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

(variant -05) Ishlab chiqarishdagi oltingugurtning 5% isrof bo'lgan 100% li H_2SO_4 olish uchun tarkibidagi 55% oltingugurt bo'lgan sulfatdan qancha (kg) kerak?

Yechish: 1) H_2SO_4 --- S
 98 t --- 32 t
 1 t --- x = 0,327 t = 327 kg S

327 kg S --- 55%
 x --- 100%

x = 594,5 kg FeS_2 ,

umum $\eta = 100\% - 5\% = 95\%$

594,5 kg --- 95%
 x --- 100%
 x = 624,9 kg FeS_2 ,

Javob: 624,9

MOL – MODDA MIQDORI. AVOGADRO QONUNI

(mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechishi)

1. (99-7-40) Hajmi 10 l bo'lgan kislorod yostig'idagi kislorod massasini (g) toping. Yostiqdagi gaz bosimi 152 kPa.

Yechish:

1) $PV = nRT$, bundan $n = PV/RT$

2) 1 mol O_2 ——— 32 g

0,67 mol ——— $x = 21,4$ g O_2

Javob: 21,4

2. (99-7-42). Ozon va kislorod aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 18 ga teng. Aralashmadagi har bir gazning massa ulushini toping.

Yechish:

1) $M_{aral} = 18 \times D_{H_2} = 18 \times 2 = 36$ g

2) $M_{aral} = 36 = O_3 \cdot x + O_2(1-x)$

$36 = 48x + 32(1-x)$

$36 = 48x + 32 - 32x$

$48x - 32x = 36 - 32$

$16x = 4$

$x = 0,25$ O_3


$1 - 0,25 = 0,75$ O_2

Javob: 0,25;

3. (99-7-49). Sulfid kislotasi bilan vodorod sulfid orasidagi reaksiya natijasida 26,5 g oltingugurt hosil qilish uchun 94 kPa bosim va 25°C da vodorod sulfid hajmini hisoblang.



$T = 250 + 273 = 298^\circ K$



44,8 l ——— 96g

x ——— 25,6g

$x = 11,95$ l H_2S


3) $PV/T = PV/T$ bundan $V = P \cdot V \cdot T / T \cdot P$

$V = 101,3 \cdot 11,95 \cdot 298 / 273 \cdot 94 = 14$ litr H_2S

Javob:

4. (99-7-50). 33,8 g xlorat kislotasi $HClO_3$ ni sulfid anhidridi bilan vodorod xloridgacha qaytarish uchun 25°C va 98,7 kPa bosimda bo'lgan sharoitda talab etiladigan qaytaruvchining hajmini hisoblang.

Yechish:




$T = 250 + 273 = 298$ K

$V = P \cdot V \cdot T / T \cdot P = 101,3 \cdot 26,88 \cdot 298 / 273 \cdot 98,7 = 30,13$ l

Javob: 30,13 l

(98-9-33). Hajmlari teng bo'lgan vodorod, azot va uglerod (IV) - oksid aralashmasining o'rtacha nisbiy molekulyar massasini aniqlang.

Yechish: Hajmlar teng bo'lgani uchun 100% ni 3 ga bo'lsak, har biri 100% : 3 = 33,33% dan bo'ladi.



2) $M_{aral} = (2 \cdot 33,33 + 14 \cdot 33,33 + 44 \cdot 33,33) / 100 = 24,66 \approx 24,7$

Javob: 24,7

(98-9-34). Bir tomchi suv ($V = 0,03$ ml) da nechta molekula mavjud?

Yechish: 1) Suv uchun zichlik $\rho = 1,0$ g/mol

$m_{suv} = \rho V = 1 \times 0,03$ ml = 0,03 g


2) 18g suvda ——— $6,02 \cdot 10^{23}$ ta

0,03 g ——— $x = 0,01 \cdot 10^{23} = 1 \cdot 10^{21}$

Javob: $1 \cdot 10^{21}$

(99-5-17). $1,806 \cdot 10^{23}$ ta molekula tutgan temir (III) - xlorid eritmasiga 0,36 mol natriy gidroksid eritmasi qo'shildi. Reaksiya natijasida bo'lgan temir (III) - gidroksidning miqdorini va reaksiyada ortib qolgan modda molekullari sonini hisoblang.

Yechish:



2) $n = 1,806 \cdot 10^{23} / 6,02 \cdot 10^{23} = 0,03$ mol $FeCl_3$



$0,3 - 0,12 = 0,18$ mol $FeCl_3$ ortgan








$0,18$ mol x $6,02 \cdot 10^{23} = 1,08 \cdot 10^{23}$ ta $FeCl_3$



Javob: $0,12 \text{ mol Fe(OH)}_3$ hosil bo'lgan
 $1,08 \cdot 10^{23}$ ta FeCl_3 ortgan.

8. (99-4-3). Katalizator ustidan $6,02 \cdot 10^{24}$ molekula oltingugurt (IV) oksid va 336 l kisloroddan iborat aralashma o'tkazilganda, 640 g oltingugurt (VI) oksid hosil bo'ldi. Reaksiyada ishtirok etmagan oltingugurt (IV) oksidning molekular sonini va kislorodning massasini hisoblang.



Yechish:





Javob: $1,2 \cdot 10^{24}$ ta SO_2 va $352 \text{ g } \text{O}_2$ reaksiyada qatnashmagan

9. (99-4-35) 10% vodorod, 10% kislorod va azotdan iborat 40 ml gazlar aralashmasi portlatildi. Portlashdan keyingi oddiy modda aralashmasining hajmini (ml , n.sh.) va tarkibini ($\%$) aniqlang.





Yechish:







10. (96-13-64). $1,12 \text{ g}$ temir va $0,65 \text{ g}$ oltingugurt kukunlari orasidagi natijasida olingan sulfid massasini (grammlarda) va ortib qolgan qolgan modda massasining sulfidga nisbatan foiz miqdorini toping.



11. (98-8-62). Odam tanasining 72% ini kislorod tashkil etsa, 70 kg bo'lgan tanadagi kislorodning atomlar soni va miqdori qanday teng bo'ladi?



12. (98-3-34). Sig'imi 15 l bo'lgan idishga massasi $30,3 \text{ g}$ bo'lgan aralashmasi to'ldirilgan. Agar idishdagi temperatura 18°C va bosim $101,3 \text{ kPa}$ bo'lsa, shu gazlar aralashmasining nisbiy molekulyar massasini toping.




$$2) 0,756 \text{ mol} \rightarrow 30,3 \text{ g}$$

$$1,0 \text{ mol} \rightarrow x = 40 \text{ g}$$

Javob: 40

13. (97-10-60). Oltingugurt (VI)-oksidni nisbatan yuqori temperaturada ushlab turish natijasida uning yarmi oltingugurt (IV)-oksidga parchalanadi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining o'rtacha molekulyar massasini hisoblang.

Yechish: 1) Faraz qilamiz, 4 mol SO_3 bor. Uning yarmi SO_2 aylansa,



1) jami = 44,8 + 22,4 + 44,8 = 112 l aralashma hosil bo'ladi

$$2) \omega_{\text{SO}_2} = (44,8 : 112) \times 100 = 40\%$$

$$3) \omega_{\text{SO}_3} = (44,8 : 112) \times 100 = 40\%$$


$$4) \omega_{\text{O}_2} = (22,4 : 112) \times 100 = 20\%$$

5) Har bir gazning molekulyar massasini o'z foiziga ko'paytiramiz

$$M_{\text{aral}} = (64 \cdot 40 + 32 \cdot 20 + 80 \cdot 40) / 100 = 64$$


Javob: 64

14. (01-05-6). Hajmi 20 l (n.sh) bo'lgan NH_3 temir katalizatori bilan to'ldirilgan 350°C li naycha orqali o'tkazilganda, hajmi 25 l (n.sh) bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan gazlarning hajm tarkibi (%) qanday?



Demak, reaksiyadan keyin 22,4 + 67,2 = 89,6 l aralashma hosil bo'ladi

2) Bunda hajm o'zgarishi 89,6 - 44,8 = 44,8 l bo'ladi.



4) Demak, 5 l NH_3 parchalanib, 2,5 l N_2 ; 7,5 l H_2 hosil bo'ladi.

5) 20 l - 5 l = 15 l NH_3 ortadi.

6) Oxirgi aralashmada 15 l NH_3 ; 2,5 l N_2 va 7,5 l H_2 bo'ladi.

$$7) \omega = (15 : 25) \times 100 = 60\% \text{ NH}_3$$


$$8) \omega = (2,5 : 25) \times 100 = 10\% \text{ N}_2$$

$$9) \omega = (7,5 : 25) \times 100 = 30\% \text{ H}_2$$

Javob: 60% NH_3 ; 10% N_2 ; 30% H_2



(00-5-14). Massasi 615 g bo'lgan magniy sulfat kristallgidratida molekullarining suv molekullariga nisbati 1:7 bo'lsa, undagi kislorod sonini toping.



$$246 \text{ g k.gidratda} \rightarrow 120 \text{ g MgSO}_4 \rightarrow 126 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$615 \text{ g} \rightarrow x = 300 \text{ g} \rightarrow y = 315 \text{ g}$$

$$n = 300 / 120 = 2,5 \text{ mol MgSO}_4$$

$$n = 315 / 18 = 17,5 \text{ mol H}_2\text{O}$$

$$1 \text{ mol MgSO}_4 \rightarrow 4 \text{ mol O bor}$$

$$2,5 \text{ mol} \rightarrow x = 10 \text{ mol kislorod}$$


$$1 \text{ mol H}_2\text{O da} \rightarrow 1 \text{ mol O bor}$$

$$17,5 \text{ mol da} \rightarrow x = 17,5 \text{ mol kislorod}$$

$$\text{Jami } 10 \text{ mol} + 17,5 = 27,5 \text{ mol}$$

$$27,5 \text{ mol} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 165 \cdot 10^{23} = 1,65 \cdot 10^{25} \quad \text{Javob: } 1,65 \cdot 10^{25}$$

6. (00-7-6). Suv va pentan ($\rho = 0,626 \text{ g/ml}$) ning molyar hajmlari ni hisoblang. Bu qiymat pentan uchun suvnikidan necha marta



$$M_{\text{pentan}} = 72 \text{ g} \quad V = 72 / 0,626 = 115 \text{ ml}$$

$$115 \text{ ml} / 18 \text{ ml} = 6,4 \text{ marta}$$

Javob: 18; 115; 6,4 marta

2. (01-7-51). Hajmi 5 l bo'lgan po'lat idishda 250 kPa bosim ostida sharoitdagi ammiakda nechta vodorod atomi mavjud?



$$n = (250 \cdot 5) / (8,314 \cdot 300) = 0,5 \text{ mol NH}_3$$

$$1 \text{ mol NH}_3 \text{ da} \rightarrow 3 \text{ mol H}$$

$$0,5 \text{ mol} \rightarrow x = 1,5 \text{ mol H bor}$$

$$1,5 \text{ mol} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 9,0 \cdot 10^{23} \text{ ta H}$$

Javob: $9,0 \cdot 10^{23}$

(01-8-30). Massasi 273 g bo'lgan gaz 20°C va normal bosimda hajmi egallassa, uning vodorodga nisbatan zichligini toping.



$$n = (101,3 \cdot 156,3) / (8,314 \cdot 293) = 6,5 \text{ mol}$$

$$2) 6,5 \text{ mol} \rightarrow 273 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol} \rightarrow x = 42 \text{ g}$$

Demak, $M_{\text{gaz}} = 42$

$$3) D_{\text{H}_2} = 42 / 2 = 21$$

Javob: 21

19. (01-9-6). Massa jihatdan tarkibi 25,3% uglerod (IV)-oksid, 40,2% azot va 34,5% argondan tashkil topgan aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi qanday?

Aralashmadagi tarkibiy qismlarning hajmiy ulushlarini hisoblang.

Yechish: 1) $M_{aral} = (44 \cdot 25,3 + 28 \cdot 40,2 + 40 \cdot 34,5) / 100 = 36,2$

2) 44 g CO_2 — 22,4 l

25,3 g ——— $x = 12,88$ l CO_2

3) 28g ——— 22,4 l

40,2g ——— $x = 32,16$ l N_2

4) 40g ——— 22,4 l

34,5g ——— $x = 19,32$ l Ar

5) jami = $12,88 + 32,16 + 19,32 = 64,36$ l aralashma

6) $CO_2 = 12,88 / 64,36 = 0,2$

7) $N_2 = 32,16 / 64,36 = 0,5$

8) Ar = $19,32 / 64,36 = 0,3$

Javob: 36,2; 0,2; 0,5; 0,3.

20. (01-10-10). Odam o'pkasidagi havo pufakchalari (alveollar)ning 700 millioniga 3 l havo sig'adi. Bitta alveolga sig'adigan havodagi molekular sonini hisoblang.

Yechish:

1) $700 \cdot 10^6$ ta alveolga ——— 3 litr havo

1 taga ——— $x = 0,00428 \cdot 10^{-6} = 4,28 \cdot 10^{-9}$ l havo

2) 22,4 l ——— $6,02 \cdot 10^{23}$

$4,28 \cdot 10^{-9}$ l ——— $x = 1,15 \cdot 10^{14} \approx 1,2 \cdot 10^{14}$

Javob: $1,2 \cdot 10^{14}$

21. (02-1-17). Dengiz suvining bir tomchisida 50 milliardga yaqin oltin atomlari bor. Dengiz suvidan 30 tomchisining massasini 1 g deb olib, dengiz suvining bir tonnasidagi oltinning massasini gram bilan hisoblab toping.

Yechish:

1) 1 tomchida ——— $50 \cdot 10^9$ ta Au

30 tomchida ——— $x = 1500 \cdot 10^9 = 1,5 \cdot 10^{12}$ ta Au bor.

2) 1 g suvda ——— $1,5 \cdot 10^{12}$ ta Au bor

$1 \cdot 10^6$ g ——— $x = 1,5 \cdot 10^{18}$ ta Au



$n = 1,5 \cdot 10^{18} / 6,02 \cdot 10^{23} = 0,25 \cdot 10^{-5}$ mol Au

$m = 0,25 \cdot 10^{-5} \times 197 = 49 \cdot 10^{-5} = 4,9 \cdot 10^{-4}$ g

Javob: $4,9 \cdot 10^{-4}$

22. (02-1-59). Yarim mol miqdordagi ammiak $22^\circ C$ va $177,32$ kPa ostida joylashtirilgan. Shu gaz tarkibidagi vodorod atomlari sonini hisoblang.

Yechish: 1) $PV = nRT$ dan $V = nRT/P$

$V = (0,5 \cdot 8,314 \cdot 295) / 177,32 = 6,91$ l

2) 22,4 l ——— $6,02 \cdot 10^{23} \times 3$ ta H

6,91 l ——— $x = 5,6 \cdot 10^{23}$ ta

Javob: $5,6 \cdot 10^{23}$

23. (02-3-8). Zichligi $0,0893$ g/l (n.sh.) bo'lgan gaz molekulasiga kiruvchi bitta atomning massasi qanday bo'ladi?

Yechish: 1) 1 litr gaz ——— $0,0893$ g

22,4 l ——— $x = 2$ g

Demak, $M_{gaz} = 2$ g

2) 2 g gazda ——— $6,02 \cdot 10^{23}$ ta molekula

x ——— 1 ta

$x = 0,33 \cdot 10^{-23}$ g

3) 1 ta atom = $0,33 \cdot 10^{-23} / 2 = 0,166 \cdot 10^{-23}$ g

Javob: $1,66 \cdot 10^{-24}$

24. (02-3-53). Ozon va kislorod aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 16,4 ga teng. Aralashmadagi kislorod va ozonning hajmlar nisbatini hisoblang.

Yechish: 1) $M_{aral} = 16,4 \times 2 = 32,8$

2) $32,8 = [48x + 32(100-x)] : 100$

$32,8 \cdot 100 = 48x + 32(100-x)$

$3280 = 48x + 3200 - 32x$

$48x - 32x = 3280 - 3200$

$16x = 80$ bundan $x = 5\% O_2$

$100 - 5 = 95\% O_3$

ya'ni $O_2 : O_3 = 95 : 5 = 19 : 1$

Javob: 19:1

25. (02-3-58). Hajmlari bir xil bo'lgan vodorod va azot aralashmasi apparati orqali o'tkazilganda, vodorodning 90% miqdori ammiakka aylanadi. Apparatdan chiqayotgan gazning tarkibidagi vodorod va azotning ulushlarini (%) hisoblang.

Yechish: 1) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Faraz qilamiz, 22,4 l H_2 bor edi.

2) $22,4 \times 0,90 = 20,16$ l H_2 sarflangan.

3) $22,4 - 20,16 = 2,24$ l ortgan.

4) N_2 ----- H_2
 $22,4$ l ----- $67,2$ l
 x ----- $20,16$ l

$x = 6,72$ l N_2 sarflangan

6) N_2 ---- $2NH_3$

$22,4$ l ---- $44,8$ l

$6,72$ l ---- $x = 13,44$ l NH_3 hosil bo'lgan

7) Jami $= 2,24$ l $H_2 + 15,68$ l $N_2 + 13,44$ l $NH_3 = 31,36$ l

8) $H_2 = (2,24 : 31,36) \times 100 = 7,1\%$

9) $N_2 = (15,68 : 31,36) \times 100 = 50\%$

Javob: 7,1; 50%

26. (02-3-60). Uglerod oksidlari aralashmasining massasi 44 g, ularning hajmi esa 28 l (n.sh). CO_2 va CO molekullari nisbati qanday bo'ladi?

Yechish: 1) 28 l ----- 44g aralashma

$22,4$ l ----- $x = 35,2$

Demak. $M_{\text{aral}} = 35,2$

2) $35,2 = [44x + 28(100-x)] / 100$

$35,2 \times 100 = 44x + 28(100-x)$

$3520 = 44x + 2800 - 28x$

$44x - 28x = 3520 - 2800$

$16x = 720$ bundan $x = 45\% CO_2$

3) $100 - 45 = 55\% CO$

4) 28 l $\times 0,45 = 12,6$ l CO_2

5) 28 l $\times 0,55 = 15,4$ l CO

6) $CO_2 = 12,6 : 22,4 = 0,56$ mol

7) $CO = 15,4 : 22,4 = 0,68$ mol

8) $CO_2 : CO = 0,56 : 0,68$

ikkala tomonni kichik songa bo'lamiz

$1 : 1,23$

ikkala tomonni 9 ga ko'paytiramiz

$9 : 11$

Javob: 9:11

27. (02-4-8). 54 g suvga necha ml metil spirti ($\rho = 0,8$ g/ml) qo'shilganda, ikkala modda tarkibidagi vodorod atomlarining miqdori bir xil bo'ladi?

Yechish: 1) $n = 54 : 18 = 3$ mol suv

2) 1 mol H_2O da ----- 2 mol H

3 molda ----- $x = 6$ mol H

3) 1 mol CH_3OH da ----- 4 mol H

x mol da ----- 6 mol H

$x = 1,5$ mol CH_3OH

28. $m = 1,5$ mol $\times 32 = 48$ g spirt

$V = m / \rho = 48 : 0,8 = 60$ ml spirt

Javob: 60

28. (02-6-22). Tarkibi $3CO + 2CO_2$ dan iborat 100g gazlar aralashmasining $50^\circ C$ va $98,6$ kPa bosimdagi hajmini hisoblang.

Yechish: 1) $3CO + 2CO_2$ jami 5 mol aralashma, bundan,

$\omega CO = 3/5 \times 100 = 60\%$

$\omega CO_2 = 2/5 \times 100 = 40\%$

2) $M_{\text{aral}} = (28 \times 60 + 44 \times 40) / 100 = 34,4$

3) $34,4g$ ----- $22,4$ l

$100g$ ----- $x = 65$ l aral.

4) $n = 65 / 22,4 = 2,9$ mol aral.

5) $V = nRT / P = (2,9 \times 8,314 \times 323) / 98,6 = 79$ litr

Javob: 79 l

29. (02-6-61). Agar bosim $101,3$ kPa ga teng bo'lsa, hajmi 1 litr gaz xlor qanday temperaturada ($^\circ C$) 1 g massaga ega bo'ladi?

Yechish: 1) $PV = nRT / M$ bundan

$T = PVM / mR = 101,3 \cdot 1 \cdot 71 / 1 \cdot 8,314 = 866 K$

2) $t = 866 - 273 = 593^\circ C$

Javob: 593

30. (02-7-25). Ma'lum bir temperaturada azot (IV)-oksidining eritilish nisbatan zichligi 25 ga teng bo'lsa, unda necha foiz dimeri mavjud bo'ladi?

Yechish: 1) $M_{\text{oksid}} = 25 \cdot 2 = 50$ 2) $M_{N_2O_2} = 46$ 3) $M_{N_2O_4} = 92$

4) $50 = [46x + 92(100-x)] / 100$

$5000 = 46x + 9200 - 92x$

$92x - 46x = 9200 - 5000$

$46x = 4200$

$x = 91,3\% NO_2$

5) $100 - 91,3 = 8,7\% N_2O_4$

Javob: 8,7%

31. (02-11-28). $200^\circ C$ da simobning to'yingan bug'larining bosimi 50 Pa ga teng. Xonada simob termometri singanda, havoning 1 cm^3 hajmida simobning massasi qancha (mg) bo'ladi?

Yechish:

1) $T = 20^\circ C + 273 = 293 K$

$P = 0,160 \text{ Pa} = 0,00016 \text{ kPa} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ kPa}$

$V = 1 \text{ cm}^3 = 100 \text{ ml} = 0,1 \text{ litr}$

2) $PV = mRT/M$ bundan

$$M = PVM/RT = (1,6 \cdot 10^{-4} \cdot 0,1 \cdot 201)/(8,314 \cdot 293) = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ g} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mg}$$

Javob: $1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mg}$

32. (02-12-37). Issiq konsentrlangan H_2SO_4 ning S_2Cl_2 bilan reaksiyasi natijasida hosil bo'ladigan gazlarning (SO_2 va HCl) hajmiy ulushlarini foizda toping.

Yechish: 1) $3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{S}_2\text{Cl}_2 \rightarrow 5\text{SO}_2 + 2\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}$

$$2) \text{SO}_2 = 22,4 \times 5 = 112 \text{ l}$$

$$3) \text{HCl} = 22,4 \times 2 = 44,8 \text{ l}$$

$$4) \text{Jami} = 112 + 44,8 = 156,8 \text{ l aralashma}$$

$$5) \text{SO}_2 = (112 : 156,8) \times 100 = 71,43\%$$

$$6) \text{HCl} = (44,8 : 156,8) \times 100 = 28,57\%$$

Javob: 71,43% SO_2 , 28,57% HCl

33. (03-3-29). Massasi 1g bo'lgan xlor hajmi 10ml bo'lgan ampulaga to'ldirilgan. Ampula 0°C dan 273°C gacha qizdirilganda, undagi bosim qanday o'zgaradi?

Yechish: 1) $V = 10 \text{ ml} = 0,01 \text{ l}$

$$T_1 = 0^\circ + 273 = 273 \text{ K}$$

$$T_2 = 273^\circ\text{C} + 273 = 546 \text{ K}$$

$$2) P_1 = mRT_1/VM = (1 \cdot 8,314 \cdot 273)/(0,01 \cdot 71) = 3197 \text{ kPa}$$

$$3) P_2 = mRT_2/VM = (1 \cdot 8,314 \cdot 546)/(0,01 \cdot 71) = 6394 \text{ kPa}$$

$$4) 6394 : 3197 = 2 \text{ marta ortadi.}$$

Javob: 2 marta ortadi

34. (03-8-51). Tarkibida 25% ozoni bo'lgan ikki gaz aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng. Ozonga qaysi gaz aralashgan?

Yechish: 1) $M_{\text{aral}} = 9 \times 4 = 36$

$$2) 36 = (48 \cdot 25 + x \cdot 75)/100$$

$$3600 = 1200 + 75x$$

$$75x = 3600 - 1200$$

$$75x = 2400$$

$$x = 32 \text{ g } (\text{O}_2)$$

Demak, ozonga kislorod aralashgan

Javob: kislorod

35. (Variant-04). Is gazi bilan vodorod aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 6,2 bo'lgan 28 l miqdorini yondirish uchun nechta litr havo ($\omega(\text{O}_2) = 0,2$) talab etiladi?

Yechish: 1) $M_{\text{aral}} = 6,2 \times 2 = 12,4 \text{ g}$

$$2) 12,4 = [28x + 2(100 - x)]/100$$

$$1240 = 28x + 200 - 2x$$

$$28x - 2x = 1240 - 200$$

$$26x = 1040$$

$$x = 40\% \text{ CO}$$

$$3) 100 - 40 = 60\% \text{ H}_2$$

$$4) 28 \text{ l} \times 0,4 = 11,2 \text{ l CO}$$

$$5) 28 \text{ l} \times 0,6 = 16,8 \text{ l H}_2$$

$$6) 2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$$

$$44,8 \text{ l} - 22,4 \text{ l}$$

$$11,2 \text{ l} - x = 5,6 \text{ l O}_2$$

$$7) 2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$$

$$44,8 \text{ l} - 22,4 \text{ l}$$

$$16,8 \text{ l} - x = 8,4 \text{ l O}_2$$

$$8) 5,6 + 8,4 = 14 \text{ l O}_2$$

$$9) 0,2 \text{ l} \text{ --- } 14 \text{ l O}_2$$

$$1,0 \text{ l} \text{ --- } x = 70 \text{ l O}_2$$

Javob: 70 l O_2 , kerak

ATOM TUZILISHI. YADRO REAKSIYALARI (mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechish)

1. (99-6-35). Agar tabiiy kislorod tarkibida 95% ^{16}O , 4% ^{17}O va 1% ^{18}O bo'lsa, elementning atom massasi qanchaga teng bo'ladi?

Yechish:

$$1) M_{\text{aral}} = (16 \cdot 95 + 17 \cdot 4 + 18 \cdot 1)/100 = 16,097$$

Javob: 16,097

2. (99-6-43). Qaysi elementlarda elektron ko'chish "sakrash" sodir bo'ladi?

1) xrom, 2) marganes, 3) mis, 4) vanadiy, 5) titan, 6) temir, 7) azot,

8) rux

$$\text{Yechish: } 1) {}_{24}\text{Cr } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^4 \rightarrow 4s^1 3d^5$$

$$3) {}_{29}\text{Cu } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1 3d^{10} \rightarrow 4s^1 3d^{10}$$

Javob: 1, 3

3. (96-10-13). Tabiatda misning o'rtacha atom massasi 63,5. Uning ^{63}Cu va ^{65}Cu izotoplaridan iboratligi ma'lum. Tabiiy misdagi ^{63}Cu xopining massa ulushini (%) toping.

Yechish: 1) $63,5 = [63x + 65(100 - x)]/100$

$$6350 = 63x + 6500 - 65x$$

$$65x - 63x = 6500 - 6350$$

$$2x=150$$

$$x=75\% \text{ } ^{63}\text{Cu}$$

Javob: 75

4. (98-8-79). ^{40}K izotopidan ^{40}Ca izotopi hosil bo'lishida qanday radioaktiv o'zgarish sodir bo'lishini aniqlang.

Yechish: $^{40}_{19}\text{K} \rightarrow ^{40}_{20}\text{Ca} + -\beta$

tarkibdan 1 ta minus zaryad chiqib ketsa, zaryad (tartib raqam) 1 ortadi

Javob: $-\beta$ chiqishi

5. (98-3-5). Natriy atomi yadrosi α - zarrachalar bilan bombardimon qilinganda proton ajralib chiqqan. Davriy sistemadagi qaysi elementning izotopi hosil bo'ldi?

Yechish: $^{23}_{11}\text{Na} + ^4_2\alpha \rightarrow ^1_1\text{p} + ^{26}_{12}\text{X}$

Javob: magniy izotopi

6. (98-2-6). $^{238}_{92}\text{U}$ dan 2 ta α - va 3 ta β -zarrachalar ajralib chiqsa, hosil bo'ladigan yangi elementning tartib raqami nechaga teng bo'ladi?

Yechish: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow 2^4_2\alpha + 3^0_{-1}\beta + ^{230}_{91}\text{X}$

Demak, noma'lum element tartib raqami 91.

Javob: 91

7. (99-10-29). Agar misdagi elektronlar 1 g (elektronning massasi 1/1840 m.a.b. ga teng) bo'lsa, misning massasini (kg) hisoblang.

Yechish: 1) melektron=1:1840=0,000543 g

2) 1 ta elektron - 0,000543g

x-----1g

x=1841,6 ta

3) 29 ta e -----64 g

1841,6 -----x=4064 g=4,06 kg

Javob: 4.06

8. (00-1-7). Elektron formulasi $...3d^14s^2$ bo'lgan atom davriy sistemaning qaysi guruhida joylashgan?

Yechish: 1) $3d^14s^2$ dan oldingi qavatlar formulasini yozamiz:

$1s^22s^22p^63s^23p^63d^14s^2$

2) darajadagi raqamlarni qo'shamiz: $2+2+6+2+6+1+2=21$

tartib raqami 21 bo'lgan element - skandiy Sc III guruhda

$...3d^14s^2$ da $1+2=3$ ta elektron bor. Valent elektroni 3 ta bo'lgan elementlar III guruhda joylashgan.

Javob: 3

9. (00-1-14). Quydagi elementlardan qaysi birining tashqi energetik pog'onasining tuzilishi $...3s^23p^1$ elektron formulaga mos keladi:

(B, Cl, P, Mg, F) ?

Yechish: 1 usul. $...3s^23p^1$ formulada darajadagi raqamlarni qo'shamiz:

$2+2+1=5$ Demak, element 5- guruhda joylashgan.

Bu fosfor (P)

2 usul. $...3s^23p^1$ dan oldingi qavatlarni yozib chiqamiz: $1s^22s^22p^63s^23p^1$ darajadagi raqamlarni qo'shamiz $2+2+6+2+3=15$, tartib raqami 15 lgan element fosfor (P)

Javob: P

10. (96-13-47). $^{238}_{92}\text{U}$ Itadan α - va β -zarrachalar sochishi natijasida qaysi element izotopi hosil bo'ladi?

Yechish: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^4_2\alpha + ^0_{-1}\beta + ^{234}_{91}\text{X}$ bu Protaktiniy Javob: $^{234}_{91}\text{Pa}$

11. (96-15-99). $^{209}_{83}\text{Bi}$ izotopi atom yadrosi tarkibining necha foizini protonlar tashkil etadi?

Yechish: 1) $(83:209) \times 100 = 39,7\%$

Javob: 39,7

12. (02-1-64). Quydagi yadro reaksiyasi natijasida 22,3 mg fransiy yadrosi yemirilganda, necha sm^3 geliy va qanday element izotopi hosil bo'ladi?

$^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow 3^4_2\alpha + 2^0_{-1}\beta + \text{X}$

Yechish: 1) $^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow 3^4_2\alpha + 2^0_{-1}\beta + ^{211}_{83}\text{X}$

2) 223000 mg Fr ---- 67,2 l He

22,3 mg ---- x

$x = 0,00672 \text{ l He} = 6,72 \text{ sm}^3$

Javob: va 6,72 sm^3

13. (02-1-65). Fransiy yadrosining radioaktiv yemirilishi

$^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow \text{X} + 2\alpha + 5n$ natijasida 0,0112 sm^3 geliy hosil bo'lgan. Reaksiya natijasida qaysi element izotopi (X) hosil bo'lgan? Reaksiyada necha gram izotop qatnashgan?

1) 0,075 2) 0,056 3) 0,56 4) $^{210}_{81}\text{X}$ 5) $^{211}_{82}\text{X}$ 6) $^{210}_{83}\text{X}$

Yechish: 1) $^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow ^{210}_{83}\text{X} + 2^4_2\alpha + 5^1_0n$

2) 223000 mg Fr ---- 44,8 l He

x ---- 0,000112 l He

$x = 5,575 \approx 0,056 \text{ mg}$

Javob: 0,056 mg

14. (03-4-29). Tarkibida 0,56% toriy ^{232} izotopi bo'lgan mineralda qo'rg'oshin -208 izotopi borligi aniqlandi. 1 kg rudadan necha litr geliy ajralib chiqadi?

Yechish: 1) $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{208}_{82}\text{Pb} + 6^4_2\text{He} + 4^0_{-1}\text{e}$

2) $1\text{kg} = 1000\text{g} \xrightarrow{100\%}$
 $x \xrightarrow{0,5\%}$ $x = 5\text{g Pb}$

3) $208\text{g Pb} \xrightarrow{6 \times 22,4\text{ l He}}$
 $5,00\text{g} \xrightarrow{x=3,23\text{ l He}}$ Javob: 3,23 l He

15. (Variant-04). Fransiy izotopining yemirilish reaksiyasi $^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow X + 3\beta + ^{207}_{82}\text{Pb}$ bo'yicha sodir bo'ladi. Massasi 0,52 mg bo'lgan fransiyning parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan gaz mahsulot hajmini (sm^3) da aniqlang.

1) $^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow 4^4_2\text{X} + 3^0_{-1}\beta + ^{207}_{82}\text{Pb}$
yoki $^{223}_{87}\text{Fr} \rightarrow 4^4_2\text{He} + 3^0_{-1}\beta + ^{207}_{82}\text{Pb}$

2) $223000\text{mg Fr} \xrightarrow{89,6\text{ l He}}$
 $0,52\text{mg} \xrightarrow{x=0,000209\text{ l yoki } 0,209\text{ sm}^3}$ Javob: 0,209

16. (Variant -05). Element atomidagi neytronlar soni 45 ta bo'lib, bu esa element atom massasining 56,25% ini tashkil etadi. Bu element atomida nechta elektron borligini ko'rsating.

Yechish: 1) 45ta neytron $\xrightarrow{56,25\%}$
 $x \xrightarrow{100\%}$ bundan $x=80$

Demak, element massasi 80

2) proton = $80 - 45 = 35$ ta

3) proton = elektron = 35 ta Javob: 35



KIMYOVIY REAKSIYALAR TEZLIGI (mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechish)

(99-7-12). Reaksiya temperaturasi 10°C ga pasaytirilganda uning 3 marta o'zgargan. Agar temperatura 100°C dan 50°C gacha tirlilsa, reaksiya tezligi necha marta kamayadi?

Yechish:

1) temperatura 10°C ga pasayganda, tezlik 3 marta o'zgarishi
temperatura ko'effitsiyenti $\gamma=3$ ekanini ko'rsatadi.

2) $\Delta t = 100 - 50 = 50$

3) $V = \gamma^{\Delta t/10} = 3^5 = 243$ marta kamayadi Javob: 243

2. (99-7-13). $\text{C(k)} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ reaksiyada reaktor hajmi 2 marta o'zlashganda, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi?

Yechish: 1) $2\text{C} + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ da to'g'ri reaksiya tezligi vodorod konsentratsiyasiga bog'liq:

$$V = k[\text{H}_2]^3$$

2) hajm 2 marta kattalashsa, konsentratsiya 2 marta kamayadi.
 $V = k(1/2)^3 = 1/8$ demak, reaksiya tezligi 8 marta kamayadi.

3. (98-3-12). Reaksiya boshlanmasidan oldin moddaning konsentratsiyasi 1,6 mol/l bo'lib, 5 minutdan so'ng uning konsentratsiyasi 0,2 mol/l ga teng bo'ldi. Reaksiya tezligini (mol/l sek) aniqlang.

Yechish: 1) Konsentratsiya o'zgarishi $1,6 - 0,2 = 1,4\text{ mol/l}$

2) $V = C/\tau = 1,4/5 \cdot 60 = 0,0047 = 4,7 \cdot 10^{-3}$ Javob: $4,7 \cdot 10^{-3}$

4. (99-7-14). Sistema temperaturasi 20°C ga ko'tarilganda, reaksiya tezligi 4 marta ortsa, temperatura 60° dan 120° gacha ortganda, reaksiya tezligi necha marta ortadi?

Yechish: Reaksiya tezligi temperaturani har 20°C ga oshirganda 4 marta tezlashsa, har 10°C da 2 marta tezlashadi. Dunda $\gamma=2$ bo'lgani uchun, $V = \gamma^{\Delta t/10}$

$\Delta t = 120 - 60 = 60$ $V = 2^6 = 64$ marta Javob: 64

5. (98-9-35). 20°C dagi ikkita reaksiya tezligi bir xil. Birinchi reaksiyaning temperatura ko'effitsiyenti 2 ga, ikkinchisidagi esa 3 ga teng. Ikkinchi reaksiya tezligi birinchisidan necha marta katta bo'ladi?

Yechish: 1) $\Delta t = 50 - 20 = 30$

2) $V = 2^{30/10} = 2^3 = 8$

$$3) V_2 = 3^{30/10} = 3^3 = 27$$

$$4) V_2 : V_1 = 27 : 8 = 3,38 \text{ marta}$$

Javob: 3,38

6. (96-13-15). $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$ sistemada CO konsentratsiyasini 0,03 mol/l dan 0,12 mol/l gacha, Cl_2 nikini 0,02 dan 0,06 mol/l gacha o'zgartirib, qancha bo'ladi?

Yechish: 1) $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$ bunda $V = k[\text{CO}] \cdot [\text{Cl}_2]$

$$2) C_{\text{CO}} = 0,12 : 0,03 = 4 \text{ marta oshirilgan}$$

$$3) C_{\text{Cl}_2} = 0,06 : 0,02 = 3 \text{ marta oshirilgan}$$

$$4) V = 4 \times 3 = 12 \text{ marta ortadi}$$

Javob: 12

7. (96-13-55). Temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lgan reaksiya tezligi 25°C da $5 \cdot 10^{-2}$ mol/l sek ga teng. Shu reaksiya tezligi 45°C da qancha bo'ladi?

$$\text{Yechish: } 1) \Delta t = 45 - 25 = 20$$

$$2) V = 3^{20/10} = 3^2 = 9 \text{ marta tezlashadi}$$

$$3) 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l sek} \times 9 = 45 \cdot 10^{-2} = 4,5 \cdot 10^{-1} \text{ mol/l sek}$$

Javob: $4,5 \cdot 10^{-1}$

8. (98-8-70). A va B moddalar orasidagi qaytar reaksiya natijasida AB_2 hosil bo'lganda, gomogen gaz sistemasidagi hajm 5 marta kamaysa, o'ng va chap tomonga boruvchi reaksiya tezliklari qanday o'zgaradi?

a) o'ngga boradigan reaksiya tezligi:

$$1) 5 \text{ marta ortadi. } 2) 25 \text{ marta ortadi } 3) 125 \text{ marta ortadi}$$

b) chapga boradigan reaksiya tezligi:

$$4) 5 \text{ marta ortadi } 5) 25 \text{ marta ortadi } 6) 125 \text{ marta ortadi}$$

$$\text{A) } 1,4 \quad \text{B) } 2,5 \quad \text{C) } 3,4 \quad \text{D) } 3,5 \quad \text{E) } 2,6$$

$$\text{Yechish: } 1) \text{ A} + 2\text{B} \rightarrow \text{AB}_2$$

$$2) \text{ Hajm 5 marta kamaysa, konsentratsiya 5 marta ortadi.}$$

$$3) V_{\text{o'ngga}} = 5 \times 5^2 = 125 \text{ marta ortadi.}$$

$$4) V_{\text{chapga}} = 5 \text{ marta ortadi}$$

Javob: a) 3; b) 4

9. (99-1-13). Azot (II)- oksiddan kislorod ishtirokida azot (IV)- oksid sintez qilinayotgan sistemada reaksiyon aralashmaning hajmi ikki marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o'zgarishini aniqlang.

$$\text{Yechish: } 1) 2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2 \text{ bunda } V = [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$$

$$2) \text{ hajm ikki marta kamaysa, konsentratsiya 2 marta ortadi.}$$

$$3) V = 2^2 \times 2 = 8 \text{ marta reaksiya tezligi ortadi}$$

Javob: 8 marta ortadi

10. (98-2-9). Temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng bo'lgan reaksiyaning 20°C dagi tezligi 3 mol/l sek bo'lsa, uning 60°C dagi tezligi (mol/l sek) qancha bo'ladi?

$$\text{Yechish: } 1) \Delta t = 60 - 20 = 40$$

$$2) V = 2^{40/10} = 2^4 = 16 \text{ marta tezlashadi.}$$

$$3) V = 3 \text{ mol/l sek} \times 16 = 48 \text{ mol/l sek}$$

Javob: 48

11. (97-8-62). Reaksiya 333 K da 30 sek da tugaydi. Agar reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng bo'lsa, shu reaksiya 30°C da qancha davom etadi?

$$\text{Yechish: } 1) t = 333 - 273 = 60^\circ\text{C}$$

$$2) \Delta t = 60 - 30 = 30$$

$$3) V = 3^{30/10} = 3^3 = 27 \text{ marta sekinlashadi.}$$

$$4) V = 30 \text{ sek} \times 27 = 810 \text{ sek} : 60 = 13 \text{ min } 30 \text{ sek}$$

Javob: 13 min 30 sek

12. (01-7-42). Oddiy sharoitdagi gazning konsentratsiyasi 0,0285 mol/l edi. Agar idishdagi bosim 6 marta ortganda va boshqa holatda bosim 4,8 marta kamayganda, konsentratsiya qanday o'zgaradi?

$$\text{Yechish: } 1) C_1 = 0,0285 \text{ mol/l} \times 6 = 0,171 \text{ mol/l} \approx 0,17 \text{ mol/l}$$

$$2) C_2 = 0,0285 \text{ mol/l} : 4,8 = 0,0059 \text{ mol/l} \approx 0,006 \text{ mol/l}$$

$$\text{Javob: } 0,17; 0,006$$

13. (02-2-24). Temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lgan reaksiya boshlang'ich temperaturada 6 min davomida tugaydi. Reaksiya temperaturasi 60°C gacha oshirilganda, shu reaksiya 1 min 30 sek davomida tugasa, boshlang'ich temperaturani aniqlang.

$$\text{Yechish: } 1) \gamma = 2$$

$$T_1 = 6 \text{ min} \times 60 = 360 \text{ sek}$$

$$T_2 = 1 \text{ min } 30 \text{ sek} = 90 \text{ sek}$$

$$2) V = 360 : 90 = 4 \text{ marta tezlashgan}$$

$$3) 4 = 2^x, \text{ bundan } x = 2$$

$$\text{buning uchun } \Delta t = 20 \text{ bo'lishi kerak}$$

$$4) \Delta t = 20 = 60 - x$$

$$x = 40^\circ\text{C}$$

Javob: 40

$$3) V_2 = 3^{30/10} = 3^3 = 27$$

$$4) V_2 : V_1 = 27 : 8 = 3,38 \text{ marta}$$

Javob: 3,38

6. (96-13-15). $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$ sistemada CO konsentratsiyasi 0,12 mol/l gacha, Cl_2 nikini 0,02 dan 0,06 mol/l gacha o'zgartirganda, o'ng tomonga boradigan reaksiya tezligi necha marta ortadi?

Yechish: 1) $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$ bunda $V = k[\text{CO}][\text{Cl}_2]$

$$2) C_{\text{CO}} = 0,12 : 0,03 = 4 \text{ marta oshirilgan}$$

$$3) C_{\text{Cl}_2} = 0,06 : 0,02 = 3 \text{ marta oshirilgan}$$

$$4) V = 4 \times 3 = 12 \text{ marta ortadi}$$

Javob: 12

7. (96-13-55). Temperatura ko'effitsiyenti 3 bo'lgan reaksiya tezligi 25°C da $5 \cdot 10^{-2}$ mol/l sek ga teng. Shu reaksiya tezligi 45°C da qanday bo'ladi?

$$\text{Yechish: } 1) \Delta t = 45 - 25 = 20$$

$$2) V = 3^{20/10} = 3^2 = 9 \text{ marta tezlashadi}$$

$$3) 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l sek} \times 9 = 45 \cdot 10^{-2} = 4,5 \cdot 10^{-1} \text{ mol/l sek}$$

Javob: $4,5 \cdot 10^{-1}$

8. (98-8-70). A va B moddalar orasidagi qaytar reaksiya natijasi AB_2 hosil bo'lganda, gomogen gaz sistemasidagi hajm 5 marta kamaysa, o'ng va chap tomonga boruvchi reaksiya tezliklari qanday o'zgaradi?

a) o'ngga boradigan reaksiya tezligi:

$$1) 5 \text{ marta ortadi. } 2) 25 \text{ marta ortadi } 3) 125 \text{ marta ortadi}$$

b) chapga boradigan reaksiya tezligi:

$$4) 5 \text{ marta ortadi } 5) 25 \text{ marta ortadi } 6) 125 \text{ marta ortadi}$$

$$\text{A) } 1,4 \quad \text{B) } 2,5 \quad \text{C) } 3,4 \quad \text{D) } 3,5 \quad \text{E) } 2,6$$

$$\text{Yechish: } 1) \text{ A} + 2\text{B} \rightarrow \text{AB}_2$$

$$2) \text{ Hajm 5 marta kamaysa, konsentratsiya 5 marta ortadi.}$$

$$3) V_{\text{o'ngga}} = 5 \times 5^2 = 125 \text{ marta ortadi.}$$

$$4) V_{\text{chapga}} = 5 \text{ marta ortadi}$$

Javob: a) 3; b) 4

9. (99-1-13). Azot (II)- oksiddan kislorod ishtirokida azot (IV)-oksidi sintez qilinayotgan sistemada reaksiya aralashmaning hajmi ikki marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o'zgarishini aniqlang.

$$\text{Yechish: } 1) 2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2 \text{ bunda } V = [\text{NO}]^2[\text{O}_2]$$

$$2) \text{ hajm ikki marta kamaysa, konsentratsiya 2 marta ortadi.}$$

$$3) V = 2^2 \times 2 = 8 \text{ marta reaksiya tezligi ortadi}$$

Javob: 8 marta ortadi

10. (98-2-9). Temperatura ko'effitsiyenti 2 ga teng bo'lgan reaksiyaning 60°C dagi tezligi 3 mol/l sek bo'lsa, uning 20°C dagi tezligi (mol/l sek) qanday bo'ladi?

$$\text{Yechish: } 1) \Delta t = 60 - 20 = 40$$

$$2) V = 2^{40/10} = 2^4 = 16 \text{ marta tezlashadi.}$$

$$3) V = 3 \text{ mol/l sek} \times 16 = 48 \text{ mol/l sek}$$

Javob: 48

11. (97-8-62). Reaksiya 333 K da 30 sek da tugaydi. Agar reaksiyaning temperatura ko'effitsiyenti 3 ga teng bo'lsa, shu reaksiya 30°C da qanday davom etadi?

$$\text{Yechish: } 1) t = 333 - 273 = 60^\circ\text{C}$$

$$2) \Delta t = 60 - 30 = 30$$

$$3) V = 3^{30/10} = 3^3 = 27 \text{ marta sekinlashadi.}$$

$$4) V = 30 \text{ sek} \times 27 = 810 \text{ sek} : 60 = 13 \text{ min } 30 \text{ sek}$$

Javob: 13 min 30 sek

12. (01-7-42) Oddiy sharoitdagi gazning konsentratsiyasi 0,0285 mol/l edi. Agar idishdagi bosim 6 marta ortganda va boshqa holatda bosim 4,8 marta kamayganda, konsentratsiya qanday o'zgaradi?

$$\text{Yechish: } 1) C_1 = 0,0285 \text{ mol/l} \times 6 = 0,171 \text{ mol/l} \approx 0,17 \text{ mol/l}$$

$$2) C_2 = 0,0285 \text{ mol/l} : 4,8 = 0,0059 \text{ mol/l} \approx 0,006 \text{ mol/l}$$

Javob: 0,17; 0,006

13. (02-2-24). Temperatura ko'effitsiyenti 2 bo'lgan reaksiya boshlang'ich temperaturada 6 min davomida tugaydi. Reaksiya temperaturasi 10°C gacha oshirilganda, shu reaksiya 1 min 30 sek davomida tugasa, boshlang'ich temperaturani aniqlang.

$$\text{Yechish: } 1) \gamma = 2$$

$$T_1 = 6 \text{ min} \times 60 = 360 \text{ sek}$$

$$T_2 = 1 \text{ min } 30 \text{ sek} = 90 \text{ sek}$$

$$2) V = 360 : 90 = 4 \text{ marta tezlashgan}$$

$$3) 4 = 2^x, \text{ bundan } x = 2$$

$$\text{buning uchun } \Delta t = 20 \text{ bo'lishi kerak}$$

$$4) \Delta t = 20 = 60 - x$$

$$x = 40^\circ\text{C}$$

Javob: 40

14. (02-6-67). 5 l eritmada A modda va 3 mol B modda bor. Agar ushbu $A+B \rightarrow C$ reaksiyaning o'rtacha tezligi $0,04 \text{ mol/l}\cdot\text{sek}$ bo'lsa, 8 sek dan so'ng bu moddalarning konsentratsiyasi qanday bo'ladi?

Yechish: 1) $A+B \rightarrow C$ $[A]=2 \text{ mol/5l}=0,4 \text{ mol/l}$
 $[B]=3 \text{ mol/5l}=0,6 \text{ mol/l}$

2) $0,04 \times 8 \text{ sek} = 0,32 \text{ mol modda reaksiyaga kirishadi}$

3) $[A] = 0,4 - 0,32 = 0,08 \text{ mol/l}$

4) $[B] = 0,6 - 0,32 = 0,28 \text{ mol/l}$

Javob: 0,08; 0,28

15. (02-7-54). Kimyoviy reaksiyaning tezlik konstantasi 100°C da $6 \cdot 10^{-4}$ ga, 150°C da $14,6 \cdot 10^{-2}$ ga teng bo'lsa, uning temperatura koeffitsiyentini toping.

Yechish: 1) $V_1 = 6 \cdot 10^{-4} = 0,0006$

2) $V^2 = 14,6 \cdot 10^{-2} = 0,146$

3) $V_2:V_1 = 0,146 : 0,0006 = 243$ marta tezlashgan

4) $243 = \gamma^{(150-100)/10}$ yoki $243 = \gamma^5$, bundan $\gamma = 3$ Javob: 3

16. (02-12-16). A va B moddalarning o'zaro ta'siridan C va D moddalar hosil bo'lish reaksiyasida A ning konsentratsiyasi 3 marta va B ning konsentratsiyasi 2 marta oshirilganda, reaksiya tezligi 432 marta oshsa, qaysi tenglama shu shartni qanoatlantiradi?

A) $7A+B \rightarrow C+D$ B) $A+7B \rightarrow C+D$ C) $3A+5B \rightarrow C+D$

D) $3A+4B \rightarrow C+D$ E) $3A+2B \rightarrow C+D$

Yechish:

$3A+4B \rightarrow C+D$ reaksiyada tezlik

$V = 3^3 \times 2^4 = 27 \times 16 = 432$ marta ortadi

Javob: D

17. (03-4-41). $\text{HCOOH} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$ reaksiyaning 140°C dagi tezlik konstantasi $5,75 \cdot 10^{-4}$ ga, 180°C da $9,2 \cdot 10^{-3}$ ga teng. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini toping.

Yechish: 1) $5,75 \cdot 10^{-4} = 0,000575$ $9,2 \cdot 10^{-3} = 0,0092$

$0,0092 : 0,000575 = 16$ marta tezlashgan

2) $\Delta t = 180 - 140 = 40$

3) $16 = \gamma^{40/10}$ yoki $16 = \gamma^4$, bundan $\gamma = 2$ Javob: 2

18. (03-5-36). 393 K da reaksiya 18 minutda tugallanadi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng bo'lsa, 453°K dagi bu reaksiyaning tugallanish vaqtini (sek) hisoblang.



Yechish: 1) $\Delta t = 453 - 393 = 60$

2) $V = 3^{60/10} = 3^6 = 729$ marta tezlashadi.

3) $T = 18 \text{ min} \times 60 \text{ sek} = 1080 : 729 = 1,48 \text{ sek}$ Javob: 1,48 sek

19. (03-5-38). Reaksiya tezligini 90 marta oshirish uchun haroratni qancha gradusga oshirish kerak? Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 2$ teng.

Yechish: 1) $V = \gamma^{t/10}$ yoki $90 = 2^{t/10}$
bundan, $t = 45,3^\circ$ Javob: 45,3

KIMYOVIIY MUVOZANAT

(mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechish)

1. (variant 05). Platina katalizatori ishtirokidagi $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \leftrightarrow$ sistemasida NH_3 va O_2 ning dastlabki konsentratsiyalari mos ravishda 12 va 16 mol/l. Ammiakning 25% reaksiyaga kirishganidan so'ng muvozanat qaror topdi. Kislorod va suvning muvozanat holatidagi konsentratsiyalarini toping.

Yechish: 1) $4 \text{ NH}_3 + 5 \text{ O}_2 \leftrightarrow 4 \text{ NO} + 6 \text{ H}_2\text{O}$
12mol/l 16mol/l

2) $12 \text{ mol/l} \times 0,25 = 3 \text{ mol/l}$ NH_3 sarflangan

3) $12 - 3 = 9 \text{ mol/l}$ NH_3 qolgan.

4) $4 \text{ NH}_3 \text{ --- } 5 \text{ O}_2$
4mol --- 5mol
3mol --- x = 3,75 mol O_2 sarflangan

5) $16 - 3,75 = 12,25 \text{ mol}$ O_2 qolgan

6) $4 \text{ NH}_3 \text{ --- } 6 \text{ H}_2\text{O}$
4mol --- 6mol
3mol --- x = 4,5 mol H_2O hosil bo'lgan


Javob: 12,25 va 4,5

2. (99-7-9). Ammiakning oksidlanish tenglamasi $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \leftrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O(g)}$ bo'yicha sodir bo'ladigan jarayon muvozanat holiga kelganida, moddalar konsentratsiyalari quyidagicha bo'lgan: $[\text{NH}_3] = 0,9 \text{ mol/l}$, $[\text{O}_2] = 2 \text{ mol/l}$, $[\text{NO}] = 0,3 \text{ mol/l}$. Muvozanat holatidagi suvning, H_2O va O_2 ning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) toping.

Yechish: 1) $4 \text{ NH}_3 + 5 \text{ O}_2 \leftrightarrow 4 \text{ NO} + 6 \text{ H}_2\text{O}$
0,9 2,0 0,3

- 2) $4\text{NO} \rightarrow 6\text{H}_2\text{O}$
 4 mol $\rightarrow$ 6 mol
 0,3 mol $\rightarrow$ x = 0,45 mol/l H_2O hosil bo'lgan
- 3) $4\text{NH}_3 \rightarrow 4\text{NO}$
 4 mol $\rightarrow$ 4 mol
 0,3 mol $\rightarrow$ 0,3 mol Demak, 0,3 mol NH_3 sarflangan
- 4) $0,9 + 0,3 = 1,2$ mol/l NH_3 reaksiyadan oldin bo'lgan
- 5) $5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO}$
 5 mol $\rightarrow$ 4 mol
 x $\rightarrow$ 0,3 mol bundan x = 0,375 mol O_2 sarflangan
- 6) $0,375 + 2 = 2,38$ mol/l O_2 bo'lgan Javob: 0,45; 1,2; 2,38


3. (98-7-6). Bug' holatidagi teng hajmdagi CO va H_2O dan iborat aralashma 1500 K temperaturagacha qizdirilgan temir katalizatori ustidan o'tkazilganida hajm bo'yicha $\text{CO}_2 = 20,7\%$, $\text{CO} = 29,3\%$, $\text{H}_2\text{O} = 29,3\%$, $\text{H}_2 = 20,7\%$ olingan bo'lsa, $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$ reaksiyaning muvozanat konstantasi nechaga teng bo'ladi?



$$K_{\text{muv}} = [\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2] / [\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}] = (20,7 \cdot 20,7) / (29,3 \cdot 29,3) = 0,50$$

Javob: 0,50


4. (98-1-36). Ammiak sintez qilish uchun tayyorlangan gazlar aralashmasida azot va vodorodning konsentratsiyalari tegishli tartibda 4 va 10 mol/l ni tashkil etgan. Reaksiyada muvozanat qaror topgandan so'ng azotning 50% miqdori reaksiyaga kirishgan bo'lsa, azot, vodorod va ammiakning muvozanat konsentratsiyalarini toping.



- 2) $4 \times 0,5 = 2$ mol/l N_2 sarflangan
- 3) $4 - 2 = 2$ mol/l N_2 ortgan
- 4) $\text{N}_2 \rightarrow 3\text{H}_2$
 1 mol $\rightarrow$ 3 mol
 2 mol $\rightarrow$ x = 6 mol/l H_2 sarflangan
- 5) $10 - 6 = 4$ mol H_2 ortgan
- 6) $\text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
 1 mol $\rightarrow$ 2 mol
 2 mol $\rightarrow$ x = 4 mol/l NH_3 hosil bo'lgan


Javob: 2; 4; 4

(01-8-20). Normal sharoitda 10 moldan azot va vodorod aralashma Ammiak hosil qilish reaksiyasi muvozanat holatiga kelgandan so'ng aralashmada 1 mol vodorod qolgan. Muvozanat konstantasini hisoblang



- 2) $10 - 1 = 9$ mol H_2 sarflangan
- 3) $\text{N}_2 \rightarrow 3\text{H}_2$
 1 mol $\rightarrow$ 3 mol
 x mol $\rightarrow$ 9 mol bundan x = 3 mol N_2 sarflangan
- 4) $10 - 3 = 7$ mol N_2 qolgan.
- 5) $\text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
 1 mol $\rightarrow$ 2 mol
 3 mol $\rightarrow$ x = 6 mol NH_3 hosil bo'lgan.
- 6) $K_{\text{muv}} = [\text{NH}_3]^2 / [\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3 = 6^2 / 7 \cdot 1^3 = 5,14$ Javob: 5,14

6. (01-3-11). Quyidagi $\text{NO} + \text{O}_2 \leftrightarrow \text{NO}_2$ reaksiyada muvozanat holatida moddalarning konsentratsiyalari (mol/l) $[\text{O}_2] = 0,26$ va $[\text{NO}] = 0,20$ bo'lsa, shu reaksiyaga kirishgan moddalarning dastlabki konsentratsiyalari yig'indisi qanday bo'ladi?



- 2) $2\text{NO} \rightarrow 2\text{NO}_2$
 2 mol $\rightarrow$ 2 mol
 x $\rightarrow$ 0,20 mol bundan x = 0,20 mol NO sarflangan

3) boshlang'ich $[\text{NO}] = 0,80 + 0,20 = 1,0$ mol bo'lgan

- 4) $\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$
 1 mol $\rightarrow$ 2 mol
 x $\rightarrow$ 0,20 mol
 x = 0,10 mol O_2 sarflangan

5) boshlang'ich $[\text{O}_2] = 0,26 + 0,10 = 0,36$ mol bo'lgan

- 6) $1,0 + 0,36 = 1,36$ mol Javob: 1,36

7. (98-7-10). Muvozanat konstantasi $K_m = 2,64 \cdot 10^{-2}$ bo'lgan reaksiyaning tenglamasi $1/2 \text{N}_2 + 3/2 \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ shaklida ifodalanadi. Shunga asoslanib $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ reaksiya tenglamasi uchun muvozanat konstantasi K_1 ni hisoblang.



8. (98-7-14). Tenglamasi $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ bo'lgan reaksiyada muvozanat vujudga kelgan paytda $[N_2]=0,01$ mol/l, $[H_2]=2,0$ mol/l, $[NH_3]=0,4$ mol/l bo'lgan. Reaksiyaning muvozanat konstantasini va dastlabki moddalar bo'lgan azot va vodorod konsentratsiyasini aniqlang.

Yechish: 1) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ uchun


$$K_{\text{muv}} = (0,4)^2 / (0,01 \cdot 2^3) = 0,16/0,08 = 2$$



1 mol --- 2 mol

x --- 0,4 mol bundan x = 0,2 mol N_2 sarflangan

3) $[N_2] = 0,01 + 0,2 = 0,21$ mol/l bo'lgan



3 mol --- 2 mol

x --- 0,4 mol bundan x = 0,6 mol H_2 sarflangan

5) $[H_2] = 2,0 + 0,6 = 2,6$ mol/l bo'lgan

Javob: $K_{\text{muv}} = 2,0; = 2,6; = 0,21$

9. (02-11-4). Quyidagi sistemada $A + B \leftrightarrow C + D$ tenglamadagi tartibda yozilgan moddalar konsentratsiyalari (mol/l) 8; 3; 2; 12 bo'lgan. Muvozanat holatidagi sistemadan C moddadan 2 mol/l chiqarib yuborilgan.

A va D larning yangi konsentratsiyalarini toping.

Yechish: 1) Dastlabki holatda $A + B \leftrightarrow C + D$

8 3 2 12

bunda $K_{\text{muv}} = (2 \cdot 12) / (8 \cdot 3) = 24/24 = 1$

2) Keyingi holatda $A + B \leftrightarrow C + D$

(8-x) (3-x) x (12+x)

bunda $K_{\text{muv}} = 1 = [x \cdot (12+x)] / [(8-x)(3-x)]$

3) tenglamani yechamiz: $(8-x)(3-x) = x(12+x)$

$$24 - 8x - 3x + x^2 = 12x + x^2$$

$$24 - 8x - 3x = 12x$$

$$24 = 12x + 8x + 3x$$

$$24 = 23x \text{ bundan } x = 1,04$$

4) Demak, $C_A = 8 - 1,04 = 6,96$ mol/l

$$C_D = 12 + 1,04 = 13,04 \text{ mol/l}$$

Javob: 6,96; 13,04

10. (02-11-5). Muvozanat holatidagi sistemada $A + B \leftrightarrow C + D$ tenglamada yozilish tartibida moddalarning konsentratsiyalari (mol/l) 6; 2; 4 va 3 ga teng. Sistemaga B moddadan 4 mol/l miqdorda qo'shilgandan




B va C larning yangi holatdagi muvozanat konsentratsiyalarini

Yechish:



$$\text{bunda } K_{\text{muv}} = (4 \cdot 3) / (6 \cdot 2) = 12 / 12 = 1$$



$$\text{bunda } K_{\text{muv}} = 1 = [(4+x) \cdot (3+x)] / [(6-x) \cdot (2+4-x)]$$

$$(4+x)(3+x) = (6-x)(6-x)$$

$$12 + 4x + 3x + x^2 = 36 - 6x - 6x + x^2$$

$$12 + 7x = 36 - 12x$$

$$24 = 19x$$

$$x = 1,26$$

$$3) C_A = 2 - 1,26 = 0,74 \text{ mol/l}$$

$$4) C_C = 4 + 1,26 = 5,26 \text{ mol/l}$$

Javob: 0,74; 5,26.

11. (02-12-19). Bir litrli idishda $\text{NO} + \text{SO}_2 \leftrightarrow \text{SO}_2 + \text{NO}$ reaksiyasi muvozanat holatida turibdi. Shu vaqtda 4 mol NO, 1 mol SO_2 , 8 mol O_2 va 8 mol NO₂ bor. Idishga 3 mol SO_2 qo'shildi va yana muvozanat baror topdi. Yangi muvozanatda NO konsentratsiyasi necha mol bo'ladi?



SO_2 dan yana qo'shguncha muvozanat konstantasi

$$K_{\text{muv}} = 8 \cdot 8 / 4 \cdot 1 = 64 / 4 = 16$$

3) SO_2 qo'shilgandan keyin $\text{SO}_2 = 1 + 3 = 4$ mol bo'lib qoldi.

Demak, NO va SO_2 san x moldan sarf bo'ldi, SO_2 va NO_2 ga esa x moldan qo'shildi. Shuning uchun endi

$$K_{\text{muv}} = [(8+x)(8+x)] / [(4-x)(4-x)] = 16$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Tenglamani yechamiz: } 16(4-x)(4-x) &= (8+x)(8+x) \\ 256 - 48x - 48x + 16x^2 &= 64 + 16x + x^2 \\ 256 - 96x + 16x^2 &= 64 + 16x + x^2 \\ 15x^2 - 144x + 192 &= 0 \end{aligned}$$

$$x_{1,2} = [144 \pm \sqrt{144^2 - 4 \cdot 15 \cdot 192}] / 2 \cdot 15$$

$$\text{bundan } x_1 = (144 - 96) / 30 = 1,6$$

Demak, NO dan 1,6 mol sarf bo'lgan

$$4) C_{\text{NO}} = 4 - 1,6 = 2,4 \text{ mol}$$

Javob: 2,4

ERITMALAR

(mavzu bo'yicha namunaviy masalalar yechish)

1. (98-5-4). 5 mol suvga bir mol sulfat kislota qo'shilishidan hosil bo'lgan eritmadagi kislota massasi ulushi nechaga teng?

Yechish: 1) $M_{\text{suv}} = 18$ $M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98$
 2) $m_{\text{suv}} = 18 \times 5 \text{ mol} = 90 \text{ g}$
 3) $m_{\text{kislota}} = 98 \times 1 \text{ mol} = 98 \text{ g}$
 4) $m_{\text{eritma}} = 90 + 98 = 188 \text{ g}$
 5) $\omega_{\text{k-ls}} = 98/188 = 0,52$

Javob: 0,52

2. (98-5-9). Konsentratsiyasi 2,5 mol bo'lgan sulvat kislota eritmasining 15 ml miqdoridan foydalanib, necha ml 0,5 M eritma tayyorlash mumkin?

Yechish: 1) $C_1 V_1 = C_2 V_2$ bundan $V_2 = C_1 V_1 / C_2$
 2) $V_2 = (2,5 \times 15) : 0,5 = 75 \text{ ml}$

Javob: 75 ml

3. (99-7-1). Massasi 114,8 g $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ kristallgidratni 85,2 g suvda eritishdan hosil bo'lgan eritmadagi rux sulfatning massa ulushini hisoblang.

Yechish: 1) $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ZnSO}_4$
 $287 \text{ g} \rightarrow 161 \text{ g}$
 $114,8 \text{ g} \rightarrow x = 64,4 \text{ g toza tuz bor}$
 2) $m_{\text{eritma}} = 114,8 + 85,2 = 200 \text{ g}$
 3) $\omega_{\text{tuz}} = 64,4/200 = 0,322$

Javob: 0,322

4. (99-6-81). KNO_3 ning 60°C to'yingan eritmasida 52,4% tuz mavjud. Shu temperaturadagi tuzning eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang.

Yechish: 1) $t = 60^\circ\text{C}$ $m_{\text{suv}} = 100 - 52,4 \text{ g tuz} = 47,6 \text{ g}$
 2) $47,6 \text{ g suvga} \rightarrow 52,4 \text{ g tuz}$
 $100 \text{ g suvga} \rightarrow x = 110 \text{ g tuz}$

Demak, $S(60^\circ\text{C}) = 110$

Javob: 110

5. (98-9-57). Kaliy nitratning 40°C dagi eruvchanlik koeffitsiyenti 61 ga teng. Uning to'yingan 250 g eritmasini bug'latish natijasida olingan tuz massasini (g) va shu temperaturadagi eritmasida erigan tuzning massa ulushini toping.

Yechish: 1) $100 \text{ g suvda} + 61 \text{ g tuz} = 161 \text{ g eritma}$

2) $161 \text{ g eritmada} \rightarrow 61 \text{ g tuz}$
 $250 \text{ g eritmada} \rightarrow x = 94,7 \text{ g tuz bor}$

3) $\omega_{\text{tuz}} = 94,7/250 = 0,39$

Javob: 94,7; 0,39

6. (99-5-24). 5% eritma hosil qilish uchun 200 ml 20% li ($\rho = 1,14$ g/ml) sulfat kislota eritmasiga qancha (ml) suv quyish kerak?

Yechish: 1) $m_{\text{kislota}} = C \cdot V \cdot \rho / 100 = (20 - 200 \cdot 1,14) / 100 = 45,6 \text{ g}$

2) $5\% \rightarrow 45,6 \text{ g}$
 $100\% \rightarrow x = 912 \text{ g eritma}$

3) $m_{\text{eritma}} = \rho \cdot V = 1,14 \cdot 200 = 228 \text{ g}$

4) $m_{\text{suv}} = 912 - 228 = 684 \text{ g}$

Javob: 684

7. (99-5-36). Vodorod sulfidning mo'l miqdordagi kislorodda oshidan hosil bo'lgan mahsulot kaliy gidroksidning ($\rho = 1,4 \text{ g/cm}^3$) 10 ml 40% li eritmasidan o'tkazilganda 120 g o'rta tuz hosil bo'ldi. Kaliya uchun olingan vodorod sulfidning hajmini (l, n.sh) toping.

Yechish: 1) $\text{H}_2\text{S} + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 2) $\text{SO}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 3) $m_{\text{KOH}} = C \cdot V \cdot \rho / 100 = (40 \cdot 100 \cdot 1,4) / 100 = 5,6 \text{ g}$

4) $2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3$
 $112 \text{ g} \rightarrow 174 \text{ g}$
 $x \rightarrow 120 \text{ g}$ bundan $x = 77,2 \text{ g KOH sarflanigan}$

5) $\text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{KOH}$
 $22,4 \text{ l} \rightarrow 112 \text{ g}$
 $x \rightarrow 77,2 \text{ g}$ bundan $x = 15,4 \text{ l}$ Javob: 15,4 l

Yechish: $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3$
 $22,4 \text{ l} \rightarrow 174 \text{ g}$
 $x \rightarrow 120 \text{ g}$ bundan $x = 15,4 \text{ l}$

8. (98-8-66). Massa ulushi 49,5% bo'lgan asetonning suvli eritmasi ($\rho = 0,99$) dagi asetonning hajmiy ulushini aniqlang. Aseton uchun 25°C dagi zichlik 0,786 g/ml.

Yechish: 1) $49,5\% \text{ li eritmani } 100 \text{ g deb faraz qilamiz}$

Bunda $m_{\text{aseton}} = 100 - 49,5 = 49,5 \text{ g}$

2) $V_{\text{eritma}} = m / \rho = 100 / 0,99 = 101 \text{ ml}$ 3) $V_{\text{aseton}} = 49,5 / 0,786 = 62,98 \text{ ml}$

4) $\omega_{\text{aseton}} = 62,98 / 101 = 0,62$

Javob: 0,62

9. (98-8-68). 55,5ml aseton bilan 44,5 ml suv aralashmasi (eritma zichligi $\rho=0,99\text{g/ml}$) dagi asetonning molyar konsentratsiyasini aniqlang. Asetonning zichligi 0,786 g/ml. Eritma hosil bo'lishida hajm o'zgarishini hisobga olmag.

Yechish: 1) Aseton formulasi $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$, $M_{\text{aseton}}=58$

2) $m_{\text{aseton}} = \rho V = 0,786 \cdot 55,5 = 43,62 \text{ g}$

3) $V_{\text{eritma}} = 55,5 + 44,5 = 100 \text{ ml}$

4) $n_{\text{aseton}} = 43,62 : 58 = 0,752 \text{ mol} \approx 0,750 \text{ mol}$

5) 100ml eritmada --- 0,750 mol

1000 ml eritmada --- $x = 7,5 \text{ mol}$


Javob: 7,5M

10. (99-3-42). 150 g vodorod peroksid eritmasiga oz miqdorda katalizator - MnO_2 qo'shildi, bunda 40°C va bosim 89 kPa da o'lchangan $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ kislorod ajraldi. Boshlang'ich eritmadagi vodorod peroksidning massa ulushini toping.

Yechish: 1) $PV=nRT$ dan

$$n_{\text{kislorod}} = PV/RT = (89 \cdot 2) / (8,314 \cdot 313) = 0,0684 \text{ mol}$$

chunki $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 0,002 \text{ m}^3 = 2 \text{ l}$ va $T = 40^\circ\text{C} + 273 = 313 \text{ K}$




$$68 \text{ g} \text{ ----- } 1 \text{ mol}$$

$$x \text{ ----- } 0,0684 \text{ mol} \quad \text{bundan} \quad x = 4,65 \text{ g H}_2\text{O}_2$$

$$3) \omega_{\text{peroksid}} = (4,65/150) \cdot 100 = 3,1\% \quad \text{Javob: 3,1}$$

11. (97-12-59). 50 g suvda ikki valentli metall gidridi eritilganda, eritma massasi suv va gidrid massalariga nisbatan 0,4 g ga kamaydi. Hosil bo'lgan moddaning eritmadagi massa ulushi 0,1375 ga teng bo'lsa, reaksiya uchun qanday gidrid olingan?

Yechish: 1) ikki valentli metallar gidridi suvda quyidagicha eriydi:



$$(\text{Me}+2)\text{g} \quad (\text{Me}+34)\text{g} \quad 4\text{g}$$

bizda $(\text{Me}+0,2)\text{g} \quad (\text{Me}+3,4)\text{g} \quad 0,4\text{g}$

2) Bundan $0,1375 = (\text{Me}+34)/(0,2+50-0,4)$

$$0,1375 (\text{Me}+49,8) = \text{Me}+3,4$$

$$0,1375 \text{ Me} + 6,85 = \text{Me}+3,4$$

$$0,7625 \text{ Me} = 3,45$$

$$\text{Me} = 4$$



$$4\text{g} \text{ ----- } 0,4\text{g}$$

$$(\text{Ca}) 40 \text{ g} = x \text{ ----- } 4\text{g}$$

Javob: kalsiy gidrid CaH_2



12. (00-4-53). Massasi 15 g bo'lgan eritma tarkibida $4,8 \cdot 10^{23}$ ta kislorod atomi bo'lgan eritmaning tarkibidagi natriy nitritning massa ulushini (%) aniqlang.

Yechish: 1) $n_{\text{kislorod}} = 4,8 \cdot 10^{23} : 6,02 \cdot 10^{23} = 0,797 \approx 0,8 \text{ mol}$

2) $M_{\text{NaNO}_2} = 69 \quad M_{\text{O}_2} = 18$

bundan: $69x + 18y = 15 \text{ g}$

HNO_2 da 2 ta atom kislorod bo'lgani uchun $2x$ deb olamiz.

Suvda 1 ta atom kislorod bo'lgani uchun uni y deb olamiz.

Bundan: $2x + y = 0,8 \text{ mol}$

3) Endi tenglama tuzamiz: $\begin{cases} 69x + 18y = 15 \\ 2x + y = 0,8 \end{cases}$

$y = 0,8 - 2x$

$69x + 18(0,8 - 2x) = 15$

$69x + 14,4 - 36x = 15$

$33x = 0,6 \quad x = 0,018 \text{ mol NaNO}_2$

4) $m_{\text{NaNO}_2} = 69 \times 0,018 = 1,242 \text{ g}$

5) $\omega = (1,242/15) \times 100 = 8,3\%$

Javob: 8,3

13. (01-1-33). Konsentratsiyasi 60% bo'lgan nitrat kislota (zichligi 1,37 g/ml) bilan fosformi oksidlab olingan ortofosfat kislota dan o'rta tuz hosil qilish uchun 10% li kaliy gidroksidning 60 ml eritmasi ($\rho = 1,09 \text{ g/ml}$) sarf bo'lgan. Fosfor oksidlanishida azot (II)—oksid hosil bo'lgan, deb hisoblang va reaksiyada qatnashgan nitrat kislota hajmini toping.

Yechish: 1) $3\text{P} + 5\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{NO} \uparrow$

2) $3\text{H}_3\text{PO}_4 + 9\text{KOH} \rightarrow 3\text{K}_3\text{PO}_4 + 9\text{H}_2\text{O}$

3) $m_{\text{KOH}} = C \cdot V \cdot \rho / 100 = (10 \cdot 60 \cdot 1,09) / 100 = 6,54 \text{ g}$

4) $5\text{HNO}_3 \text{ --- } 9 \text{ KOH}$

$5 \cdot 63 \text{ g} \text{ --- } 9 \cdot 56 \text{ g}$

$x \text{ --- } 6,54 \text{ g}$

bundan $x = 4,088 \text{ g HNO}_3$

5) $V = (m - 100) / C \cdot \rho = (4,088 - 100) / (60 \cdot 1,37) = 4,97 \approx 5,0 \text{ ml}$

Javob: 5,0

14. (01-3-108). Hajmi 139 ml bo'lgan 91% li sulfat kislota eritmasi ($\rho = 1,8 \text{ g/ml}$) ga qanday massada (g) oltingugurt (VI)- oksid yuttirilgan-da, eritmadagi kislota ning massa ulushi 98% ga yetadi?

Yechish: 1) $m_{\text{SO}_3} = \rho V = 1,8 \cdot 139 \text{ ml} = 250,2 \text{ g}$

2) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

80

98

9) 10 ml eritmada --- 0,005 mol

1000 ml ---- x

x = 0,5 M AlCl_3

10) 10 ml eritmada --- 0,01 mol

1000 ml ---- x

x = 1 M HCl

Javob: AlCl_3 0,5M; HCl 1M

18. (03-2-5). 20 g o'yuvchi natriy eritmasi 23,6 g oleumni neytrallashga sarf bo'ldi. Oleumdagi sulfat anhidridning har bir molekulasiga nechta sulfat kislota molekulasiga to'g'ri kelishini toping.

Yechish:

1) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3 \rightarrow \text{NaOH}$

23,6 g 20 g

2) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

80 ---- 98

x ---- y y = 98x/80 = 1,225x

3) $2\text{NaOH} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

80 ---- 80

(20-x) -- (23,6 - 1,225x)

80(23,6 - 1,225x) = 80(20-x)

Tenglamani yechsak, x = 16 g NaOH (H_2SO_4 uchun sarf bo'lgan)

4) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

80 ---- 98

16 ---- x = 19,6 g kislota

5) 20 - 16 = 4 g NaOH (SO_3 uchun sarf bo'lgan)

6) $\text{SO}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

80 ---- 80

x ---- 4

x = 4 g SO_3

7) n = 4/80 = 0,05 mol SO_3

8) n = 19,6/98 = 0,2 mol H_2SO_4

9) Ularning nisbati : 0,05 : 0,2 = 1 : 4

Demak, bitta SO_3 ga 4 ta H_2SO_4 to'g'ri keladi.

Javob: 4

19. (01-3-104). 100%li sulfat kislota erigan sulfat anhidridning 20% li eritmada) hosil qilish uchun 1 kg massadagi 92,6% li sulfat



Yechish: 1) $m_{\text{kislota}} = 1000 \text{ g} \times 0,946 = 946 \text{ g}$

2) $m_{\text{suvi}} = 1000 - 946 = 54 \text{ g}$

3) 20% li eritmada $80 \text{ g H}_2\text{SO}_4 \text{ ---- } 20 \text{ g SO}_3$
 $946 \text{ g H}_2\text{SO}_4 \text{ ---- } x = 236,5 \text{ g SO}_3$

4) 54 g suvni yo'qotish uchun unda SO_3 ni eritamiz:



$$18\text{g} \text{ ---- } 80\text{g} \text{ ---- } 98\text{g}$$

$$54\text{g} \text{ ---- } x \text{ ---- } y$$

bundan $x = 240 \text{ g SO}_3$ kerak

$y = 294 \text{ g H}_2\text{SO}_4$ hosil bo'ladi

5) Hosil bo'lgan yangi kislotada yana SO_3 eritib, 20% li qilamiz


$$80\text{g H}_2\text{SO}_4 \text{ ---- } 20 \text{ g SO}_3$$

$$294 \text{ g ---- } x = 73,5 \text{ g SO}_3 \text{ kerak}$$

6) Umumiy SO_3 massasi $236,5 + 240 + 73,5 = 550 \text{ g}$ Javob: 550

20. (01-3-108). Hajmi 139 ml bo'lgan 91% li sulfat kislota eritmasi ($\rho = 1,8 \text{ g/ml}$) ga qanday massada (g) oltingugurt (VI)-oksid yuttirilganda, eritmada kislotaning massa ulushi 98% ga yetadi?

Yechish: 1) $m_{\text{eritma}} = \rho V = 1,8 \times 139 = 205,2 \text{ g}$



3) $C_{\text{SO}_3} = (98/80) \times 100 = 122,5\%$

4) 91% $24,5 \text{ g} \text{ ---- } 250,2 \text{ g}$

122,5% 98% $7 \text{ g} \text{ ---- } x = 71,5 \text{ g}$

Javob: 71,5

21. (variant-06). Natriy karbonatning 20% li 500 g eritmasiga necha gramm $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ qo'shilsa, natriy karbonatning massa ulushi 12% ga teng bo'ladi?



1) $m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 500 \times 0,2 = 100 \text{ g}$

2) reaksiya uchun n mol Na_2CO_3 va n mol $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ sarf bo'ladi, n mol CaCO_3 cho'kadi, deb faraz qilamiz. Bunda:

$$0,12 = (100 - n106) / (500 + 219n - 100n)$$

$$0,12 = (500 + 119n) / 100 - 106n$$

$$60 + 14,28n = 100 - 106n$$

$$106n + 14,28n = 100 - 60$$

$$120,28n-40$$

$$n=0,333$$

$$3) m_{CaCl_2 \cdot 4H_2O} = 0,333 \times 219 = 73 \text{ g}$$

Javob: 73

22. (variant-06). Ikki valentli metall gidridi 420,75 g suvda eritilganda 2,24 l (n.sh.) gaz modda ajralib, 2,0% li eritma hosil bo'ldi. Qaysi metall gidridi ishlatilgan?

Yechish: 1-usul:

1) 2% li eritmada 2g modda va 98 g suv bor.



$$36 \text{ g} \text{-----} 44,8 \text{ l}$$

$$x \text{ g} \text{-----} 2,24 \text{ l}$$

$$x = 1,8 \text{ g suv}$$

$$2) 420,75 - 1,8 = 418,95 \text{ g suv}$$

$$3) 418,95 \text{ g} \text{-----} 98\%$$

$$x \text{-----} 2\%$$

$$x = 8,55 \text{ g Me(OH)}_2$$

$$4) 8,55 \text{ g Me(OH)}_2 \text{-----} 2,24 \text{ l H}_2$$

$$x \text{-----} 44,8 \text{ l}$$

$$x = 171 \text{ g}$$

$$5) M_{Me(OH)_2} = 171 \text{ bundan } Me = 171 - (OH)_2 = 171 - 34 = 137$$

ikki valentli va og'irligi 137 bo'lgan metall bariy.

Javob: Ba, 137

2-usul:

$$1) n = 2,24 / 22,4 = 0,1 \text{ mol H}_2$$

$$2) 1 \text{ mol MeH}_2 \text{-----} 2 \text{ mol H}_2$$

$$x \text{-----} 0,1 \text{ mol}$$

$$x = 0,05 \text{ mol MeH}_2$$

$$3) 0,02 = [0,05(Me + 34)] / [0,05(Me + 2) + 420,75 - 0,1]$$

$$0,02[0,05(Me + 2) + 420,65] = 0,05Me + 1,7$$

$$0,02(0,05Me + 0,1 + 420,65) = 0,05Me + 1,7$$

$$0,001Me + 8,415 = 0,05Me + 1,7$$

$$0,05Me - 0,001Me = 8,415 - 1,7$$

$$0,049Me = 6,725$$

$$Me = 137 \text{ (Ba)}$$

Javob: Ba, 137

23. (variant-06). 2,4 g ishqoriy metall oksidi 93,6 g suvda eritilganda hosil bo'lgan birikmaning massa ulushi 4% ni tashkil qilsa, reaksiyaga olingan metallni aniqlang.



Yechish: $\text{Me}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MeOH}$

$$\begin{aligned} 1) \text{C} &= 4\% \text{ yoki } \omega = 0,04 & 0,04 &= x / (2,4 + 93,6) \\ & & 0,04 &= x / 96 \\ & & x &= 3,84 \text{ g MeOH} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{Me}_2\text{O} &\text{-----} 2\text{MeOH} \\ 2\text{Me} + 16 &\text{----} 2\text{Me} + 34 \\ 2,4 \text{ g} &\text{-----} 3,84 \text{ g} \end{aligned}$$

bundan tenglama tuzamiz:

$$2,4(2\text{Me} + 34) = 3,84(2\text{Me} + 16)$$

$$4,8\text{Me} + 81,6 = 7,68\text{Me} + 61,44$$

$$7,68\text{Me} - 4,8\text{Me} = 81,6 - 61,44$$

$$2,88\text{Me} = 20,16$$

$$\text{Me} = 7 \text{ (Li)}$$

Javob: litiy

24.(variant-06). Natriy gidrokarbonat va natriy karbonatdan iborat 38 g aralashmani to'la neytrallash uchun 40% li ($\rho = 1,3 \text{ g/ml}$) sulfat kislotadan 56,6 ml sarflansa, hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) hisoblang.

Yechish: 1) $m_{\text{kislotasi}} = (40 - 1,3 \cdot 56,6) / 100 = 29,43 \text{ g}$

$$\begin{aligned} 2) 2\text{NaHCO}_3 &\text{----} \text{H}_2\text{SO}_4 \\ 168 \text{ g} &\text{-----} 98 \text{ g} \\ x &\text{-----} m & x &= 106m / 98 = 1,71m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{Na}_2\text{CO}_3 &\text{----} \text{H}_2\text{SO}_4 \\ 106 \text{ g} &\text{-----} 98 \text{ g} \\ (38 - x) &\text{-----} (29,43 - m) \end{aligned}$$

bundan tenglama tuzamiz:

$$98(38 - x) = 106(29,43 - m)$$

$$98(38 - 1,71m) = 106(29,43 - m)$$

$$3724 - 167,58m = 3119,58 - 106m$$

$$61,58m = 604,42; \quad m = 9,82 \text{ g H}_2\text{SO}_4$$

$$x = 1,71 \times 9,82 = 16,78 \text{ g NaHCO}_3$$

$$4) 38 - 16,78 = 21,22 \text{ g Na}_2\text{CO}_3$$

$$5) 168 \text{ g} \text{-----} 142 \text{ g}$$

$$16,78 \text{ g} \text{---} x = 14,2 \text{ g Na}_2\text{SO}_4$$

$$6) 106 \text{ g} \text{----} 142 \text{ g}$$

$$21,22 \text{ g} \text{---} x = 28,43 \text{ g Na}_2\text{SO}_4$$





$$7) 14,2 + 28,43 = 42,63 \text{ g Na}_2\text{SO}_4$$




$$8) m_{\text{eritma}} = \rho \cdot V = 1,3 \cdot 56,6 = 73,58 \text{ g}$$






$$9) m_{\text{eritma}} = 73,58 + 38 \text{ g aral} = 111,58 \text{ g}$$

$$10) 168 \text{ g} \text{-----} 88 \text{ g}$$

$$16,78 \text{ g} \text{---} x = 8,8 \text{ g CO}_2$$

**Hg va birikmalari reaksiyalari****Al va birikmalari reaksiyalari****Mn va KMnO4 reaksiyalari**

**Cr va K, Cr₂O₃, reaksiyalari****N va HNO₃, reaksiyalari****S va H₂SO₄, reaksiyalari**

**Cl va birikmalari reaksiyalari****Sn va birikmalari reaksiyalari**

KIMYODAN MASALALAR YECHISHDA ISHLATILADIGAN ENG MUHIM ATAMALAR, MODDALAR NOMI VA ULARNING FORMULALARI

A	Alebastr	$\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$
	Alyuminiyli achchiqtosh	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$
	Adipin kislota	$\text{COOH}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$
	Akril kislota	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$
	Akrilonitril	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$
	Alunit	$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot x\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot y\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot z\text{H}_2\text{O}$
	Alyuminiy karbid	Al_4C_3
	Ammiak	NH_3
	Ammoniy ioni	NH_4^+
	Ammoniy karbid	$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2$
	Ammoniy dixromat	$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
	Ammosfos	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4, \text{NH}_4\text{HPO}_4$
	Anilin	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$
	Antifriz	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
	Arsenat kislota	H_3AsO_4
	Argentit (kumush yaltirog'i)	Ag_2S
	Asbest	$\text{CaO} \cdot 3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2$
	Aspirin	$\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$
	Aseton	$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$
	Asetat Na	CH_3COONa
	Asetilen	$\text{CH}=\text{CH}$
	Atirgul hidli spirt	Feniletil spirt $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
	Azot (I)-oksid	N_2O
	Azot (II)-oksid	NO
	Azot (III)-oksid	N_2O_3
	Azot (IV)-oksid	NO_2
	Azot (V)-oksid	N_2O_5
B	Bariy xlorid	BaCl_2
	Bariy nitrat	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
	Bariy gidroksid	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
	Bakelit	Fenol formaldegid smola
	Benzol	C_6H_6
	Bertole tuzi (kaliy xlorat)	KClO_3
	Bo'r (marmar, ohaktosh)	CaCO_3
	Butan	C_4H_{10}



	Boksit	$Al_2O_3 \cdot nH_2O$
	Borat kislota	H_2BO_3
	Braunit (marganes (III)-oksid)	Mn_2O_3
	Bromid kislota	HBr
	Bromat kislota	$HBrO_3$
V	Vanadat kislota	HVO_3
	Vodorod sulfid	H_2S
	Vodorod xlorid	HCl
	Vodorod peroksid	H_2O_2
	Vinil radikali	$CH_2=CH-$
	Volframat kislota	H_2WO_4
	Vitamin B ₁₂	$C_{63}H_{90}O_{14}N_{14}PCo$
G	Galogenlar	F, Cl, Br, J, At
	Gausmanit	Mn_3O_4 yoki Mn_2MnO_4
	Galenit (qo'rg'oshin yaltirog'i)	PbS
	Galmey (rux karbonat)	$ZnCO_3$
	Gematit	Fe_2O_3
	Geptan	C_7H_{16}
	Geksan	C_6H_{14}
	Geran (yorongul) hidli efir	Difenil efir $C_6H_5-O-C_6H_5$
	Gerbitsid	Begona o'tlarga qarshi vosita
	Gemoglobin (qonda)	$(C_{738}H_{1166}O_{288}N_{283}S_2Fe)_4$
	Germanat kislota	H_2GeO_4
	Gipoxlorit kislota	$HClO$
	Gipofosfit kislota	H_3PO_3
	Gipobromid kislota	$HBrO$
	Gipoyodid kislota	HJO
	Gips	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
	Gidroksoniy ioni	H_3O^+
	Gidroksil ioni	$-OH$
	Gidridlar	vodorodli birikmalar NaH, KH
	Gidroxinon	para-dioksi benzol $C_6H_4(OH)_2$
	Glitserin	$CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH)$
	Glyukoza	$C_6H_{12}O_6$
	Glauberit	$Na_2SO_4 \cdot CaSO_4$
	Glauber tuzi	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
	Glikogen	$(C_6H_{10}O_5)_n$
	Glikokol k-ta yoki oksisirka k-ta	$HO-CH_2-COOH$
	Glikol	etilenglikol $C_2H_4(OH)_2$

	Glinozem (alyuminiy oksid)	Al_2O_3
D	Divinil	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$
	Dolomit	$\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$
	Dixromat kislota	$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
E	Etilen (Gollandiyalik kimyogarlar yog'i)	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$
I	Is gazi	CO
	Ichimlik soda	NaHCO_3
	Izopren	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$
	Insektitsid (benzol hosilalari)	Hasharotlarga qarshi vosita
	Insulin	$\text{C}_{254}\text{H}_{377}\text{N}_{65}\text{O}_{75}\text{S}_6$
Y	Yodid kislota	HJ
	Yodat kislota	HJO_3
	Yodoform	CHJ_3
K	Kaliy permanganat	KMnO_4
	Kaliy manganat	K_2MnO_4
	Kaliy dixromat	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
	Kaliy karbonat (potash)	K_2CO_3
	Kaliy xlorid	KCl
	Kaliy xlorat (Bertole tuzi)	KClO_3
	Kaliy gipoxlorit	KClO
	Kaliy nitrat (kaliyli selitra)	KNO_3
	Karbamid (mochevina)	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
	Kalsiy karbid	CaC_2
	Kapron	poliamid $(-\text{NH}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}-)_n$
	Karbonat anhidrid	CO_2
	Karbonat kislota	H_2CO_3
	Karborund	SiC
	Karbonil gruppasi	-CO-
	Karboksil gruppasi	-COOH
	Karnallit	$\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
	Kauchuk (tabiiy) M=15000-500000	$(-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$
	Kaustik soda	NaOH
	Keton gruppasi	-C=O
	Kinovar	HgS
	Korund	Al_2O_3 kristallari
	Kolchedan temirli	FeS_2
	Kolchedan misli	CuFeS_2
	Kolloksilin -dinitrosellyuloza	$[(\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2)(\text{OH})(\text{ONO}_2)]_n$



Kollodiy	(dinitrosellyuloza + (spirt-efir)- bug'latish
Kumush nitrat	AgNO_3
Kumol (izopropil benzol)	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$
Kuprit	Cu_2O
Kuydirilgan ohak	CaO
Kraxmal	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$
Kristall soda	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
Kristobalit	Kubik strukturali SiO_2
Krezol	Oksitoluol $\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3(\text{OH})$
Ksilol	dimetilbenzol $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$
Kvarts	Geksagonal strukturali SiO_2
L Lavsan - poliefir	$(\text{-CO-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-})_n$
Linol kislota	$\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$
Linolen kislota	$\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{COOH}$
M Marganes (IV)-oksid (pirolyuzit)	MnO_2
Magnezit	MgCO_3
Magnetit	Fe_3O_4
Magniy kuporosi	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
Manganat kislota	H_2MnO_4
Malaxit	$[\text{Cu}(\text{OH})]_2\text{CO}_3$
Malon kislota	$\text{HOOC-CH}_2\text{-COOH}$
Malein kislota	HOOC-CH=CH-COOH
Marmar (bo'r, ohaktosh)	$\cdot \text{CaCO}_3$
Metan	CH_4
Metil radikali	-CH_3
Metafosfat kislota	HPO_3
Metafosfit kislota	HPO_2
Metakril kislota	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOH}$
Metakrilat	$\text{CH}_2=\text{CH-COOCH}_3$
Metilmetakrilat	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-COOCH}_3$
Mis kuporosi	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Mis yaltirog'i (xalkozin)	Cu_2S
Mochevina (karbamid)	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
N Natriy peroksid	Na_2O_2
Natriy oksid	Na_2O
Nitrat kislota	HNO_3
Nitrit kislota	HNO_2
Nikotin kislota	$\beta\text{-piridin karbon kislota}$ $\text{C}_5\text{H}_4\text{N-COOH}$

O	Ortofosfat kislota	H_3PO_4
	Ortomanganit kislota	H_2MnO_4
	Ortotitan kislota	H_4TiO_4
	Ozon	O_3
	Oksalat kislota	$HOOC-COOH$
	Oleum	$H_2S_2O_7$, yoki $H_2SO_4 \cdot SO_3$
	Olein kislota	$C_{18}H_{34}O_2$ yoki $C_{17}H_{33}COOH$
	Oktan	C_8H_{18}
	Osh tuzi	$NaCl$
	Ohaktosh	$CaCO_3$
	Ohakli suv	$Ca(OH)_2$
	Ohak so'ndirilgan	$Ca(OH)_2$
	Ohak so'ndirilmagan	CaO
P	Palmitin kislota	$C_{16}H_{32}O_2$ yoki $C_{15}H_{31}COOH$
	Perxlorat kislota	$HClO_4$
	Peryodat kislota	HJO_4
	Permanganat kislota	$HMnO_4$
	Pentan	C_5H_{12}
	Pestisid	O'simlik va hayvon mikroorganizmlariga qarshi vosita
	Pirt (temir kolchedani)	FeS_2
	Pikrin kislota	$C_6H_5(OH)(NO_2)_3$
	Piperazin	$NH-(CH_2)_4-NH$
	Piperidin	$C_5H_{11}N$
	Piridin	C_5H_5N
	Pirogallol	$C_6H_2(OH)_3$
	Pirokatexin	orto-dioksi-benzol $C_6H_4(OH)_2$
	Pirosulfat kislota	$H_2S_2O_7$
	Pirrol	C_4H_5N
	Pirrolodin	C_4H_9N
	Piron	$C_6H_4O_3$
	Pirofosfat kislota	$H_4P_2O_7$
	Piroksilin (trinitrosellyuloza)- (tutunsiz porox)	$[(C_6H_4O_2)(ONO_2)_3]_n$
	Pirollyuzit (marganes (IV)-oksid)	MnO_2
	Plyumbat kislota	H_2PbO_4
	Polistirol	$(-CH_2-\dot{C}H(C_6H_5)-)_n$
	Polietilen	$(-CH_2-CH_2-)_n$
	Potasir	K_2CO_3
	Presipitat	$CaH_2O_4 \cdot 2H_2O$



	Propan	C_3H_8
R	Rux aldamasi	ZnS
	Rodanid kislota	HSCN
S	Selitra ammoniyli	NH_4NO_3
	Selitra kaliyli	KNO_3
	Selitra natriyli	$NaNO_3$
	Selitra (Chili)	$NaNO_3$
	Selenid kislota	H_2Se
	Selenat kislota	H_2SeO_4
	Sementit	Fe_3C
	Scolit (molekulyar elak)	$M_1M_2(Al + SiO_2)_n \cdot H_2O$
	Sariq qon tuzi	$K_4[Fe(CN)_6]$
	Salitsil kislota	$C_6H_4(OH)COOH$
	siklopropan	$(CH_2)_3$
	Silan	SiH_4
	Silikat kislota	H_2SiO_3
	Silvinit	$KCl \cdot NaCl$
	Siderit	$FeCO_3$
	Sirka kislota	CH_3COOH
	Sirka aldegid	CH_3COH
	Sinka	$Na_2Al_2S_2O_7$
	Sigler-Natt katalizatori	$TiCl_4 \cdot Al(CH_3)_3$
	Sulfat kislota (kimyo sanoati noni)	H_2SO_4
	Sulfit kislota	H_2SO_3
	Sulfid kislota	H_2S
	Sulfat anhidrid	SO_3
	Sulfit anhidrid	SO_2
	Sulema	$HgCl_2$
	Superfosfat oddiy	$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O$ tarkibida 5% $CaSO_4$ bor
	Superfosfat qo'sh	$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O$ + qisman H_2PO_4
	Suyak uni	$Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaCO_3$
	Soda	Na_2CO_3
	So'ndirilmagan ohak	CaO
	Stirol	$CH_2=CH(C_6H_5)$
	Stearin kislota	$C_{18}H_{36}O_2$ yoki $C_{17}H_{35}COOH$
	Sellyuloid	Dinitrosellyuloza + kamfara
	Sut shakari	$C_{12}H_{22}O_{11}$ laktoza

	Selenit kislota	H_2SeO_3
	Silan	SiH_4
	Siloksan	$(SiH_3)_2O, (Si_2H_5)_2O$
	Sianid kislota	HCN
T	Talk	$3 Mg \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$
	Taxir tuz	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$
	Temir kuyindisi	Fe_3O_4
	Tellurat kislota	H_2TeO_4
	Temir kuporosi	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$
	Teflon (tetraftoretilen)	$CF_2=CF_2$
	Tereftal kislota	$HOOC-C_6H_4-COOH$
	Tetraborat kislota	$H_2B_4O_7$
	Titan kislota	H_2TiO_3
	Tridimit	Geksagonal strukturali SiO_2
	Trotil	$C_6H_5(CH_3)(NO_2)_3$
	Tiosulfit kislota	$H_2S_2O_3$
	Tiosulfat kislota	$H_2S_2O_4$
	Toluol	$C_6H_5-CH_3$
U	Uglerod tetraxlorid	CCl_4
F	Fosfat kislota	H_3PO_4
	Fosfit kislota	H_3PO_3
	Fosforit uni	$Ca_3(PO_4)_2$
		$CaCO_3 + Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$
	Fruktoza	$C_6H_{12}O_6$
	Fosfin	PH_3
	Formaldegid	$HCOH$
	Formalin	$HCOH + H_2O$
	Fotogen	kerosin
	Fenol (karbol kislota)	C_6H_5-OH
	Fenil radikal	$-C_6H_5$
	Fenoplast	Fenol formaldegid smola
	Fenoksisirka kislota	$C_6H_5-O-CH_2-COOH$
	Ftal kislota	$HOOC-C_6H_4-COOH$
	Ftorid kislota (plavik)	HF
	Fungitsid	Zamburug'lar tarqatadigan kasalliklarga qarshi vosita
X	Xalkozin (mis yaltirog'i)	Cu_2S
	Xalkopirit (mis kolchedani)	$CuFeS_2$
	Xlorid kislota	HCl
	Xlorat kislota	$HClO_3$



Xlorit kislota	HClO_2
Xlorli ohak	$\text{CaCl}_2 - \text{Ca}(\text{OCl})_2$, yoki $\text{CaCl}(\text{OCl})$
Xloroform	CHCl_3
Xlorsirka kislota	$\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{COOH}$
Xromat kislota	H_2CrO_4
Xromit k-ta	HCrO_3
Xlorazid	ClN_3
Xloral	CCl_3-CHO
Xlorofill	$\text{C}_{55}\text{H}_{72}\text{O}_6\text{N}_4\text{Mg}$ yoki $\text{C}_{55}\text{H}_{70}\text{O}_6\text{N}_4\text{Mg}$ CCl_3-NO_2
Xlorpikrin	$\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
Xrom kaliyli achchiqtosh	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Xrompik	NaHCO_3
Ch Choy sodasi (ichimlik soda)	HCOOH
Chumoli kislota	HCOH
Chumoli aldegid	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$
Sh Shisha	$\text{K}_2\text{CO}_3 - \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$
Shisha (qiyin suyuqlanadigan)	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{PbO} \cdot 6\text{SiO}_2$
Shisha billur	$\text{Au}-\text{HNO}_3 \cdot 3\text{HCl}$
Shoh arog'i (zar suvi)	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$
Shakar (saxaroza)	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
E Etilenglikol (antifriz)	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$
Etilen	NaOH
O' O'yuvchi Na	KOH
O'yuvchi K	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
Q Qizil qon tuzi	$\text{KNO}_3 \cdot \text{CS}$
Qora porox	H_2SnO_3
Qalay kislota (α -, β -)	PbS
Qo'rg'oshin yaltirog'i	Pb_3O_4
Qo'rg'oshin oksid (surik)	$2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$, belila
Qo'rg'oshin gidrosikarbonat	

MUNDARIJA

So'z boshi	3
I bob. Kimyo fani va uning predmeti	4
II bob. Kimyoning asosiy tushunchalari	7
II. 1. Modda haqida tushuncha	7
II. 2. Atom va molekulyar massa	11
II. 3. Kimyoviy formula va kimyoviy tenglamalar	15
II. 4. Valentlik	17
II. 5. Kimyoviy reaksiyalar va ularning turlari	18
III bob. Oddiy moddalar	23
IV bob. Murakkab moddalar	25
IV. 1. Oksidlar	25
IV. 2. Gidroksidlar	30
IV. 3. Kislotalar	34
IV. 4. Tuzlar	36
V bob. Kimyoning asosiy miqdoriy (stexiometrik) qonunlari	43
V. 1. Moddalar massasining saqlanish qonuni	43
V. 2. Tarkibning doimiylik qonuni	46
V. 3. Avagadro qonuni	47
V. 4. Ekvivalentlar qonuni	50
VI bob. Atom tuzilishi	53
VI. 1. Atomning tarkibi	54
VI. 2. Izotop va izobaralar	56
VI. 3. Yadro reaksiyalari	57
VI. 4. Atomning elektron tuzilishi	59
VI. 5. Kvant sonlari	62
VI. 6. Elektron qavatlarining elektronlar bilan to'lib borishi. Elektron formulalar	65
VII bob. D. Mendeleev davriy qonuni va elementlar davriy jadvali....	70
VII. 1. Atomlarning xossalari va ularning o'zgarishi	73
VIII bob. Kimyoviy bog'lanish va uning asosiy turlari	78
VIII. 1. Kimyoviy bog'ning asosiy tavsiflari	78
VIII. 2. Kovalent bog'lanish	79
VIII. 3. Molekulalararo ta'sir turlari	85

VIII. 4. Donor-akseptor bog'lanish	86
VIII. 5. Vodorod bog'lanish	87
VIII. 6. Atom orbitallarining gidridlanishi	88
VIII. 7. Ion bog'lanish	90
VIII. 8. Metall bog'lanish	91
IX bob. Moddalarning agregat holatlari	93
IX. 1. Gazsimon holat	95
IX. 2. Moddalarning suyuq holati	96
IX. 3. Moddalarning qattiq holati	98
IX. 4. Suyuq kristallar	101
X bob. Kimyoviy jarayonlar energetikasi	101
X. 1. Sistema haqida tushuncha	102
X. 2. Ichki energiya va entalpiya tushunchalari	104
X. 3. Entropiya haqida tushuncha	104
X. 4. Izobar-izotermik potensial haqida tushuncha	106
X. 5. Termokimyoviy hisoblashlarga doir masalalar	108
XI bob. Kimyoviy reaksiyalar kinetikasi	108
XI. 1. Kimyoviy reaksiya tezligi	112
XI. 2. Reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar	114
XI. 3. Reaksiyalarning faollanish energiyalari	116
XI. 4. Katalizatorning ta'siri. Katalitik reaksiyalar	118
XI. 5. Kimyoviy reaksiyalarning mexanizmlari bo'yicha turlari	120
XI. 6. Kimyoviy reaksiya tezligiga doir masalalar yechish	123
XI. 7. Kimyoviy muvozanat	126
XI. 8. Kimyoviy muvozanatning siljishi. Le-Shatele prinsipi	130
XII bob. Dispers sistemalar. Eritmalar	130
XII. 1. Dispers sistemalar va ularning turlari	132
XII. 2. Chin eritmalar	134
XII. 3. Eritmalarning hosil bo'lishi	137
XII. 4. Moddalarning eruvchanligi	139
XII. 5. Eritmalarning konsentratsiyalarini ifodalash usullari	148
XIII bob. Elektrolitlar eritmalar	148
XIII. 1. Elektrolitlar eritmalarining turlari	148

XIII. 2. Dissotsilanish darajasi va dissotsilanish doimiysi	150
XIII. 3. Ion almashinish reaksiyalari	153
XIII. 4. Kislotalar, gidroksidlar va tuzlarning dissotsilanishi	156
XIII. 5. Suvning ion ko'paytmasi. pH haqida tushuncha	157
XIII. 6. Indikatorlar haqida tushuncha	160
XIII. 7. Tuzlarning gidrolizi	161
XIV bob. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari	167
XIV. 1. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari	168
XIV. 2. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish	170
XIV. 3. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari turlari	173
XV bob. Elektrokimyoviy jarayonlar	176
XV. 1. Oksidlanish potentsiali haqida tushuncha	176
XV. 2. Metallarning kuchlanishlar qatori	179
XV. 3. Galvanik elementlar	180
XV. 4. Elektroliz	183
XVI bob. Metallmaslar	190
XVI. 1. Metallmaslar to'g'risida ma'lumot	190
XVI. 2. Vodorod (H, Z = 1)	192
XVI. 3. Kislorod (O, Z = 8)	196
XVI. 4. Suv (H ₂ O)	199
XVI. 5. Suvning qattiqligi va uni yo'qotish usullari	203
XVI. 6. Vodorod peroksid	206
XVI. 7. Inert gazlar yoki VIII A gruppacha elementlari	208
XVII bob. VA gruppacha elementlari	214
XVII. 1. VA gruppacha elementlarining umumiy xossalari	214
XVII. 2. Azot	215
XVII. 3. Azot kislotalari va ularning tuzlari	221
XVII. 4. Fosfor (P, Z = 15)	225
XVII. 5. Fosfat kislota tuzlari	228
XVIII bob. Mineral o'g'itlar	232
XVIII. 1. O'g'itlar klassifikatsiyasi	232
XVIII. 2. Azotli o'g'itlar	233
XVIII. 3. Fosforli o'g'itlar	234



VIII. 4. Kaliyli o'g'itlar	235
IX bob. VI A gruppacha elementlari	236
IX 1. VI A gruppacha elementlarining umumiy xossalari	237
IX 2. Oltingugurt	237
IX 3. Vodorod sulfid	239
IX 4. Oltingugurt (IV) birikmalari	242
IX 5. Oltingugurt (VI) birikmalari	243
IX 6. Sulfat kislota	243
X bob. VII A gruppacha elementlari	246
X 1. VII A gruppacha elementlarining umumiy xossalari	247
X 2. Ftor va uning birikmalari	248
X 3. Xlor va uning birikmalari	250
XI bob. Metallar	259
XI 1. Metallarning umumiy xossalari	259
XI 2. Qotishmalar	262
XI 3. Metallarni olish. Metallurgiya haqida tushuncha	263
XI 4. Metallar korroziyasi	265
XI 5. Korroziyadan himoyalash usullari	269
XI 6. Lantanoidlar va ularning birikmalari	271
XI 7. Aktinoidlar va ularning birikmalari	274
XII bob. I A gruppacha elementlari	276
XII 1. Umumiy xossalari	276
XII 2. Litiy (Li)	277
XII 3. Natriy va kaliy	278
XIII bob. II A gruppacha elementlari	284
XIII 1. Umumiy xossalari	284
XIII 2. Berilliy va uning birikmalari ($Z=4$)	284
XIII 3. Magniy va kalsiy	285
XXIV bob. III A gruppacha elementlari	290
XXIV 1. Umumiy xossalari	290
XXIV 2. Bor va uning birikmalari	290
XXIV 3. Alyuminiy	294
XXV bob. Ayrim qo'shimcha gruppacha metallari	299
XXV 1. Xrom va uning birikmalari	299
XXV 2. Temir va uning birikmalari	304
XXV 3. Cho'yan ishlab chiqarish	309

XXV. 4. Po'lat ishlab chiqarish	311
XXVI bob. IV A gruppacha elementlari	311
XXVI. 1. Umumiy xossalari	311
XXVI. 2. Uglarod	314
XXVI. 3. Karbidlar	316
XXVI. 4. Uglarodning kislorodli birikmalari	318
XXVI. 5. Kremniy	323
XXVI. 6. Kremniy kislotalari	325
XXVI. 7. Germaniy, qalay, qo'rg'oshin	329
XXVII bob. Kompleks birikmalar	331
XXVII. 1. Kompleks birikmalar haqida tushuncha	331
XXVII. 2. Kompleks birikmalar nomenklaturasi	334
XXVII. 3. Kompleks birikmalarning hosil bo'lishini tushuntiruvchi nazariyalar	335
XXVII. 4. Kompleks birikmalarning barqarorligi	338
XXVIII bob. Organik kimyo	340
XXVIII. 1. Organik moddalarning tuzilish nazariyasi	341
XXVIII. 2. Organik moddalarning turlari	347
XXVIII. 3. Organik moddalar ishtirokida boradigan reaksiyalar	348
XXIX bob. Uglevodorodlar	351
XXIX. 1. To'yingan uglevodorodlar	351
XXIX. 2. Tsikloalkanlar	363
XXIX. 3. To'yinmagan uglevodorodlar	368
XXIX. 4. Atsetilen va uning gomologik qatori	381
XXIX. 5. Diyen uglevodorodlar	387
XXIX. 6. Tabiiy va sintetik kauchuklar	391
XXIX. 7. Aromatik uglevodorodlar	395
XXX bob. Uglevodorodlarning tabiiy manhalari	404
XXX. 1. Neft va neftni qayta ishlash	404
XXX. 2. Tabiiy gaz va uni qayta ishlash	408
XXX. 3. Toshko'mirni qayta ishlash	409
XXXI bob. Kislorodli organik birikmalar. Spirtlar	410
XXXI. 1. Bir atomli to'yingan spirtlar	410
XXXI. 2. Ikki atomli spirtlar (diollar yoki glikollar)	416
XXXI. 3. Uch atomli spirtlar (triollar). Glitserin	419
XXXI. 4. Fenollar	421

607

Abdulxayeva Maxsuda Muxamadjonovna

KIMYO

Oliy o'quv yurtiga kiruvchilar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun o'quv qo'llanma

"TIB-KITOB" nashriyoti, Toshkent sh. Shiroq k. 100 uy.

Muharrir **M. Mirkomilov**

Musahhih **U. Safarov**

Badiiy muharrir **Kan Artur**

Kompyuterda tayyorlovchi **E. Hojiqulov**

Bosishga 14.04.2011 y. ruxsat etildi. Qog'oz bichimi 84x108¹/₃₂
Hisob-nashr tabog'i 38,0. Adadi 1500 nusxa.
Shartnoma № 1/03. Buyurtma № 114.

"SHAMS-ASA" MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

100097, Toshkent sh., Bunyodkor shox ko'chasi, 28 uy.

Mazkur qo'llanma "Zehn-Shans" nodavlat ta'lim muassasasi va
"Universal Tadqiqodchi" MCHJ hamkorligida nashrga tayyorlandi.

Oliy o'quv yurtlariga tayyorgarlik bo'yicha murojaat
qiling: Toshkent sh., Yunusobod tum., 2-mavze, 14 a uy
"ZEHN-SHANS" Nodavlat Ta'lim Muassasasi
Tel: +99871-221-35-56, +99871-221-86-09

Ushbu kitobni sotib olish bo'yicha murojaat qiling:

Beruniy shox bekatidagi kitoblar do'koni.

Tel.: +99897-119-18-73, +99871-246-66-72

(To'lov kelishilgan narxda va siz istagan shaklda).

Anionen	OH ⁻	F ⁻	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃

[illegible]

© 2000 The McGraw-Hill Companies

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Abstract