


54
A 94

Q.M. AHMEDOV, S.V. TUROBJONOV
S.Y. SAPAROV

UMUMIY VA ANORGANIK KIMYODAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI




Q.M. AHMEROV, S.M. TUROBJONOV

S.Y. SAPAROV

**UMUMIY VA ANORGANIK
KIMYODAN
LABOROTORIYA
MASHG'ULOTLARI**

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim
vazirligi kimyoviy texnologiya, oziq-ovqat texnologiyasi va boshqa
yo'nalishlarda o'qiydigan bakalavriat talabalari uchun o'quv
qo'llanma sifatida tavsiya etgan*

TOSKENT "O'ZBEKISTON" 2019



Taqri zchilar: prof. **Otaqo'ziyev T.A.** – t.f.d., TKTI
«Noorganik moddalar texnologiyasi» kafedresi professori.

dos. **Turg'unov E.A.** – O'zMU «Noorganik kimyo» kafedresi
dostenti.

Mazkur o'quv qo'llanma texnika oliy o'quv yurtlarining kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo'yicha), oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) va turdosh yo'nalishlarda bilim oladigan talabalarga mo'ljallangan. Qo'llanma yangi avlod o'quv adabiyotlariga qo'yilgan talablar asosida yozilgan bo'lib, unda umumiy va anorganik kimyo fanining nazriy qonun-qoidalari, kimyoviy elementlar davriy sistemasining zamonaviy tahlili, amaliy savollar, testlar, masala-misollar va kimyo asoslarini mustaqil o'rganish bo'yicha yo'llanmalar keltirilgan.

SO'Z BOSHI

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va kadrlar tayyorlash Milliy dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib xamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20-apreldagi va 27-iyuldagi PQ-2909-sonli xamda PQ-3151-sonli Qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim o'quv jarayonini zamonaviy yangi avlod o'quv adabiyotlari bilan to'ldirishga ahamiyat berilmoqda. Shu munosabat asosida mualliflardan S.S.Saparov, Q.M.Axmerov va S.M.Turobjonovlar tomonidan lotin alifbosida tayyorlangan mazkur o'quv qo'llanma yuqorida aytilgan adabiyotlar sirasiga kiradi. Kitobning birinchi nashri bosilib chiqqaniga o'n ikki yil bo'ldi. O'tgan vaqt ichida kimyo fanida ko'plab yangiliklar ochildi, yirik korxona, ilmiy taqiqot institutlari, tadbirkorlik ishlari ruvojlantirildi, yuzlab xar xil yangi maxsulotlar chiqarila boshladi. eng muhim, ilg'or mamlakatlarda erishilgan fan yutuqlari, ayniqsa, UNESCO tasdiqlagan programmaga asoslangan o'quv qo'llanman bu yangi avlodi o'z ichiga qator izchil bilimlar bioneorganik birikmalar, kimyoviy elementlar jadvalidagi 109 ta element o'rniga 118 ta element joylashtirildi, sintez qilingan yana o'nga yaqin elementlar o'z o'rinlarini kutmoqda, texnologiya asoslari va nanokimyo yangiliklari, diagramma va jadvallar orqali berildi. Bu talabalar bilim-larini chuqurlashtirishda, auditoriyada va mustaqil ishlashlarini bajarishlarida amaliy yordam beradi. Mazkur holat o'qitishning reyting usulidan va test nazoratidan foy-dalanib, umumiy kimyo asoslarini singdirishda juda qo'l keladi. Mazkur o'quv qo'llanma oliy texnika o'quv yurtlarining kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo'yicha), oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) va turli yo'nalishlarda bilim olayotgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, unda umumiy va anorganik kimyo fanidan nazariy qonun-qoidalar, laboratoriy mashg'ulotlari, testlar, masala-mashqlar va mustaqil o'rganish uchun ma'lumotlar

keltirilgan.Fikrimiz so'ngida mamlakatimiz kimyogar talabalarning sevikli o'qituvchisi, fanimizning yirik mutaxassisi Respublikamiz F.A.sining akademigi N.A.Parni'ga ushbu o'quv qollanma qo'llanmasini diqqat bilan o'qib,chiqib,bildirilgan tanqitliklar,mulohazalari, maslaxat va ko'rsalmalar uchun o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.

Mualliflar.

KIRISH

Kimyo tabiatni o'rgatuvchi fanlardan biri bo'lib, jismlar, hodisalar, jarayonlar orasidagi bog'liqlikni ma'lum qonuniyatlar asosida tushintirib beradi. Bizni o'rab turgan olam kishi ongiga bog'liq bo'lmagan holda mavjuddir. U xarakatdagi materiyaning turli ko'rinishlarini ifodalanishidan vujudga kelgan fandır.

Butun borliq materiyaning iborat bo'lib, atrofimizni o'rab turadi. Moddalar turli-tuman ko'rinishda dunyodagi cheksiz ko'p ob'ekt va sistemalar holida, har qanday xususiyat, aloqa, munosabat hamda harakatlarning asosi sifatida mavjud bo'ladi. Materiya tabiatda bevosita ko'z bilan ko'riladigan buyum yoki qismlargina emas. balki ilmiy-texnik taraqqiyotning o'sishi orqasida kelajakda aniqlanishi mumkin bo'lgan narsalarni ham o'z ichiga oladi. Atrofimizda ro'y beruvchi hodisa va jarayonlar materiyaning xarakat ko'rinishlaridir.

Materiya qator xususiyatlarga ega bo'lib, dunyoning moddiy birligi ham materiyaning ana shu xususiyatlarida o'z aksini topadi. Materiya xususiyatlari qatoriga uning hech kim tomonidan yaratilmaganligi, yo'qolmasligi, vaqtda abadiy mavjudligi hamda fazoda cheksizligi, strukturalarining bitmas-tuganmasligi kabi kiradi. Materiya harakat shakli turli-tumandir. Jismlarni isitish va sovutish, turlanish, qorning erib suvga aylanishi, suvning muzga o'tishi, kimyoviy energiyaning elektr energiyasiga, ba'zi jarayonlarda ajraluvchi issiqlik energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi, kosmik hodisalar, biologik jarayonlar shular jumlasidandir. Bunday aylanish va o'zgarishlar materiya harakati turli shakllarining birligi va uzluksiz bog'liqligidan dalolat beradi. Harakatning bir shakli ikkinchi shakliga o'tishi tabiatning asosiy qonuni-materiya va uning harakati abadiyligi qonunidan kelib chiqadi.

Kimyo moddalar o'zgarishini o'rganadi. Mazkur sharoitda ma'lum fizik xossalarga ega bo'lgan materiyaning har bir ko'rinishi, masalan, suv, temir, tosh, qum, kislorod, azot va boshqalar kimyoda modda

deyiladi. Alyuminiy kumushrang engil metall bo'lib, zichligi 2,7 g/sm³, yoqlari markazlashgan kub panjarada kristallanadi. 658,60 S da eriydi. 2447 O S da qaynaydi. Bularning hammasi alyuminiyning xarakterli fizik xususliklaridir.

Moddaning fazoda chegaralangan qismi jism deb ataladi. Bu moddaga nisbatan torroq mazmunda ishlatiluvchi tushuncha bo'lib, aniq bir narsani anglatadi. Alyuminiydan yasalgan qoshiq, pichoq, idish, samolyot detallari, sim yoki qurilish buyumlari jismga misol bo'la oladi. Modda iborasi jism tushunchasiga nisbatan umumiydir. Hozirgi vaqtda moddalar to'rt guruhga bo'linib o'rganiladi. Bular elementar zarrachalar, oddiy moddalar, murakkab moddalar (yoki kimyoviy birikmalar) hamda aralashmalar bo'lib, quyidagicha tushuntiriladi.

Elementar zarrachalarga elektron, proton, neytron, pozitron, neytrino, mezon va boshqalar kirib, bular soni 100 dan ortadi. Oddiy modda kimyoviy elementning erkin holda mavjud o'la oladigan turi bo'lib, bunday modda asosan bir elementdan tuzilgan bo'ladi. Ular soni besh yuztaga yaqindir.

LABAROTORIYADA ISHLASH EXTIYOT CHORALARI

Kimyo laboratoriyasida ishlaganda ko'ngilsiz xodisalar ro'y bermasligi uchun kuydagi extiyot choralari qoidalariga amal qilish shart:

1. Laboratoriya xonasiga albatta xalat kiyib kirish kerak bo'ladi.
2. Bajariladigan har bir laboratoriya ishini uyda konspekt qilib, yoddan bilib olish talab qilinadi.
3. Zaxarli va qo'lansa xidli moddalar bilan qilinadigan tajribalarni mo'rili shkaftida bajaring.
4. O'qituvchining ruxsatisiz biror moddaning mazasini tatib ko'rish yoki xidlash, shuningdek, berilgan ishga taa'luqli bo'lmagan boshqa biror ishni qilib ko'rish qat'iyan man etiladi.
5. Moddaning hidini aniqlashda yoki gazlarni hidlab ko'rishda havo oqimini idishdan o'zingiz tomon elpitib ohista hidlang.
6. Kuchli kislotalarni, ayniqsa kontsentrangan sulfat kislotani suyultirishda suvni kislotaga quymasdan, kislotani suvga tomchilatib ohista quyung.

7. Probirkaga biror suyuqlik solib qizdirayotganningizda uning og'zini o'zingizga yoki yoningizda turgan odamga qaratib ushlamang.

8. Efir ,benzin ,spirt, benzol kabi oson o't oluvchi suyuqliklarni o'tga yaqin qo'yib qizdirish yoki ochiq alangada istish mumkin emasligini yodda tuting.

9. Yonuvchi gazlarning havo bilan aralashmasi portlovchi bo'ladi ,shuning uchun vodorod va shunga o'xshash gazlarni yoqishdan oldin ularning tozaligini sinab ko'rish kerak.

10. Simob va uning bug'i zaxarlidir.Shuning uchun u bilan ishlaganda juda ehtiyot bo'lish lozim.

11. Elektr asboblari bilan ishlashda ularning izolyatsiyasiga e'tibor bering.Ular yaxshi izolyatsiyalangan bo'lishi kerak.

12. Ish joingizdan bajaraladigan ish uchun keraksiz buyumlarni (kitob , daftar, portfel shuningdek ortiqcha idish,asbob va reaktivlarni) boshqa, maxsus joyga olib qo'yish lozim.

13. Natriy metalli va boshqa ishqoriy metallar bilan ishlaganda suvdan ehtiyot bo'lish kerak.

14. Qizdirilayotgan eritmaga yoki bug'lanayotgan suyuqliklarga yuzingizni yaqinlashtirmang, yuzingizga sachrashni mumkin.

15. Laboratoriya mashg'uloti tugagach , ish stolini tartibga solish, gaz va vodoprovod jo'mraklarining berkligini hamda elektr asboblarning o'chirilganligini albatta , tekshirishni unutmang.

16. Bajariladigan tajribalarga e'tibor bilan qarash, qunt bilan ishlash. Asboblarda oddiy operatsiyalarni bajarish tartibini va xavfsizlik texnikasi qoidalarni yaxshi bilmaslik baxtsiz hodisalarga sabab b'lishini unutmaslik?

LABORATORIYADA ISHLATILADIGAN IDISHLAR VA ASBOBLAR

Turli kimyoviy tajribalarni bajarishda, maxsus qalin yoki yupqa shishadan yasalgan idishlar temperaturaning o'zgarishiga chidamli va ularda qizdirish bilan bog'liq bo'lgan turli kimyoviy jarayonlar bajariladi. Qalin shishadan yasalgan shishalarni qizdirish yaramaydi. Kimyo laboratoriyalarida ko'p ishlatiladigan idishlar quyidagilardir:



Chinni hovvoncha

• O'lchov - shisha idishlar;



Tigel



Vyurs kolbasi




Konussimon kolba



Tubi yumaloq kolba



Voronka




O'lchov silindrlari



Ajratkich voronka




Eksikator



Probirkalar



Byuretkalar



Pipetkalar

Kislorod olish uchun asbob



Kipp apparati



Haydash uchun asbob



Spirt lampasi



Gorelkalar

Tarozilar va ular dan foydalanish

Tarozi kimyo laboratoriyasining zarur asbobi. Shuning uchun laboratoriyada ishlovchi har qanday tarozini ishlata olishi lozim.

Kimyo laboratoriyalarida odatda, aniq tortish kerak bo'lmagan hollarda ishlatiladigan tarozilar (oddiy tarozilar), *texno-kimyoviy va analitik tarozilar* ishlatiladi.

Oddiy tarozilar 1-2 g ortiq yoki kabi ahamiyatga ega bo'lmagan hollarda ishlatiladi.

Texnik-kimyoviy tarozilar esa 0,01 g aniqlik bilan tortishga imkon beradi. Ular, ko'pincha sintez ishlarida, reaksiya uchun olingan va reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni tortishda ishlatiladi.

Analitik tarozilar esa aniq tortadigan tarozilar bo'lib, ular asosan anali? vaqtida ishlatiladi. Bo'l tarozilarda 0,0001-0,0002 g aniqlik bilan tortish mumkin.



Texnik-kimyoviy tarozi



Analitik tarozi

Texnik-kimyoviy tarozida tortishda quyidagi qoidalar qat'iy amal qilish kerak.

1. Texnik-kimyoviy tarozi buzilgan bo'lsa, uni tuzatish o'z qo'lingizdan kelmasa, darhol o'qituvchi yoki laborantga murojaat qiling.

2. Tarozi pallasiga issiq, xo'l va iflos narsalarni qo'ymang. Suyuqliklar bilan ishlayotganda ularni taroziga va toshlarga hech qachon tomizmang.

3. Tortiladigan moddani hech qachon to'g'ridan-to'g'ri tarozi pallasiga qo'ymang.

4. Tortiladigan moddani tarozining chap pallasiga, toshlarni esa o'ng pallasiga qo'ying.

5. Tortiladigan modda va toshlarni tarozi pallasining o'rtasiga qo'ying.

6. Toshlarni faqat pinset bilan oling va ularni tarozi pallasidan olgandan so'ng g'ilofdagi o'z joyiga qo'ying; toshlarni stolga qo'yish, yaramaydi, chunki ular iflos bo'lishi yoki yo'qolishi mumkin.

7. Moddalarni tortish vaqtida toshlarni boshqa g'ilofdan olmang. Agar narsani muvozanatga keltirish uchun biror tosh yetishmay qolsa, demak, tortish tartibiga rioya qilinmagan bo'ladi.

8. laboratoriya ishida bir xil moddalar ketma-ket tortiladigan bo'lsa, tarozidan va bir g'ilofdagi toshlardan foydalanish kerak.

9. Tortib bo'lganingizdan keyin, tarozida hech narsa qoldirmang.

10. Ish tugallangandan so'ng, tarozi va toshlarni tekshiring hamda tarozini arretirlab qo'ying.

1.0. KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHALARI

1.1. Moddalarning kimyoviy fo'rmulasini tuzish

Modda tarkibining kimyoviy belgilari bilan ifodalanishiga **Kimyoviy fo'rma** deyiladi. Moddaning kimyoviy fo'rmulasi elementlarning valentligiga asosan tuziladi. Masalan, tarkibida besh valentli azot va ikki valentli kislorod bo'lgan binar birikmaning fo'rmulasini tuzish uchun ikkala element valentliklarining eng kichik umumiy ko'paytuvchisini topamiz. Bu 10 ga teng. So'ngra uni azot va kislorodning valentligiga bo'lib, birikmadagi azot atomlari bilan kislorod atomlari sonini topamiz. $10 : 5 = 2$; $10 : 2 = 5$. Demak, birikmaning fo'rmulasi N_2O_5 .

Moddalarning kimyoviy fo'rmulasini almashtirish qoidasiga ($A^m B^n = A_n B_m$) asoslanib ham fo'rma tuzish mumkin. Bu qoidaga muvofiq, ikki elementdan tarkib topgan birikmalarning fo'rmulasini tuzish uchun, avval, elementlarning kimyoviy belgilari ustiga ularning valentligi yozib qo'yiladi, so'ngra birinchi elementning valentlik atomiga, ikkinchi elementning valentlik soni esa birinchi atomiga indeks qilib yoziladi (agar bunda indekslar juft son bo'lsa, ular ixchamlashtiriladi). Masalan:

III II

Al O bo'lgani uchun alyuminiy oksidi fo'rmulasi Al_2O_3 ;


III I

Fe Cl bo'lgani uchun temir (III) xlorid $FeCl_3$;

II II

Cu S bo'lgani uchun mis (II) sulfide CuS ;

Atomlarning o'lkani diametri – 10^{-10} m ya'ni 1^oA(angstrom) atrofida. Masalan: Cl atomi $1.8^oA=0.18nm$ $1nm=10^{-9}m/10$



19,93 · 10⁻²⁷ kg. Absolyut massani topish fo'rmulalari:

a-usuli.

$$A_{\text{absolyutmax}} = \frac{A_r}{N_A}$$

bu yerda: $A_{\text{absolyut mass}}$ - absolyut massa(g,kg)

A - nisbiy atom massa; N_A - Avogadro soni ($6.02 \cdot 10^{23}$ dona).

b-usul.

$$A_{\text{absolyut mas}} = A_r \cdot 1 \text{ m.a.b yoki } A_{\text{absolyut mas}} = A_r \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

tarzida ifodalab, bu yerda $A_{\text{absolyut mas}} = A_r \cdot l.m.a.b$ yoki $A_{\text{absolyut mas}} = A_i$;
 $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ tarzida ifodalab, bu yerda

$A_{\text{absolyut mas}}$ -absolyut massa; $A_{\text{nisbiy atom massa}}$; 1 m.a.b-massa
atom birligi qiymati $1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ ga teng.

Masalalar

1. Mis atomining absolyut massasini toping?


Yechish: **a-usul** mis atomining absolyut massasini topishda fo'rmla asosida misning nisbiy atom massasini Avagadro soniga nisbati orqali topamiz. ga teng **b-usul** bu usulda ikkinchi fo'rmuladan foydalanamiz.

$$A_{\text{absolut maks}} = A_1 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 64 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,063 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \text{ ga teng.}$$

	A_{abs} – absolyut massa	A_r – nisbiy atom massa	I va P	N	Element
1	$51.46 \cdot 10^{-27} \text{ g}$			16	
2				14	Al
3		20	9		
4		23		11	
5	$14.94 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$		4		
6		28	14	14	
7		37			Cl

Nisbiy atom massa (A_r) - element atomi massasini ^{12}C uglerod izotopi atomi massasining 1/12 (o'n ikkidan bir) qismidan necha marta og'irligini ko'rsatuvchi kattalikdir.

Tassavur qilamiz ^{12}C izotopining 1 dona atomini olib teng 12 ta bo'lakga bo'lamiz. O'sha 12 ta bo'lakdan 1 donasi bu - 1 m.a.b ning qiymatidir.



$$^{12}\text{C} \text{ ning } 1/12 \text{ og'irlilik qismi } A_r = \frac{19.93 \cdot 10^{-27}}{12} = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg ga}$$

teng bo'lib, **massa atom birligi** (m.a.b.) deb ataladi yoki **etalon massa** deyiladi.

$$1 \text{ m.a.b.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Qolgan elementlar shu 1 dona bo'lakdan necha marta og'irligiga qarab nisbiy atom massa topiladi.

$$A_r(X) = \frac{A_{\text{absolyut}}(X)}{1/12 \cdot A_{\text{absolyut}}(\text{C})}$$

Nisbiy atom massa topish formulasi:

Masalan, kislorod atomi massasi $26,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. uning nisbiy atom massasiga teng.

Demak, kislorod atomi ^{12}C atomining 1/12 ($1,66 \cdot 10^{-27}$) qismidan 16 marta og'ir.

3. 3 g Fe alon massa sifatida ^{12}C izotopining 1/12 qismining o'rniga, 3 g ni olinadigan bo'lsa, temirning nisbiy atom massasi nechaga teng bo'ladi?

Yechimi: Nisbiy atom massani topish fo'rmulasidan foydalanamiz. Ushbu fo'rmuladagi 1/12 o'rniga 3/22 qo'yamiz.

$$A_r(\text{Fe}) = \frac{A_{\text{absolyut}}(\text{Fe})}{3/22 \cdot A_{\text{absolyut}}(\text{C})} = \frac{9.5 \cdot 10^{-23} \text{ g}}{3/22 \cdot 1.993 \cdot 10^{-23} \text{ g}} = 34.22$$

Yoki oddiygina o'zlarining nisbiy atom massalaridan foydalanamiz.

Uglerodning nisbiy atom massasi 12 ning 3/22 qismini topamiz. $12 \cdot 3/22 = 1.6363$ chiqdi. Temir nisbiy atom massasini shu songa bo'lamiz. $56/1.6363 = 34.22$

3.S ning nisbiy atom massasi 8 bo'lishi uchun ^{16}O izotopining necha qismi olinish kerak?

Yechimi: Nisbiy atom massani topish fo'rmulasidan foydalanamiz:

$$A_r(\text{S}) = \frac{A_{\text{absolyut}}(\text{S})}{X \cdot A_{\text{absolyut}}(^{16}\text{O})}$$

bu fo'rmuladagi x ni aniqlaymiz. Avvalo bizga S va O ning absolyut massalari kerak.

$$A_s(\text{S}) = A_r \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 32 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} = 5.344 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$A_s(\text{O}) = A_r \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 16 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27} = 2.6724 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

Endi bu sonlarni nisbiy atom massa topish fo'rmulasiga qo'yamiz.

$$A_r(\text{S}) = \frac{A_{\text{absolyut}}(\text{S})}{X \cdot A_{\text{absolyut}}(^{16}\text{O})}$$

$$8 = \frac{5.344 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}{X \cdot 2.672 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}$$

$$8x = 2$$

$$x = 1/4$$

^{16}O izotopining $1/4$ qismi olinsa S ning nisbiy atom massasi 8 ga teng bo'lar ekan. **2-usul.** $32/8 = 4$ marta kichraydi. Demak, $16/4 = 4$ 16 ning $1/4$ qismidir. Demak $1/4$ qismi olinishi kerak.

Absolyut massa bilan molekulyar massa o'rtasidagi bog'lanish

fo'rmulasi;

$$A_b = M_r \cdot 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

$$M_r = A_b / 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

Masala 1.2

1. Oqsil molekulasining m.a.b. = $53.156 \cdot 10^{-20} \text{ g}$ bo'lsa, oqsilning molyar massasini toping?

Yechimi:


$$M_r(\text{oqsil}) = \frac{A_{\text{absolut}}(\text{oqsil})}{1/12 \cdot A_{\text{absolut}}(C)} = \frac{53.156 \cdot 10^{-20} \text{ g}}{1/12 \cdot 1.993 \cdot 10^{-23} \text{ g}} = 32 \cdot 10^3 = 32000 \text{ g/mol}$$

1.3. Ideal gaz qonunlari

Avogadro qonuni – bir xil sharoitda teng hajmli gazlarda molekulalar soni teng bo'ladi.

Hajmiy nisbatlar qonuni – reaksiyaga kirishayotgan va hosil bo'layotgan gazlarning hajmlari o'zaro kichik butun sonlar kabi nisbatda bo'ladi. Bu qonun Gey-Lyussak tomonidan kashf etildi.

Masalan:



Masala


1. 15 l H_2 va 3 l N_2 aralashmasi o'rtasidagi reaksiya tugagach hosil bo'lgan aralashmaning havoga nisbatan zichligi qanday?

Ideal gazlarning holat tenglamasi

Tabiatda real gazlar mavjud bo'lib ularning zarrexalari orasida turlicha o'zaro ta'sir mavjud. lekin, bu ta'sir hisobga olinmagan holda barcha gazlar bir qilib ideal deb qaraladi. masalan NH_3 ning 1 moli real holatda 22.4 l hajmni egallaydi (N.sh) da lekin uni ideal deb qaraymiz va u 22.4 l hajmni egallaydi deb olamiz. Ideal gazlarning bosimi, hajmi, temperaturasi o'rtasida quyidagi bog'lanish mavjud.

1. **Izotermik jarayon** – $T = \text{const}$. $P_0 V_0 = PV$

Bu jarayonda bosim va hajm o'zgarishi o'zaro teskari propartsional.




Masala

2 ATM bosimida 3 l hajmni egallaydigan gaz, 0.5ATM da qancha hajmni egallaydi?

$$P_0 V_0 = PV \quad 2\text{ATM} \cdot 3\text{l} = 0.5\text{ATM} \cdot V$$

$$6 = 0.5V \quad V = 12 \text{ l}$$

2. Izobarik jarayon – P-const.



Bu jarayonda hajm va temperatura o'zgarishi o'zaro to'g'ri proporsional.

Masala

20°C da 8 l hajmni egallaydigan gaz 10°C da qanday hajmni egallaydi.


Izoxorik jarayon – V-const.

$$\frac{8 \text{ l}}{293 \text{ K}} = \frac{V = 7.73 \text{ l}}{283 \text{ K}}$$

$$\frac{P_0}{T_0} = \frac{P}{T}$$



Bu jarayonda temperatura va bosim o'zgarishi to'g'ri proporsional.



Gaz moddalarning miqdori, hajmi, bosimi va temperatura o'rtasida quyidagi bog'lanish mavjud:

Masala: Ma'lum miqdor O_2 $25^\circ C$ va 1atm bosimida 60 l hajmni

$$\frac{P_0 V_0}{T_0 n_0} = \frac{PV}{T n}$$

egallasa, $33^\circ C$ va 0.8 atm bosimda qanday hajmni egallaydi.

Gaz $20^\circ C$ da 202.6 kPa bosimda 90 l hajmni egallasa, $25^\circ C$ da

$$\frac{P_0 V_0}{T_0 n_0} = \frac{PV}{T n}$$

$$\frac{1ATM \cdot 60l}{298k} = \frac{0.8ATM \cdot V}{306k} \quad V = 77l$$

304.2kPa bosimda qancha hajmni egallaydi?

$$t=20^\circ C \quad T=T_0+t^\circ c=273+20=293k, \quad P=202.6 \text{ kPa}, \quad V=90 \text{ l}$$

$$t=25^\circ C \quad T_0=T_n+t^\circ c=273+25=298k, \quad P_0=304.2 \text{ kPa}, \quad V_0=?$$

$$PVT_0 = P_0 V_0 T$$

2. $30^\circ C$ da $0.5m^3$ ni egallagan gaz 263k da qancha hajmni egallaydi?

$$V_0 = \frac{PVT_0}{P_0 T} = \frac{202.6 \cdot 90 \cdot 298}{304.2 \cdot 293} = 61l \text{ krladi.}$$

$$t=30^\circ C \quad T=T_0+t^\circ c=273+30=303k, \quad V_0=0.5m^3=500 \text{ l}$$

$$T_0=263k, \quad V=?$$

$$VT_0 = V_0 T$$

$$V = \frac{V_0 \cdot T}{T_0} = \frac{500l \cdot 303k}{263k} = 434l$$

Meneleyev-

Klapeyron birlashgan gaz qonuni Bu qonun asosida P, V, T, m, M, n o'rtasidagi bog'lanishni quyidagicha yozish mumkin:

$PV=nRT$ (I) n -ning qiymati

$$n = \frac{m}{M}, n = \frac{V}{V_m}, n = \frac{N}{N_A}$$

(II) bo'lgani uchun (II) tenglamani (I) tenglamaga qo'yamiz buning natijasida

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad PV = \frac{V}{V_m}RT, \quad PV = \frac{N}{N_A}RT$$

tarzida yozish mumkin.

Kimyoviy jarayonlar paytida bosinning o'zgarishi


Hajm va temperatura o'zgarmas bo'lgan sharoitda bosimning o'zgarishi miqdor o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

Bosim va zarrachalarning o'zgarishi o'zaro to'g'ri proporsional.


$$\frac{P}{P_0} = \frac{n}{n_0}$$



$$\begin{array}{ccc} 2 & 3 & 3/2=1.5 \text{ marta ortdi.} \end{array}$$



$$\begin{array}{ccc} 4 & 2 & 4/2 = 2 \text{ marta kamaydi.} \end{array}$$



$$\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 2/2=1 \text{ o'zgarmagan} \end{array}$$

Nazorat savollari

1. Yuqori haroratda SO_3 ning 40% parchalandi.

a. Idishda bosim necha marta o'zgaradi

b. Bosim necha % ga o'zgaradi

c. Aralashma hajmiy tarkibini % da toping

d. Aralashma molyar massasini toping?

a. 100 mol SO_3 bor deb o'ylasak. 40 mol parchalandi. 60 mol qoldi.



$$\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 1 \end{array}$$

$$40 \quad x=40 \quad x=20$$

$$60 + 40 + 20 = 120 \text{ mol}$$

$$120/100 = 1.2 \text{ marta ortadi.}$$

b. 100 mol -----100%

$$120 \text{ mol} \text{-----} x = 120\% - 100\% = 20\% \text{ ga ortadi.}$$

c. Aralashmada 60 mol – SO_3 , 40 mol- SO_2 , 20 mol – O_2 bor.
Ularning hajmiy ulushlari 50%, 33.3%, 16.7% gat eng.

60 mol SO_3 * 80 g = 4800 gr	120 mol -----8000 gr
40 mol SO_2 * 64 g = 2560 gr	1 mol -----x=66.7 gr/mol
20 mol O_2 * 32 g = 640 gr	

2.0. ANORGANIK BIRIKMALARNING ASOSIY SINFLARI

Kimyoviy elementlar 200 mingdan ortiq anorganik birikma hosil qiladi. Bu birikmalar quyidagi to'rt sinfga bo'linadi:

1.1. Oksidlar. 2. Asoslar. 3. Kislotalar. 4. Tuzlar.

Binar birikmalar deb – ikki xil element atomidan tashkil topgan birikmalarga aytiladi. Ularga: Oksidlar: SO_2 , SO_3 , N_2O_3 , Cl_2O_7 , P_2O_5 , Ayrim kislotalar: HBr , HI , HF , HCl
Ayrim tuzlar: NaCl , KI , KF
Bular binary birikma bo'la olmaydi: NaOH , KOH , LiOH .

2.1. Oksidlar

Elementlarning kislorod bilan hosil birikmasi *oksidlar* deyiladi ya'ni biri kislorod bo'lgan ikki elementlardan tashkil topgan murakkab moddaga aytiladi.

Oksidlarda kislorod bilan birikkan element doimo musbat oksidlanish darajasiga, kislorod esa manfiy oksidlanish darajasiga (F_2O dan boshqa birikmalarda) ega bo'ladi.

Deyarli barcha kimyoviy elementlar oksidlar hosil qiladi. Hozirgi vaqtga qadar uchta elementning nodir gazlardan neon, geliy va argonning oksidlari hali olinmagan.

Oksidlar kimyoviy xossalriga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi:

1. Asosli oksidlar: Na_2O , K_2O , CaO , MgO , BaO va hakoza
2. Kislotali oksidlar: SO_2 , SO_3 , CO_2 , N_2O_3 , N_2O_5 , P_2O_5 , NO_2 , CrO_3 , SiO_2 , Cl_2O_7
3. Amfoter oksidlar : bular tuz hosil qiluvchi oksidlar deyiladi. ZnO , SnO , SnO_2 , PbO , As_2O_3 , Cr_2O_3 , Al_2O_3 , Sb_2O_3 , MnO , PbO_2 , Fe_2O_3
4. Tuz hosil qilmaydigan (befarq, betaraft. indeferent) oksidlar. N_2O , NO , CO ,

5. Peroksidlar: H_2O_2, Na_2O_2 .


Xalqaro nomenklaturaga muvofiq oksidlarning nomi nisbiy elektrmanfiyligi kamroq element nomi bilan nisbiy elektrmanfiyligi ko'proq element lotincha nomini o'z ichiga – id

qo'shunchasini qo'shib hosil qilinadi. Agar element bir necha oksid hosil qiladigan bo'lsa, u holda ularning nomida elementning oksidlanish darajasi nomidan keyin qavs ichida rim raqami bilan ko'rsatiladi. Masalan, H_2O - suv, FeO - temir (II) oksid, Fe_2O_3 - temir (III) oksid, P_2O_3 - fosfor (III) oksid, P_2O_5 - fosfor (V) oksid, P_4O_6 - tetrafosfor geksaoksid, P_4O_{10} - tetrafosfor dekaoksid, Cu_2O - mis (I) oksid.

2.2. Asoslar

Asoslar molekulasi metall atomi va bir yoki bir necha gidroksil (OH) gruppantashkil topgan murakkab moddalardir. Asoslarda metall atomi doimo musbation(kation), gidroksil gruppasi esa o'zgarmanfiy ion (anion)dan iboratdir. Gidroksilgruppning soni metallning valentligiga teng bo'ladi.

Masalan:



Asoslar molekulasidagi gidroksil gruppasi soniga qarab bir yoki bir necha bosqich bilan dissosiyalanadi. Masalan:



Tarkibida metall bo'lmagan yagona gidroksid ammoniy gidroksididir NH_4OH .

Asoslar suvda yaxshi va yomon eriydigan asoslarga bo'linadi.

Ishqoriy metallar va ishqoriy – yer metallarning gidroksidlari suvda yaxshi eriydi va yaxshi dissosilanadi. **Suvda juda yaxshi eriydigan gidroksidlar ishqorlar** deyiladi.

Masalan: $LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)_2, Ra(OH)_2, Ca(OH)_2, Sr(OH)_2$ ishqorlardir. Ishqorlar terini o'yadi, shisha, yog'och va kiyimni yemiradi. Shuning uchun ham ular o'yuvchi ham deyiladi.

Davriy sistemadagi I va II gruppning yonaki gruppacha va III, IV, V, VI, VII, VIII grupp metallarning gidroksidlari suvda yomon eriydi, bular asoslar deyiladi.

2.3. Kislotalar

Kislota tarkibida vodorod atomi bo'lgan va uning o'rnini metall atomlari olishi natijasida tuz hosil qiladigan murakkab moddadir.
Masalan:



Metallarga o'rin beradigan vodorodning soniga qarab kislotalar har xil **negizli** bo'ladi. Agar kislota tarkibidagi vodorod atomlaridan bittasini metalga almashtirsa, bunday kislota **bir negizli** (HCl , CH_3COOH , HNO_2 , HNO_3 , $HClO$, H_3PO_2 , $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$), ikkitasini metalga almashtirsa, **ikki negizli** (H_2SiO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_3 , $H_2C_2O_4$, H_2S , H_2CrO_4), uchtasini metall atomiga almashtirsa, **uch negizli** (H_3PO_4 , H_3AsO_4 , H_3BO_3), $H_4P_2O_7$ esa to'rt negizli kislota misol bo'ladi.

Kislotalar asosan ikki turga, ya'ni kislorodli va kislorodsiz kislotalarga bo'linadi:

1. Agar kislota molekulasida kislorod atomlari bor bo'lsa, bunday kislotalar kislorodli kislotalar deyiladi. Masalan: H_2SiO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 va hokozo.

2. Agar kislota molekulasida kislorod atomlari bo'lmasa, bunday kislotalar kislorodsiz kislotalar deyiladi. Masalan: HCl , HF , H_2S , H_2Se , HCN , HJ .

2.4. Tuzlar

Tarkibi metall ionlari, shuningdek anioniy ioni va kislota qoldiqlaridan iborat bo'lgan murakkab birikmalar tuzlar deyiladi.
Tuzlar, tuz hosil qiluvchi metall ioni va kislota qoldig'i xususiyatiga qarab, har xil turga bo'linadi:

– normal (oʻrta) tuzlar	$\text{KNO}_3, \text{K}_2\text{SO}_4$
– nordon (gidro) tuzlar	$\text{KHSO}_4, \text{Ca}(\text{HSO}_4)_2$
– asosli (gidroksi) tuzlar	$\text{Mg}(\text{OH})\text{NO}_3, \text{Al}(\text{OH})\text{SO}_4$
– qoʻshaloq tuzlar	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$
– aralash tuz	CaClOCl
kompleks tuzlar	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4, \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Kislota va ishqoriy eritmalarining indikatorlarga taʼsiri. Uchta toza probirka olib, uning har biriga 5-6 ml dan distillangan suv quyung va har qaysi probirkaga 1-2 tomchidan fenolftalein eritmasidan tomizing. Soʻngra birinchi probirkaga 2-3 ml xlorid kislota, ikkinchisiga 2-3 ml oʻyuvchi natriy eritmalaridan qoʻshing va yaxshilab chayqating. Uchinchi probirkaga nisbatan bu probirkalarda indikatorlar rangining qanday oʻzgarishini aniqlang. Xuddi shu tajribani metiloranj eritmasi, universal indikator va lakmus qogʻozlari bilan ham takrorlang. Kuzatilgan natijalarni daftaringizga yozing va eslab qoling

2-tajriba. Asosli oksid va asosning hosil boʻlishi. Toza metall qoshiqchaga ozgina magniy qirindisidan solib, uni spirt lampa alangasida yondiring. Magniy yonib boʻlganidan keyin qoshiqchadan qolgan oq rangli magniy oksidini 1/4 qisimigacha suv quyilgan probirkaga soling, yaxshilab chayqating. Hosil boʻlgan eritmaga 1-2 tomchi fenolftalein tomizing va eritma rangining oʻzgarishini kuzating. Magniy oksidi va gidroksidining hosil boʻlishi reaksiyalari tenglamalarini yozing Ular qanday xossalarga ega?

3- tajriba. Kislotali oksidi va kislota hosil qilish (tajriba moʻrli shkafda bajariladi)

Toza shisha stakanchaga ozroq distillangan suv solib, unga 1-2 tomchi metiloranj eritmasidan tomizing. Soʻngra metall qoshiqchaga oltingugurt kukunidan solib, uni spirt lampasidan yondiring. Yonib turgan oltingugurt qochiqchasi bilan suv solingan stakanga sekin suvga tegizmasdan tushirib, stakan ogʻzini shisha plastinka yordamida berkiting.

Oltimgugurt yonishi natijasida hosil bo'lgan alanga rangiga va chiqayotgan gazning hidiga e'tibor bering. Oltimgugurtning hammasi yonib bo'lgach, metall qoshiqchani asbest to'r ustiga qo'ying.

Stakanning og'zini qaytadan shisha plastinka bilan yopib, chayqatib tungan holda oltimgugurt dioksidini suvda eriting va eritma rangining o'zgarishini kuzating.

4-tajriba. Amfoter gidroksidining hosil bo'lishi Probirkaga AlCl_3 eritmasidan 5-6 ml soling va uning ustiga cho'kma hosil bo'lguncha ishqor eritmasidan tomizing. Reaksiya tenglamasini yozing

a) Hosil bo'lgan cho'kmani suyuqligi bilan chayqatib ikkita probirkaga bo'ling. Birinchi probirkaga kislota, ikkinchisiga esa ishqor eritmalaridan qo'shing. Ikkal probirkadagi cho'kma erib ketadi. Cho'kmaning kislota da ham, ishqorda ham erishi sababini tushuntirib bering. Reaksiya tenglamalarni yozing.

2.4.1. Aralashma tarkibidagi tuzning foiz miqdorini aniqlash

Osh tuzining qumli aralashmasidan texnik –kimyoviy tarozida 0,01 g ga qadar aniqlik bilan 20 g tortib oling. Olingan aralashmani stakanga soling va uning ustiga o'lchov silindirida o'lchab 100 ml suv quyning. Aralashma tarkibidagi osh tuzini uchi rezinali shisha tayoqcha bilan aralashtrilib eriting. Filtr qog'ozidan Burma filtr yasab, hosil bo'lgan eritmani filtrlang.

Eritmani filtrlab bo'lgandan keyin stakanda qolgan cho'kmani 10-15ml distillangan suv solib, avval stakanni chayqating, so'ngra cho'kmani tindiring va yan hosil bo'lgan eritmani filtirlang. Bu jarayoni yan bir marta takrorlang. So'ngra yuvgichdagi distillangan suv bilan filtrini uch marta yuving va nihoyat, filtratdan 2-3 ml probirkaga yig'ib, unga 2-4 ml tomchi nitrat kislota eritmasidan va 2-3 tomchi kumush nitrat tuzi eritmasidan qo'shing. Agar bu vaqtda cho'kma tushmasa, yuvishni to'xtating, agar cho'kma hosil bo'lsa, yuvishni yana davom ettiring.

Stakandagi filtrlangan eritmani o'lchov silindriga soling va uning hajmi 250 ml ga yetguncha distillangan suv qo'shing. Uni yaxshilab aralashtring va quruq areometрни suyuqlikka ohista tushirib, eritmaning

nisbiy zichligini o'lchang. So'ngra areometrni toza suv bilan chayib, filtr qog'ozida qolib o'z joyiga qo'ying.

O'lchangan zichlikka muvofiq keladigan eritmaning foiz konsentratsiyasini jadvaldan toping, ρ_{eritma} da aniqlangan zichlikka muvofiq keladigan protsent konsentratsiya qiymati bo'lmasa, uni interpolatsiya yo'li bilan toping

Tajriba natijalarini laboratoriya daftaringizga quydagi shakilda yozing.

Aralashmaning massasi, m	Eritmaning Hajmi, V ml	20° ko'rsatgan nisbiy zichlik d r/ml	Eritmaning foiz konsentratsiyasi C%	Eritmadagi tuzning miqdori m _{tuz}

Eritmadagi tuz miqdori m_{tuz} ni aniqlash uchun, avval, eritmaning hajmini uning zichligiga ko'paytirish orqali eritmaning massasini topish kerak:

$$m_{eritma} = V_{eritma} \cdot d$$

(d-eritma zichligi)

So'ngra quyidagi fo'rmula orqali eritma tarkibidagi tuzning massasi xisoblanadi

$$m_{tuz} = \frac{m(eritma) \cdot C\%}{100}$$

Tuzning massa miqdorini va aralashmaning massasini bilgan holda aralashma tarkibidagi NaCl ning foiz miqdorini 0.1% aniqlikda hisoblab toping.

2.4.2.Moddalar kimyoviy fo'rmulasini tuzish

Formulani chiqarish uchun birikmani qanday elementlar tashkil etsa, shu elementlarning massa ulushlarini atom massalarning nisbatidan topamiz.

Masala

1. Tarkibida 49.6 % mangan va 50.04 % kislorod bo'lgan moddaning formulasini aniqlang?

Berilgan:

$$W_{Mn}=49.6\%$$

$$W_O=50.04\%$$

Fo'rmulani top? Yechish: masala shartidan ma'lumki birikma tarkibida Mn va O atomlari bor. U holda birikmaning taxminiy formulasi Mn_xO_y bo'ladi, bu yerdan x va y ni topish uchun har bir atom %ulushini o'sha atomning nisbiy atom massasiga bo'lib, atomlarning nisbati topiladi:

$$Mn : O = \frac{49.6\%}{55} : \frac{50.04\%}{16} = 0.902 : 3.13$$

agar chiqqan sonlar nisbati aniq bo'lmasa, bu sonlarni eng kichigiga bo'lamiz. bunda ham butun chiqmasa, 2ga ko'paytiramiz.

$1:3.5=1 \cdot 2:3.5 \cdot 2=2:7$. Umumiy holda quyidagicha demak Mn ning 2 ta atomiga O ning 7 ta atomi to'g'ri keladi. Bu birikma formulasi quyidagich bo'ladi Mn_2O_7 .

2. Tarkibida 79%-Cu, 19.75% -O, 1.25% -H bo'lgan birikma fo'rmulasi qanday?

Berilgan:

$$W_{Cu}=79\%$$

$$W_O=19.75\%$$

$$W_H=1.25\%$$

Fo'rmulani top?

Yechish:

$$Cu : O : H = \frac{79\%}{64} : \frac{19.75\%}{16} : \frac{1.25\%}{1} = 1.2 : 1.2 : 1.25 = 1 : 1 : 1$$

Fo'rmulasi quyidagicha $CuOH$ - mis (I) gidroksid.

Yana fo'rmulani chiqarishning usuli bu birkma yonishi yoki reaksiyaga kirishib ajralib chiqqan moddalar massalari berilganda ham fo'rmulani chiqarsak bo'ladi.

3. Tarkibida 39,7 % kaliy, 27,9 % marganets va 32,4 % kislorod bo'lgan moddaning eng oddiy formulasini toping.

Yechish: Moddaning umumiy formulasini $K_xMn_yO_z$ deb olsak,

$$x : y : z = \frac{39,7}{39} : \frac{27,9}{55} : \frac{32,4}{16} = \frac{1,01}{0,51} : \frac{0,51}{0,51} : \frac{2,02}{0,51} = 1 : 1 : 4$$

Demak, moddaning formulasi $KMnO_4$ ekan.

Nazorat savollari

1. Tarkibi quyidagicha foizga ega bo'lgan birikmalarning formulalarini toping?

a) K-39,67%; Mn-27,87%; O-32,46%; b) H-3,7%; P-37,8%; O-58,5%;

c) Sn-77,7%; O-21%; H-1,3%; d) Cu-65,3%, O-32,65%, H-3,05%;

2. Kislota tarkibida H-2,2%, J-55,7%, O-42,1% gat eng . Kislota formulasini aniqlang.

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba . Kislota va ishqor eritmalarning indikatorlarga ta'siri.

Uchta toza probirka olib, uning xar biriga 5-6 ml dan distillangan suv quyning va har qaysi probirkaga 1-2 tomchidan fenolftalein erimasidan tomizing. So'ngra birinchi probirkaga 2-3 ml xlorid kislota, ikkinchisiga 2-3 ml o'yuvchi natriy eritmalaridan qo'shing va yaxshilab chayqating. Uchinchi probirkaga nisbatan bu probirkalarda indikatorlar rangining qanday o'zgarishini aniqlang. Iluddi shu tajribani metiloranj eritmasi, universal indikator va lakmus qog'ozlari bilan ham takrorlang. Kuzatilgan natijalarni jadval-1 ga yozing va eslab qoling.

2=Tajriba Kislotali oksid va uning kislotasini xosil qilish.(tajriba mo'rili shkafda bajariladi) Toza shisha stakanchaga ozroq distillangan suv solib, unga 1-2 tomchi metiloranj eritmasidan tomizing. So'ngra metall qoshiqchaga oltingugurt kukunidan solib, uning spirt lampaga alangasida yondiring. YOnib turgan oltingugurt qoshiqchasi bilan suv solingan stakanga sekin suvga tegizmasdan tushirib, stakan og'zini shisha plastinka yordamida berkiting. Oltingugurt yonish natijasida xosil bo'lgan alanga rangiga va chiqayotgan gazning hidiga e'tibor bering.

Stakanning og'zini qaytadan shisha plastinka bilan yopib, chayqatib turgan holda oltingugurt(IV)-oksidini suvda eritib va eritma rangining o'zgarishini kuzating. Oltingugurt yonish reaksiyasi va xosil bo'lgan oksidning suvda erish reaksiyasini tenglamalarini yozing.

3-tajriba. Asosli oksid va asosning xosil bo'lishi. Ozgina magniy qirindisini qiskich bilan olib, uni spirt lampa alangasida yondiring. Magniy yonib bo'lganidan keyin qolgan oq rangli magniy oksidini suv quyilgan probirkaga soling, yaxshilab chayqating. Xosil bo'lgan eritmaga 1-2 tomchi fenolftalein tomizing va eritma rangining o'zgarishini kuzating. Magniy oksidi va gidroksidining xosil bo'lish reaksiyalari tenglamalarini yozing. Ular qanday xossalarga ega?

4-tajriba. Amfoter gidroksidning xosil bo'lishi. A) Probirkaga $AlCl_3$ eritmasidan 5-6 ml quying va uning ustiga to cho'kma xosil bo'lguncha ishqor eritmasidan tomizing. Reaksiya tenglamasini yozing. B) Xosil bo'lgan cho'kmani suyuqligi bilan chayqatib, ikki probirkaga bo'ling. Birinchi probirkaga kislotaga, ikkinchisiga esa ishqor eritmasidan qo'shing. Ikkala probirkadagi cho'kma xam erib ketadi. CH_3COOH ning kislotada xam, ishqorda xam erishi sababini tushuntirib bering. Reaksiya tenglamasini yozing.

3.0.EKVIVALENTLAR QONUNI

Ingliz olimi Dalton XVIII asrning oxirida elementlarning o'zaro muayyan miqdordagina birika olishini aytdi hamda bu miqdorlarni «birikuvchi miqdorlar» deb atadi. Keyinchalik «birikuvchi miqdorlar» termini «ekvivalent» termini bilan almashtirildi. Ekvivalent - **teng qiymatli** demakdir. Ekvivalentlik tushunchasini 1820 yilda Volleston tomonidan fanga kiritilgan. Elementlarning ekvivalentini aniqlashda vodorod va kislorod ekvivalentlari asos qilib qabul qilingan. Elementning 8 og'irlik qism kislorod yoki 1.008 og'irlik qism vodorod bilan birikadigan, yoki birikmalarda shuncha kislorod, yoxud shuncha vodorod o'zini oladigan og'irlik qismini ko'rsatuvchi son shu elementning *ekvivalentidcyedi*. Ekvivalentlar qonuni shunday ta'riflanadi: **Elementlar kimyoviy reaksiyalarga kirishayotganda o'z ekvivalentlariga proporsional miqdorlarda birikadi va almashinadi.**

1 mol vodorod atomlari bilan birika oladigan yoki kimyoviy reaksiyalardan 1 mol vodorod atomining o'rinini boshqara oladigan modda miqdori uning ekvivalenti deb ataladi. 1 ekvivalent moddaning massasi **ekvivalent massa** deb ataladi.

Ekvivalent va ekvivalent massa odatda birikmalarning tarkibini o'rganib, bir elementning o'rnini boshqa elementdan qanchasi egallashini tekshirib aniqlanadi. Buning uchun albatta shu elementning vodorodli birikmasidan foydalanish shart emas, ekvivalenti aniq bo'lgan boshqa element bilan birikmasidan ham foydalanish mumkin. Masalan, CaO ohakda kalsiyning ekvivalenti va ekvivalent massasini topishda, suvda topilgan O kislorodning bir ekvivalenti 8 g/mol ekanligini bilsak, 40 g/mol Ca ga 16 g/mol O to'g'ri kelsa, 8 g/mol O ga 20 g/mol Ca ekvivalent massasi to'g'ri keladi.

Moddalar bir-biri bilan ularning ekvivalentlariga proporsional miqdorlarda ta'sirlashadilar. O'zaro ta'sirlashayotgan moddalar massalari (hajmlari) ularning ekvivalent massalariga (hajmiga) proporsionaldir.

Ekvivalent hajm – moddaning 1 ekvivalenti egallaydigan hajm bo'lib, gazsimon holat uchun qo'llanadi (1 ekvivalent hajm H - 11,2 l/mol, O - 5,6 l/mol).

Quyidagilarning ekvivalentini topish:

1. Elementlarning ekvivalentini topish: elementning nisbiy atom massasini shu elementning valentligiga nisbati orqali topamiz

$$E_{\text{element}} = \frac{A_r(\text{elementi})}{V_{\text{elementi}}}$$

E_{element} - elementning ekvivalenti.
 A_r - elementning nisbiy atom masasi.
 V - elementning valentligi.

Masalan:

1. Al ning ekvivalentini aniqlang?

$$E_{\text{ekv}} = \frac{M_{\text{ekv}}}{V_{\text{ekv}} \cdot n_{\text{ekv}}} \quad \text{ga teng}$$

2. Mustaqil ravishda Cu(II), Fe(III), C(II,IV), P(III), Hg, Au, Ag, Zn larning ekvivalentini aniqlang?

2. Oksidlarning ekvivalentini topish: Buning uchun oksidning molekulyar massasini oksid hosil qilgan element soni va valentligi (indeksidagi son) ko'paytmasining nisbatidan topamiz.

E_{oksid} - oksidning ekvivalenti.

M_r - oksidning molekulyar massasi.

V - oksid hosil qilgan elementning valentligi.

n - oksid hosil qilgan element soni.

Masala

1. Al_2O_3 ning ekvivalentini aniqlang?

Birinchii navbatda Al_2O_3 ning molekulyar massasini topaniz.

$M_r(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2Ar(\text{Al}) + 3Ar(\text{O}) = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 16 = 54 + 48 = 102 \text{ g/mol}$
ga teng.

$$E_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{M_{\text{Al}_2\text{O}_3}}{V_{\text{O}} \cdot n_{\text{O}}} = \frac{102 \text{ g/mol}}{3 \cdot 2} = 17 \text{ g/mol ga teng.}$$

2. Mustaqil ishlash uchun: CuO , CrO_3 , Cl_2O_7 , P_4O_{10} , Na_2O larning ekvivalentini aniqlang?

3. Asoslarning ekvivalentini topish: Buning uchun asosning molekulyar massasini asos tarkibidagi -OH lar soniga nisbati orqali topamiz.

$$E_{\text{asos}} = \frac{M_{\text{asos}}}{n_{\text{OH}}}$$

E_{asos} - asosning ekvivalenti. M - asosning molekulyar massasi. n - OH lar soni.

Masala:

1. $\text{Al}(\text{OH})_3$ ning ekvivalentini aniqlang?

$M_r(\text{Al}(\text{OH})_3) = Ar(\text{Al}) + 3Ar(\text{O}) + 3Ar(\text{H}) = 27 + 3 \cdot 16 + 3 \cdot 1 = 78 \text{ g/mol}$

$$E_{\text{Al}(\text{OH})_3} = \frac{M_{\text{Al}(\text{OH})_3}}{n_{\text{OH}}} = \frac{78 \text{ g/mol}}{3} = 26 \text{ g/mol ga teng.}$$

Agarda asoslarning reaksiya paytidagi ekvivalentini aniqlash kerak bo'lsa, asosning reaksiya paytida nechta gidroksil gruppasini almashgan bo'lishiga qaraladi.

2. Mustaqil ishlash uchun: $\text{Cr}(\text{OH})_3$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Pb}(\text{OH})_4$ larning ekvivalentini aniqlang?

E_{oksid} - oksidning ekvivalenti.

Mr - oksidning molekulyar massasi.

V - oksid hosil qilev elementning valentligi.

n - oksid hosil qilgan element soni.

Masala

1. Al_2O_3 ning ekvivalentini aniqlang?

Birinchi navbatda Al_2O_3 ning molekulyar massasini topaniz.

$Mr(Al_2O_3) = 2Ar(Al) + 3Ar(O) = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 16 = 54 + 48 = 102 \text{ g/mol}$
ga teng.

$$E_{Al_2O_3} = \frac{Mr_{Al_2O_3}}{V_{Al} \cdot n_{Al}} = \frac{102 \text{ g/mol}}{3 \cdot 2} = 17 \text{ g/mol} \text{ ga teng.}$$

2. Mustaqil ishlash uchun: CuO , CrO_3 , Cl_2O_7 , P_4O_{10} , Na_2O larning ekvivalentini aniqlang?

3. Asoslarning ekvivalentini topish: Buning uchun asosning molekulyar massasini asos tarkibidagi -OH lar soniga nisbati orqali topamiz.

$$E_{\text{asos}} = \frac{M_{\text{asos}}}{n_{OH}}$$

E_{asos} - asosning ekvivalenti. M - asosning molekulyar massasi. n - OH lar soni.

Masala:

1. $Al(OH)_3$ ning ekvivalentini aniqlang?

$Mr(Al(OH)_3) = Ar(Al) + 3Ar(O) + 3Ar(H) = 27 + 3 \cdot 16 + 3 \cdot 1 = 78 \text{ g/mol}$

$$E_{Al(OH)_3} = \frac{M_{Al(OH)_3}}{n_{OH}} = \frac{78 \text{ g/mol}}{3} = 26 \text{ g/mol} \text{ ga teng.}$$

Agarda asoslarning reaksiya paytidagi ekvivalentini aniqlash kerak bo'lsa, asosning reaksiya paytida nechta gidroksil gruppasini almashgan bo'lishiga qaraladi.

2. Mustaqil ishlash uchun: $Cr(OH)_3$, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $Pb(OH)_4$ larning ekvivalentini aniqlang?

4. Kislotalarning ekvivalentini topish: Buning uchun kislotalning molekulyar massasini kislota tarkibidagi vodorod atomlari soniga nisbati orqali topamiz.

$$E_{\text{kislota}} = \frac{M_{\text{kislota}}}{n_H}$$

E_{kislota} - kislotalning ekvivalenti. M_{kislota} - kislotalning molekulyar massasi. n_H - kislota tarkibidagi vodorodlarning soni.

Masala

1. H_2SO_4 ning ekvivalentini aniqlang?

$Mr(H_2SO_4) = 98 \text{ g/mol}$

$$E_{H_2SO_4} = \frac{M(H_2SO_4)}{n_H} = \frac{98 \text{ g/mol}}{2} = 49 \text{ g/mol}$$


Agarda kislotalning reaksiya paytidagi ekvivalentini aniqlash kerak bo'lsa, kislota reaksiya paytida nechta vodorod atomi almashgan bo'lishiga qaraladi.

Masala




Bu reaksiyada H_3PO_4 tarkibidagi 3 ta vodorod atomining 1 tasi metall bilan almashgan shuning uchun kislotalning molekulyar massasini almashgan vodorod atomi soni 1 ga nisbati orqali topamiz.

$$E_{H_3PO_4} = \frac{M_{H_3PO_4}}{n_{\text{almashgan H atomlari}}} = \frac{98 \text{ g/mol}}{1} = 98 \text{ g/mol}$$



Bu reaksiyada H_3PO_4 tarkibidagi 3 ta vodorod atomining 2 tasi metall bilan almashgan shuning uchun kislotalning molekulyar massasini almashgan vodorod atomi soni 2 ga nisbati orqali topamiz.

$$E_{H_3PO_4} = \frac{M_{H_3PO_4}}{n_{\text{almashgan H atomlari}}} = \frac{98 \text{ g/mol}}{2} = 49 \text{ g/mol}$$



Bu reaksiyada H_3PO_4 tarkibidagi 3 ta vodorod atomining 3 tasi metall bilan almashgan shuning uchun kislotalning molekulyar massasini almashgan vodorod atomi soni 3 ga nisbati orqali topamiz.

Demak, kislota tarkibidagi vodorod atomlarining nechitasi metall bilan almashgan bo'lsa, shu songa nisbat orqali topamiz.

3. Mustaqil bulash uchun: HCl , HNO_3 , H_2PO_4 , CH_3COOH , H_3BO_3 , H_2CO_3 kislotalar ekvivalentini aniqlang.

4. 1.5 mol NaOH bilan 1.5 mol H_2SO_4 bilan reaksiyaga kirishgani aniqlandi. Kislota ning ekvivalentini aniqlang?

5. **Tuzlarning ekvivalentini topish:** Buning uchun tuzning molekulyar massasini tuz hosil qilgan metallning soni bilan valentligi ko'paytmasiga nisbati orqali topamiz.

$$E_{\text{tuz}} = \frac{M_{\text{tuz}}}{V_{\text{Me}} \cdot n_{\text{Me}}}$$

E_{tuz} - tuzning ekvivalenti, M_{tuz} - kislota ning molekulyar massasi.

V_{Me} - tuz hosil qilgan metallning valentligi, n_{Me} - tuzdagi metall soni.

1. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ning ekvivalentini aniqlang?

$M_r(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 342 \text{ g/mol}$

$$E_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{M_r(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)}{V_{\text{Me}} \cdot n_{\text{Me}}} = \frac{342 \text{ g/mol}}{3 \cdot 2} = 57 \text{ g/mol}$$

6. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida oksidlovchi va qaytaruvchilarning ekvivalentini topish: Buning uchun oksidlovchi bo'lsa, qabul qilgan elektro'nlar soniga nisbati orali qaytaruvchiniki esa bergan elektro'nlar soniga nisbati orqali topamiz.

$$E_{\text{oksidlovchi}} = \frac{M_{\text{oksidlovchi}}}{n_{\text{qabulqilektron}}}$$

$$E_{\text{qaytaruvchi}} = \frac{M_{\text{qaytaruvchi}}}{n_{\text{berganlektron}}}$$

$\text{HCl} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Cl}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasidagi oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalentini topamiz.

Bu reaksiyada oksidlovchi - KMnO_4 Qaytaruvchi - HCl dir.

Ularning oksidlanish darajasining o'zgarishiga qaraymiz.

Mn^{+7} dan Mn^{+2} ga o'zgardi yani 5ta elektron qabul qildi.
 Cl^{+1} dan Cl^{+0} ga o'zgargan yani 1 ta elektron bergan.

$$E_{KMnO_4} = \frac{M(KMnO_4)}{n_{qabulq}} = \frac{158g/mol}{5} = 31.6g/mol$$

$$E_{HCl} = \frac{M(HCl)}{n_{bergad}} = \frac{36.5}{1} = 36.5g/mol$$

Elementlar bir-biri bilan o'zaro ekvivalentlariga proporsional miqdorda birikadi. Bu qonunga asosan reaksiaga kirishuvchi moddalar massalarining yoki birkamadagi elementlar massa ulushlarining bir-biriga nisbati ularning ekvivalent massalarining nisbatiga teng.

$$\frac{m_1}{E_1} = \frac{m_2}{E_2}$$

Bu tenglamada biror element ekvivalenti E_1 ni topish uchun massa ulushi yoki modda massalari nisbatidan tashqari E_2 malum bo'lishi kerak. E_2 vodorodli birikmada vodorodning, kislorodning yoki element massasi aniq bo'lgan biror elementning ekvivalent massasidir.

1. Massasi 0,728 g bo'lgan metall kislorodda yonganda 0,9072 g metall oksidi hosil qildi. Metallning valentligi II ga teng. Metallning ekvivalentini va metalni aniqlang?

Berilgan:

$m_{Me}=0,728g$

$m_{metall oksidi}=0,9072g$

$EMe=?$

Yechish:

Metallning ekvivalentini topish uchun qancha kislorod birlashtirganini aniqlaymiz. Metall oksididan metall massasini ayirsak birlashtirgan kislorod massasi kelib chiqadi.

$mO = m_{metall oksidi} - m_{Me} = 0,9072g - 0,728g = 0,1792g$ O_2 birlashtirgan.

$$\frac{m_1}{E_1} = \frac{m_2}{E_2}$$

bu formulaga qo'yish orqali metallning ekvivalentini topamiz.

$$\frac{m_{Me}}{E_{Me}} = \frac{m_{O_2}}{E_{O_2}}$$

$$\frac{0.728g}{E_{Me}} = \frac{0.1792g}{8g} \quad 0,728g \cdot 8g = E_{Me} \cdot 0,1$$

$$E_{Me} = \frac{0.728g \cdot 8g}{0.1792g} = 32,5g$$

$E_{Me}=32,5g$ bo'lsa, valentligiga ko'paytirsak nisbiy atom massasi kelib chiqadi.


$32,5 \cdot 2=65g$ bu metall Zn- ruxdir.

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

Tajriba ma'lum miqdorda olingan metallning suyultirilgan xlorid kislotadan siqib chiqaradigan vodorod hajmini o'lchashga asoslangan:



Bu tajriba (3-1 rasm) da ko'rsatilgan germetik asbobda bajariladi.



3.1.- rasm Metall ekvivalentini molyar massasini aniqlash uskunasi:
1-Ostvald probirkasi; 2- byuretka; 3- barobarlovchi byuretka.

Ostvald probirkasining bir tomoniga suyultirilgan 10 ml xlorid kislotadan quyung. Ikkinchi tomoniga tarozida oldindan tortilgan va kichkina filtr qog'oziga o'ralgan 0,05 g metallni ehtiyotlik bilan, kislotaga tegizmasdan soling.

Barobarlovchi byuretkani pastka yoki yuqoriga xarakatlantirib turgan xolda suvning sathini nolga yaqin chiziqqa keltiring va


Ostvald probirkasini probka bilan berkitib, asbobning germetikligini tekshiring. Buning uchun barobarlovchi byuretkadagi suvning satxini byuretkadagi suv satxidan pastroqqa tushiring va uni shu xolatda shativga maxkamlab o'rnating. Agar 1-2 minut davomida byuretkada suvning sathi sezilarli darajada o'zgarmasa, asbobni germetik deb xisoblash mumkin. Asbobning germetikligini tekshirilgandan keyin, byuretkalardagi suv satxini bir holatga keltiring va darajalarga bo'lingan byuretkadagi suvning dastlabki sathini (V_{bosh}) belgilab yozib qo'ying.

Ostvald probirkasini qiyalatib undagi kislotani metall solingan tomoniga quyung. SHu zahoti metall kislotani bilan reaksiyaga kirishib, vodorod ajrala boshlaydi. Ajralib chiqqan vodorod byuretkadagi suvni barobarlovchi byuretkaga tomon siqib chiqara boshlaydi. Reaksiya tomon bo'lishi bilan byuretkadagi gazning chiqib ketmasligi yoki unga xavo kirmasligi uchun ikkala idishdagi suvning sathini tenglashtiring. So'ngra byuretkadagi so'nggi suv sathini (V_{oxir}) aniqlab yozib oling. Tajriba natijalarini jadvalga yozung.

4.0.KIMYOVIY REAKSIYALAR ENERGETIKASI

Kimyoviy jarayon paytida energiyaning o'zgarishini – termokimyo o'rganadi. Kimyoviy reaksiya paytida ajraladigan yoki yutiladigan issiqlik miqdori – issiqlik effekti deyiladi. Issiqlik miqdori Q yoki ΔH belgi bilan ifodalanadi. ΔH va Q bir-biriga teskari $Q = -\Delta H$ holda bo'ladi.

Issiqlik ajralishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalar – ekzotermik reaksiyalar deyiladi. Bunda tenglama oxirida $+Q$ yoki $-\Delta H$ belgisi qo'yiladi.





Issiqlik yutilishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalar – endotermik reaksiyalar deyiladi. (endo – ichkarida) tenglama oxiriga $-Q$ yoki $+\Delta H$ belgisi qo'yiladi.





Reaksiyaning issiqlik effekti ΔH – entalpiya farqi orqali topiladi.



Moddaning hosil bo'lish issiqligi (ΔH_{298}) – standart holatda oddiy moddalardan 1 mol birikma hosil bo'lganda ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik miqdoriga aytiladi.

Standart holat – moddaning 1 atm, 0°C (yoki 298.15 K va 101,325 kPa) dagi holatiga aytiladi.

Standart holatda oddiy moddalarning hosil bo'lish issiqligi 0 ga teng.

Masala

1. Ammiakning hosil bo'lish issiqligi 45 kJ/mol bo'lsa, qanday massadagi ammiak hosil bo'lganda 900 kJ issiqlik ajraladi?


Berilgan:

$$\Delta H_{\text{hosil}} = 45 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H = 900 \text{ kJ}$$

$$m = ?$$

Yechish: Moddaning hosil bo'lish issiqligi bu 1 mol modda hosil bo'lganda ajraladigan yoki yutiladigan energiya miqdori edi. Amiak hosil bo'lish reaksiyasida 2 mol ammiak hosil bo'ladi shuning uchun 45 ni 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 90 kJ issiqlik chiqar ekan.



$$\begin{array}{ccc} 34 \text{ g} & & 90 \text{ kJ} \\ X = ? & \begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \nearrow \searrow \end{array} & 900 \text{ kJ} \end{array}$$

$$X = \frac{900 \text{ kJ} \cdot 34 \text{ g}}{90 \text{ kJ}} = 340 \text{ g amiak hosil bo'lganda } 900 \text{ kJ}$$

issiqlik ajraladi.

2. NO ning hosil bo'lish issiqligi -156 kJ, 50 l NO hosil bo'lganda yutiladigan issiqlikni aniqlang?

Berilgan:


$$\Delta H_{\text{hosil}} = -156 \text{ kJ/mol}$$

$$V = 50 \text{ l}$$

$$\Delta H = ?$$

Yechish:

Moddaning hosil bo'lish issiqligi bu 1 mol modda hosil bo'lganda ajraladigan yoki yutiladigan energiya miqdori edi. NO hosil bo'lish reaksiyasida 2 mol NO hosil bo'ladi. Shuning uchun -156 kJ ni 2 ga ko'paytiramiz. Demak 312 kJ issiqlik chiqar ekan.



$$\begin{array}{rcl} 44.8 \text{ l} & & 312 \text{ kJ} \\ 50 \text{ l} & \times & X = ? \end{array}$$

$$X = \frac{50 \text{ l} \cdot 312 \text{ kJ}}{44.8 \text{ l}} = 348.2 \text{ kJ issiqlik kerak bo'ladi.}$$

3. 40 ta metan molekulasini hosil bo'lganda ajraladigan issiqlik miqdorini aniqlang? (metanning hosil bo'lish issiqligi 86 kJ ga teng).


Berilgan:

$$\Delta H_{\text{hosil}} = 86 \text{ kJ/mol}$$

$$N = 40 \text{ ta}$$

$$\Delta H = ?$$

Yechish:



$$\begin{array}{rcl} 6.02 \cdot 10^{23} & & 86 \text{ kJ} \\ 40 \text{ ta} & \times & X = ? \end{array}$$

$$X = \frac{40 \text{ ta} \cdot 86 \text{ kJ}}{6.02 \cdot 10^{23}} = 57128 \cdot 10^{-23} = 57128 \cdot 10^{-21} \text{ kJ issiqlik chiqadi.}$$

Gess qonuni

1840 –yilda rus kimyogari Gess tomonidan kashf etilgan.



Reaksiyaning issiqlik effekti - jarayonining qanday usulda olib

borilishiga bog'liq emas, balki faqat reaksiya da ishtirok etayotgan moddalarning dastlabki va oxirgi holatiga bog'liq.

Masalan:




Aslida ikki bosqichda sodir bo'ladi.



$$\text{Bu holda } Q = Q_1 + Q_2$$

Buni shunday tushinamiz reaksiyaning issiqlik effekti faqat sistemaning boshlang'ich va oxirgi holatiga bog'liq bo'lib, oraliq bosqichlarga bog'liq bo'lmaydi, quyidagicha ifodalash mumkin



$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{\text{umumiy}}$$

Moddalarning hosil bo'lish issiqligi asosida reaksiyaning issiqlik effektini, yoki issiqlik effekti asosida moddaning hosil bo'lish issiqligini topish mumkin.

Gess qonunidan quyidagi hulosani chiqaramiz - Kimyoviy reaksiyaning issiqlik effekti reaksiya mahsulotlarining hosil bo'lish issiqliklari yig'indisidan reaksiya uchun olingan dastlabki moddalarning hosil bo'lish issiqliklari yig'indisini ayirmasiga teng.

$$\Delta H = \sum \Delta H^{\circ}_{\text{mahsulot}} - \sum \Delta H^{\circ}_{\text{dastlabki mahsulot}}$$

Σ - jami (yig'indi).

Masalan:

Oddiy moddalarning hosil bo'lish issiqligi "0" ga teng.

Masala

1. NO ning hosil bo'lish issiqligi -130 kJ/mol NO₂ ning hosil bo'lish issiqligi 90 kJ/mol bo'lsa,

NO + 1/2 O₂ = NO₂ reaksiyaning issiqlik effektini aniqlang?

$$n = \frac{V}{V_n} = \frac{28l}{22.4l} = 1.25 \text{ mol } \text{CH}_4 \text{ ni } X \text{ mol deb olamiz.}$$

$\text{CH}_4 - 408 \text{ kJ}$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & \times & 804 \text{ kJ} \\ X \text{ mol} & \times & 804X \text{ kJ} \end{array}$$

$\text{NH}_3 - 1532 \text{ kJ/mol}$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & \times & 383 \text{ kJ} \\ 1.25 - X & \times & 1000 - 804X \end{array}$$

$$600 - 804X = 383(1.25 - X)$$

$$600 - 804X = 478.75 - 383X$$

$$121.25 = 421X$$

$$X = 0.288 \text{ mol } \text{CH}_4$$

$$1.25 \text{ mol} - 0.288 \text{ mol} = 0.962 \text{ mol } \text{NH}_3$$


$$V = n \cdot V_n = 0.288 \text{ mol} \cdot 22.4l = 6.45l \text{ } \text{CH}_4$$

$$V = n \cdot V_n = 0.962 \text{ mol} \cdot 22.4l = 21.55l \text{ } \text{NH}_3$$

LABORATORIYADA BAJARILADIGAN ISHLAR

Tajriba 4.1- rasmda tasvirlangandek soddalashtirilgan kalorimetrdan bajariladi.

Kalorimetrning ichki stakaniga 50 ml suv quyib va uni termometr va aralashtirgich o'rnatilgan qopqoq bilan berkiting. Aralashtirgich bilan suvni aralashtirib xamda suvning xaroratini yozib oling va uni t_1 bilan belgilang. O'qituvchining ko'rsatmasi bilan kukun xoligacha maydalangan tuzdan 0.04 mol texnik kimeviy tarozida tortib oling va uni



4.1-rasm. Soddalashtirilgan kalorimetr.

1-tashqi stakan, 2- ichki stakan, 3- qopqoq, 4-termometr, 5- aralashtirgich, 6- voronka.

kalorimetrlning ichki stakanidagi voronka yordamida o'ziga soling. Tuzni aralashtirgich orqali aralashtirib eriting. Tuzningda to'liq erigach, eritmaning termometr ko'rsatgan xaroratini yozib oling va uni t_2 bilan belgilang.

Tajriba natijalarini xisobot jadvaliga yozing va tuzning erish issiqligini xisoblang. Tuzning erish issiqligining nazariy qiymatini jadvalda berilgan.

Moddalarning 18°C dagi erish issiqlik effektlari 4.1-jadval

Moddalar	Erish issiqligi		Moddalar	Erish issiqligi	
	Kkal	kJ		kkal	kJ
KNO ₃	-8,54	-35,75	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	-4,28	-17,9
NaNO ₃	-5,04	-21,08	ZnSO ₄	+18,54	+77,59
NH ₄ NO ₃	-6,42	-26,90	CuSO ₄ ·5H ₂ O	-2,80	-11,7
K ₂ SO ₄	-6,42	-26,88	Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	-18,76	-78,51
NH ₄ Cl	-3,89	-16,30	CuSO ₄	+15,90	+66,54
Na ₂ CO ₃	+5,63	+23,60	H ₂ SO ₄	+18,09	+75,70
Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O	-15,91	-66,58	HNO ₃	+7,45	+31,16
NaOH	+10,10	+42,24	KOH	+12,70	+53,18

Neytrallanish reaksiyasining issiqlik effektini aniqlash.

O'qituvchidan topshiriq olib neytrallanish reaksiyasining termokimeviy tenglamasini yozing.

Kalorimetrlning ichki stakaniga byuretkadan kerakli xajm 1 M ishqor eritmasidan quyning va unga termometr tushuring, undagi ishqor eritmasining (t_1) xaroratini o'lchang. Boshqa quruq stakanga byuretkadan bir xil hajmdagi 1 M kislota eritmasidan quyning. So'ngra uni voronka orqali kalorimetrlning ichki stakandagi ishqor eritmasiga quyning va aralashtirgich bilan yaxshilab aralashtiring. Neytrallanish reaksiyasi nihoyasiga etib, xarorati ortishi to'xtagandan keyin eritmaning maksimal xaroratini (t_2) yozib oling.

Natijalarni xisoblash jadvaliga yozing va neytrallanish reaksiyasining issiqlik effektini xisoblang.

Nazorat savollari

1. Oddiy moddalardan SO_2 hosil bo'lganda 112 l kislorod sarflandi va 900 kJ issiqlik ajraldi. SO_2 ning hosil bo'lish issiqligini aniqlang?

Javobi: $\Delta H_{\text{hosil}} = 270 \text{ kJ/mol}$

2. Ammiak hosil bo'lish reaksiyasida 168 l vodorod ishtirokida ammiak hosil qilinganda 225 kJ energiya ajraldi. Ammiakning hosil bo'lish issiqligini aniqlang? Javobi: $\Delta H_{\text{hosil}} = 45 \text{ kJ/mol}$

3. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ reaksiyada ammiakning hosil bo'lish issiqligi 45 kJ/mol bo'lsa, jarayonda 20 ta vodorod molekulasini ishtirok etsa qancha energiya ajralishini aniqlang?

Javobi: $\Delta H_{\text{hosil}} = 9.96 \cdot 10^{-22} \text{ kJ/mol}$

5.0.KIMYOVIY KINETIKA

Kimyoviy reaksiya tezligi, kimyoviy muvozanat va ularga ta'sir etuvchi omillar, sistemaning faollanish energiyasi va boshqalar kimyoviy kinetikada o'rganadi.

Kimyoviy reaksiya tezligi.

Kimyoviy reaksiyaning tezligi – kimyoviy reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning konsentratsiyasining vaqt birligi ichida o'zgarishiga aytiladi. Kimyoviy reaksiya tezligi harfi bilan belgilanadi. Kimyoviy reaksiyaning tezlikni quyidagi fo'rmla asosida topamiz.

$$V_{o'rtacha} = \frac{C_1 - C_2}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta C}{\Delta t} \quad \text{Bunda } C_M = \frac{n}{V} \quad \text{bo'lgani uchun}$$

$$V_{o'rtacha} = \frac{\Delta n}{V \cdot \Delta t} \quad \text{tarzida ham yozsak bo'ladi. Bu fo'rmulada}$$

$\vartheta_{o'rtacha}$ – reaksiyaning o'rtacha tezligi (mol/l (s, min, soat)).

ΔC – konsentratsiyalarning farqi.

Δt – o'tgan vaqt (s, min, soat).


$C_1; C_2$ - avvalgi va keyingi konsentratsiyalar (mol/l).

C_M – molyar konsentratsiya (mol/l).

Δn – modda miqdorining o'zgarishi (mol).

V – reaksiya olib borilayotgan idish (reaktor) hajm (l, m³).

Kimyoviy reaksiyaning tezligini masala ishlash orqali tushuntiramiz.



1. 10 min davomida modda konsentratsiyasi 3 mol/l dan 1 mol/l gacha kamaygan bo'lsa, reaksiyaning tezligini (mol/l min) da aniqlang?

2.
Berilgan:

$$\Delta t = 10 \text{ min}$$

$$C_1 = 3 \text{ mol/l}$$

$$C_2 = 1 \text{ mol/l}$$

$$V_{\text{o'rtacha}} = ?$$

Yechish:

Reaksiya tezlikni topish fo'mulaga qo'yamiz.

$$V_{\text{o'rtacha}} = \frac{C_1 - C_2}{\Delta t} = \frac{3 \text{ mol/l} - 1 \text{ mol/l}}{10 \text{ min}} = \frac{2 \text{ mol/l}}{10 \text{ min}} = 0.2 \text{ mol/l min ga teng.}$$

3. Raksiyaning tezligi 0.3 mol/l min ga teng. Shu reaksiya 7 min da modda konsentratsiyasi qanchaga o'zgaradi. Yani ΔC ni aniqlang?

Berilgan:

$$V_{\text{o'rtacha}} = 0.3 \text{ mol/l min}$$

$$\Delta t = 7 \text{ min}$$

$$\Delta C = ?$$

Yechish:

Quyidagi fo'muladan foydalanamiz.

$$V_{\text{o'rtacha}} = \frac{\Delta C}{\Delta t} \text{ dan } \Delta C \text{ ni topamiz.}$$

$$\Delta C = V_{\text{o'rtacha}} \cdot \Delta t = 0.3 \text{ mol/l} \cdot \text{min} \cdot 7 \text{ min} = 2.1 \text{ mol/l ga teng.}$$

4. Reaktrda moddanning konsentratsiyasi 30 sek ichida 6.8 mol/l dan 3.4 mol/l gacha kamaysa, shu reaksiyaning tezkigini (mol/l sek) da aniqlang?

Berilgan:

$$\Delta t = 30 \text{ sek}$$

$$C_1 = 6.8 \text{ mol/l}$$

$$C_2 = 3.4 \text{ mol/l}$$

$$V_{\text{o'rtacha}} = ?$$

Yechish:

O'rtacha tezlikni topish fo'rmulaga qo'yamiz.

$$V_{o'rtacha} = \frac{C_1 - C_2}{\Delta t} = \frac{6.8 \text{ mol/l} - 3.4 \text{ mol/l}}{30 \text{ sek}} = 0.1133 \text{ mol/l} \cdot \text{sek ga teng.}$$

5. Hajmi 2 l bo'lgan idishda A gazning 4.5 mol miqdori B gazning 3 mol miqdori bilan aralashtirildi. A va B gazlar $A + B = C$ tenglamaga muvofiq reaksiyaga kirishadi. 20 soatdan so'ng sistemada miqdori 2 mol bo'lgan C gaz hosil bo'ldi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini (mol/l soat) da aniqlang?

Berilgan:

Vidish=2 l

n(A)=4.5 mol

n(B)=3 mol

$\Delta t = 20$ soat

n(C)=2 mol

Vo'rtacha=?

Yechish:

$\Delta n = 2$ mol gat eng. Chunki 20 soat ichida 2 mol C modda hosil bo'ldi. Shuning uchun ham $\Delta n = 2$ mol gat eng. Bunda A va B gazlarning modda miqdorini hisoblashning ham keragi yo'q.

$$V_{o'rtacha} = \frac{\Delta n}{V \cdot \Delta t} = \frac{2 \text{ mol}}{2 \text{ l} \cdot 20 \text{ soat}} = 0.05 \text{ mol/l} \cdot \text{soat}$$

5.1. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar

Kimyoviy reaksiyaning tezligiga qator omillar ta'sir etishi o'rganilgan.

Moddalarning tabiatiga: ta'sirlashuvchi maddalarning tabiati bir-biridan qanchalik farq qilsa, reaksiya shunchalik tez sodir bo'ladi. Masalan: kislota asos bilan kuchli kislota kuchsiz kislota ga nisbatan tezroq reaksiyaga kirishadi.

Konsentratsiyaga: gazlarda va suyuq eritmalarda erigan yoki tarqalgan moddalar butun hajm bo'ylab reaksiyaga kirishida konsentratsiya qanchalik yuqori bo'lsa, reaksiyaning tezligi ham shunchalik katta bo'ladi. Chunki, zarrachalarning to'qnashish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi.

Qattiq moddalarda reaksiyada to'qnashuvchi yuzaga bog'liq: yuza qanchalik katta bo'lsa, ko'proq zarrachalar bir-biri bilan to'qnashadi va reaksiya shunchalik tez sodir bo'ladi. Bir necha fazadan iborat sistema geterogen sistema deb ataladi. Ularda sodir bo'ladigan

reaksiyalar geterogen reaksiyalar deyiladi. Geterogen reaksiyaning tezligi deganda, vaqt birligi ichida fazalar chegarasidagi sirtidagi reaksiyaga kirishuvchi yoki reaksiya natijasida hosil bo'luvchi moddalar miqdori o'zgarishini tushunamiz:

$$v_{get} = \frac{\Delta n}{S \cdot \Delta t}$$

bu yerda: S — fazalar chegara sirtining kattaligi, Δn — sistemada modda mol sonlarining o'zgarishi, v_{get} — geterogen reaksiya tezligi. Tenglamadan ko'rinadiki, sistemada reaksiya fazalar chegara sathidagina bo'lganligi bois, bu sath qanchalik katta bo'lsa, reaksiya tezligi ham shunchalik katta bo'ladi. Demak, qattiq moddalar maydalangan holda reaksiyaga tezroq kirishadi. Masalan: 1 kg toza bir bo'lak oxaktosh bilan mo'l miqdordagi HCl ning orasidagi reaksiya sekin sodir bo'ladi. Chunki, oxaktosh bir butun bo'lak holoda turibdi. Agarda shu bo'lakni maydalasak reaksiyaning borishi shunchalik tez sodir bo'ladi. Yani oxaktoshni 1000 bo'lakga bo'lsak reaksiya birinchiga niabatan 1000 marta tez sodir bo'ladi.

Temperatura: harorat ortganda zarrachalarning harakat tezligi tezlashadi. Bunda zarrachlarning to'qnashish ehtimolligi va to'qnashganda birikma hosil qilish ehtimolligi ortadi.

Katalizator: dastlabki moddalar bilan aktiv oraliq kompleks hosil qiladi. Katalizator shu oraliq kompleks hisobiga reaksiyaning aktivlanish energiyasini pasaytiradi va reaksiyaning borishini tezlashtiradi.

Bosim: bosim o'zgarganda gaz moddalarning ham konsentratsiyasi ham o'zgaradi. Suyuq va qattiq moddalarga bosim ta'sir etmaydi. Bosim qanchaga o'zgarsa, gaz moddalarning ham konsentratsiyasi shunchaga o'zgaradi.

5.2. Konsentratsiyaning reaksiya tezligiga ta'siri (massalar ta'siri qonuni).

Demak kimyoviy reaksiyaning tezligi o'zaro tasirlashayotgan moddalar konsentratsiyalari ko'paytmasiga to'g'ri proportsionalligi ma'lum bo'ladi. Bu hulosaga **massalar ta'siri qonuni** deyiladi.

Geterogen kimyoviy reaksiyalar tezligi bilan reaksiyaga kirishuvchi moddalarning konsentratsiyasi o'rtasidagi bog'lanish massalar ta'siri qonuni bilan ifodalanadi. Masalan, A modda B modda bilan o'zaro reaksiyaga kirishib, bir xil fazada C moddani hosil qilsa: $aA + bB = cC$. Ushbu reaksiya uchun massalar ta'siri qonunining matematik ifodasi quyidagichadir:

$$v = k[A]^a[B]^b$$


bu reaksiyadan, v — reaksiya tezligi, $[A]$, $[B]$ — A va B moddalarning molyar konsentratsiyalari, a, b — moddalarning koeffitsienti, k — tezlik konstantasi (proporsionallik koeffitsiyenti) kimyoviy reaksiyaning tezlik konstantasi reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyasiga bog'liq emas, aksincha reaksiyaga kirishaayotgan moddalarning moddalar tabiatiga va reaksiyaning borosh sharoiti temperatura, bosim, katalizatorga bog'liq.

Geterogen sistemada kimyoviy reaksiyalarning tezligiga qattiq moddalarning umumiy konsentratsiyasi ta'sir etmaydi. Chunki, geterogen sistemada gaz va qattiq modda molekularining to'qnashuvi faqat fazalar chegarasidagina sodir bo'ladi. Shuning uchun, bu kattalik massalar ta'siri qonuni tenglamasiga kiritilmaydi.

Quyidagi reaksiyalar uchun reaksiya tezlini topamiz.



tarzida bo'ladi chunki qattiq moddalarning konsentratsiyasi olinmaydi. Chunki ularda faqat reaksiya sirt yuzasida bo'ladi.



ko'rinishiga ega bo'ladi.

Sistemadagi bosimning ozgarishi konsentratsiyaga to'g'ri proportsional shuning uchun reaksiya tezligi bosim orqali ifodalaymiz.

$$v = k \cdot P_{C_2H_2} \cdot P_{H_2}^2$$

hajmning o'zgarishi esa konsentratsiyaga teskari proportsionaldir.

Masalalar: 1. $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ reaksiyada tezlik konstantasi 0.5 mol/lsek, N_2 ning konsentratsiyasi 0.2 M, H_2 ning konsentratsiyasi 0.3 M bo'lganda reaksiya tezligini aniqlang?

Berilgan:

$$k = 0.5 \text{ mol/lsek}$$

$$[H_2] = 0.2 \text{ M}$$

$$[N_2] = 0.3 \text{ M}$$

$$V = ?$$

Yechish:

Fo'rmuladan foydalanib topamiz:

$$V = k[N_2][H_2]^3 = 0.5 \text{ mol/lsek} \cdot 0.2 \text{ M} \cdot 0.3^3 \text{ M} = 0.0027 \text{ mol/l sek}$$

ga teng.

2. Quyidagi reaksiyaning $NO + O_2 = NO_2$ reaksiyaning tezligi 0.3 mol/lsek ga teng. NO va O_2 laening konsentratsiyalari 0.5 va 0.6 M bo'lgandagi tezlik konstantasini aniqlang?

Berilgan:

$$V = 0.3 \text{ mol/lsek}$$

$$[NO] = 0.5 \text{ M}$$

$$[O_2] = 0.6 \text{ M}$$

$$k = ?$$

Yechish:

$NO + O_2 = NO_2$ quyidagi reaksiya tenglashtiramiz.

$2NO + O_2 = 2NO_2$ va reaksiya tezligi quyidagicha bo'ladi.

$$V = k [NO]^2 [O_2] \text{ fo'rmuladan } k \text{ ni aniqlaymiz.}$$

$$0.3 \text{ mol/lsek} = k [0.5 \text{ M}]^2 [0.6 \text{ M}]$$

$$k = \frac{0.3 \text{ mol/lsek}}{[0.5 \text{ M}]^2 [0.6 \text{ M}]} = 2 \text{ mol/lsek ga teng}$$

3. Quyidagi reaksiyaning $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ reaksiyada NO va O_2 larning konsentratsiyalari 2 martadan oshirilgan bo'lsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi?

Yechish: Agar moddalarning konsentratsiyalari 2 martadan oshirilgan bo'lsa, k ni berilmasa 1 ga teng deb olamiz.

$$V = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] = 1 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \text{ marta tezlashadi}$$

4. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ quyidagi sistemada bosim 3 marta ortirilsa, reaksiya tezligi necha marta ortadi?

Yechish: Sistemada bosim 3 marta ortgan bo'lsa. Demak konsentratsiya ham 3 marta ortgan. Shuning uchun reaksiya tezlashgan. k ning qiymati 1 ga teng.

$$V = k[\text{H}_2]^2[\text{O}_2] = 1 \cdot 3^2 \cdot 3 = 27 \text{ marta tezlashadi}$$

5. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{SO}_3$ quyidagi sistemada hajm 2 marta kamaytirib. kislorod o'miga havo ishlatilsa reaksiyaning tezligi qanday o'zgaradi?

Yechish:

Hajm bilan konsentratsiya teskari proportsional edi. Shunga asosanib sistemada hajm 2 marta kamaysa demak konsentratsiya 2 marta ortadi. Tezlik ham ortgan quyidagicha

$$V = k[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2] = 1 \cdot 2^2 \cdot 2 = 8 \text{ marta tezlashgan.}$$

Lekin, kislorod o'miga havo ishlatilsa, tezlik kamayadi chunki havo tarkibida kislorod 20% ni tashkil qiladi. Kislorodning konsentratsiyasi sof 100% li kisloroddan tarkibida 20% kislorod bo'lgan havoga o'zgardi. Yani 5 marta kamayganini bildiradi. Demak, kislorodning konsentratsiyasi 5 marta kamaydi.

$$V = k[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2] = 1 \cdot 1^2 \cdot 5 = 5 \text{ marta sekinlashadi.}$$

Reaksiya 8 marta tezlashib 5 marta sekinlashasa, reaksiyaning tezligi 1,6 marta tezlashgan.

6. Ushbu $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 = 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ reaksiyada kislorodning konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi?

Yechish. Reaksiya tezligining konsentratsiyaga bog'liqligi: $v_1 = k[\text{NH}_3]^4[\text{O}_2]^5$

Kislorodning konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa:

$$v_2 = K[NH_3]^3[O_2] = 243K[NH_3][O_2]$$

Tezliklar nisbatini topamiz:

Demak, reaksiya tezligi 243 marta ortadi

7. $2CO + O_2 = 2CO_2$ reaksiyasida bosim 2 marta va kislorod konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa reaksiya tezligi qanday o'zgaradi?

Yechish. Reaksiyaning boshlang'ich tezligi:


$$v_{boshlang'ich} = k[O_2]^2[CO]$$

Bosim 2 marta oshirilsa, CO va O_2 konsentratsiyalari 2 marta ortadi, O_2 ning konsentratsiyasi yana 3 marta orttirilsa, unda:

$$v_{boshlang'ich} = k[CO]^2[O_2] = 1 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$$

marta rezlashgan.

8. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyalari $[NO] = 0,3$ mol/l va $[O_2] = 0,15$ mol/l bo'lgan quyidagi kimyoviy reaksiya tezligi $1,2 \cdot 10^{-3}$ mol/l · sek. Quyidagi reaksiya uchun tezlik konstantasini aniqlang:



Yechish. Massalar ta'siri qonuniga ko'ra:

$$v_{boshlang'ich} = k[NO]^2[O_2]$$

$$1,2 \cdot 10^{-3} = k[0,3]^2[0,15]$$

$$1,2 \cdot 10^{-3} = k \cdot 0,0135$$

$$k = 88,9 \cdot 10^{-3} = 8,89 \cdot 10^{-2}$$

Demak, $k = 8,9 \cdot 10^{-2}$ ga teng.

5.3. Temperaturaning ta'siri

Temperaturaning ortishi reaksiyaning tezligining ortishiga sabab bo'ladi. Vant-Goff qonuni buning isbotidir. Quyidagicha ta'riflanadi.

Temperatura har 10°C ga o'tm ganda reaksiyaning tezligi 2-4 marta o'rtacha 3 marta tezlashadi

Bu qonuning matematik ifodasini quyidagicha: $V_2 = V_1 \cdot \gamma^{10}$ yozamiz.

- t_1 - boshlang'ch va oxirgi temperatura ($^{\circ}\text{C}$).
- birinchi va ikkinchi temperaturadagi tezligi.
- γ - reaksiyaning temperatura koeffitsienti.
- 10 - o'zgarmas son.

Masalalarda har doim birinchi berilgan temperaturani t_1 deb olamiz.

Reaksiya tezligining temperatura o'zgarishi bilan o'zgarishini S. Arrenius yaratgan faollanish nazariyasi asosida tushuntirish mumkin. Temperaturaning ko'tarilishi reaksiya tezligining ortishiga olib keladi, bu esa reaksiya tezligi konstantasining ortishiga bog'liq. O'z navbatida reaksiya tezligi konstantasi faollanish energiyasiga bog'liq. Molekulalar kimyoviy ta'sirlanishga uchrashi uchun o'rtacha energiyadan ko'proq kinetik energiyaga ega bo'lishi kerak. Bu energiya faollanish energiyasi deyiladi. Bunday energiyaga ega bo'lgan molekulalar faol molekulalar hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyalar vaqtida har doim energiya to'sig'i yengiladi, uning cho'qqisida reaksiyaning oraliq mahsuloti — faollangan kompleks hosil bo'ladi. Faollanish energiyasi — reaksiyaga kirishayotgan moddalarni faol kompleksdan ajratib turadigan energiya to'sig'idir. Faollanish energiyasi juda yuqori bo'lganda, energiya to'sig'ini yenga oladigan molekulalar soni kam, reaksiya tezligi esa juda kichik bo'ladi. Reaksiya tezligi konstantasining faollanish energiyasiga bog'liqligi - iii Arreniusning quyidagi tenglamasi ifodalaydi:

$$K = Z \cdot p e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

bu yerda: Z — hajm birligidagi molekulaning 1 sekunddagi to'qnashuvlar soni; e — natural logarifm ($e = 2,7156\dots$); R — universal gaz doimiysi ($R = 8,31 \text{ J/mol K}$); T — mutlaq temperatura, K ; p — to'qnashayotgan molekulalar oriyentatsiyasiga bog'liq sterik ko'paytuvchi.

Arrhenius tenglamasining boshqa ko'rinishlari ham ma'lum masalan,

$$\lg \frac{K_2}{K_1} = \frac{E_a}{2.303} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Bu yerda E_a — faollash energiyasi; K_1, K_2 — berilgan (T_1) va berilgan (T_2) temperaturadagi reaksiya tezligi konstantasi.

1.50°C da reaksiyaning tezligi 4 mol/lsek ga teng. Shu reaksiyaning 80°C dagi tezligini aniqlang? Temperatura koeffitsienti 3 ga teng.

Berilgan:

$t_1 = 50^\circ\text{C}$

$t_2 = 80^\circ\text{C}$

$V_{t_1} = 4 \text{ mol/lsek}$

$\gamma = 3$

$V_{t_2} = ?$

Yechish:

Bizga hamma ko'rsakgichlar berilgan V_{t_2} ni topamiz.

$$V_{t_2} = V_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}} = 4 \text{ mol/l} \cdot \text{sek} \cdot 3^{\frac{80^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}}{10}} = 108 \text{ mol/l} \cdot \text{sek ga}$$

teng bo'ladi.

2. Reaksiyaning temperatura koeffitsienti 3 bo'lganda reaksiyani 50°C dan necha °C ga ko'tarilganda reaksiyaning tezligi 81 marta tezlashadi?

Berilgan:

$\gamma = 3$

$t_1 = 50^\circ\text{C}$

$V_{t_2} = 81$

$V_{t_1} = 1$

$t_2 = ?$

Yechish: Quyidagi formulaga qo'yamiz.

$$V_2 = V_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

$$V_2 = V_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

$$81 = 1 \cdot 3^{\frac{x - 50^\circ C}{10}}$$

$$3^4 = 3^{\frac{x - 50^\circ C}{10}}$$

Asos bir hil bo'lmagani uchun tashlab yuboramiz va quyidagi holat yuzaga keladi

$$4 = \frac{x - 50^\circ C}{10} \quad 4 \cdot 10 = x - 50^\circ C$$

$$40 = x - 50^\circ C$$

$$x = 40 + 50 = 90^\circ C \text{ ga ko'tarishimiz kerak ekan.}$$

3. Reaksiyaning temperatura koeffitsenti 2 bo'lganda, temperatura $20^\circ C$ dan $50^\circ C$ gacha isitilsa reaksiyaning tezligi necha marta ortadi?

Berilgan:

$$t_1 = 20^\circ C$$

$$t_2 = 50^\circ C$$

$$V_1 = 1$$

$$\gamma = 2$$

$$V_2 = ?$$

Yechish:

Bizga hamma ko'rsakgichlar berilgan V_1 ni topamiz.

$$V_2 = V_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}} = 1 \cdot 2^{\frac{50^\circ C - 20^\circ C}{10}} = 2^3 = 8 \text{ marta tezlashadi}$$

Temperatura ortganda reaksiya tezlashadi. Reaksiyaning davom etish vaqti qisqaradi. Buni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz.

$$T_1 = T_2 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

T_1 va T_2 - birinchi va ikkinchi temperaturada reaksiyaning davom etish vaqt (sek, min, soat).

4 50°C da reaksiya 1 soat davom etadi. Agar temperatura koefitsienti $\gamma = 4$ ga teng bo'lganda reaksiya 100°C da qancha vaqtda tugaydi?

Berilgan:

$$t_1 = 50^\circ\text{C}$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C}$$

$$T_1 = 1 \text{ soat}$$

$$\gamma = 4$$

$$T_2 = ?$$

Yechish: 1 soat = 3600sek ga teng. Vaqtga bog'liq fo'rmuladan foydalanamiz.

$$T_1 = T_2 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

$$3600 \text{ sek} = T_2 \cdot 4^{\frac{100 - 50}{10}}$$

$$3600 \text{ sek} = T_2 \cdot 4^5$$

$$3600 \text{ sek} = 1024 \cdot T_2$$

$$T_2 = \frac{3600 \text{ sek}}{1024} = 3.52 \text{ sek da tugaydi.}$$

5. $\gamma = 2$ bo'lganda reaksiya 50°C da 8 min da tugaydi. Reaksiya 2 min da tugashi uchun temperaturani necha °C ga ko'tarish kerak?

Berilgan:

$$t_1 = 50^\circ\text{C}$$

$$T_1 = 8 \text{ min}$$

$$T_2 = 2 \text{ min}$$

$$\gamma = 2$$

$$t_2 = ?$$

Yechish:

Reaksiyaning tezligining ortishi temperaturaning ko'tarishini talab qiladi. Temperaturani necha °C ga ko'tarishni aniqlaymiz.

$$T_1 = T_2 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

$$8 \text{ min} = 2 \text{ min} \cdot 2^{\frac{x - 50}{10}}$$

$$\frac{8 \text{ min}}{2 \text{ min}} = 2^{\frac{x - 50}{10}}$$

$$4^1 = 2^{\frac{x - 50}{10}}$$

Bir hil a₀ ni tashlab yuboramiz.

$$1 = \frac{X - 50^{\circ}\text{C}}{10}$$

$$10 = X - 50^{\circ}\text{C}$$

$X = 60^{\circ}\text{C}$ ga o'zgartirishimiz kerak.

6. 100°C da birinchi reaksiyaning $\gamma = 2$, ikkinchi reaksiyaning $\gamma = 4$ bo'lganda reaksiyalarning tezliklari bir hil. Qanday temperaturadan keyin ikki reaksiyalarning tezliklari ikki marta farq qiladi?

Berilgan:

$$t_1 = 100^{\circ}\text{C}$$

$$\gamma = 2$$

$$\gamma = 4$$

$$\frac{V^2_{t_2}}{V^1_{t_1}} = 2$$

$$t_2 = ?$$

Yechish:

Birinchi reaksiya quyidagicha bo'ladi.

$$V^1_{t_1} = V_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_1 - t_0}{10}}$$

$$V^1_{t_1} = 1 \cdot 2^{\frac{X - 100^{\circ}\text{C}}{10}}$$

Ikkinchi reaksiyaning tezligi quyidagicha bo'ladi.

$$V^2_{t_2} = V_{t_2} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_0}{10}}$$

$$V^2_{t_2} = 1 \cdot 4^{\frac{t_2 - 100^{\circ}\text{C}}{10}}$$

$$\frac{V^2_{t_2}}{V^1_{t_1}} = 2 \text{ bunda ko'rinib turibdiki birinchi va ikkinchi}$$

reaksiyalarning tezliklari nisbati 2 ga teng. Yani ikki marta farq qilish kerak.

$$\frac{4^{\frac{t_2 - 100^{\circ}\text{C}}{10}}}{2^{\frac{X - 100^{\circ}\text{C}}{10}}} = 2$$

$$4^{\frac{t_2 - 100^{\circ}\text{C}}{10}} = 2 \cdot 2^{\frac{X - 100^{\circ}\text{C}}{10}}$$

$$2^{\frac{t_1 - 100}{10}} = 2^{\frac{t_2 - 100}{10}}$$

$$2^{\frac{200 - 200}{10}} = 2^{\frac{t_2 - 90}{10}} \text{ asoslarini tashlaymiz.}$$

$$\frac{200 - 200}{10} = \frac{t_2 - 90}{10}$$

$$200 - 200 = t_2 - 90$$

$$t_2 = 110^\circ \text{C}$$

110°C da ikkinchi reaksiya birinchisiga qaraganda ikki marta farq qiladi.

5.4. Katalizator tasiri

Katalizatorlar yordamida kimyoviy reaksiyaning tezligini o'zgarishi jarayoniga – **kataliz** deyiladi.

Reaksiyaning tezligi faqat zarrachalarning to'qnashish tezligiga bog'liq emas. balki ularning faollanish (aktivlanish) energiyasiga ham bog'liq.

Reaksiya sodir bo'lishi uchun yetarli bo'ladigan eng kam energiya miqdori – **faollanish energiyasi** deyiladi. Faollanish energiyasi qancha kichik bo'lsa, reaksiya shuncha tez sodir bo'ladi. Reaksiyas uchun 40 kJ/mol energiya sarflansa reaksiya **juda tez** sodir bo'ldi. 40-120 kJ/mol o'rtacha **tez**, undan katta bo'lganda sekin sodir bo'ladi.

Ionlarning faollanish energiyasi juda kichik bo'lganligi uchun ion almashinish reaksiyalari tezligi juda katta bo'ladi. Katalizatorning ta'sir mohiyati sistemaning faollanish energiyasini kamaytiradi ya'ni katalizator dastlabki moddalar bilan ta'sirlashib aktiv oraliq kompleks hosil qiladi.

Reaksiya tezligini o'zgartirib, o'zi kimyoviy jihatdan o'zgarmaydigan moddalar **katalizatorlar** deyiladi. Ularning xususiyatli tomoni shundaki, ular reaksiya davomida sarf bo'lmaydi va shuning uchun


oxirgi mahsulot tarkibiga kirmaydi. Ularning ikkinchisi, ajralib chiqadigan o'ziga xosligi kimga qoviy muvozanatga ta'sir qiluvchisidir. Katalizatorlar ishtirokida boradigan reaksiyalar **katalitik reaksiyalar** deyiladi. Katalitik reaksiyalarni o'rganuvchi ta'lim **kataliz** deyiladi. Kataliz ikki hil bo'ladi.

Gomogen kataliz – katalizator va reaksiyaga kirishayotgan moddalar bir jinsli aralashma hosil qiladigan bo'llishi.

Geterogen kataliz - katalizator va reaksiyaga kirishayotgan moddalar bir jinsli bo'lmagan aralashma hosil qilgan katalizatorlarga aytiladi.


Masalan: Sulfat kislota ishlab chiqarishning ikki usuli bor ular nitroza va kantak usullaridir.

Nitroza usulida katalizator NO bo'ladi.



bunda reaksiyaga kirishayotgan moddalar ham katalizator ham gaz moddalardi shuning uchun bu kataliz gomogen bo'ladi.

Kantak usulida esa katalizator V_2O_5 dan foydalaniladi.




bunda reaksiyaga kirishuvchi moddalar gaz holatda katalizator esa qattiq modda shuning uchun bu katalizni geterogen kataliz deymiz.

Reaksiya tezligini tezlashtiradigan katalizatorlar musbat, sekinlashtiradigan katalizatorlar **manfiy katalizator** deyiladi.

Ayrim moddalar katalizatorning ta'sirini kamaytiradi yoki butunlay yo'q qiladi, bunday moddalarga **katalitik zaxar** deyiladi. Masalan: amiak sintezida 0.1% oltingugurtning bo'lishi to'rsimon temir katalizatorining ta'sirini to'liq to'htatadi. O'zi katalizator bo'lmay uning aktivligini oshiradigan moddalar – **promotorlar** deyiladi. Masalan, amiak sintezida to'rsimon temir katalizatoriga 2% metaalyuminat kaliy KAlO_2 qo'shilganda uning aktivligi ancha ortadi. Katalizatorning promotorlari K, O, Na, O, Pt, Fe, Ni va boshqalar. Katalizator zaxarlariga esa As, Sb, CN^- , Hg birikmalari kiradi.

Reaksiya tezligini kamaytiradigan moddalarga – **ingibitor** deyiladi. Masalan: H_2O_2 ning parchalanishi MnO_2 ishtirokida tezlashsa, H_2SO_4 ishtirokida sekinlashadi. Bundan tashqari SO_3^{2-} ionlari bo'lgan

moddalar havoda oksidlanib SO_4^{2-} ionlariga aylanib qolmaslik uchun glitserin qo'shib qo'yiladi. Bunda glitserin ingibitor vazifasini bajaradi. Katalizatorning ta'siri ta'rifidan va o'ziga hosdir. Ko'p tajribalardan ko'rinadiki har hil katalizatorlarni bir hil modda o'ziga ta'sir ettirilib har hil mahsulotlar olishi mumkin. Bu ayniqsa organik moddalar bilan boradigan reaksiyalarga juda hosdir. Masalan, Al_2O_3 katalizatori ishtirokida etil spiritining degidratlanishi sodir bo'ladi, mis katalizatori ishtirokida degidridlanishi boradi.





Katalizatorning oz miqdori ham reaksiyani juda tezlashtiradi. Chunki, modda reaksiyasida katalizator juda qisqa vaqt oralig'ida ishtirok etadi. Tirik organizimlardagi katalizatorlar biokatalizatorlar (fermentlaardir) deyiladi.

5.5. Qaytar va qaytmas kimyoviy reaksiyalar

Ohirigacha boradigan va o'zining yo'nalishini temperatura hamda bosimning o'zgarishi bilan o'zgarmaydigan reaksiyalarga – **qaytmas reaksiyalar** deyiladi.

Kimyoviy reaksiyalar qaytmas deb hisoblanadi:



✓ Kam dissotsilanadigan birikma – suv, kuchsiz kislova yoki asos, kompleks tuz chiqsa: $\text{KOH} + \text{HCl} = \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$,



✓ Katta miqdordagi issiqlik ajraladigan (yonish reaksiyalarida):



Ammo kuchsizlik kimyoviy reaksiya qaytar bo'ladi: bir hil sharoitda (P, T kat) ular bir yo'nalishda boradi. Boshqa bir sharoitda – teskari boradi, ayrim oraliq sharoitlarda esa bir vaqtning o'zida ikki o'zaro qarama – qarshi yo'nalishlarda boradi. Masalan:



Chapdan o'nga boradiga reaksiyaga to'g'ri reaksiya, o'ngdan chapga boradigan reaksiyaga teskari reaksiya deyiladi.

Agar to'g'ri reaksiya ekzotermik bo'lsa, teskari reaksiya endotermik bo'ladi. Shu bilan birga energiyaning saqlanish qonuniga muvofiq to'g'ri reaksiyada ajralib chiqqan issiqlik, teskari reaksiyada yutilgan issiqlik miqdoriga teng bo'ladi.

5.6. Kimyoviy muvozanat

Qaytar kimyoviy reaksiyani qaraylik:



$$V_{\text{to'g'ri}} = k[N_2][H_2]^3 \quad (1)$$

$$V_{\text{teskari}} = k[NH_3]^2 \quad (2)$$

Reaksiyaning boshlanishidan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari maksimal, reaksiya mahsuloti konsentratsiyasi juda kichik, shu sababli to'g'ri reaksiya tezligi teskari reaksiya tezligiga nisbatan ancha yuqori. Ammo vaqt o'tishi bilan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari $[N_2]$ va $[H_2]$ kamayib boradi, reaksiya mahsuloti konsentratsiyasi $[NH_3]$ ortadi. 1 va 2 – formulaga muvofiq to'g'ri reaksiya tezligi kamayadi, teskari reaksiya tezligi ortadi va ma'lum vaqt lahzada teskari reaksiya tezligi to'g'ri reaksiya tezligi bilan tenglashadi.

Qaytar reaksiyalarda to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari o'zaro teng bo'lgandagi holat **kimyoviy muvozanat**, muvozanat holatdagi moddalarning konsentratsiyalari esa – **muvozanat konsentratsiya** deyiladi.

Kimyoviy muvozanatda reaksiyalar to'xtamaydi, shuning uchun bunday muvozanat dinamik ya'ni harakatdagi muvozanat deyiladi.

Muvozanat konsentratsiyani odatda muvozanatda bo'lmagan joriy kimyoviy reaksiyalardan $[N_2]$, $[H_2]$ va $[NH_3]$ farq qilishi uchun kiritilgan bo'ladi. Shunday qilib kimyoviy muvozanatda $V_{to'g'ri} = V_{teskari}$ bo'ladi, ya'ni reaksiya uchun $k_2[NH_3]^2 = k_1[N_2][H_2]$ to'g'ri va teskari reaksiyalar tezlik konstantalari nisbatiga – kimyoviy muvozanat konstantasi (K) deyiladi va quyidagicha yozamiz.

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]} = K_{eq}$$

Kimyoviy muvozanatda :

- sistemada hech qanday tashqi o'zgarish kuzatilmaganda ham to'g'ri va teskari reaksiyalar to'xtamaydi;

- vaqt birligida reaksiyaga kirishgan dastlabki moddalarning molekular soni ayni vaqt ichida reaksiya mahsulotlaridan hosil bo'ladigan moddalar molekular soniga teng;

- Moddalardan birining konsentratsiyasini, temperatura yoki bosimning o'zgarishi kimyoviy muvozanatning siljishiga olib keladi ya'ni reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning konsentratsiyasi o'zgaradi.

Agarda:

- reaksiya ishtirok etayotgan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari kamayib, reaksiya mahsulotlarining konsentratsiyalari ortsa, muvozanat **chapga** siljiydi.

- reaksiya ishtirok etayotgan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari ortib, reaksiya mahsulotlarining konsentratsiyalari kamaysa, muvozanat **o'nga** siljiydi.

Muvozanatning siljishi to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari yana tenglashguncha, ya'ni moddalar yangi muvozanat konsentratsiyalari tenglashgunga qadar ya'ni muvozanat qaror topguncha davom etadi. Kimyoviy muvozanatning siljish yo'nalishini **Le-Shatele (1884-yil)** prinsipi aniqlaydi.

Kimyoviy muvozanatda reaksiyalar to'xtamaydi, shuning uchun buning muvozanat dinamik ya'ni harakatdagi muvozanat deb ataladi.

Muvozanat konsentratsiyalarida muvozanatda bo'lgan reaksiyalar konsentratsiyalaridan $[N_2]$, $[H_2]$ va $[HI]$ farq qilishi uchun tenglik o'rinli bo'ladi. Shunday qilib kimyoviy muvozanatda $V_{\text{muvozanat}} = V_{\text{teskari}}$ bo'ladi, ya'ni reaksiya uchun $k_1[N_2][H_2] = k_2[HI]^2$ to'g'ri va teskari reaksiyalar tezlik konstantalari nisbatiga – kimyoviy muvozanat konstantasi (K) deyiladi va quyidagicha yozamiz.

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[HI]^2}{[N_2][H_2]} = K_c$$

Kimyoviy muvozanatda :

- sistemada hech qanday tashqi o'zgarish kuzatilmaganda ham to'g'ri va teskari reaksiyalar to'xtamaydi;
- vaqt birligida reaksiyaga kirishgan dastlabki moddalarning molekulalar soni ayni vaqt ichida reaksiya mahsulotlaridan hosil bo'ladigan moddalar molekulalari soniga teng;
- Moddalardan birining konsentratsiyasini, temperatura yoki bosimning o'zgarishi kimyoviy muvozanatning siljishiga olib keladi ya'ni reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning konsentratsiyasi o'zgaradi.

Agarda:

- reaksiyada ishtirok etayotgan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari kamayib, reaksiya mahsulotlarining konsentratsiyalari ortsa, muvozanat chapga siljiydi.
- reaksiyada ishtirok etayotgan dastlabki moddalarning konsentratsiyalari ortib, reaksiya mahsulotlarining konsentratsiyalari kamaysa, muvozanat o'nga siljiydi.

Muvozanatning siljishi to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari yana tenglashguncha, ya'ni moddalar yangi muvozanat konsentratsiyalari tenglashgunga qadar ya'ni muvozanat qaror topguncha davom etadi. Kimyoviy muvozanatning siljish yo'nalishini **Le-Shatele (1884-yil)** prinsipi aniqlaydi.

Agar muvozanat holatida tizimni sistemaga, tashqi taʼsir bilan biror taʼsir koʻrsatilsa (temperaturasi, bosimi, konsentratsiya oʻzgarishi) muvozanat shu taʼsirni kamaytiradigan tomonga siljiydi.

Konsentratsiyaning taʼsiri.

- agar dastlabki moddalarning birortasining konsentratsiyasi oshirilsa yoki mahsulot konsentratsiyasi kamaytirilsa toʻgʻri reaksiya tezlashadi. Bunda dastlabki moddalarning konsentratsiyasi kamayib muvozanat oʻng tomonga siljiydi.

- Agar dastlabki moddalar konsentratsiyasi kamaytirilsa yoki mahsulot konsentratsiyasi ortsa u holda teskari reaksiya tezligi ortib, mahsulot konsentratsiyasi kamayadi muvozanat esa chapga siljiydi.

Quyidagi $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ sistemada N_2 konsentratsiyasi oshirilsa yoki NH_3 konsentratsiyasi kamaytirilsa, bunda muvozanat oʻngga siljiydi.

Temperaturaning taʼsiri.

- Temperatura oshganda muvozanat endotermik (issiqlik yutilishi bilan) boradigan reaksiya tomonga, temperatura kamaysa ekzotermik (issiqlik chiqishi bilan) boradigan reaksiya tomonida boradi.

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ $\Delta H = -92.4 \text{ kJ}$ sistemada toʻgʻri reaksiya ekzotermik, teskarisi esa endotermik shuning uchun temperatura koʻtarilganda muvozanat chapga siljiydi (temperaturani pasaytiruvchi teskari reaksiya kuchayadi) temperatura pasayganda esa muvozanat oʻnga siljiydi (temperaturani oshiruvchi toʻgʻri reaksiya kuchayadi)

Bosimning taʼsiri.

Bosim va hajmning oʻzgarishi faqat gazlar ishtirok etadigan reaksiyalar muvozanatiga taʼsir koʻrsatadi va bu sharoitda reaksiya gazsimon moddalarning molekulalar sonini oʻzgarishiga olib keladi. Sistema bosimi oʻzgarish temperatira (T) va hajmda (V) gazsimon moddalarning molekulalari soniga toʻgʻri proporsional, shuning uchun sistema bosimining oʻzgarishiga gaz molekulalari taʼsir qiladi.

- Bosim ortganda sistema muvozanati gazsimon moddalar molekulalari sonini kamayishi bilan boradiga reaksiya yoʻnalishi

tomonga (hajm kam tomonga), bosim kamayganida gazsimon moddalar molekullarining sonini ortishi bilan bora (hajm ko'p tomonga) reaksiya xo'ra hi tomonga siljiydi.


$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ sistemada bosim ortganida kam tomonga to'g'ri reaksiya tomonga, bosim kamayganida kam ko'p teskari reaksiya tomonga siljiydi.

Hajmning ta'siri:

Sistema hajmi oshirilganda bosim proporsional ravishda kamayadi, muvozanat hajm ko'p tomonga siljiydi. Hajm kamaygan muvozanatni hajm kam tomonga siljitadi.

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ sistemada hajm ikki marta kamaysa, bosim ham ikki marta ortadi. I.e-Shatele prinsipiga muvofiq sistemada to'g'ri reaksiya kuchayadi.

Agarda, kimyoviy reaksiyada o'ng va chap tomondagi molekullar soni teng bo'lib qolsa, bosim va hajm kimyoviy muvozanatga ta'sir ko'rsatmaydi:



Katalizatorning ta'siri.

Katalizatorlar to'g'ri va teskari reaksiyani bir hilda tezlashtiradi, shuning uchun katalizatorlar kimyoviy muvozanatni siljitmaydi, u faqat muvozanat holatga kelishini tezlashtiradi.

Le-Shatele prinsipi nafaqat qaytar kimyoviy reaksiyalar uchungina qo'llaniladi.

Qattiq moddalarning konsentratsiyasi olinmaydi.

$FeO + CO \rightleftharpoons Fe + CO_2$ reaksiya uchun muvozanat konsentratsiyasi quyidagicha;

$$K_M = \frac{[CO_2]}{[CO]} \text{ tarzida bo'ladi.}$$

Kimyoviy muvozanat konstantasining qiymati qancha katta bo'lsa, reaksiya unimi shuncha yuqori bo'ldi. Konstantaning qiymati modda tabiatiga, temperaturaga bog'liq, konsentratsiyaga (P,V) ga, katalizatorga bog'liq emas.

Kimyoviy muvozanatga doir masalalarini yechish usullari.



Har qanday muvozanatga doir masalani ishlashda 3 ta konsentratsiya farqlanadi.

- Boshlang'ich konsentratsiya: $B_k = M_k + R_k$
- Reaksiyaga kirishgan konsentratsiya: $R_k = B_k - M_k$
- Muvozanat konsentratsiya: $M_k = B_k - R_k$

Masala 1. NH_3 ning oksidlanish tenglamasi $NH_3 + O_2 \rightleftharpoons NO + H_2O$ bo'yicha sodir bo'ladigan jarayon muvozanat holatida. moddalar konsentratsiyalar $[NH_3] = 0.9 \text{ mol/l}$, $[O_2] = 1 \text{ mol/l}$, $[NO] = 0.3 \text{ mol/l}$ ga teng bo'lgan. Muvozanat holatdagi suvning, NH_3 , O_2 ning boshlang'ich konsentratsiyasini aniqlang.



Reaksiya tenglamasi.	4	5	4	6
Reaksiyaga kirishgan konsentratsiya.	X_1	X_2		
Muvozanat konsentratsiya	0.	1	0.3	X_3




$X_1 = 0.3 \text{ mol/l}$ $X_2 = 0.375 \text{ mol/l}$ X_1 va X_2 lar reaksiyaga kirishgan konsentratsiyalar. Boshlang'ich konsentratsiyani topish uchun reaksiyaga kirishgan konsentratsiyaga muvozanat holatdagi konsentratsiya qo'shiladi. $B_k = M_k + R_k$

Bunda $[NH_3] = 0.9 \text{ mol/l} + 0.3 \text{ mol/l} = 1.2 \text{ mol/l}$

$[O_2] = 1 \text{ mol/l} + 0.375 \text{ mol/l} = 1.375 \text{ mol/l}$ gat eng.

2. Sirka kislota va etil sipirtning o'zaro reaksiyasida muvozanat qaror topganda, modda konsentratsiyalari $[CH_3COOH] = 0.4 \text{ mol/l}$,


$[C_2H_5OH]=0.4 \text{ mol/l}$, $[CH_3COOC_2H_5]=0.6 \text{ mol/l}$, $[H_2O]=0.6 \text{ mol/l}$ bo'lganda muvozanat konstantasini aniqlang?



$$K = \frac{[CH_3COOC_2H_5] \cdot [H_2O]}{[C_2H_5OH] \cdot [CH_3COOC_2H_5]} = \frac{0.6 \cdot 0.6}{0.4 \cdot 0.4} = 2.25 \text{ ga teng.}$$


3. Ammiak sintez qilish uchun tayyorlangan gazlar aralashmasida azot va vodorod konsentratsiyalari tegishli tartibda 4 mol/l va 10 mol/l ni tashkil qilgan. Reaksiyada muvozanat qaror topgandan so'ng azotning 50% miqdori reaksiyaga kirishgan bo'lsa, azot, vodorod va ammiakning muvozanat konsentratsiyalarini toping?

Yechish: a) Kimyoviy reaksiya tenglamasini yozamiz;



4 10 0 mol/l da

b Azotning 50% miqdori reaksiyaga kirishganidan foydalanib, reaksiyaga kirishgan hamda hosil bo'lgan moddalar miqdorlarini (mol/l) hisoblaymiz; $C(N_2)=4 \text{ mol/l} \times 0.5 = 2 \text{ mol/l}$



1 3 2 mol/l da


2 $x_1=6$ $x_2=4$ $x_1=6 \text{ mol/l}$, $x_2=4 \text{ mol/l}$

Reaksiyadan so'ng moddalarning konsentratsiyalarini aniqlaymiz, buning uchun azot va vodorod dastlabki konsentratsiyalaridan, reaksiyaga kirishgan azot va vodorod konsentratsiyalarini ayiramiz.

$[N_2]=4 \text{ mol/l} - 2 \text{ mol/l} = 2 \text{ mol/l}$, $[H_2]=10 \text{ mol/l} - 6 \text{ mol/l} = 4 \text{ mol/l}$, $[NH_3]=4 \text{ mol/l}$

4. $SO_2 + O_2 = SO_3$ reaksiyada SO_3 dan 0,1 mol/l hosil bo'lganda kimyoviy muvozanat qaror topdi ($K_M=1$). SO_2 ning boshlang'ich konsentratsiyasi 0,3 mol/l bo'lsa, kislorodning dastlabki konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang?

Yechish: a) Reaksiya tenglamasidan foydalanib, SO_3 ning hosil bo'lgan konsentratsiyasidan foydalanib, reaksiyaga kirishgan SO_2 va O_2 ning konsentratsiyalarini topamiz.




2 1 2 mol/l da

$$x_1 = x_2 = 0,1 \quad x_3 = 0,1 \quad x_4 = 0,05$$

Farazki, $[SO_2]=0,1$, $[O_2]=0,05$ dan reaksiyaga kirishgan SO_2 dastlabki $0,3 \text{ mol/l}$ bo'lgan, muvozanat holatida esa $[SO_2]=0,2$ bo'lgan.

Kimyoviy muvozanat dan foydalanib ($K_M=1$), kislorodning muvozanat qiymatini aniqlaymiz.



Muvozanat konsratatsiya: $0,2 \quad x \quad 0,1$

$$K = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 [O_2]} = 1 = \frac{0,1^2}{0,2^2 \cdot x} \quad 0,04 \cdot x = 0,01$$

$$x = 0,25$$

b) Kislorodning dastlabki konsratatsiyasini aniqlaymiz;


$$[O_2] = 0,05 + 0,25 = 0,3 \text{ mol/l}$$

5. $SO_2 + N_2O = SO_2 + N_2$ reaksiya hajmi 5 l bo'lgan idishda olib borildi. Reaksiya uchun SO_2 va N_2O dan mos ravishda 10 va 15 mol dan olingan bo'lsa, N_2 ning muvozanat konsratatsiyasini (mol/l) aniqlang. ($K_M=1$)

Yechish: a) Dastlab reaksiyaga kirishgan moddalarning konsratatsiyalarini (mol/l) aniqlaymiz;

$$C_m(CO) = \frac{n}{V} = \frac{10 \text{ mol}}{5 \text{ l}} = 2 \text{ mol/l}, \quad \bar{N}_M(I, f) = \frac{15 \text{ mol}}{5 \text{ l}} = 3 \text{ mol/l}$$

b) Kimyoviy reaksiya tenglamasidan foydalanib, N_2 ning konsratatsiyasini aniqlaymiz;



$$K = \frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]} = 1 = \frac{x \cdot x}{(2-x)(3-x)}$$

$$(2-x)(3-x) = x^2$$

$$6 - 5x + x^2 = x^2$$

$$5x = 6$$

$$x = 1,2 \text{ mol/l}$$

$$[N_2] = 1,2 \text{ mol/l}$$

LABORATORIYADA BAJARILADIGAN ISHLAR

1-Tajriba. Reaksiyaga kirishuvchi reagentlar konsentratsiyasining reaksiya tezligiga ta'siri. Kimeviy reaksiya tezligiga konsentratsiya o'zgarishining natiriy tiosulfat bilan sulfat kislotasi o'rtasidagi reaksiya sharoitida o'rganiladi:



Bunda avval kuchsiz opalesta reaksiya xodisasi sodir bo'lib, so'ngira oltingugurt o'kmaga tushishi natijada eritma loyqalanadi.

Tajribani boshqarish vaqtida eritmatalarni o'zaro aralashtirish reaksiyaning boshlanishi, oltingugurt cho'kmasi xosil bo'lishi esa reaksiyaning tugashi deb xisoblanadi. Shuning uchun reaksiya boshlanishidan to oltingugurt cho'kmasi xosil bo'lgunga qadar ketgan vaqt kimeviy reaksiya tezligini xarakterlaydi.

Bitta quruq probirkaga tajriba uchun 1-jadvalda (xisobotga qarang) ko'rsatilgan millilitrda natiriy tiosulfatdan va suvdan, ikkinchi probirkaga sulfat kislotadan quyiladi. Natiriy tiosulfat eritmasiga sulfat eritmasini tezda quyib vaqt belgilanadi, probirkada qancha vaqtdan so'ng (sekund xisobida) loyqalanish xosil bo'lishini sekundomer yordamida aniqlanadi. SHu tartibda jadvalda ko'rsatilgan № 2.3 xajmda eritmatalardan olib tajriba yana qaytariladi. Olingan natijalarni 1-jadvalga yoziladi.

Bajarilgan reaksiya uchun massalar ta'siri qonunining matematik ifodasini yozing. Kuzatish natijalarini grafik tarzida ifodalang.

2-Tajriba. Kimeviy reaksiyalar tezligiga xaroratning ta'siri. Ikkita probirganing biriga natiriy tiosulfat eritmasidan 2 ml, ikkinchisiga sulfat kislotasi eritmasidan 2 ml quyiladi. Bitta stakan 1/3 xajmigacha suv quyib, ikkala probirkani suvli stakanga solib qo'yiladi va probirkalardagi eritmalar suvning xaroratini o'ziga qabul qilguncha 4-5 minut kutiladi. Stakandagi suvning xaroratini termometr yordamida o'lchab yozib olinadi. Natiriy tiosulfatli probirkaga sulfat kislotasi eritmasi quyiladi va loyqalanish vaqti belgilab olinadi. Stakandagi suvning xaroratini issiq suv yordamida boshlang'ich xaroratga nisbatan 10° va 20° C ga oshirib tajribani yana ikki marta qaytariladi.

Olingan natijalarni 2-jadvalga yozing. Xar bir koefitsientini tezlik qiymatlaridan to'g'ri olib xisoblang. Reaksiya tezligining xaroratga bog'liqligini grafikka yozing.

3-Tajriba. Reaksiya tenglamasidagi kimeviy reaksiya tezligiga chegara sirtining ta'siri. H_2O_2 dan (bo'r) taroz olib, xar biri taxminan 0.5 g bo'lgan ta'lim namuna oling. Namunalaridan birinchisi kukun xoligacha maydalangan, ikkinchisi esa kichkina bo'lakchalar xolida bo'lsin. Ikkita probirkaga 1/4 xajmigacha 10% H_2O_2 eritmasidan quyning va ularga bir vaqtda bo'r namunalari soling. Probirkalarning qaysi birida reaksiya tezroq tugaydi. Reaksiya tenglamasini yozing. Nima uchun ikkala xolda ham reaksiya tezligi har xil bo'lish sababini izohlang.

4-Tajriba. Kimy muvozanatning siljishi. Probirkaning yarim xajmigacha distillangan suv quyning va unga bir tomchidan temir(III) xlorid bilan kaliy rodanid yoki amoniy rodanidning konsentralangan eritmalaridan qo'shing. Xosil bo'lgan rangli eritmani to'rtta probirkaga bo'ling va ulardan birini tajriba natijalarini solishtirish uchun etalon sifatida olib qo'ying. So'ngra birinchi probirkaga 3-4 tomchi FeCl_3 , ikkinchisiga 2-3 tomchi KSCN yoki NH_4SCN eritmasidan tomizing, uchinchisiga esa ozgina KCl yoki NaCl kristallidan soling va probirkalarni yaxshilab chayqating. Xosil bo'lgan eritmalar rangini etalon sifatida olib qo'yilgan probirkadagi eritma rangi bilan solishtiring. Reaksiya tenglamasini va reaksiyaning muvozanat konstantasini ifodasini yozing. Eritmalar rangining o'zgarishi bilan muvozanatning qaysi tomonga siljishini aniqlang va natijalarni xisobotga yozing.

Nazorat savollari

1. Ammiakni oksidlanish tenglamasi $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$, bo'yicha sodir bo'ladigan jarayon muvozanat holiga kelganda, moddalar konsentrassiyalari $[\text{NH}_3]=0.9 \text{ mol/l}$, $[\text{O}_2]=2 \text{ mol/l}$, $[\text{NO}]=0.3 \text{ mol/l}$ ga teng bo'lgan. Muvozanat holatidagi suvning, NH_3 va O_2 ning boshlang'ich konsentrassiyalarini (mol/l) hisoblang.

- A) 0.3; 0.3; 0.38; B) 0.6; 0.4; 0.38; C) 0.45; 1.2; 2.38;
D) 0.75; 1.2; 1.0; E) 0.45; 0.6; 0.45.

2.0. ERITMALAR

Eritmalar bir jinsli yoki gomogen aralashmalardir. Eritmalar qattiq, suyuq va gaz holatda bo'ladi. Lekin, bu termin asosan suyuq aralashmalarga nisbatan ishlatiladi.

Erituvchi modda (Dispersiya muhiti) - eritma hosil bo'lishida agregat holatini saqlab qolgan yoki miqdori ko'p bo'lgan moddalarga aytiladi.

Eritgan modda (Dispers faza) - eritma hosil bo'lishida agregat holatini o'zgartiradigan yoki miqdori kam bo'lgan moddalarga aytiladi.

Ko'pchilik holatlarda kimyo laboratoriyalarida erituvchi suv bo'lib, ba'zi moddalar unda cheksiz eriydi. M-n: Etil spirit Erituvchi va erigan modda molekularidan iborat bo'lib, bir biri bilan fizik-kimyoviy aloqada bo'ladigan bir jinsli gomogen sistema **eritma** deyiladi

Sistemalar 2 xil bo'ladi:

1. Mayin dispers sistema;

2. Dag'al dispers sistema.

Mayin dispers sistema zarrachalarning o'lchamiga qarab 2 xil bo'ladi.

Chin eritma - eritmada erigan madda zarrachalar o'lchami 1 nm dan kichik bo'lgan eritma kiradi. Bularga quyidagilarning eritmaları kiradi. NaCl, soda, shakar eritmaları kiradi.

Kolloid eritma - eritmada erigan modda zarrachalari o'lchami 1 nm-100 nm gacha kattalikda bo'lgan eritmalar kiradi. Bularga H_2SiO_3 , $Fe(OH)_3$, H_2SO_4 , AgI, oqsil eritmaları kiradi.

Dag'al dispers sistema - bunday eritmalarda zarrachalar o'lchami 100 nm dan katta bo'ladi. Dag'al dispers sistema ham 2 xil bo'ladi.

Suspenziya - suyuqlik muhitida qattiq modda zarrachlari tarqalgan eritmalar. Ularga loyqa suv (bu eritmada suv yani suyuqlik muhitida qattiq qum zarrachalari tarqalgan bo'ladi).

Emulsiya - suyuqlik muhitida suyuq moddalarning tarqalishidan hosil bo'lgan eritmalar. Ularga qattiq, suv bilan yog' aralashmasi va boshqalar kiradi.

Erigan modda- dispers faza, erituvchi- dispers muhit bo'ladi.

Chin eritmalar shaffof, rangsiz, zarrachalar o'lcham kichik bo'lganligi uchun uzoq vaqt to'qolsa ham eskirmaydi.

Kolloid eritmalar esa o'ziga xos rangli ranglarga ega bo'ladi. Zarrachalar o'lchami chin eritmalariga qaraganda yirikroq bo'ladi.

Chin eritma bilan kolloid eritmani bir-birdan farqlashni transuz olimi Tindal tomonidan aniqlangan. U ikkita probirkada birida chin eritma, ikkinchisida esa kolloid eritma solib ikkalasidan ham nur o'tkazilganda quyidagicha jarayon bo'lir bo'ladi:

– chin eritma orqali nur o'tkazilganda nur oqimi o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi yani o'z yo'nalishida davom etadi.

– kolloid eritmada esa aksincha, o'tayotgan nur o'z yo'nalishini o'zgartiradi.

Lekin ko'pchilik moddalarning erish darajasi cheklangan bo'lib – eruvchanlik yoki eruvchanlik chegarasi deyiladi. S bilan belgilanadi. Erituvchining ma'lum miqdorida eriydigan moddaning qismini ko'rsatadi. **Eruvchanlik** – 100 gr erituvchida eriydigan moddaning massasiga aytiladi.

100 gr suvda 200 gr shaker eriydi.

100 gr suvda 0.2 gr gips eriydi.

Moddalarning eruvchanligi – erituvchi va erigan moddaning tabiatiga, temperaturaga, gaz moddalarda bosimga bog'liq.

Eritmada ayni modda yana erishi mumkin bo'lsa, eritma to'yinmagan eritma deyiladi. Mn: 100 gr suvda 50 gr shaker erisa to'yinmagan eritma hosil bo'ladi.

Eritmada ayni moddadan boshqa erimasa, to'yingan eritma deyiladi. M-n: 100 gr suvda 200 gr shaker erisa.

Erituvchida ayni moddadan erishi mumkin bo'lgan eritma to'yinmagan eritma deyiladi.

100g H_2O ga 210g shakar erisa, 300g to'yingan eritma hosil bo'ladi va 10g shalar erimay qoladi.

100g H_2O da 150g shaker eritilsa, 250g to'yinmagan eritma hosil bo'ladi. Ayni eritmada yana 50g shaker erishi mumkin. To'yingan eritmada erituvchi va erigan modda massalari o'rtasida quyidagicha bog'lanish bor.

$$\frac{m_{\text{mod}}}{S} = \frac{m_{\text{suv}}}{100} = \frac{m_{\text{eritma}}}{100 + S} = \frac{\lambda m}{S}$$

m_{mod} - eritmadan massasi.

S - eruvchanlik koeffitsienti.

m_{suv} - suvning massasi.

m_{eritma} - eritmaning massasi.

Ko'pchilik qattiq moddalarning eruvchanligi harorat ortishi bilan ortadi.

Gazlarning eruvchanligi harorat ortishi bilan kamayib boradi (suv qaynaganda undagi erigan gazlar chiqib ketadi). Lekin bosim ortishi ularning eruvchanligini ortishiga olib keladi (mineral suvli idish ochilsa, idish ichidagi bosim kamayadi va erigan karbonat angidrid shiddat bilan ajralib chiqa boshlaydi).

Moddalarning eruvchanligi erigan modda tabiatiga, erituvchi tabiatiga, temperaturaga, gaz moddalarda bosimga bog'liq bo'ladi.

Masalalar yechish usuli:

1. 120g suvda ayni temperaturada qancha g tuz erishi mumkin? ($S=36g$)

Berilgan:

$S=36g$

$m(\text{suv})=120g$

$m(\text{tuz})=?$

Yechish: Eruvchanlik fo'rmulasidan

120 g suvda erishi kerak bo'lgan tuz

massasini aniqlaymiz.

$\frac{m_{\text{mod}}}{S} = \frac{m_{\text{suv}}}{100}$ dan tuz massasini aniqlaymiz.

$\frac{X}{36g} = \frac{120g}{100g}$ bundan X ni topsak

$$X = \frac{36g \cdot 120g}{100g} = 43.2g \text{ tuz eriydi.}$$

2. 450g suvda 20°C da to'yingan eritma hosil qilish uchun ayni moddadan 75g eritildi.

Moddaning 20°C dagi eruvchanlik koeffitsientini aniqlang?

Berilgan:

$m(\text{suv}) = 450 \text{ g}$

$m(\text{erigan modda}) = 75 \text{ g}$

$S = ?$

Yechish: Eruvchanlik formulasi bilan 100 g suvda erishi kerak bo'lgan tuz massasi aniqlaymiz.

$$\frac{\text{mod}}{S} = \frac{\text{suv}}{100} \quad \text{da } S \text{ ni aniqlaymiz.} \quad \frac{75 \text{ g}}{S} = \frac{450 \text{ g}}{100 \text{ g}}$$

$$\text{bunda } S = \frac{75 \text{ g} \cdot 100 \text{ g}}{450 \text{ g}} = 16.67 \text{ g modda eriydi.}$$

3. 185g to'yingan erimada 66g tuz bo'lsa, eruvchanlik kofitsientini aniqlang?

Berilgan:

$m(\text{to'yingan eritma}) = 185 \text{ g}$

$m(\text{tuz}) = 66 \text{ g}$

$S = ?$

Yechish:

$M_{\text{suv}} = m_{\text{eritma}} - m_{\text{tuz}} = 185 \text{ g} - 66 \text{ g} = 119 \text{ g suv bor.}$

$S = 55.46 \text{ g gat eng.}$

$$\frac{\text{mod}}{S} = \frac{\text{suv}}{100} \quad \frac{66 \text{ g}}{S} = \frac{119 \text{ g}}{100 \text{ g}} \quad S = 55.46 \text{ g gat eng.}$$

4. Moddaniy $S = 415 \text{ g}$ ga teng. Shu moddaniy 60g suvda erishidan qanday massali to'yingan eritma olish mumkin?

Berilgan:

$S = 415 \text{ g}$

$m_{\text{suv}} = 60 \text{ g}$

$m_{\text{eritma}} = ?$

Yechish:

$$\text{d. } \frac{S_{\text{tuz}}}{100} = \frac{m_{\text{eritma}}}{100 + S} \quad \frac{515 \text{ g}}{100 \text{ g}} = \frac{m_{\text{eritma}}}{100 \text{ g} + 415 \text{ g}}$$

$$m_{\text{eritma}} = \frac{60(100 + 415)}{100} = \frac{515 \cdot 60}{100} = 509 \text{ g to'yingan eritma}$$

hosil bo'ladi.

5.200 g eritmaning 20% osh tuzi. Uni to'yingan eritmaga aylantirish uchun 70g eritishga to'g'ri keladi. Osh tuzining eruvchanlik ko'rsatkichini aniqlang?

Berilgan:

$$m_{\text{eritma}} = 200 \text{ g}$$

$$\omega_{\text{tuz}} = 20\%$$

$$m_{\text{qo'shilgan tuz}} = 70 \text{ g}$$

$$S = ?$$

Yechish:

a. Birinchi navbatda eritma tarkibidagi tuzni topamiz:

$$m_{\text{tuz}} = \omega_{\text{eritma}} \cdot m_{\text{eritma}} = 0.2 \cdot 200 \text{ g} = 40 \text{ g tuz bor.}$$

b. Eritma massasidan tuzning massasini olib tashlasak eritmadagi suvning massasi kelib chiqadi.

$$m_{\text{suv}} = m_{\text{eritma}} - m_{\text{tuz}} = 200 \text{ g} - 40 \text{ g} = 160 \text{ g suv bo'lgan.}$$

c. Eritmadagi tuz bilan qo'shilgan tuz massalarini qo'shib keyingi eritmadagi jami erigan tuz massasini aniqlaymiz.

$$m_{\text{tuz}} + m_{\text{qo'shilgan tuz}} = 40 \text{ g} + 70 \text{ g} = 110 \text{ g jami tuz boldi.}$$

d. Keyin eruvchanlikning fo'rmulasiga qo'yamiz.

$$\frac{m_{\text{tuz}}}{S} = \frac{m_{\text{suv}}}{100} \quad , \quad \frac{110 \text{ g}}{S} = \frac{160 \text{ g}}{100}$$

$$S = \frac{110 \text{ g} \cdot 100 \text{ g}}{160 \text{ g}} = \frac{11000}{160} = 68.75 \text{ g ga teng.}$$

6. Natriy nitritning 10°C dagi eruvchanligi $80,5$ ga teng. Shunday shartlarda 250 g suvda shu tuzdan qancha g erishi mumkin.

Berilgan:

$$S_{10^{\circ}\text{C}} = 80,5\text{g}$$

$$m_{\text{suv}} = 250\text{g}$$

$$m_{\text{er}} = ?$$

Yechish: NaNO_3 ning 10°C dagi eruvchanligi $80,5$ teng degani 100 g suvda NaNO_3 dan $80,5$ g erishini bildiradi.

1-usul. 100 g suvda $80,5$ g tuz eriydi
 250 g suvda X g tuz eriydi.

$$X = \frac{250\text{g} \cdot 80,5\text{g}}{100\text{g}} = 201,25\text{g} \quad \text{tuz } 10^{\circ}\text{C} \text{ da } 250\text{g} \text{ suvda eriydi.}$$

2-usul.

Berilgan:

$$S_{10^{\circ}\text{C}} = 80,5\text{g}$$

$$m_{\text{suv}} = 250\text{g}$$

$$m_{\text{tuz}} = ?$$

Yechish:

$$\frac{m_{\text{mod}}}{S} = \frac{m_{\text{er}}}{100} \quad \text{quyidagi bog'lanishdan } m_{\text{mod}}$$

ni topamiz.

$$m_{\text{mod}} = \frac{m_{\text{er}} \cdot S}{100} = \frac{250\text{g} \cdot 80,5\text{g}}{100\text{g}} = 201,25\text{g}$$

tuz 10°C da 250g suvda eriydi

1. Moddaning eruvchanligi 70 gr ga teng bo'lsa, 250 gr suvda necha gr erishi kerak? J: 175 gr

2. Eruvchanlik 32 bo'lgan moddaning 660 gr to'yingan eritmasini hosil qilish uchun qanday massali tuz va suv kerak? J: $160, 500$

3. Eruvchanligi 80 bo'lgan moddaning 48 gr dan foydalanib qanday massali to'yingan eritma tayyorlash mumkin? J: 108 gr

4. 560 gr suvda $87,5$ gr tuz erisa, eruvchanligini aniqlang? J: $15,6$ gr

5. 250 gr to'yingan eritma bug'latilganda 25 gr tuz kristallangan bo'lsa, eruvchanlik qanday bo'ladi? J: $11,1$ lgr

6. 5 mol suvda 112 l HCl gazidan hosil bo'lgan to'yingan eritmada
 60 ta eruvchanligini aniqlash uchun J: 202.7 gr
 2. 600 gr eritma taqsimot ko'rsatkichi $0.04 \cdot 10^{23}$ ta HBr molekulasi bo'lsa,
 uning eruvchanligini aniqlash uchun J: 37 gr

Erigan modda	Suv massasi	To'yingan eritma	S-eruvchanlik	Δm-cho'chkaga tushgan tuz massasi
66	124			
40	25			
	32		26	
	46		$S_{100}=44, S_{20}=64$	
84	73			
		250	10	
		210°C da 500 gr	$S_{210}=156$ $S_{100}=16$	
		60°C da 511 gr	$S_{40}=75$, $S_{60}=125$	
56 l HBr	5 mol			

6.1. Eritma konsentratsiyalarini ifodalash usullari

Bir modda ichida ikkinchi moddaning tarqalganlik darajasi uning **konsentratsiyasi** deyiladi. Agar erigan modda miqdori ko'p bo'lsa, eritma **konsentirlangan**, kam bo'lsa **suyiltirilgan** deyiladi. Moddalarning to'yingan eritmaları ba'zan konsentirlangan eritmasi deb ataladi. Lekin to'yingan eritma modda eruvchanligiga qarab konsentrlangan ham suyiltirilgan ham bo'lishi mumkin. $S_{(Gipe)} = 0.2g$, $S_{(shakar)} = 200g$ ga teng. Shuning uchun gipsning to'yilgan eritmasi suyiltirilgan, shakarning to'yingan eritmasi konsantrlangan.

Konsentratsivani ifodalashda eritmaning massa birligida yoki hajm birligida erigan modda massasi, miqdori, ekvivalentlar soni bilan ifodalash mumkin.

6.7. Eritgan moddani massasi hisoblashi.

(Protsent va massalar konsentratsiya)

$W(\omega)$ y $\omega\%$ bilan belgilanadi. W ulush – eritmaning har 100g da ne. erigan modda borligini ko'rsatadi yoki erigan modda massasining eritmaga nisbatidir.

$$\omega = \frac{m_{\text{erigan mod}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{m_{\text{er}}}{m_{\text{er}} + m_{\text{erit}}} = \frac{m_{\text{erigan mod}}}{\rho \cdot V_{\text{eritma}}}$$

Formula orqali ifodalash mumkin. $C_M = \frac{C\% \cdot d \cdot 10}{M_r}$ $m = V \cdot \rho$ erigan modda massasi $m = V \cdot \rho$ eritma massasi

Masala yechish:

1. 80g eritmada 20g erigan modda mavjud bo'lsa, eritmaning massa ulishini (%) aniqlang?

Berilgan:


eritma=80g

erigan modd=20g

$W=?$

Yechish:

Eritmani quyidagicha tasavur qilsak bo'ladi.



Keyin massa ulushni aniqlaymiz.

$$W = \frac{m_{\text{erigan modd}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{20g}{80g} = 0.25 \cdot 100\% = 25\% \text{ ekan}$$

2. 600g suvda 240g shakar erishidan hosil bo'lgan eritmaning massa ulishini (%) aniqlang?

Berilgan:


$m_{\text{suv}}=600\text{g}$

$m_{\text{shakar}}=240\text{g}$

$W=?$

Yechish:

Eritmani quyidagicha tasavvur qilsak bo'ladi.



$$W = \frac{m_{\text{shakar}}}{m_{\text{shakar}} + m_{\text{suv}}} = \frac{240\text{g}}{240\text{g} + 600\text{g}} = 0.286 \cdot 100\% = 28.6\%$$

eritma hosil bo'ladi.

3. 400ml $\rho=1.24\text{g/ml}$ bo'lgan natriy ishqori eritmasida 100g NaOH bo'lsa, eritmaning massa ulishini aniqlang?

Berilgan:

$V=400\text{ml}=0.4\text{ l}$

$\rho=1.24\text{g/ml}$

$m_{\text{NaOH}}=100\text{g}$

$W=?$

Yechish:

Eritmani quyidagicha tasavvur qilsak bo'ladi.



Quyidagicha yechamiz.

a. $V = \frac{m_{eritma}}{\rho_{eritma}}$ dan $m_{eritmani}$ topamiz.

$m_{eritma} = \rho_{eritma} \cdot V = 1.24 \text{ g/ml} \cdot 400 \text{ ml} = 496 \text{ g}$

b. $W = \frac{m_{NaOH}}{m_{eritma}} = \frac{100 \text{ g}}{496 \text{ g}} = 0.2015 \cdot 100\% = 20.16\%$ NaOH bor ekan.

Nazorat savollari

1. 400 gr eritmada 120 gr erigan modda bo'lsa, uning massa ulushini aniqlang J: 30 %
2. 500 gr eritmada 450 gr shakar bo'lsa, eritma massa ulushini aniqlang J: 90%
3. 300 gr suvga 200 gr osh tuzi qo'shib qanday massa ulushli eritma tayyorlash mumkin. J: 40%
4. 180 gr H_2SO_4 dan foydalanib hosil qilingan 400 ml eritmaning $\rho = 1.2 \text{ g/ml}$ bo'lsa, kislota massa ulushini aniqlang J: 37.5 %

6.3.Eritmalar tayyorlash

1. Fizik o'zgarishlar hisobiga eritmalar tayyorlash.

Hosil bo'lgan eritma massa ulishi so'ralganda:

Fo'rmla yordamida hisoblanadi.

1. 50 g suvda 10 g shakar erisa, eritmaning massa ulishini aniqlang?

Yechish: $W_{shakar} = \frac{m_{shakar}}{m_{shakar} + m_{suv}} = \frac{10 \text{ g}}{10 \text{ g} + 50 \text{ g}} = 0.1667$ yoki 16.67%

2. 300 g 20 % li eritmaga 50 g H_2O qo'shilsa, yangi hosil bo'lgan

eritmaning W - qanday o'zgaradi?

Yechish: $W = W \cdot m_{eritma} = 0.2 \cdot 300 \text{ g} = 60 \text{ g}$

a) $m_{eritma} = 0.2 \cdot 300 \text{ g} = 60 \text{ g}$ erigan modda bo'lsa,




b) $m_{eritma}^2 = m_{eritma}^1 + m_{suv} = 300 \text{ g} + 50 \text{ g} = 350 \text{ g}$

c) $W = \frac{m_{mod}}{m_{eritma}} = \frac{60 \text{ g}}{350 \text{ g}} = 0.1714$ yoki 17.14%

3. 215 g 16 % li eritmasiga shu moddaning 125 gr 40% li eritmasi qo'shilsa, qanday massa ulishli eritmasi hosil bo'ladi?

Yechish



a. Har bir eritmadagi tuzlarning massasini aniqlaymiz.

$$m_{tuz}^1 = W \cdot m_{eritma} = 215 \text{ g} \cdot 0.16 = 34.4 \text{ g}$$

$$m_{tuz}^2 = W \cdot m_{eritma} = 0.4 \cdot 125 = 50 \text{ g}$$

b. yangi hosil bo'lgan eritmaning massasini va uning tarkibidagi tuzning massasini aniqlaymiz.

$$m_{eritma}^3 = m_{eritma}^1 + m_{eritma}^2 = 215 \text{ g} + 125 \text{ g} = 340 \text{ g}$$

$$m_{tuz}^3 = m_{tuz}^1 + m_{tuz}^2 = 34.4 \text{ g} + 50 \text{ g} = 84.4 \text{ g}$$

c. Endi hosil bo'lgan eritmaning massa ulishini aniqlaymiz.

$$W_{\text{er}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{84,3 \text{ g}}{340 \text{ g}} = 0,2482 \text{ yoki } 24,82\% \text{ ga teng.}$$

Nazorat savollari

1. 200 gr 30 % li va 300 gr 40% li NaOH eritmaları aralashtirilsa, hosil bo'lgan yangi eritmada NaOH ning massa ulushi qanday bo'ladi? J: 36

2. 400 gr 15% li va 300 ml 20% $\rho=1,18 \text{ g/ml}$ kislota eritmaları qo'shilsa, yangi eritma massa ulushini aniqlang? J: 17,35%

3. 200 gr 16% li NaOH eritmasiga 300 gr 10% li eritma 50 gr suv va 40 gr NaOH qo'shilgandan keyin yangi eritmada NaOH massa ulushi qanday bo'ladi? J: 17,28%

4. CuSO_4 ning 400 gr 16% li eritmasiga 80 gr suv, 20 gr CuSO_4 va 50gr $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ qo'shilgach hosil bo'lgan eritmada tuz massa ulushini % da hisoblang? J: 21%


Hosil bo'lgan eritmaning massa ulishi berilganda

Erituvchi so'ralsa agar u suv bo'lsa 0%


Eriyotgan modda bo'lsa 100% deb olamiz.

1. 200 g 30% li NaOH eritmasiga qancha massali 10% li eritmasidan qo'shilganda 14% li eritmasi hosil bo'ladi?

Yechish:



1- usul. Bunda aralashtirish qoidasidan foydalanamiz.



Demak, 30% li eritma bilan 10% li eritma bilan 16 g qo'shilsa
 14% li eritmadan yangi bo'lgan 200 g eritma olamiz.

$$\begin{array}{rcl} 30\% & 10\% & 14\% \\ 4 & 16 & = 200 \\ 200 & & x \end{array}$$

$\frac{300g \cdot 16g}{4g} = 800g$ 10% li eritmadan qo'shdak 14% li eritmadan
 hosil bo'ladi.

2- usul.

Massa ulishning fo'rmulasidan foydalangan holda topamiz.

$$m_{eritma} = 200g$$

$$+ W^2 = 10\% = W^3 = 14\%$$

$$m_{NaOH} = W^1 \cdot m_{eritma} = 0.3 \cdot 200g = 60g$$

$$W = \frac{m_{NaOH}}{m_{eritma}} \text{ shu fo'rmulada}$$

Yangi hosil bo'lgan

$$W = 14\%$$

$$m_{NaOH} = 60 + 0.1x$$

$$m_{eritma} = 200g + x$$

$$W = \frac{m_{NaOH}}{m_{eritma}}$$

$$0.14 = \frac{60g + 0.1x}{200g + x}$$

$$0.14(200g + x) = 60g + 0.1x$$

$$28g + 0.14x = 60g + 0.1x$$

$$0.14x - 0.1x = 60g - 28g$$

$$0.04x = 32g$$

$$x = 800g$$

Nazorat savollari

- 400 g 25% li eritmaga qanday massali 75% li eritma qo'shilsa, unda 38% li eritmaga aylanadi J: 100 gr
- 100 g 42% li eritmaga 100 g massali 65% li eritma qo'shsak 54% li eritma hosil bo'ladi J: 100 g
- 450 g 12% li eritma tayyorlash uchun 5% li eritma va toza tuzda necha gr kerak J: 416.84, 33.16
- 200 g 47% li eritmani 20% li eritmaga aylantirish uchun qandayn massada suv qo'shish kerak J: 378 gr
- 275 gr 30% li eritma olish uchun 45% li va 10% li eritmalardan necha gr dan olish kerak J: 157.14, 117.86
- 80 gr CuSO_4 ning 40% li eritmasini tayyorlash uchun 30 % li eritmaga necha gr mis kuporosi qo'shish kerak J: 192

Kimyoviy o'zgarishlar natijasida eritmalar tayyorlash

a) Hosil bo'lgan eritmaning massa ulishi so'ralganda

1. 250 g suvda 90 g

a) HCl

b) K_2O

c) Na

d) P_2O_5

eritilganda qaysi moddaning necha (%) li eritmasi hosil bo'ladi?

Yechish:

- K_2O ning massa ulishini aniqlasak.

$$a. \quad W = \frac{m_{\text{K}_2\text{O}}}{m_{\text{suvi}} + m_{\text{HCl}}} = \frac{90\text{g}}{250\text{g} + 90\text{g}} = \frac{90\text{g}}{340\text{g}} = 0.265 \quad \text{yoki } 26.5\%$$

b). Suvda K_2O eriganda u suv bilan reaksiyaga kirishib trqishli ishqorni hosil qiladi.



$$1. \quad \begin{array}{ccc} 94\text{g} & & 112\text{g} \\ & \searrow & \nearrow \\ 90\text{g} & & x = ? \end{array}$$


$$x = \frac{90\text{g} \cdot 112\text{g}}{94\text{g}} = 107.23\text{g}$$

$$2. m_{\text{eritma}} = m_{\text{suvi}} + m_{\text{K}_2\text{O}} = 250\text{g} + 90\text{g} = 340\text{g}$$

$$m_{\text{KOH}} = 107.23\text{g}$$

$$3. W = \frac{m_{\text{KOH}}}{m_{\text{suvi}} + m_{\text{K}_2\text{O}}} = \frac{107.23\text{g}}{250\text{g} + 90\text{g}} = 0.317 \text{ yoki } 31.7\% \text{ KOH bor.}$$

c). Na ham suvda eriganda tegishli ishqor va vodorod ajralib chiqadi.



$$\begin{array}{ccc} 46\text{ g} & \times & 80\text{ g} \\ 90\text{ g} & & x_1 = ? \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & 2\text{ g} \\ & & x_2 = ? \end{array}$$

$$x_1 = \frac{90\text{g} \cdot 80\text{g}}{46\text{g}} = 156.5\text{g} \text{ NaOH hosil bo'ladi.}$$

$$x_2 = \frac{90\text{g} \cdot 2\text{g}}{46\text{g}} = 3.91\text{g} \text{ H}_2 \text{ eritmadan ajralib chiqib ketadi.}$$

2. $m_{\text{eritma}} = m_{\text{suvi}} + m_{\text{K}_2\text{O}} = 250\text{g} + 90\text{g} = 340\text{g}$ 340 g eritmadan 3.91 g H₂ ajralib chiqib ketadi. 340 g - 3.91 g = 336.1 g eritma qoladi.

3. Eritma tarkibidagi ishqorning massa ulishini aniqlaymiz.

$$W = \frac{m_{\text{NaOH}}}{m_{\text{suvi}} + m_{\text{K}_2\text{O}} - m_{\text{H}_2}} = \frac{156.5\text{g}}{250\text{g} + 90\text{g} - 3.91\text{g}} = 0.466 \text{ yoki } 46.6\%$$

d). P₂O₅ suvda eriganda fosfat kislota hosil qiladi.



$$\begin{array}{ccc} 142\text{ g} & \times & 196\text{ g} \\ 90\text{ g} & & x_1 = ? \end{array}$$

$$x_1 = \frac{90\text{g} \cdot 196\text{g}}{142\text{g}} = 124.2\text{g} \text{ H}_3\text{PO}_4 \text{ hosil bo'ladi.}$$

$$2. m_{\text{eritma}} = m_{\text{suvi}} + m_{\text{K}_2\text{O}} = 250\text{g} + 90\text{g} = 340\text{g}$$

$$3. W = \frac{m_{\text{H}_3\text{PO}_4}}{m_{\text{suvi}} + m_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{124.2\text{g}}{250\text{g} + 90\text{g}} = 0.3653 \text{ yoki } 36.53\%$$


Nazorat savollari

- 300 gr 20% li sulfat kisota eritmasiga 20 gr SO_3 qo'shilganda yangi eritma hosil bo'lganining massa ulushini aniqlang? J:26.4%
- 355 g H_2SO_4 ga 400 gr 25% oli H eritmasiga yuttirilganda yangi eritma hosil bo'lgan massa ulushini aniqlang? J:78%
- NaOH ning 240 gr 20% li eritmasida 69 gr Na erishidan hosil bo'lgan ishqor massasini aniqlang? J:55%
- 250 gr 10% LiOH eritmasida 21 gr Li va 15 gr Li_2O eriganda hosil bo'lgan eritma massa ulushini aniqlang? J:42.75%
- H_3PO_4 ning 250 g 20% li eritmasida
 - 200 g 35% li eritmasi
 - 142 g P_2O_5
 - 100 g H_3PO_4
 - 180 g H_2O
 - 3 mol P_2O_5
 Eritilishidan hosil bo'lgan eritma massa ulushini aniqlang?

Hosil bo'lgan eritma foizi berilganda

- 135 g suvda qanday massali Na_2O eritilganda 20% li eritma hosil bo'ladi

1- usul.



$$\begin{array}{ccc} 62 \text{ g} & & 80 \text{ g} \\ x \text{ g} & \times & 80x/62 \text{ g} = 1.29x \text{ g NaOH} \end{array}$$

$$m_{\text{suv}} = 135 \text{ g}$$

$$m_{\text{Na}_2\text{O}} = x \text{ g}$$

$$m_{\text{eritma}} = 135 \text{ g} + x$$

$$m_{\text{NaOH}} = 1.29x \text{ g}$$

$$W_{\text{NaOH}} = ?$$

$$W_{NaOH} = \frac{m_{NaOH}}{m_{Na_2O} + m_{suv}}$$

$$0.2 = \frac{1.29x}{x + 135}$$

$$0.2(x + 135) = 1.29x$$

$$0.2x + 27 = 1.29x$$

$$27 = 1.29x - 0.2x$$

$$1.09x = 27$$

$$x = 24.77 \text{ g}$$

2- usul.



$$\begin{array}{ccc} 62 \text{ g} & & 80 \text{ g} \\ 1 \text{ g} & \times & 80/62 \text{ g} = 1.29 \text{ g NaOH} \end{array}$$

Demak, suv va natriy oksidi aralashtirilganda Na_2O suv bilan reaksiyaga kirishadi. Bunda ishqor hosil bo'ladi. 1 g Na_2O dan 1.29 g NaOH olamiz, shuning uchun uni 100% ga ko'paytirib qarasak 100% dan 129% li eritma olinganini ko'ramiz. Qo'shilayotga suvni esa, 0% li eritma deb qaraymiz.

	0%	109 g
	20%	
	129%	20 g
H_2O	Na_2O	NaOH
Demak, 0% li	129%	20% li eritma olinadi.
109 g	20 g	129 g
135 g	x=?	

$$x = \frac{135 \text{ g} \cdot 20 \text{ g}}{109 \text{ g}} = 24.77 \text{ g Na}_2\text{O eritilgandan so'ng 20% li eritma}$$

olinadi.

2. Natriy karbonatning ikkita eritmasi bor. Birinchi eritmadan 100 g, ikkinchisidan 150 g olinib tayyrlangan aralashma 22,4 l miqdorda H_2SO_4 ta'sir ettirilganda 22,4 l (n.sh.) gaz ajralib chiqadi. Agar birinchi eritmada 150 g, ikkinchisidan 100 g olib tayyrlangan aralashmaga H_2SO_4 ta'sir ettirilganda 4,7 l (n.sh.) gaz ajralib chiqqan bo'lsa, dastlabki eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ullishini aniqlang?

Yechish: (100% + 150%) 5,82

1. Reaksiya tenglamasi $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 22,4

2. Birinchi eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ulushi $\omega_1(\text{Na}_2\text{CO}_3) = X_1$ va ikkinchi eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ulushi $\omega_2(\text{Na}_2\text{CO}_3) = X_2$ belgilaymiz.

3. Birinchi aralashmadagi Na_2CO_3 ning massasi $100 X_1 + 150 X_2$ bo'ladi.

4. Reaksiya tenglamasidan $(100 X_1 + 150 X_2) \cdot 22,4 \text{ l} = 106 \cdot 5,82$ оламиз.

Bundan $100 X_1 + 150 X_2 = 27,54$ (1)

5. Ikkinchi aralashmadagi Na_2CO_3 ning massasi $150 X_1 + 100 X_2$ bo'ladi. reaksiya tenglamasidan $(150 X_1 + 100 X_2) \cdot 22,4 = 106 \cdot 4,70$ оламиз.

Bunda $150 X_1 + 100 X_2 = 22,24$ (2)

(1) va (2) tenglamalarni birgalikda ishlaymiz.

$$\begin{cases} 100X_1 + 150X_2 = 27,54 \\ 150X_1 + 100X_2 = 22,24 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{bundan } \bar{O}_1 = 0,045, \text{ yoki } 4,5\% \\ \bar{O}_2 = 0,153, \text{ yoki } 15,3\% \end{array}$$

Dastlabki birinchi eritma tarkibida 4.5%, ikkinchi eritma tarkibida 15.3% Na_2CO_3 bo'lgan.

Nazorat savollari

1. KOH ning 200 g 18 % li eritmasiga qanday massali
 - a. KOH qo'shilganda 70% li
 - b. K_2O qo'shilganda 40% li eritmalar olinadi?
2. NaOH ning 120 g 20 % li eritmada qanday massali Na eritilishidan 50% li eritma olish mumkin?

1. 200 ml 40% li $\rho=1.12\text{ g/ml}$ bo'lgan H_2SO_4 H eritmasiga
 - a. 200 gr 60% li eritma
 - b. 80 gr NaOH
 - c. 1200 gr suv
 - d. 31 gr CaO
 - e. 46 gr Na solimganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini % aniqlang?
2. 500 gr 20% li CuSO_4 eritmasiga
 - a. 50 gr CuSO_4
 - b. 75 gr $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
 - c. 250 gr 40% li eritma
 - d. 60 gr suv

6.4. Molyar konsentratsiya

Eritmaning hajm birligida erigan moddaning miqdori shu eritmaning **molyar konsentratsiyasi yoki molyarligi** deyiladi. Uning birligi mol/l, mol l⁻¹, M.

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M_r \cdot V}$$

$$C_M = \frac{C\% \cdot d \cdot 10}{M_r}$$

C_M – molyar konsentratsiya (M, mol/l)

n – modda miqdori (mol)

V – hajm (l)

m – massa (g)

M_r – molyar massa (g/mol)

$C\%$ – foiz konsentratsiya (%)

$d(\rho)$ – zichlik

1. 5 l eritmada 3 mol erigan modda bo'lsa, shu eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan: $V = 5 \text{ l}$

$n = 3 \text{ mol}$

$CM = ?$

Yechish:

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{3 \text{ mol}}{5 \text{ l}} = 0.6 \text{ mol/l}$$

2. NaOH ning 240 g miqdori bilan joydalanib tayyorlangan 500 ml eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$m = 240 \text{ g}$

$V = 500 \text{ ml}$

$Mr(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$

$C_M = ?$

Yechish:

$$C_M = \frac{m}{M_r \cdot V} = \frac{240 \text{ g}}{40 \text{ g/mol} \cdot 0.5 \text{ l}} = 12 \text{ M}$$

3. Normal sharoitda 14 l HCl, 75 ml H_2O da erishidan hosil bo'lgan eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang? Bunda hajmning o'zgarishini hisobga olmang.

Berilgan: $V = 14 \text{ l}$

$V = 75 \text{ ml}$

$Mr(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$

$Mr(\text{HCl}) = 36.5 \text{ g/mol}$

$CM = ?$

Yechish:

a) modda miqdorini aniqlaymiz.

$$n = \frac{V}{V_n} = \frac{14 \text{ l}}{22.4 \text{ l}} = 0.625 \text{ mol}$$

b) eritmaning hajmi suvning hajmi teng deb olamiz.

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{0.625 \text{ mol}}{0.075 \text{ l}} = 8.33 \text{ mol/l}$$

4. KOH ning 100 ml, 1.5 M li eritmasining tarkibidagi KOH ning massasini aniqlang?

Berilgan:

$V = 0.1 \text{ l}$

$C_M = 1.5 \text{ M}$

$Mr(\text{KOH}) = 56 \text{ g/mol}$

$m = ?$

Yechish:

$C_M = \frac{m}{M_r \cdot V}$ formuladan foydalanib m ni aniqlaymiz.

$$m = C_M \cdot M_r \cdot V = 1.5 \text{ M} \cdot 56 \text{ g/mol} \cdot 0.1 \text{ l} = 8.4 \text{ g KOH bor ekan.}$$

5. 240 g NaOH dan foydalanib qanday hajmdan 1 M eritmasini olish mumkin?

Berilgan:

$m = 240 \text{ g}$

$C_M = 1 \text{ M}$

$V = ?$

Yechish:

$C_M = \frac{m}{V \cdot M_r}$ dan foydalanib V ni topamiz.

$$V = \frac{m}{C_M \cdot M_r} = \frac{240 \text{ g}}{1 \text{ M} \cdot 40 \text{ g}} = 6 \text{ l}$$

eritma linadi.

6. Zichligi 1.84 g/ml bo'lgan sulfat kislota 98% li eritmasining molyar konsentratsiyasini aniqlang.

Berilgan: $\rho = 1.84 \text{ g/ml}$

$W = 98\%$

$M_r(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$

$C_M = ?$

Yechish:

Foiz konsentratsiya berilganda quyidagi fo'rmuladan foydalanamiz.

$$C_M = \frac{C\% \cdot d \cdot 10}{M_r} = \frac{98\% \cdot 1.84 \text{ g/ml} \cdot 10}{98 \text{ g/mol}} = 18.4 \text{ mol/l} \quad \text{eritma.}$$

7. Agar 250 ml eritmada 68,4 g $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ erigan bo'lsa, eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang.

Berilgan:

$V_{\text{eritma}} = 250 \text{ ml}$

$m_{\text{uz}} = 68.4 \text{ g}$

$M_r(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 342 \text{ g/mol}$

$C_M = ?$

Yechish:

Bu fo'rmuladan foydalanamiz.

$$C_M = \frac{m}{M_r \cdot V} = \frac{68.4 \text{ g}}{342 \text{ g/mol} \cdot 0.25 \text{ l}} =$$

$= 0.8 \text{ mol/l}$ li eritma ekan.

2-usul. 68,4 r ga teng bo'lgan alyuminiy sulfat moddasining miqdorini topamiz.

$$n(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = \frac{m_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}}{M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}} = \frac{68,4}{336} = 0,2 \text{ mol}$$

Eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlaymiz.

$$C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = \frac{n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}}{V} = \frac{0,2 \text{ mol}}{0,25 \text{ l}} = 0,8 \text{ mol/l}$$

Demak, eritmaning molyar konsentratsiyasi 0,8 mol/l ga, molyarligi 0,8 M ga teng bo'ladi.

Nazorat savollari

- 4 l eritmada 1,6 mol erigan modda bo'lsa, molyarligini toping?
J: 0,4 mol/l
- 2,5 l eritmada NaOH ning massasi 12 gr bo'lsa, molyar konsentratsiyasini aniqlang? J: 0,12M
- 500 gr $\rho=1,25$ g/ml eritmada 160 gr NaOH bo'lsa, eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang? J: 10 M
- 250 ml 6 M li eritmadagi sulfat kislotasining massasini aniqlang?
J: 147 gr
- 800 gr $\rho=1,2$ g/ml NaOH eritmasi molyarligi 3 ga teng bo'la, NaOH ning massasini aniqlang? J: 80 gr

Turli molyarli eritmalar tayyorlash

Turli modda va eritmalar aralashtirib har xil eritmalar tayyorlashda hosil bo'lgan eritma hajmi quyidagicha hisoblaymiz.

❖ *hosil bo'lgan eritma zichligi berilmaganda ya'ni hajm o'zgarishi hisobga olinmaganda:*

a) *suyuqlikda qattiq modda erisa hosil bo'lgan eritma hajmi suyuqlik hajmiga teng deb qaraladi.* M: 1 l suvda 50 g NaCl eriganda hosil bo'lgan eritmaning hajmi ham 1 l deb olamiz.

b) *suyuqlikda suyuq moddalar erigan bo'lsa, bunda hosil bo'lgan eritmaning hajmi ikkala suyuqliklarning hamming yig'indisiga teng bo'ladi.*

M: 2 l suvda 2 l spirt erigan bo'lsa, eritmaning hajmi 4 l deb olinadi.

c) *Suyuliklarda gaz moddalar erigunchilikda, eritmaning hajmi dastlabki suyuqlikning hajmida ya'ni gazning hajmi ahamiyatga ega bo'lmaydi.* Misol uchun 4 l HCl eritilgan bo'lgan eritmaning hajmi ham qolganadi.

❖ *Hosil bo'lgan eritmaning zichligi bo'lgan gaz, suyuqlik, qattiq ya'ni har qanday modda aralashmasi bo'lganligi nazar ularning massalari qo'shilib eritmaning umumiy massasi topiladi va zichlikdan hajm aniqlanadi.*

Masalan:

1. Natriy ishqorining 250 ml ($\rho=1.24$ g/ml) bo'lgan 40% li eritmasi 350 ml ($\rho=1.12$ g/ml) 18% li eritmalari aralashtirilsa, hosil bo'lgan yangi eritmaning massa ulushini va molyar konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$V_{\text{eritma}}=250$ ml

$\rho_1=1.24$ g/ml

$W_1=40\%$

$V_{\text{eritma}}=350$ ml

$\rho_2=1.12$ g/ml

$W_2=18\%$

$W_3=?$, $CM=?$

Yechish:

1-usul.

1- eritmaning tarkibini aniqlaymiz.

a. $m^1_{\text{eritmasi}} = \rho^1 \cdot v^1 = 1.24 \text{ g/ml} \cdot 250 \text{ ml} = 310 \text{ g}$

b. $m^1_{\text{tuz}} = W^1 \cdot m^1_{\text{eritmasi}} = 310 \text{ g} \cdot 0.4 = 124 \text{ g NaOH bor.}$

2- eritmaning tarkibi

c. $m^2_{\text{eritmasi}} = \rho^2 \cdot v^2 = 1.12 \text{ g/ml} \cdot 350 \text{ ml} = 392 \text{ g}$

b. $m^2_{\text{tuz}} = W^2 \cdot m^2_{\text{eritmasi}} = 392 \text{ g} \cdot 0.18 = 70.56 \text{ g NaOH bor.}$

Aralashtirilgandan so'ng massalar ham hajmlar ham qo'shiladi.

$m^3_{\text{eritma}} = m^1_{\text{eritmasi}} + m^2_{\text{eritmasi}} = 310 \text{ g} + 392 \text{ g} = 702 \text{ g}$

$m^3_{\text{tuz}} = m^1_{\text{tuz}} + m^2_{\text{tuz}} = 124 \text{ g} + 70.56 \text{ g} = 194.6 \text{ g}$

$V^3_{\text{eritma}} = V^1_{\text{eritma}} + V^2_{\text{eritma}} = 250 \text{ ml} + 350 \text{ ml} = 600 \text{ ml}$

Bular topilgandan so'ng oshqorning massa ulishini va molyar konsentratsiyasini aniqlaymiz.

$$W_{\text{NaOH}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{104.6 \text{ g}}{3702 \text{ g}} = 0.2772 \text{ yoki } 27.72\%$$

$$C_M = \frac{m_{\text{NaOH}}}{M_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{eritma}}} = \frac{194.6 \text{ g}}{40 \text{ g/mol} \cdot 0.6 \text{ l}} = 8.1 \text{ M}$$

2. 500 ml 1 M li va 500 ml 1.5 M eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan yangi eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$$C_M^1 = 1 \text{ M}$$

$$C_M^2 = 1.5 \text{ M}$$

$$V_{\text{eritma}}^1 = 500 \text{ ml}$$

$$V_{\text{eritma}}^2 = 500 \text{ ml}$$

$$C_M^3 = ?$$

Yechish:

Har bir eritma tarkibidagi moddalarning miqdorini aniqlaymiz.

$$n_1 = C_M^1 \cdot V^1 = 1 \text{ M} \cdot 0.5 \text{ l} = 0.5 \text{ mol}$$

$$n_2 = C_M^2 \cdot V^2 = 1.5 \text{ M} \cdot 0.5 \text{ l} = 0.75 \text{ mol dan}$$

modda bor. Modda miqdorlarini qo'shamiz.

$$n_3 = n_1 + n_2 = 0.5 \text{ mol} + 0.75 \text{ mol} = 1.25 \text{ mol}$$

modda bor.

$$\text{Vajmalar esa } V_3 = 500 \text{ ml} + 500 \text{ ml} = 1000 \text{ ml} = 1 \text{ l}$$

Yangi eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlaymiz.

$$C_M^3 = \frac{n_3}{V^3} = \frac{1.25 \text{ mol}}{1 \text{ l}} = 1.25 \text{ mol / l}$$

$$W_{\text{BaCl}_2} = \frac{m_{\text{BaCl}_2}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{194.6 \text{ g}}{702 \text{ g}} = 0.2772, \text{ yoki } 27.72 \%$$

$$C_M = \frac{m_{\text{BaCl}_2}}{V_{\text{eritma}}} = \frac{194.6 \text{ g}}{40 \text{ g mol}^{-1} \cdot 0.6 \text{ l}} = 8.1 M$$

2. 500 ml 1 M li va 500 ml 1.5 M eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan yangi eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$$C_M^1 = 1 \text{ M}$$

$$C_M^2 = 1.5 \text{ M}$$

$$V_{\text{eritma}}^1 = 500 \text{ ml}$$

$$V_{\text{eritma}}^2 = 500 \text{ ml}$$

$$C_M^3 = ?$$

Yechish:

Har bir eritma tarkibidagi moddalarning miqdorini aniqlaymiz.

$$n_1 = C_M^1 \cdot V^1 = 1 \text{ M} \cdot 0.5 \text{ l} = 0.5 \text{ mol}$$

$$n_2 = C_M^2 \cdot V^2 = 1.5 \text{ M} \cdot 0.5 \text{ l} = 0.75 \text{ mol dan}$$

modda bor. Modda miqdorlarini qo'shamiz.

$$n_3 = n_1 + n_2 = 0.5 \text{ mol} + 0.75 \text{ mol} = 1.25 \text{ mol}$$

modda bor.

$$\text{Vajmalar esa } V_3 = 500 \text{ ml} + 500 \text{ ml} = 1000$$

$$\text{ml} = 1 \text{ l}$$

Yangi eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlaymiz.

$$C_M = \frac{n^3}{V^3} = \frac{1.25 \text{ mol}}{1 \text{ l}} = 1.25 \text{ mol / l}$$

Nazorat savollari

1. 100 ml 3 M li va 800 ml 2 M li eritmalar aralashtirilib, shundan hosil bo'lgan yangi eritma molyarligi qanday bo'ladi? J: 2.33 M
2. 200 gr $\rho = 1.2$ g/ml 5 M li va 100 ml 2 M li eritmalar aralashtirilib, shundan hosil bo'lgan eritmaning molyarligi qanday bo'ladi? J: 3.8 M
3. 100 gr $\rho = 1.25$ g/ml 0.6 M li va 100 ml 4 M li eritmalar aralashtirildi. Hosil bo'lgan yangi eritmaning $C_m = ?$ J: 3.66 M
4. 100 ml 4 M H_2SO_4 eritmasi 200 gr $\rho = 1.25$ g/ml 36% li eritmasi bilan aralashtirishdan hosil bo'lgan eritmaning molyar konsentratsiyasi qanday bo'ladi? J: 4.2 M
5. 500 gr $\rho = 1.2$ g/ml 0.8 M va 200 gr $\rho = 1.25$ g/ml 30% li sulfat kislota eritmaları aralashtirilsa, hosil bo'lgan eritma molyarligi qanday bo'ladi? J: 1.65 M
6. 3 l 2 M li HCl eritmasida 8.2 l HCl gazı yuttirilganda hosil bo'lgan eritmaning $C_m = ?$ J: 2.12 M

6.5. Normal konsentratsiya

Eritmaning hajm birligida erigan moddaning ekvivalent miqdori shu eritmaning normalligini ko'rsatadi. C_n – bilan belgilanadi. Birligi – g/ekvi/l, mol ekvi/l, ekvi/l ga teng.

$$C_n = \frac{m_{\text{erigan mod}}}{E \cdot V_{\text{eritma}}(l)}$$

Normal konsentratsiya 1 l yoki (1000 ml) eritmada necha ekvivalent erigan modda borligini ko'rsatadi.

Ekvivalentni avvalgi mavzularda topganimizdek topiladi.

C_n , W , C_m lar o'rtasida quyidagicha bog'lanish mavjud.

$$\rho \cdot 10^3 \cdot W = C_m \cdot Mr = C_n \cdot E$$

$$C_n = \frac{C\% \cdot \rho \cdot 10}{Mr}$$

Masalan

1. 14.8 g $Ca(OH)_2$ tutgan 500 ml eritmaning normal konsentratsiyasini aniqlang.

Berilgan:

$m(\text{Ca(OH)}_2) = 14.8 \text{ g}$

$M_r(\text{Ca(OH)}_2) = 74 \text{ g/mol}$

$V = 37 \text{ ml} = 0.037 \text{ l}$

$C_n = ?$

Yechish:

$$C_n = \frac{m(\text{normal})}{V(\text{l})} = \frac{14.8 \text{ g}}{37 \text{ g} \cdot 0.037 \text{ l}} = 10.8 \text{ N}$$

li eritma ekan.

2. Zichligi 1.64 g/ml bo'lgan 90% li sulfat kislotaning normal konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$\rho = 1.64 \text{ g/ml}$

$W = 90 \%$

$M_r(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$

$C_n = ?$

Yechish:

$$C_n = \frac{C\% \cdot \rho \cdot 10}{M_r} = \frac{90\% \cdot 1.64 \text{ g/ml} \cdot 10}{98 \text{ g/mol}} = 15.06 \text{ N} \quad \text{li eritma}$$

ekan.

3. H_3PO_4 ning 2 M li eritmasining normal konsentratsiyasini aniqlang

Normal konsentratsiya va molyar konsentratsiya o'rtasidagi bo'liq fo'rmuladan foydalanamiz.

$$C_m \cdot M_r = C_n \cdot E \quad \text{dan } C_n \text{ ni topamiz.}$$

$M_r(\text{H}_3\text{PO}_4) = 98 \text{ g/mol}$

$$C_n = \frac{C_m \cdot M_r}{E} = \frac{2 \text{ M} \cdot 98 \text{ g}}{32.67 \text{ g}} = 6 \text{ N}$$

$E(\text{H}_3\text{PO}_4) = 32.67$

4. Sulfat kislotaning 200 ml 6 N li eritmasini to'la neytallash uchun natriy ishqorining 24% li eritmasidan (zichligi 1.32 g/ml) qancha hajm olinishi kerak?

1- usul.


Yechish:

a. $Cn = \frac{W_{\text{eritmasi}}}{E \cdot V_{\text{eritmasi}}}$ dan qancha massa sulfat kislotasi borligini

aniqlaymiz.

$$m_{\text{eritmasi}} = Cn \cdot E \cdot V_{\text{eritmasi}} = 6N \cdot 49 \cdot 0.24 = 58.8 \text{ g } H_2SO_4 \text{ bo'lgan.}$$

b. Shunday qilib kislotasi qancha massa NaOH eritmasini neytrallash uchun yetarli bo'lishini aniqlaymiz.



$$\begin{array}{ccc} 98 \text{ g} & & 80 \text{ g} \\ 58.8 \text{ g} & \times & x = ? \end{array}$$

$$x = \frac{58.8 \text{ g} \cdot 80 \text{ g}}{98 \text{ g}} = 48 \text{ g} \quad \text{NaOH sarflanadi.}$$

NaOH ning massa eritmasini aniqlaymiz.

$$m_{\text{eritmasi}} = \frac{m_{NaOH}}{W} = \frac{48 \text{ g}}{0.24} = 200 \text{ g}$$

Keyin hajmini aniqlaymiz.

$$V = \frac{m_{\text{eritmasi}}}{\rho} = \frac{200 \text{ g}}{1.32 \text{ g/ml}} = 151.5 \text{ ml} \quad \text{NaOH eritmasidan kerak.}$$

2-usul.

Agar ikkita modda reaksiyaga kirishayotgan bo'lsa, ularning normaligi va hajmi berilsa ikkinchi eritmaning

$$Cn = \frac{C\% \cdot \rho \cdot 10}{Mr} = \frac{24\% \cdot 1.32 \text{ g/ml} \cdot 10}{40 \text{ g/mol}} = 7.92N$$

$$Cn^1 \cdot V^1 = Cn^2 \cdot V^2 \quad \text{dan } V^2 \text{ ni aniqlaymiz.}$$

$$V^1 = \frac{Cn^1 \cdot V^1}{Cn^2} = \frac{6N \cdot 200 \text{ ml}}{7.92N} = 151.5 \text{ ml} \quad \text{NaOH eritmasidan sarflangan.}$$

5. Agarda 250 ml alyuminiy sulfat eritmasida 8,57 g tuz erigan bo'lsa, uning ekvivalent konsentratsiyasi yoki normalligini aniqlang.

Bu eritma almashinish reaksiyasi bo'yicha qancha moliy sulfatni ishlatishga mumkin?

Yechish. Masala shartida ko'ra alyuminiy sulfatning ekvivalent soni $(Al_2(SO_4)_3 = 6 \text{ g})$ bo'lsa, uning ekvivalent reaksiyasi:

$$M_{\text{molar}} Al_2(SO_4)_3 = \frac{M(Al_2(SO_4)_3)}{Z(Al_2(SO_4)_3)} \text{ бўлади.}$$

$$C_{\text{molar}}(Al_2(SO_4)_3) = \frac{n_{\text{molar}}}{V} = \frac{m_{\text{molar}}}{M_{\text{molar}} \cdot V} = \frac{m_{\text{molar}} \cdot Z_{\text{molar}}}{M_{\text{molar}}(SO_4)_3 \cdot V} = \frac{49.5 \cdot 6}{342 \cdot 0.25} = 0.6 \text{ molar/l}$$

Nazorat savollari

1. 500 ml eritmada 49.5 gr H_2SO_4 erigan bo'lsa, normalligini aniqlang? J: 2.02 N

2. 3 l eritmada 600 gr HNO_3 bo'lsa, Cn=? J: 5 N

3. 400 ml 2.5 N li H_3PO_4 eritmasidagi kislota massasini aniqlang? J: 32.67 gr

4. 500 gr 30% li H_2SO_4 kislota eritmasining $\rho=1.2 \text{ g/ml}$ bo'lsa, Cn=? J: 7.4 N

5. 6 M li H_3PO_4 eritmasining Cn=? J: 18 N

6. 3 l 2 N NaOH eritmasining $\rho=1.14 \text{ g/ml}$ bo'lsa, C%=? J: 7%

7. 25 % li $\rho=1.16 \text{ /ml}$ bo'lgan sulfat kislota eritmasining molyar va normal konsentratsiyasini aniqlang? J: Cm=2.96 M, Cn=5.92 N

8. $\rho=1.28 \text{ g/ml}$ 6 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal va foiz konsentratsiyasini aniqlang? J: C%=34.68%, Cn=12N

6.6. Titr konsentratsiya

Eritmaning har 1 ml da eritgan moddaning massasini ko'rsatadigan kattalik – titr deyiladi.

$$T = \frac{m_{\text{erigan modda}}}{V_{\text{eritma}}(ml)}$$

$$1) \text{ Molyar konsentratsiya bilan bog'liqligi } - T = \frac{Cm \cdot Mr}{1000}$$

$$T = C_{\text{m}}, p.10$$

2) Normal konsentratsiyasi bilan bog'liqligi - $T = \frac{C_m \cdot M_r}{1000}$

Masalalar

1. 500 ml erimada 200 gr erigan modda bo'lsa, eritma titrini aniqlang?

$$T = \frac{m_{eritma} (gr)}{V_{eritma} (ml)} = \frac{200 \text{ gr}}{500 \text{ ml}} = 0.4 \text{ g/ml}$$

2. 5 M li sulfat kislotasining normal konsentratsiyasini aniqlang?

$$T = \frac{C_m \cdot M_r}{1000} = \frac{5 \text{ M} \cdot 98 \text{ g/mol}}{1000} = 0.49 \text{ g/ml}$$

Mustaqil ishlash uchun

1. 300 gr 15% li NaOH erimasi zichligi 1.2 g/ml bo'lsa, uning titrini aniqlang? J: 0.18 g/ml

2. 500 gr 14% li H_2SO_4 kislota $\rho = 1.25 \text{ g/ml}$ bo'lsa, $T = ?$ J: 0.175 g/ml

3. Titirlari bir hil bo'lgan H_2SO_4 , NaOH, HCl eritmaları molyarligi ortish tartibida yozing? J: H_2SO_4 , NaOH, HCl

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba. Tuz va suvdan iborat eritma tayerlash. O'qituvchi sizga qaysi tuzdan eritma tayerlash va uning massa ulushi nechaga teng bo'lishi haqida topuiriq bergandan so'ng, ishni quyidagi tartibda bajaring:

1. Tuzning massasini xisoblang va uni tarozida tortib oling.

2. Suv massasini uning xajmiga teng deb xisoblab, kerakli miqdor suvni o'lchov tsilindrda o'lchab oling va uni tuz solingan stakanga quying.

3. Stakandagi tuz to'liq erib ketguncha eritmani aralashtirgich bilan aralashtiring.

4. Eritmani tsilindrga quyib, hajmini o'lchang.
- 2-Tajriba natijalaridan eritmani konsentratsiyasini aniqlash.
1. Eritma konsentratini areometr yordamida aniqlash(6.1-rasm).



6.1.rasm Areometr ko'rinishi

Buning uchun eritmani toza tsilindrga quyib, extiyotlik bilan quruq areometr tushiriladi, bunda areometr silindr tubiga tegib turmasligi kerak. Zichlikning qanday qiymatga ega bo'lganligini bilish uchun areometrining shkalasining tsilindrda suyuqlikning pastki meniskiga to'g'ri keladigan shkala chizig'i aniqlanadi. Silikalaning darajalari suyuqlikning zichligini ko'rsatadi.

Eritma zichligini aniqlangandan so'ng unga to'g'ri keladigan massa ulushi qiymati quyida keltirilgan 6.1- jadvaldan olinadi.. Tuzlarning suvli eritmalarini 20°C dagi nisbiy zichliklari

6.1-jadval

Massa ulushi C(%)	NaCl	(NH ₄) ₂ SO ₄	BaCl ₂	NaNO ₃	NH ₄ Cl	H ₂ SO ₄	NaOH	HNO ₃
3	1,027	1,022	1,034	1,025	1,011	1,020	1,032	-
6	1,041	1,034	1,053	1,039	1,017	1,041	1,065	1,038
8	1,056	1,046	1,072	1,053	1,023	1,055	1,087	1,044
10	1,071	1,057	1,092	1,067	1,029	1,069	1,109	1,056
12	1,086	1,069	1,113	1,082	1,034	1,088	1,131	1,068

Agar jadvalda o'lgangan zichlikning qiymati bo'lmasa, u xolda uning qiymati interpolatsiya usuli bilan topiladi.

Interpolatsiya usuli.

Masalan: NaCl uchun o'lgangan zichligi $\rho_{o'lgan} = 1,045$ g/ml ga teng, jadvalda bu miqdor yo'q, shuning uchun jadvaldan katta va kichik qiymatlarni olamiz:

$$\rho_{\text{kat}} = 1,056; \quad c_{\text{kat}} = 8 \% ;$$

$$\rho_{\text{kichik}} = 1,041; \quad c_{\text{kichik}} = 6 \% ;$$

Ushbu bularning ayrimasini quyidagidek yozamiz

$$\Delta \rho = 0,015 \quad \Delta s = 2\%$$

Shunday qilib, ρ_{kat} bilan ρ_{kichik} o'rtasidagi farq aniqlanadi:

$$\Delta \rho = \rho_{\text{kat}} - \rho_{\text{kichik}} = 1,045 - 1,041 = 0,004$$

Nihoyat, $\Delta \rho = 0,004$ ga to'g'ri keladigan Δc ning qiymatini topish uchun proporsiya tuziladi:

$$\Delta \rho - \Delta c \quad 0,015 - 2\%$$

$$\Delta \rho - \Delta c \quad 0,004 - \Delta c \%$$

$$\Delta c = \frac{0,004 * 2}{0,015} = 0,53$$

Topilgan Δs ning qiymatini jadvaldan olingan konsentratsiyaning kichik qiymatiga qo'shib, haqiqiy massa ulushi topiladi

$$c_{\text{haq}} = c_{\text{kichik}} + \Delta c = 6 + 0,53 = 6,53 \%$$

Aniqlangan qiymatlardan foydalanib eritmani molyal, molyar va normal konsentratsiyalari hisoblab toping.

7.0.ELEKTROLITIK DISSOTSILANISH

Moddalarni elektr o'tkazuvchanligiga qarab 4 turga bo'lamiz.

1. Metallarni elektr o'tkazuvchanligiga qarab, (1) metallar ular elektr tokini delokullashgan lektronlarining erkin harakati hisobiga o'tkazadi. Bu jarayon fizikaviy hodisa, Masalan: Fe, Cu, Al metallari.


2. Yarim o'tkazgichlar ular elektr tokini bir yo'nalishda o'tkazdi. M; Si, Se, In lar shu xususiyati tufayli o'zgaruvchan tokni bir tomonga o'tkazganligi uchun ular dan Diodlar tayyorlanadi.

3. Elektrolitlar : bunday moddalarning ko'pchiligi qattiq holatda elektr tokini o'tkazmaydi. Faqat suvda eritilganda yoki suyultirilganda elektr tokini o'tkazadi. Ularda elektr toki o'tayotganda kimyoviy o'zgarish sodir bo'ladi. M: NaCl, K₂SO₄, Al(NO₃)₃ - tuzlar; H₂SO₄, HCl, HNO₃ - kislotalar. KOH, Ba(OH)₂, NaOH - ishqorlar; elektrolitlardir.

4. ch. moddimalar; shakar, spirt, H_2O , N_2 , CH_4 , ko'pchilik organik moddalar elektr tokini o'tkazmaydigan moddalar "Dielektriklar" ham deyiladi

7.1. Moddalarning suvda erish mehanizmi

Suv H_2O molekularining O, kislorod joylashgan tomoni manfiy (-), H_2 - hidrogen joylashgan tomoni ijobiy (+) (a) bo'lib, a) qutbli ya'ni dipol deyilib (b) bilan ifodalanadi.



Moddalarning suvda eruvchanligi ularning qutbliligiga ya'ni bog' tabiatiga bog'liq bo'lib ion bog'li va qutbli kovalent bog'li moddalar suvda yaxshi eriydi, qutbsiz ham qutbli kovalent bog'li moddalar suvda oz eriydi, yaxshi eriganda ham ionlarga ajralmaydi. Umuman olganda qutbli qutblida, qutbsiz qutbsizda yaxshi eriydi. Moddaning ionlarga ajralish jarayoni elektrolit dissotsiyanish deyiladi. Natijada sekin harakatlanadigan ionlar paydo bo'lib elektr tokini o'tkazadi.

Ko'pchilik moddalarda suv molekularining bir qismi mustahkamlanadi. Bunday moddalar bug'latilganda suv saqlaydigan gidratlar kristalgidratlarni hosil qiladi.

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ mis kuporosi,

$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristall soda,

$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ glauber tuzi,

$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ gips.

ION bog'li moddalar suyuqlantirilganda ham ionlarga ajraladi.

Elektr o'tkazuvchanligini aniqlash,

1) $NaCl$ (kristall) eritmasi elektr tokini o'tkazadi

2) H_2SO_4 100% li eritmasi elektr tokini o'tkazmaydi

3) $NaOH$ eritmasi elektr tokini o'tkazadi

4) H_2SO_4 40% li eritmasi elektr tokini o'tkazadi

5) Shakarning 10% li eritmasi elektr tokini o'tkazadi


6) N_2 (suyuqlanmasida) tokini o'tkazadi.

Moddalar eritmasida ajralish haqidagi qonuni S. Arrinius taklif etgan. Bu nazariya quyidagicha ta'riflanadi:

1) elektrolit eritmasida yoki suyuqlanmasida elektronlarga ajraladigan moddalar mavjud. Ionlar atom yoki atomlar guruhidan iborat bo'lishi mumkin. Bu moddalar zaryadli ionlar kation, manfiy zaryadlisi anion deyiladi.





2) Ionlar atomlardan tuzilishi va xossalari bilan farq qiladi.



3) Elektrolit eritmasi va suyuqlanmasida ionlar tartibsiz harakatda bo'ladi, undan o'zgarmas tok o'tkazilganda kationlar katodga, anionlar anodga tomon harakatlanadi.

7.2. Ionlarning elektron konfiguratsiyasi

$E^- \Sigma_p < \Sigma_e$ anion, $E^+ \Sigma_p > \Sigma_e$ kation, $E^0 \Sigma_p = \Sigma_e$ atom.



Quyidagilarning electron konfiguratsiyasini yozing:

1. Si^{+4} , P^{-3} , Cs^{+1} , Pb^{+4} , N^{-3} , Cr^{-3} , Mn^{+4} , Mo^{+6} , Ag^{+1} , Sn^{+2} larning electron konfiguratsiyasini yozing?

2. Quyidagi noma'lum ionlarning konfiguratsiyasi berilgan. Shu asosida noma'lum elementni aniqlang?

$E^{-2} \dots 2s^2$ - qaysi element.

$E^{+3} \dots 2s^2 2p^5$ $E^{2-} \dots 5s^2 5p^6$ $E^{+4} \dots 3d^5$ $E^{+3} \dots 4d^4$ $E^{+1} \dots 5d^5$ $E^{-1} \dots 4s^2 4p^6$

Masala:

1. Fe^{+2} dan 4 marta ko'proq elektroniga ega bo'lgan 100% anion qaysi element ekanligini aniqlang. S^{+2} dan 3 marta ko'proq elektroniga ega bo'lgan E^{+1} ion qaysi element ekanligini aniqlang?

7.3. Ion radiusini taqqoslash

Atom kationga aylanganida radius kichrayadi, anionga aylanganida esa atom radiusi kattalashadi. 10 elektronli zarrachalarning ko'proq electron bergani kichikroq, ko'proq electron bergani kattaroq bo'ladi. O'lchami eng kichik bo'lgan H^+ ionidir. Bu boshqa ionlardan 10⁵ marta kichikroq.

F^- , Ne , Na^+ , Mg^{+2}

Ion radiusi kichrayadi.

$\bar{r}$ 10 10 10 10

p 9 10 11 12

Quyidagi ionlarning radiusini taqqoslang.

$\text{S}^{+4} > \text{S}^{-6}$ O^0 O^{-2}

N^{-1} N^- S^{-2} S^{-4}

Cl^0 Cl^{+3} Cl^{+5} Cl^{-1}

Ar^0 Cl^{-1} Ar^0 Ca^{+2}

S^{-2} Cl^{-1} Ca^{+2} S^{-2}

Quyidagi tartibda ionlarning radiusi qanday tartibda ko'zgaradi.

Kr^0 , Br^{-1} , Se^{-2} , Rb^{-1} , Se^{-2}

Se^{+2} , Rb^{-1} , Kr^0 , Br^{-1} , Se^{-2}



7.4. Kislota, asos, tuzlarning dissotsiyalanishi

Kislota — dissotsiyalanganda kation sifatida H^+ , anion sifatida kislota qoldig'i hosil bo'ladigan moddalarga aytiladi.





Ko'p negizli kislotalar bosqichli dissotsiylanadi.




Dissotsilanish bosqichlari bo'yicha qiyinlashib boradi. Masalan: H_3PO_4 eritmasida ionlarning konsentratsiyasi H^+ , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} , PO_4^{3-} tartibida kamayib boradi. Hamma kislotalar eritmada H bo'lgani uchun o'xshash xossaga ega. Lakmusni qizartiradi. Ta'mi nordon. Ular metallar, metal oksidlari, asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Kislotalar eritmasida erkin H^+ ionlari emas: gidratlangan H^+ ionlari bo'ladi.



Gidroksoniy kationi

Asoslar – dissotsiylanganda kation sifatida metall ioni, anion sifatida OH^- ajratadigan moddalarga aytiladi.

Ko'p negizli kuchli asoslar bir bosqichda dissotsiylanadi. Ko'p negizli kuchsiz asoslar bosqichli dissotsiylanadi.



Asoslar eritmada umumiy OH^- ionlari bo'lgani uchun indikatorlar rangini o'zgartiradi.

Lakmus – ko'kartinadi,




Fenolftalen – pushti,

Metal arg'aldog'i – sariq.

Ular kislotalar, kislotali oksidlar bilan neytrallanish reaksiyaga kirishadi. Terini o'yuvchi xususiyatga ega shuning uchun o'yuvchi deb ham ataladi.

Tuzlar – dissotsiylanganda kation sifatida metall kationini, anion sifatida kislota qoldig'ini hosil qiladigan moddalarga aytiladi.

O'rta tuzlar bir bosqichda dissotsiylanadi.



Nordon tuzlar bosqichli dissotsiylanadi.

I – bosqichda kislota qoldig'i bo'ladi.

II – bosqichda kislota qoldig'i va H^+ kationlari ajraladi.

I- bosqichda $Na_2HPO_4 = 2Na^+ + HPO_4^{2-}$

II- bosqichda $HPO_4^{2-} = H^+ + PO_4^{3-}$

Nordo tuzlar eritmalarida H^+ bo'lgani uchun I slotaga o'lishash umumiy xossani namoyon qiladi.

Asosli tuzlar dissotsiylanganda metall kationi, kislota qoldig'i va OH^- ionlarini ajraladi.

$BaOHNO_3 = Ba^{2+} + OH^- + NO_3^-$

Bu tuz eritmaları asos o'xshash umumiy xossaga namoyon qiladi. Qo'sh va asosli tuzlar bosqichli dissotsiylanadi. Metal kationlari va kislota qoldiqlari hosil qiladi.

$KAl(SO_4)_2 = K^+ + Al^{3+} + SO_4^{2-}$

$CaOCl_2 = Ca^{+2} + Cl^- + OCl^-$

Kompleks tuzlar – dissotsiylanganda tashqi va ichki sferalarga ajraladi. Ichki sfera esa deyarli ionlarga ajralmaydi.

$K_3[Fe(CN)_6] = 3K^+ + [Fe(CN)_6]^{-3}$

7.5. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi

Shved olimi S. Arrenius (1887 y) elektrolit eritmalarining elektr o'tkazuvchanligi bilan Vant-Goff va Raul qonunlariga bo'ysunmasligi orasida ichki bog'lanish bor degan xulosaga keldi. U elektrolit molekulari suvda eriganda ionlarga parchalanadi, deb taxmin qiladi. Shunday qilib, elektrolit dissotsilanish nazariyasi vujudga keldi. Lekin bu nazariya elektrolit molekulari ionlarga dissotsilanish sababini tushuntirib bera olmadi. Bu nazariya D. I. Mendeleyevning "gidratlar nazariyasiga" asoslangan I. A. Kablukov va V. P. Kistya-kovskiylarning ishlarida o'z rivojini topdi. Elektrolit molekularining parchalanishiga erituvchining qutblangan molekulari sabab bo'ladi. Anorganik moddalarning oddiy erituvchisi bo'lgan suv juda katta solvatlash xossasiga ega. Erituvchining qutblangan molekulari ularga tushgan elektrolit molekularini o'rab olib, unda ichki bog'lanishni bo'shashtiradi, bu esa dissotsilanishga olib keladi. Natijada eritmada gidratlangan

ionlar saydi kamayadi. Ionlarga parchalanish faqat suvda emas, balki boshqa erituvchilarda masalan, spirt, benziol, xloroformda ham bo'lishi mumkin. Hozirda dissotsilanish reaksiyasini ionlarning solvatlari deyiladi. Suvda bo'lgan ionlar erituvchi qutbli molekulalar bilan bog'lanib solvatlanadi va ionlarning saydi kamayib xosil qiladi. Erituvchi solvatlangan ionlar uzluksiz betartib harakatda bo'ladi. (masalan, NaCl tuzining suvda erish protsessi). Kristal panjarasi ionlardan iborat moddalarda solvatlari qutbli molekulalar bilan ionlarga dissotsilanadi.

Oddiy erituvchi suvning dielektrik o'tkazuvchanligi juda yuqori, bundan tashkari suv eng yaxshi ionlashtiruvchi eritmadir. Suvning dielektrik o'tkazuvchanligi 80,1 teng. Bu shuni ko'rsatadiki, kristallda bo'lgan musbat va manfiy ionlararo tortishish kuchlari suvdagi eritmada 80,1 marta kamayadi. Dielektrik doimiylik efir, benzol, uglerod (IV)-sulfid kabi erituvchilarda, ya'ni dissotsilanmaydigan moddalar uchun juda kichikdir. Kuchsiz darajada ionlatuvchi spirt, atseton va boshqa erituvchilarda dielektrik o'tkazuvchanlik o'rtacha qiymatga ega bo'ladi.

Quyidagi jadvalda ba'zi erituvchilarning dielektrik o'tkazuvchanligi (20°C) keltirilgan.

Ba'zi erituvchilarning dielektrik o'tkazuvchanligi (20°C)

Erituvchi	Dielektrik o'tkazuvchanlik	Erituvchi	Dielektrik o'tkazuvchanlik
Suv	80,1	Xloroform	5,0
Metil spirt	33,0	Dietil efir	4,34
Etil spirt	25,7	Uglerod (IV)-sulfid	2,62
Atseton	21,7	Benzol	2,28

Elektrolitlar tabiatiga qarab kuchli va kuchsiz elektrolitlarga bo'linadi. Kuchli elektrolitlar to'liq, kuchsiz elektrolitlar qisman eritmada ionlarga dissotsilanadi. Kuchsiz elektrolitlarning dissotsilanishi qaytar protsessdir: chunki eritmada gidratlangan ionlar to'qnashishi natijasida yana dissotsilanmagan molekulalar xosil qilish mumkin. Bunday qaytar protsessni molyarlanish deyiladi. Elektrolitik dissotsilanish protsess kinetik muvozanat qaror topganda, ya'ni dissotsilanish tezligi

molaj bo'lish tezligiga teng bo'lgan bo'lib qoldir bo'ladi. Masalan, sirka kislotasi eritmasi uchun bu o'zgarishga quyidagicha yoziladi.

1. Sirka kislotasi dissotsilanish



2. Sirka kislotasi

Elektrrolitlar dissotsilanish darajasi bilan xarakterlanadi. Elektrolitning dissotsilangan molekularlar sonining umumiy erigan molekularlar soniga nisbati dissotsilanish darajasi deyil. Dissotsilanish darajasi 1 asr sonlari bilan yoki protsent xisobida ifodalanganadi. kuchli elektrolitlarga esa dissotsilanish darajasi 0,3 yoki 30% dan yuqori, kuchsiz elektrolitlarga esa dissotsilanish darajasi 0,3 yoki 30% dan past bo'lgan moddalar kiradi. Dissotsilanish darajasi konsentratsiyaga bog'lik bo'lib eritma suyultirilgan sari ortadi. Chunki eritmaning kichik konsentratsiyasida ionlarning to'qnashish ehtimolligi kamayadi. Buni sirka kislotasi misolida quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Konsentratsiya, Cnorm.	1,0	0,1	0,01	0,001
Dissotsilanish darajasi, 18°C	0,004	0,014	0,042	0,124

Dissotsilanish darajasi temperaturaga bog'lik bo'lib, u ko'tarilishi bilan ortadi, chunki bu xolatda molekularlardagi bog'lanishlar kuchsizlanadi.

Kuyidagi jadvalda ba'zi elektrolitlarning 0,1 n eritmalarini uchun 18°C dagi dissotsilanish darajasi keltirilgan.

Elektrolitlar	%	Elektrolitlar	%
HCl	92	HCN	0,001
HBr	92	NaOH	91
HI	92	KOH	91
HNO ₃	92	Ba(OH) ₂	77
H ₂ SO ₄	58	NH ₄ OH	1,34
H ₂ SO ₃	34	NaCl	84
H ₃ PO ₄	27	KCl	86
H ₂ CO ₃	0,17	NH ₄ Cl	85
H ₂ S	0,07	AgNO ₃	81
KNO ₃	83	MgCl ₂	76,5
K ₂ SO ₄	71	CuSO ₄	40

Jadvaldan ko'rinib turibdiki kuchli elektrolitlar kuchli asoslar, kuchli kislotalar va to'liq dissotsiyanlangan elektrolitga ega bo'lgan kislota, kuchsiz asoslar va barcha organik kislotalar misol bo'lib xizmat qiladi.

Ko'pchilik elektrolitlar suvda eriganda ionlarga ajraladi. Moddalarning suvdagi ajralish darjasi – dissotsiyanlash deyiladi.

Uning qiymati dissotsiyanlangan molekularlar soni, n umumiy molekularlar soniga nisbati orqali topiladi.

$$\alpha = \frac{\text{Dissotsiyanlangan molekularlar}(n, C_M, m, W, N)}{\text{Umumiy molekularlar}(n, C_M, m, W, N)}$$

$$\text{Umumiy tarzda } \alpha = \frac{n}{N}$$

n – dissotsiyanlangan molekularlar soni,

N – umumiy molekularlar soni.

α – dissotsiyanlash darajasi (%)

Masalalar:

1. Eritilgan 120 ta molekulalardan 50 tasi ionlarga ajralgan bo'lsa, dissotsiyanlashini aniqlang?

Berilgan:

$N=120$ ta

$n=50$ ta

$\alpha=?$

Yechish: Fo'rmuladan foydalanamiz.

$$\alpha = \frac{n}{N} = \frac{50\text{ta}}{120\text{ta}} = 0.4167 \text{ yoki } 41.67\%$$

2. $\alpha=70\%$ bo'lganda eritilgan 500 ta molekuladan nechitasi ionlarga ajralgan?

Berilgan:

$\alpha=70\%$

$N=500$ ta

$n=?$

Yechish:

$$\alpha = \frac{n}{N} \text{ dan } n \text{ ni aniqlaymiz.}$$

$$n = \alpha \cdot N = 0.7 \cdot 500\text{ta} = 350\text{ta} \text{ molekula}$$

dissotsiyanlangan.

3. Sulfat kislota eritmasida 130 g molekulalar dissotsiylangan bo'lsa, uning anionlari sonini aniqlang. ($\alpha = 80\%$)

Berilgan:

130 g

$\alpha = 80\%$

$N = ?$

Yechish:

$\alpha = \frac{n}{N}$ dan n ni aniqlaymiz.

$$N = \frac{n}{\alpha} = \frac{130}{0.8} = 162.5 \text{ molekula bo'lgan.}$$

4. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ning 3 M li eritmasida $\alpha = 70\%$ bo'lsa, kation va anionlarning konsentratsiyasini aniqlang?

Berilgan:

$C_M = 3 \text{ M}$

$\alpha = 70\%$

$n = ?$


Yechish:

$\alpha = \frac{n}{N}$ dan n ni aniqlaymiz.

$$n = \alpha \cdot N = 0.7 \cdot 3 = 2.1 \text{ M}$$

molekulalar dissotsiylangan.

Tuzning dissotsiylanishini yozamiz va bundagi hosil bo'lgan kation va anionlarning molyar konsentratsiyasini aniqlaymiz.



1	$\times$	2	3
2.1		$x_1 = ?$	$x_2 = ?$
$x_1 = 4.2$		$[\text{Al}^{+3}]$	
$x_2 = 6.3$		$[\text{SO}_4^{-2}]$	

5. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ning 5 M li eritmasida NO_3^- ioning konsentratsiyasi 7 M ekanligi ma'lum bo'lsa, dissotsiylanish darajasini aniqlang?


Berilgan:

$C_M = 5 \text{ M}$

$[\text{NO}_3^-] = 7 \text{ M}$

$\alpha = ?$

Yechish: Tuz dissotsiylanganda NO_3^- berilgan bo'lsa, shuncha ion hosil bo'lishi uchun qancha tuz dissotsiylanishi kerakligini aniqlaymiz.



1	$\times$	2
$x = ?$		7

$$x = \frac{1.7}{2} = 3.5 M \text{ dissotsiylangan tuzning molarligi.}$$

Ummumiy m. ... konsentratsiyasi 5 ... α ni aniqlaymiz.

$$\alpha = \frac{3.5 M}{5 M} = 0.7 \text{ yoki } 70 \%$$

Nazorat savollari

1. Eritilgan 250 ta molekuladan 75 tasi dissotsiylangan bo'lsa, α ni aniqlang?
2. H_2SO_4 ning 300 g 9 % li eritmasida dissotsiylanish darajasi 12 % gat eng bo'lsa, dissotsiylangan molekular sonini aniqlang.
3. HNO_3 eritmasida $\alpha = 7 \%$ va unda 6 mol kislota molekulari bo'lsa, H^+ larining miqdorini aniqlang?

Elektrolitlarning α elektrolit tabiatiga, erituvchi tabiatiga, konsentratsiya, haroratga bog'liq. Ko'pchilik holatlarda α o'rnida dissotsiylanish konstantasi K qo'llaniladi.

Kuchli elektrolitlar: eritmalarida deyarli to'la ionlarga ajraladigan moddalar kuchli elektrolitlar deyiladi.

1. H_2O da eriydigan deyarli barcha tuzlar kuchli elektrolitlardir: Na_2SO_4 , KCl , $AgNO_3$.
2. H_2O da eriydigan asoslar (ishqorlar) I, II- A-gruppach (Be , Mg dan tashqari) metallarining gidroksidlari kiradi.
3. Kislotalar: HCl , $HClO_4$, HBr , $HMnO_4$, HNO_3 , H_2SO_4 , $HClO_3$, $H_2Cr_2O_7$, H_2CrO_4 , HCl va boshqalar.

7.6. Kuchsiz elektrolitlar

Eritmada qisman ionlarga ajraladigan moddalar – **kuchsiz elektrolitlar** deyiladi.

1. Suvda oz eriydigan asoslar ya'ni I va II – A guruhchasining metall gidroksidlaridan tashqari barcha metallarning gidroksidlari kiradi. $Be(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $Cu(OH)_2$, NH_4OH .
2. Kuchsiz kislotalar – HCN , H_2SiO_3 , H_2CO_3 , HF , H_2S , HNO_2 , $HClO$, CH_3COOH va boshqalar. O'rtacha kuchli H_2SO_3 , H_3PO_4 , $HCOOH$ kislotalar.

Elektrolitlarning $\alpha > 30\%$ bo'lganda kuchli, $3\% < \alpha < 30\%$ bo'lganda o'rtacha kuchli, $\alpha < 3\%$ bo'lganda kuchsiz elektrolitlar hisoblanadi.

Kuchsiz elektrolitlar uchun α va K o'rtasida quyidagi bog'lanish mavjud.

$$K = \alpha^2 \cdot C_M$$

α – dissotsiylanish darajasi.

K – dissotsiylanish konstantasi.

C_M – molyar konsentratsiya.

Masalalar:

1. HClO ning 0.1 M li eritmasida dissotsiylanish konstantasi $2 \cdot 10^{-5}$ bo'lsa, H^+ larining konsentratsiyasini aniqlang.

Berilgan:

$$C_M = 0.1 \text{ M}$$

$$K = 2 \cdot 10^{-5}$$

$$[H^+] = ?$$

Yechish:

a. $K = \alpha^2 C_M$ formuladan foydalangan holda α ni topamiz va dissotsiylangan molekulalar sonini aniqlaymiz.

$$\alpha \sqrt{\frac{K}{C_M}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-5}}{0.1 \text{ M}}} = \sqrt{20 \cdot 10^{-5}} = \sqrt{0.002} = 0.014$$

b. $\alpha = \frac{n}{N}$ dan n ni aniqlaymiz.

$$n = \alpha \cdot N = 0.014 \cdot 0.1 = 0.0014 = 1.4 \cdot 10^{-3} \text{ molekula dissotsiylangan.}$$

c. Gipoxlorid kislota bir bosqichda dissotsiylanadi.



$$1.4 \cdot 10^{-3} \quad \times \quad \frac{1}{x} = ?$$

$$x = \frac{1.4 \cdot 10^{-3}}{1} = 1.4 \cdot 10^{-3} \text{ shuncha } H^+ \text{ mavjud ekan.}$$

2. 1 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ eritmada 0.4 mol SO_4^{2-} bo'lsa, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ning dissotsiylanish konstantasini aniqlang.

Berilgan:


$$C_M = 1 \text{ M}$$

$$V = 3 \text{ l}$$

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = 0.4 \text{ mol}$$

$$K = ?$$

Yechish:



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & 3 \text{ mol} \\ x = ? & \times & 4 \text{ mol} \end{array}$$

$$x = \frac{4 \text{ mol} \cdot 1 \text{ mol}}{3 \text{ mol}} = 1.33 \text{ mol} \quad \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ dissotsiylangan.}$$

b. Umumiy molekular sonini aniqlaymiz.

$$n = C_M \cdot V = 1 \text{ M} \cdot 3 \text{ l} = 3 \text{ mol} \quad \text{jami } \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ bo'lgan.}$$

c. Dissotsiylanish darajasini aniqlaymiz.

$$\alpha = \frac{n}{N} = \frac{1.3 \text{ mol}}{3 \text{ mol}} = 0.4444 \text{ yoki } 44.44\%$$

d. Dissotsiylanish konstantasini aniqlaymiz.

$$K = \alpha^2 \cdot C_M = 0.4444^2 \cdot 1 \text{ M} = 0.1975 \text{ ga teng.}$$

3. MgCl_2 va AlCl_3 larning eritmaları aralashmasida Cl^- lari konsentratsiyasi 7 M bo'lib, Mg^{2+} niki 1.5 M bo'lsa, Al^{3+} ionining konsentratsiyasini aniqlang.

Berilgan:

$$[\text{Cl}^-] = 7 \text{ M}$$

$$[\text{Mg}^{2+}] = 1.5 \text{ M}$$

$$[\text{Al}^{3+}] = ?$$

Yechish:

a. Berilgan Al^{3+} konsentratsiyasidan shu Al^{3+} dissotsiylanganda qancha Cl^- aniqlaymiz.



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & 1 \text{ mol} & 2 \text{ mol} \\ & 1.5 \text{ mol} & x=? \end{array}$$

$$x = \frac{1.5 M \cdot 2 M}{1 M} = 3 M \text{ } Cl^- \text{ lari bor.}$$

b. Jami Cl^- ionlaridan $MgCl_2$ dissotsiylanganda ajralgan Cl^- ionlarini ayiramiz.

$7 M - 3 M = 4 M$ li Cl^- ionlari $AlCl_3$ dissotsiylanganda ajralib chiqqan.
 $AlCl_3 = Al^{3+} + 3Cl^-$

$$\begin{array}{ccc} 1 M & 3 M \\ x=? & 4 M \end{array} \quad x = \frac{4 M \cdot 1 M}{3 M} = 1.3 M \text{ } Al^{3+}$$

4. Hajmlari bir hil bo'lgan $1 M$ dan olingan K_2SO_4 , K_3PO_4 , KCl eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmadagi K^+ lirining konsentratsiyasini aniqlang? Tuzlarning dissotsiylanish darajasi tegishli ravishda $80, 85, 90\%$ dan bo'lganda.

Berilgan:

$K=?$

Yechish:

a. barcha tuzlarning dissotsiylangan molekullari konsentratsiyasini aniqlaymiz.

$$n(K_2SO_4) = C_M \cdot \alpha = 1 M \cdot 0.8 = 0.8 M$$

$$n(K_3PO_4) = C_M \cdot \alpha = 1 M \cdot 0.85 = 0.85 M$$

$$n(KCl) = C_M \cdot \alpha = 1 M \cdot 0.9 = 0.9 M$$

Ionlar tarkibidagi zarrachalar sonini aniqlash:

1. NH_4^+ , H_2CO_3 , CuOH^+ , HSO_4^- ionlar tarkibidagi p, n, e lar sonini aniqlang?

Yechish:

Atom tarkibidagi p, e lar soni shu elementning tartib raqamiga teng edi. n – neytron bu atom massadan p – protonlar sonini ayirish orqali topar edik. Shundan foydalangan holda ionlarning tarkibidagi zarrachalarni hisoblashda p va n lar soni atom tarkibida qancha bo'lsa, shuncha deb qaraladi. e – elektrolar soni esa o'zgaradi, chunki bu ion u e yo'qotgan yoki qabul qilgan bo'ladi.

Agar, ion (+) holatda bo'lsa, u e yo'qotgan, ion (–) holatda e biriktirib olgan bo'ladi.

NH_4^+ tarkibida N – uning tartib raqami 7, atom massasi 14. Uning tarkibida 7 ta e, 7 ta p.

$n = A - p = 14 - 7 = 7$ ta neytroni bor. H – tartib raqami 1, atom massasi

1. Tarkibida 1 ta e, 1 ta p, neytroni yo'q. Demak

NH_4^+ tarkibida

$$p = 7 + 1 \cdot 4 = 11 \text{ ta}$$

$$n = 7 + 0 = 7 \text{ ta}$$

$$e = 7 + 1 \cdot 4 - 1 = 10 \text{ ta} \text{ Chunki, (+1) zaryadlangan ion e ber-}$$

gan, shuning uchun undan 1 ta ayiramiz.

HSO_4^- tarkibida

$$p = 1 + 16 + 8 \cdot 4 = 49 \text{ ta}$$

$$n = 0 + 16 + 8 \cdot 4 = 48 \text{ ta}$$

$$e = 1 + 16 + 8 \cdot 4 + 1 = 50 \text{ ta chunki (-1) zaryadlangan ion e}$$

qabul qilgan bo'ladi. shuning uchun 1 ta qo'shiladi.

Qolganlarining tarkibini aniqlang?

7.6.1. Ionlarning suvda eriganda issiqlik chiqishi yoki yutilishiga sababchi bo'lgan omillar

Qattiq moddalar suvda eritilganda:

– Kristall panjaraning buzilishi yuz berib, unda panjarani buzish uchun energiya sarflanadi. Bu energiyani E_f deb belgilask.


– Kristall panjara buzilib hosil bo'lgan ionlar suv bilan bog'lanib gidratlanadi. Bunda esa energiya chiqadi. Bu energiya E_1 bilan bog'lanadi. E_1 bilan E_2 orasidagi farq bog'lanish vujudga keladi.

Agar suvda eriganda $E_1 > E_2$ dan bo'lsa, ya'ni suvning kristall panjarasini buzish uchun ketga energiya miqdori qancha energiya chiqadigan energiya miqdori yuqori bo'lsa, bunda eritma sovib ketadi. Bu moddaning erishi endotermik jarayon bo'ladi.

Agar $E_1 < E_2$ dan bo'lsa, issiqlik chiqadi. Bunda eritma qiziydi. Masalan: H_2O , NaOH va boshqalarning erishidan issiqlik chiqadi.



H_2SO_4 yoki uning konsentrlangan eritmasini suyultirishda suvga kislota solinadi. Bunda gidratlanish eritmaning butun hajmi bo'yicha sodir bo'lib issiqlik bir tekis taqsimlanadi.








Kislotaga suv solish mumkin emas. Chunki, kislotaga nisbatan suvning zichligi kichik, bunda gidratlanish faqat yuzada sodir bo'ladi. Ajralgan issiqlik shu joyni qaynatib suyuqlikning sachrab ketishiga sabab bo'ladi.



Demak, moddalarning suvda erishi fizik- kimyoviy jarayondir.

Ionlarning xossalari: elektrolitlarning xossalari ularning eritmalarida mavjud bo'ladigan ionlarning xossalari. Osh tuzi alangani sariq rangga bo'yashi undagi Na^+ borligini, AgNO_3 eritmasiga qo'shilganda oq cho'kma hosil bo'ladi. Bu Cl^- ionlariga bog'liq.







7.7. Ion almashinish reaksiyalari

Moddalar kislota, asos, oksidlovchi, qaytaruvchi xususiyatiga ko'ra reaksiyaga kirishadi. Bundan tashqari elektrolit eritmaları cho'kma, gaz, kuchsiz elektrolit kompleks birikma qilgani tufayli ham ion almashinish reaksiyasiga kirishishi mumkin.

• Ionlar orasida boradigan reaksiyalar – ion almashinish reaksiyalari deyiladi. Ion almashinish reaksiyalarining malekulyar, to'la ionli va qisqa ionli ko'rinishda yoziladi.




Masala:

1. Na_2CO_3 eritmasiga ekvivalent miqdorda HCl qo'shilsa, eritmada qanday ionlar qoladi va to'la ionli tenglamada nechta ion qatnashadi?

Yechish:

a. Na_2CO_3 bilan HCl ning reaksiya tenglamasini tozimiz va qaysi ionlar reaksiyada ishtirok etayotganini ko'rib chiqamiz.



Bu reaksiyadan ko'rinib turibdiki, to'la ionli tenglamasida 11 ta ion qatnashadi. Eritmada Na^+ va Cl^- ionlari qoladi.

Tuzlarning suvda eruvchanligi ularning elektrolitligi bilan bog'liq:

CO_3^{2-} , S^{2-} , PO_4^{3-} , SiO_3^{2-} ning K^+ , Na^+ tuzlari suvda eriydi, NH_4^+ ning tuzlari ham suvda eriydi va parchalanadi.

Cl^- - Ag^+ , Hg^+ , Pb^{2+} , Cu^+ tuzlar suvda erimaydi.


SO_4^{2-} - Ba^{2+} , Se^{2+} , Ca^{2+} , Ag^+ erimaydi.

K^+ , Na^+ , NH_4^+ , NO_3^- , CH_3COO^- - hammasi eriydi.

Ayrim tuzlarning eritmaları aralashtirilganda ular reaksiyaga kirishmaydi lekin, ularning eritmalarining aralashmalari bug'latilganda har hil tuz eritmaları hosil bo'ladi. Masalan: $NaCl$ va K_2SO_4 tuzlarining eritmaları aralashtirilib u bug'latilsa, 4 ta tuz aralashmalari hosil bo'ladi. Ya'ni $NaCl$, Na_2SO_4 , KCl , K_2SO_4 tuzlarining aralashmalari hosil bo'ladi. Bu tuzlarning hosil bo'lishiga sabab ionlar birikayotganda ular bir-biri bilan hohlaganiga birikadi. Shuning uchun 4 ta tuz hosil bo'ladi.

Laboratorda bajariladigan ishlar.

1-Tajriba. Eritmalarining elektr o'tkazuvchanligini o'lchash.



7.1.rasm. Elektr o'tkazuvchanlikni o'lchovchi asbob.

Tajriba 7.1- rasmda tasvirlangan asbobda bajariladi. Asbob stakandan (1), ketma-ket ulangan elektrodlardan (3) , elektrodga ulangan izolyatsiyalangan simdan (4), elektr lampochkadan (5), ebonit qopqoqdan (2) va stakan xamda lampa o'rnatilgan dastgoxdan (6) iborat.

a) Stakanga 40-50 ml distillangan suv quyib, asbobni tok manbai bilan vilka (7) orqali ulang. Lampochka yonadimi? Endi suvga ozgina shakar soling va aralashtirib, lampochka yonishini kuzating. Keyin suvga ozgina osh tuzi kristallidan soling va lampochka yonganini kuzating. Bu xolda eritma elektr tokini o'tkazadimi? Sababini tushuntiring. Tajribadan so'ng asbobni tok manбайдan uzib, elektrodلarni distillangan suv chayqab qo'ying.

b) Bu tajribada ko'rsatilgan asbobga 40-50 ml konsentrlangan sirka kislota(CH_3COOH) eritmasidan quying va unga elektrodلarni tushuring. Asbobni tok manbaiga ulang. Lampochka yonadimi? Sirka kislotaga asta sekin distillangan suv qo'shib, uni suyultira boshlang. Nima kuzatiladi? Nima uchun sirka kislotaning elektr o'tkazuvchanligi suyultirish bilan o'zgaradi?

2-Tajriba. Kuchsiz elektrolitlar dissotsiatsiyalanishida ionlar muvozanatining siljishi a) Probirkaga 2-3 ml 0,1 n CH_3COOH eritmasidan quying v unga 1-2 tomchi metiloranj eritmasidan tomizing. Kislotali muhitda metiloranj qanday rang xosil qiladi?

Ushbu eritma taqriban 1 g CH_3COONa kristallidan soling va yaxshi aralashtiring. Nima tuzilgan? Eritma rangi o'zgaradi? Kuchli qotishmalar eritmasi ustiga qotishgan bo'lgan elektrolit qo'shilgan eritma muvozanatining o'zgarish sababini tushuntiring.

b) Probirkaga 0,1 n LiNH_4OH eritmasidan 5-6 ml quyung va unga 2-3 tomchi 0,5 n HCl eritmasidan qo'shing. Eritmani ikkita probirkaga soling. Probirkalardagi eritmalardan biriga taxminan 0,5 g NH_4Cl kristallidan solib aralashtiring va eritma rangining o'zgarish sababini tushuntiring.

3-Tajriba. Elektrolitlarni kimyoviy aktivligini solishtirish.

a) Ikkita probirkaga bir xil kattalikdagi marmar bo'lakchasini soling. birinchi probirkaga 1-2 ml 2 n sirka kislotasining erumasini va ikkinchi probirkaga xuddi shu xajmda 2 n xlorid kislotasidan quyung. /aysi probirkada gaz shiddatliroq ajralib chiqadi. Reaksiyaning molekulyar va ionli tenglamasini, reaksiyalarni tezligining matematik tenglasini yozing. SHu reaksiya tezligi kaysi ionlarning konsentratsiyasiga bog'liq?

v) Probirkaga 5 ml 1 n HCl eritmasidan quyung va ustiga bir bo'lak rux soling. Vodorodning bir tekis ajralishini kuzating. Probirkaga 0,5 g CH_3COONa kristallidan solib aralashtiring. Ruxning erish tezligi o'zgaradimi? YAngi xid paydo bo'lganini ko'ring va reaksiya tenglamalarini yozing.

4-Tajriba. Ion almashinish reaksiyalarning yo'nalishi.a) Uchta probirka olib birinchisiga 1 ml 0,5 n FeCl_3 , ikkinchisiga 1 ml 0,5 n Na_2SiO_3 , uchinchisiga 1 ml 0,5 n H_2SO_4 eritmasidan qo'ying. Birinchi probirkaga 2 n NaOH , ikkinchisiga- 2 n HCl , uchinchisiga- BaCl_2 eritmasidan quyung. Nima kuzatiladi, cho'kunaga qanday moddalar tushadi? Molekulyar va ionli tenglamalarini yozing.

b) Probirkaga 1-2 ml 0,5 n Na_2CO_3 eritmasidan va bir necha tomchi 0,5 n H_2SO_4 eritmasidan quyung. Nima kuzatiladi? Molekulyar va ion tenglamalarini yozing.

v) Probirkaga 1-2 ml 0,5 n NH_4Cl eritmasidan quyib 1-2 ml 2 n NaOH eritmasidan qo'shing va uni alangada qaynaguncha qizdiring. So'ng ehtiyotlik bilan ajralib chiqayotgan gazni xidlab qo'ring va xaqiqatdan NH_3 gazi ekanligini aniqlang. Molekulyar va ion tenglamalarini yozing.

5-Tajriba. Cho'kma xosil bo'lishining eruvchanlik ko'paytmasining ta'siri. Kichik stakanga 10 ml dan 1 n $Pb(NO_3)_2$ va NaCl eritmasini quyib aralashtiring. Oq cho'kma xosil bo'lgan che'l mani avval 1-2 ml suv qo'shing, so'ngra uni filtrla 2 qismga bo'ling. 1 qismni 0,1 n NaCl eritmasidan qo'shing va filtrlatib oling. 2 qismga esa 1-2 ml 1 n NaCl eritmasidan qo'shing va filtrlatib oling. Oq cho'kma xosil bo'lishini kuzating. Reaksiyalarning molekulyar va ion tenglamalarini yozing. Filtratlar oq cho'kma xosil bo'lish va eruvchanlik sababini tuzlarning eruvchanlik ko'paytmasi qiymatlaridan foydalanib izoxlang.

7.8.TUZLAR GIDROLIZI

Tuzlarning suv bilan ta'sirlashib kuchsiz elektrolit hosil qilishiga – tuzlar gidrolizi deyiladi. Hidro – suv, lizis – parchalanish. Bu moddaning suv ta'sirida bir necha moddalarga parchalanishi deganidir. Anorganik moddlarning asosiy sinflaridan oksidlar, asoslar va kislotalar gidrolizlanmaydi. Ular suvda eriganda gidratlanadi. Oksidlar gidratlanganda suv bilan reaksiyaga kirishib tegishli oksidning gidratini hosil qiladi. Asoslar va kislotalar suvda eriganda ya'ni gidratlanganda faqat ularning eritmalari hosil bo'ladi. Tuzlarni hosil bo'lishiga ko'ra 4 guruhga ajratishimiz mumkin shuning uchun ularning qaysilari gidrolizga uchraydi shuni bilishimiz kerak. Undan avval qaysi kislota kuchli qaysi kislota kuchsiz ekanligini aniqlashimiz kerak. Kislorodli kislotalarning kuchini kislota tarkibidagi kislorod atomlari sonidan vodorod atomlari sonini ayirganimizda 2 va undan katta son chiqsa, bu kislota kuchli kislota hisoblanadi. Agarda, 2 dan kichik son chiqsa, demak u kuchsiz kislota hisoblanadi. Masalan: H_2SO_4 bu kislotalada 4 ta kislorod va 2 ta vodorod atomlari bor. Ayirmasi $4-2=2$ chiqadi, demak bu kislota kuchli kislota ekan. H_2CO_3 karbanat kislotalada $3-2=1$ 2 dan kichik son chiqadi. Karbanat kislota kuchsiz kislota hisoblanadi. Organi karbon kislotalarning hammasi kuchsiz kislotalardir. Kislorodsiz kislotalarning kuchini aniqlash uchun davriy sistemadagi joylashishiga qaraladi. Davriy sistemada guruhlarda joylashgan kislotalar gruppasi no'meri oshgan sari kislotalik ham irtib boradi.

Moddalar: HF, HCl, H₂SO₄, HNO₃ da tartibda kislotalik kuchini o'rtib
 bulardan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizini kuzatib olishimiz.
 Kuchli kislota va kuchli asosdan hosil bo'lgan tuzlar: NaCl, KCl,
 Ba(NO₃)₂, LiCl va boshqa tuzlarni keltirishimiz mumkin.


Tilim indikatorlar

1. *Indikator reaksiyalar muhiti* H⁺ va OH⁻ ionlarning konsentratsiyasiga qarab rangini o'zgartiradigan moddalar yordamida aniqlash mumkin. Bunday moddalar indikatorlar deyiladi

Reaksiyaning muxitiga qarab (kislotali, ishqoriy) ikki xil rangga ega bo'ladigan indikatorlarga ikki rangli indikatorlar deyiladi. Bitta muxitda uziga xos rangga ega bo'lib, boshqa muxitda rangsiz qoladigan indikatorlarni bir rangli indikatorlar deyiladi.

Indikatorlar asosan murakkab organik birikmalar bo'lib kuchsiz asos va kuchsiz kislotalar jumlasiga kiradi. Indikatorlarni HInd yoki IndOH kabi fo'rmla orqali ifodalash mumkin (formuladagi Ind- indikatorning murakkab anioni va kationidir).

Indikatorlarni prinsipi dissosilanmagan indi-qator molekulari va uning Ind ionlarini eritmada xar xil rangli bo'lishidir. Masalan, fenolftalein molekulari rangsiz, uning ionlari Ind esa to'q qizil rangli bo'ladi, metiloranj molekulari sariq, ionlari esa qizil rangli bo'ladi. Ular eritmada quyidagicha dissosilanadi:



Indikator	Tabiati	O'zgarish soxasi	Kislotali muxitdagi rangi	Ishqoriy muxitdagi rangi
Metilrot	Asos	4,2-6,3	Qizil	Sariq
Metiloranj	Asos	2,9-4,7	Qizil	Sariq
Fenolftalein	Kislota	8,2-10,5	Rangsiz	Qizg'ish birafsha
Lakmus	Kislota	5-8,0	Qizil	Ko'k
Fenoltrot	Kislota	6,4-8,0	Sariq	Qizil

Laboratoriyada bajariladigan ishlar Kationlararo, anionlararo, kation-anion va birgalikdagi gidrolizlanishlaridagi va eritmalarning muxit (pH) ni aniqlash.

1-Tajriba. O'ralay jaraenida muxit pH ni o'zgarishi. To'rtta probirka olib, ulardan biriga 2-3 ml 0,5 n NaCl , ikkinchisiga 2-3 ml 0,5 n Na_2CO_3 , uchinchisiga 2-3 ml 0,5 n $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ eki AlCl_3 eritmalaridan va to'rtinchisiga taqqoslash uchun 2-3 ml distillangan suv quyding. Probirkalarning xar qaysiga 1 ml lakmusning neytral eritmasidan qo'shib, yaxshilab chayqatib arashtiring. Suv solingan probirkadagi lakmus rangining o'zgarishiga qarab xar bir tuz eritmasining reaksiya muhitini aniqlang. Tekshirilgan tuzlarning qaysilari gidrolizlanadi? Gidrolizlanish reaksiyalarining molekulyar va ionli tenglamalarini yozing xamda qaysi tipdagi gidrolizlanishlar sodir bo'lishini ayting.

2-Tajriba. Ikki tuzning birgalikdagi gidrolizi (qaytmas gidroliz). Probirkaga 2-3 ml dan 0,5 n $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ eki AlCl_3 bilan Na_2CO_3 eritmalaridan quyding va unga 1-2 tomchi lakmus eritmasidan tomizing. Probirkani chayqatib aralashtiring. /anday gaz ajraladi va qanday moda cho'kmaga tushadi? Gidrolizlanish reaksiyasining molekulyar va ionli tenglamalarini ezing. Nima uchun alyuminiy karbonat xosil bo'lmaydi.

3-Tajriba. Gidrolizlanish darajasiga temperaturaning ta'siri a) probirkaga 2-3 ml 0,5 n natriy atsetat SN_3SOONa eritmasidan quyding, unga 1-2 tomchi fenolftolein eritmasidan tomizing. Proobirkani chayqatib aralashtiring va eritma rangiga e'tibor bering. Probirkani eritma qaynaguncha qizdiring va eritma rangining o'zgarishini kuzating.

Gidrolizlanish reaksiyasining molekulyar va ionli tenglamalarini yozing. Temperatura ta'sirida eritma rangini o'zgarish sababini tushuntiring.

b) probirkaga 2 ml 0,5 n FeCl_3 eritmasidan quyding va eritma qaynaguncha probirkani qizdiring. Nima kuzatiladi? Temir (III) – xlorid tuzi gidrolizining bosqichli tenglamalarini molekulyar va ionli ko'rinishlarida yozing. Temperatura oshganda gidrolizlanish muvozanati qaysi tomonga siljiydi.

v) probirkaga 1 ml 0,5 n ZnCl₂ eritmasi qo'yilgach va indikator yordamida eritmani titrlang. Eritmani titrlash ox bo'lakchasini solib, eritma qo'yilgan probirkani qizartirguch.

Qanday gaz chiqadi va nima uchun? Ishtirok etadigan reaksiya qanday rol o'ynaydi.

4. Tajriba. Gidrolizlanish darajasiga ko'ra reaksiya ta'siri.


a) probirkaga 2 ml 0,5 n vismut nitrat Bi(NO₃)₃ tuzi eritmasidan quyig va unga dissotsiatsiya suv qo'shib, eritmani titrlash ta'siriga ta'sir qiling. Cho'kmada Bi(OH)₃ qizil cho'kma hosil bo'lishini kuzatib, eritmani suyultirishning gidrolizlanishiga ta'sirini izoxlang. Gidrolizlanish reaksiyasining molekulyar va ionli tenglamalarini tuzing. b) probirkada xosil bo'lgan cho'kmaga 1 tomchi konts. nitrat kislota eritmasidan tomizing. Nima kuzatiladi?

Reaksiyaning molekulyar va ionli tenglamalarini yozing. Gidrolizlanishiga vodorod ionlari qanday ta'sir etadi?

8.0. OKSIDLANISH – QAYTARILISH REAKSIYALARI

Reaksiyaga kirishayotgan moddalarning oksidlanish darajasi o'zgarishi bo'yicha ham bo'linadi.

- Oksidlanish darajasi o'zgarmasdan boradigan reaksiyalar.
- Oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan boradigan yani oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.
- Oksidlanish darajasi o'zgarmasdan boradigan reaksiyalar- bularga alamashinish, ko'pchilik ajralish va parchalanish reaksiyalari kiradi.



- Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari- elementlarning oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan boradigan reaksiyalar kiradi.






Oksidlanish daraja-atomning elektron berishi yoki qabul qilishi asosida atomda hosil bo'lgan shartli zaryadga aynaladi.

Agar atomga $\bar{e}$ biriksa, atom (-) zaryad, atom $\bar{e}$ berib, musbat (+) zaryadga ega bo'ladi. Agar murakkab birikmalardagi elementning qaysi biri $\bar{e}$ berib musbat, $\bar{e}$ qabul qilib manfiy zaryadlanishini shu elementning nisbiy elektromanfiylik qiymatiga bog'liq. Qaysi elementning nisbiy elektromanfiyligi katta bo'lsa, shu element $\bar{e}$ qabul qilib manfiy zaryadlanadi. Nisbiy elektromanfiylik qiymati kichik bo'lgan element $\bar{e}$ larini berib musbat zaryadlanadi.


Oksidlanish darajasining son qiymati atom bergan yoki qabul qilgan elektronlar soni bilan ifodalanadi.

Oddiy moddalar har doim 0 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. M: N_2^0 , O_2^0 , P^0 , Si^0 , Fe^0 , Cu^0 va boshqalar.

Metallar o'z birikmalarida musbat oksidlanish darajasiga ega. Masalan:



Vodorod ko'pchilik birikmalarida +1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. $\overset{+1}{H}_2O$



Vodorod metall gidridlarida -1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Masalan: $\overset{+1}{Na}\overset{-1}{H}$, $\overset{+2}{Ba}\overset{-1}{H}_2$, $\overset{+1}{K}\overset{-1}{H}$ va bosh.

Kislorod o'zining aksariyat birikmalarida -2 oksidlanish darajasini hosil qiladi. $\overset{+1}{H}_2\overset{-2}{O}$, $\overset{+3}{Al}_2\overset{-2}{O}_3$, $\overset{+1}{Na}_2\overset{-2}{O}$ va bosh.

Kislorod florli birikmalarida +2 oksidlanish darajasini hosil qiladi. $\overset{-1}{F}_2\overset{+2}{O}$ ba'zan $\overset{-1}{F}_2\overset{+1}{O}_2$ bo'ladi.

Peroksidlarda esa, -1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. $\overset{+1}{H}_2\overset{-1}{O}_2$, $\overset{+2}{Ba}\overset{-1}{O}_2$, $\overset{+1}{Na}_2\overset{-1}{O}_2$ va boshqalar.



oksidlanish darajasini o'zgartirishning elektron berish-qabul qilishi bilan bog'liq bo'lgan shartli zaryalar bo'ladi.

Agar atomga elektron berish (-) zaryasi berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.


Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.


Agar atomga elektron berilgan bo'lsa, u musbat (+) zaryaga ega bo'ladi.

Agar atomga elektron olinib ketgan bo'lsa, u manfiy (-) zaryaga ega bo'ladi.

Quyidagi oksidlanish darajalar tarkibidagi elementlarning oksidlanish darajalarini quyidagi qoidalar yordamida aniqlaymiz. Oksidlanish darajasi o'zgarishsiz bo'lgan elementlar tarkibidagi oksidlanish darajalarini aniqlaymiz. Oksidlanish darajasi o'zgarishsiz bo'lgan elementlar tarkibidagi oksidlanish darajalarini aniqlaymiz. Oksidlanish darajasi o'zgarishsiz bo'lgan elementlar tarkibidagi oksidlanish darajalarini aniqlaymiz.



Quyidagi oksidlanish darajalarida:



Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalarida elektron oluvchi atom, molekula yoki ionlar oksidlovchi deyiladi va ular reaksiyadan keyin qaytariladi.


Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalarida elektron beruvchi atom, molekula yoki ionlar qaytaruvchi deyiladi va ular reaksiyadan keyin oksidlanadi.

Atom, molekula yoki ionlarning elektronlarini berish jarayoni oksidlanish jarayoni deyiladi va ularning oksidlanish darajalari ortadi:

$\text{H}_2 - 2e = 2\text{H}^+$ $\text{Fe}^{2+} - 1e = \text{Fe}^{3+}$
 Atomlar elektronlarnig elektron berib olish jarayoni
 qaytarilish deyiladi va ular qaytarilish darajalari
 kamayadi.
 $\text{S}^0 + 2e = \text{S}^{2-}$ $\text{Al}^{3+} + 3e = \text{Al}$

Reaksiya	Ta'rif	Nisbat
<i>Atimlararo oksidlovchi va qaytaruvchi turli moddalarda bo'lgan</i>		
<i>Ichki moddalarda</i>	Oksidlovchi va qaytaruvchi bir elementning o'zida bo'ladi.	
<i>Disproportsiyalanish</i>	Bir element atomining oksidlanish darajasi bir vaqtning o'zida ham ortadi va ham kamayadi.	
<i>Sinproportsiyalanish</i>	Ayni elementning turli oksidlanish darajasidagi atomlari bir hil oksidlanish darajasiga o'tishi.	

Oksidlanish-qaytarilish bir-biriga bog'liq jarayondir. Masalan



Bu reaksiyada magniy xlorga elektron berib qaytaruvchi, xlor bu elektronlarni qabul qilib oksidlovchi, ikkinchi reaksiyada esa vodorod qaytaruvchi, mis ioni oksidlovchidir.

Element atomi oksidlanganda uning oksidlanish darajasi ortadi, qaytarilganda esa oksidlanish darajasi pasayadi. Masalan:

$\text{Sn}^{2+} - 2e = \text{Sn}^{4+}$ bu jarayonda qalayning oksidlanish darajasi +2 dan +4 gacha ortdi.


Elektron-balans ushbu usulda oksidlovchi va qaytaruvchining o'zaro o'zaro oksidlovchi va qaytaruvchilarni aniqlash uchun elektronlarning qaytaruvchining umumiy qabul qilgan elektronlar soniga teng bo'lgan oksidlovchining kislorod qabul qilgan elektronlar soniga teng bo'lganidan iborat bo'ladi:



Elektronlar bilan taqqoslanish uchun oksidlovchi va qaytaruvchining elektronlar sonini aniqlash kerak. Oxidlovchi elektronlarning soni 2 ga teng bo'lganidan, qaytaruvchining elektronlar soni ham 2 ga teng bo'lgan bo'ladi:





Elektronlar bilan taqqoslanish uchun oksidlovchi va qaytaruvchining elektronlar sonini aniqlash kerak. Oxidlovchi elektronlarning soni 2 ga teng bo'lganidan, qaytaruvchining elektronlar soni ham 2 ga teng bo'lgan bo'ladi:




Ikkinchi misol fosforning nitrat kislota bilan oksidlanishi:




Ushbu reaksiya uchun elektron tenglama yozsak:



Reaksiyadagi oksidlovchi va qaytaruvchilar oldiga topilgan sonlarni yozamiz:



Reaksiyaning o'ng va chap tomonidagi atomlar sonini xisoblash tenglamaning chap tomonidan vodorod va kislorod atomlari o'zaro teng emasligini ko'rsatadi. Bu xolda tenglamaning chap tomoniga suv molekullari yoziladi va reaksiyaning tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:



Ba'zi bir xollarda metall oksidlanganda tuz xosil bo'ladi, bunday xolda reaksiyaga kislota molekulasidan ortiqcha miqdorda olinadi.


balans:



Elektron tenglamasi:



Yig'irya tenglama: $3\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu} + \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ sonlarni qo'yanmiz:



Reaksiyaning ung'liklarini tekshirib, reaksiya shartlarida 2 ta, ya'ni HNO_3 molekula

ishlatilishida ishlatilgan HNO_3 ning 6 ta azot atomi qatnashgan bo'lganligi aniqlandi.

Reaksiya shartlariga asoslanib, reaksiya yozish kerakligini aniqlash va reaksiya tenglamasini tuzishda foydalanish kerak bo'ladi.



Ion-elektron metodi yordamida boradigan oksidlanish-qaytarilish

reaktsiyalarining to'liq tenglamalarini tuzishda elektron-balans

metodidan foydalanish kerak. Oksidlanish darajasi va elektron-balansini

aniqlash o'zining fizik asosini yo'qotadi. Chunki elektron-balans

metodida ishlatiladigan HNO_3 , Mn^{2+} , N_2^0 va boshqa HNO_3 da eritmada

umuman bo'lmaydi. Ushbu suvli eritmada suvning kislorodi bilan birikib,

CrO_4^{2-} , MnO_4^- , NO_3^- ionlar hoida mavjud bo'ladi.

Bundan tashqari, elektron-balans metodi oksidlanish-qaytarilish

protssessida gidroksid va vodorod ionlari xamda suv molekularining

rolini ko'rsatmaydi.

Shuning uchun xam suvli eritmalarida boradigan oksidlanish-

qaytarilish reaksiyalarining tenglamalarini tuzishda ion-elektron

metodidan foydalanish maksadga muvofikdir.

Bu metodda koeffitsiyentlar ion-elektron tenglama yordamida

topiladi. Ion-elektron tenglamaning elektron-balans tenglamadan

farqi shuki, unda elektrolitik dissotsilanish nazariyasiga binoan suvli

eritmada xaqiqatdan mavjud bo'lgan ionlar yoziladi.

Ion-elektron metodi yordamida eritmalarida boradigan oksidlanish-

qaytarilish reaksiyalarining to'liq tenglamalarini tuzish uchun quyidagi

tartibga rioya qilish kerak.

1. Reaksiya uchun olingan va reaksiya natijasida xosil bo'ladigan

maxsulotlarning tarkibini bilish, ya'ni reaksiyaning molekulyar

tenglama yozish zarur.

4. Sulfit ionining elektrolitik dissotsilani shartlariga binoan reaksiya shartlarini tanlash kerak.

Reaksiyaning o'ng va chap tomonlarida oksidlanis va qaytarilish protsesslarini ion-elektron usulida yozishda quyidagilarni hisobga olinadi.

1. Reaksiyaning element atomlari soni tenglamaning o'ng va chap tomonlarida teng bo'lishi kerak (elektron balans).

2. Reaksiyaning o'ng tomonida qancha kislorod kam bo'lsa, shuncha ko'p vodorod ionlari qo'shiladi, agar reaksiya suyuq muhitda yuzalsin, vodorod ionlari o'rniga H⁺ qo'shiladi. Agar reaksiya suyuq muhitda yuzalsin, vodorod ionlari o'rniga H₂O qo'shiladi.

3. Reaksiyaning o'ng tomonida qancha elektron kam bo'lsa, shuncha ko'p elektronlar qo'shiladi. Agar reaksiya suyuq muhitda yuzalsin, elektronlar o'rniga OH⁻ qo'shiladi.

4. Reaksiyaning o'ng va chap tomonlarida elektron balansini tenglashtirish kerak (elektron balans).

5. Reaksiyaning o'ng va chap tomonlarida elektron balansini tenglashtirish va qaytarilish protsesslarini ion-elektron usulida yozilib, oksidlovchi va qaytaruvchi moddalarni aniqlash kerak. E'tiborsizliklar topiladi. Ular tuzilishda qaytaruvchi yo'qotgan elektronlar soni oksidlovchi qabul qilgan elektronlar soniga teng bo'lishi nazarda tutiladi.

5. Jarayonlarning o'ng va chap tomonlarini aniqlangan koeffitsiyentlarga ko'paytirib, ularni birgalikda yoziladi. Natijada qisqa ion tenglama xosil bo'ladi.

Reaksiyaning to'liq ion va molekulyar tenglamalari yoziladi.

1. Molekulyar tenglama to'g'ri yozilganligini xar qaysi element atomlari soni orqali tekshiriladi. Ko'pincha kislorod atomlari sonini xisoblash bilan chegaralanadi.


Ion-elektron metod bo'yicha sulfit ionining kaliy permanganat ta'sirida sulfat ioniga o'tishini uch muxit sharoitida ko'rib chiqaylik.

Kislotali muxitda. a) Reaksiyaning molekulyar tenglamasi:



b) Reaksiyaning ionli sxemasi: $\text{K}^+ + \text{MnO}_4^- + 2\text{Na}^+ + \text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{K}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

yoki qisqartirib berilgan shemasi



Demak, ki...da permanganat...igacha (eritma...
rangsizla...edi.


vi) oksidlanish reaksiyalaridan iborat bo'lgan oksidlanish protsessi, bu oksidlanish reaksiyalarida oksidlanish darajasi oshib, elektron ko'rinishida yozish uchun to'rtinchi darajada ko'rinib turadigan elektronlar sonida to'rtta elektron qo'shiladi. Bu oksidlanish reaksiyalarida oksidlanish darajasi oshib, elektron ko'rinishida yozish uchun to'rtinchi darajada ko'rinib turadigan elektronlar sonida to'rtta elektron qo'shiladi. Bu oksidlanish reaksiyalarida oksidlanish darajasi oshib, elektron ko'rinishida yozish uchun to'rtinchi darajada ko'rinib turadigan elektronlar sonida to'rtta elektron qo'shiladi.

[illegible]


SO_3^{2-} ning SO_4^{2-} ioniga oksidlanishi kislorod atomining soni ortishi bilan kuzatiladi.




Sxema (4) ning o'ng tomonidagi umumiy zaryad nolga, chap tomonidagisi esa -2 ga teng. Sxemaning o'ng va chap tomonida zaryadlar soni teng bo'lishi uchun sxemaning chap tomonidan elektronli olish kerak, u xolda oksidlanish protsessining ion-ektronli tenglamasi quyidagicha yoziladi:



g) Endi qaytarilish (3) va oksidlanish (5) protsesslari bir-birini ostiga yozilib, oksidlovchi va qaytaruvchi uchun koeffitsiyentlar aniqlanadi:




Oksidlovchi qabul qilgan elektronlar soni qaytaruvchi yuqotgan elektronlar soniga teng bo'lishi kerak. Buning uchun (3) tenglamani 2 ga va (5) tenglamani 5 ga ko'paytirib, reaksiyaning qisqa ionli tenglamasiga ega bo'lamiz.






a) Yuqoridagi reaksiya qaytarilish reaksiyasining ion-elektron tenglamasi quyidagicha yoziladi:



Ikkinchi reaksiya qaytarilish reaksiyasining ionli tenglamasiga ega bo'lgan qaytaruvchini 1 ga ko'paytirib, (15) va (16) tenglamalarini qo'shiyentlariga ko'paytirib, ularni qo'shsak reaksiyaning qisqacha ionli tenglamasiga ega bo'lamiz:



Yuqoridagi tenglamani qisqartirib, qisqacha ionli tenglamani yozib, to'liq ionli tenglamani yozamiz:



Yuqoridagi tenglamani yozamiz:




Endi reaksiyaning to'liq molekulyar tenglamasini yozamiz:



Ba'zi oksidlovchilar kation bo'lib, reaksiya natijasida murakkab anionlarga, ya'ni ba'zi oksidlovchilar murakkab anionlar bo'lib, reaksiya natijasida kationlarga aylanadi. Masalan, arsenit sulfidning suyultirilgan nitrat kislota bilan oksidlanishini ko'rib chiqaylik.

a) Reaksiyaning molekulyar tenglamasi :




6) ionli sxemasi




yoki



v) Oksidlanish va qaytarilish protsesslarining ion-elektron tenglamalari:



prossesi



g) Yuqoridagi tenglamalarni koeffitsiyentlariga ko'paytirib, birgalikda yozsak, reaksiyaning qisqacha ionli tenglamasiga ega bo'lamiz:



qisqartirib tenglamaga qaramlikni yozib, to'liq ionli tenglamani yozing:



Ushbu oksidlanish-qaytarilish reaksiyasining to'liq molar tenglamani yozing:

3. Laboratoriyada bajariladigan ishlar

Tajriba 2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ning o'z-o'zida oksidlanish qaytarilish reaksiyasini o'rganish.

1-1. Tajriba.

1. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ning o'z-o'zida oksidlanish qaytarilish reaksiyasini o'rganish.

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ning o'z-o'zida oksidlanish qaytarilish reaksiyasini o'rganish. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ni nechta donasini o'ling va spirt bilan yordamida kizdirib, o'z-o'zida oksidlanish qaytarilish reaksiyasini o'rganish. xususiyatlar bilan nazar solib, o'z-o'zida oksidlanish qaytarilish reaksiyasida xrom (III)-oksidlanish va suv buglari hosil bo'lishini nazarda tutib reaksiya tenglamasini yozing oksidlovchi bilan kaytaruvchilarni ko'rsatib.

2-1. Tajriba.

Disproportsiyalanish reaksiyasi. Vodorod peroksidini parchalash. Probirkaga 2-3 ml 3% li vodorod peroksid (H_2O_2) eritmasidan qo'ying va unga katalizator sifatida MnO_2 kristallaridan ozgina soling. Probirkaga tezlik bilan cho'g'langan cho'pni tushiring, nima kuzatiladi?

Vodorod peroksidning katalizator ishtirokida parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Nima uchun bu reaksiyani disproportsiyalanish turiga kiradi?



Tajriba 3. Vodorod peroksidning oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida ikki yoqlamalilik.

a) Probirkaga 2-3 ml KI eritmasidan quying va uning ustiga 1 ml H_2SO_4 bilan 1-2 ml H_2O_2 eritmalaridan qo'shing. Eritmani rangiga e'tibor qiling. Bu reaksiyada I, ajrishini e'tiborga olib oksidlanish-kaytarilish reaksiya tenglamasini yozing.

b) Probirkaga 2-3 ml KMnO_4 eritmasidan quying va uning ustiga 1ml suyultirilgan H_2SO_4 qo'shib ustiga rangsizlanguncha tomchilab

9.0.GALV. 106 ELEMENTLAR

O'z-o'zidan boradigan Cu^{2+} oksidlanish-qaytarish reaksiyasida ajralib chiqadigan energiya bilan elektr ishini bajarish uchun o'xnatilrsa bo'ladi. Bu galvanik elementlarda amalga oshiriladi. Elektronlangan o'xchisi reagentlar orasida bormay, tashqi zanjir orqali o'tuvchi moslama ana shunday element rolini bajara oladi. Agar rux plastinka olib, uni mis ioni (Cu^{2+}) bo'lgan eritmaga solinsa, yuqorida aytilgan o'z-o'zidan boruvchi reaksiyani kuzatish mumkin. Reaksiya so'ngida suvdagi Cu^{2+} ionlari uchun xos bo'lgan eritmaning zangori rangi yo'qoladi va rux metali yuzasida metall holdagi mis ajralib chiqib boshlaydi. Bir vaqtning o'zida rux eriy boshlaydi.



9.1-rasm. Galvanik element sxemasi

masda Zn bilan Cr^{3+} ionlari o'zaro iluvchi galvanik elementlarni masi

shamada mis za o' kelayotgan 1000 sobiga
adi,

[illegible]

Hislashgan metallar o'z tuzlari eritmasiga tushirilganda eritmaga ionlar ajralib chiqadi. Vodoroddan keyin joylashgan metallar o'z tuzlari eritmasida vodorodga nisbatan musbat zaryadga ega bo'ladi. Chunki metallar aktiv bo'lmaganligi sababli eritmaga elektron chiqara olmaydi. Ularning erkin elektronlarini eritmada bo'lgan metall ionlari qabul qilib neytrallanadi va metall yuzasiga to'planadi. Metall elektronlari soni o'zidagi musbat ionlar sonidan kamayib ketganligi sababli metall musbat zaryadlanadi, anionlar mo'ligi sababli eritma manfiy zaryadlanadi. Shu sababli bir qancha metallarning potentsiallari musbat qiymatga ega bo'ladi (yana ta'kidlaymiz: vodorod elektrodining potentsialiga nisbatan). Metall ioni konsentratsiyasi 1 n bo'lgan eritmaga rag-kur metall tushirilganda vujudga keladigan potentsial **normal elektrod potentsiali** (E°) deyiladi. Potentsiallarni o'lchashda birlik sifatida normal vodorod potentsiali, standart elektrod sifatida esa normal vodorod elektrod qabul qilingan. Metallarning normal potentsiallarini nazarda tutib, ular tartib bilan bir qatarga qo'yilsa, vodorodning bir

suyuqlarda bilan to'ldiriladi. Ular o'tkazadigan pl.inka (elektrolit) bo'ladi.

Elektrolitning suvlangan elektrolit deyiladi.

Elektrolitning suvlangan elektrolit deyiladi.

Elektrolitizyonga solingan elektrolit tartibsiz (hara) harakatlanadi. Elektrolit o'tkazadigan zarrachalarning harakati o'zaro iyonlar mavjud bo'lgan elektrod (katod) tomonidan iyonlar musbat zarrachalarga elektrod (anod) tomon harakatlanadi. Iyonlar musbat zarrachalarga qaratiladi.

— Anodda anionlar (A^{n-}) anod tomonidan iyon.

$A^{n-} \rightarrow A^n + n e^-$ (anod tomonidan iyon).

Anionlar anod tomonidan elektrolitdan beradi va neytral atomga yoki molekula bo'lgan aylanadi.

$A^{n-} + n e^- \rightarrow A^n$

Katodda kationlar elektrolitdan beradi, neytral atomga yoki molekula bo'lgan aylanadi.

$M^{n+} + n e^- \rightarrow M^0$

Elektrolitlarni berish — oksidlanish qabul qilish jarayoni qaytarilish deb ataladi. Shuning uchun eritmada yoki suyuqlanmada elektrolit to'ki o'tadi.

— anodda anionlarning (A^{n-} , OH^-) yoki suv molekulasining oksidlanish jarayoni boradi.

— Katodda kationlarning (Me^{n+} , H^+) yoki suv molekulasining qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi.

Elektrolitlarning suyuqlanmalarining elektrolizi.

Agar yuqori temperaturada moddani qizdirsak modda suyuqlanadi. Moddalar suyuqlanganda ham elektrolit to'kini o'tkazadi. Demak, suyuqlanmada ionlar mavjud shu ionlar to'kini o'tkazadi va suyuqlanmalarining elektrolizi sodir bo'ladi. suyuqlanmalarining elektrolizi oson sodir bo'ladi, lekin moddalarni suyuq holatga keltirish uchun katta miqdorda issiqlik kerak bo'ladi. suyuqlanmaning elektrolizi elektrod materiallariga va ionlarning tabiatiga bog'liq emas.

Agar suyuqlanmada xar hil elektrodlar ionlarning aralashmasi bo'lsa, u holda ularning elektrod potentsiallari (E) bilan anoiqlanadi.

birgalikda qayta eritiladi. Ishqoriy suv malekulalarida oksidlanadi (kislotali muhitda H^+).


Jarayonlari uchun jadval.

Aktiv metallarning kationlari.	Yarim aktiv metallarning kationlari.	Kuchli aktiv metallarning kationlari.	Moderat kationlari, H^+
$H^+, Cs^+, Rb^+, K^+, Na^+, Li^+, NH_4^+, Sr^{2+}, Ba^{2+}, Pb^{2+}, Bi^{3+}, Sb^{3+}, Sn^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Mn^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cr^{3+}, Be^{2+}, Cu^+, Ag^+, Hg^{2+}, Fe^{3+}, Pb^{2+}, Au^+, Pt^{2+}$ Bu kationlarning o'zining suv malekulalari qaytariladi. $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	$Ni^{2+}, Co^{2+}, Cr^{3+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Pb^{2+}, Bi^{3+}, Sb^{3+}, Sn^{2+}, Sn^{4+}, Cu^+, Ag^+, Hg^{2+}, Fe^{3+}, Pb^{2+}, Au^+, Pt^{2+}$ Bu kationlarda oksidlanish ham qaytariladi. $Me^{n+} + ne^- \rightarrow Me^0$	$Cu^{2+}, Hg^{2+}, Ag^+, Pb^{2+}, Au^+$ va boshqalarda faqat metall qaytariladi. $Me^{n+} + ne^- \rightarrow Me^0$	Faqat H^+ kationlarning qaytariladi. $2H^+ + e^- \rightarrow H^0$

Anoddagi jarayonlar.

Bu jarayonda anod materialiga va anod tabiatiga bog'liq. Anod ikki hil eriydiga va erimaydiga bo'ladi. Anod erimaydiga (inert) bo'lsa, ko'mir, grafit, platina yoki oltingugurtdan yasaladi. Bunda quyidagi jarayonlar sodir bo'ladi.

– Birinchi navbatda kislorodsiz kislota anioni oksidlanadi.



– Agar kislorosli kislotalarning anionlari (SO_4^{2-} , NO_3^- , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} ...) va F-suvli eritmalarining elektrolizida oksidlanmaydilar ularning o'rniga suv malekulalari oksidlanadi. $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 \uparrow + 4H^+$

– Ishqor eritmalarining elektrolizida anodda OH^- ionlari oksidlanadi.



– Agar eritmada har xil anionlar ishtirok etsa, ular E^0 ortib borishlari tartibida oksidlanadilar. Dastlab kislorodsiz kislotalarning anionlari oksidlanadilar J^- , Br^- , S^{2-} , Cl^- , (F dan tashqari). Keyin esa suv malekulalari oksidlanadilar (ishqoriy muhitda OH^- ionlari)

Faradey qonunlari

Faradeyning birinchi qonuni: Elektroliz jarayonida ajralib chiqadigan moddalarining massasi elektrolit eritmasidagi unglammasidagi elektr o'tkuchi to'g'ri proportsional bo'ladi: $m = KQ = KI \cdot t$ (1) formulada m – ajralib chiqqan moddaning massasi (g), K – Faradeyning elektrolitik konstantasi (g/A), I – vaqt (A), t – vaqt (s). K – moddaning elektrolitik ekvivalenti (g/K). Faradeyning ikkinchi qonuni: Elektroliz jarayonida ajralib chiqqan moddalarining massasi o'zaro proportsional bo'ladi: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{K_1}{K_2} = \frac{Ar_1}{Ar_2} \cdot \frac{z_2}{z_1}$ (2) formulada m_1, m_2 – ajralib chiqqan moddalarining massasi (g), Ar_1, Ar_2 – moddalarining nisbiy atom massasi, z_1, z_2 – moddalarining kimyoviy ekvivalentligiga proporsional bo'ladi.

Faradeyning ikkinchi qonunida E – moddaning kimyoviy ekvivalenti (g).

Faradeyning birinchi qonunini Faradeyning ikkinchi qonunlarini birlashtirib quyidagi formulaga ega bo'lamiz:

$$m = \frac{E \cdot I \cdot t}{F} = \frac{E \cdot Q}{F} \text{ yoki } m = \frac{Ar \cdot I \cdot t}{nF} = \frac{Ar \cdot Q}{nF}$$

Bu yerda F – Faradey doimiysi vaqt sekunda olinsa qiymati - 96500 K, vaqt soatda olinsa qiymati - 26.8 A·s, Ar – elektrodda ajralib chiqqan elementning nisbiy atom massasi, n – elektrodlardagi jarayonda ishtirok etgan elektronlar soni.

To'g'ri bo'yicha unum:

$$h = \frac{m_1 \cdot 96500}{E \cdot I \cdot t} \cdot 100\% \text{ bunda } m_1 \text{ - amalda ajralib chiqqan modda}$$

miqdori (g), m – nazariy miqdor.

Elektroliz mavzusiga doir masalalarini yechish usullari.

To'g'ri kuchini aniqlash

1. Mis (II) sulfat eritmasining elektroliz qilinganda 30 daqiqa davomida 6.4 g mis ajralib chiqdi. Bunda qancha to'g'ri kuchi bilan amalgam oshirilganini aniqlang?


Yechish: Faradey qonuning to'g'ri formulasidan foydalangan holda to'g'ri kuchini aniqlaymiz.

$$I = \frac{F \cdot t}{E} \text{ dan } t = \frac{m \cdot F}{E \cdot I} = \frac{10 \cdot 96500}{10 \cdot 34} = 283.5 \text{ s} = 4 \text{ min } 43.5 \text{ s} \approx 10.72 \text{ A}$$

Elektrolizga qat'iyatlash

2. Kaliy xloridning 10 A toki bilan elektroliz qilinishida 4 g xlorid chiqish uchun qancha vaqt kerak?

Yechish: KCl elektrolizi quyida bo'ladi:



Shuning uchun 10 g xlorid uchun 10 g xlorid.


$$I = \frac{F \cdot t}{E} \text{ dan } t = \frac{m \cdot F}{E \cdot I} = \frac{10 \cdot 96500}{10 \cdot 34} = 283.5 \text{ s} = 4 \text{ min } 43.5 \text{ s} \approx 10.72 \text{ A}$$

15% li HCl suyuqligining 100 g (ziqligi 1.1 g/cm³) konsentratsiyasini o'rnatish uchun 5 A toki bilan qancha vaqt

lavomida o'tkazish kerak?

Yechish:

H₂SO₄ ning elektrolizida katodda H₂ gazini O₂ ajralib chiqadi. Shuning uchun sulfat kislotaning massasi o'zgarmaydi, faqat suvning massasi kamayib sulfat kislotaning massa ulushi ortib boradi.



Sulfat kislotaning eritmasining massasini aniqlaymiz.

$$m_{\text{eritma}} = \rho \cdot V = 1000 \text{ ml} \cdot 1.15 \text{ g/ml} = 1150 \text{ g}$$

Shu eritmada qancha massa kislotaga borligini aniqlaymiz.

$$m_{\text{kislotaga}} = m_{\text{eritma}} \cdot W = 1150 \text{ g} \cdot 0.15 = 172.5 \text{ g H}_2\text{SO}_4 \text{ bor.}$$

Konsentratsiyasini 3 marta oshirish degan bu massa ulushini 3 marta ko'payganidir.

15% · 3 = 45% ga yetkazishimiz kerak.

Sulfat kislotaning massasi o'zgarmagani uchun shu massa 45% gat eng bo'ladi.

Massa ulushning formulasi bilan massa yangi eritmaning massasini aniqlaymiz.

$$W_{\text{Ag}} = \frac{m_{\text{Ag}}}{m_{\text{eritmasi}}} \quad m_{\text{eritmasi}} = \frac{m_{\text{Ag}}}{W_{\text{Ag}}} = \frac{100 \text{ g}}{0.31} = 322.58 \text{ g}$$

Katodda Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi. Anodda elektrolit suvining oksidlanishi sodir bo'ladi. Faradey qonuni bo'yicha elektrolit suvni elektroliz qilganda qancha xlorin chiqadi, shuncha qancha Ag⁺ ionlari katodda Ag bo'lib qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi. Faradey qonuni bo'yicha elektroliz qilganda qancha xlorin chiqadi, shuncha qancha Ag⁺ ionlari katodda Ag bo'lib qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.

Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.

$$m_{\text{Ag}} = \frac{W_{\text{Ag}} \cdot m_{\text{eritmasi}}}{100} = \frac{0.31 \cdot 322.58}{100} = 100 \text{ g}$$

Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.

Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi. Faradey qonuni bo'yicha elektroliz qilganda qancha xlorin chiqadi, shuncha qancha Ag⁺ ionlari katodda Ag bo'lib qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.

Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.

Ag⁺ ionlari qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi. Faradey qonuni bo'yicha elektroliz qilganda qancha xlorin chiqadi, shuncha qancha Ag⁺ ionlari katodda Ag bo'lib qatnashib, Ag bo'lgan eritma hosil bo'ladi.




$$\begin{array}{ccc} 680 \text{ g} & & 432 \text{ g} \\ x_2 & & x_1 \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0.56 \cdot 680 \text{ g}}{22.4} = 17 \text{ g AgNO}_3 \text{ elektroliz bo'lgan.}$$

$$x_2 = \frac{0.56 \cdot 432 \text{ g}}{22.4} = 10.8 \text{ g katodda Ag ajraladi.}$$

136 g AgNO₃ ning 17 g mi elektroliz bo'lgan. Demak, 136-17=119 g AgNO₃ elektroliz bo'lmay qolgan.



$$22,4 \text{ l} \quad \times \quad 352 \text{ g}$$

$$0,56 \text{ l} \quad \times$$

$$\frac{0,56 \text{ l}}{22,4 \text{ l}} = \frac{x}{352 \text{ g}} \quad \text{yoki} \quad 0,025 \text{ mol}$$

$$0,56 \text{ l} \quad \times \quad 352 \text{ g/mol}$$

$$0,56 \text{ l} \quad \times \quad 352 \text{ g/mol}$$

0,56 l l i kislotada $x = 0,025 \text{ mol}$ ajratib chiqqan.

0,56 l l i kislotada $x = 0,025 \text{ mol}$ ajratib chiqqan.

Qolgan mis sulfat massasi aniqlanadi.

$m = 400 \text{ g} - 10,8 \text{ g} - 388,4 \text{ g} = 119 \text{ g}$ qolgan. Shuncha eritma tarkibida 119 g mis sulfat kislotada ajratilgan. Ularning massa ulushini aniqlaymiz.

$$W_{\text{HNO}_3} = \frac{m_{\text{HNO}_3}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{6,3 \text{ g}}{388,4 \text{ g}} = 0,0162 \text{ yoki } 1,62 \%$$

$$W_{\text{AgNO}_3} = \frac{m_{\text{AgNO}_3}}{m_{\text{eritma}}} = \frac{119 \text{ g}}{388,4 \text{ g}} = 0,3064 \text{ yoki } 30,64 \%$$

2-misol. 310 g 14,9% li mis sulfat eritmasi elektroliz qilinganda anodda 1,86 l (n.sh.) gaz ajralgandan so'ng jarayon to'xtatildi. Mis sulfatning massa ulushi (%) da aniqlang?

Yechish:

1) Eritmadagi mis(II) sulfatning massasini aniqlaymiz;

$$m(\text{CuSO}_4) = 310 \times 14,9\% = 46,19 \text{ g}$$

2) Reaksiya tenglamasidan foydalanib, elektrolizga uchragan mis(II) sulfat massasini, undan esa ortib qolgan mis(II) sulfat massasini topamiz;

Laboratoriya bajariladigan ishlar

1 - tajriba.

3-ki valentli qat'iy moddalarining elektroliz qurilmasini (Ushbu qurilma 1-sonli trubkani) qalay eritmasi bilan to'ldirib, elektroliz orning yordamida tirsagiga grafit elektrodni tushiring va uning boshini tok manbaiga ulang. Elektroliz jarayonida kristallarining hosil bo'lishini kuzatib, katod jarayonini yozing. Elektroliz eritmasida elektrodlardan soling moddalar ajratilib oling. Aritma rangiga 3-4 qat'iy moddan kaliy yodid qo'shib, elektroliz eritmasini qaynatib, bo'rk rangli bo'lishini kuzatib. Elektroliz moddalarini elektroliz rangli kompleks hosil qilish va elektroliz eritmasini tenglamasini yozing va eritma rangining o'zgarishini tushuntiring.

2 - tajriba.

Qalay yodidning elektrolizi. Probirkaning $\frac{3}{4}$ qismini qalay yodid eritmasidan qo'ndirib, 5-6 tomchidan fenolftalein va kraxmal eritmasidan tomizing. Eritmani aralashtirib, so'nra elektrolizyorga quying. Grafit elektrodni tushirib, ularni tok manbaiga yoki to'g'rilagichga ulang.

Tajriba natijalarini yozing. Katod va anod atrofida eritmalar rangining o'zgarishini kuzating, katod va anod jarayonlarining tenglamasini keltiring. Katod va anod eritma rangining o'zgarishini tushuntiring.

3 - tajriba.

Natriy sulfatning elektrolizi. Probirkada natriy sulfat eritmasini lakmus bilan aralashtirib va hosil bo'lgan eritmani elektrolizyorga quying. Eritma orqali elektr toki o'tkazib va elektrodlar atrofida eritma rangining o'zgarishini kuzating.

Tajriba natijalarini yozing. Anod va katod jarayonlari tenglamalarini keltiring. Katod va anodda qanday modda hosil bo'ladi? Nima sababdan elektrodlar atrofida eritma rangi o'zgaradi?

4- tajriba.

Grafit va mis elektrodlar ishtirokida mis sulfatning elektrolizi.

Elektrolizyorga mis sulfati eritmasidan quying. unga grafit elektrodlar tushirib va eritma orqali elektr toki o'tkazib. Bir necha minutdan

kompleksi qo'shimchasi bo'ldir. Nazariy va amaliy kimyo Xalqaro itifoqi (IYUPAC) tomonidan nomenklatura qoidalarini boshlab joriy etilgan bo'lgan kompleks birikmalar uchun quyidagicha qo'llaniladi:

1. Kompleks birikmalar nomida kation nomi kation nomi bilan aytiladi, [Co(NH₃)₆]³⁺ - geksamminxlorokobalt(III)-kation, [Co(NH₃)₆][Cl]⁻ - geksamminxlorokobalt(III)-trioksalat (SH)-kation (SH).

2. Kompleks birikmalar nomida anion nomi anion nomi bilan aytiladi. Ligandlar nomlari qaydalaridan olingan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi. Kompleks birikmalar nomlari yozib bo'lgan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi. Kompleks birikmalar nomlari yozib bo'lgan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi.

3. Kompleks birikmalar nomida "O" qo'shimchasi qo'shiladi, neytral ligandlar nomlari qaydalaridan olingan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi. Kompleks birikmalar nomlari yozib bo'lgan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi. Kompleks birikmalar nomlari yozib bo'lgan bo'lsa, ular qisqartirib tanishtiriladi.

4. Har bir kompleks birikma nomida sonini ko'rsatish bo'lganda grekcha sonlar bilan ko'rsatiladi (di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-) yoziladi, bular tegishli ligandlar soni 2, 3, 4, 5 va 6 bo'lganda).

Agar ligand nomining o'zida grek qo'shimchasi bo'lsa, masalan mono di- va h.k., unda ligand nomi qavsga olinib, unga boshqa xilga kiruvchi qo'shimcha qo'shib yoziladi (bis-, tris-, tetrakis-, i geksakis kabi ifodalanadi). ligandlar tegishli 2, 3, 4, 5 va 6 bo'lganda [Co(NH₂-CH₂-CH₂-NH₂)₃][Cl]-tri (etilendiamin)-kobalt (SH)-xlorid.

5. Kompleks anionlar nomiga -at qo'shimchasi qo'shib o'qiladi. Masalan: K₄[Ni(CN)₄] - tetrasianonikelat -(O)-kaliy.

6. Metalning oksidlanish darajasi uning nomi ortiga qavsga olingan rim sonlari bilan belgilanadi. Masalan, [Co(NH₃)₆Cl]²⁺ da kobaltning oksidlanish darajasi plyus uchga tengligini ko'rsatish uchun rimcha (SH)dan foydalaniladi.

Kompleks birikmalarda struktura (holat va koordinasion) izomeriya va stereo (geometrik, optik) izomeriyalar bor. Bularning birinchisida birorta ligand ba'zi hollarda metall bilan koordinasion bog' orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'langan bo'lsa, boshqalarida u kristall to'ring koordinasion ta'sir doirasidan tashqarida bo'ladi. Buni quyidagi kompleks birikma [CrCl₃(H₂O)₃] misolida namoyish qilish mumkin:

komplekslardan biridir. Nazariy va amaliy kimyo Xalqaro ittifoqi (IYUPAK) qabul qilgan nomenklatura 1962 yildan boshlab joriy etilgan bo'lib, kompleks birikmalar uchun quyidagicha qo'llaniladi:

1. Tuzlarda avvalo kation nomi, so'ngra anion nomi aytiladi. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}] \text{Cl}_2$ - pentaamminxlorokobalt (VI)-xlorid. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6] [\text{C}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ - geksammin kobalt (SH)-trioksalat xrom (SH).

2. Kompleks ioni yoki molekulani nomlashda metallarga qaraladi. Ligandlar ularning zaryadlaridan qat'iy nazar alfavit tarzida sanaladi. Kompleks formulasi yozib bo'lingach, birinchi bo'lib metall ko'rsatiladi $\text{K}_2 [\text{Pt}(\text{N}_2\text{O}_2)_2 \text{Cl}_2]$ dixlorodinitritoplatinat (P)-kaliy.

Z. Anion ligandlarga "O" qo'shimchasini qo'shib, neytral ligandlarni esa molekula kabi o'qiladi. Masalan, N_3 - azido, B - bromo, OH - siano, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ - oksalato va h.k. $\text{K}_4 [\text{Ni}(\text{CN})_6]$ - tetrasianonikelat (O)- kaliy; $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6] \text{Cl}_3$ - geksakvoaluminium (SH)-xlorid.

4. Har turga kiruvchi ligandlar sonini (1 dan ortiq bo'lganda) grekcha sonlar bilan belgilanadi (di-, tri-, tetra-, penta-, va geks- yoziladi, bular tegishli ligandlar soni 2, 3, 4, 5 va 6 bo'lganda).

Agar ligand nomining o'zida grek qo'shimchasi bo'lsa, masalan mono di- va h.k., unda ligand nomi qavsga olinib, unga boshqa xilga kiruvchi qo'shimcha qo'shib yoziladi (bis-, tris-, tetrakis-, i geksakis kabi ifodalanadi, ligandlar tegishli 2, 3, 4, 5 va 6 bo'lganda) $[\text{Co}(\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{NH}_2)_3 \text{Cl}]$ tri (etilendiamin)- kobalt- (SH)xlorid.

5. Kompleks anionlar nomiga -at qo'shimchasi qo'shib o'qiladi. Masalan: $\text{K}_4 [\text{Ni}(\text{CN})_6]$ - tetrasianonikelat (O)- kaliy.

6. Metallning oksidlanish darajasi uning nomi ortiga qavsga olingan rim sonlari bilan belgilanadi. Masalan, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}]^{2+}$ da kobaltning oksidlanish darajasi plus uchga tengligini ko'rsatish uchun rimcha (SH) dan foydalaniladi.

Kompleks birikmalarda struktura (holat va koordinasion) izomeriya va stereo (geometrik, optik) izomeriyalar bor. Bularning birinchisida birorta ligand ba'zi hollarda metall bilan koordinasion bog' orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'langan bo'lsa, boshqalarida u kristall to'ning koordinasion ta'sir doirasidan tashqarida bo'ladi. Buni quyidagi kompleks birikma $[\text{CoCl}_3 (\text{H}_2\text{O})_6]$ misolida namoyish qilish mumkin:


$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ - binafsha rangli modda

$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl} \cdot \text{H}_2\text{O}$


ko'k rangli moddalar

$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Stereoizomerlar bir xil kimyoviy bog'lanishga ega, lekin bir-biridan fazodagi joylashuvi boyicha farq qiladi. Quyida ko'rsatilganidek, $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ kompleks birikmada xlor - ligandlar yonma-yon holda (a) yoki qarama-qarshi tomonlarda joylashishi mumkin.



a.



b.

Koordinasion sferada donor atomlarining turlicha joylashuvi hisobiga vujudga keladigan izomeriya turi geometrik yoki sis- va trans izomeriya deyiladi.

Kursatilgan $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ kompleks birikmadagi geometrik izomerlar, ya'ni a) sis-izomer; b) trans-izomer kurinishida tasvirlangan.

Bir xil guruxlar yonma-yon joylashgan izomer molekullari **sis-izomer**, bir xil guruxlar bir-biridan uzoqda joylashganlari esa **trans-izomer** hisoblanadi.

Ko'zguda bir-birining aksini ifodalovchi izomerlar optik izomerlar turiga kiradi. Insonning ikki qo'li bir-biriga juda o'xshagani bilan uni bir-biriga juda mos keladi deb bo'lmaydi. Optik izomerlarning fizik va kimyoviy xossalari o'zaro o'xshashdir.

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba.

a) Uchta probirkaga 2 ml dan $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ temir ammoniy sulfat qo'sh tuzi eritmasini quying. Birinchi probirkaga NaOH eritmasini quying. Bir oz qizdirib chiqayotgan gazni hidiga qarab qanday gaz ekanligini aniqlang. Ushbu reaksiya $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ ning eritmasida qaysi ion borligini ko'rsatadi? Ikkinchi probirkaga kaliy rodanid (KSCN) erimasidan ozgina quying. Qizil rangli tuz hosil bo'lishi qaysi ion boriigidan darak beradi? Uchinchi probirkaga BaCl_2 eritmasini qo'shib SO_4^{2-} ion borligini aniqlang. Reaksiya tenglamalarini yozing va $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ ni elektrolitik dissotsiyanlash tenglamasini yozing.

b) Geksatsianoferrat (III) kaliy $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ eritmasiga ishqor va kaliy rodanid KSCN eritmasini tasir ettiring. Nima uchun tarkibida Fe^{3+} ion bo'lgan $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ tuzi bilan Fe^{3+} ion uchun xarakterli bo'lgan reaksiyalar sodir bo'lmadi? Sababini tushuntiring. Tenglamalarni yozing.

2-Tajriba.

Kompleks anionlar.a) Probirkaga 2-3 ml 0,1 m $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ eritmasidan olib ustiga cho'kma hosil bo'lguncha tomchilatib KI eritmasini soling. Hosil bo'lgan cho'kmaning rangini aniqlang. Ustiga yana bir oz ortiqcharoq miqdorda kaliy yodid eritmasidan quying. Nima kuzatiladi? Reaksiya natijasida vismutning kompleks tuzi hosil bo'lishini (Bi ionining koordinatsion soni 4 ga teng) nazarda tutib reaksiya tenglamasini yozing. Hosil bo'lgan tuzning nomini ayting. b) Rux va alyuminiy tuzlarning eritmasiga cho'kma hosil bo'lguncha tomchilatib ishqor eritmasidan quying. Hosil bo'lgan cho'kmaning rangini aniqlang. Hosil bo'lgan cho'kmalarga yana ortiqcharoq miqdorda ishqor eritmasidan qo'shing. Nima kuzatilganini izoxlang. Ishqorning ortiqcha miqdori bilan gidroksosianat va gidroksoalyuminat hosil bo'lishini nazarda tutib reaksiya tenglamalarni yozing.

3-Tajriba.

Kompleks kationlar.a) Probirkaga 2-3 ml 0,5 n CuSO_4 eritmasidan quyib, usliga tomchilab cho'kma hosil bo'lguncha ammiak eritmasidan quying. Hosil bo'lgan cho'kmaning rangini aniqlang. Uning ustiga

yana ortiqcharoq miqdorda ammiak eritmasidan quying. Nima uchun cho'kmaning erish jarayoni kuzatildi? Hosil bo'lgan eritmaning rangi qanday o'zgaradi? Cho'kma hosil bo'lish va cho'kmaning erish jarayonlari reaksiya tenglamalarini yozing. Hosil qilingan eritmani ikkita probirkaga bo'ling, probirkalardan biriga NaOH eritmasidan, ikkinchisiga Na₂S eritmasidan qo'shing va ulardan birida cho'kma hosil bo'lishini kuzating. Cu(OH)₂ va CuS larning eruvchanlik ko'paytmasiga asoslanib, cho'kma hosil bo'lishini tushuntiring. **4-Tajriba. Kompleks birikmalar ishtirokida boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.** a) Ozgina suyultirilgan sulfat kislota qo'shilgan KMnO₄ eritmasiga sariq qon tuzi K₃[Fe(CN)₆] eritmasidan qo'shing. Nima kuzatildi? Reaksiya tenglamasini yozing. Oksidlovchi bilan qaytaruvchini ko'rsating. b) Probirkada 2 ml dan vodorod peroksid va o'yuvchi kaliy eritmalaridan aralashtiring va ustiga 2 ml qizil qon tuzining K₃[Fe(CN)₆] eritmasidan quying. Kislorod ajralishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing.

5-tajriba. Akvakomplekslarning hosil bo'lishi. a) Chinni idishga CoCl₂•6H₂O va CuSO₄•5H₂O kristalgidratlarni solib qizdiring. Hosil bo'lgan suvsiz tuzlarning rangini aniqlang va soviting. Sovitilgan idishga suv quying. Idishdagi eritma rangining o'zgarishi akvakompleks hosil bo'lganligini bildiradi.

b) Bir nechta dona kobalt CoCl₂•6H₂O kristallarini 2-3 tomchi konsentrlangan xlorid kislotada eriting, eritmaning rangini aniqlang. Hosil bo'lgan eritmaga suv qo'shib suyultiring. Gidratlangan Co⁺² ionlari uchun xarakterli bo'lgan rangni eritmaning rangiga qarab aniqlang. CoCl₂•6H₂O tuzning HCl kislotasida erish reaksiyasini va eritmaning suv bilan suyultirish natijasida sodir bo'lgan reaksiya tenglamasini yozing.

12.0.S-BLOK ELEMENTLARI

Birinchi gurux asosiy guruxchasi elementlari ishqoriy metallar deb atalib, ular Li, Na, K, Rb, Cs va Fr elementlaridan iborat. Bu elementlarning tashqi elektron qavatlarida s' elektronlari mavjud. Shuning uchun bu elementlar kimyoviy reaksiya paytida s' elektronni osongina yo'qotib, kuchli qaytaruvchi xossasini namoyon qiladi va doimo +I ga teng

oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Bu elementlarda Li dan Fr ga tomon atom radiiClari kattalashadi. ammo ion zaryadlari o'zgarmaydi. Shuning uchun bu elementlarning metallik va qaytaruvchilik xossalari ortib boradi. Bu elementlarni ishqoriy metallar deb atalishiga sabab, ular suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishib, asos va vodorod hosil qiladi. Hosil bo'lgan birikmalari esa kuchli ishqorlardir.

Tabiatda uchrashi. Ishqoriy metallar sof holda tabiatda uchramaydi. Ko'pgina elementlarga o'xshab, ular alyumosilikatlar tarkibida uchraydi. Litiyning eng muhim minerallari lepidolit $K_2O \cdot 2Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, Fe (OH)₂, spodumen $Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$, ambligonit $LiAlPO_4F$ yoki $LiAlPO_4OH$ va boshqalar. Natriy minerallari tosh tuz $NaCl$, glabuer tuzi $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kriolit Na_3AlF_6 , bura $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, silvinit $NaCl$ KCl , chili selitrasi

$NaNO_3$, dala shpati $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ holida uchraydi. Kaliy minerallari silvinit $NaCl$ KCl , dala shpati $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, silvin KCl , karnallit KCl $MqCl$, $6H_2O$ va o'simlik kuli tarkibida K_2CO_3 holida uchraydi.


Rubidiy elementi tabiatda keng tarqalgan bo'lishiga qaramay, mustaqil minerallar hosil qilmaydi. Tabiatda u kaliyning yo'ldoshi hisoblanib, turli tog' jinClari ayniqsa, alyumosilikatlar tarkibida uchraydi. Seziy elementi rubidiyga qaraganda ancha siyrak element hisoblanadi. Tarkibida eng ko'p seziy bo'lgan mineral - polusit $4Cs_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 18SiO_2 \cdot 2H_2O$ dir.

Fransiy elementi minerallari tabiatda uchramaydi, uning izotoplari sun'iy ravishda hosil qilinadi.


Olinishi. Tarkibida bu elementlar bo'lgan minerallar birinchi navbatda boyitiladi. Boyitilgan rudalar tarkibidagi elementlarni eritmaga yoki qayta ishlash uchun qulay holga aylantirilib quyidagi usullar bilan olinadi:



Hosil qilingan Li_2SO_4 ni karbonatlar holida cho'ktiriladi:



Hosil qilingan karbonatlar HCl ishtirokida eritmaga o'tkaziladi.




Hosil qilingan LiCl ni 1:1 nisbatda KCl tuzi bilan aralashtirib suyuqlantiriladi va elektroliz qilinadi. Bunda anod sifatida grafitdan, katod sifatida temir elektrodlardan foydalaniladi. Katodda Li metali qaytariladi: $\text{Li}^+ + e = \text{Li}^0$

Anodda esa xlor ioni oksidlanadi: $2\text{Cl}^- - 2e = \text{Cl}_2$

$2\text{Li}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 + 4\text{CaCO}_3 = 2(\text{Li}_2\text{O Al}_2\text{O}_3) + 4(\text{CaO SiO}_2) + 4\text{CO}_2$
Hosil qilingan litiy minerali ishqor ta'sirida eritmaga o'tkaziladi:
 $\text{Li}_2\text{O Al}_2\text{O}_3 + \text{Ca(OH)}_2 = 2\text{LiOH} + \text{CaO Al}_2\text{O}_3$

Hosil qilingan LiOH eritmasi NaCl ta'sirida LiCl tuziga aylantiriladi, eritmani bug'latib, qolgan LiCl tuzini suyuqlantirib elektroliz qilinadi.

3. Toza holdagi litiy metali litiy oksidi Li_2O ni kremniy yoki alyuminiy bilan qaytarib olinadi:




Natriy metali asosan ikki xil usul bilan olinadi:

1. Natriy gidroksidni suyuqlantirib elektroliz qilinadi. Bunda katod temirdan, anod esa nikeldan yasaladi. Katodda Na metali qaytariladi:



Anodda esa OH^- ionlari oksidlanib, kislorod ajralib chiqadi:



Bu usul toza holda natriy olinishi va jarayonning past temperatura-da olib borilishi kabi afzalliklarga ega. Lekin xom ashyo sifatidagi NaOH ning tannarxi birmuncha yuqoriligini eslatib o'tish lozim.

2. NaCl tuzini suyuqlantirib, elektroliz qilinadi. Bu usulda xomashyo sifatida toza holdagi NaCl ishlatilsa, NaCl bilan Na metallning syuqlanish temperaturalari bir-biriga yaqin bo'lgani uchun natriy metalini sof holda ajratib olish anchagina noqulaydir. Bundan tashqari, natriyning toyingan bug' bosimi taxminan havoning toyingan bug' bosimiga yaqin qiymatga ega, bu esa natriyning ko'p yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun NaCl tuziga NaF, KCl yoki CaCl_2 tuzlari aralashtirilib, uning suyuqlanish temperaturasi kamaytirib, elektroliz qilinadi. Katodda Na va K metallari qaytariladi. Bu aralashmani haydab Na ajratib olinadi. Anodda esa Cl^- ioni oksidlanadi:



Yuqorida ko'rib o'tilgan usullarni kaliy metalini olish uchun qo'llash



mumkin emas. Chunki kaliyning reaksiyaga kirishish xususiyati kuchli, ya'ni ajralib chiqayotgan klorod bilan tezda oksidlanib ketadi. Shuning uchun **kaliyni olishda quyidagi usullardan foydalaniladi:**

1. Suyuqlantirilgan KON yoki KCl eritmasidan kaliyni natriy bilan siqib chiqariladi:




2. KCl va NaCl tuzlari aralashmasini suyuqlantirib elektroliz qilinadi. Katodda qaytarilgan Na va K aralashmalarini haydab kaliy ajratib olinadi.

3. KCl tuzini vakuumda alyuminiy yoki kremniy bilan qaytarib olinadi.





Rubidiy va seziiyni olishning eng qulay usullari quyidagilardan iborat:

1. Xlorli birikmalarini qizdirib, vakuumda Sa bilan qaytariladi:




2. Karbonatlari yoki xloridlari yuqori temperaturada Mg yoki CaCl₂ ishtirokida qaytariladi:




Li, Na, K metallari sanoatda germetik berkitilgan temir idishlarda, laboratoriyada esa kerosinda saqlanadi. Rb va Cs metallari payvandlangan shisha ampulalarda saqlanadi.

1. Leblan usuli. Bu usulda osh tuziga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirib, natriy sulfat hosil qilinadi. Hosil qilingan natriy sulfat ohaktosh va ko'mir bilan aralashtirib pechda qizdiriladi, ya'ni $2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{kons}) = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$




2. Solvey usuli. Bu usulda osh tuzi ammiak va karbonat ангидрид bilan toyintirib NaHCO_3 cho'kmaga tushiriladi.



Cho'kmani qizdirib soda ajratib olinadi.



3. Elektrolitik usul. Osh tuzi eritmasini elektroliz qiliz natijasida hosil bo'lgan oyuvchi natriyni karbonat angidrid ta'sirida cho'ktirib, so'ngra uni qizdirib soda olinadi.



Hosil bo'lgan SO_3 yana qayta ishlatiladi.

Ishlatilishi. Ishqoriy metallar va ularning birikmalari organik moddalarni sintez qilishda, alyuminiy ishlab chiqarish, shisha va keramik moddalar olish, sun'iy tola ishlab chiqarish va mineral o'g'itlar olishda ishlatiladi. Vatanimizda qurilayotgan soda zavodi (Qoraqalpog'iston) undan keng soxalarda foydalanishga imkon beradi.

13.0. IKKINCHI GURUH S ELEMENTLARI



Ikkinchi gurux asosiy guruxchasi elementlariga Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra lar kiradi. Bu elementlarning tashqi elektron qavatlarida s^2 elektronlari mavjud. Shuning uchun kimyoviy reaksiya paytida s^2 elektronlarini berib, +2 ga teng oksidlanish darajasini namoyon qiladilar.

Ularning qaytaruvchilik xossalari ishqoriy metallarnikiga qaraganda kuchsizroq ifodalangan. Ikkinchi gurux asosiy guruxchasi elementlarining ion radiuslari ishqoriy metallarning ion radiusaridan kichik. Shuning uchun bu elementlarning gidroksidlari ishqoriy metallarning gidroksidlarga qaraganda kuchsizroq asos xossasini namoyon qiladi. Bu elementlarning gidroksidlarini asos xossalari gurux boyicha Be dan Ra ga tomon ortib boradi, chunki elementlarning ion radiuslari ortib boradi. $\text{Be}(\text{OH})_2$ amfoter, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ kuchsiz asos, lar kuchli asos xossasiga ega. Be bilan Mg bir guruxda yonma-yon joylashganiga qaramay, xossalari bir-biridan keskin farq qiladi: berilliy oksidi va gidroksidi amfoter xossaga, Mg elementining oksidi va gidroksidi esa asos xossasiga ega. Bunga sabab shuki, Be ning ion radiusi Mg ning ion radiusiga qaraganda ikki marta kichikligidir.

Berilliy. Berilliy ikkinchi gurux asosiy guruxchasiga joylashgan bo'lib, $1s^2 2s^2$ elektron konfiguratsiyasiga ega. Uning oksidlanish darajasi +2 ga teng. Berilliyi birinchi bo'lib 1827 yilda Velyor berilliy xloridni kaliy bilan qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan.


Tabiatda uchrashi. Berilliy tabiatda asosan berill $Al_2O_3 \cdot 3BeO$ $6SiO_2$ fenikit $2BeO \cdot SiO_2$, xrizoberill $Al_2O_3 \cdot BeO$ minerallari holida uchraydi.

Olinishi. 1. Tarkibida berilliy bo'lgan rudalar boyitiladi. Hosil qilingan konsentrat ohaktosh bilan aralashtirib kuydiriladi, so'ngra bu qorishma konentrlangan H_2SO_4 bilan ishlanadi;



Hosil qilingan berilliy xlorid tuzini natriy xlorid bilan aralashtirib (suyuqlanish temperaturasi pasaytirish maqsadida) suyuqlantiriladi va elektroliz qilinadi. Katodda berilliy metall holida qaytariladi.

2. Berilliyning ftoqli birikmacini induksion elektr pechlarda magniy bilan qaytarib metall holida olish mumkin:




Hosil bo'lgan Be metalini 1200° da suyuqlantirib MgF_2 shlakidan ajratiladi.

Ishlatilishi. Berilliy va uning birikmalari issiqlikka va o'tga chidamli, shisha, keramik buyumlar olishda, sement sanoatida, meditsinada, qishloq xo'jalik zararkunandalariga qarshi kurashishda, to'qimachilik va konditer sanoatida organik moddalarni sintez qilishda ishlatiladi.



Magniy. Magniyning elektron konfiguratsiyasi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ dir. Toza holatda magniyi birinchi bo'lib 1829 yili A. Byussi ajratib olgan. Tartib nomeri 12, atom massasi 24,312. Magniyning uchta barqaror izotopi ma'lum: Mg , Mg , Mg . Tabiatda magniy asosan silikatlar Mg_2SiO_4 - olivin minerali holida, karbonatlar - dolomit $CaMg(CO_3)_2$, va magnezit $MgCO_3$ minerallari holida, xloridlar - karnallit $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ minerali holida uchraydi. Bundan tashqari dengiz suvlari tarkibida $MgCl_2$ holida uchraydi.

Olinishi. 1. Tuzlari $KClMgCl_2 \cdot 6H_2O$ yoki $MgCl_2$ ni suyuqlantirib elektroliz qilish usuli bilan olinadi. Bunda katodda Mg erkin holda, anodda esa Si , ajralib chiqadi.

2. **Metallotermik usul.** Bu usulda vakkum elektr pechlarida $1200-1200^\circ C$ da qizdirilgan dolomitni kremniy bilan qaytarib olinadi:



3. **Uglerodotermik usul.** Bu usulda magniy birikmalari yuqori temperaturada qizdirilib oksidlarga aylantiriladi va cho'g'latilgan ko'mir bilan qaytariladi.



Magniy gidrid MgH_2 kukun holidagi kumush rang, qattiq modda, suv ta'sirida oson parchalanadi. Alyuminiy va berilliy gidridlariga qaraganda termik barqaror. Bundan tashqari magniyning gidrid-borat $Mg[BH_4]_2$ va gidrid-alyuminat $Mg[AlH_4]_2$ birikmalari ham ma'lum.

Magniy oksid. MgO - yuqori temperaturada suyuqlanadigan, asos xossasiga ega bo'lgan oq tuqli kristall modda. Texnikada asosan magniy karbonatni termik parchalanish natijasida olinadi:




Magniy oksid qaynoq suvda juda oz eriydi, kislotalar bilan reaksiyaga kirishib tuz hosil qiladi:

Magniy gidroksid. $Mg(OH)_2$ - suvda kam eriydigan, asos xossasiga ega bo'lgan kristall modda. Magniy gidroksid ammoniy tuzlaridan ammiakni siqib chiqara oladi. $2NH_4Cl + Mg(OH)_2 = MgCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

Magniy xlorid $MgCl_2$ oktaedrik tuzilishiga ega bo'lgan, ion bog'lanishli oq tuqli kristall modda. Magniy oksidni ko'mir ishtirokida xlorlash usuli bilan olinadi: $MgO + Cl_2 + C \xrightarrow{t} MgCl_2 + CO$

Magniy xlorid kristall gidrati $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dengiz suvlarini quritish usuli bilan olinadi. Magniy sulfat MgSO_4 oq tucli kukun. Suv ta'sirida monogidrit $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ va heptagidrat $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ hosil qiladi. Magniy sulfat ishqoriy metallarning tuzlari bilan quyidagi qo'shiloq tuzlar hosil qiladi.




Magniy nitrat $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ suvda yaxshi eriydigan gigroskopik modda. Termik beqaror bo'lgani uchun qizdirganda MgO hosil qilib parchalanadi: $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MgO} + \text{N}_2\text{O}_5 + 6\text{H}_2\text{O}$

Magniy karbid MgC_2 kalsiy karbidga magniy xlorid ta'sir ettirish natijasida hosil bo'ladi: $\text{CaC}_2 + \text{MgCl}_2 \rightarrow \text{MgC}_2 + \text{CaCl}_2$

Magniy karbid suv ta'sirida shiddatli parchalanib asetilen hosil qiladi.



Magniy nitrid Mg_3N_2 magniyni azot atmosferasida qizdirish natijasida hosil qilinadi, suv ta'sirida ammiak hosil qilib parchalanadi:



Magniyni yuqorida keltirilgan birikmalaridan tashqari suvda yomon eriydigan tuzlari $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Mg}_3(\text{AsO}_4)_2$, MgCO_3 , MgF_2 ham bor.

Ishlatilishi. Magniy va uning birikmalar intermetall birikmalar hosil qilishda, raketa texnikasida, keramik, shisha va sement olishda, to'qimachilikda, achchiqtosh olishda ishlatiladi.

Kalsiyga guruxchasi elementlari. Kalsiy guruxchasi elementlariga kalsiy Ca , stronsiy Sr , bariy Ba va radiy Ra kiradi. Bu elementlarning tashqi elektron qavatlarida s^2 elektronlar mavjud. Gurux boyicha elementlarning atom va ion radiuClari ortib boradi. Shuning uchun bu elementlarning aktivligi ham ortib boradi.

Tabiatda uchrashi. yer qobig'ida kalsiyning oltita, stronsiyning to'rtta, bariyning ettita barqaror izotopi bor. Bulardan eng ko'p tarqalganlari Ca va Ba lardir. Radiy radioaktiv element bo'lgani uchun uning barqaror izotoplari yo'q. Lekin sun'iy ravishda hosil qilingan sakkizta radioaktiv izotoplari ma'lum.

Kalsiy er qobig'ida eng ko'p tarqalgan elementlardan hisoblanadi. Tabiatda asosan silikatlar CaSiO_3 va alyumosilikatlar $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ holida uchraydi. Bulardan tashqari kalsiy karbonat CaCO_3 , angidrit CaSO_4 , gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ flyuorit CaF_2 , apatit $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F}, \text{Cl}, \text{OH})$ fosforit $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ lar holida uchraydi. Bariy va stronsiy asosan stronsit SrCO_3 , viterit BaCO_3 , selistin SrSO_4 , barit BaSO_4 minerallari holida uchraydi. Radiy esa uran rudasi tarkibida qisman uchraydi.

Olinishi. Kalsiy, stronsiy, bariy metallarini, birinchi marta Xevi tomonidan elektroliz qilib olingan. Elektroliz qilishda ularning tuzlarini yuqori temperaturada suyuqlantiriladi. Katodda metallar ajralib chiqadi. Bu elementlar tuzlarini suyuqlantirishda ularni suyuqlanish temperaturalarini kamaytirish uchun ba'zi tuzlardan foydalaniladi.

Bundan tashqari kalsiy, stronsiy, bariy metallarini vakuumda alyumotermiya usuli bilan ham olish mumkin:



Ishlatilishi. Bu elementlar va ularning birikmalari keramika, shisha, sement sanoatida, qurilish materiallari olishda, boyoqchilikda, organik moddalarni sintez qilishda, katalizator tayyorlashda, metallurgiya va intermetall birikmalar olishda ishlatiladi. Kalsiy ko'pgina qiyin eriydigan metallarni qaytarishda muhim ahamiyatga ega. Bu yo'l bilan toriy, vanadiy, sirkoniy, berilliy, niobiy, uran va tantal kabi metallar qaytariladi. Kalsiydan mis, nikel, bronza va maxsus po'lat tayyorlashda ham foydalaniladi. Stronsiy metallarni tozalashda xizmat qiladi. Misga qo'shilganda uning qattiqligi ortadi. Radiy va uning birikmalari nur qaytaruvchi boyoqlar tayyorlashda, meditsinada, qishloq xo'jaligida va radon olishda ishlatiladi.

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Ishqoriy metallarga havo kislorodi va suvning ta'siri.
a) Kerosinli shisha idishda saqlanadigan natriy metallining kichik bo'lakchasini pinset yordamida olib, filtr qog'ozi orasida arting va pichoq bilan kesing. Metallning yangi kesilgan yuzasiga e'tibor bering.

Bir oz vaqtdan keyin natriy metallining kesilgan yuzasida nima sodir bo'ladi? Reaksiya tenglamasini yozing.

b) Natriyning kichkina bo'lakchasini filtr qog'oz bilan artib, ikki tomchi fenoltalein qo'shilgan suvli chinni idishga soling. Shiddatli reaksiya borishini va eritma rangining asta-sekin o'zgarishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing.

2-tajriba. Ishqoriy metallarning alangani bo'yashi Xlorid kislotada yuvish va qizdirish yoli bilan tozalangan platina yoki nixrom simni litiyning biror tuzi eritmasiga botirib oling va gaz gorelkasi alangasiga tuting. Alanganing to'q qizil ranga bo'yalishini kuzating. Shu tajribani kaliy va natriy tuzlari bilan xam ho'llab ko'ring. Kaliy tuzlari alangani binafsha tusga, natriy tuzlari esa sariq tusga kiradi.

3-tajriba. Natriy tuzlarining gidrolizi. a) Probirkaga ozroq natriy peroksid solib, uning 2-3 ml suvda eriting va gaz ajralib chiqishini kuzating. Universal indikator yordamida eritma muxitini aniqlang. Eritmaning pH qanday? Qanday gaz ajralib chiqadi? Reaksiya tenglamasini molekulyar va ionli ko'rinishini yozing.

b) Uchta probirkaning biriga Na_2SO_3 , ikkinchisiga NaCl va uchinchisiga Na_2CO_3 solib, ularni disstillangan suvda eriting. Probirkaga 2-3 tomchidan fenoltalein yoki metiloranj eritmasidan tomizib, eritmalarining muhitini aniqlang. Olingan hamma tuzlar gidrolizlandimi? Gidrolizlanish reaksiyasi tenglamasini molekulyar va ionli ko'rinishida yozing.

4-tajriba. Magniyning yonishi va suvning ta'siri. a) Qisqich uchida o'zgina magniy solib, uni yondiring. Nima kuzatiladi, tenglamasini yozing.

b) Probirkaga 2-3 ml suv quyib, unga bir bo'lak magniy bo'lakchasini xona haroratida reaksiya bormasligiga e'tibor bering. So'ngra probirkani qizdiring. Nima kuzatiladi? Eritmaga 1-2 tomchi fenoltalein qo'shing. Uning rangi o'zgaradimi? Reaksiya tenglamasini yozing.

5-tajriba. Ishqoriy-yer metallarning karbonatlari va sulfatlarini hosil qilish. Kalsiy, stronsiy va bariy xlorid tuzlari eritmalariga Na_2CO_3 va Na_2SO_4 laridan qo'shib, bu elementlarning karbonatlari va sulfatlarini hosil qiling.

Nazorat savollari

1. Quyidagi reaksiyalarning tenglamalarini tugallang va tenglashtiring:

- a) $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$ d) $\text{NaH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$
b) $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$ g) $\text{NaH} + \text{Cl}_2 \rightarrow \dots$
c) $\text{Li}_3\text{H} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$ e) $\text{KH} + \text{O}_2 \rightarrow \dots$

2. Natriy peroksidga: a) 10g SO_2 b) 10 litr SO_2 ta'sir ettirib necha litr kislorod (n.sh. da) olish mumkin?

J: a) 1,75 l b) 5 litr O_2

3. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradigan reaksiyalarning tenglamalarini tuzing:


- a) $\text{Ca} \rightarrow \text{CaH}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
b) $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{SrO} \rightarrow \text{Sr} \rightarrow \text{Sr}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Sr}(\text{OH})_2$
c) $\text{Ba} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaO} \rightarrow \text{O}_2$

14.0. O'N UCHINCHI GRUPPA ELEMNTLARING UMUMIY TAVSIFI

Bor va uning birikmalari

Borning tabiatda tarqalishi: bor asosan birikma xolida tarqalgan bo'lib, ular qatoriga: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ - bura, $\text{Na}_2\text{H}_4\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - kernet, $\text{H}_3\text{BO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ - sasolin. Borning yer po'stlog'idagi miqdori $5 \cdot 10^{-4}$ at %. Ikki proton ^{10}B (19,6%) va ^{11}B (80,40%) ko'rinishidan iborat.

Olinishi. Bor asosan metallotermiya usuli bilan olinadi:



Metallotermik usul bilan olingan bor uncha toza bo'lmaydi. Toza holatdagi bor uning birikmalarini suyuqlantirib elektroliz qilish usuli bilan olinadi. Juda toza xoldagi borni, bug' holatdagi bor bromidni chug'atilgan tantal simi ishtirokida vodorod bilan qaytarib bor olish mumkin:



Bundan tashqari, vodorodli birikmalarini termik parchalab ham erkin xoldagi borni olish mumkin: $B_2N_6 \xrightarrow{\text{}} 2B + 3N_2$

Xossalari. Bor amorf va kristall modifikatsiyaga ega. Bor inert modda, oddiy sharoitda faqatgina fluor bilan birika oladi. Qizdirilganda esa, xlor, brom va oltingugurt bilan reaksiyaga kirishadi. Borga suyultirilgan kislotalar ta'sir etmaydi. Qizdirilganda, konsentran sulfat, nitrat kislotalarda va zar suvida yeriyladi:



Oksidlovchi moddalar ishtirokida bor ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi:




Bor oksidi V_2O_5 ning hosil bo'lishi Gibbs energiyasi yuqori bo'lganligi tufayli ($G_{298} = 1178 \text{ kDj/mol}$), bor qizdirilganda SiO_2 , P_2O_5 , CO_2 kabi barqaror oksidlar bilan ham reaksiyaga kirishib, kuchli qaytaruvchilik xossalarini namoyon qiladi:





Birikmalari. Borning vodorodli birikmalari boranlar deb ataladi. Xalq xo'jaligida ko'p ishlatiladigani V_3N_6 diborandir.




Borovodorod (boran) - lar juda shiddatli reaksiyaga kirishuvchi moddalardir. Ularning ko'pchiligi xatto ochiq havoda o'z-o'zidan alangalanib, katta issiqliq ajratib yonadi. Shu sababli bu moddalar raketa yoqilgisi sifatida ishlatiladi:





Diboran ishqoriy va ishqoriy - yer metallari va ularning gidroksidlari bilan reaksiyaga kirishadi:




Diboran kislotalar bilan bosqichli almashinish reaksiyalariga kirishadi:




Diboran galogenlar borming galogenidlarini hosil qiladi. Bor galogenidlari ammiak va ishqoriy metallar galogenidlari bilan biriklib, kompleks birikmalar hosil qiladi:




Bor galogenidlari suv ta'sirida yaxshi gidrolizlanadi:




Bor oksidi va borat kislotalari. Bor oksidi V_2O_5 ok kristall modda borat kislotalari suvsizlantirish natijasida hosil bo'ladi.




Borat kislotalari ishqor ta'sir ettirganda poliboratlar, agar NaOH ta'sir ettirilsa, natriy tetraborat kristallogidratlari hosil bo'ladi:



Bor tuzlariga kislota ta'sir ettirganda borat kislotalari hosil bo'ladi:



Borning kislorodli birikmalari asosan polimer tuzilishli bo'lib, -H-O-H- bog'lari molekulaning asosiy tuzilishini belgilaydi. Shunga asosan bor oksidi $(\text{B}_2\text{O}_3)_n$ tarkibga mos keladi. $(\text{B}_2\text{O}_3)_n$ juda osonlik bilan H_2O molekullari bilan ta'sirlashadi. Buni gidratlanish reaksiyasi deyiladi. $(\text{B}_2\text{O}_3)_n$ ning gidratlanish reaksiyasi natijasida bor kislotalari - polimetaborat, poliortoborat va ortoborat kislotalari hosil bo'ladi:




Agar bor kislotalarini qizdirilsa tarkibidan suv chiqib ketishi natijasida yuqoridagi reaksiya teskari yo'nalishda borib $(\text{B}_2\text{O}_3)_n$ hosil bo'ladi.

Bu kislotalardan ko'p ishlatiladigani orborat kislota - H_3BO_3 . Oddiy sharoitda ok rangli, kulga tegsa yog'simon iz qoldiruvchi, qavat-qavat tuzilishli modda. Bu tuzilish H_3BO_3 tarkibidagi vodorod va kislorod atomlarining H bog'i hosil qilishiga asoslangan.

Aksariyat borat kislotalari metallar bilan turli tarkibli tuzlarni hosil qiladi. Ulardan biri natriy tetraborat - $Na_2V_4O_7$ bura tuzidir. Bu to'z suvda yaxshi yeriya. aniqrog'i gidro'lizlanadi:




ion xolda $B_4O_7^{2-} + H_2O \longrightarrow H_2B_4O_7 + 2OH^-$ ikkinchi bosqichda:



Bu tuz eritmasi kuchsiz asos (pH > 7) xossasiga ega bo'ladi.

$Na_2B_4O_7$ ga kuchli kislotalar ta'sir ettirib ortoborat kislota olinadi:



Bura hosil qilish uchun bor kislotalari NaON bilan 2:1 nisbatda qayta ishlanadi:



Bura ko'pinga metallarni kovsharlashda, o'tga chidamli shishalar va olishda va analitik kimyoda moddalar analizida ishlatiladi.

Ishlatilishi Bor atomi yadrosi osonlikcha neytron biriktirib olish xususiyatiga ega. Shu sababdan bor birikmalari. yadroviy energetikada yadro jarayonlarini susaytiruvchi sifatida ishlatiladi. Bor (Cr, Zr) kabi ko'pchilik d -, va f - metallar bilan birikib yuqori haroratga chidamli (2000-3000°C) va kimyoviy ta'sirga bardoshli boridlar hosil qiladi. Shu xossalariga asoslanib, ko'pchilik boridlardan va qotishmalaridan reaktiv dvigatellar detallari, gaz turbinalarining parraklari tayyorlanadi. Ba'zi boridlar katalizator sifatida. elektron asboblarning katodlarini yasashda ishlaytiladi.

Boranlar raketa yoqilg'isi sifatida ishlatiladi.

Bor oksidi, bor tuzlari shisha tarkibiga qo'shilganda (3-12% B_2O_3) ximikatlariga va yuqori haroratga bardoshli shisha turlari tayyorlanadi, borat kislota tabobatda ishlatiladi.

Bor bilan uglerod birikmasi bor uglerod-karbonat ham deyiladi. Birikmalar yuqori haroratga bardoshli karboranli polimerlar ishlab

chiqarishda ishlatiladi. Bor karbidi V_4S_3 - yuqori haroratga bardoshli ($T_{\text{eruyil}} = 2623^\circ\text{C}$). Judda katta qattiqlikka ega bo'lgan modda. Azot bilan bor birikib boro nitrid (BN) ni hosil qiladi. Bor nitridining qattiqligi olmos qattiqligiga yaqindir. Borazon

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba. Borat kislotasining olinishi va uning efirini hosil bo'lishi. a) Probirkaga buraning to'yingan eritmasidan 3-4 ml soling va ustiga 3-4 tomchi konsentrlangan sulfat kislota eritmasidan tomizing. Probirkani eritmasi bilan kran ostida yoki sovutkichda 5 minut soviting. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozib hulosa chiqaring.

b) Borat kislotasini tuyngan eritmasidan 3-4 ml yoki kristallidan chinni kosachaga soling, ustiga 2-3 ml etanol (etil spirt) quyib qizdiring va ajralib chiqayotgan boretill efini bug'ini yoqing. Alanga rangiga e'tibor bering. Boretill efirini hosil bo'lishi va yonish (borat ionini ochish) reaksiya tenglamalarini tuzib, tegishli hulosa chiqaring.

2-Tajriba. Buraning gidrolizi. Probirkaga 1-2 ml $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ (natriy tetraborat) eritmasidan quyib ustiga 1-2 tomchi fekolflalen tomizning. Gidroliz tenglamasini molekulyar va ion-molekulyar xolda yozib reaksiya muxitini aniqlang. Gidrolizni qanday qilib kuchaytirish mumkin.

3-Tajriba. Uchuvchan kislotalarni borat kislota yordamida tuzlardan ajratish. Probirkaga 1 g NaCl va 1 g $NiBO_3$ aralashtirib soling va probirkani shlativga maxkamlab qo'ying. Probirkani qizdiring. Xlorovodorod gazini ajralishini kuzating, uning aniqlash uchun probirkani og'ziga ammiak bilan xo'llangan shisha eg'ochni tutkazing.




4-Tajriba. Kislota va ishqor eritmalarining alyuminiyga ta'siri (murili shkafda bajaring). Uchta probirka olib ularning har biriga birozdan alyuminiy qirindisidan (yoki bulakchasidan) soling, sungra: 1-chi probirkaga 1-2 ml 30 % NaOH yoki KOH eritmasidan, 2-chi probirkaga suyultirilgan xlorid kislota eritmasidan va 3-chi probirkaga esa konsentrlangan nitrat kislota eritmasidan quyng. Ishqor va nitrat kislotasi quyilgan probirkalarni ozroq qizdiring. Nima kuzatiladi?

Reaksiya tenglamalarini yozib, Al ga ishqorni va xlorid hamda nitrat kislotalarning turlicha ta'siri asosida tegishli xulosalar qiling.

Nazorat savollari

Bor va alyuminiy atomi tuzilishini taqqoslab ularning umumiy va farq qiluvchi xossalari tushuntiring. $AlCl_3$ va $Na_2B_4O_7$ gidrolizining reaksiya tenglamalarini molekulyar va ion xolda yozing. Konsentrlangan nitrat va sul'fat kislotalari borgan qanday ta'sir etadi?

1. Quyidagi reaksiyalarning tenglamalarini tugallab yozing.



15.0. O'N TO'RTINCHI GRUPPA ELEMENTLARING UMUMIY TAVSIFI

15.1. Uglerod gruppasi



Tabiatda uchrashi

Oddiy modda sifatida	Element sifatida birikmalar tarkibida
• olmos	• barcha hayvon va o'simliklarning asosiy tarkibiy qismi
• grafit	• karbonat angidrid CO_2
	• karbonatlar
	• neft, tabiiy gazlar

Kimyoviy xossalari

Oksidlovchi sifatida	Past ifodalangan Oksidlovchi sifatida
$CaO + 3C = CO + CaC_2$	$C + O_2 = CO_2, t < 500^\circ C$ (yonish)
kalsiy karbid	$CO_2 + C = 2CO, t > 900^\circ C$
$4Al + 3C = Al_4C_3$	$C + H_2O = CO + H_2, t > 1200^\circ C$
Aluminiy karbid	$C + ZnO = Zn + CO, t > 1000^\circ C$
$2H_2 + C = CH_4$	$3C + 4HNO_3 = 3CO_2 + 4NO + 2H_2O$
Metan	

Allotropiyasi

- C atomlari sp^3 gibrirlanishga ega
- Qavatsimon struktura

- Atom kristall panjara
- Mallarang

Yuqori elektr o'tkazuvchanlikka ega

Karbin	- $C \equiv C - C \equiv C -$
Polikumulen	$=C=C=C=C=$
Fullerenlar	C_{30} va C_{80-100} – tashqi qavati uglerod atomlaridan iborat
Ko'mir	beshburchak yoki oltiburchakdan tashkil topgan futbolli to'pini eslatuvchi sharlar. 80 dan ortiq uglerod atomlarining 20 ta oltiburchak va 12 ta beshburchakdan iborat ikosaedr shaklida mavjud.

Uglerod birikmalari


Uglerod (II) oksidi CO (mog'or gazi) : $C \equiv O$: Uglerod va kislorod uch valentli	Uglerod (IV) oksidi (karbonat anhidrid) $O = C = O$
Fizik xossalari	
• Rangsiz gaz • Hidsiz • Suvda yonib eriydi • O'ta zaharli – qon gemoglobini bilan birikib, kislorod almashinishini to'sadi	• Rangsiz gaz • Xidsiz • Havodan og'ir • Suvda eriydi • Nafas olishda qabul qilinmadi • $t = -76^{\circ}C$ – quruq muz
Kimyoviy xossalari	
• tuz hosil qilmaydigan gaz • yaxshi qaytaruvchi $C^{+4}O + ZnO = Zn + C^{+4}O_2$ • ko'k rangli alanga berib yonadi	• kislotali oksid $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$ $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ $CO_2 + CaO = CaCO_3$ • oksidlovchi sifatida $CO_2 + C = 2CO$ $CO_2 + Mg = 2MgO + C$ (yuqori t)
• ammiak bilan karbamid (mochevina) hosil qiladi	• $CO_2 + 2NH_3 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$

Olinishi


• sanoatda
 $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$
 $\text{H}_2\text{O} + \text{C} \leftrightarrow \text{CO} + \text{H}_2$
 suv gazi yoki sintez gazi
 • laboratoriyada
 $\text{HCOOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{CO}\uparrow$

CH₃COOH
 4.9.10831


• sanoatda
 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{CaO}} \text{CO}_2$
 • laboratoriyada
 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$



Malon kislotasidan olinadi:



Qizdirilganda C_3 molekulasini hosil qiladi:



• kuchsiz
 • faqat eritmada mavjud bo'ladi
 • toza holda beqaror
 $\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
 • eritmada
 $\text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ (gidrokarbonat - ion)
 $\text{HCO}_3^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ (karbonat - ion)

Tuzlari

Karbonatlar


Na_2CO_3 – kalsiylangan soda
 K_2CO_3 – potash
 CaCO_3 – ohaktish, bo'r, marmar
 • ishqoriy metallar va NH_4^+ ioni karbonatlarigina suvda eruvchan
 • kuchli gidrolizlanadi
 • ishqoriy metallar karbonatlaridan tashqari barcha karbonatlar qizidirilganda parchalanadi
 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{CaO}} \text{CO}_2$

Gidrokarbonatlar

NaHCO_3 – ichimlik sodasi
 KHCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
 Suvda yaxshi eriydi (NaHCO_3 dan tashqari)
 $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\text{CaCO}_3} \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

CO_3^{2-} ga sifat reaksiyasi $2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	CO_2 ga sifat reaksiyasi CO_2 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 + \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ohakli suvni loyqalanishi, keyinchalik uning tiniqlashuvi
---	--

Ditsian (juda kuchli zahar) – $(\text{CN})_2$




Rodanid kislota – HSCN



Bu kislota Fe^{+3} ioniga sifat reaksiyani beradi:

15.2.Karbidlar



CaC_2 metallar karbidlari asetilnidlar deb ataladi.



B_4C – qora kristall, suv va kislotalarda erimaydi, issiq ishqorda parchalanadi, yarim o'tkazgich xususiyatli, charxlash xususiyati yaxshi.

VC – qora kristall, HNO_3 da parchalanadi. Po'latning qattiqligiga sabab bo'ladi.

WC – qattiq qotishmalar olishda legirovchi vosita sifatida ishlatiladi.

Mg_2C_3 – suvda parchalanib metilasetilen $\text{CH}_3 - \text{C}\equiv\text{CH}$ ni hosil qiladi.

Fe_3C - sementit .

Karbidlarni uch guruhga bo'lish mumkin

I. tuzsimon karbidlar	II. kovalent bog'li karbidlar	III. metallsimon karbidlar
- metanjdlar (Be_2C, Al_4C_3) - asetilenidlar (Cu_2C, Ag_2C_2, CaC_2, SrC_2, BeC_2, MgC_2, BaC_2, ZnC_2, CdC_2, HgC_2) - propinidlar (Al_2C_3, Ge_2C_6, Mg_3C_3)	- silitsidlar (SiC) - boridlar (B_{12}C_3, B_{12}C_2) bular juda qattiq, issiqqa chidamli	Cr_7C_3, Cr_3C_2, Mn_{12}C_6, Mn_7C_5 Juda qattiq, kislotalar ta'siriga chidamli, havoda $1000 - 1100^\circ\text{C}$ gacha chidamli

15.3.Kremniy Si

Allotropiyasi

Olmossimon tuzilish • metallarga xos yaltiroqlik • elektr o'tkazuvchanlik • inertlik	Amfoter kremniy • qo'ng'ir kukun • olmossimonga qaraganda oson reaksiyaga kirishadi
--	--

Tabiatda uchrashi

• yer yuzida tarqalishi bo'yicha ikkinchi o'rindagi element • faqat bog'langan holda, oksid ko'rinishida SiO_2 (qum, kvarts) va silikatlar holida uchraydi: $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ – dala shpati $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ – gil
--

Kimyoviy xossalari

Qaytaruvchi sifatida	Oksidlovchi sifatida
Yetarlicha inert $\text{Si} + 2\text{F}_2 = 2\text{SiF}_4$ $\text{Si} + \text{O}_2 = \text{SiO}_2$ $\text{Si} + \text{C} = \text{SiC}$ – kremniy karbid $\text{Si} + 2\text{CaO} = \text{SiO}_2 + 2\text{Ca}$ $\text{Si} + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\uparrow$	$\text{Si} + 2\text{Mg} = \text{Mg}_2\text{Si}$ – magniy silitsid (ko'pgina metallarda Si kimyoviy ta'sirsiz eriydi)

Olinishi

Sanoatda $\text{SiO}_2 + \text{C} = \text{CO}_2 + \text{Si}$	Laboratoriyada $3\text{SiO}_2 + 4\text{Al} = 3\text{Si} + 2\text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{SiCl}_4 + 2\text{Zn} = 2\text{ZnCl}_2 + \text{Si}$
---	---

Si birikmalari

Kremniy oksidi Si^{+4}O_2 (anorganik polimer)	 • Qattiq, qiyin suyuqlanuvchan modda • Kislotali oksid $\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{SiO}_2 + \text{CaO} = \text{CaSiO}_3$ $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow$ • Inert $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (shishaning buzilishi)
Kremniy kislotalari $n\text{SiO}_2 \cdot m\text{H}_2\text{O}$	H_2SiO_3 – metasilikat kislota; H_4SiO_4 – ortosilikat kislota; $n > 1$ – polisilikat kislota barchasi kuchisiz, beqaror $\text{H}_2\text{SiO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{SiO}_2 \downarrow$ Olinishi $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$ studensimon cho'kma
Silikatlar – silikat kislota tuzlar	• Hidrolizga uchraydi – ishqoriy muhit hosil qiladi • Na, K tuzlari – suvda erigan holda – suyuq shisha deyiladi. • Oddiy shisha – $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ soda (Na_2CO_3), • ohaktosh (CaCO_3) va oq qum (SiO_2) larni suyultirilib olinadi • $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{PbO} + \text{SiO}_2$ – xristal • Sement maydalangan gil va ohaktoshni kuydirib olinadi • Keramika tabiiy gildan shakl berish, quritish, kuydirish • usullari yordamida olinadi
Silanlar	$\text{Mg} \cdot \text{Si} + 4\text{HCl} \rightarrow 2\text{MgCl}_2 + \text{SiH}_4 \uparrow$ $\text{SiCl}_4 + \text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{SiH}_4 \uparrow + \text{AlCl}_3 + \text{LiCl}$ $\text{SiH}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{SiH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SiO}_2 + 4\text{H}_2$ $\text{SiO}_2 + 2\text{C} + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{SiCl}_4 + 2\text{CO}$

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba . K' omir yuzasidagi adsorbsiya.

Tahminan 0,5 g k'orgoshin nitrat kristallidan quruk probirkaga solib parchalanguncha qizdiring. Reaksiya tenglamasini yozing. Qizdirishni to'xtatgach, probirkaga bir necha k'omir b'olakhsidan soling. Probirkani probka bilan yopib, aralashtiring. Nima uchun azot (IV) oksidning qizgish-qungir rangga o'taboshlaydi? Kuzatilgan hodisani tushuntiring.

2-Tajriba . Uglerod (IV) oksidining olinishi va uning xossalari

a) Probirkaga suv quying, ustiga rang kirguncha lakmus tomizing, songra Kipp apparatida eritmaning rangi o'zgargunha karbonat angidrid gazini o'tkazing. So'ngra eritmani qaynating. Nima kuzatiladi? Tajribani tushuntiring.

b) Karbonat angidrid gazini kalsiy gidroksidini eritmasidan o'tkazing. Ajraladigan cho'kmaning tarkibi qanday? Eritma orqali CO_2 o'tkazishni davom ettiring. Nima kuzatiladi? Olingan tiniq eritmani ikkita probirkaga bo'ling. Bittasiga ohakli suv qo'shing, ikkinchisini qizdiring. Nima kuzatiladi? Tushuntiring.

3-Tajriba .Karbonatlarning parchlanishi

Uchta kuruq probirkaga taxminan 0,5-1 g qattiq ammoniy karbonat, natriy gidrokarbonat va mis gidroksokarbonat tuzlaridan olib qizdiring. Nima kuzatiladi? Tegishli reaksiyalarning tenglamalarini yozing.

4-Tajriba . Silikat kislotasining nisbiy kuchini aniqlash.

Uchta probirkaga natriy silikat eritmasidan 3ml dan quying. Birinchi probirkaga tomchilatib xlorid kislotasidan, uchinchisiga – cho'kma xosil b'olguncha Kipp apparatidan karbonat angidrid o'tkazing. Nima kuzatiladi.

Silikat kislotasining kuchi haqida xulosa chiqaring.

5-Tajriba . Natriy silikatning gidrolizi.

a) Probirkaga natriy silikat eritmasidan 2-3ml quying. Indikatorlar yordamida reaksiya muhitini aniqlang. Natriy silikat gidrolizining molekulyar va ionli reaksiya tenglamalarini yozing.

b) 3 ml natriy silikat eritmasiga 3 ml ammoniy xlorid eritmasidan q'oshing va cho'kma hosil bo'lishini kuzating. Hosil bo'lgan cho'kmaning

tarkibini aniqlang va sodir bo'lgan reaksiya tenglamasini yozing. Tajriba natijalarini izoxlang.



Nazorat savollari

Uglerod (II) va (IV) oksidlari laboratoriyada va sanoatda qanday olinadi?

1. Kremniyni nitrat kislota bilan plavik kislota aralashmasida va ishqorlarda eritish mumkin. Tegishli reaksiyalarning yenglamalarini yozing va tenglashtiring.

2. Toza qum va osh tuzidan qanday qilib eruvchan suyuq shisha hosil qilish mumkinligini reaksiya tenglamasini yozish bilan tushuntiring.

3. Quyidagi reaksiyalarni tugallangan va tenglashtiring



16.0. O'N BESHINCHI GRUPPA ELEMENTLARNING UMUMIY TAVSIFI

Tabiatda uchrashi

- Oddiy modda sifatida havo hajmining 78% ini tashkil etadi
- Element sifatida tuproqda, organik moddalarda (oqsillarda, nuklein kislotalarda va boshq.) mavjud bo'ladi

16.1. Azot N_2



Kimyoviy xossalari

Molekulasida mustahkam uchbog' mavjudligi sababli past reaksiyon aktivlikka ega	
• Metallar bilan	$\text{N}_2 + 3\text{BaBa}_3\text{N}_2$ (nitrid) (Li bilan qizdirishsiz)
• Kislorod bilan	

• Vodorod bilan	
-----------------	--

Fizik xossalari

• Rangsiz gaz • Ta'amsiz • Hidsiz • Suvda kam eriydi • $t_{\text{eriy}} = -196^{\circ}\text{C}$ • $t_{\text{qay}} = -210^{\circ}\text{C}$	
--	--


Olinishi

• sanoatda – suyuq havodan	• laboratoriyada $\text{NH}_4\text{NO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
----------------------------	---

Ishlatilishi

• ammiak, nitrat kislota ishlab chiqarishda • inert muhit hosil qilishda • mineral o'g'itlar ishlab chiqarishda	
---	--

Ammiak



Olinishi

• Sanoatda	• Laboratoriyada $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (kuchsiz qizdiriladi)
------------	--

Kimyoviy xossalari

Asos sifatida	
• Kislotalar bilan	$\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$
• Suvda eriydi	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
Qaytaruvchi sifatida	$4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 = \text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 = 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NH}_3 + 3\text{CuO} = 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $8\text{NH}_3 + 3\text{Br}_2 = \text{N}_2 + 6\text{NH}_4\text{Br}$

Fizik xossalari

- rangsiz gaz
- o'ziga xos hidli
- zaharli
- havodan yengil
- suvda juda yaxshi eriydi ($700 \text{ l NH}_3 - 1 \text{ l H}_2\text{O}$)
- oson siqiladi
- 10 %li erimasi – nashatil spirti (NH_4OH)

Ishlatilishi

Nirtat kislota, nitratlar, mochevina, soda, mineral kislotalar ishlab chiqarishda

Ammoniy tuzlari (NH_4^+ saqlaydi)

Kimyoviy xossalari

• Ishqorlar bilan	$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NH}_3\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (NH_3 uchun sifat reaksiyasi, nam lakmus qog'ozini ko'k tusga kiradi)
• Kislotalar bilan	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
• Tuzlar bilan	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$
• Qizdirilganda parchalanadi	$\text{NH}_4\text{Cl} \leftrightarrow \text{NH}_3\uparrow + \text{HCl}$ (agar kislota uchuvchan bo'lsa) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = \text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{HSO}_4$ (qisman, agar kislota uchuvchan bo'lmasa) $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$

Fizik xossalari

• Kristall moddalar	
• Suvda yaxshi eriydi	
• To'liq icha dissotsiyanadi	
Olinishi	
$\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$	
Ishlatilishi	
Mineral kislotalar	


Gidrazin (N_2H_4)

Olinishi



Azit kislota (HN₃)

Olinishi




Gidroksilamin (gidroksilamin) NH₂OH

Olinishi



Kimyoviy xossalari




Azot oksidlari

Azot (I) oksidi N ₂ O	• Rangsiz gaz • Shirin ta'mga ega • "kuldiruvchi" gaz • Suvda yaxshi eriydi • Tuz hosil qilmaydi • Qizdirilganda parchalanadi $2\text{N}_2\text{O} \rightarrow 2\text{N}_2 + \text{O}_2$ • Olinishi $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$ Kimyoviy xossalari: $2\text{NaNO}_2 + 4\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_4\text{N}_2\text{O}_2 (\text{giponitrit tuzi}) + 4\text{NaOH}$
Azot (II) oksidi	• Rangsiz gaz • Hidsiz • Suvda yomon eriydi • Qiyin siqiladi • Suv hosil qilmaydi • Oson oksidlanadi $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ • Qaytarilishi ham mumkin $2\text{NO} + 2\text{SO}_2 = 2\text{SO}_3 + \text{N}_2$ • Olinishi $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$

Azot (III) oksidi N_2O_3	• To'q – qizil suyuqlik • Kislotali oksid $N_2O_3 + 2KOH = 2KNO_2 + H_2O$ (nitrit) • Olinishi $NO_2 + NO = N_2O_3$ HNO_2 = nitrit kislota, N_2O_3 ga to'g'ri keladi, beqaror $2N_2O_3 \cdot H_2O + NO_2 + NO$ $3HNO_2 \rightarrow HNO_3 + 2NO + H_2O$ $2HNO_2 + O_2 \rightarrow 2HNO_3$ $2KJ + HNO_2 \rightarrow J_2 + 2NO + H_2O$
Azot (IV) oksidi NO_2	• Qo'ngir gaz, o'ziga xos hidli • Zaharli • Suvda yaxshi eriydi, suv bilan ta'sirlashadi $2NO_2 + H_2O = HN^+O_2 + HN^-O_2$ $4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$ (O_2 mo'l miqdor) • Ishqorlar bilan $2NO_2 + 2NaOH = NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O$ • Dimerlanadi $2NO_2 \xrightleftharpoons[+140^{\circ}C]{-11,2^{\circ}C} N_2O_4$ qo'ng'ir rangsiz gaz gaz • Olinishi $2NO + O_2 = 2NO_2$ $Cu + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ - Kimyoviy xossalari: $HNO_3 + NO_2 \rightarrow HNO_3 + NO$
Azot (V) oksidi	• Rangsiz, yaltiroq gaz • Beqaror $2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$ • Kislotali oksid $N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$ $N_2O_5 + 2NaOH = NaNO_3 + H_2O$ • Kuchli oksidlovchi • Olinishi $2HNO_3 + P_2O_5 = 2HPO_3 + N_2O_5$ • HNO_3 - nitrat kislota, N_2O_5 ga to'g'ri keladi

Nitrat kislota HNO_3



Fizik xossalari




• Rangsiz suyuqlik	• $t_{\text{er}} = 86^\circ\text{C}$
• uchuvchan, havoda "tutaydi"	• $t_{\text{q}} = -42^\circ\text{C}$
• suv bilan yaxshi aralashadi	

HNO_3 ning oksidlovchi xossasi

HNO_3 – metallar va metallmaslarni kuchli oksidlovchi		
Reagent	HNO_3 (kons.)	HNO_3 (suyuq)
Ishqoriy va ishqoriy yer metallar: Li, Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba	N_2O ajralib chiqadi	NH_3 hosil bo'ladi, HNO_3 mmol miqdorda NH_4NO_3 hosil bo'ladi
Aktiv va o'rtacha aktiv metallar: Mg, Zn, Ni, Co, Mn	NO ajralib chiqadi	N_2O , N_2 , NH_4NO_3
Passiv metallar: Sn, Pb, Cu, Bi, Hg, Ag	NO_2 ajralib chiqadi	NO
Fe, Cr, Al passivlashtiradi (sovuqda)	Qizdirilganda NO yoki NO_2 va metall oksidlari hosil bo'ladi	N_2O , N_2 , NH_4NO_3 Metal tuzlar hosil bo'ladi
Metallmaslar	NO_2	NO
Metallmaslar tegishli kislotalargacha oksidlanadi		

HNO_3 bilan boradigan reaksiyalarga misollar

Konsentrlangan HNO_3 bilan
$2\text{Fe}^0 + 6\text{HNO}_3 \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 6\text{NO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $2\text{Fe}^0 + 6 \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 6$ $2\text{N}^{+5} + 1 \rightarrow \text{N}^{+4} \quad 6$
$\text{Bi}^{3+} + 6\text{HNO}_3 = \text{Bi}^{5+}(\text{NO}_3)_3 + 3\text{N}^{+4}\text{O}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $\text{Bi}^{3+} + 3 \rightarrow \text{Bi}^{5+} + 1$ $\text{N}^{+5} + 1 \rightarrow \text{N}^{+4} \quad 3$
$\text{P}^0 + 5\text{HNO}_3 = \text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{P}^0 + 5 \rightarrow \text{P}^{+5} + 1$ $\text{N}^{+5} + 1 \rightarrow \text{N}^{+4} \quad 5$
Suyultirilgan HNO_3 bilan



Olinishi


- laboratoriyada
- $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{kons}) = \text{HNO}_3 + \text{NaHSO}_4$ (kuchsiz qizdirib)
- sanoatda 3 bosqichda
- 1) platina katalizatorligida NH_3 ni oksidlab
- $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 = 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
- 2) azot (II) oksidini oksidlab
- $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$
- 3) kislorod ishtirokida NO_2 ni suvga yuttirib
- $\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 = 4\text{HNO}_3$

Ishlatilishi

Mineral o'g'itlar, portlovchi moddalar, dorivor preparatlar, bo'yoqlar, plastmasalar, sun'iy tolalar ishlab chiqarishda ishlatiladi


Nitrat kislota tuzlari – nitratlar

suvda yaxshi eriydi
qizdirilganda parchalanadi




16.2.Fosfor

Fosfor, 1669 yil (Brand, Germaniya) alkimyoviy filosofik toshni izlash natijasida (siydikni haydashda qoladigan qoldiqdan aniqlagan) ochgan. Fosfor nomi yunoncha yorug'lik sochuvchi so'zidan olingan. A.Yu. Fersman fosforning ahamiyatini yuqori baholab, uni "*Hayot va tafakkur elementi*" deb atagan.




Olinishi



Ishlatilishi

Mineral o'g'itlar, portlovchi moddalar, dorivor preparatlar, bo'yoqlar, plastmaslar, sun'iy tolalar ishlab chiqarishda ishlatiladi
--

Nitrat kislota tuzlari – nitratlar



16.2.Fosfor

Fosfor, 1669 yil (Brand, Germaniya) alkimyoviy filosofik toshni izlash natijasida (siydikni haydashda qoladigan qoldiqdan aniqlagan) o'chgan. Fosfor nomi yunoncha yorug'lik sochuvchi so'zidan olingan. A.Yu. Fersman fosforning ahamiyatini yuqori baholab, uni "*Hayot va tafakkur elementi*" deb atagan.

Tabiatda

Birikmalar tarkibida

- fosforitlar $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$
- apatitlar $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaX}_2$, bu yerda $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}$
- oqsil moddolari

Olinishi



Kimyoviy xossalari

• kislorod bilan	$4\text{P} + 5\text{O}_2 = 2\text{P}_2\text{O}_5$ $4\text{P} + 3\text{O}_2 = 2\text{P}_2\text{O}_3$ (kislorod yetishmaganda)
• oltingugurt bilan	$2\text{P} + 3\text{S} = \text{P}_2\text{S}_3$
• galogenlar bilan	$2\text{P} + 5\text{Cl}_2 = 2\text{PCl}_5$ $2\text{P} + 3\text{Cl}_2 = 2\text{PCl}_3$ (xlor yetishmaganda) $\text{PCl}_5 + 4\text{H}_2\text{O} = 5\text{HCl} + \text{H}_3\text{PO}_4$ $\text{PCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl}$
• suv bilan	$4\text{P} + 16\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}_3\text{PO}_4 + 10\text{H}_2\uparrow$
• kislotalar bilan	$3\text{P} + 5\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{NO}$ $2\text{P} + 5\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
• ishqorlar bilan	$4\text{P} + 3\text{NaOH} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{PH}_3\uparrow + 3\text{NaH}_2\text{PO}_2$
• metallar bilan	$2\text{P} + 3\text{Ca} = \text{Ca}_3\text{P}_2$ $3\text{Li} + \text{P} = \text{Li}_3\text{P}$ $\text{Al} + \text{P} = \text{AlP}$
• gugurt qutisi yonboshiga surtilgan qizil fosfor, gugurt kallagidagi Bertoli tuzi bilan o'zina ishqalangandayoq reaksiyaga kirishadi:	$6\text{P} + 5\text{KClO}_3 \rightarrow 5\text{KCl} + 3\text{P}_2\text{O}_5$

Allotropiyasi

Tavsifi	Allotropik modifikatsiyalar		
	Oq fosfor	Qizil fosfor	Qora fosfor
Kristallik panjarasi	Molekulyar P_4	Atom	Atom
Rangi	Oq	Qizildan – binafshagacha	Mallarang – qora
Hidi	Sarimsoq piyoz	Yo'q	Yo'q
Qattiqligi	Tolasimon	Qattiq	Nisbatan yumshoq

t _{erit}	44°C	faqat bosim ostida suyuqlanadi, t>280°C da oq fosfor bug'lariga aylanadi	
Eruvchanlik	H ₂ O da kuchsiz, CS ₂ da yaxshi	Erimaydi	
Reaksiya qobiliyati	Yuqori	Past	O'rtacha
Lyuminosensiya	Yashilsimon yorqinlik	Yo'q	Yo'q

Ishtatilishi

- fosfor oksidlari, fosfat kislota ishlab chiqarishda
- gugurt ishlab chiqarishda
- qotishmalarda
- organik sintezda


!	Fosforning kislorodli birikmalari, azotning kislorodli birikmalariga nisbatan ancha barqaror Fosforning vodorodli birikmalari (PH ₃), azotning vodorodli birikmalariga nisbatan ancha beqaror
---	--

Fosforning vodorod va galogenlar bilan hosil qilgan birikmalari

Fosfin. Oddiy modda holida fosfor va vodorod bir-birlari bilan amalda birikmaydi. Fosforning vodorodli hosilalari bilvosita usulda olinadi.




PH₃ – fosfin, rangsiz kuchli zaharli, sasigan baliq hidli gaz.




Ushbu reaksiyada eng toza fosfin olinadi.


Bu moddani quyidagi disproporsiyalanish reaksiyasi asosida ham laboratoriyada olish mumkin:



Fosfin va fosfony tuzlari kuchli qaytaruvchilardir. Havoda fosfin fosfat kislota hosil qilib yonadi.



oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin va boshqalar qaytariladi.



Fosfidlarni suv bilan parchalanishida, PH₃–bilan bir qatorda oz miqdorda gidrazin tarkibiga o'xshash suyuq *difosfin* P₂H₄ hosil bo'ladi.

P_2H_4 – rangsiz suyuqlik, $t_f = 51,70S$ havoda o'z-o'zidan alanganadi va fosfinni ham alanganlantiradi. Kuchli qaytaruvchi. Biroq u asoslik xossasini namoyon qilmaydi, kislotalar bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Demak: $NH_3 - PH_3 - AsH_3 - SbH_3$ qatori bo'yicha


barqarorliklari kamayadi,
qaytaruvchi xossalari ortadi,
bog'ning zaifligi ortadi,
asoslik xossasi ortib boradi.

P⁺⁵ birikmalari

- nisbatan barqaror
- oksidlovchi xossalari namoyon qilmaydi

Fosfor (V) oksidi $P_2O_5 (P_4O_{10})$	Ortofosfat kislota H_3PO_4
kristallsimon modda	• oq qattiq modda
eng yaxshi qurituvchilardan biri	• suvda yaxshi eriydi
kislotali oksid	• o'rta kuchli kislota
$P_2O_5 + 3CaO = Ca_3(PO_4)_2$	• sanoatda olinishi
$P_2O_5 + 6NaOH = 2Na_3PO_4 + 3H_2O$	$Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 =$
suvda yaxshi eriydi	$= 2H_3PO_4 + 3CaSO_4 \downarrow$
$P_2O_5 + H_2O = 2HPO_3$	Tuzlari
Metofosfat kislota	Fosfatlar Na_3PO_4
$2HPO_3 + H_2O = H_4P_2O_7$	Gidrofosfatlar Na_2HPO_4
Difosfat kislota	Digidrofosfatlar NaH_2PO_4
$H_4P_2O_7 + H_2O = 2H_3PO_4$	$H_3PO_4 + 3NaOH =$
Ortofosfat kislota	$= Na_3PO_4 + 3H_2O$
Qizdiriganda	$H_3PO_4 + 2NaOH = Na_2HPO_4 + 2H_2O$
$P_2O_5 + 3H_2O \rightleftharpoons (H_2O)_2H_3PO_4$	$H_3PO_4 + NaOH = NaH_2PO_4 + H_2O$
Turli moddalar tarkibidan suvni tortib oladi	Yoki
$4HNO_3 + P_4O_{10} \rightarrow 4HPO_3 + 2N_2O_5$	$H_3PO_4 + NaOH = NaH_2PO_4 + H_2O$
$2H_2SO_4 + P_4O_{10} \rightarrow 4HPO_3 + 2SO_3$	$NaH_2PO_4 + NaOH = Na_2HPO_4 + H_2O$
	$NaHPO_4 + NaOH = Na_3PO_4 + H_2O$
	PO_4^{3-} ga sifat reaksiyasi
	$3Ag^+ + PO_4^{3-} = Ag_3PO_4 \downarrow$
	yaltiroq – sariq
	$2H_3PO_4 \rightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$


Gipofosfit kislota (H_3PO_2)



Bir asosli



Fosfit kislota (H_3PO_3)



Ikki asosli


Fosforli o'g'itlar

$Ca_3(PO_4)_2$	"fosforit uni"
$Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 = Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$	Oddiy superfosfat
$Ca_3(PO_4)_2 + 4H_3PO_4 = 3Ca(H_2PO_4)_2$	Qo'sh superfosfat
$Ca(OH)_2 + H_3PO_4 = CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	Presipitat
$2NH_3 + 2H_3PO_4 = NH_4H_2PO_4 + (NH_4)_2HPO_4$ + kaliy tuzlari - ammosfoska	ammosfos

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Bir xil og'irlik miqdorida olingan ammoniy xlorid va kalsiy gidroksidni chinni hovonchada yaxshilab aralashtiring. Probir-kaning 1/3 qismiga qadar aralashma soling va probirkani shisha nay o'rnatilgan probka bilan berkiting, shtativga o'rnatib (16.2.1-rasm). Aralashmani sekin qizdiring. Ajralib chiqayotgan gazni ehtiyotlik bilan hidlang. Shisha nay uchiga suv bilan ho'llangan qizil lakmus qog'ozni tuting. Bunda nima sodir bo'ladi? Shisha tayoqchani konsentrlangan xlorid kislotaga botirib olib, gaz chiqayotgan nay uchiga yaqinlashtiring. Nima kuzatiladi?

16.2.1.-rasm



2-tajriba. Fosfora nitrat kislolaning ta'siri. Probirkaga 0,1-0,2 g qizil fosfor soling va unga 3-5 ml HNO_3 qo'shing. Probirkani shtativga qiya xolda o'mating va kuchsiz qizdiring. Jarayonni borishini kuzating. Agar xamma fosfor reaksiyaga kirishib tamom boimasa yana nitrat kislota qo'shing, Gaz ajralishi butunlay tugagandan so'ng qizdirishni to'xtating. Reaksiya natijasida ortofosfat kislota va azot (II) oksid hosil bo'lishini hisobga olib reaksiya tenglamasini yozing.

3-tajriba. Fosfat kislota tuzlarining gidrolizi. Uchta probirka oling. Probirkalardan biriga natriy ortofosfat, ikkinchisiga natriy gidrofosfat va uchinchisiga natriy digidrofosfat tuzlari eritmalaridan quying. Uchala probirkaga universal indikator qog'ozini tushuring va muhitini aniqlang. Har bir tuzning gidroliz tenglamalarini molekulyar va ion ko'rinishida yozing va xulosa chiqaring.

Nazorat savollari

1. Nitrat kislolaning metallar va metalmaslar bilan o'zaro ta'siri reaksiyalariga misollar keltiring.
2. Sanoatda ammiakdan nitrat kislota olishda sodir bo'ladigan reaksiya tenglamalarini yozing.
3. Qizil fosfor bilan oq fosfor aralashmasi berilgan. Qizil fosfomi oq fosfordan qanday ajratish mumkin.
4. Quyidagi reaksiyalarni tugallang va tenglashtiring
 - a) $\text{N}_2\text{O} + \text{C} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{CO}_2 + \dots$
 - b) $\text{NO} + \text{P} \longrightarrow \text{N}_2 + \dots$
 - c) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{C} + \text{SiO}_2 \longrightarrow \text{P} + \text{CO} + \dots$

17.0.O'N OLTINCHI GRUPPA ELEMENTLARING UMUMIY TAVSIFI

17.1.Kislorodning ochilishi va xossalari

Kislorodni kashf qilinishi 3 ta buyuk olimlarining nomi bilan bog'lik. Kislorod birinchi marta erkin holda selitrani, aniqrog'i $Mg(NO_3)_2$ tuzini qizdirib 1770 yilda (ayrim manbalarda 1772 yil deb ko'rsatilgan) Shved kimyogari Sheyele olgan. 1774 yil ingliz olimi Pristli simob oksidi (HgO) va qo'rg'oshinli surikni (Pb_3O_4 - $2PbO$, PbO_2) parchalab olgan.

Ko'pgina moddalarning xavoda yonishi reaksiyasida kislorodning roli 1775 yil fransuz olimi Lavuazye tushuntirdi va xavoning tarkibini o'rganadi. Lavuazye o'z tekshirishlari bilan 1697 yil nemis olimi Shtal tomonidan yaratilgan *flogiston* nazariyasini asossiz ekanligini isbotladi. Erkin holda kislorod ikki atomli molekula (O_2) holida mavjud bo'ladi. Nisbiy molyar massasi $Mr(O_2) = 32$, Molyar massasi $M(O_2) = 32$ g/mol. Oksidlanish darajasi -2, -1, 0, +2, +4. Valentligi 2, 3, 4.

Tabiatda uchrashi

- Tabiatda eng ko'p tarqalgan element (yer po'stlog'ining 47%)
- Oddiy modda sifatida havoning 21% (hajmiy)ini tashkil etadi
- Element sifatida suv, tog' ma'danlari, mineral kislotalar, oqsillar, yog'lar va moylar, uglevodlar tarkibiga kiradi

Allotropiyasi

Kislorod ikki xil oddiy modda hosil qiladi: O_2 va O_3

Kislorod O_2 Kimyoviy xossalari

O_2 – kuchli oksidlovchi	
• Metallar bilan	$2Mg + O_2 = 2MgO$ (oksid) $2Na + O_2 = Na_2O_2$ (peroksid)
• Metallmaslar bilan	$S + O_2 = SO_2$ (oksid)
• Murakkab moddalar bilan	$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$


Fizik xossalari

- rangsiz gaz, ta'amsiz, hidsiz, havodan og'ir, suvda kam eriydi, normal atim bosimida -183°C da qaynaydi.

Olinishi

• Sanoatda: suyuq xavodan hamda suvni elektroliz qilib $2H_2O \xrightarrow{2H_2O} 2H_2 + O_2$ $2Na_2O_3 + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2 \uparrow$ $4K_2O_3 + 2CO_2 = 2K_2CO_3 + 3O_2 \uparrow$	• Laboratoriyada $2KMnO_4 \xrightarrow{K_2O_3} 2K_2O_3 + MnO_2 + O_2$ $2KClO_3 \xrightarrow{2KCl} 2KCl + 3O_2$ $2KNO_3 \xrightarrow{2KNO_3} 2KNO_3 + O_2$ $4MnO_2 \xrightarrow{2Mn_2O_3} 2Mn_2O_3 + O_2 \uparrow$ $4CrO_3 \xrightarrow{2Cr_2O_3} 2Cr_2O_3 + 3O_2 \uparrow$ $2HgO \xrightarrow{2Hg} 2Hg + O_2 \uparrow$
--	--

17.2.OZON O₃



Kimyoviy xossalari

• Ozonga sifat raksiyasi $O_3 + KJ + H_2O = \downarrow \xrightarrow{2(e^- + 2H^+)} 2KOH + O_2$ • Bo'yoqlarni rangsizlantiradi • UB – nurlarni qaytaradi • Mikroorganizmlarni o'ldiradi
--

Fizik xossalari

Xavoning yuqori qavatlarida uchraydi. Xarakterli hidli gaz, Elektr razryadi ta'sirida hosil bo'ladi, Beqaror modda, Kuchli oksidlovchi xususiyatga ega

Oltinugurt S



Allotropiya

• Plastik oltinugurt S ₈	• Monoklinik oltinugurt S ₈
• Rombik oltinugurt S ₈	Bug' holatda S ₈ , S ₆ , S ₄ , S ₂

Tabiatda uchrashi

Erkin holda – sariq rangli qattiq modda, suvda erimaydi, uglerod disulfidda CS₂, benzolda va boshqa organik erituvchilarda eriydi
Birikmalar tarkibida element sifatida:

• Sulfidlar ZnS – rux aldamasi FeS₂ – pirit Cu₂S – mis yaltirog'i	• Sulfatlar: Na₂SO₄ · 10H₂O – Glauber tuzi CaSO₄ · 2H₂O – gips MgSO₄ · 7H₂O – achchiq tuz (ingliz tuzi) CaSO₄ · 0.5H₂O – alabaster CaSO₄ · H₂O – o'lik gips
--	---

Olinishi

$2H_2S + O_2 = 2S + 2H_2O$ $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$ $FeS_2 = FeS + S$
--

Kimyoviy xossalari

Oksidlovchi sifatida	Qaytaruvchi sifatida
$S^0 + Fe = FeS^{-2}$ $S^0 + H_2 = H_2S^{-2}$ Disproporsiyalanish reaksiyasi $S^0 + MeOH \xrightarrow{\text{sur'ulanmasi}} Me_2S^{+4}O_3 + Me_2S^{-2}$ $+ H_2O$ $2S + C \rightarrow CS_2$ $3S + 2P \rightarrow P_2S_3$	$S^0 + O_2 = S^{+4}O_2$ $S^0 + 2Cl_2 = S^{+4}Cl_4$ $S + Cl_2 \rightarrow SCl_2$ $S^0 + 2HNO_3 \xrightarrow{\text{ikona}} H_2S^{+4}O_4 + 2NO$

Birikmalar: Vodorod sulfid H₂S



Tabiatda uchrashi

• Organik moddalarning chirish mahsuloti, Vulqon gazlarida, Mineral madanli suvlar tarkibida
--

Kimyoviy xossalari

H_2S^{-2} – qaytaruvchi, S^0 gacha qaytariladi, ba'zida oksidlovchining kuchiga va miqdoriga qarab S^{+4} , S^{+6} gacha qaytariladi.	$2H_2S + 3O_2 = 2SO_3 + 2H_2O$ (mol miqdor O_2) $2H_2S + O_2 = 2S + 2H_2O$ (kam miqdor O_2)
• Galogenlar bilan	$H_2S + Cl_2 = S + 2HCl$

• Nitrat kislota bilan	$\text{H}_2\text{S} + 2\text{HNO}_3 = \text{S} + \text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $3\text{H}_2\text{S} + 2\text{HNO}_3 = 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{H}_2\text{S} + 2\text{HNO}_3 = \text{SO}_2 + 2\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$
------------------------	--

Fizik xossalari

• Rangsiz gaz, palag'da tuxum hidli • Xavodan ozgina og'ir • Suvda sulfid kislota hosil qilib eriydi • past t_{qay} va t_{er} • zaharli, ko'p miqdori o'limga olib keladi.
--




Olinishi

$\text{FeS} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$ $\text{H}_2 + \text{S} = \text{H}_2\text{S}\uparrow$
--

Sulfid kislota H_2S – kuchsiz kisota

$\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$ $\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$ Tuzlari	Sulfidlar Na_2S Gidrosulfid NaHS S^{2-} uchun sifat reaksiya $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS}\downarrow$ qora
---	---

Polisulfidlar



S^{4+} birikmalari. Oltinugurt (IV) oksidi



Olinishi

Sanoatda $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2 \uparrow$ $\text{S} + \text{O}_2 = \text{SO}_2 \uparrow$	Laboratoriyada $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 =$ $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{konst}) =$ $\text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{NaHSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
---	---

Kimyoviy xossalari

SO_2 – kislotali oksid 1 hajm suvda 40 hajm SO_2 eriydi	$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$ $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_3$
SO_2 – oksidlovchi	$\text{S}^{+4}\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S}^0 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{SO}_2\text{Cl}_2$
SO_2 – qaytaruvchi	$2\text{S}^{+4}\text{O}_2 + \text{O}_2 = 2\text{S}^{+6}\text{O}_3$ $\text{S}^{+4}\text{O}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{S}^{+6}\text{O}_4$ $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4$
SO_2 disproporsionallanish reaksiyasida	$4\text{S}^{+4}\text{O}_2 + 8\text{NaOH} =$ $= 3\text{Na}_2\text{S}^{+6}\text{O}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

Fizik xossalari

- Yongan gugurt hidini eslatuvchi zaharli, rangsiz gaz - Suvda yaxshi eriydi $t < 10^\circ\text{C}$ da suyuq holatga o'tadi $t < 73^\circ\text{C}$ da qattiq holatga o'tadi - zaharli

Sulfit kislota H_2SO_3

$\begin{array}{c} \text{H}-\text{O} \\ \diagdown \\ \text{S}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{H}-\text{O} \end{array}$ faqat eritmada mavjud: $\text{H}_2\text{SO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_3^-$ $\text{HSO}_3^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{SO}_3^{2-}$ Tuzlari (erkin holda uchraydi)
--



$\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$ – sulfitli eritma (suvdagi). Yog'och tolalati va qog'oz massaga shu eritma bilan ishlov beriladi.

S⁶⁺ birikmalari. Oltinugurt (VI) oksidi SO_3



Kimyoviy xossalari

SO_3 – kuchli oksidlovchi	
SO_3 – kislotali oksid	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$ $\text{SO}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{SO}_3 + \text{Na}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_4$


Fizik xossalari

Rangsiz gaz $t_{\text{su}} = 45^\circ\text{C}$ $t < 17^\circ\text{C}$ da kristallsimon moddaga aylanadi. Polimerlanadi. U namlikni shiddat bilan yutib, sulfat kislota hosil qiladi.
--


Olinishi

$\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{V}_2\text{O}_5} \text{SO}_3$	$\text{SO}_2 + \text{NO}_2 = \text{SO}_3 + \text{NO}$
--	--

Sulfat kislota



kuporos moyi

Kimyoviy xossalari	
• H_2SO_4 eritmasi umumiy kislotalik xossasini namoyon qiladi	
Konsentrlangan H_2SO_4 – kuchli oksidlovchi	 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Zn} = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$ $5\text{H}_2\text{SO}_4 + 4\text{Zn} = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}\uparrow$ $7\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{Zn} = 5\text{ZnSO}_4 + \text{S} + 7\text{H}_2\text{O}$ $2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Cu} = \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}\uparrow$ Quyidagi metallarning aktivligini pasaytiradi (sovuqda) Pt, Au, Al, Fe, Cr.
	Konsentrlangan H_2SO_4 shakami ko'mirlaydi (qoraytiradi) $\text{nC}_{(2)}\text{H}_{(3)}\text{O}_{(1)} + \text{H}_2\text{SO}_4 = 12\text{nC} + \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 11\text{nH}_2\text{O}$ $\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
	Uchuvchan bo'lmagan kuchli H_2SO_4 quruq tuzlardan boshqa kislotalarni siqib chiqaradi: $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3$
Su ultirilgan	Konsentrlangan
K, Ba, Ca, Na, Mg bilan tuz + H_2 hosil qiladi Al, Fe, Cr bilan tuz + H_2 hosil qiladi Zn, Sn bilan tuz + H_2 Cu, Hg, Ag bilan reaksiyaga kirishmaydi	K, Ba, Ca, Na, Mg bilan tuz + H_2S + H_2O hosil qiladi Al, Fe, Cr metallari passivlashadi Zn, Sn bilan tuz + H_2 hosil qiladi Cu, Hg, Ag bilan tuz + SO_3 + H_2O hosil qiladi
Olinishi	
• SO_2 olinishi	$4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$
• SO_2 ning SO_3 gacha oksidlanishi	$\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightleftharpoons{\text{kat}} \text{SO}_3$
• SO_3 yutilishi, kislota hosil bo'lishi	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$

Fizik xossalari	
• Rangsiz moysimon modda • Kuchli kislota	
<i>Tuzlari</i> ↙ ↘ Na_2SO_4 NaHSO_4 <i>sulfatlari gidrosulfatlari</i>	
SO_4^{2-} ga sifat reaksiyasi $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$ (oq chokma, hatto kislota ham erimaydi) Ishqoriy yer metallarida sulfatlarning eruvchanligi yuqoridan pastga tushgan sari pasayadi. Kristallogidrat hosil qilishi ham yo'qolib boradi	

Sulfat kislolaning quyidagi tuzlari katta ahamiyatga ega:

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ – glauber tuzi	Bu nom shifokor va kimyogar Glauber sharafiga qo'yilgan, Glauber osh tuziga sulfat kislota ta'sir ettirib, jahonda birinchi bu tuzni hosil qilgan va dori sifatida ishlatgan edi.
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – taxir tuz	Surgi sifatida ishlatiladi
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – mis kuporosi	O'simlik zararkunandalariga qarshi kurashda, turli bo'yoqlar tayyorlashda ishlatiladi
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – temir kuporosi	To'q – yashil rangli kristall, o'simlik zararkunandalariga qarshi kurashda, turli bo'yoqlar tayyorlashda ishlatiladi

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-Tajriba. Oltingugurtning qaytaruvchi va oksidlovchi xossalari.

Probirkaga 2-3 ml konsentralangan nitrat kislota eritmasidan quyib unga ozroq oltingugurt kukunidan soling va aralashmani qaynaguncha oxista qizdiring. So'ngra yana 2-3 min qaynating. Bunda qanday gaz ajralib chiqishini qayd qiling. Suyuqlikni sovuting va ustki qavatidagi tiniq eritmani boshqa probirkaga quyib unga 4-5 tomchi 2 n bariy xlorid eritmasidan tomizing. Nima kuzatiladi? Oltingugurtning nitrat

kislotada oksidlanish va unda hosil bo'lgan moddaning bariy xlorid bilan o'zaro ta'sirlanish reaksiya tenglamalarini yozing.

1 g oltingugurt kukunini 2 g rux yoki alyuminiy kukuni bilan aralashtiring va uni bir bo'lak asbest ustiga to'king. Mo'rili shkak tagida aralashmani yonib turgan cho'p orqali extiyotlik bilan yondiring va bunda oq tusli rux (yoki alyuminiy) sulfid kukuni hosil bo'lishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing. **Tajriba 2. Metal sulfidlarini cho'ktirish.** Alohida probirkalarga bariy, ikki valentli temir, qo'rg'oshin, marganets, kadmiy, simob, mis va uch valentli summa tuzlarining 0,1 n eritmalaridan 2-3 ml dan quyding. Hamma probirkalarga 2-3 ml ammoniy sulfid (NH_4)₂S eritmasidan qo'shing. Probirkalardagi eritmalaridan qaysilarida cho'kma hosil bo'ladi. Ularning rangiga e'tibor bering. Reaksiya tenglamalarini molekulyar va ionli ko'rinishida yozing. Cho'kma hosil bo'lgan probirkalarga 2 n xlorid eritmasidan qo'shing. Suyultirilgan xlorid kislotada eriydigan va erimaydigan cho'kmalarni kuzating. Bu sulfidlarni eruvchanlik ko'paytmasi qiymatlaridan foydalanib, kuzatilgan xodisalarga izox bering. Reaksiya tenglamalarini molekulyar va ionli ko'rinishida yozing.

2-Tajriba. Oltingugurt (IV) oksidining olinishi. Probirkaga taxminan 1 g natriy sulfit (Na_2SO_3) tuzi kristallidan soling va unga 5-7 ml suyultirilgan xlorid kislotasi eritmasidan quyding. Probirkaga og'zini gaz o'tkazuvchi nay o'rnatilgan probirkaga bilan berkiting va ajralib chiqayotgan gazni bir necha tomchi neytral lakmus eritmasi bilan distillangan suv quyilgan probirkaga yuboring. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing. Hosil qilingan sulfit kislotasi eritmasini keyingi tajriba uchun olib qo'ying.

3-Tajriba. Sulfit kislotasi tuzlarining qaytaruvchi xossalari. Probirkaga 2-3 ml natriy sulfit (Na_2SO_3) tuz eritmasidan va 1-2 tomchi sulfat kislotasi eritmasidan quyding. Probirkaga 1-2 ml kaliy bixromat eritmasidan qo'shing. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing va oksidlovchi bilan qaytaruvchini ko'rsating.

4-Tajriba. Natriy tiosulfatning qaytaruvchi xossalari. Probirkaga 2-3 ml natriy tiosulfat va 1 ml kraxmal eritmasidan quyding, so'ngra yodning rangi yo'qolguncha tomchilatib yod eritmasidan qo'shing.

Reaksiya tenglamasini yozing. Probirkaga 1-2 ml xlorli suv quyning va unga to xlorning hidi ketguncha tomchilatib natriy tiosulfat eritmasidan qo'shing. Eritmada sulfat ioni borligini isbotlang reaksiya tenglamasini yozing.




Nazorat savollari

Okksidlanisli darajasi -2, +4 va +6 ga teng bo'lgan oltingugurt atomlarining elektron formulalarini yozing.

1. Uch xil usul bilan oltingugurt(IV) oksid hosil qilish reaksiyalarining tenglamalarini yozing.

2. Erkin oltingugurtni oksidlovchi, qaytaruvchi xossalari namoyon qiladigan reaksiyalarga misollar keltiring.

3. Quyidagi reaksiyalarni tugallang va tenglashtiring



18.0.O'N YETTINCHI GRUPPA ELEMNTLARNING UMUMIY TAVSIFI

18.1.Vodorod va galogenlar tavsifi

Ochilishi. Vodorodni birinchi marta 1766 yilda (Kavendish, Angliya) olgan. Kimyoviy elementlar hisobiga 1783 yilda kiritilgan (Lavuaize, Fransiya) va unga «gidrogenium» ya'ni «suv tug'diruvchi» degan nom berilgan.

^1_1H -protiy (belgisi-H) 99,985%;

^2_1H - deyteriy (belgisi-D). og'ir vodorod-0.015%;

^3_1H -tretiy (belgisi-T), o'ta og'ir vodorod.



Uning yerdagi miqdori $\approx 2\text{kg}$

proton elementar zarracha	H^+ ishqoriy metallar kabi	H^- galogenlar kabi
------------------------------	--	------------------------------------


Shuning uchun vodorod ham birinchi ham yettinchi guruhlariga joylashtirilgan.

Olinishi




Suv bug'ini katalitik qaytarib




Metan krekingsi





suv, kislota, ishqorlarni Si va metallar bilan qaytarib



reduktivlik (shu bilan natijasi)



taqsim gird oksidlanish (II) natijasi




• elektroliz yo'li bilan


Suvli eritmalarini elektrolizi



Magniy, rux va temir kabi metallar-
ni suv ishtirokida qizdirib olinadi.



Bu usulga temir- bug' usuli deyiladi.



Fizik xossalari

- Eng yengil gaz (yerdagi eng yengil modda vodoroddir)
- Rangsiz
- Hidsiz
- Suvda yomon eriydi. bir qancha metallarda yaxshi eriydi (Pt, Pd)
- $t_{\text{qay}} = -252,8^\circ\text{C}$

Kimyoviy xossalari

Qaytaruvchi sifatida $\text{H}_2 - 2 = 2\text{H}^-$	Oksidlovchi sifatida $\text{H}_2 + 2 = 2\text{H}^+$
• Metallmaslar bilan $\text{H}_2 \xrightarrow{+\text{O}_2} \text{H}_2\text{O}$ $\xrightarrow{+\text{F}_2} \text{H}_2\text{F} \text{ (t.o.na da portlash bilan)}$ $\xrightarrow{+\text{Cl}_2} \text{HCl} \text{ (yoritilgand; portlash bilan)}$ $\xrightarrow{+\text{Br}_2} \text{HBr}$ $\xrightarrow{+\text{J}_2} \text{HJ} \longrightarrow$ $\xrightarrow{+\text{N}_2} \text{NH}_3$ $\xrightarrow{\text{Fe, } 500^\circ\text{C, } 200\text{atm}} \text{H}_2\text{S}$ • Organik kimyodagi qo'shbog'ga birikish reaksiyasi $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pt, } 200^\circ\text{C}} \text{C}_2\text{H}_6$ • Bir qancha metallar oksidlarini qaytarish $\text{CuO} + \text{H}_2 = \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	• Ishqoriy va ishqoriy yer metallarining gidridlarini olishda $\text{H}_2 + 2\text{Na} = 2\text{NaH}$ $\text{H}_2 + \text{Ca} = \text{CaH}_2$ Metall gidridlari kuchli qaytaruvchilardir: $\text{NaH} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{H}_2$

Ishlatilishi

- HCl , NH_3 sintezida
- Bir qancha rangli metallarni qaytarishda
- Organik sintezda

Suv H_2O



Molekularlar orasida molekulararo vodorod bog'lanish mavjud. Atomlar orasidagi bog' qutbli kovalent bog'lanish bo'lib, markaziy atom (kislorod) sp^3 gibridlangan. $\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$
Kuchsiz elektrolit
 $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 7$

Fizik xossalari

- $t_{\text{qay}} = 100^\circ\text{C}$
- $t_{\text{er}} = 0^\circ\text{C}$
- Rangsiz, tamsiz modda
- Yuqori issiqlik sig'imi va erish issiqligiga ega (muz)
- Ko'p moddalarni eritadi

Kimyoviy xossalari

• aktiv metallar	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
• nisbatan passiv metallar bilan	$\text{Zn} + \text{H}_2\text{OZnO} + \text{H}_2\uparrow$
• metallmaslar bilan	$\text{C} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2 + \text{CO}$ (suv bug'i) $\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 = \text{HClO} + \text{HCl}$ $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{F}_2 = 4\text{HF} + \text{O}_2 + \text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 \dots$
• oksidlar bilan asosli kislotali	$\text{H}_2\text{O} + \text{CaO} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3 = \text{H}_2\text{SO}_4$
• tuzlar bilan gidroliz kristallogidrat hosil bo'lishi	(“Gidroliz” bo'limiga qarang) $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O} = \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
• aktiv metallar gidridlari bilan	$\text{NaH} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
• organik moddalar bilan	Gidratatsiya reaksiyasi
Gidroliz reaksiyasi $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{I}} \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH} + \text{CH}_3\text{OH}$	
$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\text{I}]{\text{kat}} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$	

Vodorod peroksid H_2O_2



Xossalari

Qaytaruvchi sifatida	Oksidlovchi sifatida
$H_2O_2 - 2 \rightarrow O_2^0 + 2H^+$	$H_2O_2 + 2H^+ + 2 \rightarrow H_2O^{2-}$

Olinishi

Laboratoriyada	Sanoatda
$Na_2O_3 + 2H_2O = 2NaOH + H_2O_2$ $BaO_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + H_2O_2$	$H_2SO_4 + H_2 + H_2S_2O_8$ $H_2S_2O_8 + H_2O \rightarrow 2H_2SO_4 + H_2O_2$

Ishlatilishi

- Oqartirishda;
- Tibbiyot va farmosevtikada;
- Polimerlanish reaksiyasini inisirlash (boshlash)da;
- Reaktiv texnikada va boshqa sohalarda


Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Metallarga kislotalar ta'siridan vodorod olish.

Probirkaga bir nechta rux bo'lakchasi solinadi va probirkaning 1/3 qismiga suyultirilgan sulfat kislota qo'shiladi. O'rtasidan nay o'tgan rezina probirkani shtativga perpendikulyar qo'yiladi. Gaz chiqishini kuzating. Ajralib chiqayotgan vodorod xavo bilan aralashmaganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun gaz chiqayotgan naychaga to'ntirilgan probirka kiygizing. 0,5 minutdan keyin oling va probirkani aylantirmasdan garelka alangasiga tuting. Agar probirkada toza vodorod bo'lsa u oxista yonadi. Agar probirkada vodorod bilan xavo aralashgan bo'lsa kichik portlash tovush bilan sodir bo'ladi. Bunday holatda gazning tozaligini tekshirish uchun toza probirka olib ishni takrorlang.

Asboddan toza vodorod chiqayotganligiga ishonch hosil qilgandan keyin uni yoqib tekshirib ko'rish mumkin. Yonib turgan vodorod ustida quruq probirkani tutib turib qanday modda hosil bo'layotganligini tekshirib ko'ring. Vodorodning olinishi va yonishi reaksiyalarini yozing.

18.1.rasm.CuO ni vodorod yordamida qaytarishi.



Birinchi tajribadagi asbobga Al (alyuminiy) kukunidan ozroq solib uning ustiga 2-3 ml NaOH ishqor eritmasidan qo`shing. Gaz chiqishini kuzating. Agar reaksiya sekin ketsa asta qizdiring. Probirkadagi xavo chiqib ketgandan so`ng shisha nay o`tkazib yoqing. Reaksiya tenglamasini yozing.

Asbob: Kipp apparati. kuruk probirka, shtativ qisqichga o`rnatilgan probirkaga CuO solinadigan va shtativga o`rnatiladi, gorizantal holda. Kipp aparatidan chiqqan vodorod tozaligi tekshirib ko`riladi. Vodorodning tozaligiga ishonch hosil qilingandan so`ng Kipp aparating gaz chiqayotgan nayi probirkaga o`rnatiladi. Vodorod gazi CuO ga dastlab xona temperaturasida, keyin CuO qizdirib o`tkaziladi. (18.1-rasm)

CuO bilan bo`ladigan o`zgarishlarni va probirka devorlarida suv tomchilarini hosil bo`lishini kuzating. Hamma CuO reaksiyaga kirishgandan keyin reaksiya to`xtatiladi. Kuzatilgan o`zgarishlarni tushuntiring va reaksiya tenglamalarini yozing.

18.2.Galogenlar va ularning birikmalari

Galogenlar oilasiga F, Cl, Br, J, At kiradi. Galogenlarning har birining tashqi qavatida 7 tadan valent elektroni mavjud (ns^2np^5). Turg'un o'ctet qavat hosil qilish uchun bitta electron biriktirib E⁻ holiga o'tish oson. Ularning maksimal valentligi VII gat eng (flordan tashqari).

Oddiy moddalar: kimyoviy xossalari rining susayishi	F_2	} Suyuq	• Ikki atomli molekularlar • Tipik metallmaslar • Qutbsiz kovalent bog'lanishga ega • Har biri o'zidan keyin kelgan galogenni kislota va tuzlari eritmalaridan siqib chiqaradi
	Cl_2		
	Br_2	qattiq	
	I_2	gaz	

Ftor

A. Muassan ftorni flyuorit CaF_2 , dan ajratib olgan.

Tabiatda uchrashi

CaF_2 – flyurit, $Na_3[AlF_6]$ – kriolit, $2Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$ – fluorapatit

O.D.

(-1)	F^- - xlorid – ion
(0)	F_2

Olinishi

Sanoatda $3HF \leftrightarrow H_3F^+ + HF^-$ katodda: $2H_3F^+ + 2e^- = 2HF + H_2 \uparrow$ anodda: $2HG_2^- - 2e^- = 2HF + F_2 \uparrow$	• Laboratoriyada -/-
--	--

Kimyoviy xossalari

Ftor qolgan galogenlarni va kislorodni birikmalaridan siqib chiqaradi:	$2H_2O + F_2 = HF + O_2$
Metallmaslarni oxirgi oksidlanish darajasigacha oksidlaydi:	$S + 3F_2 \rightarrow SF_6$ $P + 5F_2 \rightarrow 2PF_5$ $C_{grafit} + 2F_2 \xrightarrow{yugorilish} CF_4$ $J_2 + 7F_2 \rightarrow 2JF_7$ $N_2 + F_2 \rightarrow \text{reaksiya bormaydi}$
Metallar bilan oddiy sharoitda (Cu, Mg va Ni kabilar ftoridlari metall yuza qatlamini qoplaydi va chuqur oksidlanishdan saqlaydi) reaksiyaga kirishadi:	$2Li + F_2 \rightarrow 2LiF$ $Ca + F_2 \rightarrow CaF_2$ $Al + 3F_2 \rightarrow 2AlF_3$ $Sn + 2F_2 \rightarrow SnF_4$

Fizik xossalari

Erkin holdagi flor ikki atomli, rangsiz, o'tkir hidli gaz

Ftorid kislota

Olinishi

H ₂ bilan F ₂ qorong'uda va - 200° C portlash bilan sodir bo'ladi:	$H_2 + F_2 \rightarrow 2HF$
Uni tabiiy birikmasidan osongina olish qulay:	$CaF_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2HF \uparrow$

Kimyoviy xossalari

HF shishani eritadi	$SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 \uparrow + 2H_2O$
---------------------	--

Savdoda 40% li eritmasi ishlatiladi

Forning kislorodli birikmalari

$HO\dot{F}$ – gipoflorid kislota OF_2 – kislorod ftorid F_2O_2 – vodorod peroksidga o'xshash ($F - O \equiv O - F$, O – to'rt valentli) F_2O_3 – ozonftorid F_2O_4 – oksozonftorid

Xlor

Xlor-1774- yil, K.Sheyele olgan

Tabiatda uchrashi

Birikmalar holida $NaCl$ – tosh tuzi, galit minerali $NaCl \cdot KCl$ – silvinit $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ – magniy xlorid geksohidrati (bishofit) $KCl \cdot MgCl_2 \cdot H_2O$ – kriolit KCl – silvin $KCl \cdot MgSO_4 \cdot 3H_2O$ – kainit

(-1)	Cl ⁻ - xlorid – ion
(+1)	ClO ⁻ - gipoxlorit – ion
(+3)	ClO ₂ – xlorit – ion
(+5)	ClO ₃ – xlorat – ion
(+7)	ClO ₄ – perxlorat – ion

Olinishi

sanoatda – ishqoriy metallar xloridlaning suvli eritmalarni elektroliz qilib $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{elektroliz}} \text{H}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{NaOH}$	laboratoriyada $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} = \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 \uparrow$ $\text{PbO}_2 + 4\text{HCl} = \text{PbCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 14\text{HCl} = 2\text{KCl} + 2\text{CrCl}_3 + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 7\text{H}_2\text{O}$ $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$ $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} = 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
---	--

Ishlatilishi

- suvni dezinfektsiyalovchi vosita sifatida - matova qog'ozni oqartiruvchi sifatida - vodorod xlorid, xlorid kislotasi, polivinilxlorid, xlorli ohak olishda - portlovchi moddalar olishda

Kimyoviy xossalari

Metallar bilan	$2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$
Vodorod bilan	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{HCl}$
Metallmaslar bilan	$2\text{P} + 3\text{Cl}_2 = 2\text{PCl}_3$
Ishqor eritmalari bilan	$\text{Cl}_2 + 2\text{KOH} \xrightarrow{\text{suv}} \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$ Laborat suvi $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \xrightarrow{\text{suv}} \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ Javel suvi $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ Xlorli ohak $3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\text{t}} \text{KClO}_3 + 5\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ $3\text{Cl}_2 + 6\text{KOHKClO}_3 + 5\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$
Suv bilan ikki xil kislotasi hosil qiladi	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HCl} + \text{HClO}$
Br, va J, ni siqib chiqarishi	$\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} = 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$
Organik moddalar bilan	$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{ClCOOH} + \text{HCl}$ $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ $4\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 = \text{N}_2 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{PH}_3 + 3\text{Cl}_2 = \text{PCl}_3 + 3\text{HCl}$ $\text{P}_2\text{H}_4 + 5\text{Cl}_2 = 2\text{PCl}_3 + 4\text{HCl}$ $2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{S}_2\text{Cl}_2$

	$2\text{Sb} + 3\text{Cl}_2 = 2\text{SbCl}_3$ $2\text{Sb} + 5\text{Cl}_2 = 2\text{SbCl}_5$ $3\text{Cl}_2 + 2\text{Fe} = 2\text{FeCl}_3$ $2\text{Cu} + \text{Cl}_2 = 2\text{CuCl}$
	$2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{Cl}_2 = 2\text{KMnO}_4 + 2\text{KCl}$

Fizik xossalari

- Sarg'ish — yashil gaz
- Bo'g'uvchan hidga ega
- Yonmaydi
- havodan 2,5 marta og'ir
- suvdagi eritmasi — xlorli suv deyiladi.
- 1 hajm suvda 3 hajm eriydi ($\text{Cl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kristallogidrat hosil qiladi)

Xlorid kislota

HF-HCl-HBr-HI

Qatorida termik barqarorlik kamayadi;
bog' uzunligi ortadi, bog'ning qutbliligi kamayadi;
kislotalik xossasi ortadi.

Olinishi

Sanoatda	Laboratoriyada
$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 4\text{HClO} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHSO}_4 + 4\text{HCl}$ $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NH}_4\text{HSO}_4 + \text{HCl}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 4\text{Cl}_2 + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHSO}_4 + 8\text{HCl}$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = 2\text{HCl} + \text{BaSO}_4$

Kimyoviy xossalari

• metallar bilan (H gacha)	$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
• asosli, amfoter oksidlar bilan	$\text{ZnO} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
• asoslar bilan	$\text{Zn(OH)}_2 + \text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
• tuzlar bilan	$\text{AgNO}_3 + \text{HCl} = \text{AgCl}\downarrow + \text{HNO}_3$ Oq cho'kma !Cl ⁻ uchun sifat reaksiyasi
• ammiak bilan	$\text{NH}_3 + \text{HCl} \leftrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$ (oq tutun)

• "shox arog'i" (3 mol HCl va 1 mol HNO ₃) Au va Pt ni eritadi	$Au + 3HCl + HNO_3 = AuCl_3 + NO + H_2O$ $3Pt + 18HCl + 4HNO_3 = 3H_2[PtCl_6] + 4NO + 8H_2O$
• Metall oksidlari:	$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$ $ZnO + 2HCl = ZnCl_2 + H_2O$ $CuO + 2HCl = CuCl_2 + H_2O$ $FeO + 2HCl = FeCl_2 + H_2O$
• Asoslar (ishqorlar):	$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$ $Ca(OH)_2 + 2HCl = CaCl_2 + 2H_2O$ $Al(OH)_3 + 3HCl = AlCl_3 + 3H_2O$ $Fe(OH)_3 + 3HCl = FeCl_3 + 3H_2O$
• Tuzlar:	$CH_3COONH_4 + HCl = NH_4Cl + CH_3COOH$ $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 \uparrow + H_2O$ $AgNO_3 + HCl = AgCl \downarrow + HNO_3$ $PbCO_3 + 2HCl = PbCl_2 \downarrow + H_2O + CO_2 \uparrow$

Fizik xossalari

Rangsiz suyuqlik
Nam havoda "tutaydi"
Vodorod xloridning suvdagi eritmasi xlorid kislotadir.

Xlorning kislorodli birikmalari

Xlor (I) oksidi

Bu oksid qo'ng'ir – sarg'ish tusli gaz, xlor xidini eslatadi, portlovchi xususiyatga ega.

Olinishi



Kimyoviy xossalari

suvda eriganda gipoxlorit kislotaga hosil
qiladi:



ClO₂

Beqaror, uy temperaturasidayoq parchalanadigan. portlovchi sarg'ish gaz.

Olinshi

	$2\text{NaClO}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{ClO}_2 + 2\text{NaHSO}_4$
--	---

Kimyoviy xossalari

ClO_2 -suvda eriydi va disproporsionirlash reaksiyasiga kirishib ikki xil kislota hosil qiladi:	$2\text{ClO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO}_2 + \text{HClO}_3$ silorati kislota silorati kislota
Ishqor bilan	$2\text{ClO}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{KClO}_2 + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$



Qizil moysimon suyuqlik

Olinishi

ClO_2 ga azon ta'siridan hosil bo'ladi:	$\text{ClO}_2 + \text{O}_3 = \text{ClO}_3 + \text{O}_2 \uparrow$
--	--

Kimyoviy xossalari

Suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadi	$\text{Cl}_2\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO}_3 + \text{HClO}_4$
--	--



Rangsiz *moysimon suyuqlik*. Kuchli endotermik modda bo'lganligi uchun zarb ta'siridan va qizdirilganda portlaydi.

Olinishi

Perxlorat kislotalardan suvni tortib olish yo'li bilan olinadi	$2\text{HClO}_4 + \text{P}_2\text{O}_5 = \text{Cl}_2\text{O}_7 + 2\text{HPO}_3$
--	---

Kimyoviy xossalari

Suv bilan sekin asta ta'sirlashib perxlorat kislotasini hosil qiladi:	$\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HClO}_4$
---	---

Xlorning kislorodli kislotalari va tuzlari



kislotalik kuchi ortadi

oksidlovchilik qobiliyati ortadi



barqarorligi, oksidlovchiligi, dissotsilanishi ortadi



barqarorligi, oksidlovchiligi, dissotsilanishi ortadi

HClO_3 va Bertole tuzi (KClO_3)

Olinishi

Ishqorga xlor ta'sir ettirib olinadi (qaynoq sharoitda)	$6\text{KOH} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow \text{KClO}_3 + 5\text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
--	---

Kimyoviy xossalari

Ikki yo'nalish bu'yicha parchalanadi	$\begin{array}{l} \xrightarrow{t, \text{ kat}} \text{KCl} + \text{O}_2 \\ \xrightarrow{t} \text{KCl} + \text{KClO}_4 \end{array}$
--------------------------------------	---

HClO_4




Olinishi

KClO_4 ga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirib olishi mumkin	$2\text{KClO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HClO}_4$
---	---


Havoda tutaydigan suyuq holdagi juda kuchli kislota.

Brom va yod

Yodning minerallariga $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ – *lautarit* va AgI – *yodargirit* kiradi. Yod ishqoriy metallar yodidlari juda yaxshi eriydi:




Brom oltinni sekin oksidlaydi:



Yodning kislorodli birikmalarida ba'zi tafovutlar kuzatiladi:

➤ HJO_3 ohista suvsizlantirilganda yodat kislotaga angidridi hosil bo'ladi:



➤ Peryodat kislotaga eritmada rangsiz kristallar – besh asosli ortoyodat kislotaga H_5JO_6 ni hosil qiladi, uning Ag_5JO_6 birikmasi olingan:



Galogenlarning ba'zi birikmalarining xususiyatlari:

KBr – nerv sistemasi ishini normallashtiradi

Yodning KJ dagi va spirtidagi eritmasi disenfeksiyada ishlatiladi

Oshqozon shirasida 0,3% li xlorid kislotaga fermentlardan biri – pepsinni aktivlashtiradi va oziq – ovqatni hazim qilishga yordam beradi.

ZnCl_2 – kavsharlashda metal sirtini ho'llash uchun ishlatiladi

BaCl_2 – zaharli modda, qishloq ho'jaligi zararkunandalarga qarshi kurashda ishlatiladi

CaCl_2 – (suvsiz) – gazni quritishda ($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ hosil bo'ladi) ishlatiladi

HgCl_2 – kuchli zahar, terini oshlashda, urug'larni dorilashda ishlatiladi

HCl ning 37% li suvli eritmasi – tutovchi kislotaga

5% li yodning spirtidagi eritmasi antiseptik va qon to'xtatuvchi vosita sifatida ishlatiladi.


Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba Xlor olish a) 18.2-rasimdagidek 3 ta Uchta probirkaga quyidagi moddalardan oz-oz soling: birinchisiga-manganets (IV) oksidi, ikkinchisiga – kaliy dixromat, uchinchisiga – kaliy permanganat. Har bir probirkaga 1 ml konsentrlangan HCl ($\rho=1,19 \text{ g/sm}^3$) qo'shing. Birinchi va ikkinchi probirkani asta qizdiring. Sodir bo'layotgan xodisalarni kuzating. Ajralayotgan gazni hidi (ehtiyot bo'ling) va rangidan (oq qog'oz fonida) aniqlang.

Xlor olish reaksiya tenglamasini yozing va bu reaksiyalarda elektron o'tish sxemasini tuzing. Keltirilgan reaksiyalarda MnO_2 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, KMnO_4 qanday vazifa bajaradi? b) rasmdagi xlor olish asbobini yig'ing.

b) Kolbaga KMnO_4 tomchili voronkaga konsentrlangan HCl soling. Voronka krannigini oching va Vyurts kolbasiga konsentrlangan HCl dan tomchilab quying.

18.2-rasm.Xlor olish moslamasi



1-Vyurts kolbasi, 2-Tomchi voronkasi, 3,4- yuvuvchi idishlar, 5-idishga suv solinadi (NCl aralashmasidan Cl_2 ni ajratish uchun), 6-yuvuvchi idishga konsentrallangan N_2SO_4 solinadi (gazni qurutish uchun).

Ajralayotgan gaz bilan besh bankani to'ldiring va ularni shisha plastinkalar bilan yoping. Idishlarni keyingi tajribalar uchun qoldiring. Ishni tugatgach gaz o'tkazuvchi naychani ishqor eritmasiga tushiring.

2-Tajriba. Brom vayodning olinishi. Kaliy bromidning bir necha kristallini ozgina marganets(IV) oksid bilan aralashtirib, aralashmani probirkaga soling. Unga bir necha tomchi konsentrlangan sulfat kislota eritmasidan quyding va bir oz isiting. Nima kuzatiladi? Reaksiya tenglamasini yozing.

a) Xuddi shunday reaksiyani kaliy yodid eritmasi bilan ham qilib ko'ring va yodning binafsha rangli bug'i hosil bo'lishini kuzating. Reaksiya tenglamasini yozing.

3-Tajriba. Xlorli suvning oksidlanish xossalari. Ikki probirka oling, ularning biriga kaliy bromid, ikkinchisiga kaliy yodid eritmalaridan

quying va ularning har biriga bir necha tomchidan «xlor suvi» qo'shing. Ikkala probirkani chayqatib eritmaslarni aralashtirgach ularga 1 ml dan benzol (yoki benzin) qo'shing va eritmalarni chayqating. Benzol qavatining rangiga e'tibor bering.


Har qaysi probirkaga bir nechta tomchidan xlorli suv qo'shing va yana chayqating. Benzol qavati rangining o'zgarishini kuzating. Xlorning brom va yodni ularning tuzlaridan siqib chiqarish reaksiyalari tenglamalarini yozing.

4-Tajriba. Yodning sublimatlanishi. Quruq chinni kosachaga yod kristallaridan bir nechasini soling, Kosacha ustiga voronka to'nkarib, kosachani shtativ xalqasiga joylashtiring va tagidan bir oz isiting. Nima kuzatiladi?

Tajriba 5. Yodning suvda va organik erituvchilarda eruvchanligi. Probirkaga yodning 1-2 ta kristallidan soling va uning ustiga 5-6 tomchi suv qo'shing. Probirkani chayqating. Eritma qanday rangga kiradi? Shu probirkaning o'ziga kaliy yodid eritmasidan 3-4 tomchi tomizing va yana probirkani chayqating. Yod kaliy yodid eritmasida qanday rangga bo'yaladi? Boshqa bir probirkaga 1-2 ta yod kristallidan soling va uning ustiga 5-6 tomchi biror organik erituvchi - spirt, benzol yoki benzin qo'shing. Probirkani chayqating. Organik erituvchilarda yod qanday eriydi va eritma qanday rangga ega bo'ladi? Yod suvda yaxshi eriydimi yoki organik erituvchilardami?

Nazorat savollari.

1. Vodorod galogenidlarni olish usullari va xossalari.
2. Galogenlarning kislorodli kislotalarini barqarorligi, kuchi va oksidlovchi xossalarni solishtiring.
3. Sulfat kislota, margans (II) oksid, natriy xlorid, suv va kaliy metalli berilgan. Shulardan foydalanib kaliy xloradni qanday olish mumkin?
4. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining to'liq tenglamasini yozib oksidlovchi va qaytaruvchi moddalarini ko'rsating:



19.0.d-BLOK ELEMENTLARI

19.1.Xrom,molibden,volfram elementlarining tavsifi

Kimyoviy elementlar davriy jadvalining d-blok elementlaridan **xrom- Cr, molibden- Mo, volfram- W** lar kiradi. Bu elementlar ichida **W** ning tashqi elektron qavatida **ikkita** elektroni, **Cr** va **Mo** da esa tashqi elektron qavatida **birgina** elektroni bor. Ular oltinchi gruppaning yonaki gruppacha d- elementlaridir.Ular atomlarining elektron konfiguratsiyalari quyidagicha yoziladi:

Cr	Z=24	KLMN	$3s^2 3p^6 3d^4 4s^1$
Mo	Z=42	KLMNO	$4s^2 4p^6 4d^5 5s^1$
W	Z=74	KLMNOP	$5s^2 5p^6 5d^4 6s^2$

Xrom, molibden, volfram yuqori xaroratda suyuqlanadigan og'ir metallardan hisoblanadi. Shu qator bo'ylab ionlanish energiyasi va suyuqlanish harorati ortib boradi. Molibden va xrom o'xshash xossalarga ega. Xrom uchun +3 va +6 oksidlanish darajasi xarakterli, chunki +2 oksidlanish darajasiga ega birikmalari beqaror. Molibden va volframda +6 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan birikmalari ko'p uchraydi. Umuman bu guruhcha elementlari uchun 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 oksidlanish darajasiga ega birikmalari uchrashi kuzatiladi.

Oddiy moddalar holatida xrom, molibden va volfram oq kumushrang yaltiroq metallardir. Ularning orasida volfram eng yuqori suyuqlanish haroratiga ega. Ularning xossalariga qo'shimchalar ta'sir etadi, masalan: texnik xrom eng qattiq moddalardan biri bo'lgan holda toza xrom bunday xossaga ega emas.

Bularning kimyoviy elementlar davriy jadvalida joylashgan o'rni va atom tuzilishi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

H_2CrO_4 va $H_2Cr_2O_7$ va ularning tuzlari kuchli oksidlovchilardir.

$Cr^{+6} \rightarrow Mo^{+6} \rightarrow W^{+6}$ qatorida chapdan o'ngga birikmalarning barqarorligi ortadi, lekin oksidlovchilik xossalari zaiflashadi. $H_2CrO_4 \rightarrow H_2MoO_4 \rightarrow H_2WO_4$ qatorida kislotalarning kuchi keskin

19.0.d-BLOK ELEMENTLARI

19.1.Xrom,molibden,volfram elementlarining tavsifi

Kimyoviy elementlar davriy jadvalining d-blok elementlaridan xrom- Cr, molibden- Mo, volfram- W lar kiradi. Bu elementlar ichida W ning tashqi elektron qavatida ikkita elektroni, Cr va Mo da esa tashqi elektron qavatida birgina elektroni bor. Ular oltinchi gruppning yonaki gruppacha d- elementlaridir.Ular atomlarining elektron konfiguratsiyalari quyidagicha yoziladi:

Cr	Z=24	KLMN	$3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
Mo	Z=42	KLMNO	$4s^2 4p^6 4d^5 5s^1$
W	Z=74	KLMNOP	$5s^2 5p^6 5d^4 6s^2$

Xrom, molibden, volfram yuqori xaroratda suyuqlanadigan og'ir metallardan hisoblanadi. Shu qator bo'ylab ionlanish energiyasi va suyuqlanish harorati ortib boradi. Molibden va xrom o'xshash xossalarga ega. Xrom uchun +3 va +6 oksidlanish darajasi xarakterli, chunki +2 oksidlanish darajasiga ega birikmalari beqaror. Molibden va volframda +6 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan birikmalari ko'p uchraydi. Umuman bu guruhcha elementlari uchun 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 oksidlanish darajasiga ega birikmalari uchrashi kuzatiladi.

Oddiy moddalar holatida xrom, molibden va volfram oq kumushrang yaltiroq metallardir. Ularning orasida wolfram eng yuqori suyuqlanish haroratiga ega. Ularning xossalari qo'shimchalar ta'sir etadi, masalan: texnik xrom eng qattiq moddalardan biri bo'lgan holda toza xrom bunday xossaga ega emas.

Bularning kimyoviy elementlar davriy jadvalida joylashgan o'rni va atom tuzilishi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

H_2CrO_4 va $H_2Cr_2O_7$ va ularning tuzlari kuchli oksidlovchilardir.

$Cr^{+6} \rightarrow Mo^{+6} \rightarrow W^{+6}$ qatorida chapdan o'ngga birikmalarning barqarorligi ortadi, lekin oksidlovchilik xossalari zaiflashadi. $H_2CrO_4 \rightarrow H_2MoO_4 \rightarrow H_2WO_4$ qatorida kislotalarning kuchi keskin

kamayadi. Tabiatda xromning to'rtta, molibdenda yettita, volframda beshta barqaror izotoplar uchraydi.

Tabiatda tarqalishi. Xrom tutgan mineral 1766-yili I.G.Leman tomonidan ochilgan "*Sibir qizil qo'rg'oshini*" deb atalgan. Xromni dastlab 1797-yili fransuz olimi L.N.Vokelen Uralda qazib olinadigan bo'yoq modda PbCr_2O_4 tarkibidan topgan. "Xrom" so'zi "**rangli**" demakdir.

Xrom tabiatda **xromli temirtosh**- $\text{Fe}(\text{Cr}_2\text{O}_3)_2$ (tarkibida 15-40% gacha xrom bo'ladi) va **krokoit**- PbCr_2O_4 ko'rinishida uchraydi. **Xromli oxra**- Cr_2O_3 , **Ferroxrom** xromning temirdagi eritmasi bo'lib, uning tarkibida 60-65% xrom va 4-6% uglerod bo'ladi. Qozog'istonda va Uralda xromli temirtoshning katta konlari bor. Olii sifatli xrom rudalarining yirik konlari Janubiy Afrika Respublikasida, Turkiyada, Janubiy Rodeziyada, Filippinda va Yugoslaviyadadir.

Olinishi. Xromli temirtosh is gazi yoki ko'mir bilan qaytarilganda ferroxrom temir bilan


xromning qotishmasi olinadi:



Sof holdagi xrom olish uchun xrom (III) oksid aluminiy ta'sirida qaytariladi:



Bu usulda olingan xrom toza bo'lmaydi, unga ozroq aluminiy aralashib qoladi. Shu sababli toza xrom olish uchun xrom (III)-oksid kremniy bilan qaytariladi:




Juda toza xrom olish uchun **dixromatlarning** eritmaları elektroliz qilinadi. Xrom tuzlarining suvdagi eritmalarini elektroliz qilish yoki xrom yodidni termik parchalash yo'li bilan ham toza xrom olinadi. Sanoatda xrom olish uchun temir xromitdan dastlab xrom (III)-oksid olinadi. Buning uchun xromli temirtosh kislorod va soda bilan suyuqlantiriladi va bunda natriy xromat hosil bo'ladi, keyin natriy xromatdan uglerod yordamida xrom (III)-oksidi olinadi. $4\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3 + 8\text{Na}_2\text{CO}_3 + 7\text{O}_2 \rightarrow 8\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{CO}_2$

Hosil bo'lgan Na_2CrO_4 suvda eritilib qo'shimchalardan tozalanadi va quritilib ko'mir bilan qaytariladi: $3\text{C} + 2\text{Na}_2\text{CrO}_4 = 3\text{CO} + 2\text{Na}_2\text{O} + \text{Cr}_2\text{O}_3$


Fizik xossalari. Xrom zichligi- 7,19-7,2 g/sm³, suyuqlanish temperaturasi- 1875°C, qaynash temperaturasi- 2430°C ga teng bo'lgan kumushsimon oq rangli, qattiq, yaltiroq, issiqlikni va elektrni yaxshi o'tkazadigan mo'rt metall. Ionlanish potentsiali 6,76 eV, atom radiusi- 1,25 Å ga teng. Xrom kristall panjarada atomining kordinatsion soni 8 ga teng bo'lgan hajmiy markazlashgan kub sistemada kristallanadi. Xrom paramagnit moddalar qatoriga kiradi.

Kimyoviy xossalari. U qaytaruvchi. 2 tadan 6 tagacha elektron beradi. Xromning birikmalaridagi oksidlanish darajasi +2, +3, +4, +6 ga teng.

Xrom havoda oksidlanib, uning sirti juda yupqa va ko'z ilg'amaydigan pishiq Cr_2O_3 qavatini qoplanib qolganligi sababli kimyoviy jihatdan ancha barqaror va bu qavat xromni korroziyalanishdan saqlaydi.




Xrom kimyoviy jihatdan passiv element, lekin suyultirilgan qaynoq xlorid va sulfat kislota ta'sir ettirilganda xrom sirtidagi oksid parda erishi natijasida kislotalardan vodorodni siqib chiqaradi va tegishli tuzlar hosil qiladi:




Bu reaksiyada xlorid kislota ortiqcha olinsa, CrCl_3 tuzi hosil bo'ladi.


Xrom konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi, konsentrlangan sulfat kislota bilan esa qizdirilganda quyidagicha reaksiyaga kirishadi, keyin bu reaksiya sovuqda ham davom etadi:



Xrom fluor bilan oson reaksiyaga kirishadi, qizdirilganda esa S, N₂, C, galogenlar va vodorod galogenidlar bilan birika oladi. Xromning kimyoviy xossalari quyidagicha ko'rsatish mumkin:




Qizdirilgan xrom suv bug'lari bilan quyidagicha reaksiyaga kirishadi:



Xrom birikmalari. Xromning oksidlanish darajasi +2, +3, +4, +6 ga teng bo'lgan har xil birikmalari va CrO , Cr_2O_3 , CrO_3 kabi oksidlari bor. Cr^{+2}O – xrom (II)-oksid - **asosli**. $\text{Cr}^{+3}_2\text{O}_3$ – xrom (III)-oksid - **amfoter**. Cr^{+6}O_3 – xrom (VI)-oksid - **kislotali**. **Ikki valentli xrom birikmalari.** Ikki valentli xrom birikmalari nihoyatda barqaror bo'lib, ular kuchli qaytaruvchilardir.

Xromga xlorid sulfat kislota ta'sir ettirib, CrCl_2 va CrSO_4 tuzlar olinadi. CrF_3 - **yashil**, CrBr_2 - **sariq** va CrS_2 - **qizil**. $\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_2$, CrS tuzlari ham bor. Bu tuzlarga ishqor ta'sir ettirilsa, $\text{Cr}(\text{OH})_2$ hosil bo'ladi. Ochiq idishda **ikki** valentli xrom birikmalari oksidlanadi: $\text{CrCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl}$



Xrom (II)-oksidi asosli oksid bo'lib, **qora** rangli kukundir. Xrom (II)- oksidini olish uchun xromning simobli amalgamasi havoda oksidlantiriladi:




Laboratoriyada quyidagi usul bilan olish mumkin:




CrO havoda 100°C dan yuqori haroratda qizdirilsa, oksidlanib, xrom (III)-oksidga aylanadi: $4\text{CrO} + \text{O}_2 = 2\text{Cr}_2\text{O}_3$

Kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, xromning ikki valentli tuzlarini hosil qiladi: $\text{CrO} + 2\text{HCl} = \text{CrCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Xrom (II)-oksidiga xrom (II)-gidroksid mos kelib, u ham kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi hamda tuz va suv hosil qiladi:



$\text{Cr}(\text{OH})_2$ ni olish uchun xromning ikki valentli suvda yaxshi eriydigan tuzlariga ishqor ta'sir ettiriladi. Natijada, **sariq** rangli cho'kma $\text{Cr}(\text{OH})_2$ hosil bo'ladi:




Xromning ikki valentli birikmalari beqaror. Havo kislorodi ishtirokida oksidlanib, xromning uch valentli birikmalarini hosil qiladi: $4\text{Cr}(\text{OH})_2$


+ O₂ + 2H₂O = 4Cr(OH)₃ Cr(OH)₂ qizdirilganda. xrom (III)-oksidini hosil qiladi:



Cr⁺² oksidlanish darajasidagi xromning birikmalari qaytaruvchilardir. Ular oson oksidlanib, Cr⁺³ li birikmalarga aylanadi:



Havo kislorodi ishtirokida Cr⁺² oksidlanadi:



CrCl₂ – rangsiz kristall suvda eriydi. Erimada havo rangli [Cr(H₂O)₆]²⁺ akva komplekslar hosil qiladi. Eng barqaror birikmasi Cr(CH₃COO)₂.

Uch valentli xrom birikmalari. Uch valentli xrom birikmalari barqaror moddalardir. Cr₂O₃ (**xromli oxra**)- juda qiyin suyuqlanuvchi yashil tusli kukun. yelimli bo'yoqlar va moy bo'yoqlar tayyorlashda keng ishlatiladi va **yashil kron** deb ataladi, suyuqlanish harorati- 2265°C, kimyoviy jihatdan inert, tabiatda FeO•Cr₂O₃ ko'rinishda uchraydi.

Xrom (III) oksidning olinish usullari:


Uglerod bilan qaytarish:



Oltinugurt bilan qaytarish:





Harorat ta'sirida xrom (III) gidroksid parchalanishi:



Xrom (III)-oksidni laboratoriya sharoitida ammoniy dixromatni qizdirib olinadi (**Vulqon reaksiyasi**): (NH₄)₂Cr₂O₇ → Cr₂O₃ + N₂ + 4H₂O

Cr₂O₃ – kimyoviy jihatdan passiv modda, u suvda erimaydigan, kislotalar bilan ham. ishqorlar bilan ham reaksiyaga kirishib, tuzlar hosil qiladigan **amfoter** xossaga ega bo'lgan barqaror birikmadir.




Cr₂O₃ kaliy pirosulfat bilan suyuqlantirilsa xromning (III) valentli birikmalariga o'tadi: Cr₂O₃ + 3K₂S₂O₇ = Cr₂(SO₄)₃ + 3K₂SO₄

Xrom (III) gidroksid. Cr(OH)₃ - **ko'kimtir** kulrang tusli cho'kma, suvda oz eriydi, **amfoterlik** xossasi bor: Cr(OH)₃ + 3H⁺ → Cr⁺³ + 3H₂O
Cr(OH)₃ + OH⁻ → CrO₂⁻ + 2H₂O


Xrom (III) gidroksid xromning suvda yaxshi eriydigan III valentli tuzlari eritunasiga ishqor ta'sir ettirib olinadi.



Cr(OH)_3 gidroksidning xossalari xuddi Al(OH)_3 nikiga o'xshaydi, ya'ni amfoter xossaga ega bo'lib, qizdirilganda kislotaga va ishqor eritmalari bilan reaksiyaga kirishadi. Cr(OH)_3 gidroksid kislotalar bilan reaksiyaga kirishganda **asos** xossalarini, asoslar bilan reaksiyaga kirishganda esa **kislotaga** xossalarini namoyon qiladi.



ko'k rang



yashil rang



Xrom (III) gidroksidi kuchli oksidlovchilar ta'sirida ishqoriy muhitda Cr^{6+} birikmalariga o'tadi. $2\text{Cr(OH)}_3 + \text{KClO}_3 + 4\text{KOH} = 2\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{KCl} + 5\text{H}_2\text{O}$




$\text{Na}_3[\text{Cr(OH)}_6]$ o'rniga Cr(OH)_3 , CrCl_3 , NaCrO_2 , $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ ni olish mumkin. Oksidlovchilar sifatida bo'lsa Cl_2 , I_2 , NaClO_3 , NaNO_3 , H_2O_2 ba boshqalar olinadi.

Xrom birikmalarida Cr^{3+} kationi ko'k rangli (xrom (III) sulfat, xrom (III) nitrat, xrom (III) xlorid), xrom (III) anion holda bo'lsa (CrO_2^-), **yashil** rangli bo'ladi (natriy xromit, kaliy xromit).


Xrom (III) tuzlari eritmalaridan quyidagi kristallogidratlar holda ajralib chiqadi: Kaliy xromli achchiqtosh- $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$, ammoniy xromli achchiqtosh- $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Xromning uch valentli birikmalaridan bo'lgan xromli achchiqtoshlar **ko'pchilik** sanoatida terilarni oshlash uchun ishlatiladi.


Cr^{3+} oksidlanish darajasidagi xromning birikmalari ham oksidlovchi, ham qaytaruvchilardir. Uch valentli birikmalari kislotali muhitda va kuchli qaytaruvchi ishtirokida oksidlovchi xossalari namoyon qilib, o'zi ikki valentli holatga o'tadi. Lekin ishqoriy muhitda kuchli oksidlovchilar ta'sirida uch valentli xrom birikmalari qaytaruvchi xossalarni namoyon qiladi va xrom (VI) valentli birikmalarga aylanadi:





HCrO_2 – metaxromitlar, tuzlari mavjud:




H_2CrO_3 – ortoxromitlar, faqat tuzlar holida olingan:




Xrom(III) tuzlari gidrolizga uchraydi. Jarayon kation mexanizmi bo'yicha boradi:




Cr_2S_3 – qora kristall modda, suvda erimaydi.



Bu tuz kuchli gidrolizga uchraydi va to'la gidroliz sodir bo'ladi.



Xrom (III) birikmalarining koordinatsion soni 6 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar hosil qiladi:




ko'k binafsha rangli och yashil rangli tim yashil rangli

Olti valentli xrom birikmalari. CrO_3 – xrom (VI) oksid (xromat angidrid) **to'q qizil** rangli. 197°C da suyuqlanadigan, zaharli ignasimon kristall modda. Xromat angidridni hosil qilish uchun kaliy dixromatga konsentrlangan H_2SO_4 ta'sir ettiriladi: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Xrom (VI) oksid xromat angidrid ham deyiladi, u nihoyatda kuchli oksidlovchi bo'lib, **kislotali** oksiddir. Xrom (VI) oksidning kuchli oksidlovchi bo'lishiga sabab shuki, u oson parchalanib, kislorod ajratib chiqaradi: $4\text{CrO}_3 \rightarrow 2\text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{O}_2$

CrO_3 kuchli oksidlovchi. Oddiy va murakkab moddalarni oksidlab, o'zi Cr_2O_3 ga qadar qaytariladi: $3\text{S} + 4\text{CrO}_3 = 3\text{SO}_2 + 2\text{Cr}_2\text{O}_3$

Isqorlar bilan reaksiyaga kirishib, natriy xromat tuzini hosil qiladi:





Xrom (VI)-oksid suv bilan oson reaksiyaga kirishadi:

agar suv ko'p bo'lsa: $\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CrO}_4$

agar CrO_3 ko'p bo'lsa: $2\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$


Demak, xrom (VI)-oksidiga ikki xil kislota to'g'ri keladi: H_2CrO_4 - xromat kislota, $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ - dixromat kislota. Suyultirish ortishi bilan muvozanat H_2CrO_4 tarafiga qarab suriladi.

Bu kislotalar beqaror, faqat suyultirilgan eritma holidagina mavjud bo'la oladi. Xromat kislota tuzlari xromatlar deyiladi va ular sariq rangda bo'ladi. Dixromat kislota tuzlari dixromatlar deyilib, to'q sariq rangli bo'ladi. Xromat va dixromat kislotalarning natriyli, kaliyli va ammoniyli tuzlari barqaror va suvda yaxshi eriydi. Bu tuzlar kuchli oksidlovchilardir. Shuning uchun ularning kislotali muhitdagi eritmasi turli moddalarni oksidlashda foydalaniladi:



Cr^{+6} oksidlanish darajasidagi xromning birikmalari kuchli oksidlovchilar bo'lib, oson qaytariladi va kislotali muhitda Cr^{+3} birikmalariga aylanadi.

Xromatlarni olish uchun $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ga soda qo'shib, kislorod ishtirokida qizdiriladi:




Hosil bo'lgan Na_2CrO_4 ni suvda eritib, Fe_2O_3 ajratib olinadi. Agar K_2CrO_4 olish lozim bo'lsa, Na_2CO_3 o'miga K_2CO_3 qo'shiladi.

Xrom (III) tuzlaridan ham xrom (VI) tuzlarini olish mumkin. Masalan:



Agar xrom (III) oksidiga ishqor va oksidlovchi qo'shilsa, xromatlarga o'tadi:



Xromatni dixromatga va dixromatni xromatga aylantirish oson. Masalan:






Xromatlar va dixromatlar kuchli oksidlash xossalari ega. Shuning uchun kimyo amaliyotida har xil moddalarni oksidlash maqsadida xromat va dixromatlardan foydalaniladi.

Dixromat kislotada tuzlari ayniqsa kislotali muhitda juda kuchli oksidlovchidir:




H_2S o'rniga KJ , Na_2SO_3 , NaNO_2 olish mumkin.

Xromatlar xromning (III) tuzlarini ishqoriy sharoitda oksidlab oson olinadi:



H_2O_2 o'rniga boshqa oksidlovchilar NaNO_3 , KClO_3 ishlatish mumkin.


Bixromatlar olish uchun xrom (III) tuzlariga kislotali muhitda kuchli oksidlovchilar PbO_2 , KMnO_4 , NaBiO_3 ta'sir etiriladi:



Xromning peroksid shaklidagi birikmalari ma'lum. Ular **peroksikislotalar** deyiladi.




$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_{12}$ - ko'k rangli efirda barqaror. H_2CrO_6 - qizil rangli.



Reaksiya paytida efir qavatining siyoh rangga bo'yalishi kuzatiladi.

Xromning birikmalaridan CrO_3Cl_2 qizil qo'ng'ir rangli suyuqlik (suyuq. harorati $-96,5^\circ\text{C}$, qaynash harorati 117°C).



K_2CrO_4 kaliy xromat suvsiz kristallanadi. Suvda yaxshi eriydi (20°C da 100 g suvda 62,9 g tuz eriydi). Na_2CrO_4 kristallari tarkibida 4, 6, 10 molekula suv ushlaydi. Uning suvda eruvchanligi yaxshi. Natriy dixromatga kaliy xlorid ta'sir ettirilib kaliy dixromat olinadi.

Suvda yomon eriydigan xromatlar qatoriga PbCrO_4 va BaCrO_4 kiradi. Ular sariq bo'yoq sifatida ishlatiladi.

CrF_6 - kam o'rganilgan, beqaror, sariq limonga o'xshash rangli kukun. Xrom va uning analoglari geksakarbonilli neytral komplekslar hosil qiladi $[\text{E}(\text{CO})_6]$. Geksakarbonilxrom $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ rangsiz kristall modda. Metallarning karbonillaridan toza metallar olish uchun foydalaniladi.

Ishlatilishi. Korroziyaga chidamli bo'lganligi sababli metall buyumlar sirti xrom bilan qoplashda ishlatiladi, masalan, eltiral, nixrom, xromal. Xrom, asosan, xromli po'latlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Temirga turli nisbatlarda xrom qo'shib har xil xossalarga ega bo'lgan yuqori sifatli po'latlar olinadi. Xromli po'latlar qattiq bo'ladi va avtomobil resorlari, miltiq stvollar va zirhli po'lat listlar tayyorlashda ishlatiladi. Tarkibida 1-2% Cr tutgan po'lat qattiq va mustahkam bo'ladi, 12% xrom tutgan po'lat esa **zanglamaydigan** po'lat deyiladi va u tibbiyotda har xil jihozlar tayyorlashda, zavodlarning kimyoviy uskunalari, kesish asboblari va qoshiq, pichoq tayyorlanadi. Kislotalar ishlab chiqaradigan zavodlarning uskuna va apparatlari 50-60% xromli qotishmalardan tayyorlanadi.

Molibden- Mo. 1778-yilda shved kimyogari **Sheelle** tomonidan kashf etildi. 1782-yilda shved kimyogari **P.Gelm** molibden (III) oksidini (Mo_2O_3) uglerod yordamida qaytarish natijasida toza holda molibden oldi. Molibden davriy sistemaning VI guruh kimyoviy elementi, tartib raqami 42, nisbiy atom massasi 95,94, kumushsimon-kulrang qiyin eriyeigan metall, zichligi $10,2 \text{ g/sm}^3$, $t_{\text{uyuq}} = 2620^\circ\text{C}$, $t_{\text{qayn}} = 4630^\circ\text{C}$, ba'zi po'latlar tarkibiga kiradi, kislotalarda eriyei. U kam tarqalgan element bo'lib, yer qobig'ida o'rtacha massa bo'yicha $3 \cdot 10^{-4}\%$ joylashgan. Asosiy ishlab chiqaruvchilar AQSH (60%), Chili (20%), Kanada (10 %) va boshqa mamlakatlar yiliga o'rtacha 100 ming tonnadan ortiq metall hisobidan molibden boyitmasi ishlab chiqaradi.

Molibdenlash – po'lat, titan, niobiy va boshqa metall materiallaridan tayyorlangan buyumlar sirtida molibden qoplamasi hosil qilish. Molibden buyumlar qattiqligi, sirt mustahkamligi, azot kislotasiga korroziyabardoshligini oshiradi, qo'shimcha silitsiylanganda esa yuqori haroratlarda olovbardoshligi oshadi. Molibdenlash diffuzion metallash usuli bilan bajariladi. Molibden minerallaridan eng muhimi **molibdenit** MoS_3 , gacha oksidlab qizdiriladi, so'ng tozalab, metall hosil bo'lgunicha vodorod bilan qaytariladi.

Minerallari. Molibdenning 20 ga yaqin minerallari mavjud bo'lib, asosan, 4 ta minerali sanoatda ishlatiladi va tabiatda keng tarqalgan.

Molibdenit MoS_2 . Mineralning nomi grekcha "molibdos"- qo'rg'oshin degan so'zdan kelib chiqqan. Sinonimi molibden yaltirog'i. Kimyoviy tarkibi Mo- 60%, S- 40%. Kimyoviy tahlillarning ko'rsatishicha. Mo- 57,1-60,05% va S- 39,7-42% atrofida bo'ladi. Ko'p hollarda kimyoviy toza birikma bo'lib topiladi, ya'ni tarkibida renyidan boshqa izomorf aralashmalar bo'lmaydi. Spektral tahlillarning ko'satishicha reny molibdenit tarkibida boshqa sulfidlar tarkibidagiga ($5 \cdot 10^{-7}$ dan $2 \cdot 10^{-4}$, 4% gacha) qaraganda ko'proq bo'ladi. Molibdenit eng keng tarqalgan mineral bo'lib, yumshoq, kulrang, qo'rqoshinsimon mineral, zichligi 4,7 - 4,8 g/sm³.

Molibdenitning rangi qo'rg'oshindek kulrang. Chizig'i kulrang bo'lib, yashilroq tovlanib turadi. U metalldek yaltiraydi. Qattiqligi 1. Yupqa varaqchalari egiluvchan. Qo'lga yog'langandek unmaydi. Qog'ozga grafitga o'xshab chizadi. Ulanish tekisligi [0001] bo'yicha o'ta mukammal. Solishtirma og'irligi 4,7-5,0. Molibdenit elektr o'tkazuvchanligi oddiy uy haroratida juda past, lekin harorat orta borishi bilan ko'tariladi.

Vulfenit – PbMoO_4 . Kimyoviy tarkibi Pb-61,4%, MoO₃-38,6%. Ba'zan CaO, CuO, MgO, WO₃, kamdan-kam CuO₃ va V₂O₅ aralashmalari bor. Singoniyasi tetragonal; simmetriya ko'rinishi piramidal L. Kristallarining qiyofasi ko'pincha kvadrat tabletkalar shaklida bo'lib, ba'zan yassi va cho'ziq piramidalaridan iborat kombinatsiya bo'lib topiladi. Yaxlit kristallangan agregatlari birmuncha kam uchraydi. **Vulfenitning** rangi mumdek yoki asaldek sariq, kulrang, qo'ng'ir, ba'zan sarg'ish-qizil va hattoki qizil. Chizig'i oq yoki juda rangsiz. Qattiqligi 3. Ulanish tekisligi [111] bo'yicha aniq. Solishtirma og'irligi 6,3-7,0. Vulfenit ko'proq oksidlangan qo'rqoshinli makonlarda uchraydi.

Aniqlovchi belgilari. Odatda, vulfenitning asaldek sariq rangi, kristallarining tabletkasimon qiyofasi, olmos kabi yaltirashi, katta solishtirma og'rlikka ega bo'lishi va oksidlanish zonasida boshqa qo'rg'oshin minerallari bilan bir paragenizisda topilishi xarakterlidir.

MDH mamlakatlarida molibdenli konlar Shimoliy Kavkaz, Kavkaz -orti, Qozog'iston,

Krasnoyarsk o'lkalari va O'zbekistonda mavjud bo'lib, ruda tarkibida 0,05-2% gacha molibden bo'ladi.

Ishlatilishi. Molibden 75-80% po'latni legirlashda (mustahkamligi va qattiqligini oshirish uchun) ishlatiladi. Molibden issiqbardosh va olovbardosh qotishmalar (masalan, reaktiv dvigatellar ishlab chiqarishda), kislotaga chidamli qotishmalar (kimyo sanoatida ishlatiladigan apparatlar) yaratishda keng qo'llaniladi. Molibden elektr yoritish vakuum asboblari uchun muhim materialdir. Disulfid MoS_2 , qattiq moy bo'lib, podshipniklar va mashinalarning ishqalanuvchi metall qismlari yadro reaktorlarida issiqlik ajratuvchi element bo'lib xizmat qiladi. U sim, list va boshqa hollarda elektr lampa, radioelektronika va rentgenotexnikada turli katod va generator lampalarning anodi, elektr lampalarning ichki o'rama simi holida keng ishlatiladi.

Qotishmalari - volfram, reniy, sirkoniy, titan, niobiy, uglerod va boshqa elementlar qo'shilgan molibden asosidagi qotishmalar. Konstruksiya, issiqbardosh molibden qotishmalari ichida molibdenning titan (0,5%), sirkoniy (0,08%) va uglerod (0,02%) qo'shilgan qotishmasi mashhur. Molibden qotishmalaridan tayyorlangan detallar vakuumda

Texnologiyasi. Molibdenli rudalar 1800°C gacha haroratda uzoq vaqt, himoya qoplama bilan havoda 1200°C - 2000°C da ma'lum vaqt ishlashi mumkin. Molibden qotishmalari raketa va boshqa uchish apparatlarining muhim detallarini ishlab chiqarishda, yadro energetikasi, elektronika va texnikaning boshqa sohalarida ishlatiladi. Molibden qotishmalarining asosiy afzalligi—issiqlikbardoshligi va plastikligi pastligidir. Elektr energetikasida rubilnik, avtomat o'chirgichlar, payvandlash uchun elektrodlar, texnikada esa bolg'a, bolta va boshqa mashinasozlikdagi asbob-uskunalariga qattiqligini oshirish uchun qo'shilib ishlatiladi. flotatsiya usuli bilan boyitilib, tarkibida 45-55% molibdenli boyitma olinadi. U avvaliga kuydirish pechlarida 500 - 600°C da kuydirilib, molibden sulfidi MoO_3 ga aylantiriladi, so'ng ammiak eritmasi bilan tanlab eritiladi. Tozalangan eritma HCl bilan qayta ishlanib, kristallanadi. Hosil bo'lgan paramolibdat ammoniy ternik parchalanadi. 90 - 100°C da boshlangan jarayon 280 - 380°C da MoO_3 olish bilan yakunlanadi. Uch oksidli molibden tayyor mahsulot bo'lib, qora metallurgiyada keng qo'llaniladi. Toza holda molibden kukunini olish uchun u vodorod bilan uch bosqichda 620 - 900°C da qaytariladi.

Volfram- belgisi - **W**. 1781-yil shved kimyogari **Sheele** tomonidan kashf etilgan. davriy sistemaning **VI** guruh kimyoviy elementi (lot. Wolframum), tartib raqami **74**, nisbiy atom massasi **183,85**. Qiyin eriydigan metall, zichligi $19,3 \text{ g/sm}^3$, $t_{\text{eriyish}} = 3380^\circ\text{C}$, $t_{\text{qayish}} = 5900^\circ\text{C}$. "**Og'ir tosh**" nomi bilan ataluvchi **tungsten** mineralini kislota yordamida parchalash tufayli volfram ajratib olinganligi uchun ham Angliya, AQSH, Fransiya mamlakatlarida haligacha bu element **tungsten** deb ataladi. Ko'pgina Yevropa mamlakatlari, Olmoniya va MDH da **volfram** deb nomlanadi. Kub shaklidagi kristall kumushday oq, og'ir metall. suvda erimaydi, konsentratlangan qaynoq KOH da erimaydi. NH_3 da HNO_3 da va zar suvida oz eriydi. Tabiatda kam tarqalgan element, yer qobig'ida $10^{-6}\%$ (massa bo'yicha)ni tashkil etadi xolos. Volfram zaxiralari MDH, Kanada, Avstraliya, AQSH, Janubiy va Shimoliy Koreya, Boliviya, Braziliya, Portugaliya mamlakatlarida ko'p topilgan. Metall hisobi bo'yicha chet ellarda yiliga o'rtacha 30-32 ming tonnadan ortiq volfram boyitmasi ishlab chiqarilmoqda.

Minerallari. Uning 15 ga yaqin minterallari mavjud, biroq tabiatda, asosan, volframit, sheelit minerallarida bo'ladi va shu minerallardan olinadi. **Volframit-** $(\text{Mn, Fe})\text{WO}_4$. Bunda agar temir-80% dan ortiq bo'lsa, **ferberit-** (FeWO_4) aksincha, marganes-80% dan yuqori bo'lsa. **gyubnerit** deb ataladi. Zichligi $7,1-7,9 \text{ g/sm}^3$, qattiqligi mineralogik shkala bo'yicha 5-5,5. Uning tarkibida WO_3 76,3-76,8% ni tashkil etadi. **Sheelit-** CaWO_4 kalsiyli bu mineralning zichligi $5,9-6,1 \text{ g/sm}^3$, qattiqligi mineralogik shkala bo'yicha 4,5-5. U magnitlangan emas.

Ishlatilishi. Jami ishlab chiqarilgan volframning 50% i gacha po'lat ishlab chiqarishga sarflanadi. 8-20% qo'shilgan volframli turli po'lat qotishmasidan og'ir sanoatda eng kerakli bo'lgan tez qiruvchi va o'yuvchi asbob-uskunalar olishda qo'llaniladi. Shuningdek, volfram po'latlarni legirlashda, yeyilishga chidamli va issiqbardosh qattiq qotishmalar olishda keng qo'llaniladi. Qiyin cruvchanligi va yuqori haroratlarda bug' bosimi pastligidan elektr lampalarining cho'g'lanish tolalari, hamda elektronika va rentgen texnikasi detallari uchun material sifatida ishlatiladi.

Qotishmalari. Volframning metallar (molibden, reniy, mis, nikel, kumush), oksidlar (ThO_2), karbidlar (TaC , NbC , ZrC) va boshqa birikmalar bilan qotishmasi mavjud. Asosiy afzalliklari – suyuqlanish haroratining yuqoriligi, elastiklik modulining kattaligi, issiqlikdan kengayish koeffitsiyentining pastligi bo'lsa, **kamchiliklari** – uy haroratida plastikligi va oksidlanishga qarshiligi pastligidir. Volfram qotishmalari buyumlari va yarim fabrikatlari, asosan, kukun metallurgiyasi usulida, kamdan-kam vakuum - yoy va elektron-nur pechlarida eritib, keyin deformatsiyalab olinadi. Yadro energetikasi, kosmonavtika, elektrotexnika, elektronika va boshqalarda ishlatiladi.

Volframning ikkita sulfidi bor:

1) WS_2 to'q kulrang kristall modda, zichligi $7,5 \text{ g/sm}^3$, 1250°C da parchalanadi, tabiatda

uchraydigan WS_2 minerali **tungstenit** deb ataladi;

2) WS_2 qora kukun, suvda eriydi.

Volfram qaytaruvchilari: vodorod, ko'mir, is gazi va boshqa moddalar kislorodli ba'zi birikmalardan kislorodni ajratib oladi, shuning uchun ular qaytaruvchilar deb ataladi. Atom tuzilishi nazariyasiga ko'ra reaksiya vaqtida elektronlar berib, o'zi oksidlanuvchi, atom yoki ion qaytaruvchi deyiladi.

Texnologiyasi. Volframli rudalar tarkibida WO_3 55-65% bo'lgunga qadar gravitatsiya, flotatsiya yoki magnitli separatsiya usullari bilan boyitiladi. So'ng ikki xil usul bilan – volframli boyitma soda bilan kuydirilib yoki avtoklavda eritma yordamida qayta ishlanadi. Ikkinchi usuli boyitma kislotalar yordamida eritiladi. Olingan volframit natriy turli qo'shimchalardan tozalangach, HCl yordamida volfram kislotasi H_2WO_4 olinadi. $500-600^\circ\text{C}$ da toblash natijasida toza (III) oksid volfram olish mumkin. Paravolframit olish uchun esa ammiakli usul bilan unga qayta ishlov beriladi. Volfram (III) oksidi vodorod yordamida qaytarilib, ($700-900^\circ\text{C}$) so'f volfram kukuni olinadi. Toza volfram metalini olish uchun olingan volframli kukunlar shtabik holatiga keltirish uchun zichlanadi. So'ng ular elektr nurlash usuli bilan eritib olinadi. **Molibden** o'simlik va hayvon organizmlari tarkibiga kiradi. To'qimalarda molibden azot almashinuvi jarayonlarida (ksantin va purinning sut va jigarda oksidlanishi) katalizator vazifasini bajaradi.

Mis, rux, marganes va temir bilan birga molibden ham *"hayotiy metallar"* deb ataladi. Molibden organizmda turli komplekslar hosil qiluvchi moddalar sifatida ishtirok etadi.

Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Xromning ikki valentli birikmalarini hosil qilish.a) Probirkaga rux bo'lakchalaridan solib, ustiga kislotali muhit hosil bo'lishi uchun 3-4 tomchi xlorid kislota eritmasi qo'shilgan 2-3 ml xrom (III) xlorid eritmasidan va 2-3 ml benzin quyning. Probirka og'zina gaz o'tkazuvchi nay o'rnatilgan tiqin bilan berkiting va gaz o'tkazuvchi nayning uchini suv solingan ikkinchi probirkaga tushiring. Eritma rangining o'zgarishini kuzating. Nima uchun benzin qo'shiladi?

b) Yuqorida xosil qilingan xrom (II) xlorid eritmasiga mo'l ishqor eritmasidan qo'shing va xrom (II) gidroksid hosil bo'lishini kuzating. Xrom (II) gidroksid qanday xossaga ega? Sodir bo'ladigan reaksiyalarning tenglamalarini yozing.

2-tajriba. Xrom (III) gidroksidning olinishi va xossalari.a) Probirkaga 2-3 ml uch valentli xrom tuzi eritmasidan quyning va unga to cho'kima hosil bo'lguncha ishqor eritmasidan tomizing. Reaksiyaning molekulyar va ionli tenglamalarini yozing.

b) Probirkadagi hosil qilingan cho'kmani ikki qismga bo'ling. Uning bir qismiga suyultirilgan xlorid kislota, ikkinchi qismiga esa cho'kma batamom erib ketgunicha ishqor eritmasidan qo'shing. Reaksiyalarning to'liq va qisqartirilgan ionli tenglamalarini yozing.

3-tajriba. Uch valenti xrom birikmalarining oksidlanishi. Probirkaga 2-3 ml uch valentli xrom tuzi eritmasidan quyning va unga dastlab hosil bo'ladigan xrom (III) gidroksid cho'kmasi erib ketguncha ishqor qo'shing. Hosil qilingan xromit eritmasidan ikkita probirkaga bo'ling. Ulardan biriga xlorli suv, ikkinchisiga esa vodorod peroksid eritmasidan qo'shing. Probirkalarni ozgina qizdiring va eritmalar rangining o'zgarishini kuzating. Tegishli reaksiyalarning tenglamalarini yozing. Oksidlovchi va qaytaruvchini ko'rsating.

4-tajriba. Xromatning dixromatga va dixromatning xromatga aylanishi. Probirkaga 2-3 ml kaliy xromat eritmasidan quyning va unga tomchilatib, to rangi o'zgarguncha sulfat kislota eritmasidan

qo'shing. So'ngra hosil qilingan eritma yana dastlabki tusigi kirguncha uning ustiga kaliy yoki natriy ishqorlarning eritmasidan tomchilatib qo'shing. Xromatning dixromatga va dixromatning xromatga aylanishi reaksiyasini molekulyar va ionli ko'rinishida yozing. Kislota va ishqor qo'shish bilan muvozanatning qanday siljishini tushuntiring.

Nazorat savollari

Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining to'liq tenglamasini yozib oksidlovchi va qaytaruvchi moddalarini ko'rsating:

1. $\text{CrCl}_3 + \text{KBiO}_3 + \text{HNO}_3 \rightarrow$
2. $\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
3. $\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{HCl} \rightarrow$

19.2. Marganes, Texnetsiy, Reniy elementlarning tavsifi

Kimyoviy elementlar davriy jadvalining VII guruh yonaki guruhchasiga **marganes- Mn, texnetsiy- Tc, reniy- Re** lar kiradi. Bu elementlarning tashqi elektron qavatida **ikkitadan** elektroni bor. Ular yettinchi gruppaning yonaki gruppacha d- elementlaridir. Metallarning aton radiusi marganesga qarab kamaygan. Ularning elektron tuzulishi (n-1)d⁵ns² elektron konfiguratsiyaga ega.

Ular atomlarining elektron konfiguratsiyalari quyidagicha yoziladi:

Mn Z=25 KLMN 3s²3p⁶3d⁵4s²

Tc Z=43 KLMNO 4s²4p⁶4d⁵5s²

Re Z=75 KLMNOP 5s²5p⁶5d⁵6s²

Reniy va texnetsiyning o'xshash xossalari ko'p. Shuning uchun marganes ulardan farq qiladi. Marganes uchun +2, +4, +7 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan birikmalari barqarordir. Lekin +3, +5, +6 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan birikmalar ham uchraydi. Texnetsiy va reniyda +7 birikmalar ancha barqaror. Mn→Tc→Re qatorida kimyoviy faollik kamayadi.

Bularning kimyoviy elementlar davriy jadvalida joylashgan o'rni va atom tuzilishi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.


Marganes – belgisi - **Mn**. 1774 yilda shved olimi **Sheyelle** tomonidan temir qotishmasi tarkibidan topilgan, song uning vatandoshi **Yu.Gan**

tomonidan sof holda ajratib, metall holida olingan. 1808 yil ingliz olimi **Djon** tomonidan toza holda olingan. Davriy sistemaning VII guruh kimyoviy elementi (lot. Margan ium), tartib raqami 25, nisbiy atom massasi 54,93.

Tabiatda tarqalishi. Marganes tabiatda ancha ko'p tarqalgan elementlar qatoriga kirib, Yer po'stlog'i og'irligining 0,1% ini tashkil etadi. Mn ning 1 ta barqaror (^{55}Mn) izotopi ma'lum, uning 10 ta sun'iy izotopi olingan. Marganes tabiatda, asosan, oksidlar, gidroksidlar va karbonatlar holida uchraydi. Bularga *pirolyuzit*- $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, *marganesli shpat*- MnCO_3 , *gausmanit*- Mn_3O_4 va *manganozit*- MnO , *braunit*- Mn_2O_3 , *manganit*- $\text{Mn}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, MnSO_3 , *gauerit*- MnS_2 , *marganes yaltirog'i (alabandin)*- MnS kabi birikmalar kiradi.

Olinishi. Marganes ana shu rudalardan yoki pirolizini kuydirish natijasida hosil bo'ladigan Mn_2O_3 ni aluminiy bilan qaytarish orqali (aluminotermiya usuli bilan ham) olinadi: $3\text{Mn}_2\text{O}_3 + 4\text{Al} \rightarrow 3\text{Mn} + 2\text{Al}_2\text{O}_3$
 $3\text{Mn}_2\text{O}_3 + 8\text{Al} \rightarrow 9\text{Mn} + 4\text{Al}_2\text{O}_3$ Marganes oksidini elektr pechlarida kremniy bilan qaytarib, marganes olinadi: $\text{Mn}_2\text{O}_3 + 2\text{Si} \rightarrow 3\text{Mn} + 2\text{SiO}_2$

Marganes oksidini uglerod bilan qaytarish orqali ham olinadi:



MnSO_4 tuzi eritmasining elektroliz qilish orqali ham marganes olish mumkin. Bunda katodda Mn va qisman H_2 , anodda O_2 ajraladi, eritmada esa H_2SO_4 qoladi.




Marganes tuzlarining suvdagi erimalarini elektroliz qilib olinadi:




Fizikaviy xossalari. Marganes oq rangli, qattiq, mo'rt, temirga o'xshab ketadigan og'ir, kumushsimon kubik kristallik metall. Suyuqlanish harorati- 1245°C, qaynash harorati- 2070°C, zichligi- 7,44 g/sm³. Marganes 4 ta allotropik shakl o'zgarish holatida uchraydi. a-Mn, 727°C gacha barqaror. b-Mn 1101°C (bu ikkala allotropik shakl o'zgarishlar ham aluminotermiya usuli bilan olinadi. U mo'rtligi va qattiqligi bilan tasniflanadi). g-Mn 1101-1137°C haroratda mavjud. t-Mn 1137°C dan yuqori haroratda hosil bo'ladi.

Kimyoviy xossalari. Marganesning elektron konfiguratsiyasi quyidagicha: $Mn_{25} 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$. Marganes atomining sirtqi qavatida **2 ta** ($4s^2$) va sirtidan oldingi tugallanmagan qavatida **13 ta** ($3s^2 3p^6 3d^5$) elektron bor. U sirtqi qavatidagi 2 ta elektronini va sirtidan ikkinchi qavatdan 5 ta elektronini berib, +2, +3, +4, +6, +7 ga teng oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Marganes yuqori temperaturada yonadi, temperaturaning ko'tarilishiga qarab MnO , MnO_2 , Mn_2O_3 va Mn_3O_4 oksidlarni hosil qiladi. Marganes metallining sirti yupqa oksid parda (Mn_2O_3) bilan qoplangan holda bo'lganligi sababli. hatto qizdirilganda ham havoda oksidlanmaydi.


Marganes qizdirilganda bir qator kimyoviy reaksiyalarga kirishadi. Kislorod bilan haroratning o'zgarishiga qarab MnO , MnO_2 , Mn_2O_3 , Mn_3O_4 larni hosil qiladi:



Marganes suv bilan qizdirilganda reaksiyaga kirishganda vodorod ajralib chiqadi. Sovuqda reaksiya sekin, isitilganda tez boradi:



Qizdirilganda marganes galogenlar, S, N, P, C, Si bilan ham reaksiyaga kirishib, $MnCl_2$, MnS , Mn_3N_2 larni hosil qiladi:




Marganes azot, fosfor va kremniy bilan o'zgaruvchan tarkibli birikmalar hosil qilishi ma'lum:

MnP , MnP_3 , Mn_2P , Mn_3P , Mn_3C , Mn_5C_2 , $Mn_{15}C_4$, Mn_7C_3 , Mn_8C_7 , $MnSi$, Mn_4Si , Mn_5Si . Marganes suyultirilgan kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, ular tarkibidagi vodorodni siqib chiqaradi:

$Mn + 2HCl = MnCl_2 + H_2$ $Mn + H_2SO_4 = MnSO_4 + H_2$ Marganes konsentrlangan qaynoq sulfat va nitrat kislotalar bilan reaksiyalarga kirishganda vodorod ajralib chiqmaydi. balki, SO_2 yoki NO_2 ni hosil qiladi: $Mn + 2H_2SO_4 = MnSO_4 + SO_2 + 2H_2O$ $Mn + 4HNO_3 = Mn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ $3Mn + 8HNO_3 = 3Mn(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

Marganes ko'pgina metallarning oksidlari va tuzlaridan metallarni qaytaradi:






Marganes qizdirilganda ko'pgina metallmaslar va murakkab moddalar bilan reaksiyaga kirishib, tegishli birikmalar hosil qiladi:

Mn +	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mn}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
	$\text{O}_2 \rightarrow \text{MnO}, \text{Mn}_2\text{O}_3, \text{MnO}_2, \text{Mn}_2\text{O}_7$
	$\text{F}_2 \rightarrow \text{MnF}_2, \text{MnF}_3$
	$\text{Cl}_2 \text{ yoki } \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2$
	$\text{Br}_2 \text{ yoki } \text{HBr} \rightarrow \text{MnBr}_2$
	$\text{S}, \text{N}_2, \text{P}, \text{C} \rightarrow \text{MnS}, \text{MnS}_2, \text{Mn}_3\text{N}_2, \text{Mn}_3\text{P}_2, \text{Mn}_3\text{C}$
	$\text{NH}_3 \rightarrow \text{Mn}_2\text{N}_3$
	$\text{CO yoki } \text{CO}_2 \rightarrow \text{MnO}$
	$\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{MnO} + \text{Mn}_2\text{C}$
	$\text{Suyul. HCl, HNO}_3 \rightarrow \text{MnCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}, \text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
	$\text{Kons. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$


Eritmada akvakomplekslar hosil bo'ladi.



Marganes va uning analoglari uchun oddiy holda karbonilli neytral komplekslar $[\text{Me}_2(\text{CO})_{10}]$ formulaga ega. Odatdagi sharoitda $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ sariq, qattiq modda suyuqlanish harorati 155°C , oson haydaladi. Marganes oksidlariga muvofiq keladigan bir qator gidroksidlar olingan. Masalan: $\text{Mn}(\text{OH})_2$ va $\text{Mn}(\text{OH})_3$ asos xossasiga, $\text{Mn}(\text{OH})_4$ amfoter xossaga, Mn_2O_7 hamda ularning gidratlari H_2MnO_4 , HMnO_4 lar kislotali xossaga ega. Demak, marganesning valentligi ortishi bilan oksidlarning asos xossalari susayib, kislota xossalari kuchayadi. Yetti valentli marganesning barcha birikmalari juda kuchli oksidlovchilardir.

Marganesning birikmalari. Kislorod bilan quyidagi 5 xil oksidlari ma'lum: MnO va Mn_2O_3 asosli, MnO_2 amfoter, MnO_3 va Mn_2O_7 kislotali.


MnO	Mn_2O_3	MnO_2	MnO_3	Mn_2O_7
qaytaruvchi	←	amfoter	oksidlovchi	→




Amaliyotda marganesning (IV)-oksidi (kuchli oksidlovchi) va MnO oksidiga mos keluvchi tuzlari ko'p ishlatiladi.

Marganesning (II) valentli birikmalari. Marganes (II) oksidi **MnO** - yashil kukun. suyuqlanish harorati 1780°C, suvda erimaydi. O'zgaruvchan tarkibga ega (MnO-MnO_{1.5}).



1. Marganesning yuqori valentli oksidlarini vodorod bilan qaytarish orqali olinadi:




2. Marganesning tuzlarini qizdirish orqali:




Marganes (II) tuzlari qattiq holda pushti rangli, lekin eritmaları rangsiz. Ular odatda marganes (IV) tuzlariga kislota ta'sir qilib olinadi.



Marganesning suvda yaxshi eriydigan II valentli tuzlariga ishqorlar ta'siridan marganes (II) gidroksidi (oq cho'kma) hosil bo'ladi:





Oq cho'kma (Mn(OH)₂) oksidlanib qorayib qoladi:






Yuqorida keltirilgan reaksiyalar Mn(OH)₂ ning beqarorligini ko'rsatadi.

Kuchli oksidlovchilar ta'sirida Mn²⁺ birikmalari qaytaruvchilik xossasini namoyon qiladi. Ishqoriy muhitda oksidlansa manganatlar, agar kislotali muhitda oksidlansa permanganatlarga o'tishi ma'lum:



MnCl₂- gazlamalarni jigar rangga bo'yash uchun ishlatiladi.

MnS- qovoq rangli qattiq modda. Uni olish uchun marganes (II) tuzlariga sulfidlar ta'sir ettiriladi:



MnSO₄ oson qo'sh tuzlar hosil qiladi: K₂SO₄·MnSO₄·6H₂O

Al₂(SO₄)₃·MnSO₄·24H₂O gazlamalarni bo'yashda ishlatiladi.

Marganes(II) ning ko'p tuzlari

suvda yaxshi eriydi (MnS, MnF₂, Mn₃(PO₄)₂, MnCO₃ lardan tashqari).

Suvdagi eritmada akva komplekslar hosil qiladi. [Mn(H₂O)₆]²⁺ ning hosil bo'lishi kislotalar ishtirokida tezlashadi. Anion komplekslardan erkin holda K₄[Mn(OH)₆], Ba₂[Mn(OH)₆] ajratib olingan. K₄[Mn(CN)₆], K₄[MnF₆], K₂[MnCl₄] kabi eruvchan komplekslar ma'lum. ular suyultirilgan eritmalarda oson parchalanadi.



Marganesing III valentli birikmalari. Tabiatda Mn₂O₃ braunit holatida uchraydi. Qora tusli qattiq modda. Uning suyqlanish harorati 1650°C. MnO₂ ni yuqori haroratda (600-900°C) qizdirib olinadi:



Marganes (III) gidroksid MnO(OH) tarkibga ega deb ham qaraladi.

Marganes oksidlari ichida eng barqarori Mn₂O₄ bo'lib, bunday tarkib H₄MnO₄ kislotasi tuzi Mn₂MnO₄ sifatida qaralishi mumkin.


Marganesning IV valentli birikmalari. Mn(OH)₄- amfoter modda, bunday birikmalar ikki xil bo'ladi: **I-guruhga Mn⁴⁺ birikmalari.** Ular III valentli marganes birikmalaridan beqarorroq. Eng barqarori Mn(H₂AsO₄)₂ va disulfid MnS₂-gausrit. MnS₂- jigar rangli qattiq modda.

Odatdagi sharoitda barqaror. Qizdirilsa MnS va S ga parchalanadi. Marganesning kompleks birikmalari ancha barqaror: $\text{Me}_3[\text{MnF}_6]$.


MnO_2 - qora qo'ng'ir rangli, o'zgaruvchan tarkibga ega, amfoter oksid. 530°C gacha qizdirilsa o'zidan kislorod ajratadi. Suvda erimaydi, qizdirilsa ko'p kislotalar ta'siriga chidamli:







2-guruhga orto- va metamarganes kislotalarining H_2MnO_4 (ortomanganit), H_3MnO_3 (metamanganit) tuzlari kiradi. Bu kislotalar erkin holda olinmagan, lekin ularning tuzlari ma'lum:



Marganes (IV) oksidining qaytarilishi:



Marganes (IV) oksidining kislotali muhitda oksidlanishi:




Marganesning V valentli birikmalari. H_2MnO_4 beqaror va mavjud emas, shu paytgacha olinmagan. Bu kislotalarning tuzlari Na_2MnO_4 va K_2MnO_4 olingan.


Marganesning VI valentli birikmalari. MnO_3 va H_2MnO_4 erkin holda olinmagan, ular beqaror.

Manganatlar metall holidagi, yoki marganes oksidlari, tuzlarini kislorod bilan ishqor ishtirokida

syuqlantirib olinadi:





Neytral va kislotali muhitda disproportsiyalanish reaksiyasi ketadi:



Marganesning (VII) valentli birikmalari. Odatdagi sharoitda Mn_2O_7 , marganes (VII)-oksidi qo'ng'ir-yashil rangli moysimon suyuqlik bo'lib, syuqlanish harorati $5,9^\circ C$ ga teng.

Uni olish uchun kaliy permanganatga sulfat kislotaga ta'sir ettiriladi. Natijada, hosil bo'lgan Mn_2O_7 qizdirilganda, MnO_2 va O_2 ga parchalanib ketadi:




Marganes (VII) oksidi suvda erib permanganat kislotani hosil qiladi:



Permanganat kislotaga va uning tuzlari eritmasi **pushti** rangli. Juda kuchli kislotaga, faqat suvdagi eritmada 20% gacah mavjud. 0,1 N li eritma uchun $\alpha=93\%$.

Agar kristallik kaliy permanganatga 2-4 tomchi konsentrlangan sulfat kislotaga qo'shib, shisha tayoqcha bilan aralashtirilsa va bu tayoqcha efir yoki spirt bilan ho'llangan paxtaga tegizilsa u darhol o'z-o'zidan alanga berib yonib ketadi. Juda kuchli oksidlovchi. Ko'p yonadigan moddalar-qog'oz, spirt, efir bu oksidga tegishi bilan o'z-o'zidan yonib ketadi.

$KMnO_4$ - kaliy permanganat. Olinishi. Marganes (IV) oksidiga KOH bilan kislod qo'shib olinadi.



Kaliy permanganat - to'q-qizil rangli kristall modda bo'lib, suvda juda yaxshi eriydi. Kuchli oksidlovchilik xossasiga ega. Uning oksidlovchilik xossasi eritmaning muhitiga qarab turlicha bo'ladi. Permanganatlar bilan oksidlash sharoitiga qarab har xil ketadi.



+ $5\text{Cl}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ Ishqoriy muhitda: $2\text{KMnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{KOH} = \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

Neytral muhitda: $2\text{KMnO}_4 + 3\text{K}_2\text{SO}_3 + 11\text{H}_2\text{O} = 2\text{MnO}_2 + 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{KOH}$

Kaliy permanganat qizdirilganda parchalanadi va bu usuldan laboratoriyada kislorod olish maqsadida foydalaniladi: $2\text{KMnO}_4 = \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$

Marganes (VII)-oksidiga mos keluvchi permanganat kislota (HMnO_4) kuchli kislota bo'lib, beqaror va u suvda osongina parchalanib ketadi.

Texnikada KMnO_4 organik moddalarni oksidlovchi reagent sifatida ishlatiladi. Shuningdek jun, gazlamalarni oqartirishda ham tibbiyotda ham ishlatiladi.

Ishlatilishi. Marganes va uning birikmalarining xalq xo'jaligida quyidagi sohalarda ishlatiladi: po'lat ishlab chiqarishda, qotishmalar tayyorlashda, metall buyumlar sirtini qoplashda, katalizatorlar sifatida. mikroo'g'itlar $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, oksidlovchilar, tibbiyotda. Bundan tashqari marganes. asosan. metallurgiya sanoatida ishlatiladi. Marganes. asosan (90%), metallurgiyada po'latni oksidsizlash, oltingugurtdan tozalash va legirlashda ishlatiladi (po'latga qovushqoqlik va qattiqlik beradi). Cho'yanni po'latga aylantirishda unga marganes qo'shilsa, cho'yandagi oltingugurt chiqib ketib, shlakka o'tadi. Marganes xilma-xil rangdor qotishmalarning korroziyalanmaslik xususiyatini oshirish maqsadida ularga qo'shiladi. **Manganin** deb ataladigan qotishma (bu qotishma **Mn-13%**, **Ni-4%**, **Cu-83%** dan iborat) muhim ahamiyatga ega. Temperaturaning o'zgarishi **manganinning** elektr o'tkazuvchanligiga ta'sir etmaydi, desa bo'ladi. **Manganin** simning elektrotexnikada qarshilik g'altaklar tayyorlash uchun ishlatilishi ana shunga asoslangan. Tarkibida marganes saqlaydigan po'latlar temir yo'l strelkalari. o'q o'tmaydigan tank korpuslari qurishda ishlatiladi. Uni asosida elektr o'tkazuvchanligi kam **manganat** qotishmasi olinadi (12% Mn, 84% Sn, 4% Ni). Eng asosiy qotishmasi **ferromarganes** (60-90% Mn va 40-10% Fe).


Laboratoriyada bajariladigan ishlar

1-tajriba. Marganets (II) gidroksidning olinishi va xossalari. Ikki valentli marganets tuzi eritmasidan probirkaga 3-4 ml quying va unga xuddi shuncha xajm ishqor eritmasidan qo'shing. Probirkada hosil bo'lgan cho'kmani suyuqligi bilan to'rt qismga bo'ling. Birini shunday ochiq havoda qizdiring, ikinchisiga - kislotaga eritmasidan, uchinchisiga - ishqor eritmasidan, to'rtinchisiga esa ozgina vodorod peroksid yoki bromli suv qo'shing. Nima kuzatiladi? Xar qaysi probirkada sodir bo'ladigan xodisani tushuntiring va reak-siya tenglamalarini yozing.

2-tajriba. Marganets tuzlarining o'zaro ta'siri. Probirkaga ikki valentli marganets tuzi eritmasidan 1-2 ml quying va unga xuddi shuncha hajim kaliy permanganat eritmasidan qo'shing. Nima kuzatiladi? Eritmaning muxitini lakmus qog'ozi bilan tekshiring. Reaksiya natijasida marganets (IV) oksidini cho'kmasi hosil bo'lishini va reaksiyada suv ishtirok etishini e'tiborga olib reaksiya tenglamasini yozing.

Nazorat savollari

Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksivalarining to'liq tenglamasini yozib oksidlovchi va qaytaruvchi moddalarini ko'rsating:



Glossariy

Absolut temperatura. Absolut nol ($-273,16^{\circ}\text{C}$) dan hisoblangan temperatura.

Gazlar uchun Gey – Luyssak qonuni ma'lum.

Adgeziya. Turli moddalar zarralari orasida vujudga keluvchi kuchlar (masalan, suv va shisha orasida).

Addukt. Lyusi kislota – asos reaksiyasidagi kabi ba'zi molekulalarning bir-biri bilan shu nomli moddani hosil qilganda protonning bir o'xshash atomdan ikkinchi siga o'tishi (masalan, karbonat kislota.)

Adsorbsiya. Ba'zi moddalarning inert material yuzasida yutilish xususiyati.

Akseptor. Elektron juftini qabul qiluvchi atom yoki ion.

Aktiv metallar. Davriy jadvalning dastlabki ikki guruhi chap qismidagi tashqi-elektronli elementlar.

Aktiv loyqa. Oqova suvlarni tozalash vaqtida bakteriyalar hosil qiluvchi massa.

Alkazol (asidoz). Qon gemoglobinida kislorod ko'chish mexanizmining buzilishi.

Allotropiya. Bir elementning turli shakllarda mavjud bo'lishi. Kislorod bilan

ozon yoki ko'mir, grafit, olmos bir-biri bilan allotroplar hisoblanadi.

Amorf modda. Atomda regularlik holati mavjud bo'lmagan qattiq modda.

Analeptik moddalar. (analeptiklar). Nafas olishni yengillashtiruvchi preparatlar. Bularga tetrazol hosilalari, masalan, korozol (VI), glutarimid, kordiamin (VIII), eti mizol (IX) va boshqalar kiradi.

Apatit. Umumiy formulasi $\text{Ca}_5[\text{PO}_4]_3\text{X}_2$, bu yerda x – odatda F (florapatit), ba'zan (klorapatit). Keng tarqalgan mineral. uning asosiy qismi fosforli o'g'itlar va tuzlar olishda, qora va rangli metallurgiya hamda keramika va shisha ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Argentometriya. Anionlar (galogenlar, CN^- , PO_4^{3-} , CrO_4^{2-} va boshqa) ionlarni aniqlashning titrimetrik usuli. Bunda tadqiq qilinayotgan eritma standart eritma AgNO_3 bilan titrlanadi. Mor, Fayans va Folgard usullari ma'lum.

Arsenatlar. Mishyak (As) ning kislorodli kislotalari. Oltin va platina gruppasi elementlaridan boshqa metallarning hammasida arsenatlar olinan.

Asbestlar. Tola tuzilishiga ega silikatlar shunday nomlanadi. Bular issiqlikni izolyatsiya qilishda keng qo'llaniladi.

Asboplastiklar. Tarkibiga mustahkamlovchi modda sifatida asbest kukuni (presslangan va quyma massalar), tolalar (asbovoloknit), qog'oz (asbogetinaks) va gazmol (asbostekstolit) kiritilgan materiallar. Bular issiqlikka chidamli (250°C) ga cha va o'tga chidamli material bo'lib, yuqori fraktsion, elektroizolyatsion va antikorrozion xususiyatga egadir.

Barometr. Atmosfera bosimini o'lchovchi asbob. 700 mm simob ustuniga teng bosimni ushlab turadigan bosim standart atmosfera bosimi hisoblanadi. 1mm simob ustuniga teng bosim birligi, barometрни ixtiro qilgan italyan olimi Evengelista Torrichelli nomidan olinib torr deb ataladi, ya'ni 1mm s.u.=1 torr.

Bimolekulyar reaksiyalar. Bir dona molekulya ishtirokida boradigan reaksiyalar monomolekulyar yoki shu bir bosqichli reaksiyada ikki molekulya ishtirokida borsа bimolekulyar va uchta molekulya qatnashganda uch molekulyarli reaksiya nomi bilan yuritiladi.

Bufеr eritmalar. Ko'pgina suvli eritmалarга ozroq miqdordagi kislotа yoki ishqor qo'shilganda o'zining vodorod ko'rsatkichi pH ni o'zgartirmaydi. Bunday eritmalar buffer eritmalar deb ataladi.

Valentlik. Elementning kimyoviy bog'lanish hosil qilish xususiyati valentlikdir. Hozirda kimyoviy bog'lanishda ishtirok etuvchi elektronlar valent elektronlari sifatida qaraladi va nuqtalar (boshqacha aytganda Lyuis belgilari) bilan ifodalanadi.

Daniel-Yakobi elementi. Mis – ruxli galvanik element. Tegishliча CuSO_4 va ZnSO_4 eritmalariga tushirilgan Cu va Zn elektrodlaridan iborat bo'lib, g'ovak to'siq bilan to'silgan: $\text{Cu} \mid \text{CuSO}_4 \mid \text{ZnSO}_4 \mid \text{Zn}$. Hozirda laboratoriyalardagi tadqiqotlarda qo'llaniladi.

Dipol momenti. Molekulaning qutblilik o'lchami (μ). U quyidagicha aniqlanadi: $\mu = Qr$, bu yerda Q dipol zaryadi, r – zaryadlar (musbat va manfiy) orasidagi maso'fa. Ikkitadan ortiq atomga ega molekula dipol momenti bog'larining qutblanganligi va molekular geometriyaga bog'liq bo'ladi.

Korroziya (Zanglash). Atrof-muhitning ta'siri ostida metallarning o'z-o'zidan zanglab chirishi yoki parchlanishi. Korroziyaning xillari ko'p bo'lib, ularga qarshi kurashishda *ingibitorlardan* foydalaniladi.

Krcmniyorganik birikmalar. Tarkibida Si – C bog' mavjud birikmalar. Ba'zan tarkibida kremniy bo'lgan barcha organik birikmalarni ham shunday atashadi. Bu birikmalarning organogalogenisilanlar, alkoksisisilanlar va aroksilanlar kabi guruhlari ma'lum.

Lantanoidlar. Davriy sistemaning 57–71 sonli 14 ta f – elementlar oilasi shun day nom bilan ataladi. Mazkur elementlar xossalari bo'yicha bir-biriga o'xshaydi. Birikmalarida +3 ga teng oksidlanish darajasini namoyon qiladi.

Magnitlik xossasi. Moddaning magnit maydoniga tortilishidir. Oddiy molekula ega kislorod boshqalardan farqli o'laroq, paramagnitlik xossasini namoyon qilishi bilan ajraladi. Buni magnit yordamida probirkaga solingan suyuq kislorodda ko'rish mumkin.

Metall bog'lanish. Miqdorlari bir-biriga teng bo'lgan harakatchan elektronlar bilan metall ionlari orasidagi tortishuv kuchlari hisobiga paydo bo'lgan bog' *metall bog'lanish* deb ataladi. Metalldagi har bir atom bir necha qo'shni atomlar bilan bog'liq bo'ladi. Erkin harakatlanuvchi elektronlar tufayli elektr o'tkazuvchanlik yuzaga keladi.

Oksidlar. Elementlarning kislorodli birikmalari.

Oksidlovchilar. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalaridagi *oksidlovchi* moddalar dir. Bular elektronga moyilligi bilan xarakterlanadi, boshqa moddalardan elektron larni tortib olib ularni oksidlaydi. Bunda oksidlovchi elektronni biriktirgani holda o'zi qaytariladi. Shunga o'xshash qaytarilishni amalga oshiruvchi modda *qaytariluvchi* deyiladi. Reaksiyada qaytariladigan modda doimo oksidlovchi, oksidlanayotgan modda esa – qaytaruvchi hisoblanadi.

Orbita. Atomda elektronning harakat yo'li.

Osmos. Zarrachalarning bir yoqlama diffuziyasi

Sulfidlar. Kimyoviy elementlarning oltingugurtli birikmalari. Ularga ZnS , CdS , As_2S_3 , Bi_2S_3 va boshqalar misol bo'la oladi.

Talk – tekis listlardan iborat strukturaga ega bo'lgan mineral. Formulasi $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ bo'lib, qavatlarining sirg'anishi grafitnikiga o'xshaydi. Shu bois uning kukuni sirg'anchiq bo'ladi.

Xlorformetanlar. Bular ko'p vaqt davomida sovitish uskunalarida xladagentlar sifatida qo'llanilib kelingan birikmalardir. Osmonga ko'tarilganda ozonni parcha lashga sababchi bo'ladilar. Hozirgi vaqtda ulardan kamroq foydalanilmoqda, o'miga zararsiz uglevodorodlardan tayyorlangan moddalar ishlatila boshlandi.

Sement. Vakillaridan biri portlandsementdir. Uni ohaktosh, qum, tuproq ara lashmasini pechda $1500^{\circ}C$ atrofida qizdirib olinadi. Olingan massa maydalanga nidan keyin unga ozroq miqdorda gips $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ qo'shiladi. Mazkur sement-beton tayyorlashda ko'plab ishlatiladi.

Sementit. Perlitli nomini olgan po'lat strukturali modda temir va Fe_3C birikma sining geterogen aralashmasidan iborat bo'lib, «sementit» deb ataladi. U qurilish larda keng qo'llaniladi.

Cho'yan. Domna pechlarida olinadigan temir – *cho'yan* deb ataladi. uning tarkibida 5% gacha uglerod va 2% atrofida boshqa aralashmalar bo'ladi. U texnika, sanoat, qurilish va boshqa sohalarida keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh. M.* «Buyuk kelejagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz». –T.: «O'zbekiston», 2017.
2. *Mirziyoyev Sh. M.* «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi». –T.: «O'zbekiston», 2017.
3. *Mirziyoyev Sh. M.* «Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birga likda barpo etamiz». –T.: «O'zbekiston», 2016
4. *Eminov A.M., Ahmerov Q.M. Turobjonov S.* "Umumiy va anorganik kimyodan laboratoriya mashg'ulotlari ", T., 2007, 14 b.t.
5. *Ahmerov Q., Jalilov A., Sayfutdinov R. Akbarov A.* Turobjonov . "Umumiy va anorganik kimyo", T., "O'qtuvchi". 2017
6. *Ibrohimova G.T., Ahmerov Q.* "Umumiy kimyoni mustaqil o'rganish". T., "O'qtuvchi", 1993 .
7. *J.P. Fakler, Jr. Larru. R. Falvello.* Techniques in Inorganic Chemistru. London, New Iork. 2011
8. *P.W. Atkins. T.J. Overton. J.P. Rourke. M.T. Weller. F.A. Armstrong.* Inorganic Chemistri. New York, 2015.
9. *D. Shrayver, P. Etkins.* Неорганическая химия (в двух томах, перевод с англий ского). М., «Мир». 2004
10. *Н.С. Ахметов.* Общая и неорганическая химия. «Высшая школа». М., 2002.
11. *К.М. Ahmerov, A. Jalilov, R.S. Sayfutdinov.* Umumiy va anorganik kimyo. T; «O'zbekiston», 2003. 2006.
12. *К. Хаускрафт, Э. Коистбел.* Современный курс общей химии (т. 1, 2). М., «Мир», 2002 (перевод с английского).
13. *А.И. Горбунов.* Теоретические основы общей химии. – М., 2001.
14. *Н.Л. Глинка.* Задачи и упражнения по общей химии. Интеграл-Пресс. – М., 2002.

MUNDARIJA

SO'Z BOSH	
KIRISH.....	
1.0 KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHALARI	
1.1 Moddalarning kimyoviy fo'rmlasini tuzish	
1.2. Atomlar o'lchami va massasi	
1.3. Ideal gaz qonunlari	
2.0. ANORGANIK BIRIKMALARNING ASOSIY SINFLARI	
2.1. Oksidlar	
2.2. Asoslar	
2.3. Kislotalar	
2.4. Tuzlar	
2.4.1. aralashma tarkibidagi tuzning foiz miqdorini aniqlash	
2.4.2. Moddalar kimyoviy fo'rmlasini tuzish	
3.0. EKVIVALENTLAR QONUNI	
4.0. KIMYOVIY REAKSIYALAR ENERGETIKASI	
5.0. KIMYOVIY KINETIKA	
5.1. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar	
5.2. Konsentratsiyaning reaksiya tezligiga ta'siri(massalar ta'siri qonuni)	
5.3. Temperaturaning ta'siri	
5.4. Katalizator tasiri	
5.5. Qaytar va qaytmas kimyoviy reaksiyalar	
5.6. Kimyoviy muvozanat	
6.0. ERITMALAR	
6.1. Eritma konsentratsiyalarini ifodalash usullari	
6.2. Eritgan moddaning massa ulishi	
6.3. Eritmalar tayyorlash	
6.4. Molyar konsentratsiya	
6.5. Normal konsentratsiya	
6.6. Titr konsentratsiya	
7.0. ELEKTROLITIK DISSOLTSILANISH	
7.1. Moddalarning suvda erish mexanizmi	
7.2. Ionlarning elektron konfiguratsiyasi	
7.3. Ion radiusini taqqoslash	
7.4. Kislota, asos, tuzlarning dissotsiylanishi	
7.5. Elektrolitik dissoltsilanish nazariyasi	
7.6. Kuchsiz elektrolitlar	
7.6.1. Ionlarning suvda eriganda issiqlik chiqishi yoki yutilishiga sababchibo'lgan omillar	

7.7. Ion almashinish reaksiyalari	
7.8. TUZLAR GIDROLIZI	
7.9. Indikatorlar	
8.0. OKSIDLANISH –QAYTARILISH REAKSIYALARI	
9.0. GALVANIK ELEMENTLAR	
10.0. ELEKTROLIZ JARAYONI	
11.0. KOORDINATSION (KOMPLEKS) BIRIKMALAR TUZILISHI.	
11.1. Kompleks birikmalar nomenklaturasi va izomeriyasi	
12.0. S-BLOK ELEMENTLARI	
13.0. IKKINCHI GURUH S ELEMENTLARI	
14.0. O'N UCHINCHI GRUPPA ELEMNTLARNING UMUMIY TAVSIFI	
15.0. O'N TO'RTINCHI GRUPPA ELEMENTLARNING UMUMIY TAVSIFI	
15.1. Uglerod gruppasi	
15.2. Karbidlar	
15.3. Kremniy Si	
16.0. O'N BESHINCHI GRUPPA ELEMENTLARNING UMUMIY TAVSIFI	
16.1. Azot	
16.2. Fosfor	
17.0. O'N OLTINCHI GRUPPA ELEMENTLARNING UMUMIY TAVSIFI	
17.1. Kislorodning ochilishi va xossalari	
17.2. OZON	
18.0. O'N YETTINCHI GRUPPA ELEMNTLARNING UMUMIY TAVSIFI	
18.1. Vodorod va uning birikmalari	
18.2. Galogenlar va ularning birikmalari	
19.0. d-BLOK ELEMENTLARI	
19.1. Xrom, molibden, volfram elementlarining tavsifi	
19.2. Marganes, Texnetsiy, Reniy elementlarning tavsifi	
Glossariy	

