


316
P-15

Ф. Р. РАЖАБОВ, А. Н. НУРМЕТОВ

АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРА

*Педагогика институтларининг „Умумтехник
таълим ва меҳнат“ мутахассислиги студентлари
учун ўқув қўлланма*



ТОШКЕНТ „ЎҚИТУВЧИ“ 1990

СЎЗ БОШИ

Махсус муҳаррир—физика-математика фанлари номзоди,
доцент Н. Дадажонов.

Қўлланма педагогика институтларининг „Умумтехник таълим ва меҳнат“ мутахассислиги учун „Олий математика“ программаси асосида ёзилган. Унда олий математика курсининг векторлар алгебраси элементлари, аналитик геометрия элементлари ва чизиқли тенгламалар системасини ечиш бўлимлари материални қисқача баён этилган. Назарий материални ўзлаштиришга ёрдам берадиган етарли мисоллар берилган.

Китоб педагогика институтлари талабаларига мўлжалланган.

Мазкур қўлланма педагогика институтларининг „Умумтехник таълим ва меҳнат“ мутахассислиги бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган бўлиб, шу мутахассислик учун тасдиқланган „Олий математика“ программасининг I курс материални ўз ичига олади. Қўлланманинг асосий вазифаси аналитик геометрия ва чизиқли алгебра курсига доир назарий материални қисқача баён этиш, темаларга доир мисол ва масалаларни ечиш усуллари кўрсатишдан иборат. Қўлланма 9 та боб ва баъзи ажойиб эгри чизиқларга бағишланган иловадан иборат. Муаллифлар программа материални иложи борича қисқа, зарур жойларда мисоллар ечиш орқали тушунтириш билан баён этишга ҳаракат қилдилар. Ҳар қайси боб сўнгида талабаларнинг муштарак ечишлари учун машқлар келтирилган.

Қўлланмага муаллифларнинг В. И. Ленин номидаги Хоразм Давлат педагогика институтининг физика-математика ва ОТД факультетларида кўп йиллар давомида ўқиган лекция ва амалий машғулот материаллари асос қилиб олинди. Бундан ташқари шу соҳага тегишли манжуд ўзбек ва рус тилидаги адабиётлардан ҳам кенг фойдаланилди. Фойдаланилган адабиёт рўйхати китоб охирида келтирилган.

Китоб қўлёзмасини ўқиб чиқиб ўзларининг фикр-мулоҳазаларини билдирган Хоразм Давлат педагогика институти алгебра ва математика ўқитиш методикаси кафедрасининг мудир, физика-математика фанлари номзоди, доцент И. А. Абдуллаев, катта ўқитувчи С. М. Машарипова, Тошкент Давлат педагогика институти геометрия кафедрасининг мудир, физика-математика фанлари номзоди, доцент И. Р. Юнусметов, Фаргона Давлат педагогика институти геометрия ва математика ўқитиш методикаси кафедрасининг мудир, педагогика фанлари номзоди, доцент Н. С. Сотволдиев, шу кафедра доценти, физика математика фанлари номзоди Т. Абдурахмоновларга ва қўлланманинг мах-

Р 1602050000—244
353(04) — 90 170—90

© „Ўқитувчи“ нашриёти, 1990

ISBN—5—645—00502—2

сус муҳаррирлик вазифасини ўз зиммасига олиб, ундаги камчиликларни тузатишга ёрдам берган Тошкент Давлат педагогика институтининг доценти, физика-математика фанлари номзоди Н. Дадажоновга муаллифлар узларининг чуқур миннатдорчилигини билдирадилар.

Муаллифлар қўлланма ҳақида билдирилган фикр ва мулоҳазаларни миннатдорчилик билан қабул қиладилар.

Муаллифлар

ДЕТЕРМИНАНТЛАР ВА ЧИЗИҚЛИ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАЛАРИ

Бу бобда иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар назариясига доир маълумотлар ҳамда детерминантлардан фойдаланиб икки ва уч номаълумли чизиқли тенгламалар системаларини ечишни урганамиз.

1-§. Иккинчи тартибли детерминантлар

Иккинчи тартибли детерминант тушунчасига икки номаълумли иккита чизиқли тенглама системасини ечиш орқали келамиз.

Айтайлик, ушбу

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad (1)$$

чизиқли тенгламалар системаси берилган бўлсин, бунда номаълумлар олдидаги коэффициентлардан камда биттаси нолдан фарқли. (1) системанинг тенгламаларидан биринчисининг ҳар иккала қисмини b_2 га, иккинчисини эса $-b_1$ га кўпайтириб, уларни ҳадма-ҳад қўшиб қуйидагини топамиз:

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = c_1b_2 - c_2b_1.$$

Шундан кейин биринчи тенгламанинг ҳар иккала қисмини $-a_2$ га, иккинчи тенгламанинг ҳар иккала қисмини эса a_1 га кўпайтириб ва ҳадма-ҳад қўшиб,

$$(a_1b_2 - a_2b_1)y = a_1c_2 - a_2c_1$$

ни топамиз.

Агар $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ бўлса, (1) системанинг ечимлари мавжуд бўлиб, бу ечим қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} x &= \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \\ y &= \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}. \end{aligned} \quad (2)$$

$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ бўлган ҳол кейинроқ алоҳида қаралади.

(1) системанинг x ва y ўзгарувчилари олдидаги коэффициентларидан ушбу

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

жадвални тузамиз. Одатда бундай жадвал *матрица* деб аталади. Бундай кўринишдаги ифодалар математиканинг турли соҳаларида кўп учраб туради. Шунинг учун улар учун махсус белгилаш ва номлар киритиш мақсадга мувофиқдир.

$\Delta = a_1 b_2 - b_1 a_2$ ифода (сон) (3) матрицанинг *детерминанти* дейилади ва у қуйидагича белгилансади:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \text{ ёки } \Delta = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

a_1, b_1, a_2, b_2 сонлар (4) дегерминантнинг *элементлари* дейилади. Бу дегерминантнинг иккита сатри ва иккита устуни бор: a_1, a_2 сонлар биринчи устуни, b_1, b_2 сонлар иккинчи устуни ташкил қилади. Худди шундай, биринчи сатр элементлари: a_1, b_1 , иккинчи сатр элементлари a_2, b_2 дан иборатдир.

a_1 ва b_2 элементлар *бош диагональ* элементлари, a_2 ва b_1 элементлар *ёрдамчи диагональ* элементлари дейилади. Шундай қилиб, иккинчи тартибли дегерминантни ҳисоблаш учун бош диагоналда турган элементлар купайтмасидан ёрдамчи диагоналда турган элементлар купайтмасини айириш керак, яъни

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Мисол. Қуйидаги дегерминантларни ҳисобланг.

$$1) \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

Ечиш. Иккинчи тартибли дегерминантни ҳисоблашнинг юқоридаги қондасига кўра топамиз:

$$1) \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) - 1 \cdot (-5) = -6 + 5 = -1;$$

$$2) \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot (-\sin \alpha) = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

2-§. Икки номаълумли иккита тенглама системасини текшириш

(1) тенгламалар системасини аналитик усулда текширишга ўтамиз. (1) система ечимга эга деб фараз қиламиз. Оддинги параграфда топилганлардан фойдаланиб қуйидагича ёзиш мумкин:

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad c_1 b_2 - c_2 b_1 =$$

$$-\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad a_1 c_2 - a_2 c_1 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Ушбу

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

белгилашларни киритамиз, натижада (2) муносабатлар ушбу кўринишни олади:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}; \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}; \quad (5)$$

бу ерда Δ (1) системанинг дегерминанти дейилади. Δ_x дегерминант эса Δ нинг биринчи устун элементларини озод ҳадлар устуни билан алмаштириш орқали, Δ_y эса Δ нинг иккинчи устун элементларини озод ҳадлар устуни билан алмаштириш орқали ҳосил қилинган.

1. Аввал $\Delta \neq 0$ бўлган ҳолни қараймиз. Бу ҳолда (1) система ҳар доим ечимга эга ва бу ечим ягона бўлиб, у (2) формулалар билан берилади.

2. $\Delta = 0$ бўлсин, у ҳолда ёрдамчи дегерминантлардан ҳеч бўлмаганда биттаси нолдан фарқли бўлса, (1) система битта ҳам ечимга эга эмас. Бунда (5) нинг тенгламаларидан камиди бири ўринли бўлмайди. Шундай қилиб, $\Delta = 0$ бўлганда ва Δ_x ёки Δ_y ёрдамчи дегерминантлардан камиди биттаси нолдан фарқли бўлса, (1) система ечимга эга эмас. Одатда бундай ҳолда берилган системанинг тенгламалари биргаликда эмас дейилади.

3. Ниҳоят, $\Delta = 0$ ва $\Delta_x = \Delta_y = 0$ бўлсин. Бу ҳолда биринчи тенгламанинг коэффициентлари иккинчи тенгламанинг коэффициентларига пропорционал бўлади ва (1) система чексиз кўп ечимга эга бўлади.

Қоринда аниқланганларини яқинлаб қуйидаги хулосани чиқариш мумкин: (1) система ечимга эга бўлиши учун унинг детерминанти нолдан фарқли бўлиши зарур: $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$. $\Delta \neq 0$ бўлганда (1) нинг ягона ечими қуйидагича топилади:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Бу формулалар **Крамер формулалари** дейилади.

Мисол. Ушбу тенгламалар системасининг барча ечимларини топинг:

$$\begin{cases} x + 3y = 4, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Ечиш. Системанинг детерминантларини тузамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 3 = -7,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 8 = -7.$$

$\Delta \neq 0$ бўлгани учун, система ягона ечимга эга. Крамер формулаларига кўра:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-7}{-7} = 1,$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-7}{-7} = 1.$$

3-§. Учинчи тартибли детерминантлар

Ушбу

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

тенгламалар системаси берилган бўлсин. Худди иккита чизиқли тенгламалар системасидагига ўхшаш, бу ер-

да ҳам учинчи тартибли детерминант тушуничасини киритамиз. Бу система коэффициентларидан тузилган учинчи тартибли квадрат матрица берилган бўлсин:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (6)$$


(6) матрицанинг учинчи тартибли детерминанти деб

$$\Delta = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3 \quad (7)$$

сонга айтилади. Иккинчи тартибли детерминант бўлган ҳолдаги символикадан фойдаланиб, бу детерминант бундай белгиланади:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

(7) даги ҳар қайси кўпайтма детерминантнинг ҳадлари дейилади. Ҳадлар олдидаги ишораларни эсда сақлаш қийин эмас. Қуйидаги схемалар бўйича (7) га кирувчи мусбат ва манфий ҳадларни аниқлаш осон:



Қулайлик учун детерминантнинг элементларини иккита индексли битта ҳарф билан белгилаш қабул қилинган бўлиб, бу индекслар, элемент турган сатр ва устунларнинг нумерларини: биринчи индекс ҳар доим сатр номерини, иккинчи индекс эса устун номерини курсатади. Масалан, a_{32} ҳаднинг индекси учинчи сатрнинг иккинчи устуни элементи эканини билдиради. Бу белгилашлардан фойдаланиб, учинчи тартибли детерминантни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Мисол. Қуйидаги учинчи тартибли детерминантларни ҳисобланг:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix}; \quad 2) \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix}.$$

Юқоридаги схема ва (7) формулага кўра топамиз:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 4 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \cdot 5 - 1 \cdot (-1) \cdot 4 = -1;$$

$$2) \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix} = a \cdot a \cdot a + 1 \cdot 1 \cdot a + a \cdot (-1) \cdot (-1) - a \cdot a \cdot a - a \cdot 1 \cdot (-1) - a \cdot 1 \cdot (-1) = 4a.$$

4-§. Детерминантни берилган устуни ёки сатри элементлари бўйича ёйиш

n та сатр ва n та устундан иборат ушбу квадрат жадвал берилган бўлсин:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (9)$$

Бу жадвалга n -тартибли квадрат матрица дейилади. i -сатр ва j -устун кесишган жойда турган элементни a_{ij} билан белгилаймиз. Биз детерминантни берилган устуни ёки сатри элементлари бўйича ёйишда солдалик учун $i, j=1, 2, 3$ қийматлар билан чегараланамиз. Бошқача қилиб айтганда, учинчи тартибли квадрат матрица билан шуғулланамиз.

Детерминант элементининг алгебраик тўлдирувчиси тушунчасини киритамиз. Ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (10)$$

детерминантнинг a_{ik} элементини олайлик. Ушбу

$$A_{ik} = (-1)^{i+k} \Delta_{ik}, \quad (i, k = 1, 2, 3) \quad (11)$$

сон a_{ik} элементининг алгебраик тўлдирувчиси дейилади. Бу ерда Δ_{ik} — иккинчи тартибли детерминант. У берилган детерминантдан i -сатр ва k -устунни ўчириш орқали (ўчирилмай қолган элементлардан) ҳосил бўлади. Δ_{ik} детерминант a_{ik} элементининг минори дейилади. Айтилганга кўра a_{22} элементининг алгебраик тўлдирувчиси қуйидагидан иборат бўлади

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix},$$

минори:

$$\Delta_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Худди шундай a_{21} нинг алгебраик тўлдирувчиси

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

дан иборат.

Детерминантни берилган сатри ёки устуни элементлари бўйича ёйишдан фойдаланиб, детерминантларни ҳисоблаш ишнинг осонлаштириш мумкин. Қуйидаги тасдиқни исботсиз келтирамиз:

Теорема. Детерминант исталган сатри ёки устуни элементлари билан шу элементлар алгебраик тўлдирувчилари купайтмаларининг йиғиндисига тенг:

$$\Delta = a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22}(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{32}(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32}.$$

(Теорема исботи А. Г. Курошнинг „Олий алгебра курси“ китобида келтирилган.) Теорема юқори тартибли детерминантлар учун ҳам ўринли эканини қайд қилиб ўтамиз.

Мисол. Қуйидаги 3-тартибли детерминантни 1-сатри элементлари бўйича ёйиб ҳисобланг.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix}.$$

Ечиш.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \\ + (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = (-2 + 5) - 2 \cdot (4 - 3) + (-10 + 6) = \\ = 3 - 2 - 7 = -6.$$

5-§. Детерминантнинг хоссалари

1. Детерминантнинг ҳамма устунларини унинг мос сатрлари билан (ёки аксинча) ўрнини алмаштиришдан детерминант ўзгармайди, яъни

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Исбот. Δ — берилган детерминант, Δ^* эса Δ дан унинг сатрларини мос устунлар билан алмаштиришдан ҳосил булган детерминант бўлсин. Δ ни биринчи сатр элементлари бўйича ёямиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \\ - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Энди Δ^* ни биринчи устун элементлари бўйича ёйиб чиқамиз:

$$\Delta^* = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \\ - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{23} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Демак, $\Delta = \Delta^*$.

2. Детерминантнинг исталган иккита сатрининг (ёки икки устунининг) ўринлари алмаштирилса, детерминантнинг фақат ишораси ўзгаради. Масалан, агар биринчи ва учинчи сатрларнинг ўринларини алмашгирсак:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}.$$

3. Иккита сатри ёки иккита устуни бир хил бўлган детерминантнинг қиймати нолга тенг.

4. Бирор сатр (ёки устун) элементларининг умумий кўпайтувчисини детерминант белгисидан ташқарига чиқариш мумкин.

Исбот. Айтайлик, детерминантнинг иккинчи сатр элементлари умумий кўпайтувчига эга бўлсин:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Бу детерминантни иккинчи сатр элементлари бўйича ёямиз:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = ka_{21}A_{21} + ka_{22}A_{22} + ka_{23}A_{23} = k(a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}) = k\Delta.$$

5. Агар детерминант бирор i -сатри (устуни) нинг ҳар бир элементи иккита қўшилувчининг йиғиндисидан иборат, яъни $a_{ik} = b_k + c_k (k = 1, 2, \dots, n)$ бўлса, у ҳолда берилган детерминант шундай иккита детерминантнинг йиғиндисига тенг бўладики, бу детерминантларнинг i -сатридан бошқа сатрлари дастлабки детерминантникидай бўлади, уларнинг биридаги i -сатр b_k элементлардан, иккинчиси эса c_k элементлардан иборат бўлади. Масалан,

$$\begin{vmatrix} a_1 + m_1 & a_2 + m_2 & a_3 + m_3 \\ b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} m_1 & m_2 & m_3 \\ b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

6. Детерминантнинг бирор устун (сатр) элементларига бошқа устуннинг (сатрнинг) бир хил сонга кўпайтирилган мос элементларини қўшишдан детерминантнинг қиймати ўзгармайди:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + ka_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ka_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + ka_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

7. Детерминантнинг бирор устуни (сатри) элементларининг бошқа устуни (сатри) элементлари алгебраик тулдирувчилари билан купайтмасининг йигиндиси нолга тенг.

Баён қилинган хоссалар юқори тартибли детерминантлар учун ҳам тўғри.

6-§. n номаълумли n та чизиқли тенгламалар системаси

Ушбун

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (12)$$

қўринишдаги система n номуълумли n та чиқиқли тенгламалар системасини ифодалайди.

Бу системанинг ҳар бир тенгламасидаги $x_1, x_2, \dots, x_n$ номаълумлар ўрнига мос равишда $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ сонларни қўйилганда (12) даги барча тенгламалар аниқликка айлansa, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ сонлар (12) системанинг ечими дейилади. 2-§ дагига ўхшаш, (12) системанинг ечими асосан қуйидаги детерминантга боғлиқдир:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (13)$$

(13) детерминант (12) тенгламалар системасидаги номаълумлар олдидаги коэффициентлардан тузилган, у (12) системанинг детерминанти дейилади.

Агар $\Delta \neq 0$ булса, система ягона ечимга эга булadi
ва бу ечим

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}; \quad \dots; \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

формулар ёрдамида топилади.

Бу ерда Δ_1 детерминант Δ детерминантдан биринчи устун элементларини озод ҳадлар билан алмаштиришдан (яъни (12) системадаги номаълумлар олдидаги коэффицентларни озод ҳадлар билан алмаштиришдан) ҳосил бўлади; Δ_2 эса Δ детерминантдан иккинчи устун элементларини озод ҳадлар билан алмаштиришдан ҳосил бўлади, $\Delta_3, \dots, \Delta_n$ лар ҳам шунга ўхшаш ҳосил қилинади.

n та чизиқли тенгламалар системасини ечишнинг бундай усули Крамер қондаси дейилади. Демак, n номаълумли n та чизиқли тенгламалар системасини ечиш учун $n+1$ та детерминант тузиш керак. Бу эса ҳисоблаш ишини кўпайтиради, шунинг учун ҳам амалий ишларда бошқа методлардан фойдаланилади.

7-§. Уч номаълумли учта чизиқли тенглама системаси

Уч номаълумли учта чизиқли тенглама системасини текшириш билан шуғулланамиз. Чизиқли тенгламаларнинг ушбу

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= d_1, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= d_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= d_3 \end{aligned} \quad (14)$$

системаси берилган бўлсин. Номаълумлар олдидаги коэффицентлардан тузилган детерминантни Δ билан белгилаймиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Ёрдамчи детерминантларни тузамиз:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & a_{12} & a_{13} \\ d_2 & a_{22} & a_{23} \\ d_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & d_1 & a_{13} \\ a_{21} & d_2 & a_{23} \\ a_{31} & d_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & d_1 \\ a_{21} & a_{22} & d_2 \\ a_{31} & a_{32} & d_3 \end{vmatrix}.$$

Берилган система x, y, z ечимга эга бўлса, бу ечимни топиш учун қуйидаги формулаларга эга бўламиз.

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}; \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}; \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}. \quad (16)$$

Қуйидаги ҳоллар содир бўлиши мумкин.

1. $\Delta \neq 0$. Бу ҳолда (16) формулалардан (14) система битта ечимга эга экани келиб чиқади.

2. $\Delta = 0$ ва $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ детерминантлардан ақалли биттаси нолдан фарқли. Бу ҳолда (14) система ечимга эга бўлмайди.

3. $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$.

Бу ҳолда (14) система ё чексиз куп ечимга эга бўлади, ёки умуман ечимга эга бўлмайди.

1-мисол. Ушбу уч номаълумли учта чизиқли тенглама системасини ечинг:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2, \\ 3x - y + 2z = -3, \\ x + y - 3z = 4. \end{cases}$$

Ечиш. Берилган системанинг асосий детерминанти ва ёрдамчи детерминантларини тузамиз.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 6 + 3 + 6 + 1 - 4 + 27 = 39 \neq 0;$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 6 - 3 + 24 + 4 - 4 - 27 = 34 - 34 = 0;$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 18 + 12 + 4 + 3 - 16 + 18 = 39;$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -8 + 6 - 9 + 2 + 6 - 6 = -39;$$

Демак, $\Delta \neq 0$ бўлгани учун система ягона ечимга эга. Бу ечим қуйидагидир:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{0}{39} = 0.$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{39}{39} = 1,$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-39}{39} = -1.$$

Жавоб. (0; 1; -1).

2-мисол. Ушбу системани ечайлик:

$$\begin{cases} x - 5y + 2z = 1, \\ 3x - 25y + 6z = 7, \\ 9x - 45y + 18z = -3. \end{cases}$$

Ечиш. Бевосита ҳисоблаш орқали $\Delta = \Delta_y = 0$, $\Delta_x \neq 0$, $\Delta_z \neq 0$ эканига ишонч ҳосил қилиш осон. Бундан қуринадики система ечимга эга эмас.

3-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x + 5y - z = 5, \\ 2x + y - 2z = 1, \\ x - 4y - z = -4 \end{cases}$$

тенгламалар системасини ечинг.

Ечиш. Бевосита ҳисобласак, $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ га эгамиз. Курииб турибдики, системанинг учинчи тенгламаси иккинчи ва биринчи тенгламаларнинг айирмасидан иборат. Шундай қилиб, берилган системани қуйдагича ёзиш мумкин:

$$\begin{cases} x + 5y = z + 5, \\ 2x + y = 2z + 1. \end{cases}$$

Бу системанинг детерминанти:


$$\sigma = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 10 = -9 \neq 0,$$

шунинг учун қуйдагига эгамиз:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} z+5 & 5 \\ 2z+1 & 1 \end{vmatrix}}{\sigma} = \frac{z+5-10z-5}{-9} = \frac{-9z}{-9} = z,$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & z+5 \\ 2 & 2z+1 \end{vmatrix}}{\sigma} = \frac{2z+1-2z-10}{-9} = \frac{-9}{-9} = 1.$$

Бундан, дастлабки система чексиз кўп ечимга эга экани келиб чиқади, чунки z ни ихтиёрий олиб, z бўйича



x ва y нинг қийматларини топамиз. Масалан, $z = -2$; деб олиб, $x = -2$; $y = 1$ ни, $z = 3$ деб олиб, $x = 3$ $y = 1$ ни топамиз ва ҳоказо.

8-§. Уч номаълумли учта тенгламанинг бир жинсли системаси

Барча озод ҳадлари нолга тенг бўлган чизикли тенгламалар системаси бир жинсли система дейилади. У қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0. \end{cases} \quad (17)$$

(17) кўринишдаги исталган бир жинсли система ҳеч бўлмаганда битта ечимга эга, чунончи $x = y = z = 0$ ечимга, яъни ноль ечимга эга. Бу система қачон нолга тенг бўлмаган ечимга эга бўлишини аниқлаш учун иккита ҳолни қараб чиқамиз.

1) Система детерминанти нолдан фарқли, яъни $\Delta \neq 0$. Бу ҳолда (17) система фақат ноль ечимга эга бўлади:

$$x = y = z = 0.$$

2. $\Delta = 0$. Бу — (17) системанинг нолга тенг бўлмаган ечими мавжуд бўлиши учун зарурий шарт ҳисобланади. Бу ҳолда система чексиз кўп ноль бўлмаган ечимларга эга бўлади.

1) Буни исбот қилиш учун дастлаб Δ детерминантининг алгебраик тўлдирувчиларидан камида биттаси нолдан фарқли деб фараз қиламиз, масалан

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

бўлсин. (17) системанинг дастлабки иккита тенгламасини ушбу кўринишда ёзамиз:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = -a_{13}z, \\ a_{21}x + a_{22}y = -a_{23}z. \end{cases} \quad (18)$$

Энди

$$A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

бўлгани учун исталган z да (17) система ушбу

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -a_{12}z & a_{11} \\ -a_{22}z & a_{21} \end{vmatrix}}{A_{33}} = \frac{A_{31}}{A_{33}} z;$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_{12}z \\ a_{21} & -a_{22}z \end{vmatrix}}{A_{33}} = \frac{A_{32}}{A_{33}} z.$$

формулар билан аниқланувчи ечимларга эга бўлади.

Агар $k = \frac{z}{A_{33}}$ деб олсак, (18) нинг ечимини ушбу кўринишда ёзиш мумкин:

$$x = kA_{31}; \quad y = kA_{32}; \quad z = kA_{33}.$$

k сон исталган қийматларни қабул қилиши мумкин.

Биз берилган (17) системанинг дастлабки икки тенгламаси ечимини топдик. Бу ечимлар k нинг ҳар қандай қийматида (17) системанинг учинчи тенгламасини ҳам қаноатлантиришини кўрсатиш мумкин. Юқорида айтганимиздек, k исталган қийматларни қабул қилгани учун (17) система чексиз кўп ечимга эга бўлади.

б) Энди Δ детерминантнинг барча алгебраик тулдирувчилари нолга тенг деб фараз қиламиз. У ҳолда (17) системанинг ҳар қандай иккита тенгламаси пропорционал коэффициентларга эга бўлади ва демак, системанинг ҳар қандай иккита тенгламасини ўлардан бирининг ҳамма ҳадларини бирор кўпайтувчига кўпайтириш орқали иккинчисига келтириш мумкин, бинобарин система битта тенгламага келтирилади—қолган иккита тенглама бу тенгламанинг натижаси бўлади.

Равшанки, бундай система чексиз кўп ноль бўлмаган ечимга эга (чунки иккита номаълумга ихтиёрий сонли қийматлар бериб, учинчи ечимни эса системанинг бирдан-бир эркин тенгламасидан топиш мумкин).

Мисол. Ушбу тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0, \\ 2x + y - z = 0, \\ 3x + 3y + 2z = 0. \end{cases}$$

Ечиш. Системада $\Delta = 0$ эканини кўриш мумкин. Системанинг дастлабки иккита тенгламасини

$$\begin{cases} x + 2y = -3z, \\ 2x + y = z \end{cases}$$

кўринишда ёзамиз. Бу системани Крамер қондаси бўйича ечамиз.

$$\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3.$$

Энди

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -3z & 2 \\ z & 1 \end{vmatrix}}{\alpha} = \frac{-3z - 2z}{-3} = \frac{-5z}{-3} = \frac{5}{3}z;$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3z \\ 2 & z \end{vmatrix}}{\alpha} = \frac{z + 6z}{-3} = \frac{7z}{-3} = -\frac{7}{3}z.$$

Демак, берилган система чексиз кўп ечимга эга экан, чунки z ни ихтиёрий олиб, x ва y ларнинг мос қийматларини топамиз. Масалан, $z = -3$ деб олиб, $x = -5$; $y = 7$ ни, $z = 6$ деб олиб, $x = 10$, $y = -14$ ларни топамиз ва ҳоказо.

9. §. Чизиқли тенгламалар системасини Гаусс методи билан ечиш

Биз шу пайтгача тенгламалар сони номаълумлар сонига тенг бўлган чизиқли тенгламалар системасини қарадик. Агар бундай системанинг детерминанти нолдан фарқли бўлса, у ҳолда система ягона ечимга эга бўлиши маълум.

Энди ихтиёрий, яъни тенгламалар сони номаълумлар сонига тенг бўлмаган чизиқли тенгламалар системасини текшираимиз. Бундай система учун ечим ягона бўлмаслиги ёки умуман ечим мавжуд бўлмаслиги ҳам мумкин. Чизиқли тенгламалар системаси бирорта ҳам ечимга эга бўлмаса, система биргаликда бўлмаган система дейилади. Агар чизиқли тенгламалар системаси ечимга эга бўлса, бундай система биргаликда дейилади. (Агар биргаликда бўлган система ягона ечимга эга бўлса, система аниқ система деб, агар ечим биттадан кўп бўлса, аниқмас система деб аталади.)

Энди коэффициентлари соңлардан иборат бўлган система ечимларини топиш учун қулай бўлган номаълумларни кетма-кет йўқотиш усулини, яъни Гаусс методини баён қилишга ўтамиз. Қуйидаги ихтиёрий чизиқли тенгламалар системаси берилган бўлсин:

[illegible]

(19) да $a_{11} \neq 0$ бўлсин деб фараз қилайлик. a_{11} нолга тенг бўлиши ҳам мумкин. Бундай ҳолда ишни системанинг биринчи тенгламасидаги бирорта нолдан фарқли коэффициентдан бошлаш керак. Дастлаб биринчи тенгламадан ташқари барча тенгламаларда x_1 ни йўқотиб, (19) системани ўзгартирамиз. Бунинг учун биринчи тенгламанинг ҳар иккала томонини $a_{11} \neq 0$ га бўлиб чиқамиз. Натижада берилган системага эквивалент ушбу янги системани ҳосил қиламиз:

[illegible]

Энди бу системанинг биринчи тенгламасини a_1 га купайтирамиз ва иккинчи тенгламадан айирамиз. Бу ишни давом эттириб, биринчи тенгламани энди a_2 га купайтириб, учинчи тенгламадан айирамиз ва ҳ. к. Бу жараёни шундай давом эттириб, маълум қадамдан кейин берилган системага тенг кучли бўлган қуйидаги янги системани ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned}x_1 + a'_{11}x_2 + \dots + a'_{1k}x_k + \dots + a'_{1n}x_n &= c'_1, \\a'_{21}x_2 + \dots + a'_{2k}x_k + \dots + a'_{2n}x_n &= c'_2, \\&\vdots \\a'_{l1}x_2 + \dots + a'_{lk}x_k + \dots + a'_{ln}x_n &= c'_l, \\&\vdots \\a'_{m1}x_2 + \dots + a'_{mk}x_k + \dots + a'_{mn}x_n &= c'_m.\end{aligned}\tag{21}$$

Бу ерда қуйидагича белгилашлардан фойдаланилган:

$$\begin{aligned} a'_{1k} &= \frac{a_{1k}}{a_{11}}, \quad a'_{ik} = a_{ik} - \frac{a_{1k}}{a_{11}} a_{21}; \quad i = \overline{1, m}, \quad k = \overline{2, n}. \\ c'_1 &= \frac{c_1}{a_{11}}, \quad c'_i = c_i - \frac{c_1}{a_{11}} a_{21}; \quad i = \overline{2, m}. \end{aligned}$$

a_{21} коэффициентни нолдан фарқли деб фараз қилиб (21) системанинг иккинчи тенгламасини a_{21} га бўламиз ва ҳосил бўлган системанинг иккинчи тенгламасини кетма-кет $a_{32}, \dots, a_{12}, \dots, a_{m2}$ га купайтирамиз ҳамда навбатма-навбат системанинг тегншли (биринчи ва иккинчи тенгламаларидан ташқари) тенгламаларидан айи-рамиз.

Бу жараёни давом эттириб, чап томонидаги барча коэффициентлари ноль бўлган, озод ҳади эса нолдан фарқли тенгламага эга бўлган системага келсак, бу система юқорида кўрсатилганидек, биргаликда бўлмайди. Агар система биргаликда бўлса, қуйидаги системалардан бирини ҳосил қиламиз:

$$\left. \begin{aligned} x_1 + b_{12}x_2 + \dots + b_{1k}x_k + \dots + b_{1n}x_n &= B_1, \\ x_2 + \dots + b_{2k}x_k + \dots + b_{2n}x_n &= B_2, \\ \dots &\dots \\ x_p + \dots + b_{pn}x_n &= B_p \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

ёки (бунда $p < n$)

$$\left. \begin{aligned} x_1 + b_{12}x_2 + \dots + b_{1k}x_k + \dots + b_{1n}x_n &= B_1, \\ x_2 + \dots + b_{2k}x_k + \dots + b_{2n}x_n &= B_2, \\ \dots &\dots \\ x_k + \dots + b_{kn}x_n &= B_k, \\ \dots &\dots \\ x_n &= B_n. \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

(22)—поғонасимон (трапеция), (23) эса учбурчак кўринишдаги система лейилади. (23) бўлган ҳолда охириги тенгламалар $x_n = B_n$ га эгамиз. x_n нинг қийматини олдинги тенгламага қўйиб, x_{n-1} ни топамиз, уни ўз навбатида олдинги тенгламага қўйиб, x_{n-2} ни топамиз ва ҳ. к.

Юқорида айтилганларни яқунлаб, қуйидагиларни ҳосил қиламиз. Гаусс методини чизиқли тенгламаларнинг ҳар қандай системаси учун татбиқ этиш мумкин. Бунда, агар алмаштиришлар жараёнида барча номаълумларнинг олдидаги коэффициентлари нолга тенг, озод ҳади эса нолдан фарқли бўлган тенглама ҳосил қилсак, система биргаликда бўлмайди; агар бундай тенгламага эга бўлмасак, система биргаликда бўлади. Агар биргаликдаги система (23) учбурчак кўринишига келса, у аниқ бўлади, (22) кўринишига келса, аниқмас бўлади.

Айтилганларни чизиқли бир жинсли тенгламалар системаси бўлган ҳолга, яъни озод ҳадлар нолга тенг бўлган тенгламаларга ҳам қўллаш мумкин. Бундай система ҳар доим биргаликда бўлади, чунки у $(0; 0; \dots, 0)$ ноль ечимга эга. Қаралаётган системада тенгламалар сони номаълумлар сонидан кичик бўлсин. У ҳолда, системамиз учбурчак шаклига келтирилиши мумкин эмас, чунки Гаусс методи бўйича ўзгартириш жараёнида тенгламалар сони камайиши мумкин, лекин ортиши мумкин эмас; бинобарин у (22) кўринишга келтирилади, яъни аниқмасдир.

1-мисол. Қуйидаги чизиқли тенгламалар системасини Гаусс методи билан ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 7. \end{cases}$$

Ечиш. Биринчи тенгламадаги x_1 олдида турган коэффициент (агар $\neq 0$) ёрдамида қолган тенгламалардаги x_1 номаълумдан қутуламиз. Бунинг учун, биринчи тенгламанинг барча ҳадларини 2 га купайтириб, иккинчи тенгламадан айирамиз. Биринчи тенгламанинг ўзини учинчи тенгламадан айирамиз. Натижада қуйидаги кўринишдаги системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ -5x_2 - 4x_3 = 4, \\ -x_2 - 6x_3 = 6. \end{cases}$$

Иккинчи ва учинчи тенгламалар фақат x_2 ва x_3 номаълумларга эга. Учинчи тенгламанинг ҳадларини 5 га купайтириб, 2-тенгламадан айирамиз. Натижада тубандаги система ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ -5x_2 - 4x_3 = 4, \\ -26x_3 = 26. \end{cases}$$

Учинчи тенгламадан: $x_3 = -1$, буни иккинчи тенгламага қўйиб, x_2 номаълумни топамиз:

$$\begin{aligned} -5x_2 - 4 \cdot (-1) &= 4, \\ x_2 &= 0. \end{aligned}$$

x_1 ва x_2 номаълумларнинг қийматларини биринчи тенгламага қўйиб, x_1 номаълумни топамиз:

$$x_1 + 0 - 3 = 1; x_1 = 4.$$

Жавоб: (4; 0; -1).

2-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 14 \end{cases}$$

чиизиқли тенгламалар системасини ечинг.

Ечиш. Биринчи тенгламадаги x_2 олдида турган коэффициент ёрдамида қолган тенгламалардаги x_2 номаълумдан қутуламиз. Бунинг учун биринчи тенглама ҳадларини учга, иккинчи тенглама ҳадларини 2 га кўпайтириб, биринчи тенгламани иккинчи тенгламадан айирамиз. Биринчи тенглама ҳадларини 2 га кўпайтириб, учинчи тенгламадан айирамиз. Натижада қуйидаги курунишдаги системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7, \\ x_1 + 0 - 2x_3 = -11, \\ 0 + 0 + 0 = 0. \end{cases}$$

Учинчи тенглама ҳадлари ва озод ҳади ноллардан иборат бўлгани учун, бу тенгламани ташлаб юборсак, тубандаги система ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7, \\ x_1 - 7x_3 = -11. \end{cases}$$

Биринчи тенгламадаги x_1 номаълумдан қутулиш учун биринчи тенгламани иккинчи тенгламадан айирсак, x_1 ва x_2 номаълумларга нисбатан ечиладиган ушбу системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} -2x_2 - 10x_3 = -18, \\ x_1 - 7x_3 = -11. \end{cases}$$

Иккинчи тенгламадан x_1 ни, биринчи тенгламадан x_2 ни топамиз:

$$\begin{aligned} x_1 &= 7x_3 - 11, \\ x_2 &= -5x_3 + 9. \end{aligned}$$

Бу ерда x_3 ихтиёрий сон.

1. Иккинчи тартибли детерминантларни ҳисобланг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}; & \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}; \\ \text{в) } \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}; & \quad \text{г) } \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

2. Учинчи тартибли детерминантларни ҳисобланг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -2 & 4 & 6 \\ 5 & -1 & 2 \end{vmatrix}; & \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}; & \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 9 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

3. Тенгламалар ва тенгсизликларни ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{vmatrix} x+2 & 1 \\ 3 & x-2 \end{vmatrix} = 0; & \quad \text{б) } \begin{vmatrix} x+24 & 5x \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 0; \\ \text{в) } \begin{vmatrix} 2x-5 & 1 \\ 4x & 1 \end{vmatrix} > 0; & \quad \text{г) } \begin{vmatrix} 1 & x+3 \\ 2 & x \end{vmatrix} < 0. \end{aligned}$$

4. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} x+2y=5, \\ -3x+y=6; \end{cases} & \quad \text{б) } \begin{cases} 3x-2y=4, \\ x+y=3. \end{cases} \end{aligned}$$

5. Қуйидаги учинчи тартибли детерминантни биринчи устун элементлари бўйича ёйиб ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

6. Қуйидаги учинчи тартибли детерминантни иккинчи сағр элементлари бўйича ёйиб ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 7 & 4 \end{vmatrix}.$$

7. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \begin{cases} x+2y+3z=3; \\ 2x+y-z=1; \\ 3x+3y+z=2. \end{cases} & \quad \text{б) } \begin{cases} 3x+2y-z=4, \\ 2x-y+3z=11, \\ x+y-2z=-1. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в)} \quad & \begin{cases} x - 2y + z = 5, \\ 2x + 3y - z = 1, \\ 4x - y + z = 3. \end{cases} & \text{г)} \quad & \begin{cases} x + y - z = 2, \\ 2x - 3y + 4z = 5, \\ -x + 2y + z = 1. \end{cases} \\ \text{д)} \quad & \begin{cases} 3x - y + 2z = 0, \\ 2x + 3y - 5z = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases} & \text{е)} \quad & \begin{cases} 2x - y + 3z = 0, \\ x + 2y - 5z = 0, \\ 3x + y - 2z = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

8. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс методидан фойдаланиб ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а)} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = -5, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases} & \text{б)} \quad & \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 = -1. \end{cases} \\ \text{в)} \quad & \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 6, \\ -x_1 + 5x_2 + x_3 = 7, \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 = -2. \end{cases} & \text{г)} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -6, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -5, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases} \\ \text{д)} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -6. \end{cases} & \text{е)} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7, \\ -x_1 - 5x_2 + x_3 = 13, \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -12. \end{cases} \end{aligned}$$

II БОБ

ЧИЗИҚЛИ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАСИНING УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ

1-§. Матрицанинг ранги

Бизга m та сатр ва n та устундан иборат $m \times n$ ўлчамли қуйидаги матрица берилган бўлсин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Бу матрицанинг ҳар бир устунини m ўлчовли вектор сифатида қараш мумкин. Бу векторлар сифатида қаралаётган устунлар чизикли боглиқ бўлиши ҳам мумкин. Матрицанинг ранги таърифини беришдан олдин чизикли боглиқ ва чизикли эркин векторлар система-

сига таъриф берамиз. Айтайлик, бизга ихтиёрий $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар системаси ва $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ҳақиқий сонлар берилган бўлсин.

1-таъриф. Ушбу $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n$ вектор $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторларнинг **чизикли комбинацияси**, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ лар эса комбинациянинг **коэффициентлари** дейилади.

2-таъриф. Агар $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ лардан камида биттаси нолдан фарқли бўлиб, $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = 0$ бўлса, у ҳолда $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар чизикли **боғлиқ** дейилади.

3-таъриф. $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = 0$ тенглик $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ сонларнинг барчаси нолга тенг бўлганда бажарилса, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар чизикли **эркин** деб аталади.

Энди матрица рангига таъриф берамиз.

4-таъриф. Матрицанинг **ранги** деб унинг чизикли эркин устунларининг (сатрларининг) максимал сонига айтилади ва у $\text{rang } A = r$ кўринишда белгиланади (бунда r — матрицанинг ранги).

Матрицанинг сатрлар системаси ранги устунлар системаси рангига тенг. A матрицада ихтиёрий k та сатр ва k та устунни оламиз.

Бу сатр ва устунларнинг кесишишидан ҳосил бўлган матрица k -тартибли квадрат матрицани ташкил этади, бу матрицанинг детерминанти A матрицанинг k -тартибли **минори** дейилади. A матрицанинг нолдан фарқли минорларининг энг юқори тартиби k га тенг бўлсин. У тубандаги схемада тўртбурчак ичида кўрсатилган:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1k} & \dots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \dots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mk} & a_{m,k+1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

A матрица минорларининг орасидаги катта тартиблисини билиш қизиқарли ва зарурдир. Агар A матрицанинг k -тартибли барча минорлари нолга тенг бўлса, у ҳолда унинг k дан юқори тартибли барча минорлари

ҳам нолга тенг бўлади. Матрица ранги ҳақидаги қуйидаги теоремани исботсиз келтирамиз.

Теорема. Матрицанинг нолдан фарқли минорларининг энг юқори тартиби бу матрицанинг рангига тенг (теорема исботи А. Г. Курошнинг „Оливалгебра курси“ китобида келтирилган). Матрицанинг рангини бу теоремадан фойдаланиб топишда бу матрицанинг жуда кўп минорларини ҳисоблаш зарур бўлади. Шунинг учун матрица рангини ҳисоблашнинг қуйидаги осон қондасини келтирамиз:

Берилган матрица рангини ҳисоблаш учун қуйи тартибли минорлардан юқори тартибли минорларга ўтиш керак. Агар нолга тенг бўлмаган (k -тартибли) минорни топган бўлсак, у ҳолда бу минорни ўраб турувчи ($k+1$)-тартибли минорларнинг ўзигина ҳисобланади. Бунда, агар бу минорларнинг барчаси нолга тенг бўлса, берилган матрицанинг ранги k га тенг бўлади деб хулоса чиқарамиз. Юқорида кўриштилган таърифлардан қуйидаги натижалар келиб чиқади.

1-натижа. Ҳар қандай матрицанинг чизиқли эркили сатрларининг максимал сони унинг чизиқли эркил устунларининг максимал сонига, яъни бу матрица рангига тенг.

2-натижа. n -тартибли детерминантнинг сатрлар орасида чизиқли боғланиш мавжуд бўлган ҳолдагина ва фақат шу ҳолдагина у нолга тенг бўлади.

Матрица рангини ҳисоблаш ҳақидаги теорема ва натижалардан фойдаланмасдан ҳам матрица рангини ҳисоблаш мумкин. Бу ҳолда қайси устунлар (ёки сатрлар) максимал чизиқли эркил система ташкил этишини топмасдан тўғридан-тўғри матрица ранги ҳисобланади, шу сабабли фақат рангнинг ўзинигина билиш керак бўлган ҳолдагина бу методдан фойдаланиш мумкин. Бу метод элементар алмаштиришлар деб аталади. Булар:

а) иккита сатрнинг ёки устуннинг ўрнини алмаштириш (транспозиция);

б) сатр (ёки устун) ни нолдан фарқли ихтиёрий сонга кўпайтириш;

в) бир сатрга ёки устунга бирор сонга кўпайтирилган бошқа сатр (устунни) қўшиш.

Элементар алмаштиришлар матрицанинг рангини ўзгартирмайди.

1-мисол. Қуйидаги матрица рангини ҳисоблаш усулидан фойдаланиб ҳисобланг: норларини ҳош

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

Ечиш. Ишнинг 1-тартибли минорлардан бошлаймиз, бунинг учун биринчи устун ва қаторнинг кесишган жойида биринчи қатор ва иккинчи устунни „ҳошяласак“.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

минорга эга бўламиз. Иккинчи қатор ва учинчи устунни „ҳошяласак“;

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Энди, учинчи тартибли минорларга ўтсак, M_2 минорни ҳошяловчи минорлар фақат иккита бўлиб, улар нолга тенг:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0.$$

Демак, матрицанинг рангини ҳисоблаш қондасига кўра $\text{rang}(A) = 2$. Берилган 2-мисол.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 9 & -19 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & -5 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

матрицанинг рангини ҳисоблаш.

Ечиш. Матрица рангини элементар алмаштиришлардан фойдаланиб топамиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 3 & -5 \\ 2 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 2 & -1 & 9 & -19 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -10 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 15 & -29 \end{pmatrix}$$

Бундан $\text{rang}(A) = 3$.

2-§. Чизиqli tenglamalar sistemasining birgalikda b'ulish sharti

Бизга n номаълумли m та чизиқли тенгламалар системаси берилган бўлсин:

[illegible]

Агар чизиқли тенгламалар системаси ечимларга эга бўлса, система биргаликда дейилади.

(1) системанинг биргаликда бўлиш-бўлмаслик шартини аниқлаймиз. Агар биргаликда бўлган система битта ечимга эга бўлса, у аниқ система, биттадан кўп ечимга эга бўлса, аниқмас система деб аталади. (1) система коэффициентларидан ушбу A матрицани:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ва бу матрицага озод ҳадди қўшиб кенгайтирилган B матрицани тузамиз:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

Берилган (1) чизикли тенгламалар системасининг бир-галикда булиш шартини қуйидаги Кронекер — Капелли теоремаси ифодалайди:

Теорема Чизиқли тенгламалар системаси ечим-
га эга бўлиши учун A матрицанинг ранги кенгай-

тирилган B матрицанинг рангига тенг булиши зарур ва етарлидир.

Исботи. Теореманинг олдин зарурийлик шартини, кейин эса етарлилик шартини исбот қиламиз.

а) (1) система биргаликда бўлсин ва $c_1, c_2, \dots, c_n$ унинг ечимларидан бири бўлсин. Бу ечимлар системани m та айниятга айлантиради:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (1 \leq i \leq m). \quad (2)$$

Кўриниб турибдики, B матрицанинг охириги устунидан бошқа барча устунлари A матрицага киради, ва аксинча, A матрица B матрицанинг бир қисми ҳисобланади, яъни A матрицанинг ҳар қайси устуни B нинг ҳам устуни бўлади, демак, бу матрицанинг устунлари орқали чизиқли ифодаланади. Бундан A ва B матрицаларнинг устунлари системаси ўзаро эквивалент эканлиги келиб чиқади, шунинг учун бу иккала ўлчовли векторлар системаси бир хил рангга эга, яъни A ва B матрицаларнинг ранглари бир-бирига тенг:

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(B).$$

б) Теореманинг иккинчи қисмини исбот қилайлик. A ва B матрицалар бир хил рангга эга бўлсин. Бу — A матрица устунларининг исталган максимал чизиқли эркин системаси B матрицада ҳам шундай чизиқли эркин система бўлади деган сўз. Демак, B матрицанинг охириги устуни A матрица устунлари орқали чизиқли ифодаланади, яъни (2) муносабат кўринишида бўлади. Шундай $c_1, c_2, \dots, c_n$ сонлар мавжудки, буларнинг коэффициентлар сифатида олиб уларни A матрица устунларига мос равишда купайтириб, бу купайтмаларни қўшиб чиқсак, B матрицадаги озод ҳадлар устунига тенг бўлади. Шунинг учун, $c_1, c_2, \dots, c_n$ сонлар (1) системанинг ечими бўлади. Демак, A ва B матрица ранглариининг тенглигидан (1) системанинг биргаликда бўлиши келиб чиқади.

Мисол. Қуйидаги системанинг биргаликда бўлиш бўлмаслигини текширинг:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 2, \\ x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 1. \end{cases}$$

Системанинг асосий (A) ва кенгайтирилган (B) матрицаларини тузиб, уларнинг рангларини топамиз:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 5 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang}(B) = 3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang}(A) = 2.$$

Шундай қилиб, $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(B)$. Демак, система биргаликда эмас.

Машқлар

1. Минорни ҳошиялаш усули билан матрицаларнинг рангини топинг:

а) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 5 & -13 & 11 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ в) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$

2. Қуйидаги матрицаларнинг рангини элементар алмаштиришлар ёрдамида топинг:

а) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

3. A матрицанинг рангини икки усул билан (элементар алмаштиришлар ва минорлар орқали) топиб, натижа бир хил бўлишини кўрсатинг:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 7 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

4. Тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш бўлмаслигини текширинг:

а) $\begin{cases} x - 2y + 3z = 6, \\ 2x + 3y - 4z = 20, \\ 3x - 2y - 5z = 6. \end{cases}$ б) $\begin{cases} x - 2y - z = 2, \\ 3x - 6y - 3z = 6, \\ 5x - 10y - 5z = 10. \end{cases}$

в) $\begin{cases} x + 2y + z = 8, \\ 3x + 2y + z = 10, \\ 4x + 3y - 2z = 4. \end{cases}$

III БОБ

МАТРИЦАЛАР АЛГЕБРАСИ

1-§. Матрицаларни кўпайтириш

Матрицаларнинг кўпайтмаси ҳақида биринчи кўпайтувчининг сатрлари сони иккинчи кўпайтувчининг устунлари сонига тенг бўлган ҳолдагина сўз юритиш мумкин, яъни фақат $(m \times n)$ ўлчамли матрицани $(n \times k)$ ўлчамли матрицага кўпайтириш мумкин. Кўпайтмада $(m \times k)$ ўлчамли матрица ҳосил бўлади. Буни қуйидаги схема билан ифодалаш мумкин:

$$(m \times n)(n \times k) = (m \times k).$$

Хусусий ҳолда, квадрат матрицаларни кўпайтириш учун уларнинг тартиблари бир хил бўлиши талаб қилинади. Кўпайтма ҳам худди шу тартибдаги квадрат матрицани ифодалайди.

Айтайлик, бизга A ва B матрицалар берилган бўлсин. A ва B матрицаларни кўпайтириш қондаси қуйидагича: $A \cdot B = C$ кўпайтманинг ҳар бир c_{ij} элементини ҳосил қилиш учун A матрицанинг i -сатридаги элементларини B нинг j -устунидаги мос элементларига кўпайтириб, натижалар қўшилади. Масалан, $(m \times n)$ ўлчамли $(m \times n)$ -матрица

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ва $(n \times k)$ ўлчамли

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{s1} & b_{s2} & \dots & b_{sj} & \dots & b_{sk} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{nk} \end{bmatrix}$$

матрицаларни кўпайтириш натижасида $(m \times k)$ ўлчамли

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1k} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2j} & \dots & c_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{l1} & c_{l2} & \dots & c_{lj} & \dots & c_{lk} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mj} & \dots & c_{mk} \end{bmatrix}$$

матрица ҳосил бўлади, бунда

$$c_{lj} = a_{l1}b_{1j} + a_{l2}b_{2j} + \dots + a_{li}b_{sj} + \dots + a_{ln}b_{nj} - \sum_{s=1}^n a_{ls}b_{sj}; \quad \left(\begin{matrix} l = \overline{1, m} \\ j = \overline{1, k} \end{matrix} \right). \quad (*)$$

Матрицаларни кўпайтириш коммутативлик хоссасига эга эмас, яъни $A \cdot B \neq B \cdot A$. Учта матрицани кўпайтириш $[(m \times n)(n \times k)](k \times p) = (m \times k)(k \times p) = (m \times p)$ схема бўйича амалга оширилади. Матрицаларни кўпайтириш ассоциативлик хоссасига эга, яъни

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

тенглик ўринлидир.

Мисол.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

матрицаларнинг кўпайтмасини топинг.

Ечиш. (*) формулага кўра:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) \\ 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 5 + 3 \cdot (-2) + (-1) \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) \\ 1 \cdot 5 + (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 12 & 1 \\ 9 & -8 & 18 \\ 10 & 5 & 16 \end{pmatrix}.$$

2-§. Тескари матрица

Бош диагонал элементлари бирлардан ва қолган диагона элементлари ноллардан иборат

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

қўйнишдаги n -тартибли квадрат матрица бирлик матрица дейилади. Олдинги темага асосан, E матрица n -тартибли инвертирланган A матрица учун

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

инвертирланган қаноатлантирувчи ягона матрица экани келиб чиқади.

1-таъриф. A матрица учун $A \cdot B = E$ тенгликни қаноатлантирувчи B матрица A га *тескари* матрица дейилади ва у $B = A^{-1}$ кўринишида белгиланади.

2-таъриф. Сатрлари чизиқли эркин матрица *хос* деб ва сатрлари чизиқли боғланган матрица *хос* матрица деб аталади.

Хосмас матрицаларга доир қуйидаги иккита теоремани исботсиз келтирамиз.

1-теорема. Хосмас матрицани элементар алмаштиришлар ёрдамида бирлик матрицага келтириш мумкин.

2-теорема. Хосмас матрицага тескари матрица таъриф ва ягонадир. (Теоремаларнинг исботлари А. Г. Курошнинг „Олий алгебра курси“ китобида келтирилган.)

Тескари матрицани топиш

Айтайлик, n -тартибли квадрат, хосмас A матрица берилган бўлсин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

А матрицага тескари В матрицани топиш учун, қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right).$$

Чап томонда берилган A матрица, ўнг томонда E 6×6 лик матрица ёзилган. Бу матрицаларнинг иккаласи ҳам бир вақтда A матрицани бирлик E матрицага келтириш диган сатрлар бўйича элементар алмаштиришлар қўллаймиз. Натижада (1) матрица қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & . & . & 0 & b_{11} & b_{12} & . & . & b_{1n} \\ 0 & 1 & . & . & 0 & b_{21} & b_{22} & . & . & b_{2n} \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & . & . & 1 & b_{n1} & b_{n2} & . & . & b_{nn} \end{array} \right)$$

(2) нинг ўнг томонидаги матрица худди A га тески B матрицани ифодалайди, яъни

$$A \cdot B \equiv E$$

булади. А матрица уз навбатида B га тескари бўлганлиги сабабли $B \cdot A = E$ ҳам бажарилади.

Мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 7 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари булган A^{-1} матрицани топинг.

Б. Ч. Ш. Бунинг учун қуйидаги матрицани тузамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Биринчи устунни 1 га, сунгир—2 га кулантирмо, мос ра-
вишда иккинчи ва учинчи устунга қўшамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Иккинчи устунни 2 га ва 1 га купайтириб, мос равиш-
да биринчи ва учинчи устунга қўшамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Учинчи устунни — 3 га купайтириб, биринчи устунга қўшамиз ва иккинчи устунни — 1 га купайтирамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Иккинчи ва учинчи устунларни алмаштирамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Натижада A га тескари A^{-1} матрицага эга бўламиз:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3-§. Чизиқли тенгламалар системасини матрицалар кўринишида ифодалаш

Бизга n номаълумли n та чиқиқли тенгламалар системаси берилган бўлсин:

[illegible]

Бу система коэффициентларидан тузилган матрица қуйи-
дагича бўлади:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Биз фақат A хосмас матрица бўлган ҳолнигина қарай-
миз. (3) системанинг чап томонида A матрицани

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

матрицага кўпайтиришдан келиб чиқадиган n сатрли
ва бир устунли матрицанинг элементлари, системанинг
унг томонида эса

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

матрицанинг элементлари турибди. Шу сабабли икки
матрицанинг тенглик таърифига асосан, (3) ни тубан-
дагича

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

ёки, қисқача

$$A \cdot X = B \quad (4)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Бу тенглама матрицавий тенг-
лама (чизиқли тенгламалар системасини матрицали кў-

риниши) дейилади. А хосмас матрица бўлгани сабабли, унга тескари бўлган A^{-1} матрица мавжуд, шу сабабли (4) ни чап томондан A^{-1} га кўпайтирамиз:
 $A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot X$, лекин $A^{-1}(A \cdot X) = (A^{-1} \cdot A) \times X = EX = X$, демак,

$$X = A^{-1} \cdot B$$

ёки

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & \dots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \dots & a'_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a'_{11}b_1 + a'_{12}b_2 + \dots + a'_{1n}b_n \\ a'_{21}b_1 + a'_{22}b_2 + \dots + a'_{2n}b_n \\ \vdots \\ a'_{n1}b_1 + a'_{n2}b_2 + \dots + a'_{nn}b_n \end{pmatrix}.$$

Бундан эса, икки матрицанинг тенглик шартига асосан (4) ёки (3) нинг ечимига эга бўламиз:

$$x_i = a'_{i1}b_1 + a'_{i2}b_2 + \dots + a'_{in}b_n, \quad (i = \overline{1, n}). \quad (5)$$

Мисол.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

тенгламалар системасини матрицавий кўринишда ёзинг ва унинг ечимини топинг.

Ечиш. Берилган системанинг матрицасини ёзамиз:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ва

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

деб белгиласак, у ҳолда системанинг „матрицавий“ кўриниши

$$A \cdot X = B \quad (*)$$

куринишда бўлади. A га тескари A^{-1} матрица

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & -5 & 6 \\ 18 & 11 & -13 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

бўлгани сабабли $(*)$ ни чап томондан A^{-1} га кўпайтирамиз: у вақтда

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} B$$

ёки

$X = A^{-1} \cdot B$ га эгамиз, бундан $A^{-1} \cdot B$ ни топамиз:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot B &= \begin{pmatrix} -8 & -5 & 6 \\ 18 & 11 & -13 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} (-8) \cdot 5 + (-5) \cdot 1 + 6 \cdot 4 \\ 18 \cdot 5 + 11 \cdot 1 + (-13) \cdot 4 \\ 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ 49 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

◆ Демак, тенгламалар системасининг ечими:

$$x_1 = -21; x_2 = 49; x_3 = 2.$$

Машқлар

1. Ушбу матрицаларнинг кўпайтмасини топинг:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & -6 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -3 & 4 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}.$$

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -8 \\ 9 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

5. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари A^{-1} матрицани топинг.

6. Берилган матрицага тескари A^{-1} матрицани топинг:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 7 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

8. Қуйидаги тенгламалар системаларни матрицалардан фойдаланиб ечинг:

а) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 9, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 14, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 16; \end{cases}$ в) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -5, \\ 7x_1 + x_2 - x_3 = 10. \end{cases}$

б) $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5; \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 3; \end{cases}$

IV БОБ


ВЕКТОРЛАР АЛГЕБРАСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

1-§. Вектор тушунчаси. Векторнинг абсолют қиймати ва йўналиши

Агар $[AB]$ кесма охирларининг тартиби эътиборга олинса, у йўналган ҳисобланади. Агар олдин A нуқта, кейин B нуқта берилган бўлса, у ҳолда A нуқта $\overline{AB}$



1-чизма.



2 чизма.

Йўналган кесманинг боши, B нуқта эса охири дейилади ($\overline{AB}$ йўналган кесма устига чизик қўйиш билан белгиланади). Оддий кесманинг учлари тенг ҳуқуқли бўлиб, уларнинг тартибини аҳамияти йўқ. Йўналган кесмада эса боши ва охирининг ўринлари алмаштирилиши билан уларнинг йўналиши ўзгаради. Йўналган $\overline{AB}$ кесманинг узунлиги деб, $|AB|$ кесманинг узунлигини айтилади ва у $|AB|$ билан белгиланади. Йўналтирилган кесма **вектор** дейилади. Векторларни белгилашда биз устига стрелка қўйилган кичик латин ҳарфларидан фойдаланамиз: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, Баъзан векторларни кесма охирларини кўрсатувчи ўша ҳарфлар билан ҳам белгиланади. Масалан, векторни 1-чизмада кўрсатилганидек, $\overline{AB}$ кўринишда белгилаш мумкин. A нуқта векторнинг боши, B нуқта векторнинг охири дейилади. Агар $\overline{AB}$ ва $\overline{CD}$ йўналган кесмалар бир хил (қарама-қарши) йўналишли бўлса, $\overline{AB}$ ва $\overline{CD}$ векторлар бир хил (қарама-қарши) йўналишли векторлар дейилади (2-чизма).

Векторнинг абсолют қиймати ёки (узунлиги) **модули** деб шу векторни тасвирловчи кесма узунлигига айтилади. $\vec{a}$ векторнинг абсолют қиймати $|\vec{a}|$ билан, $\overline{AB}$ векторнинг абсолют қиймати эса $|\overline{AB}|$ билан белгиланади.

Модули бирга тенг бўлган вектор **бирлик** вектор дейилади. Векторнинг боши унинг охири билан устма-уст тушиши мумкин. Бундай вектор ноль вектор деб аталади. Ноль вектор устига стрелка қўйилган ноль (0) билан белгиланади. Ноль векторнинг йўналиши ҳақида

суа юритилмайди — у аниқланмаган. Ноль векторнинг модули нолга тенг деб ҳисобланади. Нолдан фарқли иккита вектор бир тўғри чизиқда ёки параллел тўғри чизиқларда ётса, бундай векторлар *коллинеар* векторлар дейилади. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг коллинеарлиги $\vec{a} \parallel \vec{b}$ кўринишида белгиланади. Узунликлари тенг, коллинеар ва бир хил йўналишли иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар *тенг* векторлар дейилади ва $\vec{a} = \vec{b}$ кўринишида белгиланади. Бир текисликка параллел бўлган ёки шу текисликда ёгувчи векторлар *компланар* векторлар дейилади.


2-§. Векторлар устида амаллар

1. Векторларни қўшиш. Таъриф. Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг йиғиндиси деб исталган A нуқтадан $\vec{a}$ векторни қўйиб, унинг охири B га $\vec{b}$ векторни қўйганда боши $\vec{a}$ векторнинг боши A да, охири $\vec{b}$ векторнинг охири C да бўлган $\vec{AC}$ векторга айтилади (3-чизма). $\vec{a}$, $\vec{b}$ векторларнинг йиғиндиси $\vec{a} + \vec{b}$ билан белгиланади.


Векторларни қўшиш таърифидан исталган A , B ва C уч нуқта учун

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \quad (1)$$

тенглик ўринли бўлиши келиб чиқади. (1) тенглик векторларни қўшишнинг *учбурчак қоида*си дейилади. Икки коллинеар векторни қўшиш ҳам шу қоида бўйича бажарилади.



3-чизма.



4-чизма.

Векторларни қўшиш амали қўидаги хоссаларга эга:
 1) Қўшишнинг группалаш (ассоциативлик) хоссаси. Ҳар қандай $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар учун

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

муносабат ўринли.

Исбот. Векторларни қўшишнинг учбурчак қоида-
 сидан (4- чизма):

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB},$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{OB} + \vec{BC} = \vec{OC};$$

$$\vec{b} + \vec{c} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC},$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{OC},$$


бундан $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ экани келиб чиқади.

Қўшилувчи векторларнинг сони иккитадан ортиқ бўлганда уларни қўшиш қўидагича бажарилади: берилган $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, . . . $\vec{l}$ векторларнинг йиғиндисини ҳосил қилиш учун $\vec{a}$ векторнинг охирига $\vec{b}$ векторнинг бошини қўйиш (яъни $\vec{a}$ векторнинг учидан бошлаб $\vec{b}$ векторга тенг вектор яшаш), кейин $\vec{b}$ векторнинг охирига $\vec{c}$ векторнинг бошини қўйиш ва ҳ. к., бу ишни $\vec{l}$ вектор устида бажарилгунча давом этгириш керак. У вақтда $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \dots + \vec{l}$ йиғинди вектор боши $\vec{a}$ векторнинг бошидан, охири эса $\vec{l}$ векторнинг охиридан иборат вектор бўлади.



Масалан, 6- чизмадаги $\vec{AF}$ вектор берилган $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$ векторларни қўшишдан ҳосил бўлган вектордир.

2) Қўшишнинг урин алмаштириш (коммутативлик) хоссаси. Ҳар қандай иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ вектор учун $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ тенглик ўринлидир.


Исбот. $\vec{a} = \vec{OA}$ ва $\vec{b} = \vec{AB}$ бўлсин. Икки ҳол бўлиши мумкин:



5-чизма.



7-чизма.



8-чизма.

1) $\vec{a}, \vec{b}$ векторлар коллинеар эмас. Бу ҳолда O, A, B нуқталар битта тўғри чизикда ётмайди (5-чизма). OAB учбурчакни $OACB$ параллелограммга тулдирсак, векторларни қўшишнинг учбурчак қондасига кура: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$, $\vec{b} + \vec{a} = \vec{OC} + \vec{CB} = \vec{OB}$; бу икки тенгликдан эса $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

2) $\vec{a} \parallel \vec{b}$ булсин. Бу ҳолда O, A, B нуқталар битта d тўғри чизикда ётади. (7-чизма).

d тўғри чизикда ётмайдиган C нуқтани олайлик, у ҳолда

$$\vec{OB} = \vec{OC} + \vec{CB}. \quad (1)$$

(1) ҳолга кура $\vec{OC} + \vec{CB} = \vec{CB} + \vec{OC}$. Лекин $\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB}$, $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{AC}$ бўлгани учун:

$$\vec{OB} = \vec{CA} + \vec{AB} + \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{OA}. \quad (2)$$

(Қарама-қарши векторлар йиғиндиси $\vec{0}$ га тенг бўлган учун $\vec{CA} + \vec{AC} = \vec{0}$). Иккинчи томондан,

$$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}.$$

(2) ва (3) тенгликлардан $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ тенгликка бўламиз.

3) Ҳар қандай $\vec{a}$ векторга ноль векторни қўшилганда $\vec{a}$ вектор ҳосил бўлади, яъни

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$


Учбурчак қондасига кўра исталган $\vec{a} = \vec{OA}$ вектор учун $\vec{OA} + \vec{AA} = \vec{OA}$ тенглик ёки $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ тенглик ўринли.

4) Ҳар қандай $\vec{a}$ вектор учун шундай $\vec{a}'$ вектор мавжудки, унинг учун:

$$\vec{a} + \vec{a}' = \vec{0}.$$

Исбот. $\vec{a} = \vec{OA}$ бўлсин. Векторларни қўшишнинг учбурчак қондасига кўра $\vec{OA} + \vec{AO} = \vec{CO} = \vec{0}$, бундан $\vec{AO} = \vec{a}'$. (4) тенгликни қаноатлантирувчи $\vec{a}'$ вектор $\vec{a}$ векторга қарама-қарши вектор дейилади ва $-\vec{a}$ билан белгиланади.

2. Векторларни айириш. Таъриф. $\vec{a}$, $\vec{b}$ векторларнинг айирмаси деб, $\vec{a}$ вектор билан $\vec{b}$ векторга қарама-қарши $-\vec{b}$ векторнинг йиғиндисига айтилади. Бу таърифдан кўринадики, $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ айирма векторни



8-чизма.


ясаш учун $\vec{c} = \vec{a} + (-\vec{b})$ векторни ясаш керак экан. Агар $\vec{a}$, $\vec{b}$ векторлар битта O нуктага қўйилган (8-чизма) ҳам

да $\vec{a} = \vec{OA}$ ва $\vec{b} = \vec{OB}$ деб белгиланган бўлса, у ҳолда $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{OA} - \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{BO} = \vec{BO} + \vec{OA} = \vec{BA}$. Бу ҳолда $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг айирмасини топиш учун боши B нуктада, охири A нуктада бўлган $\vec{BA}$ векторни ясаш етарли бўлади.

3. Векторни сонга кўпайтириш. $\vec{a} \neq \vec{0}$ вектор ва α сон берилган бўлсин, бу ерда $\alpha \in R$. Таъриф. $\vec{a}$ векторнинг α сонга кўпайтмаси деб шундай $\vec{b}$ векторга айтиладики, $\alpha > 0$ бўлганда $\vec{b}$ нинг йўналиши $\vec{a}$ нинг йўналиши билан бир хил, $\alpha < 0$ да $\vec{b}$ нинг йўналиши $\vec{a}$ нинг йўналишига тескари бўлиб, $\vec{b}$ векторнинг узунлиги эса $\vec{a}$ векторнинг узунлиги билан α сон модулининг кўпайтмасига тенг. $\vec{a}$ нинг α сонга кўпайтмаси $\vec{b} = \alpha \vec{a}$ шаклида белгиланади. Бу таърифдан бевосита қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

- а) ихтиёрий $\vec{a}$ вектор учун: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$;
- б) ихтиёрий $\alpha \in R$ сон учун: $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
- в) ихтиёрий $\vec{a}$ вектор учун: $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$.
- г) $\vec{a}$ ва $\alpha \vec{a}$ векторлар ўзаро коллинеардир;

9-а чизмада $\vec{a}$ вектор 3 сонига кўпайтирилган: $\vec{b} = 3 \cdot \vec{a}$; 9-б чизмада $\vec{c}$ вектор $-\frac{1}{2}$ сонига кўпайтирилган: $\vec{b} = -\frac{1}{2} \vec{c}$. Бирор $\vec{a} \neq \vec{0}$ векторни ўзининг узунлигига тескари $\frac{1}{|\vec{a}|}$ сонга кўпайтирилса, шу вектор йўналишидаги бирлик вектор (орт) ҳосил бўлади, яъни $\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \vec{a}_0$ ($|\vec{a}_0| = 1$).



9-чизма.

Теорема. Агар $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\vec{a} \neq \vec{0}$) бўлса, у ҳолда шундай α сон мавжудки,

булади.

Исбот. $\vec{a} \parallel \vec{b}$ бўлгани учун қуйидаги уч ҳол бўлган мумкин:

1) $\vec{a} \uparrow \vec{b}$ бўлса, $\frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} = \frac{1}{|\vec{b}|} \vec{b}$ бўлиб, бундан $\vec{b} = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \vec{a}$

бу ҳолда $\alpha = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ булади;

2) $\vec{a} \downarrow \vec{b}$ бўлса, $\frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} = -\frac{1}{|\vec{b}|} \vec{b}$ бўлиб, бундан $\vec{b} = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \vec{a}$, бу ҳолда $\alpha = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ булади;

3) $\vec{b} = \vec{0}$ бўлганда $\vec{b} = 0 \cdot \vec{a}$; бундан $\alpha = 0$. Демак, векторни сонга кўпайтириш таърифидан ва бу теоремадан қуйидаги хулосани чиқариш мумкин: $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = \alpha \vec{a}$ ($\alpha \in R$). Шундан қилиб, (5) муносабат $\vec{a}, \vec{b}$ векторлар коллинеарлигининг зарурий ва етарли шартидир.

Векторни сонга кўпайтириш қуйидаги хоссаларга эга:

а) $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;

б) $\alpha(\beta \cdot \vec{a}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ (группалаш қонуни);

в) $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha \cdot \vec{a} + \alpha \vec{b}$ (векторларни қўшишга нисбатан тақсимот қонуни);

г) $(\alpha + \beta) \cdot \vec{a} = \alpha \cdot \vec{a} + \beta \cdot \vec{a}$ (скалярни қўшишга нисбатан тақсимот қонуни).

Иккинчи хоссани, яъни $\alpha(\beta \cdot \vec{a}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ тенгликнинг ўринли эканини кўрсатиш билан чекланамиз.

Исбот. Маълумки, $\alpha(\beta \cdot \vec{a})$ ва $(\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ векторлар бир хил: $|\alpha| \cdot |\beta| \cdot |\vec{a}|$ узунликка эга. Векторни сонга кўпайтириш амалининг таърифига кўра, агар $\alpha \cdot \beta > 0$ бўлса, $\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{a})$ ва $(\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ векторлар бир хил йуналган, агар $\alpha \cdot \beta < 0$ бўлса, бу векторлар $\vec{a}$ га қарама-

қарши йуналган булади. Шундан қилиб, агар $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$, $\alpha \cdot \beta > 0$ бўлса, $\alpha(\beta \cdot \vec{a}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ га эга бўламиз. Агар $\alpha = 0$, $\beta = 0$ ёки $\alpha = 0$ бўлса, у ҳолда $\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{a}) = 0$ ва $(\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a} = 0$ булади. (Қолган хоссаларнинг исботини [8] дан қириш мумкин.)

1-мисол. $ABCDEF$ мунтазам олтибурчак берилган.

$\vec{BC} = \vec{e}$; $\vec{ED} = \vec{m}$ эканлигини ҳисобга олиб, $\vec{AB}, \vec{CD}, \vec{EF}, \vec{AD}, \vec{BE}, \vec{CF}$ ларни $\vec{e}$ ва $\vec{m}$ векторлар орқали ифодаланг (10-чизма).

Ечиш. Берилганга кўра $\vec{BC} = \vec{e}$, $\vec{ED} = \vec{m}$. Шунингдек, изланган векторларни ҳам чизмада белгилаб қўямиз. $ABCDEF$ мунтазам олтибурчак бўлгани учун $\vec{AB} = \vec{ED} = \vec{m}$; $\vec{BO} = \vec{CD}$; $\vec{BC} = \vec{OA}$; $\vec{OF} = -\vec{ED} = -\vec{m}$. Чизмадаги $\triangle AOB$ дан: $\vec{BO} = \vec{AO} - \vec{AB} = \vec{BC} - \vec{ED} = \vec{e} - \vec{m} = \vec{CD}$.

$\vec{EF}$ вектор $\vec{BC}$ векторга қарама-қарши бўлгани учун: $\vec{EF} = -\vec{BC} = -\vec{e}$. Демак,


$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{m} + \vec{e} + \vec{e} - \vec{m} = 2\vec{e}.$$

Худди шунга ўхшаш, топамиз:


$$\begin{aligned} \vec{BE} &= \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DE} = \vec{BC} + \vec{CD} + (-\vec{ED}) = \\ &= \vec{e} + \vec{e} - \vec{m} - \vec{m} = 2\vec{e} - 2\vec{m} = 2(\vec{e} - \vec{m}); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{CF} &= \vec{CD} + \vec{DE} + \vec{EF} = \vec{CD} + (-\vec{ED}) + (-\vec{BC}) = \\ &= \vec{e} - \vec{m} - \vec{m} - \vec{e} = -2\vec{m}. \end{aligned}$$


2-мисол. ABC учбурчак берилган. O нуқта учбурчакнинг оғирлик маркази (яъни учбурчак медианаларининг кесишган нуқтаси) бўлса, $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$ эканини исботланг (11-чизма).



10-чизма.



11-чизма.



12-чизма.

Е чи ш. Томонлари $\vec{OA}$ ва $\vec{OB}$ векторлардан иборат $AOBE$ параллелограмм ясаймиз. Бу параллелограммдан:

$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OE}. \quad (1)$$

О нуқта учбурчакнинг оғирлик маркази бўлгани учун $\vec{OD}$ вектор $\vec{CD}$ нинг учдан бирини ташкил қилади, яъни

$$\vec{OD} = \frac{1}{3} \vec{CD}. \quad (2)$$

Чизмадан:

$$(\vec{OC} = -2\vec{OD}, \vec{OD} = \frac{1}{3}\vec{CD}) \rightarrow \vec{OC} = \vec{OE}. \quad (3)$$

$$(\alpha), (\beta), (\gamma) \Rightarrow (\vec{OC}) = -(\vec{OA} + \vec{OB}) \Rightarrow \\ \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}.$$

3-мисол. $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ тенглик уринли бўлса, томонлари $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан иборат бўлган параллелограмм тўғри тўртбурчак эканлигини исботланг.

Е чи ш. Маълумки, томонлари $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан иборат параллелограммнинг диагоналлари $\vec{a} + \vec{b}$ ва $\vec{a} - \vec{b}$ векторларни ифодалайди. Шунинг учун $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар бўлмаса, шартга асосан, бу векторлар асосида тузилган параллелограмм тенг диагоналлarga эга бўлади. Бу хоссага эга бўлган параллелограмм эса тўғри тўртбурчакдир.

4-мисол. Иккита (l ва m) тросга 45 кг юк осилган (12-чизма). Агар $\angle ACB = 120^\circ$ бўлса, тросларда ҳосил бўлувчи кучларини аниқланг.

Е чиш. Чизмадан кўринишича, тросларга осилган 45 кг юк иккита кучнинг йиғиндисидан иборатдир. Шунинг учун юк йўналишини диагональ сифатида қараб, параллелограмм томонларини топамиз. Бунинг учун ECD параллелограмми ясаймиз, чизмадан: $\angle FCD = 30^\circ$. Параллелограмм томонлари $\vec{CD}$ ва $\vec{CE}$ ларни топамиз:

Тўғри бурчакли $\triangle CFD$ дан: $CF = CD \cdot \cos 30^\circ$,

$$CD = \frac{CF}{\cos 30^\circ} = CE \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{45 \cdot 2\sqrt{3}}{3} = 30\sqrt{3}.$$

Демак, $\vec{CD} = 30\sqrt{3}$ кг.




$\vec{CE}$ ни топамиз. $CD = EF$ бўлгани учун:

$$CE = \frac{EF}{2} = \frac{CA}{2} = \frac{30\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}.$$

Демак, $\vec{CE} = 15\sqrt{3}$ кг.

5-мисол. Ихтиёрий $\vec{a}$ вектор берилган. $2\vec{a}$; $\sqrt{2}\vec{a}$; $-\frac{3}{5}\vec{a}$; $-\sqrt{3}\vec{a}$ векторларни ясанг.

Е чиш. Бу векторларни яшаш учун берилган $\vec{a}$ векторга параллел бўлган тўғри чизиқ оламиз. Бу тўғри чизиқда $2\vec{a}$, $\sqrt{2}\vec{a}$, $-\frac{3}{5}\vec{a}$, $-\sqrt{3}\vec{a}$ векторларни яшаш қийин эмас. $\sqrt{2}\vec{a}$ векторни яшаш учун, катети $\vec{a}$ вектор модулига тенг бўлган тенг ёнли тўғри бурчакли учбурчак ясаймиз. Пифагор теоремасига асосан бу уч-



13-чизма.

бурчакнинг гипотенузаси $\sqrt{2a}$ векторнинг модулига тенг бўлади (13-чизма). $-\sqrt{3a}$ векторни ясаш учун дастлаб $\sqrt{3a}$ векторни ясаймиз. Бунинг учун бир тети $\sqrt{2a}$ вектор модулига, иккинчи катети a вектор модулига тенг тўғри бурчакли учбурчак ясаймиз. Пифагор теоремасига асосан бу учбурчакнинг гипотенузаси $\sqrt{3a}$ векторнинг модулига тенг бўлади (13-чизма).

6-мисол. $2\vec{AB} + \vec{CB} + 3\vec{BA}$ ва $4\vec{AC}$ векторларнинг коллинеар эканини кўрсатинг.


Ечиш. Векторлар устида бажариладиган амалларни кўра қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} 2\vec{AB} + \vec{CB} + 3\vec{BA} &= (2\vec{AB} + 2\vec{BA}) + (\vec{CB} + \vec{BA}) = \\ &= \vec{0} + \vec{CA} = \vec{CA}. \end{aligned}$$

Равшанки, $4\vec{AC}$ ва $\vec{CA}$ векторлар коллинеар.

3-§ Векторлар орасидаги бурчак. Векторларнинг ўқдаги проекцияси

Икки вектор ҳамда вектор ва ўқ орасидаги бурчакни тушунчаларини киритамиз. Бизга $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар берилган бўлсин. Бу векторларнинг бошларини бир-бирининг O нуқтага жойлаштирамиз, бошқача айтганда $\vec{OA} = \vec{a}$ ва $\vec{OB} = \vec{b}$ векторларни ясаймиз (14-чизма). Ҳолда AOB учбурчакнинг ички AOB бурчаги ($\vec{a}$ вектори билан $\vec{b}$ вектор билан устма-уст тушгунча айлантирилган) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак дейилади ҳамда $(\vec{a}, \vec{b})$ кўринишида ёки α , φ , ... ҳарфлардан бири орқали белгиланади. Таърифга кўра векторлар орасидаги бурчак 0° дан 180° гача (масъумида 0 дан π гача) оралиқда бўлади. Бундан кўринади



14-чизма.

бир хил йўналишдаги коллинеар векторлар орасидаги бурчак 0° га, қарама-қарши йўналишдаги векторлар орасидаги бурчак 180° га тенг булар экан. Агар векторлар орасидаги бурчак 90° га тенг бўлса, улар перпендикуляр ёки ортогонал векторлар дейилади.

Агар $\vec{a} \perp \vec{b}$ каби белгиланади.

Агар тўғри чизиқда саноқ боши ҳисобланган O нуқта, масштаб бирлиги ва йўналиш олинган бўлса, бу тўғри чизиқ ўқ деб аталади. Одатда ўқ томонга йўналиш мусбат, чап томонга йўналиш эса манфий деб олинади (15-чизма).

Айтайлик, l ўқ ва унинг бирлик вектори $\vec{e}$ берилган бўлсин. Ихтиёрий $\vec{a} \neq \vec{0}$ векторнинг бирлик вектори $\vec{a}_0$ шундан аниқланади:

$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \text{ чунки}$$

$$|\vec{a}_0| = \left| \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right| = \left| \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} \right| = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot |\vec{a}| = 1.$$

$\vec{a} \neq \vec{0}$ текисликдаги ихтиёрий вектор бўлсин. $\vec{a}$ вектор билан l ўқ орасидаги бурчак деганда l ўқнинг бирлик вектори $\vec{e}$ билан $\vec{a}$ вектор орасидаги бурчак тушурилади. $\vec{a}$ вектор l ўқ билан φ бурчак ташкил қилсин (16-чизма).

Таъриф. Векторнинг ўқдаги ортогонал проекцияси деб вектор узунлигини шу вектор билан ўқ орасидаги бурчак косинусига кўпайтмасига тенг бўлган сонга айтилади. $\vec{a}$ векторнинг l ўқдаги проекцияси $pr_l \vec{a}$ кўринишда белгиланади. Таърифга кўра:

$$pr_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi. \quad (6)$$

$\vec{a}$ векторнинг бу ўқдаги ортогонал проекцияси қуйидагича аниқланади:

$$OA_1 = pr_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi = OA_1.$$

Бу ерда $\varphi = (\vec{e}, \vec{a})$, A_1 нуқта A нуқтанинг l тўғри
зиқдаги проекцияси.

Биз $\vec{a}$ ва $\vec{e}$ векторлар орасидаги бурчак ўткир бў
ган ҳолни кўрлик. φ бурчак ўтмас бўлган ҳолда
 $\vec{a}$ векторнинг l ўқдаги проекцияси OA_1 кесманинг уз
лигига тенг бўлади (16-б чизма), аммо ишора m
билан олинади. Ҳақиқатан ҳам,



$$\begin{aligned} \text{пр}_l \vec{a} &= |\vec{a}| \cdot \cos \varphi = |\vec{a}| \cos \angle BOA = \\ &= -|\vec{a}| \cos \angle A_1OA = -OA_1. \end{aligned}$$

Агар $\vec{a}$ вектор l ўққа перпендикуляр бўлса, φ
 $\varphi = 90^\circ$ бўлиб, $\text{пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos 90^\circ = 0$ бўлади.


Ихтиёрий $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар учун

$$\text{пр}_l (\vec{b} + \vec{c}) = \text{пр}_l \vec{b} + \text{пр}_l \vec{c}$$

тенглик ўринли эканлигини кўрсатиш мумкин. Ҳақиқ



16-чизма.



17-чизма.

тан ҳам, агар $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг l ўқдаги проек
циялари бир хил ишорали бўлса (17-а чизма), қуйида
ги муносабат ўринли бўлади:

$$\begin{aligned} \text{пр}_l (\vec{b} + \vec{c}) &= \text{пр}_l \vec{AC} = -A_1C_1 = -A_1B_1 + B_1C_1 = \\ &= -\text{пр}_l \vec{b} + \text{пр}_l \vec{c}. \end{aligned}$$

Агар проекцияларнинг ишоралари ҳар хил бўлса (17-б
чизма), қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \text{пр}_l (\vec{b} + \vec{c}) &= \text{пр}_l \vec{AC} = -A_1C_1 = -A_1B_1 - B_1C_1 = \\ &= -\text{пр}_l \vec{b} + \text{пр}_l \vec{c}. \end{aligned}$$

Иккала ҳолда ҳам (*) тенглик ўринли.
Бу хоссани n та векторлар йиғиндисининг проекцияси
учун ҳам умумлаштириш мумкин, яъни бир нечта век
торлар йиғиндисининг бирор l ўқдаги проекцияси, шу
векторларнинг l ўқдаги проекцияларининг йиғиндисига
тенг.

Мисол Узунлиги $|\vec{a}| = 5$ га, l ўқ билан ҳосил
қилган бурчаги 60° га тенг бўлган $\vec{a}$ векторнинг l ўқ
даги проекциясини ҳисобланг.

Ечиш. (6) формулага асосан:

$$\text{пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi = 5 \cdot \cos 60^\circ = 5 \cdot \frac{1}{2} = 2,5.$$

4-§. Чизиқли комбинация. Базис

Бизга $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ векторлар ҳамда $\vec{\lambda}_1, \vec{\lambda}_2, \dots, \vec{\lambda}_k$
— ҳақиқий сонлар берилган бўлсин.

Таъриф. $\vec{\lambda}_1 \vec{a}_1 + \vec{\lambda}_2 \vec{a}_2 + \dots + \vec{\lambda}_k \vec{a}_k$ ифода $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$
векторларнинг $\vec{\lambda}_1, \vec{\lambda}_2, \dots, \vec{\lambda}_k$ коэффициентли **чизиқли**
комбинацияси дейилади. Агар $\vec{a}$ вектор $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$
векторларнинг чизиқли комбинацияси шаклида ифода
ланган бўлса, $\vec{a}$ вектор шу векторлар бўйича ёйилган
дейилади, яъни қуйидаги тенглик ўринли бўлади:

$$\vec{a} = \vec{\lambda}_1 \vec{a}_1 + \vec{\lambda}_2 \vec{a}_2 + \dots + \vec{\lambda}_k \vec{a}_k.$$

Агар камид биттаси нолдан фаркли $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сонлар маълум тартибда танлаб олинганда

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$$

тенглик бажарилса, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар *чизикли* боғлиқ дейилади. Агар (7) муносабат фақат $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ да ўринли бўлса, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар чизикли боғланмаган ёки *чизикли эрки* дейилади.

Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар бўлса, чизикли боғлиқ бўлади ва аксинча. Шунингдек, учта вектор чизикли боғлиқ бўлиши учун уларнинг компланар бўлиши зарур ва етарли (юқоридаги икки фикрнинг тўригини мустақил исботлашни ўқувчиларга топширишимиз).

Маълум тартибда олинган $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ векторлар системаси чизикли эрки бўлиб, бошқа ҳар қандай векторни $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ лар орқали чизикли ифодалаш бу векторлар системаси *базис* дейилади ва у $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ кўринишда белгиланади. Агар базиснинг ҳар бир вектори бирлик вектор бўлиб, уларнинг ихтиёрий ҳар иккитаси ўзаро перпендикуляр бўлса, бундай базис ортонормаланган базис дейилади. Базис ташкил этувчи векторлар сонини қаралаётган фазонини *ўлчови* дейилади.

Исталган $\vec{a}$ векторни берилган $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ базис векторлари бўйича ёйиш мумкин:

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2.$$

(8) ёйилмадаги a_1, a_2 сонлар $\vec{a}$ векторнинг $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ базисга нисбатан координатлари дейилади. Бу қисқача $\vec{a} = \{a_1; a_2\}$ кўринишда белгиланади. Худди шунини ухшаш, $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ базис берилган бўлса, ихтиёрий $\vec{a}$ векторни шу базиснинг векторлари бўйича ёйиш мумкин:

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3, \quad (9)$$

бу ерда a_1, a_2, a_3 сонлар $\vec{a}$ векторнинг $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ базисга нисбатан координатлари дейилади ва $\vec{a} = \{a_1; a_2; a_3\}$ кўринишда ёзилади. Масалан,

$$\vec{a} = 2\vec{a}_1 + \vec{a}_2 - 4\vec{a}_3 + \frac{1}{5}\vec{a}_4 - \vec{a}_5 \quad \text{вектор } \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5$$

векторларнинг чизикли комбинациясини ифодалайди. Агар векторларни бошқа векторларнинг чизикли комбинацияси орқали ифодалаш мумкин бўлса, берилган вектор шу векторлар бўйича ёйилган дейилади.

1-мисол. K ва L нуқталар $ABCD$ параллелограмм томонларининг ўрталари бўлсин (18-чизма). $\vec{BC}$ векторни $\vec{m} = \vec{AK}, \vec{n} = \vec{AL}$ векторлар бўйича ёйинг.

Ечнш. $\triangle ABK$ дан

$$\vec{AB} + \frac{1}{2} \vec{BC} = \vec{m}. \quad (10)$$

$\triangle ALD$ дан $\vec{AD} + \vec{DL} = \vec{n}$. Чизмадан тубандагиларга эга бўламиз:

$$\vec{AD} = \vec{BC}; \quad \vec{DL} = \frac{1}{2} \vec{DC} = \frac{1}{2} \vec{AB}.$$

У ҳолда

$$\vec{BC} + \frac{1}{2} \vec{AB} = \vec{n}. \quad (11)$$

(10) дан:


$$\vec{AB} = \vec{m} - \frac{1}{2} \vec{BC}. \quad (12)$$

(12), (11) лардан:


$$\vec{BC} + \frac{1}{2} \vec{m} - \frac{1}{4} \vec{BC} = \vec{n}$$

ёки

$$\vec{BC} = \frac{4}{3} \vec{n} - \frac{2}{3} \vec{m}.$$



18-чизма.



19-чизма.

2-мисол. $ABCD, B_1, C_1, D_1$ куб берилган (19-чизма). А векторни $\vec{m} = \vec{AB}$; $\vec{n} = \vec{AC}$ $\vec{l} = \vec{AA_1}$ векторлар бўйининг, бунда Q нукта BB_1, C_1D_1 ёқнинг маркази.

Ечиш. BC қирранинг ўрта таси N нукта бўлсин. У ҳолда

$$\vec{AN} = \vec{AB} + \vec{BN} = \vec{m} + \frac{1}{2}\vec{BC}$$

$\triangle AQN$ дан:

$$\vec{AQ} = \vec{AN} + \vec{NQ}.$$

Чизмадан:

$$\vec{BC} = \vec{n} - \vec{m}; \quad \vec{NQ} = \frac{1}{2}\vec{AA_1} = \frac{1}{2}\vec{l}.$$

У ҳолда (13), (14), (15) лардан қуйидагига эга бўламиз:

$$\vec{AQ} = \vec{m} + \frac{1}{2}(\vec{n} - \vec{m}) + \frac{1}{2}\vec{l} = \frac{1}{2}\vec{m} + \frac{1}{2}\vec{n} + \frac{1}{2}\vec{l}.$$

5-§ Координаталари билан берилган векторлар устида амаллар

Координата формада ёзилган векторлар устида баъзи амалларни бажаришни кўрайлик.

$\vec{a}, \vec{b}$ векторлар $B = \{\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3\}$ базисга нисбатан қуйидаги координаталарга эга бўлсин:

$$\vec{a} = \{a_1; a_2; a_3\} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3;$$

$$\vec{b} = \{b_1; b_2; b_3\} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3.$$

1. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларни қўшишда уларнинг мос координаталари қўшилади. Ҳақиқатан ҳам,

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) + (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) = \\ &= (a_1 + b_1)\vec{e}_1 + (a_2 + b_2)\vec{e}_2 + (a_3 + b_3)\vec{e}_3 = \\ &= \{a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3\}. \end{aligned}$$

2. $\vec{a} - \vec{b}$ айирмани топилганда векторларнинг мос координаталари айрилади. Ҳақиқатан ҳам,

$$\begin{aligned} \vec{a} - \vec{b} &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) - (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) = \\ &= (a_1 - b_1)\vec{e}_1 + (a_2 - b_2)\vec{e}_2 + (a_3 - b_3)\vec{e}_3 = \\ &= \{a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3\}. \end{aligned}$$

3. Векторни сонга кўпайтиришда унинг барча координаталари шу сонга кўпайтирилади. Ҳақиқатан ҳам,

$$\lambda\vec{a} = \lambda(a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3) = (\lambda a_1)\vec{e}_1 + (\lambda a_2)\vec{e}_2 + (\lambda a_3)\vec{e}_3$$

га эга бўлади. Юқоридаги қондалар координаталари билан берилган бир нечта векторлар устида амаллар бажаришда ҳам ўз кучини сақлайди.

(14) Мисол. $\vec{a} = \{2; -1; \frac{1}{3}\}$; $\vec{b} = \{4; \frac{1}{2}; -3\}$ ва $\vec{c} = \{2; 1; 0\}$ векторлар берилган.

(15) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$, $5\vec{a}$ векторларнинг координаталари

$$\begin{aligned} \text{Ечиш. } \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} &= \{2 + 4 + 2; -1 + \frac{1}{2} + 1; \frac{1}{3} - 3 + 0\} = \{8; \frac{1}{2}; -2\frac{2}{3}\}. \end{aligned}$$

$$5\vec{a} = \{5 \cdot 2; 5 \cdot (-1); 5 \cdot \frac{1}{3}\} = \{10; -5; 1\frac{2}{3}\}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} &= \{2 \cdot \frac{1}{2} + 4; \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2}; \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - 3\} = \\ &= \{5; 0; -2\frac{5}{6}\}. \end{aligned}$$

6-§. Векторларнинг скаляр кўпайтмаси

Векторлар устида ҳозиргача бажарилган амаллар (қўшиш, айириш, сонга кўпайтириш) чизиқли амаллар бўлиб, натижада яна векторлар келиб чиқади. Энди векторлар устида натижада скаляр (сон) ҳосил бўладиган амални кўриб чиқамиз.

Таъриф. Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ вектор узунликлари билан улар орасидаги бурчак косинусининг кўпайтмаси-

дан ҳосил булган сон бу векторларнинг $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг кўпайтмаси дейилади. Агар иккита вектордан бирорто ноль вектор бўлса, скаляр кўпайтма нолга тенг бўлади.

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг скаляр кўпайтмаси $\vec{a} \cdot \vec{b}$ қилинишида белгиланади, демак,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi. \quad (1)$$

Бу ерда φ берилган $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак. (16) формула физикада ўзгармас $\vec{F}$ кучининг бошлангич B нуқтадан C нуқтагача тугри чизиқли ҳаракати давомида бажарган иши

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{BC}| \cdot \cos \varphi$$

ни ифодалайди. У скаляр катталик бўлиб, F ва BC векторларнинг скаляр кўпайтмасидан иборатдир. Бу ерда $\vec{F}$ куч вектори ва $\vec{BC}$ вектор орасидаги бурчак.

Мисол. $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ ҳамда $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак 135° га тенг бўлса, $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг.

Ечиш. (16) формулага асосан топамиз:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \cdot 3 \cdot \cos 135^\circ = 2 \cdot 3 \cdot \cos (90^\circ + 45^\circ) = \\ &= -6 \cdot \sin 45^\circ = -6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Скаляр кўпайтманинг хоссаларини курайлик.

1. Ихтиёрий $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар учун қуйидаги муносабат уринлидир:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}. \quad (17)$$

Бу хосса скаляр кўпайтманинг коммутативлик хоссаи дейилади.

Исбот. Бу хосса скаляр кўпайтманинг таърифи билан бевосита келиб чиқади, яъни

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}, \\ \vec{b} \cdot \vec{a} &= |\vec{b}| \cdot |\vec{a}| \cos \varphi \end{aligned}$$

2. Ихтиёрий a ва b векторлар ва ихтиёрий k сон учун қуйидаги тенглик ўринлидир:

$$(ka) \cdot b = k(a \cdot b). \quad (18)$$

Бу хоссадан векторларни скаляр купайтиришда сонли купайтувчини скаляр купайтма белгиси ташқарисига чиқариш мумкин деган хулоса келиб чиқади.

Исбот. Бу хоссани исбот қилиш учун икки вектор орасидаги бурчак тушунчасидан фойдаланамиз. Маълумки, агар $k > 0$ бўлса, a ва b векторлар орасидаги бурчак ka ва b векторлар орасидаги бурчакка тенг бўлади. Қуйидагига эгамиз:

$$\begin{aligned} (ka) \cdot b &= |k| |a| \cdot |b| \cdot \cos \varphi = k |a| \cdot |b| \cos \varphi = \\ &= k(a \cdot b). \end{aligned}$$

Агар $k < 0$ бўлса, a ва b векторлар орасидаги бурчак $\alpha = 180^\circ - \varphi$ га тенг:

$$\begin{aligned} (ka) \cdot b &= |ka| \cdot |b| \cos(180^\circ - \varphi) = \\ &= k |a| |b| \cos \varphi = k |a| |b| \cos \varphi = k(a \cdot b). \end{aligned}$$

3. Ҳар қандай a , b ва c векторлар учун қуйидаги тенглик ўринлидир:

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c. \quad (19)$$

Бу хосса скаляр купайтманинг дистрибутивлик хоссаси дейилади.

Исбот. Агар $a = 0$ бўлса, $a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ тенгликнинг ўринлилиги ўз-ўзидан равшан. Агар $a \neq 0$ бўлса, у ҳолда $a(b + c) = |a| \text{пр}_l(b + c)$. Бу ерда l ўқи $\frac{a}{|a|} = e$ бирлик вектори билан аниқланган.

Ҳар қандай b ва c векторлар учун (3-§ га қаранг)

$$\text{пр}_l(b + c) = \text{пр}_l b + \text{пр}_l c$$

муносабат ўринлидир. Демак,

$$\vec{a}(\vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}| \cdot (\text{пр}_1 \vec{b} + \text{пр}_1 \vec{c}) = \\ = |\vec{a}| \text{пр}_1 \vec{b} + |\vec{a}| \text{пр}_1 \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c},$$

бундан эса $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ тенгликнинг ўринли экани кўринади.

4. Ҳар қандай векторнинг ўз-ўзига скаляр кўпайтмаси бу вектор узунлигининг квадратиغا тенг:

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2. \quad (20)$$

Исбот. Скаляр кўпайтма таърифидан:

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2 \cos 0^\circ = |\vec{a}|^2.$$

$\vec{a} \cdot \vec{a}$ ифода $\vec{a}^2$ билан белгиланади ва $\vec{a}$ векторнинг скаляр квадратини деб аталади. Бунга кўра (20) тенгликдан $\vec{a}$ векторнинг узунлиги учун қуйидагига эга бўламиз:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2}. \quad (21)$$

5. Ортонормалланган $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ базис учун:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \text{ да, } i = 1, 2, 3. \\ 1, & i = j \text{ да} \end{cases}$$

Исбот. Скаляр кўпайтма таърифидан:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = |\vec{e}_i| |\vec{e}_j| \cos(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \\ = 1 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad (i \neq j).$$

Хусусий ҳолда

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i = |\vec{e}_i|^2 = 1.$$

Скаляр кўпайтма ёрдамида бизга таниш баъзи айниятларни исботлаш мумкин.

Масалан, $(\vec{a} \pm \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$ айниятни исбот қилайлик, бунинг учун айниятнинг чап томонидан унинг ўнг томонини келтириб чиқарамиз:

$$(\vec{a} \pm \vec{b})(\vec{a} \pm \vec{b}) = \vec{a}(\vec{a} \pm \vec{b}) \pm \vec{b}(\vec{a} \pm \vec{b}) = \\ = \vec{a} \cdot \vec{a} \pm \vec{a} \cdot \vec{b} \pm \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{a}^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2.$$

Теорема. Ноль бўлмаган иккита векторнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг бўлса, бу векторлар ўзаро перпендикуляр бўлади ва аксинча.

Исбот. Фараз қилайлик, $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар ўзаро перпендикуляр бўлсин, у ҳолда улар орасидаги бурчак 90° га тенг, демак,

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0.$$

у ҳолда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b}),$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0; \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Демак, $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг бўлса, у векторлар перпендикулярдирлар. Ноль бўлмаган иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг бўлиши учун $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ бўлиши керак, бу эса $(\vec{a}, \vec{b})$ бурчак 90° қийматини қабул қилганда ўринлидир. Демак,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

Энди координаталари билан берилган векторларнинг скаляр кўпайтмасини қараймиз. Ортонормалланган $B = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ базисда $\vec{a} = \{x_a, y_a, z_a\}$ ва $\vec{b} = \{x_b, y_b, z_b\}$ векторлар координаталари билан берилган бўлсин.

У ҳолда $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар

$$\vec{a} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k},$$

$$\vec{b} = x_b \vec{i} + y_b \vec{j} + z_b \vec{k}$$

ёйилмаларга эга бўлади. Скаляр кўпайтманинг хоссаларидан фойдаланиб $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларни скаляр кўпайтирамиз:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k})(x_b \vec{i} + y_b \vec{j} + z_b \vec{k}) =$$

$$= x_a x_b \vec{i} \cdot \vec{i} + x_a y_b \vec{i} \cdot \vec{j} + x_a z_b \vec{i} \cdot \vec{k} + y_a x_b \vec{j} \cdot \vec{i} + \\ + y_a y_b \vec{j} \cdot \vec{j} + y_a z_b \vec{j} \cdot \vec{k} + z_a x_b \vec{k} \cdot \vec{i} + z_a y_b \vec{k} \cdot \vec{j} + z_a z_b \vec{k} \cdot \vec{k}$$

(5) хоссага кўра:

$$\vec{i}^2 = 1; \vec{j}^2 = 1; \vec{k}^2 = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0.$$

У ҳолда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b. \quad (22)$$

Демак, координаталари билан берилган икки векторнинг скаляр кўпайтмаси бу векторлар мос координаталари кўпайтмаларининг йиғиндисига тенг.

Координаталари билан берилган $\vec{a} = \{x_a; y_a; z_a\}$ вектор учун $\vec{a} \cdot \vec{a}$ скаляр кўпайтмани топайлик. $\vec{a}$ ни $\vec{a} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k}$ кўринишда ёзиб оламиз.

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = (x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k}) \cdot (x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k})$$

тенгликка асосан

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = x_a x_a + y_a y_a + z_a z_a,$$

$$a^2 = x_a^2 + y_a^2 + z_a^2.$$

Маълумки,

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a^2} = \sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}. \quad (23)$$

Бу эса координаталари билан берилган $\vec{a}$ векторнинг узунлиги $|\vec{a}|$ нинг координаталари квадратларининг йиғиндисидан олинган арифметик квадрат илдизга тенг эканлигини кўрсатади.

1-мисол. Берилган $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ ва $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ векторларнинг $\vec{a} \cdot \vec{b}$ скаляр кўпайтмасини ҳисобланг.

Ечиш. Скаляр кўпайтма хоссасидан фойдаланиб толамиз:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (2\vec{i} - 3\vec{j}) \cdot (-\vec{i} + 2\vec{j}) = \\ &= -2\vec{i} \cdot \vec{i} + 4\vec{i} \cdot \vec{j} + 3\vec{j} \cdot \vec{i} - 6\vec{j} \cdot \vec{j} = \\ &= -2\vec{i}^2 - 6\vec{j}^2 = -2 - 6 = -8. \end{aligned}$$

2-мисол. Координаталари билан берилган $\vec{a} =$

$\vec{a} = \{-1; 3; 2\}$ ва $\vec{b} = \{2; -1; -3\}$ векторларнинг скаляр купайтмасини ҳисобланг.

Ечиш. (22) формулага асосан:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-3) = -11.$$

3-мисол. Координаталари билан берилган $\vec{a} = \{-2; 5; 7\}$ ва $\vec{b} = \{1; -4; -6\}$ векторлар йиғиндисини ва айирмасининг узунлигини топинг.

Ечиш. Маълумки, икки вектор йиғиндисининг (айирмасининг) координаталари қўшилувчи (камаювчи ва айрилувчи) векторлар мос координаталарнинг йиғиндисидан (айирмасидан) иборатдир:

$$\vec{a} + \vec{b} = \{-2 + 1; 5 - 4; 7 - 6\} = \{-1; 1; 1\};$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \{-2 - 1; 5 + 4; 7 + 6\} = \{-3; 9; 13\}.$$

Энди йиғинди ва айирма векторлар узунлигини топамиз. (23) муносабатга асосан:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}; |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3},$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 9^2 + 13^2} = \sqrt{258}; |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{258}.$$

Скаляр купайтмадан фойдаланиб икки вектор орасидаги бурчакни, векторларнинг ўқдаги проекцияларини ҳисоблаш мумкин. Икки вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ орасидаги бурчак

$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ формула бўйича ҳисобланади. Агар векторлар координаталари билан берилган бўлса, улар орасидаги бурчак

$$\cos \varphi = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

формула бўйича ҳисобланади.

Мисол. Берилган $\vec{a} = \{2; 3\}$ ва $\vec{b} = \{1; 2\}$ векторлар орасидаги бурчакни топинг.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 8,$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}.$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}.$$

$$\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{8}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{5}}$$

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{65}}; \varphi = \arccos\left(\frac{8}{\sqrt{65}}\right).$$

Машқлар

1. $\vec{\alpha}$ ва $\vec{\beta}$ векторлар берилган. Қуйидаги векторларни ясанг:

1) $\frac{\vec{\alpha} + \vec{\beta}}{2}$; 2) $\frac{\vec{\alpha} - \vec{\beta}}{2}$; 3) $\vec{\alpha} + \frac{\vec{\beta}}{2}$; 4) $2\vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

2. О нуқта $ABCD$ параллелограмм диагоналлари-нинг келишиш нуқтаси. $\vec{AB} = \vec{p}$ ва $\vec{AD} = \vec{q}$ бўлса, $\vec{BC}$, $\vec{CB}$, $\vec{CD}$, $\vec{DC}$, $\vec{BD}$, $\vec{OA}$, $\vec{CO}$, $\vec{BO}$ векторларни $\vec{p}$ ва $\vec{q}$ лар орқали ифодаланг.

3. Моддий нуқтага иккита $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ куч таъсир қилади. Агар $|\vec{F}_1| = 10$ Н, $|\vec{F}_2| = 6$ Н бўлиб, $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ векторлар орасидаги бурчак 90° бўлса, уларнинг тенг таъсир этувчисини топинг.

4. $ABCD$ тетраэдр берилган. а) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD}$;
б) $\vec{AC} + \vec{CD} + \vec{AB}$ йиғиндиларни топинг.

5. ABC учбурчакда $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AC} = \vec{b}$ ва медиана $\vec{AD} = \vec{c}$ бўлсин. $\vec{c}$ векторни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орқали, $\vec{b}$ векторни $\vec{c}$ ва $\vec{a}$ векторлар бўйича ёйинг.

6. $ABCD, B_1C_1D_1$ куб берилган. $\vec{AC}_1$, $\vec{AB}_1$, $\vec{D_1C_1}$, $\vec{B_1D_1}$ векторларни $\vec{a} = \vec{AB}$; $\vec{b} = \vec{AD}$; $\vec{c} = \vec{AA_1}$ векторлар бўйича ёйинг.

7. Узунлиги $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ бўлган $\vec{a} = \vec{AB}$ вектор абсциссалар ўқи ($\vec{e}$ бирлик вектори) билан 45° ли бурчак ташкил этади. Бу векторнинг Ox ўқдаги проекциясини топинг.

8. $ABCD$ тўғри тўртбурчакда $\vec{DB} = \vec{a}$ ва $\vec{AC} = \vec{b}$ диагоналлار ўтказилган. $\vec{BD}$, $\vec{BC}$, $\vec{CB}$ векторларни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг чизиқли комбинацияси кўринишида ифодаланг.

9. $\vec{a} = \{3; 2\}$; $\vec{b} = \{-1; 0\}$ векторларнинг йигиндисини топинг.

10. Агар $\vec{p} = \{4; -7; 3\}$ ва $\vec{q} = \{-5; 9; \frac{1}{2}\}$ бўлса, $\vec{a} = 3\vec{p} + 2\vec{q}$ векторнинг координаталарини топинг.

11. Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак $(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$, уларнинг узунликлари эса $|\vec{a}| = 4$; $|\vec{b}| = 3$ бўлса, бу векторларнинг скаляр квадратларини ва уларнинг скаляр кўпайтмасини топинг.

12. Векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг:

1) $\vec{a} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$ ва $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j}$ нинг;

2) $A(-2; 3)$; $B(3; 5)$ ва $C(4; -2)$ бўлса, $\vec{AB}$ ва $\vec{BC}$ нинг.

13. Агар $\vec{a} = \{-2; 3\}$; $\vec{b} = \{3; 5\}$; $\vec{c} = \{-2; 8\}$ ва $\vec{d} = \{3; 1\}$ бўлса, бу векторлар учун

а) $\vec{a} \cdot \vec{b}$; б) b^2 ; в) $\sqrt{a^2}$; г) $(\vec{a} + \vec{c})^2$; д) $(2\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$ ларни ҳисобланг.

14. $\vec{a} = \{-2; 3\}$ векторга перпендикуляр бўлган бирлик векторнинг координаталарини топинг.

15. $\vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ ва $\vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$ векторлар орасидаги бурчакни топинг.

16. $\vec{a} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$ ва $\vec{b} = 2\vec{i} + 6\vec{j} - 4\vec{k}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг.

ТЕКИСЛИКДА ВА ФАЗОДА ТЎҒРИ БУРЧАКЛИ ДЕКАРТ КООРДИНАТАЛАРИ

1-§. Текисликда координаталар системасини киритиш

Текисликда бирор O нуқтада кесишувчи ўзаро перпендикуляр иккита ўқни оламиз. Бу ўқларнинг ҳар бирида O нуқтадан бошлаб коллинеар бўлмаган $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторларни ажратамиз (20-чизма). Бу векторлар системаси $B = \{\vec{i}, \vec{j}\}$ базисни аниқлайди.

1-таъриф. Мусбат йўналишлари мос равишда $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторлар билан аниқланувчи иккита ўқдан ташкил топган система текисликда тўғри бурчакли координаталар системаси дейилади ва $R = \{O, \vec{i}, \vec{j}\}$ кўринишда белгиланади. O нуқта координаталар боши, $\vec{i}$, $\vec{j}$ бирлик векторлар эса координата векторлари дейилади. Таърифга асосан $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторлар ортогонал ва бирлик векторлардир:


$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1; \vec{i} \perp \vec{j}.$$

Мусбат йўналишлари $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторлар билан аниқланган Ox , Oy ўқлар мос равишда абсциссалар ва ординаталар ўқлари деб аталади.

Текисликда $R = \{O, \vec{i}, \vec{j}\}$ координата системаси берилган бўлсин. Шу текисликнинг A нуқтаси учун $\vec{OA}$ вектор A нуқтанинг радиус-вектори дейилади.

$\vec{OA}$ вектор учун қуйидаги муносабатни ёзиш мумкин:

$$\vec{OA} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}.$$



20-чизма.

2-таъриф. OA радиус-векторнинг x, y координа-

талари A нуқтанинг $R = \{0, \vec{i}, \vec{j}\}$ координаталар системасида координаталари дейилади ва у $A(x; y)$ кўринишда белгиланади. Бунда x сон A нуқтанинг абсциссаси, y сон эса A нуқтанинг ординатаси дейилади.

Векторнинг координаталарини қуйидагича таърифлаймиз.

3-таъриф. Векторнинг координата уқларидаги проекциялари векторнинг координаталари дейилади.

Векторнинг Ox ўқидаги проекцияси унинг биринчи координатаси ёки x координатаси, Oy ўқидаги проекцияси унинг иккинчи координатаси ёки y координатаси дейилади.

Масалан, агар a векторнинг координаталарини x_a, y_a билан белгиласак, у ҳолда таърифга асосан қуйидагига эга бўламиз:

$$x_a = \text{пр}_{Ox} \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{i}),$$

$$y_a = \text{пр}_{Oy} \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{j}).$$

Координаталар текислигида $\vec{a} = \vec{AB}$ вектор берилган бўлсин. A нуқтадан Ox ўқига параллел, B нуқтадан Oy ўқига параллел тўғри чизиқлар ўтказамиз (21-чизма). Уларнинг кесишиш нуқтаси C бўлсин. У ҳолда

$$\vec{AC} = x_a \cdot \vec{i}, \quad \vec{CB} = y_a \cdot \vec{j}$$

ва

$$\vec{a} = \vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB} = x_a \cdot \vec{i} + y_a \cdot \vec{j}$$


деб ёза оламиз. Бундан қуйидаги хулоса келиб чиқади: агар x_a, y_a лар $\vec{a}$ векторнинг координаталари бўлса, унда $\vec{a}$ векторни унинг координаталари орқали ушбу кўринишда ёзиш мумкин:

$$\vec{a} = x_a \cdot \vec{i} + y_a \cdot \vec{j}. \quad (1)$$


(1) вектор тенгликни кўп ҳолларда ушбу

$$\vec{a} = \{x_a; y_a\}$$

символик кўринишда ёзилади. (1) тенглик текисликда-



21-чизма.



22-чизма.

ги ҳар қандай векторни иккита ўзаро перпендикуляр векторларга ёйиб ёзиш мумкинлигини кўрсатади. Умуман, текисликдаги ҳар қандай векторни коллинеар бўлмаган иккита векторга ёйиб ёзиш мумкин (бу факт қийшиқ бурчакли декарт координаталари системасини тузиш учун асос бўлади).

$\vec{a}$ векторнинг боши ва охири координаталари $R = [0, \vec{i}, \vec{j}]$ координаталар системасида маълум бўлса, бу векторнинг координаталарини топиш масаласини қарайлик. Айтайлик, $R = [0, \vec{i}, \vec{j}]$ га нисбатан $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ бўлсин (22-чизма). У ҳолда

$$\vec{OA} = x_1 \cdot \vec{i} + y_1 \cdot \vec{j}; \vec{OB} = x_2 \cdot \vec{i} + y_2 \cdot \vec{j}$$

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} \text{ ва } \vec{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}.$$

Бундан

$$\vec{AB} = \vec{a} = [x_2 - x_1; y_2 - y_1].$$

яъни векторнинг координаталари шу вектор охири ва бошининг тегишли координаталари айирмасига тенг.


Агар $\vec{a} = \vec{AB}$ вектор боши ва охирининг координаталари $A(x_A; y_A)$ ва $B(x_B; y_B)$ бўлса, у ҳолда иккита нукта орасидаги масофа

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

формула билан топилади.

1-мисол. $R = [0, \vec{i}, \vec{j}]$ да $M(2; -5)$, $N(3; 0)$ нукталарни ясанг.

Ечиш. $M(2; 5)$ нуктани ясаш учун $\vec{OM} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$ векторни ясаймиз. Бунинг учун 0 нуктадан бошлаб $\vec{i}$ га коллинеар $2\vec{i}$ векторни, $\vec{j}$ га коллинеар $-5\vec{j}$ векторни ясаймиз. Сўнгра бу векторларнинг йи-



23-чизма.

гиндисини топсак, $\vec{OM}$ вектор ҳосил бўлади ва ундан изланаётган M нуктани топамиз. Худди шундай $N(3; 0)$ нуктани ясаш учун $\vec{ON} = 3\vec{i}$ векторни ясаймиз (23-чизма).

2-мисол. Агар $A(1; 2)$, $B(-2; 3)$ бўлса, $\vec{AB}$ векторнинг координаталарини топинг.

Ечиш. Бу ерда $x_1 = 1$, $x_2 = -2$, $y_1 = 2$, $y_2 = 3$. (2) формулага кўра: $\vec{AB} = [-2 - 1; 3 - 2] = [-3; 1]$.

3-мисол. $A(1, -2)$ ва $B(4, -3)$ нукталар орасидаги масофани топинг.

Ечиш. Изланаётган масофани (*) формулага асосан топамиз:

$$\rho(A; B) = \sqrt{(4 - 1)^2 + (-3 + 2)^2} = \sqrt{9 + 1},$$

$$\rho(A; B) = \sqrt{10}.$$

4-мисол. Берилган $A(4, 3)$ нуктадан 5 бирлик масофада Oy ўқида ётган $B(x, y)$ нуктани топинг.

Ечиш. Шартга кўра B нукта Oy ўқида ётади. Oy ўқида ётган ҳар бир нуктанинг абсциссаси нолга тенг бўлганлиги билан B нукта $B(0, y)$ координаталарга эга. (*) формулага асосан:

$$5 = \sqrt{(0 - 4)^2 + (y - 3)^2}$$

$$25 = 16 + y^2 - 6y + 9$$

$$y^2 - 6y = 0; y(y - 6) = 0$$

$$y = 0; y = 6.$$

Демак, $A(4, 3)$ нуктадан узоқлиги 5 га тенг бўлиб, Oy ўқида ётувчи иккита нукта мавжуд экан:

$$B_1(0; 0) \text{ ва } B_2(0; 6).$$


Фазонинг O нуқтаси, кесишувчи ўзаро перпендикуляр учта Ox , Oy , Oz тўғри чизиқларни оламиз (24-чизма). Бу тўғри чизиқларнинг ҳар бир жуфти орқали текислик утказамиз. Ox ва Oy тўғри чизиқлар орқали ўтувчи текисликни xOy текислик деб, қолган иккита текисликни мос равишда xOz ва yOz деб белгилаймиз. Ox , Oy , Oz тўғри чизиқлар *координата ўқлари* (мос равишда абсцисса, ордината, аппликата), уларнинг кесишиш нуқтаси координаталар боши, xOy , yOz ва xOz текисликлар *координата текисликлари* дейилади.

O нуқта ҳар қайси координата ўқини иккита яриш тўғри чизиққа ажратади. Улардан бирини мусбат, бошқасини манфий деб келишиб оламиз. Бу усул билан ҳосил қилинган Ox, Oy, Oz системага фазода тўғри бурчакли (декарт) координаталар системаси дейилади. Одатда Ox , Oy , Oz координата ўқларининг бирлик векторлари

мос равишда $\vec{i}$, $\vec{j}$ ва $\vec{k}$ лар орқали белгиланади. Фазода тўғри бурчакли координаталар системаси символически $R = \{0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ кўринишда ҳам белгиланади.

Фазодаги векторнинг координаталари деб унинг координата ўқларидаги протекцияларига айтилади. Векторнинг Ox ўқдаги протекцияси унинг биринчи ёки x координатаси, Oy ўқдаги протекцияси иккинчи ёки y координатаси, Oz ўқдаги протекцияси учинчи ёки z координатаси дейилади.

Тўғри бурчакли координаталар системасида узининг x_a, y_a, z_a координаталари билан бирор $\vec{a}$ вектор белгирилган бўлсин. 1-§ га ўхшаш бу ерда ҳам



24-чизма.

$$\vec{a} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k} \quad (3)$$

тенгликнинг бажарилишини исботлаш мумкин. (3) тенгликни кўпчилик ҳолларда $\vec{a}(x_a; y_a; z_a)$ символик кўринишда ёзилади. Бу тенглик фазодаги ҳар қандай векторни ўзаро перпендикуляр учта векторлар ёйиб ёзиш мумкинлигини

билдиради. Умуман олганда фазодаги ҳар қандай векторни учта ўзаро компланар бўлмаган векторларга ёйиш мумкин.

Векторлар координаталари билан берилганда улар ўстида қўшиш, айтириш ва векторни сонга кўпайтириш амалларини кўрайлик.

Векторларни қўшиш (айириш) ва векторни сонга кўпайтириш хоссасидан: агар $\vec{a}$ векторнинг координаталари $x_a; y_a; z_a$ дан иборат, $\vec{b}$ векторнинг координаталари эса $x_b; y_b; z_b$ бўлса, у ҳолда

$$\vec{a} \pm \vec{b} = x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k} \pm x_b \vec{i} \pm y_b \vec{j} \pm z_b \vec{k} = \\ = (x_a \pm x_b) \vec{i} + (y_a \pm y_b) \vec{j} + (z_a \pm z_b) \vec{k}$$

ва

$$\lambda \vec{a} = \lambda(x_a \vec{i} + y_a \vec{j} + z_a \vec{k}) = \lambda x_a \vec{i} + \lambda y_a \vec{j} + \lambda z_a \vec{k}$$

эканлиги келиб чиқади.

Шундай қилиб, $\vec{a} \pm \vec{b}$ вектор $x_a \pm x_b; y_a \pm y_b; z_a \pm z_b$ координаталарга эга бўлади, яъни

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \{x_a \pm x_b; y_a \pm y_b; z_a \pm z_b\}. \quad (4)$$


$\lambda \vec{a}$ векторнинг координаталари эса $\lambda x_a; \lambda y_a; \lambda z_a$ бўлади, яъни

$$\lambda \vec{a} = \{\lambda x_a; \lambda y_a; \lambda z_a\}. \quad (5)$$

Демак, икки векторни қўшганда (айирганда) уларнинг мос координаталари қўшилади (айирилади). Векторни сонга кўпайтирганда, унинг ҳар бир координатаси шу сонга кўпайтирилади.

Мисол. $\vec{a} = \{2; -3; 1\}$ вектор берилган. Унга коллинеар бўлган $\vec{b} = \{x; y; 4\}$ векторнинг номаълум координаталарини аниқланг.

Ечиш. Икки векторнинг коллинеарлик таърифига асосан (IV боб, 2-§, 3-пункт) $\vec{b} = k\vec{a} = k(2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$ деб ёзамиз. У ҳолда (2) формулага асосан: $\vec{b} = \{2k; -3k; k\}$. Иккинчи томондан, $k = 4$. Демак, $\vec{b} = \{8; -12; 4\}$ бўлади.



25-чизма.

Энди A нуқтанинг координаталарини кўриб ўтамиз. Айтайлик, фазода O хуз декарт координаталар системаси берилган бўлсин (25-чизма). Бу системада исталган A

нуқта учун $\vec{OA}$ векторининг координаталари шу A нуқтанинг координаталари дейилади. Демак, нуқтанинг координаталари—унинг радиус-векторининг координаталаридир. Одатда A нуқтанинг

координаталари шу ҳарфнинг ёнида кичик қавс ичида ёзилади: $A(x_A; y_A; z_A)$.

A ва B нуқталарнинг координаталари маълум бўлганда $\vec{AB}$ векторнинг координаталарини топишни кўрайлик. Айтайлик, A нуқтанинг координаталари $(x_A; y_A; z_A)$, B нуқтанинг координаталари $(x_B; y_B; z_B)$ бўлсин. У ҳолда (25-чизма):

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} = x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k} - x_A \vec{i} - y_A \vec{j} - z_A \vec{k} = \\ &= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}.\end{aligned}$$

Бу ердан $\vec{AB}$ вектор $x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A$ координаталарга эга бўлишини кўрамиз. Демак, векторнинг координаталари унинг охири ва бошини билдирувчи нуқталарнинг мос координаталари айирмасига тенг:

$$\vec{AB} = \{x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A\}. \quad (6)$$

A ва B нуқталар орасидаги масофа эса $\vec{AB}$ вектор узунлигига тенг. Демак, координаталари билан берилган икки нуқта орасидаги $d = |\vec{AB}|$ масофа қуйидаги формула билан топилади:

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}. \quad (**)$$

Мисол. Агар $A(3; 4; 1)$ ва $B(5; 4; 1)$ бўлса, $\vec{AB}$ векторининг координаталарини топинг.

Ечиш. Айтайлик, $\overrightarrow{AB} = \{x_{AB}; y_{AB}; z_{AB}\}$ бўлсин. У ҳолда (6) формулага асосан:

$$x_{AB} = x_B - x_A = 5 - 3 = 2,$$

$$y_{AB} = y_B - y_A = 4 - 4 = 0.$$

$$z_{AB} = z_B - z_A = 11 - 1 = 10.$$

Демак,

$$\overrightarrow{AB} = \{2; 0; 10\} \text{ бўлади.}$$

3-§. Кесмани берилган нисбатда бўлиш

MN кесмани берилган $\lambda_1 : \lambda_2$ нисбатда бўлиш талаб қилинсин. Агар MN кесмада ML масофа абсолют қийматининг LN масофа абсолют қийматига нисбати $\lambda_1 : \lambda_2$ га тенг бўлса, L нуқта MN кесмани $\lambda_1 : \lambda_2$ нисбатда бўлади дейилади. Берилган масалани ҳал қилиш учун

MN кесманинг $\frac{|\overrightarrow{ML}|}{|\overrightarrow{LN}|} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ тенгликни қаноатлантирув-

чи $L(x_L; y_L; z_L)$ нуқтасининг координаталарини топиш керак (26-чизма). Таърифланишига кўра L нуқта MN кесмани $\lambda_1 : \lambda_2$ нисбатда бўлиши учун

$$\overrightarrow{ML} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot \overrightarrow{LN} \quad (7)$$

тенгликнинг бажарилиши зарур.

$\overrightarrow{ML}$ ва $\overrightarrow{LN}$ векторларни $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OL}$ ва $\overrightarrow{ON}$ радиус-векторлар орқали ифодаalayлик. У ҳолда (7) тенглама


$$\overrightarrow{OL} - \overrightarrow{OM} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} (\overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OL})$$

кўринишни олади. Бундан эса

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OL} &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \times \\ &\times \overrightarrow{OM} + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \overrightarrow{ON} \quad (8) \end{aligned}$$

келиб чиқади.

(8) формула қўйилган масаланинг ечимини беради,



26-чизма.

чунки у MN кесмани берилган $\lambda_1 : \lambda_2$ нисбатда бўлувчи L нуқтанинг радиус-векторини $M(x_M; y_M; z_M)$ ва $N(x_N; y_N; z_N)$ нуқталарнинг радиус-векторлари орқали ифодалайди.

(8) вектор тенгликка асосан қуйидаги тенгликларга эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned} x_L &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} x_M + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} x_N; \\ y_L &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} y_M + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} y_N; \\ z_L &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} z_M + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} z_N. \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

(9) формула берилган кесмани $\lambda_1 : \lambda_2$ нисбатда бўлувчи L нуқтанинг координаталарини топиш формулаларидир.

L нуқта MN кесманинг ўртаси бўлган хусусий ҳолда (9) формула

$$x_L = \frac{x_M + x_N}{2}; \quad y_L = \frac{y_M + y_N}{2}; \quad z_L = \frac{z_M + z_N}{2} \quad (10)$$

кўринишга келади.

(10) формула кесмани тенг иккига бўлувчи нуқтанинг координаталарини ҳисоблаш формулаларидир. (9) ва (10) формулалардан хусусий ҳолда—кесма текисликда берилганда кесмани берилган нисбатда бўлиш формулаларига эга бўламиз.

Мисол. ABC учбурчакнинг медианалари бирор M нуқтада кесишади, бунда:

а) M нуқта ҳар бир медианани учбурчак учидан ҳисоблаганда $2:1$ нисбатда бўлишини;


б) текисликнинг ҳар қандай O нуқтаси учун

$$\vec{OM} = \frac{1}{3} (\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

бўлишини исботланг.

Ечиш. CD медиана устида учбурчакни учидан ҳисоблаганда $2:1$ нисбатда бўлувчи M нуқтани қарайлик (27-чизма). (8) формулага асосан

$$\vec{OM} = \frac{1}{3} \vec{OC} + \frac{2}{3} \vec{OD}$$



27-чизма.

тенгликка эга бўламиз. Бунда O — текисликнинг ихтисрий нуқтаси, D нуқта AB томоннинг уртаси, шу сабаб (8) формулага асосан ($\lambda_1 = \lambda_2$):

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OB}.$$

Демак,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OC} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

Энди шу M нуқта барча медианаларни учбурчак учидан ҳисоблаганда $2:1$ нисбатда бўлишини кўрсатамиз. Бунинг учун BK медианада N нуқтани оламиз ва N нуқта BK медианани учбурчак учидан ҳисоблаганда $2:1$ нисбатда бўлсин. У ҳолда (8) формулага асосан

$$\overrightarrow{ON} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{OK} \text{ тенгликка эга бўламиз. } N \text{ нуқта}$$

AC томоннинг уртаси, шунга кўра ($\lambda_1 = \lambda_2$);

$$\overrightarrow{OK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OC}.$$


Демак,

$$\overrightarrow{ON} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OB} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) = \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

$\overrightarrow{OM}$ ва $\overrightarrow{ON}$ векторлар тенг экан. Бу эса M нуқта учбурчакнинг барча медианалари учун умумий эканлигини билдиради. Шу билан юқоридаги иккита шарҳ ҳам исбот қилинди.

4-§. Қутб координаталар системаси. Нуқтанинг декарт ва қутб координаталари орасидаги боғланиш

Математикада декарт координаталари системасидан ташқари бошқа координаталар системаларидан ҳам фойдаланилади. Шундай системалардан бири қутб координаталари системасидир. Ориентацияли текисликда бирор O нуқта, $[OP)$ нур ва бу нурда ётувчи $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ бирлик векторни оламиз (текисликда олинган $R = [0; \vec{i}; \vec{j}]$ координаталар системаси $\vec{i}$ векторни O нуқта атрофида $\vec{j}$ вектор устига тушириш учун қисқа йўл бўйича буриш соат стрелкаси ҳаракатига тескари бўлса,



28-чизма.

координаталар системаси мусбат ориентацияли, текисликни эса ориентацияланган дейилади). Ҳосил қилинган геометрик образ қутб координаталар системаси дейилади (28-чизма).

Уни $R = \{0; \vec{i}\}$ кўринишда белгилаймиз. O нуқта қутб боши, $[OP)$ нур эса қутб

уқи дейилади. M нуқтанинг текисликдаги ҳолати икки сон: бири $[OA)$ бирлик кесма ёрдамида ўлчанган $\rho = |OM|$ масофа, иккинчиси $[OP)$ нур $[OM)$ нурнинг

устига тушиши учун буриш керак бўлган $\varphi = (\vec{i}, \vec{OM})$ бурчак билан тўла аниқланади. Қутб ўқини $[OM)$ нур устига тушгунга қадар буриш соат стрелкаси йўналишига тесқари йўналишда бажарилса, φ бурчак мусбат деб, акс ҳолда, манфий деб ҳисобланади. ρ ни M нуқтанинг қутб радиуси, φ ни M нуқтанинг қутб бурчаги дейилиб, улар умумий ном билан M нуқтанинг қутб координаталари дейилади ва $M(\rho, \varphi)$ кўринишда белгиланади. O нуқта учун $\rho = 0$ бўлиб, φ аниқланмаган ҳисобланади. Агар ρ сон ва φ бурчак $0 < \rho \leq \infty$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ оралиқда ўзгарса, текисликнинг ҳар бир нуқтаси қутб координаталари билан мос келади. Ҳар бир қутб координаталар системасига мусбат ориентирлан-


ган тўғри бурчакли координаталар системаси $\{0; \vec{i}; \vec{j}\}$ ни мос қўйиш мумкин. Бунда O нуқта (қутб) координаталар боши бўлиб хизмат қилади. Фараз қилайлик, ρ, φ лар M нуқтанинг қутб координаталари, x, y эса M нуқтанинг тўғри бурчакли координаталар системасидаги координаталари бўлсин (29-чизма). y ҳолда чизмадан:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases} \quad (11)$$


Бу формулалар ёрдамида M нуқтанинг қутб координаталари ρ ва φ маълум бўлса, x, y ни топиш мумкин:

$$(11) \Rightarrow x^2 + y^2 = \rho^2 \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (12). \text{ Агар } \rho \neq 0 \text{ бўлса,}$$

$$(11), (12) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (13)$$



29-чизма.



30-чизма.

Аксинча, $M \neq 0$ нуқтанинг тўғри бурчакли декарт координаталари x , y маълум бўлса, (12), (13) дан унинг қутб координаталари ρ ва φ ларни топиш мумкин. Демак, (11), (13) формулалар декарт ва қутб координаталари системасини боғловчи формулалардир.

Текисликда қутб координаталар системаси берилган бўлсин. Бу системала ρ ёки φ лардан бирини ўзида сақловчи $f(\rho; \varphi)$ ифодани олайлик. Бу ифода текисликда бир қанча фигурани ифодалаши мумкин. Масалан, фигура $f(\rho; \varphi) = \rho = 6$ муносабат билан аниқланган бўлсин. У ҳолда:

а) $F_1 = \{M(\rho, \varphi) | \rho = 6\}$ — (Маркази O қутбда ва радиуси $\rho = 6$ га тенг бўлган айлана).

б) $F_2 = \{M(\rho, \varphi) | \rho - 6 > 0\}$ (F_1 айланадан ташқаридаги нуқталар тўплами).

в) $F_3 = \{M(\rho, \varphi) | \rho - 6 < 0\}$ (O марказли, $\rho = 6$ радиусли очик доира).

г) $F_4 = \{M(\rho, \varphi) | \rho - 6 \geq 0\} = F_1 \cup F_2$;

д) $F_5 = \{M(\rho, \varphi) | \rho - 6 \leq 0\}$ ($\rho = 6$ радиусли доира);


е) $F_6 = \{M(\rho, \varphi) | \rho - 6 \neq 0\} = F_2 \cup F_3$.

$f(\rho, \varphi)$ тенглама F_1 фигуранинг берилган қутб координаталар системасидаги тенгламаси дейилади. Ушбу

$$\rho = a; (a = \text{const}) \quad (14)$$

тенглама маркази қутбда, радиуси a га тенг бўлган айлананинг тенгламаси бўлади. Шу айлана тенгламасини бошқа қутб координаталар системасида топайлик. Бунда қутб айланада ётсин, қутб ўқи эса айлана марказидан ўтсин деб фараз қилайлик (30-чизма). Қуйидагига эътибор:

$$\rho = 2a \cos \varphi. \quad (15)$$



31-чизма.

Бу изланган айлана тенгламасидир. (14) ва (15) ни қуйидагича ўзгартириб ёзамиз:

$$\rho - a = 0. \quad (16)$$

$$\rho - 2a \cos \varphi = 0. \quad (17)$$

(14) ва (15) тенгламалар битта айланини ифодалайди, лекин тенгламалар ҳар хил. Биттаси ρ ни ўзида сақласа, иккинчиси ρ ва φ ни ҳам ўзида сақлайди (чунки координаталар системаси ҳар хил).

Демак, айлана қутб координата системасига нисбатан жойлашувига кўра ҳар хил кўринишдаги тенгламаларга эга бўлар экан.

1-мисол. Қуйидаги нуқталарни қутб координаталар системасида ясанг:

$$M\left(3; \frac{3\pi}{4}\right); N\left(2; \frac{\pi}{4}\right); P\left(2.5; \frac{3\pi}{2}\right).$$

Ечиш. M нуқтани ясаш учун қутб ўқини $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ёки $\varphi = 135^\circ$ бурчакка бурамиз, йўналиш мусбат. Радиусда 3 бирлик кесма оламиз, шу кесма охири биз излаган нуқта бўлади. N ва P нуқталар ҳам худди шундай топилади (31-чизма).

2-мисол. Қутб координаталар системасида берилган $A\left(\frac{\pi}{3}; 3\right)$ ва $B\left(-\frac{\pi}{4}; 4\right)$ нуқталарнинг декарт координаталар системасидаги координаталарини топинг.

Ечиш. а) Берилган: $A\left(\frac{\pi}{2}; 3\right); \varphi = \frac{\pi}{2}; \rho = 3.$

$$\left. \begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \end{aligned} \right\} \quad \text{формуларга кўра:}$$

$$x = 3 \cos \frac{\pi}{2} = 3 \cdot 0 = 0; \quad y = 3 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 3 \cdot 1 = 3 \text{ ларни топамиз.}$$

Демак, декарт координаталар системасида: $A(0; 3).$

б) Худди юқоридагига ўхшаш топамиз: $B\left(-\frac{\pi}{4}; 4\right);$

$$\varphi = -\frac{\pi}{4}; \quad \rho = 4.$$

$$x = 4 \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2};$$

$$y = 4 \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -2\sqrt{2}.$$

Демак, $B(2\sqrt{2}; -2\sqrt{2})$.

3-мисол. Қутб координаталар системасида берилган $\rho^2 \sin 2\varphi = 2a^2$ чизиқ тенгламасини декарт координаталар системасида ифодаланг.

Ечиш.

$$\rho^2 \sin 2\varphi = 2a^2$$

$$\rho^2 \cdot 2 \sin \varphi \cdot \cos \varphi = 2a^2$$

$$2\rho \sin \varphi \cdot \rho \cos \varphi = 2a^2$$

$$2\rho \sin \varphi \cdot \rho \cos \varphi = 2a^2 \quad (*)$$

$x = \rho \cos \varphi$ ва $y = \rho \sin \varphi$ ларни (*) га қўйсак, $2xy = 2a^2$ ёки $xy = a^2$ келиб чиқади.

5-§. Икки векторнинг вектор кўпайтмиси ва унинг хоссалари. Учбурчакнинг юзи


Вектор кўпайтмага таъриф беришдан олдин учта нокомпланар вектор учунининг фазода жойлашшига алоқадор бўлган қуйидаги тушунчани киритамиз.

1-таъриф. Агар учта нокомпланар $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторни умумий бошланғич нуқтага келтирилгандан сўнг векторлардан бирини иккинчиси билан устма-уст тушгунга қадар улар орасидаги кичик бурчак бўйича айлантриш учинчи векторнинг охиридан қаралганда соат стрелкасига қарши йўналишда кўринса, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар учлиги ўнг учлик (агар айлантриш соат стрелкаси йўналиши бўйича олинса, чап учлик) дейилади.

2-таъриф. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг вектор кўпайтмиси деб қуйидаги учта шартни қаноатлантирадиган $\vec{c}$ векторга айтилади ва у $[\vec{a}, \vec{b}]$ ёки $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$ кўринишда белгиланади:

$$1) |\vec{c}| = |[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b})), \quad (0 < \angle(\vec{a}, \vec{b}) < \pi);$$

2) $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$, $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$ ($\vec{c}$ вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга ортогонал);



32-чизма.

3) $\{i, j, k\}$ ва $\{a, b, [a, b]\}$ векторлар учлиги унғ учлиқни ҳосил қилсин (32-чизма). Бу таърифда келтирилган учта шартнинг ҳар бирининг геометрик маъносини аниққайлик.

1-шарт $\vec{c}$ векторнинг узунлиги ($|\vec{c}|$ сон) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга қурилган параллелограмм юзини ифодаловчи сонга тенг эканини билдиради (32-чизма) (чунки $|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\vec{a}, \vec{b})$ ифода томонлари $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан иборат параллелограмм юзини ифодалайди).

2-шарт вектор кўпайтма (яъни $\vec{c}$ вектор) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар билан аниқланадиган текисликка перпендикуляр эканини билдиради.

3-шарт вектор кўпайтманинг йўналишини аниқлайди.


Вектор кўпайтма қуйидаги ҳоссаларга эга:

1. Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар бўлса ёки улардан камида бири ноль вектор бўлса, уларнинг вектор кўпайтмаси нолга тенг бўлади.

Исбот. Ҳақиқатан ҳам, $\vec{a}||\vec{b}$ бўлса, $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ ёки 180° бўлиб, биринчи шартга асосан $|\vec{c}| = 0$ бўлади. Модули нолга тенг вектор эса албатта ноль вектордир.

2 $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$, яъни кўпайтувчиларнинг ўринлари эни алмаштиришда вектор кўпайтманинг ишораси ўзгаради.

Исбот. Ҳақиқатан ҳам, вектор кўпайтма таърифининг 1 ва 2-шартларига асосан $[\vec{a}, \vec{b}]$ ва $[\vec{b}, \vec{a}]$ векторларнинг узунликлари тенг ва иккаласи ҳам битта текисликка перпендикуляр, йўналишлари эса учинчи шартга асосан $\vec{c}$ вектор томонга қараб энг қисқа йўл билан бурилиш соат стрелкаси ҳаракатига тескари бўлса, $\vec{b}$ дан $\vec{a}$ вектор томонга қараб қисқа йўл билан бурилиш эса соат стрелкаси ҳаракати бўйича бўлиб қолади, демак йўналиш аввалгига ўхшаш бўлиши учун $[\vec{b}, \vec{a}]$



33-а, б, в, чизма.

вектор $[\vec{a}, \vec{b}]$ векторга нисбатан қарама-қарши йўналган бўлиши керак.

3. $[\alpha\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a}, \alpha\vec{b}] = \alpha[\vec{a}, \vec{b}]$, бу ерда α — исталган ҳақиқий сон (скаляр кўпайтувчига нисбатан ассоциативлик қонуни).

Исбот. $[\alpha\vec{a}, \vec{b}]$ ва $\alpha[\vec{a}, \vec{b}]$ векторларнинг модуллари тенг, йўналишлари эса $\alpha > 0$ бўлганда $[\vec{a}, \vec{b}]$ вектор билан бир хил, $\alpha < 0$ да эса $[\vec{a}, \vec{b}]$ нинг йўналишига қарама-қарши. (33-а, б, в чизма.)

$$4. [\vec{a} + \vec{a}', \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{a}', \vec{b}]$$

$$[\vec{a}, \vec{b} + \vec{b}'] = [\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{a}, \vec{b}'].$$

(Бу хосса исботи [8] да келтирилган.)

Бу хоссалардан қуйидагига эга бўламиз:

$$[\alpha\vec{a} + \beta\vec{c}, \gamma\vec{c} + \delta\vec{d}] = \alpha\gamma[\vec{a}, \vec{c}] + \beta\gamma[\vec{b}, \vec{c}] +$$

$$+ \alpha\delta[\vec{a}, \vec{d}] + \beta\delta[\vec{b}, \vec{d}].$$

Бирлик векторларнинг вектор кўпайтмалари қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}] &= -[\vec{j}, \vec{i}] = \vec{k}, [\vec{i}, \vec{i}] = 0, \\ [\vec{k}, \vec{i}] &= -[\vec{i}, \vec{k}] = \vec{j}, [\vec{j}, \vec{j}] = 0, \\ [\vec{j}, \vec{k}] &= -[\vec{k}, \vec{j}] = \vec{i}, [\vec{k}, \vec{k}] = 0. \end{aligned}$$

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар координаталари билан берилган бўлса, яъни

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}, \\ \vec{b} &= b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k} \end{aligned}$$

бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{i} + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{k}. \end{aligned} \quad (18)$$

Демак,

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}.$$

Вектор кўпайтмадан фойдаланиб учбурчакнинг юзини ҳисоблаш учун формула чиқарамиз. Айтайлик, ABC учбурчак фазодаги $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ туғри бурчакли координаталар системасига нисбатан учларининг координаталари билан берилган бўлсин:

$$A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2); C(x_3; y_3; z_3).$$

Вектор кўпайтма таърифидаги 1-шартга кўра унинг модули параллелограммининг юзини беради. Унинг ярми эса учбурчакнинг юзини беради. Шунинг учун

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]| \quad (19)$$

га эга бўламиз.

1-мисол. $\vec{i}, \vec{j}$ бирлик векторлар бўлиб, улар орасидаги бурчак 45° га тенг. $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ векторларга ясалган параллелограммининг юзини ҳисобланг.

$$\begin{aligned} \text{Ечиш. } [\vec{a}, \vec{b}] &= [3\vec{i} - \vec{j}, 2\vec{i} + 3\vec{j}] = [3\vec{i}, 2\vec{i}] + [3\vec{i}, 3\vec{j}] + \\ &+ [-\vec{j}, 2\vec{i}] + [-\vec{j}, 3\vec{j}] = 9[\vec{i}, \vec{j}] - 2[\vec{j}, \vec{i}] = 11[\vec{i}, \vec{j}]. \end{aligned}$$

$$|\vec{a}, \vec{b}| = |11\vec{i}, \vec{j}| = 11|\vec{i}| \cdot |\vec{j}| \cdot \sin 45^\circ = \\ = 11 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5,5\sqrt{2};$$

$$S = 5,5\sqrt{2} \text{ кв. бирлик.}$$

2-мисол. Учларнинг координаталари $A(5; 4; 3)$, $B(2; -1; 0)$, $C(-3; 2; 1)$ бўлган ABC учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. AB ва AC векторларнинг координаталарини ҳисоблайлик. (6) формулага асосан:

$$\vec{AB} = \{2 - 5; -1 - 4; 0 - 3\} = \{-3; -5; -3\}.$$

$$\vec{AC} = \{-3 - 5; 2 - 4; 1 - 3\} = \{-8; -2; -2\}.$$

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \left\{ \begin{vmatrix} -3 & -5 \\ -8 & -2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -8 & -2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \right\} = \\ = \{4; 18; -34\}.$$

$$|[\vec{AB}, \vec{AC}]| = \sqrt{4^2 + 18^2 + (-34)^2} = \sqrt{1496} = 2\sqrt{374}.$$

(19) формулага кўра:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{374}, \quad S_{\triangle ABC} = \sqrt{374} \text{ кв. бирлик.}$$

3-мисол. $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ ва $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}$ векторлар орасидаги бурчакни аниқланг.

Ечиш. Икки вектор орасидаги бурчак формуласига кўра:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 + 6 \cdot 2}{\sqrt{1+4+4} \sqrt{4+9+36}} = \frac{8}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{49}} = \frac{8}{21}$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{8}{21}\right).$$

4-мисол. Учлари $A(7; 3; 4)$, $B(4; 1; -2)$, $C(7; 5; 4)$ нуқталарда бўлган учбурчак берилган. Учбурчакнинг A учидан туширилган биссектрисанинг CB томон билан кесишган D нуқтанинг координаталарини топиш ва учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Учбурчакнинг A учини ҳосил қилувчи томонларнинг узунликларини топамиз:

$$\rho(A, C) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \\ = \sqrt{(7 - 7)^2 + (5 - 3)^2 + (4 - 4)^2} = \sqrt{0 + 4 + 0} = \sqrt{4} = 2.$$

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}] &= -[\vec{j}, \vec{i}] = \vec{k}, [\vec{i}, \vec{i}] = 0, \\ [\vec{k}, \vec{i}] &= -[\vec{i}, \vec{k}] = \vec{j}, [\vec{j}, \vec{j}] = 0, \\ [\vec{j}, \vec{k}] &= -[\vec{k}, \vec{j}] = \vec{i}, [\vec{k}, \vec{k}] = 0. \end{aligned}$$

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар координаталари билан берилган бўлса, яъни

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}, \\ \vec{b} &= b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k} \end{aligned}$$

булса, у ҳолда

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{i} + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{k}. \end{aligned} \quad (18)$$

Демак,

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}.$$

Вектор кўпайтмадан фойдаланиб учбурчакнинг юзини ҳисоблаш учун формула чиқарамиз. Айтайлик, ABC учбурчак фазодаги $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ тўғри бурчакли координаталар системасига нисбатан учларининг координаталари билан берилган бўлсин:

$$A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2); C(x_3; y_3; z_3).$$

Вектор кўпайтма таърифидagi 1-шартга кўра унинг модули параллелограммнинг юзини беради. Унинг ярми эса учбурчакнинг юзини беради. Шунинг учун

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]| \quad (19)$$

га эга бўламиз.

1-мисол. $\vec{i}, \vec{j}$ бирлик векторлар бўлиб, улар орасидаги бурчак 45° га тенг. $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ векторларга ясалган параллелограммнинг юзини ҳисобланг.

$$\begin{aligned} \text{Ечиш. } [\vec{a}, \vec{b}] &= [3\vec{i} - \vec{j}, 2\vec{i} + 3\vec{j}] = [3\vec{i}, 2\vec{i}] + [3\vec{i}, 3\vec{j}] + \\ &+ [-\vec{j}, 2\vec{i}] + [-\vec{j}, 3\vec{j}] = 9[\vec{i}, \vec{j}] - 2[\vec{j}, \vec{i}] = 11[\vec{i}, \vec{j}]. \end{aligned}$$

$$|\vec{a}, \vec{b}| = |11| \vec{i}, \vec{j}| = 11|\vec{i}| \cdot |\vec{j}| \cdot \sin 45^\circ = \\ = 11 \cdot 1 \cdot 1 \frac{\sqrt{2}}{2} = 5,5\sqrt{2};$$

$$S = 5,5\sqrt{2} \text{ кв. бирлик.}$$

2-мисол. Учларнинг координаталари $A(5; 4; 3)$, $B(2; -1; 0)$, $C(-3; 2; 1)$ бўлган ABC учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. AB ва AC векторларнинг координаталарини ҳисоблайлик. (6) формулага асосан:

$$\vec{AB} = [2 - 5; -1 - 4; 0 - 3] = [-3; -5; -3].$$

$$\vec{AC} = [-3 - 5; 2 - 4; 1 - 3] = [-8; -2; -2].$$

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \left\{ \begin{vmatrix} -3 & -5 \\ -8 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -8 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \right\} = \\ = [4; 18; -34].$$

$$|[\vec{AB}, \vec{AC}]| = \sqrt{4^2 + 18^2 + (-34)^2} = \sqrt{1496} = 2\sqrt{374}.$$

(19) формулага кўра:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{374}, \quad S_{\triangle ABC} = \sqrt{374} \text{ кв. бирлик.}$$

3-мисол. $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ ва $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}$ векторлар орасидаги бурчакни аниқланг.

Ечиш. Икки вектор орасидаги бурчак формуласига кўра:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 + 6 \cdot 2}{\sqrt{1+4+4} \sqrt{4+9+36}} = \frac{8}{\sqrt{9} \sqrt{49}} = \frac{8}{21} \\ \varphi = \arccos\left(\frac{8}{21}\right).$$

4-мисол. Учлари $A(7; 3; 4)$, $B(4; 1; -2)$, $C(7; 5; 4)$ нуқталарда бўлган учбурчак берилган. Учбурчакнинг A учидан туширилган биссектрисанинг CB томон билан кесишган D нуқтанинг координаталарини топиш ва учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Учбурчакнинг A учини ҳосил қилувчи томонларининг узунликларини топамиз:

$$\rho(A, C) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \\ = \sqrt{(7 - 7)^2 + (5 - 3)^2 + (4 - 4)^2} = \sqrt{0+4+0} = \sqrt{4} = 2.$$

$$\begin{aligned} \rho(A, B) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \\ &= \sqrt{(4 - 7)^2 + (1 - 3)^2 + (-2 - 4)^2} = \\ &= \sqrt{9 + 4 + 36} = \sqrt{49} = 7. \end{aligned}$$

Бурчакнинг биссектрисаси ўзи туширилган томонни ён томонлар билан пропорционал булакларга бўлиш хос. сасидан фойдаланиб, $|CD| : |DB| = 7 : 2 = \frac{7}{2} = 3,5$ эканлигини аниқлаймиз.

Демак, $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{7}{2}$ га тенг. Агар $\lambda = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ деб белгилаб олсак, (9) формула берилган масала учун қуйидаги қўринишни олади:

$$x_D = \frac{x_C + \lambda x_B}{1 + \lambda}; \quad y_D = \frac{y_C + \lambda y_B}{1 + \lambda}; \quad z_D = \frac{z_C + \lambda z_B}{1 + \lambda}.$$

Бу формула бўйича D нуқтанинг координаталарини қуйидагича топамиз:

$$x_D = \frac{x_C + \lambda x_B}{1 + \lambda} = \frac{7 + \frac{7}{2} \cdot 4}{1 + \frac{7}{2}} = \frac{7 + 14}{\frac{9}{2}} = \frac{21}{\frac{9}{2}} = \frac{42}{9};$$

$$y_D = \frac{y_C + \lambda y_B}{1 + \lambda} = \frac{5 + \frac{7}{2} \cdot 1}{1 + \frac{7}{2}} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{7}{2}}{\frac{9}{2}} = \frac{17}{9};$$

$$z_D = \frac{z_C + \lambda z_B}{1 + \lambda} = \frac{4 + \frac{7}{2} \cdot (-2)}{1 + \frac{7}{2}} = \frac{4 - 7}{\frac{9}{2}} = -\frac{3}{\frac{9}{2}} = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3}.$$

Демак, изланаётган нуқта:

$$D\left(\frac{42}{9}; \frac{17}{9}; -\frac{2}{3}\right).$$

Энди учбурчакнинг юзини ҳисоблаймиз. Бунинг учун $\vec{AB}$ ва $\vec{AC}$ векторларнинг координаталарини (6) формулага кўра ҳисоблаймиз:

$$\vec{AB} = \{0; 2; 0\}, \quad \vec{AC} = \{-3; -2; -6\}.$$

Буларнинг вектор купайтмасини топамиз:

$$[\vec{AB}; \vec{AC}] = \left\{ \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -6 & -3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \right\} =$$

$$= \{-12; 0; 6\}$$

$$||[\vec{AB}, \vec{AC}]|| = \sqrt{(-12)^2 + 6^2} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{5} = 3\sqrt{5} \text{ кв. бирлик.}$$

6-§. Векторларнинг аралаш купайтмаси ва унинг хоссалари. Тетраэдрнинг ҳажми


$\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг аралаш купайтмаси деб (векторларнинг курсатилган тартибига кўра) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг вектор купайтмасидан иборат векторни $\vec{c}$ векторга скаляр купайтиришдан ҳосил қилинган сонга айтилади. Аралаш купайтма $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$ ёки $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ кўринишда белгиланади.

Аралаш купайтманинг геометрик маъноси билан таънишайлик. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар бирор O нуқтага қўйилган бўлиб, компланар бўлмасин ҳамда ўнг учликни ҳосил қилсин. Қирралари шу берилган векторлардан иборат параллелепипедни ясасак, $||[\vec{a}, \vec{b}]||$ миқдор шу параллелепипед асосининг юзини билдиради. Аралаш купайтма таърифига асосан $[\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = ||[\vec{a}, \vec{b}]|| |\vec{c}| \cos \varphi$, бу ерда $\varphi = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ бўлиб, $|\vec{c}| \cos \varphi$ миқдор $\vec{c}$ векторнинг $[\vec{a}, \vec{b}]$ вектор йўналишидаги тўғри чизиқдаги проекциясига тенг бўлиб, параллелепипеднинг баландлигидир. (34-а, б чизма):

$$|\vec{c}| \cos \varphi = h.$$

Демак, $[\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = S_{\text{асос}} \cdot h = V$. Бу сон эса параллелепипеднинг ҳажмини аниқлайди.

Демак, агар $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар ўнг учлик ҳосил қилса, бу векторларнинг аралаш купайтмаси бу векторларга ясалган параллелепипед ҳажмига тенг бўлади. Агар $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ лар чан учлик ташкил қилса, $[\vec{a}, \vec{b}]$



34-а, б чизма.

вектор билан $\vec{c}$ вектор орасидаги бурчак $\varphi \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \varphi \leq 0$ (34-б чизма) бўлади. У ҳолда

$$[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c} = -V.$$

Демак,

$$|[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c}| = V. \quad (20)$$

$R = \{0; i; j; k\}$ координаталар системасига нисбатан $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар қуйидаги координаталарга эга бўлсин:

$$\vec{a} = \{a_1; a_2; a_3\}; \quad \vec{b} = \{b_1; b_2; b_3\}; \quad \vec{c} = \{c_1; c_2; c_3\}.$$

$\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг аралаш купайтмасини ҳисоблаймиз. Дастлаб, $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг вектор купайтмасини топамиз:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{k}. \quad (21)$$

Энди $[\vec{a}, \vec{b}]$ векторни $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ векторга скаляр купайтирамиз. У ҳолда

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} &= c_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - c_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + c_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Ҳосил булган бу учинчи тартибли детерминантда йўлларни икки марта алмаштирамиз:

$$[\vec{a}\vec{b}]\vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (22)$$

(22) формуладан кўринадики, учта векторнинг аралаш купайтмаси учинчи тартибли детерминантга тенг бўлиб, бу детерминантнинг биринчи йўл элементлари биринчи вектор координаталаридан, иккинчи йўл элементлари иккинчи вектор координаталаридан, учинчи йўл элементлари эса учинчи вектор координаталаридан тузилади.

Векторларнинг аралаш купайтмаси қуйидаги хоссаларга эга:

$$1. \quad [\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = [\vec{b}, \vec{c}]\vec{a}.$$

Ҳақиқатан ҳам, бу учта векторга қурилган параллелепипед ҳажмларининг абсолют қийматлари тенг, ундан ташқари $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ва $\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}$ учликларнинг ориентациялари бир хил.

2. Купайтувчиларнинг ўринлари алмашинишидан аралаш купайтманинг ишораси ўзгаради:

$$[\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = -[\vec{b}, \vec{a}]\vec{c};$$

$$[\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = -[\vec{a}, \vec{c}]\vec{b};$$

$$[\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} = -[\vec{c}, \vec{b}]\vec{a}.$$

$[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c} = -[\vec{b}, \vec{a}] \vec{c}$, чунки $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$.

Қолган тенгликлар ўринлилиги ҳам шунга ўхшаш кўрсатилади.

3. $(\alpha \cdot \vec{a}) \cdot [\vec{b}, \vec{c}] = \alpha \cdot [\vec{a}, \vec{b}] \vec{c}$. Иштиёрни $\alpha \in R$ учун $(\alpha \cdot \vec{a})[\vec{b}, \vec{c}] = \alpha[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c}$, чунки 1-хоссага кўра $(\alpha \vec{a})[\vec{b}, \vec{c}] = [\alpha \vec{a}, \vec{b}] \vec{c}$. Бундан эса $[\alpha \vec{a}, \vec{b}] \vec{c} = \alpha[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c}$.

$$4. (\vec{a} + \vec{a}')[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{a}'[\vec{b}, \vec{c}],$$

$$\vec{a}[\vec{b} + \vec{b}', \vec{c}] = \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{a}[\vec{b}', \vec{c}],$$

$$(\vec{a} + \vec{a}')[\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{a} + \vec{a}', \vec{b}] \vec{c} = ([\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{a}', \vec{b}]) \vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] \vec{c} + [\vec{a}', \vec{b}] \vec{c} = \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{a}'[\vec{b}, \vec{c}].$$

Иккинчи тенглик ҳам шунга ўхшаш кўрсатилади.

5. Агар $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар компланар бўлса, уларнинг аралаш кўпайтмаси нолга тенг бўлади, чунки уларга қурилган параллелепипед текисликда жойлашиб қолади, бундай параллелепипеднинг баландлиги нолга тенглигидан ҳам ҳажми нолга тенг, аксинча $[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c} = 0$ бўлса, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар компланар бўлади. Ҳақиқатан ҳам, $[\vec{a}, \vec{b}] \vec{c} = 0$ бўлса, $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{c}$. Лекин вектор кўпайтманинг таърифига асосан $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$, $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$, бундан эса $[\vec{a}, \vec{b}]$ векторнинг $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторларнинг ҳар бирига перпендикулярлиги келиб чиқади, демак, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар компланар.

6. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлардан исталган икkitаси коллинеар бўлса, уларнинг аралаш кўпайтмаси нолга тенг, хусусий ҳолда

$$[\vec{a}, \vec{a}] \vec{b} = [\vec{a}, \vec{b}] \vec{a} = [\vec{b}, \vec{a}] \vec{a} = 0.$$

Аралаш кўпайтмадан фойдаланиб, учларининг координаталари билан берилган тетраэдрнинг ҳажмини ҳисоблаш мумкин. Айтайлик, $ABCD$ тетраэдр учларининг координаталари

$$B(x_2; y_2; z_2)$$

$$C(x_3; y_3; z_3)$$

$$D(x_4; y_4; z_4)$$

бўлсин.

Маълумки, тетраэдрнинг ҳажми унинг бир учидан чиқувчи қирраларидан ясалган параллелепипед ҳажмининг $\frac{1}{6}$ қисмига

тенг (яъни AB, AC ва AD қирраларидан ясалган). Шунинг учун:

$$V = \frac{1}{6} |\vec{AB} \cdot [\vec{AC}, \vec{AD}]| = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD})|. \quad (23)$$

Агар (23) формулани нуқтанинг координаталари орқали ифодаласак,

$$V_{\text{тет.}} = \frac{1}{6} \text{mod} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \quad (24)$$

ёки (24) формулани янада ихчамроқ формада ёзсак, қуйидагига эга бўламиз:

$$V_{\text{тет.}} = \frac{1}{6} \text{mod} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} \quad (25)$$


Мисол. Учлари $A(6; 0; 0); B(0; 5; 0); C(0; 0; 5)$ ва $O(0; 0; 0)$ нуқталарда бўлган пирамида ясанг ҳамда унинг ҳажмини топинг (35-чизма).

Ечиш. (24) формулага асосан топамиз:


$$V_{\text{пир.}} = \frac{1}{6} \text{mod} \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 150 = 25 \text{ куб бирлик.}$$

7-§. Декарт координаталарини алмаштириш

Кўпгина амалий ва назарий масалаларни ечишда декарт координаталарининг бир системасидан бошқа сис-



35-чизма.



36-чизма.

а) Декарт координаталар системасини (координата ўқларини) параллел кўчириш билан боғлиқ алмаштириш формулаларини келтириб чиқарамиз. Бу ҳолда R ва R' координата системалари бир хил координата векторларига ва ҳар хил координата бошига эга бўлади:

$$R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}; \quad R' = \{0'; \vec{i}'; \vec{j}'\}.$$

O' нуқтанинг эски системага нисбатан координаталари $x_0; y_0$ бўлсин (36-чизма). Ихтиёрий M нуқтанинг те-
кисликда эски координаталар системасига нисбатан координаталари $(x; y)$, шу нуқтанинг янги системага нисбатан координаталари X, Y бўлсин. U ҳолда векторлар координаталарига асосан ёзамиз:

$$\vec{OO'} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j},$$

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j},$$

$$\vec{O'M} = X \vec{i}' + Y \vec{j}'.$$


Векторларни қўшиш қондасига кўра:

$$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M}.$$

$$(a), (b), (c), (z) \Rightarrow \begin{cases} x = X + x_0, \\ y = Y + y_0. \end{cases}$$

(26) изланган алмаштириш формулаларидир. U биридан параллел кўчириш орқали ҳосил бўлган координаталар системаларидаги координаталарни ўзаро боғлайди.

темасига уншн турри келади. Координаталарни алмаштиришнинг умумий моҳияти тубандагича: Ихтиёрий M нуқтанинг эски системага нисбатан x, y координаталарини унинг янги системага нисбатан x', y' координаталари орқали ифодалаш талаб қилинади. Дастлаб иккита хусусий ҳолни қарай-
миз.



37-чизма.



38-чизма.

б) Координаталар бошини ўзгартирмай координата ўқларини α бурчакка бурганда координаталарни алмаштириш. Бу ҳолда $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{0'; \vec{i}'; \vec{j}'\}$. Демак, $(\vec{i}, \vec{i}') = \alpha$. Ихтиёрий M нуқтанинг эски координаталари $(x; y)$, шу нуқтанинг янги координаталари (x', y') бўлсин. U ҳолда

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}, \quad \vec{OM} = x' \vec{i}' + y' \vec{j}'. \quad (27)$$

Янги координата векторларини эски координата векторлари орқали ёзамиз:

$$\vec{i}' = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j},$$

$$\vec{j}' = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j}. \quad (28)$$

Агар R ва R' декарт координаталар системалари бир хил ориентацияли бўлса (37-чизма), u ҳолда

$$(\vec{i}, \vec{i}') = 90^\circ + \alpha, \quad (\vec{i}', \vec{j}) = 90^\circ - \alpha, \quad (\vec{j}, \vec{j}') = \alpha; \quad (29)$$


агар қарама қаршн ориентацияли бўлса (38-чизма), u ҳолда

$$(\vec{i}, \vec{j}') = 270^\circ + \alpha; \quad (\vec{i}', \vec{j}) = 90^\circ - \alpha; \quad (\vec{j}, \vec{j}') = 180^\circ + \alpha \quad (30)$$

бўлади. (28) тенгликларни навбат билан $\vec{i}, \vec{j}$ векторларга скаляр кўпайтирамиз:

$$a_1 = \vec{i}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{i}', \vec{i}), \quad a_2 = \vec{i}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{i}', \vec{j}),$$

$$b_1 = \vec{j}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{j}', \vec{i}), \quad b_2 = \vec{j}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{j}', \vec{j}).$$



36-чизма.

темасига ўтишга тўғри келади. Координаталарни алмаштиришнинг умумий моҳияти тубандагича: Ихтиёрий M нуқтанинг эски системага нисбатан x, y координаталарини унинг янги системага нисбатан x', y' координаталари орқали ифодалаш талаб қилинади. Дастлаб иккита хусусий ҳолни қараймиз.

а) Декарт координаталар системасини (координата ўқларини) параллел кўчириш билан боғлиқ алмаштириш формулаларини келтириб чиқарамиз. Бу ҳолда R ва R' координата системалари бир хил координата векторларига ва ҳар хил координата бошига эга бўлади:

$$R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}; \quad R' = \{O'; \vec{i}; \vec{j}\}.$$

O' нуқтанинг эски системага нисбатан координаталари $x_0; y_0$ бўлсин (36-чизма). Ихтиёрий M нуқтанинг текисликда эски координаталар системасига нисбатан координаталари $(x; y)$, шу нуқтанинг янги системага нисбатан координаталари X, Y бўлсин. У ҳолда векторлар координаталарига асосан ёзамиз:

$$\vec{OO'} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j},$$

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j},$$

$$\vec{O'M} = X \vec{i} + Y \vec{j}.$$

Векторларни қўшиш қондасига кўра:


$$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M}.$$

$$(a), (b), (c), (z) \Rightarrow \begin{cases} x = X + x_0, \\ y = Y + y_0. \end{cases} \quad (26)$$

(26) изланган алмаштириш формулаларидир. У биридан параллел кўчириш орқали ҳосил бўлган координаталар системаларидаги координаталарни узаро боғлайди.



37-чизма.



38-чизма.

б) Координаталар бошини ўзгартирмай координата ўқларини α бурчакка бурганда координаталарни алмаштириш. Бу ҳолда $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{0; \vec{i}'; \vec{j}'\}$. Демак, $(\vec{i}, \vec{i}') = \alpha$. Ихтиёрий M нуқтанинг эски координаталари $(x; y)$, шу нуқтанинг янги координаталари (x', y') бўлсин. У ҳолда

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}, \quad \vec{OM} = x' \vec{i}' + y' \vec{j}'. \quad (27)$$

Янги координата векторларини эски координата векторлари орқали ёзамиз:

$$\vec{i}' = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j},$$

$$\vec{j}' = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j}. \quad (28)$$

Агар R ва R' декарт координаталар системалари бир хил ориентацияли бўлса (37-чизма), у ҳолда

$$(b) \quad (\vec{i}, \vec{i}') = 90^\circ + \alpha, \quad (\vec{i}', \vec{j}) = 90^\circ - \alpha, \quad (\vec{j}, \vec{j}') = \alpha; \quad (29)$$

агар қарама қарши ориентацияли бўлса (38-чизма), у ҳолда

$$(r) \quad (\vec{i}, \vec{j}') = 270^\circ + \alpha; \quad (\vec{i}', \vec{j}) = 90^\circ - \alpha; \quad (\vec{j}, \vec{j}') = 180^\circ + \alpha \quad (30)$$

бўлади. (28) тенгликларни навбат билан $\vec{i}, \vec{j}$ векторларга скаляр кўпайтирамиз:

$$a_1 = \vec{i}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{i}', \vec{i}), \quad a_2 = \vec{i}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{i}', \vec{j}),$$

$$b_1 = \vec{j}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{j}', \vec{i}), \quad b_2 = \vec{j}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{j}', \vec{j}).$$

(29), (30) муносабатларни ҳисобга олсак, $\vec{i}'$ $\vec{j}'$ векторнинг координаталари R координаталар системасига нисбатан R ва R' координаталар системаси бир хил ориентацияли бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos \alpha, \sin \alpha\}, \vec{j}' = \{-\sin \alpha, \cos \alpha\}$$

кўринишда, агар R ва R' координаталар системаси қарама-қарши ориентацияли бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos \alpha, -\sin \alpha\}; \vec{j}' = \{\sin \alpha, -\cos \alpha\}$$

кўринишда бўлади. У ҳолда (27) формулалар қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad (31)$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha + y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha - y' \cos \alpha \end{cases} \quad (32)$$

(31) ва (32) формулаларни бирлаштириб, қуйидаги

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha + \varepsilon y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha \end{cases} \quad (33)$$

кўринишда ёзиш мумкин, бу ерда $\varepsilon = \pm 1$ бўлиб, R ва R' реперлар бир хил ориентирланган бўлса, $\varepsilon = +1$; қарама-қарши ориентирланган бўлса, $\varepsilon = -1$ бўлади.

Энди умумий ҳолни қараймиз. Бунда координата бошлари ҳам, координата векторлари ҳам ҳар хил йўналишда жойлашган, яъни $R = \{O; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{O'; \vec{i}'; \vec{j}'\}$ бўлсин. Агар ихтиёрий M нуқтанинг эски системага нисбатан координаталари (x, y) бўлса, координаталарни алмаштириш формулаларини бу ҳолда ёзиш учун (26) ва (33) тенгламалардан қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha + \varepsilon y' \sin \alpha + x_0, \\ y &= x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha + y_0. \end{aligned} \quad (34)$$

Бу формулалар ёрдамида x' , y' ларни x ва y лар орқали ҳам ифодалаш мумкин.

Мисол. Иккита тўғри бурчакли декарт координаталар системаси $R = \{O; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{O'; \vec{i}'; \vec{j}'\}$ берил-

ган бўлиб, $O(2; 0)$, $O'(-2; 1)$, $\vec{i}' = \{1; 1\}$, $\vec{j}' = \{1; -1\}$ бўлсин. M нуқтанинг R координаталар системасига нисбатан координаталари $x = -2$; $y = 3$ бўлса, бу нуқтанинг R' координаталари системасига нисбатан координаталарини топиш.

Ечиш. Қуйидагиларга эгамиз:

$$\begin{aligned} a_1 &= \cos \alpha = 2; & a_2 &= \sin \alpha = 1; \\ b_1 &= -\sin \alpha = 1; & b_2 &= \cos \alpha = -1; \\ x_0 &= 2; & y_0 &= 3. \end{aligned}$$

Бу қийматларни (34) формулаларга қўямиз:

$$\begin{aligned} x &= 2x' - y' + 2, \\ y &= -x' - y' + 3 \end{aligned}$$

ва $x = -2$; $y = 3$ эканини эътиборга олиб,

$$\begin{cases} -2 = 2x' - y' + 2 \\ 3 = -x' - y' + 3 \end{cases}$$

системага эга бўламиз. Бу системани ечамиз:

$$\begin{cases} 2x' - y' = -4 \\ x' + y' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = -\frac{4}{3} \\ y' = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Демак, M нуқтанинг R' координаталар системасига нисбатан координаталари $x' = -\frac{4}{3}$; $y' = \frac{4}{3}$ дан иборат экан.

Машқлар

1. Тўғри бурчакли координаталар системасида қуйидаги нуқталар берилган:

- а) $A(-1; 4; 3)$ ва $B(3; 1; -2)$;
б) $C(-5; 2; -1)$ ва $D(4; -3; 5)$.

$\vec{AB}$, $\vec{BA}$, $\vec{CD}$, $\vec{DC}$ векторларнинг координаталарини топиш.

2. $\vec{a} = \{-2; 3; 3\}$ ва $\vec{b} = \{1; -6; 2\}$ векторлар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ ларнинг қандай қийматларида коллинеар бўлади?

3. $[AB]$ кесма бешта нуқта билан олтига тенг бўлакка бўлинган. $A(-3; -4)$ ва $B(9; -8)$ экани маълум бўлса, бўлиш нуқталарининг координаталарини топиш.

(29), (30) муносабатларни ҳисобга олсак, $\vec{i}' \vec{j}'$ векторнинг координаталари R координаталар системасига нисбатан R ва R' координаталар системаси бир хил ориентацияли бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos \alpha, \sin \alpha\}, \vec{j}' = \{-\sin \alpha, \cos \alpha\}$$

кўринишда, агар R ва R' координаталар системаси қарама-қаршн ориентацияли бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos \alpha, -\sin \alpha\}; \vec{j}' = \{\sin \alpha, -\cos \alpha\}$$

кўринишда бўлади. У ҳолда (27) формулалар қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad (31)$$

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha + y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha - y' \cos \alpha \end{cases} \quad (32)$$

(31) ва (32) формулаларни бирлаштириб, қуйидаги

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - \varepsilon y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha \end{cases} \quad (33)$$

кўринишда ёзиш мумкин, бу ерда $\varepsilon = \pm 1$ бўлиб, R ва R' реперлар бир хил ориентирланган бўлса, $\varepsilon = +1$; қарама-қаршн ориентирланган бўлса, $\varepsilon = -1$ бўлади.

Энди умумий ҳолни қараймиз. Бунда координата бошлари ҳам, координата векторлари ҳам ҳар хил йўналишда жойлашган, яъни $R = \{O; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{O'; \vec{i}'; \vec{j}'\}$ бўлсин. Агар ихтиёрий M нуқтанинг эски системага нисбатан координаталари (x, y) бўлса, координаталарни алмаштириш формулаларини бу ҳолда ёзиш учун (26) ва (33) тенгламалардан қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - \varepsilon y' \sin \alpha + x_0, \\ y = x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha + y_0. \end{cases} \quad (34)$$

Бу формулалар ёрдамида x', y' ларни x ва y лар орқали ҳам ифодалаш мумкин.

Мисол. Иккита тўғри бурчакли декарт координаталар системаси $R = \{O; \vec{i}; \vec{j}\}$ ва $R' = \{O'; \vec{i}'; \vec{j}'\}$ берил-

ган бўлиб, $O(2, 3)$, $\vec{i}' = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $\vec{j}' = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ ва M нуқтанинг R координаталар системасига нисбатан координаталари $x = -2$; $y = 3$ бўлса, бу нуқтанинг R' координаталари системасига нисбатан координаталарини топинг.

Ечиш. Қуйидагиларга эгамиз:

$$\begin{aligned} a_1 &= \cos \alpha = 2; & a_2 &= \sin \alpha = 1; \\ b_1 &= -\sin \alpha = 1; & b_2 &= \cos \alpha = -1; \\ x_0 &= 2; & y_0 &= 3. \end{aligned}$$

Бу қийматларни (34) формулаларга қўямиз:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 2, \\ y = -x' - y' + 3 \end{cases}$$

ва $x = -2$; $y = 3$ эканини эътиборга олиб,

$$\begin{cases} -2 = 2x' - y' + 2 \\ 3 = -x' - y' + 3 \end{cases}$$

системага эга бўламиз. Бу системани ечамиз:

$$\begin{cases} 2x' - y' = -4 \\ x' + y' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = -\frac{4}{3} \\ y' = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Демак, M нуқтанинг R' координаталар системасига нисбатан координаталари $x' = -\frac{4}{3}$; $y' = \frac{4}{3}$ дан иборат экан.

Машқлар

1 Тўғри бурчакли координаталар системасида қуйидаги нуқталар берилган:

- а) $A(-1; 4; 3)$ ва $B(3; 1; -2)$;
б) $C(-5; 2; -1)$ ва $D(4; -3; 5)$.

$\vec{AB}$, $\vec{BA}$, $\vec{CD}$, $\vec{DC}$ векторларнинг координаталарини топинг.

2. $\vec{a} = \{-2; 3; 3\}$ ва $\vec{b} = \{\alpha; -6; 2\}$ векторлар α ва β ларнинг қандай қийматларида коллинеар бўлади?

3. $[\vec{AB}]$ кесма бешта нуқта билан олтига тенг бўлакка бўлинган. $A(-3; -4)$ ва $B(9; -8)$ экани маълум бўлса, бўлиш нуқталарининг координаталарини топинг.

4. Учлари $A(-1; 4)$ ва $B(3; 8)$ нуқталарда бўлган кесма берилган. A нуқтага нисбатан B нуқтага уч марта яқин жойлашган C нуқтанинг координаталарини топинг.

5. C нуқта учлари $A(5; 5)$ ва $B(-2; -6)$ бўлган кесмани $1:3$ нисбатда бўлади (B дан A га қараб). C нуқтанинг координаталарини топинг.

6. Учлари $A(-5; 8)$ ва $B(10; 2)$ нуқталарда бўлган AB кесмани C ва D нуқталар тенг учга бўлади. C ва D нуқталарнинг координаталарини топинг.

7. $A(2; 1; -1)$ ва $B(0; -2; 3)$ нуқталар берилган, AB векторни ясанг ҳамда унинг узунлигини топинг.

8. Қуйидаги нуқталарни қутб координаталар системасида ясанг:

$$A\left(4; \frac{7\pi}{4}\right); B\left(-2; \frac{5\pi}{6}\right); C\left(-3; \frac{\pi}{6}\right); D(-5; 0).$$

9. Қутб бошига нисбатан $M\left(4; \frac{\pi}{6}\right); N\left(3; \frac{7\pi}{6}\right); P\left(4; -\frac{3\pi}{2}\right)$ нуқталарга симметрик бўлган нуқталарни топинг.

10. Тўғри чизиқнинг қутб ўқи билан ҳосил қилган бурчаги $\frac{2\pi}{3}$ га, қутб бошидан шу тўғри чизиққа туширилган перпендикуляр узунлиги эса 4 га тенг. Шу тўғри чизиқ тенгламасини тузинг ва уни чизинг.

11. Ушбу $\vec{a} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$ ва $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ векторларнинг вектор кўпайтмасини топинг.

12. $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ ва $\vec{b} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ векторлар берилган. $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$ векторни аниқланг ва ясанг ҳамда $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан ясалган учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

13. Учбурчакнинг юзи $S = 3$ кв. бирликка тенг. Унинг икки учи $A(3; 1)$ ва $B(1; -3)$ нуқталарда бўлса, унинг x ўқда ётувчи C учининг координаталарини топинг.

14. Тўғри тўртбурчакнинг иккита қарама-қарши учларининг координаталари $A(2; 5)$ ва $C(-2; -5)$. Унинг юзини ҳисобланг.

15. $A(1; 5); B(4; 11)$ ва $C(2; 7)$ нуқталарнинг бир тўғри чизиқда ётишини кўрсатинг.

16. ABC учбурчакнинг учлари $A(1; 2); B(5; 0)$ ва $C(4; 3)$ лар берилган. Шу учбурчакнинг юзини ҳисобланг.

17. $A(2; 2; 2), B(3; 1; -2); C(4; 3; 1); D(1; 0; -1)$ нуқталарнинг бир текисликда ётишини кўрсатинг.

18. $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$ ва $\vec{c} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ векторларнинг ўзаро компланар эканини кўрсатинг.

19. $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}; \vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}; \vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ векторлардан параллелепипед ясанг ва унинг ҳажмини ҳисобланг.

20. Учлари $A(4; 0; 0), B(0; 5; 0), C(0; 0; 3), D(4; 5; 7)$ нуқталарда бўлган пирамида ясанг ҳамда унинг ҳажмини ва ABC ёнига туширилган баландлигини ҳисобланг.

VI БОБ. ТЕКИСЛИКДА ТЎҒРИ ЧИЗИҚЛАР

1-§. Икки ўзгарувчили тенглама ва унинг графиги

Айтайлик,

$$F(x; y) = 0 \quad (1)$$


тенглама x, y ўзгарувчилардан камда биттаси иштирок этган тенглама бўлсин. Бу тенглама ўзгарувчилардан бирини, масалан, y ни иккинчисининг (x нинг) функцияси каби аниқласин. У ҳолда (1) ни y га нисбаган ечсак,

$$y = f(x), \quad a \leq x \leq b \quad (2)$$


тенглама ҳосил бўлади. (2) да $x [a, b]$ кесмада ўзгарганда $f(x)$ функция узлуксиз ўзгаради деб фараз қиламиз.

Дастлаб $f(x)$ ни бир қийматли функция деб қараб, x ва y ларни $R = \{0; i; j\}$ координаталар текислигидаги бирор M нуқтанинг координаталари деб фараз қиламиз. У вақтда x нинг ҳар бир қиймати учун (2) тенглама y нинг ягона қийматини аниқлайди. Демак, x нинг ҳар бир қийматида текисликнинг координаталари $(x; f(x))$ бўлган биргина нуқтаси тўғри келади. Агар x узлуксиз ўзгариб турли қийматлар қабул қил

са, M нуқта $\{0; i; j\}$ координаталар текислигида x ва y нинг қийматларига қараб ўрнини ўзгартира боради. Бирор нуқталар тўпламини тасвирлайди. Бу нуқталар тўплами чизиқ деб аталади. Агар $f(x)$ функция кўп



39-чизма.



40-чизма.

қийматли бўлса, яъни x нинг ҳар бир қийматига y нинг бир неча $y_1, y_2, \dots, y_n$ қийматлари мос келса, y ҳолда

x нинг ҳар бир қийматига $[0; i; j]$ текисликда $M_1, M_2, \dots, M_n$ нуқталар тўғри келади. Масалан, $y=f(x)$ функция икки қийматли бўлсин. Бу ҳолда x нинг ҳар бир x_1 қийматига y нинг $y_1=f(x_1)$ ва $y_2=f(x_1)$ қийматлари

мос келиб, $[0; i; j]$ координаталар текислигида x нинг x_1 қиймати билан иккита $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_1; y_2)$ нуқта аниқланади (39-чизма). $[a, b]$ кесмада x узлуксиз ўзгарганда M_1 ва M_2 нуқталар ҳам ўринларини узлуксиз ўзгартиради ва чизиқни тасвирлайди.

Таъриф. Агар чизиқ ихтиёрий нуқтасининг x ва y координаталари (1) тенгламани қаноатлантирса ва аксинча бу тенгламани қаноатлантирадиган ҳар бир жуфт $(x; y)$ қиймат чизиқ нуқтасини тасвирласа, y ҳолда (1) тенглама чизиқнинг ошқормас тенгласи деб аталади.

Аналитик геометрияда икки хил масала қаралади: 1) берилган геометрик хоссаларига кўра чизиқ тенгламасини тузиш; 2) тенгламасига кўра чизиқнинг геометрик хоссаларини аниқлаш.

1-мисол. Координата бурчаклари биссектрисаларининг тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Дастлаб биссектриса учун хос геометрик хоссани ифодаalaymиз. Бурчак биссектрисаси бу бурчак ичида ётувчи ва унинг томонларидан баравар узоқликдаги нуқталарнинг геометрик ўрнини ифодалайди. Бу хоссага асосланиб I ва III координата бурчакларининг биссектрисаси тенгламасини тузамиз (40-чизма). Агар OM биринчи координата бурчаксининг биссектрисаси бўлиб, $M(x; y)$ унинг ихтиёрий нуқтаси бўлса, хосса кўра шаклдан:

$$p(M_1; M) = p(M_2; M)$$

ёки

$$y = x. \quad (3)$$

Агар $M(x; y)$ учинчи координата бурчаксининг биссектрисасидаги ихтиёрий нуқта бўлса ҳам x , ҳам y манфий сон бўлиб, уларнинг абсолют қийматлари бир-бирига тенг бўлади ва биз яна (3) тенгламага келамиз. Шунга ўхшаш II ва IV координата бурчакларининг биссектрисаси тенгласи $y = -x$ (4) эканини кўриш мумкин.

2-мисол. $y = x$ тенглама билан ифодаланган чизиқнинг геометрик хоссаларини аниқланг.

Ечиш. $[0; i; j]$ координата текислигида $y = x$ тенглама ҳар бир нуқтасининг абсциссаси унинг ординатасига тенг бўлган нуқталар тўпламини аниқлайди. Бундай хоссага эга бўлган нуқталарнинг тўплами I ва III координата бурчакларининг биссектрисаларини ифодалайди.

Энди чизиқнинг унинг (1) тенгламасига кўра ясаш масаласини қараймиз. x, y координаталарни боғловчи бирор тенгламанинг текисликда қандай чизиқни тасвир этишини билиш учун чизиқни шу тенгламага асосланиб ясаш керак. Текисликдаги нуқта эса ўзининг (x, y) координаталари билан аниқланади. Шунинг учун (1) тенгламадаги x га $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ қийматларни берсак,


$$F_1(x_1; y) = 0; F_2(x_2; y) = 0; F_n(x_n; y) = 0; \dots \quad (4)$$

тенгламалар ҳосил бўлади. Бу тенгламалардан y нинг $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ қийматларига мос бўлган $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ қийматларини топамиз, нагижада координаталари (1) тенгламани қаноатлантирувчи

$$(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_n; y_n), \dots \quad (5)$$

нуқталарга эга бўламиз. Бу нуқталарни координаталар системасида ясаб, уларни туташ чизиқ билан бирлаштираёқ, (1) тенгламани тасвирловчи чизиқ ҳосил бўлади. Бу чизиқ икки ўзгарувчили (1) тенгламанинг графиги дейилади.

Мисол. $y = x^2$ тенглама тасвирлайдиган чизиқни ясаг.



41-чизма

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	9	4	1	0	1	4	9	...

Натижада $\dots (-3; 9), (-2; 4), (-1; 1), (0; 0), (1; 1), (2; 4), (3; 9) \dots$ нуқталар ҳосил бўлади. Бу нуқталарни $[0; \vec{i}; \vec{j}]$ системада жойлаштириб, уларни силлиқ чизик билан бирлаштирсак, $y = x^2$ функциянинг графиги, яъни парабола ҳосил бўлади (41-чизма).

2-§. Тўғри чизиқнинг турли тенгламалари

Дастлаб тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори тусунчасига таъриф берамиз.

Таъриф. Тўғри чизиққа параллел ёки шу тўғри чизиқда ётувчи ҳар қандай вектор бу тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори дейилади.

Тўғри чизик турли усуллар билан берилиши мумкин. Ҳар бир ҳол учун тўғри чизик маълум тенгламага эга бўлади. Шу тенгламаларни келтириб чиқарамиз.

1. Тўғри чизиқнинг параметрик тенгламалари. a тўғри чизик бирор $[0; \vec{i}; \vec{j}]$ реперга нисбатан ўзининг бирор $M_0(x_0; y_0)$ нуқтасининг ва йўналтирувчи $\vec{a} = \{a_1; a_2\}$ векторининг берилиши билан аниқла-

Ясаш. Берилган тенгламада x га $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ қийматларни берамиз ва унинг шунга мос қийматларини топамиз. Бу қийматларни жадвал шаклида ёзғамиз:

нади (42-чизма). Тўғри чизиқда ихтиёрий $M(x; y)$ нуқта оламиз. У ҳолда M_0M вектор $\vec{a}$ вектор билан коллинеар бўлади. Демак, шундай сон t топиш мумкинки,

$$\vec{M_0M} = t\vec{a}; \quad t \in \mathbb{R} \quad (6)$$

деб ёзиш мумкин. Бунинг аксинча, агар бирор M



42-чизма

нуқта учун (6) муносабат бажарилса, $\vec{M_0M} \parallel \vec{a}$ бўлади. Демак, (6) муносабат фақат a тўғри чизиққа тегишли M нуқталар учунгина бажарилади. M, M_0 нуқталарнинг радиус-векторларини мос равишда $\vec{r}; \vec{r_0}$ орқали белгиласак: $\vec{r} = \vec{OM}, \vec{r_0} = \vec{OM_0}$ бўлиб, $\vec{M_0M}$ вектор учун

$\vec{M_0M} = \vec{r} - \vec{r_0}$ га эга бўламиз. (6) тенгликдан:

$$\vec{r} = \vec{r_0} + t\vec{a}. \quad (7)$$

Бу тенглама a тўғри чизиқнинг векторли тенгламаси дейилади. Бу тенгламадан t нинг турли қийматларида a тўғри чизиқдаги нуқталарнинг радиус-векторларини ҳосил қиламиз; (7) тенгламада қатнашаётган t ўзгарувчи параметр дейилади.

M ва M_0 нуқталарнинг координаталари x, y ва x_0, y_0 бўлса, (7) ни координаталарда ёзиш мумкин, натижада қуйидаги тенгламалар ҳосил бўлади:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + a_1 t, \\ y &= y_0 + a_2 t. \end{aligned} \quad (8)$$

(8) тўғри чизиқнинг параметрик тенгламалари дейилади.

Агар a тўғри чизик координата ўқларидан бирортасига ҳам параллел бўлмаса (яъни $a_1 a_2 \neq 0$ шарт бажарилса), (8) дан

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} \quad (9)$$

тенгламага эга бўламиз. Бундан

$$a_1x - a_1y + (-a_2x_0 + a_1y_0) = 0. \quad (10)$$

Бу ерда шартга кўра a_1, a_2 нинг камида биттаси нолдан фарқли, шу сабабли (10) биринчи даражали тенгламалар. Бундан эса ҳар қандай тўғри чизик биринчи даражали тенглама билан ифодаланади деган муҳим хулосага келамиз.

Мисол. $M_0(5; 2)$ нуқта орқали ўтувчи ва йўналтирувчи вектори $\vec{a} = [2; -1]$ бўлган тўғри чизикнинг параметрик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартига кўра: $x_0 = 5; y_0 = 2; a_1 = 2; a_2 = -1$. (8) формулага асосан

$$\begin{aligned} x &= 5 + 2t, \\ y &= 2 - t \end{aligned}$$

тенгламаларга эга бўламиз. Бу тенгламалар биз излаган тўғри чизикнинг параметрик тенгламаларидир.

2. Икки нуқта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламаси. Бизга маълумки, икки нуқта орқали ягона тўғри чизик ўтади. M_1 ва M_2 нуқталарнинг $[0; i; j]$ системага нисбатан координатлари маълум деб фараз қилиб, шу нуқталар орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламасини топаёлик.

Айтайлик, $M_1(x_1; y_1), M_2(x_2; y_2)$ бўлсин, бу нуқталардан ўтувчи тўғри чизикни a деб белгилайлик. a тўғри чизикда ихтиёрий $M(x; y)$ нуқта оламиз. У ҳолда $\vec{M_1M_2} = [x_2 - x_1; y_2 - y_1]$ вектор $\vec{M_1M} = [x - x_1; y - y_1]$ векторга коллинеар булса, равшанки, M нуқта фақат a тўғри чизикда ётганда қуйидаги муносабат ўринали бўлади (IV боб, 2-§, 3-пункт):

$$\vec{M_1M} = t \cdot \vec{M_1M_2}. \quad (11)$$

Бу ердан, векторларнинг тенглигига асосан қуйидагига эга бўламиз:

$$x - x_1 = t(x_2 - x_1) \text{ ва } y - y_1 = t(y_2 - y_1). \quad (12)$$

Бундан эса

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}. \quad (13)$$

(13) тенглама берилган икки нуқта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламаси дейилади. Бу тенглама $x_2 - x_1 \neq 0$ ва $y_2 - y_1 \neq 0$ бўлганда уринлидир. Агар $x_2 - x_1 = 0$

булса, у ҳолда тўғри чизик Oy ўққа параллел бўлиб, тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$x - x_1 = 0 \text{ ёки } x = x_1.$$

Мисол. ABC учбурчак учларининг координатлари берилган:

$$A(-1; 4), B(11; -5), C(15; 17).$$

AB ва BC томонларнинг тенгламасини тузинг.

Ечиш. а) AB томоннинг тенгламасини тузамиз. (13) формулага кўра топамиз:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} &= \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}, \quad \frac{x + 1}{11 + 1} = \frac{y - 4}{-5 - 4}, \quad \frac{x + 1}{12} = \frac{y - 4}{-9}, \\ -3(x + 1) &= 4(y - 4); \quad -3x - 3 = 4y - 16, \\ 4y + 3x - 13 &= 0. \end{aligned} \quad (AB)$$


б) BC томоннинг тенгламасини тузамиз:

$$\begin{aligned} \frac{x - 11}{15 - 11} &= \frac{y + 5}{17 + 5}, \quad \frac{x - 11}{4} = \frac{y + 5}{22}, \\ 11x - 121 &= 2y + 10; \quad 2y - 11x + 131 = 0. \end{aligned} \quad (BC)$$


3. Тўғри чизикнинг координата ўқларидан кесган (ажратган) кесмалари бўйича тенгламаси. a тўғри чизикни аниқловчи M_1 ва M_2 нуқталар координата ўқлари Ox ва Oy да ётсин. Аниқлик учун $M_1(a; 0)$ нуқта Ox ўқда, $M_2(0; b)$ нуқта эса Oy ўқда ётсин (43-чизма). Бу ҳолда (13) тенглама қуйидаги кўринишга келади:

$$\frac{x - a}{0 - a} = \frac{y - 0}{b - 0}$$

ки



43-чизма.



44-чизма.

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (14)$$

(14) тенглама тўғри чизиқнинг координата ўқларидан кесган кесмалар бўйича тенгламаси дейилади. бу ерда a ва b лар тўғри чизиқнинг мос равишда Ox ва Oy ўқларидан кесган кесмаларидир.

Мисол. Тўғри чизиқ $4x - 3y - 12 = 0$ тенглама билан берилган. Унинг координата ўқлари билан кесишган нуқталарини топинг.

Ечиш. Кесишиш нуқталарининг координаталарини топиш учун берилган тўғри чизиқ тенгламасини тўғри чизиқнинг координаталар ўқларидан ажратган кесмаларга нисбатан тенгламаси (яъни (14)) кўринишига келтирамиз:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-4} = 1.$$

Демак, берилган тўғри чизиқнинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталари $A(3; 0)$ ва $B(0; -4)$ экан.

4. Тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламаси.

Таъриф. $\vec{a}$ вектор $\{\vec{i}; \vec{j}\}$ базисда a_1, a_2 координаталарга эга бўлиб $a_1 \neq 0$ бўлса, $\frac{a_2}{a_1} = k$ сон $\vec{a}$ векторнинг бурчак коэффициенти дейилади.

Агар $\vec{a}$ вектор тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори k сон шу тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти бўлса, шу тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламасини келтириб чиқарамиз. Изланаётган тўғри чизиқнинг битта нуқтаси ва бурчак коэффициенти текисликда шу тўғри чизиқнинг ҳолатини тўла аниқлайди. Оу ўққа параллел тўғри чизиқлар учун бурчак коэффициент мавжуд эмас. Шунинг учун Оу ўққа параллел бўлмаган a тўғри чизиқ $M_0(x_0; y_0)$ нуқтадан ўтсин ва k бурчак коэффициентга эга бўлсин деб фараз қилайлик. (9) дан $a_1 \neq 0$ деб қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$y - y_0 = \frac{a_2}{a_1} (x - x_0). \text{ Таърифга кўра: } \frac{a_2}{a_1} = k,$$

демак,

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad (15)$$

ёки

$$y = kx + b, \quad (16)$$

бу ерда

$$b = y_0 - kx_0.$$

(16) тенглама тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламаси дейилади.

У ҳолда (13) га асосан $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ нуқталар орқали ўтган тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (17)$$

формула билан аниқланади. Бу тўғри чизиқ y ўқига параллел бўлмаган ҳолга тўғри келади.

Бурчак коэффициентининг геометрик маъносини аниқлайлик (44- чизма). M_1, M_2, N учбурчакдан $k = \operatorname{tg} \alpha$ эканлиги кўринади, бу ерда α бурчак Ox ўқини соат стрелкаси йўналишига тескари йўналишда буриб a тўғри чизиқ билан устма-уст тушгунга қадар буриш бурчаги, шунинг учун ҳам k бурчак коэффициенти дейилади.

1- мисол. $M_1(3; 2)$ ва $M_2(4; 3)$ нуқталар орқали ўтувчи тўғри чизиқнинг Ox ўқи билан ҳосил қилган бурчагини топинг.

Ечиш. (17) формулага кўра: $k = \frac{3-2}{4-3} = 1$, бунидан $k = \operatorname{tg} \alpha = 1$. Демак, $\alpha = 45^\circ$.

2- мисол. Ox ўқи билан 30° ли бурчак ташкил этиб, $M_1(2; -3)$ нуқта орқали ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

Ечиш. Изланаётган тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти $k = \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ га тенг. (15) тенгламага $x_0 = 2; y_0 = -3$ қийматларни қуйиб, қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$y + 3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (x - 2)$$

ёки

$$x - \sqrt{3}y - (2 + 3\sqrt{3}) = 0.$$

5. Берилган нуқта орқали ўтиб берилган векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламаси. Текисликда $M(x; y)$ нуқта

ва $\vec{n} = \{A; B\}$ вектор берилган:

$$d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0; \quad (22)$$

ли ўти

$$d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0. \quad (23)$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (14)$$

(14) тенглама тўғри чизиқнинг координата ўқларидан кесган кесмалар бўйича тенгламаси дейилади. Бу ерда a ва b лар тўғри чизиқнинг мос равишда Ox ва Oy ўқларидан кесган кесмаларидир.

Мисол. Тўғри чизиқ $4x - 3y - 12 = 0$ тенглама билан берилган. Унинг координата ўқлари билан кесишган нуқталарини топинг.

Ечиш. Кесишиш нуқталарининг координаталарини топиш учун берилган тўғри чизиқ тенгламасини тўғри чизиқнинг координаталар ўқларидан ажратган кесмаларга нисбатан тенгламаси (яъни (14)) кўринишига келтирамиз:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-4} = 1.$$

Демак, берилган тўғри чизиқнинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталари $A(3; 0)$ ва $B(0; -4)$ экан.

4. Тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламаси.

Таъриф. $\vec{a}$ вектор $\{\vec{i}; \vec{j}\}$ базисда a_1, a_2 координаталарга эга бўлиб $a_1 \neq 0$ бўлса, $\frac{a_2}{a_1} = k$ сон $\vec{a}$ векторнинг бурчак коэффициенти дейилади.

Агар $\vec{a}$ вектор тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори k сон шу тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти бўлса, шу тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламасини келтириб чиқарамиз. Изланаётган тўғри чизиқнинг битта нуқтаси ва бурчак коэффициенти текисликда шу тўғри чизиқнинг ҳолатини тўла аниқлайди. Оу ўққа параллел тўғри чизиқлар учун бурчак коэффициент мавжуд эмас. Шунинг учун Оу ўққа параллел бўлмаган a тўғри чизиқ $M_0(x_0; y_0)$ нуқтадан ўтсин ва k бурчак коэффициентга эга бўлсин деб фараз қилайлик. (9) дан $a_1 \neq 0$ деб қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$y - y_0 = \frac{a_2}{a_1} (x - x_0). \text{ Таърифга кўра: } \frac{a_2}{a_1} = k,$$

демак,

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad (15)$$

ёки

$$y = kx + b, \quad (16)$$

бу ерда

$$b = y_0 - kx_0.$$

(16) тенглама тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентли тенгламаси дейилади.

У ҳолда (13) га асосан $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ нуқталар орқали ўтган тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (17)$$

формула билан аниқланади. Бу тўғри чизиқ y ўқига параллел бўлмаган ҳолга тўғри келади.

Бурчак коэффициентининг геометрик маъносини аниқлайлик (44-чизма). M_1M_2N учбурчакдан $k = \operatorname{tg} \alpha$ эканлиги кўринади, бу ерда α бурчак Ox ўқини соат стрелкаси йўналишига тескари йўналишда буриб a тўғри чизиқ билан устма-уст тушгунга қадар буриш бурчаги, шунинг учун ҳам k бурчак коэффициенти дейилади.

1-мисол. $M_1(3; 2)$ ва $M_2(4; 3)$ нуқталар орқали ўтувчи тўғри чизиқнинг Ox ўқи билан ҳосил қилган бурчагини топинг.

Ечиш. (17) формулага кўра: $k = \frac{3-2}{4-3} = 1$, бундан $k = \operatorname{tg} \alpha = 1$. Демак, $\alpha = 45^\circ$.

2-мисол. Ox ўқи билан 30° ли бурчак ташкил этиб, $M_1(2; -3)$ нуқта орқали ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

Ечиш. Изланаётган тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти $k = \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ га тенг. (15) тенгламага $x_0 = 2; y_0 = -3$ қийматларни қуйиб, қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$y + 3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (x - 2)$$

ёки

$$x - \sqrt{3}y - (2 + 3\sqrt{3}) = 0.$$

5. Берилган нуқта орқали ўтиб берилган векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламаси. Текисликда $M(x; y)$ нуқта

ва $\vec{n} = \{A; B\}$ вектор берилган бўлсин:

$$d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0; \quad (22)$$

ли ўти

$$d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0. \quad (23)$$

чизик тенгламасини тузиш талаб қилинсин. Изланаётган a тўғри чизикда ётувчи ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтани олайлик. M нуқта қуйидаги шарт бажарилгандагина a тўғри чизикда ётади:

$$\vec{n} \cdot \vec{M_1M} = 0, \quad (18)$$

бу ерда $\vec{M_1M} = \{x - x_1; y - y_1\}$.

Икки векторнинг скаляр кўпайтмасига асосан

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) = 0 \quad (19)$$

га эга бўламиз. (19)—берилган нуқта орқали ўтиб, берилган векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламасини ифодалайди. $\vec{n}$ вектор тўғри чизикнинг нормал вектори дейилади.

Мисол. $M_1(3; 1)$ нуқта орқали ўтувчи ва $\vec{n} = \{-1; 1\}$ векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Бу ерда $x_1 = 3$, $y_1 = 1$, $A = -1$, $B = 1$. Буларни (19) формулага қўйиб, изланган тўғри чизик тенгламасини топамиз:

$$-1(x - 3) + 1 \cdot (y - 1) = 0$$

ёки

$$x - y - 2 = 0.$$

6. Тўғри чизикнинг умумий тенгламаси. Юқоридаги тўғри чизик тенгламаларининг барчаси учун характерли бўлган нарса, бу тенгламанинг биринчи даражали бўлишligидир. Энди тескари масалани кўрайлик. Ҳар қандай биринчи даражали

$$Ax + By + C = 0 \quad (20)$$

тенглама тўғри чизикнинг умумий тенгламасини ифодалайди. Бу ерда A , B , C — ўзгармас коэффициентлар бўлиб, A ёки B дан ақалли бири нолдан фарқли деб фараз қилинади. Умумий тенгламаси билан берилган тўғри чизикнинг координата ўқларига нисбатан жойлашувида тубандаги ҳоллар бўлиши мумкин:

а) агар $C = 0$, $A \neq 0$, $B \neq 0$ бўлса, яъни тўғри чизик тенгламасида озод ҳад бўлмаса, тўғри чизик координаталар бошидан ўтади.

Демак, агар $A \neq 0$ бўлса, (20) тўғри чизик $y - y_0 = k(x - x_0)$ бўлса, (20) тўғри

ёки

$$y = kx + b,$$

Тўғри чизик умумий тенгламасидан бурчак коэффициенти k ни топайлик: $k = \frac{A}{-B} = -\frac{a_1}{a_2}$, демак, тўғри чизик

йўналтирувчи вектори $\vec{a}$ нинг координаталари сифатида $-B, A$ сонларни қабул қилиш мумкин, яъни умумий тенгламаси билан берилган тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори сифатида

$$\vec{a} = \{-B; A\} \quad (21)$$

векторни олиш мумкин.

1-мисол. $2x - 3y + 7 = 0$ тўғри чизикнинг нормал векторини кўрсатинг.

Ечиш. Нормал векторини $\vec{n} = \{A; B\}$ кўринишда излаймиз. Берилган тўғри чизик тенгламасидан: $A = 2;$

$B = -3$. Шунинг учун $\vec{n} = \{2; -3\}$.

2-мисол. $2x + y - 4 = 0$ ва $x - y + 1 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуқтаси орқали ўтиб, $x + y - 5 = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр булган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Дастлаб икки тўғри чизикнинг кесишиш нуқтасини топамиз, бунинг учун кесишиш нуқтасининг координаталарини $x_1; y_1$ деб оламиз. У ҳолда

$$\begin{cases} 2x_1 + y_1 - 4 = 0, \\ x_1 - y_1 + 1 = 0 \end{cases}$$

системадан $x_1 = 1; y_1 = 2$ ларни топамиз. Изланаётган тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори $\vec{a}$ сифатида $x + y - 5 = 0$ тўғри чизикнинг нормал вектори $\vec{a} = \{1; 1\}$ ни олиш мумкин. У ҳолда изланаётган тўғри чизик тенгламаси

$1 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 2) = 0$ ёки $x + y - 3 = 0$ кўринишда булади.

3-§. Текисликда икки тўғри чизикнинг ўзаро жойлашуви

Текисликда d_1 ва d_2 тўғри чизиклар ушбу тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0; \quad (22)$$

$$d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0. \quad (23)$$

Бу тўғри чизикларнинг текисликда ўзаро жойлашувини текшириш учун (22) ва (23) тенгламаларни биргаликда система қилиб текшириш керак (1 боб, 2-§). Шунга мувофиқ d_1 ва d_2 тўғри чизиклар текисликда ўзаро қуйидагича жойлашиши мумкин:

а) d_1 ва d_2 тўғри чизиклар кесишади. У ҳолда $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ (система ягона ечимга эга);

б) d_1 ва d_2 тўғри чизиклар параллел. Бу ҳолда $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$ бўлади.

в) d_1 ва d_2 тўғри чизиклар устма-уст тушади, бу ҳолда $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

Мисол. $x - 4y + 3 = 0$ ва $2x - y + 5 = 0$ тўғри чизикларнинг текисликда ўзаро қандай жойлашишини текширинг.

Ечиш. Берилган тўғри чизикларнинг текисликда жойлашишини аниқлаш учун ушбу

$$\begin{cases} x - 4y + 3 = 0, \\ 2x - y + 5 = 0 \end{cases}$$

системани текшираемиз. Энди бу тўғри чизикларнинг кесишиш нуқтасини топиш учун бу системани ечамиз, чунки изланган нуқта бир вақтнинг ўзида берилган тўғри чизикларнинг ҳар бирида ётади. Юқорида аниқлаганимиздек, $\frac{1}{2} \neq \frac{-4}{-1}$ бўлгани учун бу тўғри чизиклар

кесишади. Системани ечиб $\left(-\frac{17}{7}; \frac{1}{7}\right)$ ни топамиз.


4-§. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак

Иккита тўғри чизик орасидаги бурчакни бу тўғри чизикларнинг берилган тенгламасига кўра аниқлаш масаласини кўраемиз.

d_1 ва d_2 тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак деганда, бу тўғри чизикларнинг йўналтирувчи векторлари орасидаги бурчакни тушунамиз (φ бурчак 0° дан 180° гача оралиқда ўзгаради). d_1 ва d_2 тўғри чизиклар қуйидаги умумий кўринишдаги тенгламалари билан берилган бўлсин (45-а чизма):

$$d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0,$$

$$d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$



45-а, б чизма.

$\vec{d}_1 = [-B_1; A_1]$ вектор d_1 тўғри чизиқнинг, $\vec{d}_2 = [-B_2; A_2]$ вектор d_2 тўғри чизиқнинг йўналтирувчи векторидир (VI боб, 2-§, 6-пунктга қаранг). У ҳолда $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ векторлар орасидаги φ бурчак таърифига кура ($\vec{d}_1$ ва $\vec{d}_2$ тўғри чизиқлар орасидаги бурчак) қуйидаги формуладан аниқланади:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos (\vec{d}_1, \vec{d}_2) = \\ &= \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{|\vec{d}_1| \cdot |\vec{d}_2|} = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

Энди $[0; i, j]$ системада ўзларининг

$$\begin{aligned} d_1: y &= k_1 x + b_1, \\ d_2: y &= k_2 x + b_2 \end{aligned}$$

бурчак коэффициентли тенгламалари билан берилган ва Oy ўққа параллел бўлмаган d_1 ва d_2 тўғри чизиқлар орасидаги бурчак формуласини аниқлаймиз. φ_1 ва φ_2 лар шу тўғри чизиқларнинг Ox ўқининг мусбаб йўналиши билан ташкил қилган бурчаклари бўлсин. Чизмадан $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ (45-б чизма). Берилган тўғри чизиқларнинг бурчак коэффициентлари $k_1 = \operatorname{tg} \varphi_1$; $k_2 = \operatorname{tg} \varphi_2$ бўлади. Қуйидагига эгамиз:

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg}(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_1}{1 + \operatorname{tg} \varphi_1 \cdot \operatorname{tg} \varphi_2}.$$

$\operatorname{tg} \varphi_1, \operatorname{tg} \varphi_2$ лар уранга k_1, k_2 ларини қуйиб,

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2} \quad (26), \quad \operatorname{ctg} \varphi = \frac{1 + k_1 \cdot k_2}{k_2 - k_1} \quad (27)$$

формулаларни ҳосил қиламиз.

(26) формула тўғри чизиқлар перпендикуляр бўлмаган ҳолда ишлагилди. (26) ва (27) формулалардан $k_2 = k_1$ тўғри чизиқларнинг параллеллик, $k_1 \cdot k_2 = -1$ тўғри чизиқларнинг перпендикулярлик шартлари келиб чиқади.

1-мисол. $x + 5y + 9 = 0$ ва $2x - 3y + 1 = 0$ тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. (24) формулага кўра топамиз:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{1 \cdot 2 + 5 \cdot (-3)}{\sqrt{1^2 + 5^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{2 - 15}{\sqrt{26} \cdot \sqrt{13}} = \\ &= -\frac{13}{\sqrt{2} \cdot 13} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Демак, $\varphi = 135^\circ$.

2-мисол. $2x - 3y - 7 = 0$ ва $4x - 6y + 5 = 0$ тўғри чизиқларнинг ўзаро параллеллиги ёки перпендикулярлигини аниқланг.

Ечиш. Бу ерда $A_1 = 2$, $A_2 = 4$, $B_1 = -3$, $B_2 = -6$. $\frac{A_1}{A_2}$ ва $\frac{B_1}{B_2}$ нисбатларини солиштирамиз: $\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Демак, берилган тўғри чизиқлар ўзаро параллел.

3-мисол. $6x - 2y + 5 = 0$ ва $4x + 2y - 7 = 0$ тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни аниқланг.

Ечиш. Тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни φ деб белгилаймиз. Тўғри чизиқларнинг берилган тенгламаларини уларнинг бурчак коэффициентли тенгламалари орқали ифодалаб, ҳар бир тўғри чизиқнинг бурчак коэффициенти аниқлаймиз:

$$y = -2x + \frac{7}{2}; \quad k_1 = -2,$$

$$y = 3x + \frac{5}{2}; \quad k_2 = 3.$$

Тўғри чизиқлар орасидаги бурчак формуласи


$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$

га кўра топамиз

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{3 + 2}{1 - 2 \cdot 3} = -1; \quad \varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

5-§. Нуқтадан тўғри чизиқчага бўлган масофа

$\{O; i; j\}$ координата
системасида d тўғри чи-
зиқ $Ax + By + C = 0$
тенгламаси билан ва
 $M_0(x_0; y_0)$ нуқта берилган
бўлсин. M_0 нуқтадан d
тўғри чизиқча перпенди-
куляр утказамиз ва улар-
нинг кесилган нуқтасини



46-чизма.

H билан белгилаймиз (46-чизма). $\vec{HM}_0$ векторнинг
узунлиги M_0 нуқтадан d тўғри чизиқчага бўлган ма-
софа дейлади ва $\rho(M_0; d)$ курунишда белгиланади.

$n = \{A, B\}$ вектор берилган тўғри чизиқнинг нормал
вектори бўлсин. Агар M нуқта d тўғри чизиқда ётса,
 $\rho(M_0, d) = 0$ бўлади. Агар M нуқта d тўғри чизиққа
тегишли бўлмаса, у ҳолда $\rho(M_0, d) = |\vec{HM}_0|$. $\vec{HM}_0$ ва
 n векторлар коллинеар, чунки n вектор d тўғри чи-
зиқнинг нормали. Векторларнинг скаляр купайтмасини
топайлик:

$$\vec{HM}_0 \cdot \vec{n} = |\vec{HM}_0| \cdot |\vec{n}| \cos(\vec{HM}_0, \vec{n}) = \pm \rho(M_0, d) \cdot |\vec{n}|. (*)$$

Агар $\vec{HM}_0$ ва n лар бир хил йўналишда бўлса, $(\vec{HM}_0, n) = 0$ бўлиб, $\cos(\vec{HM}_0, n) = 1$ бўлади, агар $\vec{HM}_0$ ва n
қарама-қарши йўналишда бўлса, $(\vec{HM}_0, n) = 180^\circ$ бў-
либ, $\cos(\vec{HM}_0, n) = -1$ бўлади. Буларни ҳисобга ол-
сак (*) формула қуйидаги курунишга эга бўлади:

$$\rho(M_0, d) = \frac{|\vec{HM}_0 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}. \quad (31)$$

H нуқтанинг координаталари x_1, y_1 бўлса, $\vec{HM}_0 = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ бўлади. H нуқта d тўғри чизиққа тегиш-

ли бўлгани учун $Ax_1 + By_1 + C = 0$ булади. Бу вақтда скаляр қўпайтма қўйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned} \vec{NM}_0 \cdot \vec{n} &= A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) = \\ &= Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1) = Ax_0 + By_0 + C. \end{aligned} \quad (32)$$

Шу билан бирга $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$ эканини назарда тут- сак, (31) формула қўйидаги кўринишни олади:

$$\rho(M_0, d) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (33)$$

(33) берилган M_0 нуқтадан берилган d тўғри чизиққа- ча бўлган масофани ҳисоблаш формуласидир.

Мисол. $A(2; 5)$ нуқтадан $6x + 8y - 5 = 0$ тўғри чизиққача бўлган масофани топинг.

Ечиш. (33) формулага кўра топамиз:

$$\begin{aligned} x_0 &= 2; y_0 = 5; A = 6; B = 8; C = -5; \\ \rho(A, d) &= \frac{|6 \cdot 2 + 8 \cdot 5 - 5|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{47}{10} = 4,7 \text{ бирлик.} \end{aligned}$$

6-§. Тўғри чизиқлар дастаси

Тўғри чизиқлар дастаси икки хил булади: кесишув- чи тўғри чизиқлар дастаси ва параллел тўғри чизиқ- лар дастаси. Агар (22) ва (23) тенгламалар билан ифо- даланувчи тўғри чизиқлар бирор нуқтада кесишса, у нуқта орқали ўтувчи тўғри чизиқлар кесишувчи тўғри чизиқлар дастасини ташкил қилади. Улар кесишган нуқта даста маркази дейилади.

Агар (22) ва (23) тўғри чизиқларнинг йўналишувчи векторлари параллел ёки устма-уст тушса, у ҳолда шу йўналишдаги тўғри чизиқлар параллел тўғри чизиқлар дастасини ифодалайди. Кесишувчи тўғри чизиқлар дастасининг маркази орқали ўтувчи тўғри чизиғи қўйида- ги тенглама билан аниқланади:

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0. \quad (34)$$

бу ерда α ва β лар бир вақтда нолга тенг бўлмаган ҳар хил қийматларни қабул қилади. Агар кесишувчи тўғри чизиқлар дастаси марказининг координаталари $(x_0; y_0)$ берилган бўлса, у ҳолда даста тенгламаси ту- бандаги кўринишга эга булади:

$$\alpha(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1) + \beta(A_2x_0 + B_2y_0 + C_2) = 0. \quad (35)$$

Мисол. Тўғри чизиқлар $x + y + 10 = 0$ ва $2x - 3y - 5 = 0$ тенгламалар билан берилган. Шу тўғри чизиқлар дастасига тегишли ва $M(1; 2)$ нуқта орқали утувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

Ечиш. Дастлаб берилган тўғри чизиқлардан утувчи тўғри чизиқлар дастаси тенгламасини тузамиз:

$$x + y + 10 + \lambda(2x - 3y - 5) = 0. \quad (*)$$

Бу тўғри чизиқлар дастасидан $M(1; 2)$ нуқтадан утувчи тўғри чизиқни ажратиб олишимиз керак. Биз излаётган тўғри чизиқ тенгламасини M нуқта координаталари қаноатлантириши керак. Шунинг учун M нуқта координаталарини $(*)$ тенгламага қўямиз:

$$1 + 2 + 10 + \lambda \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 - 5 = 0,$$

$$13 + \lambda(-9) = 0; \quad \lambda = -\frac{13}{9}.$$

Бу қийматни $(*)$ тенгламага қўйиб изланаётган тўғри чизиқ тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$x + y + 10 + \frac{13}{9}(2x - 3y - 5) = 0,$$

$$9x + 9y + 90 + 26x - 39y - 65 = 0,$$

$$7x - 6y + 5 = 0.$$

М а ш қ л а р

1. $M(1; 4)$ ва $N(3; -2)$ нуқталардан ўтувчи тўғри чизиқнинг бурчак коэффициентини топинг ва тенгламасини тузинг.

2. Бурчак коэффициенти $k = -3$ бўлган ва $(-1; 4)$ нуқтадан ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

3. Қўйидаги нуқталар жуфтидан ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг:

а) $(-2; 2)$ ва $(3; 4)$;

б) $(1; 3)$ ва $(0; 5)$;

в) $(1; -7)$ ва $(3; -3)$;

г) $(0; 2)$ ва $(4; 0)$.

4. Координата ўқларидан $a = 3$; $b = 2$ кесмалар ажратувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

5. Қўйидаги тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни топинг:

1) $y = -7x$ ва $y = 3x + 11$;

2) $3x + 4y - 3 = 0$ ва $4x + 3y + 5 = 0$;

$$3) 2x + 2y + 1 = 0 \text{ ва } y = 2x + 3;$$

$$4) \frac{x+5}{24} = \frac{y-4}{7} \quad \text{ва} \quad \frac{x-2}{-15} = \frac{y+\frac{7}{8}}{8}.$$

6. Ушбу тўғри чизиқларнинг параллел эканлигини кўрсатинг.

$$a) 2x - 6y + 5 = 0 \text{ ва } 10x - 30y - 17 = 0;$$

$$6) \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{5} \quad \text{ва} \quad \frac{x-9}{4} = \frac{y+3}{10}.$$

7. $M(3; 2)$ нуқтадан $3x + 4y + 4 = 0$ тўғри чизиқ-кача бўлган масофани топинг.

8. $5x + 3y - 3 = 0$ ва $3x + 2y + 5 = 0$ тўғри чизиқларнинг кесишиш нуқтасидан ўтувчи тўғри чизиқлар дастасига тегишли бўлган $7x - 3y + 2 = 0$ тўғри чизиққа параллел ва перпендикуляр тўғри чизиқларнинг тенгламаларини тузинг.

9. $A(3; -1)$ нуқтадан ҳамда $x + 4y - 5 = 0$ ва $2x - 5y - 1 = 0$ тўғри чизиқларнинг кесишиш нуқтасидан ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.


VII боб

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛАР


Бизга олдинги бобдан маълумки, текисликда тўғри бурчакли Декарт координаталар системасида ҳар қандай биринчи тартибли икки ўзгарувчи тенглама, яъни $Ax + By + C = 0$ кўринишдаги тенглама (A ва B коэффициентлар бир вақтда нолга тенг эмас) тўғри чизиқ тенгламасини ифодалайди. Энди иккинчи тартибли икки ўзгарувчи тенгламаларни текширамыз. Бундай тенгламалар билан ифодаланувчи нуқталар тўплами иккинчи тартибли чизиқлар дейилади. Иккинчи тартибли чизиқларнинг турлари билан танишамиз.

1-§. Айлана

$R = \{0; i; j\}$ координаталар системаси берилган бўлсин. Бу системага нисбатан $C(a; b)$ марказли ва R радиусли айлана тенгламасини тузамиз. Айлана—берилган $C(a; b)$ нуқтадан R узоқликда ётган текислик нуқталарининг тўплами бўлиши таърифидан фойдаланамиз.



47-чизма



48-чизма.

(47-чизма), $M(x; y)$ — айлананинг ихтиёрий нуқтаси бўлса, бу нуқта айланада ётади деган шарт $MC = R$ тенглик билан ифодаланади. MC ни координата шаклида ёзамиз:

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R$$

ёки

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2. \quad (1)$$

(1) тенглама маркази $C(a; b)$ нуқтада ва радиуси R га тенг айлананинг каноник тенгламасидир. Агар айлана маркази координаталар боши билан устма-уст тушса, тенглама қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$x^2 + y^2 = R^2. \quad (2)$$

Эгри чизиқ параметрик тенгламалар орқали ҳам берилиши мумкин. Айтайлик, M нуқта эгри чизиқ бўйлаб ҳаракатлансин ва бирор t вақтда $x = \varphi(t)$; $y = \psi(t)$ координаталарга эга бўлсин. У ҳолда

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (3)$$

тенгламалар системаси эгри чизиқнинг параметрик тенгламалари, t эса параметр дейилади. Масалан,

$$\begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases} \quad (4)$$

тенгламалар айлананинг параметрик тенгламаларидир.

Агар чизиқнинг параметрик тенгламалари маълум бўлса, ундан фойдаланиб, чизиқнинг ошкормас кўринишдаги тенгламасини келтириб чиқариш мумкин (ош-

кормас тенглама баъзи ҳолларда чизик тенгламасини ифодаламаслиги ҳам мумкин, бошқача айтганда чизикқа тегишли бўлмаган нуқтанинг координаталари ошкормас тенгламани қаноатлантириши мумкин). Агар (4) системадан t параметрни чиқарсак,

$$x^2 + y^2 = R^2$$

тенгламага эга бўламиз.

Мисол. Маркази $C(-1; 1)$ нуқтада, радиуси 3 бирлик бўлган айлана тенгламасини тузинг ва бу айлана-ни ясанг.

Ечиш. Шартга кўра айлана марказининг координаталари $a = -1$; $b = 1$ ва $R = 3$. Берилганларни (1) формулага қўйиб, айлана тенгламасини тузамиз: $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$. Изланган айлана 48-чизмада тасвирланган.

2-§. Чизикларнинг кесишиш нуқталари. Икки айлананинг ўзаро жойлашуви

Айтайлик, иккита чизик декарт координаталар системасида ўзининг қуйидаги тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$\gamma_1: \varphi_1(x, y) = 0,$$

$$\gamma_2: \varphi_2(x, y) = 0.$$

Бу чизикларнинг кесишиш нуқталарини топиш учун қуйидаги система ечимга эга бўлишини текшираемиз:

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y) = 0, \\ \varphi_2(x, y) = 0. \end{cases}$$

Бу системанинг ечими чизиклар кесишиш нуқталарининг координаталарини ифодалайди.

Координаталар текислигида иккита айлананинг ўзаро жойлашувини текширайлик. Айланаларнинг радиуслари R_1 ва R_2 уларнинг марказлари орасидаги масофа k бўлсин дейлик. Агар айланалар марказлари O ва O_1 нуқтада (O нуқтани координаталар боши ва OO_1 нуқтанинг мусбат йўналиши деб қабул қиламиз) деб ҳисобласак, айланалар қуйидаги тенгламалар билан ифодаланади:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= R_1^2, \\ (x - k)^2 + y^2 &= R_2^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Бу айланаларнинг кесишишини аниқлаш учун (5) тенгламаларни система қилиб ечамиз. У ҳолда x, y лар учун қуйидаги ифодага эга бўламиз: $x = \pm \sqrt{R_1^2 - y^2}$.
бу ерда

$$y = \pm \frac{1}{2k} \times$$


$$\times \sqrt{(R_1 + R_2 + k)(R_1 + k - R_2)(R_1 + R_2 - k)(R_2 + k - R_1)}. \quad (6)$$

Бу формуладан кўринадики, агар $R_1 + k > R_2$, $R_1 + R_2 > k$ ва $R_2 + k > R_1$ бўлса, у ҳолда илдиз остидаги ифода мусбат бўлиб, (5) система иккита ечимга эга бўлади. Демак, айланалар иккита нуқтада кесишади. Агар $R_1 + k - R_2$; $R_1 + R_2 - k$; $R_2 + k - R_1$ кўпайтувчилардан биттаси нолга тенг бўлса, (5) система битта ечимга эга бўлиб, айланалар ўзаро уринади. Агар илдиз остидаги бирор кўпайтувчи манфий бўлса, (5) система ечимга эга бўлмайди, яъни айланалар кесишмайди. Айтилганлардан қуйидаги хулоса келиб чиқади: Агар R_1, R_2, k сонлардан бири қолган иккитасининг йиғиндисидан катта бўлса, айланалар кесишмайди; агар улардан бири қолган иккитасининг йиғиндисига тенг бўлса, айланалар уринади; агар сонлардан бири қолган иккитасининг йиғиндисидан кичик бўлса, айланалар иккита нуқтада кесишади.

3-§. Эллипс

1-таъриф. Текисликда ихтиёрий нуқтасидан фокуслар деб аталувчи берилган иккита F_1 ва F_2 нуқтасигача бўлган масофалар йиғиндиси ўзгармас миқдорга ($2a$ га) тенг бўлган барча нуқталар тўплами эллипс деб аталади (ўзгармас миқдор $2a$ фокуслар орасидаги масофадан катта деб олинади).

Эллипс тенгламасини тузиш учун координаталар системасини тубандагича киритамиз. Берилган икки нуқтани туташтирувчи тўғри чизиқни абсциссалар ўқи деб қабул қиламиз, координаталар бошини эса берилган нуқталар ўртасида оламиз. Берилган F_1, F_2 фокуслар орасидаги масофани $2c$ билан белгилайлик. У ҳолда F_1, F_2 нуқталарнинг координаталари мос равишда $(c; 0)$ ва $(-c; 0)$ га тенг бўлади. Таърифга кўра $2a > 2c$ ёки $a > c$. Эллипснинг ихтиёрий нуқтасини $M(x; y)$



49-чизма.

билан белгилайлик (49-чизма). M нуқтанинг F_1 ва F_2 фокуслардан масофаларини унинг фокал радиуслари дейилади ва мос равишда r_1 , r_2 билан белгиланади, яъни $r_1 = \rho(F_1, M)$ ва $r_2 = \rho(F_2, M)$. Эллипснинг таърифига кўра $\rho(F_1, M) + \rho(F_2, M) = 2a$ ёки

$$r_1 + r_2 = 2a.$$

Демак,

$$\rho(F_1, M) + \rho(F_2, M) = 2a. \quad (*)$$

Икки нуқта орасидаги масофани топиш формуласига кўра:

$$\begin{cases} \rho(F_1, M) = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}, \\ \rho(F_2, M) = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}. \end{cases} \quad (**)$$

$$(*), (**) \Rightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a.$$

Бу тенгламанинг биринчи ҳадини ўнг томонга ўтказиб, ҳосил бўлган тенгламанинг иккала томонини квадратла кутарамиз:

$$\begin{aligned} x^2 + 2cx + c^2 + y^2 - 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \\ + x^2 - 2cx + c^2 + y^2, \end{aligned}$$

бундан

$$2cx = 4a^2 - 2cx - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

ёки

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx.$$

Ҳосил қилинган тенгламанинг ҳар иккала томонини яна квадратга кутарамиз:

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2.$$

Бу ифодани ихчамлаштиришдан кейин қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Тенгламанинг иккала қисмини $a^2(a^2 - c^2)$ га бўлиб, ҳуйдагини ҳосил қиламиз:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$

$a > c$ бўлган учун. $a^2 - c^2$ мусбат миқдордир, уни b^2 билан белгиласак:

$$b^2 = a^2 - c^2, \quad (6^a)$$

юқоридаги тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (7)$$




қурилишни олади.

(7) тенглама эллипснинг каноник тенгламаси дейилади.

Эллипснинг каноник тенгламасига кўра шаклини текшираимиз.

1. (7) тенглама билан аниқланган эллипс координата ўқларига нисбатан симметрикдир. Ҳақиқатан ҳам, (x, y) шу эллипснинг бирор нуқтаси бўлса, яъни x, y сонлар (7) тенгламани қаноатлантирса, y вақтла (7) тенгламада x, y ўзгарувчиларнинг фақат квадратлари қатнашгани учун бу тенгламани

$(-x; y); (x; -y)$ ва $(-x; -y)$



50-чизма.

нуқталарнинг координаталари ҳам қаноатлантиради (50-а чизма). Шунинг учун координата ўқлари эллипснинг симметрия ўқларидир. Симметрия ўқларининг кесишган нуқтаси $O(0; 0)$ эллипснинг *маркази* дейилади, фокуслар ётган ўқ унинг *фокал ўқи* дейилади.

2. Эллипснинг координата ўқлари билан кесишган нуқталарини топамиз. Эллипснинг Ox ўқ билан кесиш-

ган нуқталарини топиш учун ушбу тенгламаларни система қилиб ечамиз:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases} \quad (8)$$

(8) системанинг иккинчи тенгласидан $y=0$ ни биринчи тенгласига қўйсак, $x = \pm a$ ҳосил бўлади. Шундай қилиб, эллипс Ox ўқини $A_1(a; 0)$ ва $A_2(-a; 0)$ нуқталарда кесади. Шу сингари эллипснинг Oy ўқ билан кесишган $B_1(0; b)$ ва $B_2(0; -b)$ нуқталари топилади. Эллипснинг координага ўқлари (симметрия ўқлари) билан кесишган нуқталари унинг *учлари* дейилади. Эллипснинг тўртта учи бор. (Чизмада улар A_1, A_2, B_1, B_2 билан белгиланган.)

$[A_1A_2]$ кесма ва унинг узунлиги $2a$ эллипснинг *катта ўқи*, $[OA_1]$ кесма ва унинг узунлиги эса эллипснинг *катта ярим ўқи* дейилади. $[B_1, B_2]$ кесма ва унинг узунлиги $2b$ эллипснинг *кичик ўқи*, $[OB_1]$ кесма ва унинг узунлиги b эса эллипснинг *кичик ярим ўқи* дейилади.

Эллипс чегараланган чизиқ. (7) тенгламадан кўрииб турибдики, унинг чап томонидаги нфода доимо мусбат бўлиб, ҳар бир ҳад қуйидаги шартни қаноатлантириши керак:

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1; \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1.$$

Бундан

$$|x| \leq a; \quad |y| \leq b.$$

Демак, эллипснинг барча нуқталари томонлари $2a$, $2b$ булган тўғри тўртбурчак ичига жойлашган (50-б чизма).

2-таъриф. Эллипснинг фокуслари орасидаги масофанинг катта ўқининг узунлигига нисбати эллипснинг *эксцентриситети* дейилади ва у e ҳарфи орқали белгиланади:

$$e = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}, \quad (9)$$

бу ерда $c < a \Rightarrow 0 < e < 1$. Эллипснинг шаклини унинг эксцентриситети ёрдамида текшириш қулай. (6^а) дан: $c^2 = a^2 - b^2$, у ҳолда

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2,$$

бундан

$$\frac{b}{a} = \sqrt{1 - e^2}.$$

$e \Rightarrow 1$ да $\frac{b}{a} \Rightarrow 0$ бўлиб, b кичиклашади ва эллипс (Ox) ўққа қисила боради, аксинча $e \Rightarrow 0$ бўлса, $\frac{b}{a} \Rightarrow 1 \Rightarrow b = a$ бўлиб, эллипс айланага яқинлаша боради. Хусусий ҳолда $a = b$ бўлса, у айланадан иборат бўлади (50-в чизма).

1-мисол. Катта ярим ўқи 5 га, кичик ярим ўқи 3 га тенг бўлган эллипснинг каноник тенгламасини ёзинг.

Ечиш. Шартга кўра $a = 5$, $b = 3$. (7) формулага асосан:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

2-мисол. $M(0; 3)$ нуқта орқали ўтувчи, фокуслари орасидаги масофа 4 га тенг бўлган эллипснинг каноник тенгламасини ёзинг.

Ечиш. Эллипснинг каноник тенгламасини ёзамиз:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Шартга кўра $M(0; 3)$ нуқта эллипсга тегишлидир, шунинг учун $\frac{9}{b^2} = 1$, бундан $b^2 = 9$. Энди a^2 параметрни топиш қолди: $a^2 = b^2 + c^2$. c — фокуслар орасидаги масофанинг ярми бўлгани учун, шартга кўра $c = 2$. У ҳолда $a^2 = 9 + 4 = 13$. Демак, $\frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$.

3-мисол. $9x^2 + 16y^2 = 144$ эллипснинг эксцентриситетини топинг.

Ечиш. Берилган эллипс тенгламасини каноник кўринишга келтирамиз:

$$9x^2 + 16y^2 = 144 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1,$$

бу ерда $a = 4$, $b = 3$, булардан фойдаланиб c ни топамиз:

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7 \Rightarrow c = \sqrt{7}.$$

Демак,

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

4-§ Гипербола

Таъриф. Ихтиёрӣ нуқтасидан фокуслар деб ата- лувчи берилган икки F_1 ва F_2 нуқтагача булган масо- фалар айирмасининг абсолют қиймати узгармас миқ- дор $2a$ га тенг булган текисликдаги барча нуқталар тўплами *гипербола* дейилади. (Узгармас миқдор $2a$ фо- куслар орасидаги масофадан ($2c$ дан) кичик деб оли- нади)

Гипербола тенгламасини келтириб чиқариш учун белгилашларни, чизмани эллипс бўлган ҳолдагидек қи- либ оламиз (49-чизма). Гипербола таърифига кўра $|PF_1, M| - |PF_2, M| = 2a$ ёки

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a.$$


Илдизлардан қутулгандан кейин қуйидаги тенгламага эга буламиз (илдизларни йўқотиш, ихчамлаш, содла- лаштириш ҳам олдинги темадагидек бажарилади):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1. \quad (*)$$

Таърифга кўра $2a < 2c$, яъни $c > a$, шунинг учун $c^2 - a^2$ миқдор мусбат бўлади, $c^2 - a^2$ ифодани b^2 билан белгилаймиз: $c^2 - a^2 = b^2$. У ҳолда (*) тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (10)$$

кўринишни олади. (10) тенглама гиперболанинг канон- ник тенгламаси дейилади. (Фокуслари ординаталар ўқи- да ётган гипербола тенгламаси $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ каби бу- лади.) Гипербола (10) тенгламасига кўра шаклини аниқлаймиз. Бунинг учун гипербола тенгламасида ҳам эллипс тенгламаси устида олиб борилган муҳокамалар- ни такрорлаб гиперболанинг координаталар боши, ко- ордината ўқларига нисбатан симметриклиги аниқла- нади.



51-чизма

Гипербола Ox ўқини $A_1(a; 0)$ ва $A_2(-a; 0)$ нуқталарда кесиб утади (51-чизма). Гипербола Oy ўқ билан кесишмайди. Ҳақиқатан ҳам, (10) тенг- ламага $x = 0$ ни қўйсак,

$y^2 = -b^2$ бўлиб, бу ифода ҳақиқий сонлар соҳасида ўринли булмайди.

A_1, A_2 нуқталар гиперболанинг *учлари*, улар ора- сидаги $2a$ узунликка тенг кесма эса унинг *ҳақиқий ўқи* дейилади.

Oy ўқда $B(0; -b)$ ва $B(0; b)$ нуқталарни белгила- сак, B_1 дан B_2 гача булган $2b$ узунликдаги кесма ги- перболанинг *мавҳум ўқи* дейилади.

Агар $M(x; y)$ нуқта гиперболада ётса, унинг тенг- ламасидан $|x| \geq a$ эканини кўрамиз. Бундан $|x| = \pm a$ тўғри чизиқлар билан чегараланган $-a < x < a$ соҳа- да гиперболанинг нуқталари мавжуд эмаслиги келиб чиқади. (10) тенгламани y га нисбатан ечамиз:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}. \quad (11)$$

Бу ердан x узгарувчи a дан $+\infty$ гача ортганда ҳамда $-a$ дан $-\infty$ гача камайганда y ордината 0 дан $+\infty$ гача ўсиши кўринади. Демак, гипербола икки қисмдан иборат бўлиб, улар гиперболанинг *тармоқлари* дейи- лади.

Гипербола (10) тармоғи $x \geq a$ ярим текис- ликда, иккинчи (чап) тармоғи $x \leq -a$ ярим текислик- да жойлашган.

Гипербола $y = \pm \frac{b}{a}x$ тенгламалар билан аниқла- нувчи иккита асимптотага эга (51-чизма).

(Агар чексиз тармоққа эга булган эгри чизиқнинг нуқтаси шу чизиқ бўнлаб ҳаракатланиб борганида унинг d тўғри чизиқгача булган масофаси нолга интилса, d тўғри чизиқ текис чизиқнинг *асимптотаси* дейилади.)

Агар $a = b$ (ярим ўқлари тенг) булса, гипербола *тег томонли* дейилади.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ тенгламада } a = b \text{ булганда:}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ ёки } x^2 - y^2 = a^2. \quad (12)$$

Тенг томонли гипербола асимптоталарининг тенгла- малари $y = x$, $y = -x$ бўлиб, улар орасидаги бурчак 90° га тенг булади. (Уларнинг бири Ox ўқ билан 45° ли, иккинчиси 135° ли бурчак ташкил қилади.)

Координата ўқларини -45° га бурсак, Oy ўқ $y = x$ асимптота билан, Ox ўқ эса $y = -x$ асимптота билан

устма-уст тушиб, асимптоталар янги координата ўқла-
ри бўлиб қолади. Бу янги ўқларда $x^2 - y^2 = a^2$ тенг-
томонли гипербола анча содда: $xу = a$ кўринишда ифо-
даланади.

Ҳақиқатан ҳам, (12) тенгламага

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha,$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

алмаштириш формулаларини татбиқ этамиз. Бу ерда
 $\alpha = -45^\circ$. У ҳолда

$$(x' \cos 45^\circ + y' \sin 45^\circ)^2 - (-x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ)^2 = a^2,$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} x' + \frac{\sqrt{2}}{2} y'\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} y' - \frac{\sqrt{2}}{2} x'\right)^2 = a^2,$$

$$\frac{1}{2} (x'^2 + 2x'y' + y'^2) - \frac{1}{2} (y'^2 - 2x'y' + x'^2) = a^2,$$

$$2x'y' = a^2,$$

$$x'y' = \frac{a^2}{2}$$

ёки x' ва y' ларни x , y лар орқали, $\frac{a^2}{2}$ ни эса би-
рор c орқали белгиласак, $xу = c$ кўринишдаги тенгла-
мага эга бўламиз.

Гипербола фокуслари орасидаги масофанинг ҳақи-
қий ўқининг узунлигига нисбати гиперболанинг экс-
центриситети дейилади. Одатда эксцентриситет e
харфи билан белгиланади:

$$e = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}.$$

Таърифдан, гипербола эксцентриситети 1 дан катта
экани келиб чиқади.

Эксцентриситет гипербола шаклини аниқлашда му-
ҳим роль ўйнайди. Ҳақиқатан ҳам, $e = \frac{c}{a}$ дан $c = ea$,

буни $b^2 = c^2 - a^2$ га қўйсак, $b^2 = a^2(e^2 - 1)$ ёки $\frac{b}{a} =$

$= \sqrt{e^2 - 1}$ бўлиб, бундан кўринадики, эксцентриситет

e қанчалик кичик, яъни $e \rightarrow 1$ бўлса, $\frac{b}{a}$ шунчалик

кичик, яъни $\frac{b}{a} \rightarrow 0$ бўлади (бу ерда a ўзгармайди деб

фараз қилинади) ва гипербола ўзининг ҳақиқий ўқига

сиқилган бўлади, аксинча e катталашиб борса, $\frac{b}{a}$ ҳам катталашиб, гипербола тармоқлари кенгайиб боради ([8]).

1-мисол. Гиперболанинг ҳақиқий уқи 18 га, фокуслари орасидаги масофа 24 га тенг бўлса, унинг каноник тенгламасини тузинг.

Ечиш. Шартга кўра $2a = 18 \Rightarrow a = 9$ ва $2c = 24 \Rightarrow c = 12$. Энди b^2 ни топамиз:

$$b^2 = c^2 - a^2 = 144 - 81 = 63.$$

Демак,

$$\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{63} = 1.$$

2-мисол. $\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{16} = 1$ гипербола тенгламасы берилган. Гиперболанинг ҳақиқий ва мавҳум ярим ўқларини, фокусларини, эксцентриситетини аниқланг.

Ечиш. Берилган тенгламада $a^2 = 25$, $b^2 = 16$, демак $a = 5$; $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 25 + 16 = 41$, бундан

$$c = \pm \sqrt{41}; F_1(\sqrt{41}; 0); F_2(-\sqrt{41}; 0).$$

Энди e ни аниқлаймиз:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{41}}{5}.$$

3-мисол. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ гипербола асимптоталарининг тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Берилган тенгламада $a^2 = 5$, $b^2 = 20$, бундан

$$a = \sqrt{5}; b = 2\sqrt{5}.$$

Асимптота тенгламалари $y = \frac{b}{a}x$; $y = -\frac{b}{a}x$ ларга топилганларни қўямиз. Демак, $y = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}x$ ёки $y = 2x$. $y = -\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}x$ ёки $y = -2x$.

4-мисол. Гиперболанинг каноник тенгламаси берилган:

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1.$$

эксцентриситетини, фокусларини, учларини топинг, асимптоталари тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Берилишга кўра: $a=3$; $b=\sqrt{7}$. Демак,

$$c^2 = a^2 + b^2; \quad c = \pm\sqrt{9+7} = \pm 4,$$

эксцентриситет:

$$e = \frac{c}{a}; \quad c = \frac{4}{3}.$$

Гипербола фокуслари:

$$F_1(4; 0); \quad F_2(-4; 0).$$

Гипербола учлари:

$$\begin{aligned} A(3; 0) & \quad A'(-3; 0); \\ B(0; \sqrt{7}); & \quad B'(0; -\sqrt{7}). \end{aligned}$$


Асимптоталари тенгламалари:

$$y = \frac{\sqrt{7}}{3}x; \quad y = -\frac{\sqrt{7}}{3}x.$$

5-§. Парабола

Таъриф. Парабола деб шундай нуқталарнинг тўп-ламига айтиладики, бу нуқталарнинг ҳар биридан фокус деб аталувчи берилган нуқтагача бўлган масофа директриса деб аталувчи берилган тўғри чизиққача бўлган масофага тенгдир.

Берилган нуқта параболанинг фокуси, берилган тўғри чизиқ эса параболанинг директрисаси дейилади. Берилган нуқта берилган тўғри чизиқда ётмайди деб олинади.



52-чирама

Параболанинг фокусини F , директрисасини d билан, фокусдан директрисагача масофани p билан белгилаймиз. Парабола тенгламасини таърифидан фойдаланиб келтириб чиқарамиз. Бунинг учун координаталар системасини тубандагича киритамиз. F нуқтадан ўтувчи

ва d тўғри чизиққа перпендикуляр тўғри чизиқни абсциссалар ўқи деб қабул қиламиз. Абсциссалар ўқининг d тўғри чизиқ билан кесишган нуқтаси L бўлсин. Ординаталар ўқини $[FL]$ кесманинг ўртасидан ўтказамиз (52-чизма).

Бу ҳолда директриса $x = -\frac{p}{2}$ тенгламага, F фокус эса $(\frac{p}{2}; 0)$ координаталарга эга бўлади. $M(x; y)$ — параболанинг ихтиёрий нуқтаси бўлсин. M нуқта параболада ётади деган шарғ (парабола таърифига кўра) қуйидаги тенглик орқали ифодаланади:

$$\rho(K, M) = \rho(M, F). \quad (*)$$

Икки нуқта орасидаги масофани топиш формуласидан фойдалансак, қуйидагига эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned} \rho(K, M) &= \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2}, \\ \rho(M, F) &= \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}. \end{aligned} \right\} \quad (**)$$

$$(*): (**) \Rightarrow \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2;$$

қавсларни очиб ихчамлаймиз, натижада



$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

ёки

$$y^2 = 2px. \quad (13)$$

(13) тенглама параболанинг каноник тенгламаси дейлади. Парабола шаклини унинг (13) тенгламасига кўра текшираемиз. $y^2 \geq 0$ ва $p > 0$ бўлгани учун (13) тенгламада $x \geq 0$ бўлиши керак. Бундан эса (13) тенглама билан ифодаланувчи параболанинг барча нуқталари ўғирим текисликда жойлашганлиги келиб чиқади.

$x = 0$ да (13) $\Rightarrow y = 0$ бўлиб, парабола координаталар бошидан ўтади. Координаталар боши параболанинг учи дейилади. x нинг ҳар бир $x > 0$ қийматига y нинг ишоралари қарама-қарши, аммо абсолют миқдорлари тенг бўлган қиймати мос келади. Бундан эса параболанинг Ox ўқиға нисбатан симметрик жойлашганлиги кўринади. Шунинг учун Ox ўқи параболанинг сим.





53-чизма.

метрия ўқи дейилади. (13) тенгламадан кўринадики, x ортиб бориши билан y ҳам ортиб боради. Демак, юқоридаги хоссаларга кўра параболанинг шаклини 53-чизмадагидек тасаввур қилиш мумкин. Агар параболалар координаталар системасига нисбатан 54 а, б, в-чизмалардагидек жойлашса, уларнинг тенгламалари мос равишда $x^2 = 2py$; $y^2 = -2px$; $x^2 = -2py$ кўринишда бўлади.

1-мисол. $y^2 = 4x$ парабола берилган. Параболанинг шундай нуқтасини топингки, ундан фокусгача бўлган масофа 1 га тенг бўлсин.

Ечиш. Шартга кўра $2p = 4 \Rightarrow \frac{p}{2} = 1$. Демак, па-



54-а, б, в чизма.

рабола фокуси $F(1; 0)$ нуқтада жойлашган. Айтайлик, $M(x; y)$ — параболанинг биз излаётган нуқтаси бўлсин. Шартга кўра бу нуқтадан фокусгача бўлган масофа 1 га тенг. Изланаётган нуқтанинг x, y координаталарини топиш учун қуйидаги тенгламалар системасини тузамиз:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ y^2 = 4x. \end{cases}$$

Бу системани ечамиз:

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + 4x &= 1 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 + 4x = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 + 2x + 1 - 1 &\Rightarrow (x+1)^2 - 1 \\ x+1 &= \pm 1; \quad x=0. \end{aligned}$$

У ҳолда $y^2 = 4x = 4 \cdot 0 = 0$. Демак, параболанинг фокусидан 1 бирлик масофада ётувчи нуқтаси $(0; 0)$ бўлади. у параболанинг учидир.

2-мисол. $x+4=0$ тўғри чизиқ ва $F(-2; 0)$ нуқтадан бир хил узоқликда жойлашган нуқталар геометрик ўрнининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. $K(x, y)$ — биз излаётган геометрик ўрнининг ихтиёрий нуқтаси бўлсин. Икки нуқта орасидаги масофа формуласига асосан: $|FK| = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}$. Масала шартига кўра $x+4=0$ тўғри чизиқ $K(x, y)$ нуқтадан $|KF| = |x+4|$ масофада бўлади. Шунинг учун,

$$\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = x+4$$

ёки

$$(x+2)^2 + y^2 = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow y^2 - 4x - 12 = 0.$$

Бундан

$$y^2 - 4x + 12 \quad \text{ёки} \quad x = \frac{1}{4}y^2 - 3.$$

Бу эса Ox ўқига нисбатан симметрик бўлган парабола тенгламасидир.



3-мисол. $y = ax^2 + bx + c$ парабола тенгламасини координаталар системасини алмаштириш билан каноник кўринишга келтиринг.

Ечиш. $y = ax^2 + bx + c$ ифодада шакл алмаштириш бажарамиз:

$$y = a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c - \frac{b^2}{4a^2},$$

$$y - \left(c - \frac{b^2}{4a^2}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2.$$

$X = x + \frac{b}{2a}$; $Y = y - \left(c - \frac{b^2}{4a^2}\right)$ координаталарни алмаштириш формуласини қўлласак,





53-чизма.

метрия ўқи дейилади. (13) тенгламадан кўринадики, x ортиб бориши билан y ҳам ортиб боради. Демак, юқоридаги хоссаларга кўра параболанинг шаклини 53-чизмадагидек тасаввур қилиш мумкин. Агар параболалар координаталар системасига нисбатан 54 а, б, в-чизмалардагидек жойлашса, уларнинг тенгламалари мос равишда $x^2 = 2py$; $y^2 = -2px$; $x^2 = -2py$ кўринишда бўлади.

1-мисол. $y^2 = 4x$ парабола берилган. Параболанинг шундай нуқтасини топингки, ундан фокусигача бўлган масофа 1 га тенг бўлсин.

Ечиш. Шартга кўра $2p = 4 \Rightarrow \frac{p}{2} = 1$. Демак, па-



54-а, б, в чизма.

рабола фокуси $F(1; 0)$ нуқтада жойлашган. Айтайлик, $M(x; y)$ — параболанинг биз излаётган нуқтаси бўлсин. Шартга кўра бу нуқтадан фокусгача бўлган масофа 1 га тенг. Изланаётган нуқтанинг x , y координаталарини топиш учун қуйидаги тенгламалар системасини тузамиз:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ y^2 = 4x. \end{cases}$$

Бу системани ечамиз:

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + 4x = 1 &\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + 4x = 1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 1 \Rightarrow (x+1)^2 = 1 \\ x+1 &= \pm 1; \quad x = 0. \end{aligned}$$

У ҳолда $y^2 = 4x = 4 \cdot 0 = 0$. Демак, параболанинг фокусидан 1 бирлик масофада ётувчи нуқтаси $(0; 0)$ бўлади, у параболанинг учидир.

2-мисол. $x+4=0$ тўғри чизиқ ва $F(-2; 0)$ нуқтадан бир хил узоқликда жойлашган нуқталар геометрик ўрнининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. $K(x, y)$ — биз излаётган геометрик ўрнининг ихтиёрий нуқтаси бўлсин. Икки нуқта орасидаги масофа формуласига асосан: $|FK| = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}$. Масала шартига кўра $x+4=0$ тўғри чизиқ $K(x, y)$ нуқтадан $|KF| = |x+4|$ масофада бўлади. Шунинг учун,

$$\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = x+4$$

ёки

$$(x+2)^2 + y^2 = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow y^2 - 4x - 12 = 0.$$

Бундан

$$y^2 - 4x + 12 \quad \text{ёки} \quad x = \frac{1}{4}y^2 - 3.$$

Бу эса Ox ўқиға нисбатан симметрик бўлган парабола тенгламасидир.

3-мисол. $y = ax^2 + bx + c$ парабола тенгламасини координаталар системасини алмаштириш билан канолик кўринишга келтиринг.

Ечиш. $y = ax^2 + bx + c$ ифодада шакл алмаштириш бажарамиз:

$$y = a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c - \frac{b^2}{4a^2},$$

$$y - \left(c - \frac{b^2}{4a^2}\right) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2.$$

$X = x + \frac{b}{2a}$; $Y = y - \left(c - \frac{b^2}{4a^2}\right)$ координаталарни алмаштириш формуласини қўлласак,



$Y = aX^2$ ёки $X^2 = \frac{1}{a}Y$ формулага эга бўламиз. Агар $\frac{1}{a} = 2p$ десак, $X^2 = 2pY$ формулага эга бўламиз.

6-§. Эллипс ва гиперболанинг директрисалари

Таъриф. Эллипс (гипербола) нинг катта (фокал) ўқига перпендикуляр ва марказидан $\frac{a}{e}$ масофада унга симметрик ўтган иккита тўғри чизиқ эллипс (гипербола) нинг директрисалари дейилади. F_1 ва F_2 фокусларга мос директрисалар таърифга кўра $d_1: x - \frac{a}{e} = 0$, $d_2: x + \frac{a}{e} = 0$ тенгламаларга эга бўлади. Бу ерда a — эллипс (гипербола) нинг катта (ҳақиқий) ярим ўқи, e — эксцентриситети. (Баъзан буларни мос равишда ўнг ва чап директрисалар деб ҳам аталади.) Эллипс учун $e < 1$, бундан $\frac{a}{e} > a$, гипербола учун $e >$

> 1 , бундан $\frac{a}{e} < a$. Бу ердан эллипснинг ҳам, гиперболанинг ҳам директрисалари уларни кесмаслиги кўринади (55-а, б чизмалар).

Эллипс (гипербола) нинг директрисалари учун қуйдаги мулоҳаза ўринлидир. Эллипс (гипербола) нинг ихтиёрий нуқтасидан фокусгача бўлган масофанинг ўша нуқтадан шу фокусга мос директрисасигача бўлган масофага нисбати ўзгармас миқдор бўлиб, эллипс (гипербола) нинг эксцентриситетига тенг бўлади. (Бу мулоҳазанинг исботини курсимиз талаб қилмагани учун келтириб ўтирмаймиз.)



55-а, б, чизма.

Мисол. Агар $x = \pm 6$ тўғри чизиқлар катта ўқи 10 га тенг бўлган эллипснинг директрисалари бўлса, шу эллипснинг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартига кўра $2a = 10 \Rightarrow a = 5$, яъни $\pm \frac{a}{e} = \pm 6$, бундан $\frac{a}{e} = 6$, аммо $e = \frac{c}{a}$, у ҳолда $\frac{a^2}{c} = 6$ ёки

$$c = \frac{a^2}{6} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}.$$

Эллипс учун

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - \frac{625}{36} = \frac{900 - 625}{36} = \frac{275}{36}.$$

Демак, эллипснинг изланаётган тенгламаси $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\frac{275}{36}} = 1$

кўринишда бўлади.

7-§. Иккинчи тартибли чизиқнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш

Бирор тўғри бурчакли декарт координаталар системасида координаталари

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (14)$$

тенгламани қаноатлантирувчи текислик нуқталарининг геометрик ўрни иккинчи тартибли чизиқ дейилади. Бунда a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентлар ҳақиқий сонлардан иборат бўлиб, a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентлардан ҳеч бўлмаганда биттаси нолдан фарқли бўлади.

Иккинчи тартибли чизиқ назариясининг асосий масалаларидан бири унинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш масаласи ҳисобланади. Иккинчи тартибли чизиқ тенгламасини соддалаштириш икки босқичдан иборат:

1) координаталар системасини буриш ёрдамида соддалаштириш. Агар иккинчи тартибли чизиқ бирор R тўғри бурчакли координаталар системасида (14) тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда бу координаталар системасини буриш ёрдамида шундай бир R' тўғри бурчакли координаталар системасига ўтиш мумкинки, у системада чизиқ ўз тенгламасида узгарувчилар купайтмасини, яъни xu ни сақламайди (бу



$Y = aX^2$ ёки $X^2 = \frac{1}{a} Y$ формулага эга бўламиз.
Агар $\frac{1}{a} = 2p$ десак, $X^2 = 2pY$ формулага эга бўламиз.

6-§. Эллипс ва гиперболанинг директрисалари

Таъриф. Эллипс (гипербола) нинг катта (фокал) ўқига перпендикуляр ва марказидан $\frac{a}{e}$ масофада ун-га симметрик ўтган иккита тўғри чизик эллипс (гипербола) нинг директрисалари дейилади. F_1 ва F_2 фокусларга мос директрисалар таърифга кўра $d_1: x - \frac{a}{e} = 0$, $d_2: x + \frac{a}{e} = 0$ тенгламаларга эга бўлади. Бу ерда a — эллипс (гипербола) нинг катта (ҳақиқий) ярим ўқи, e — эксцентриситети. (Баъзан буларни мос равишда ўнг ва чап директрисалар деб ҳам аталади.) Эллипс учун $e < 1$, бундан $\frac{a}{e} > a$, гипербола учун $e >$

> 1 , бундан $\frac{a}{e} < a$. Бу ердан эллипснинг ҳам, гиперболанинг ҳам директрисалари уларни кесмаслиги кўринади (55-а, б чизмалар).

Эллипс (гипербола) нинг директрисалари учун қуйидаги мулоҳаза уринлидир. Эллипс (гипербола) нинг ихтиёрий нуқтасидан фокусгача булган масофанинг ўша нуқтадан шу фокусга мос директрисасигача булган масофага нисбати ўзгармас миқдор бўлиб, эллипс (гипербола) нинг эксцентриситетига тенг бўлади. (Бу мулоҳазанинг исботини курсимиз талаб қилмагани учун келтириб ўтирмаймиз.)



55-а, б, чизма.

Мисол. Агар $x = \pm 6$ тўғри чизиқлар катта ўқи 10 га тенг бўлган эллипсининг директрисалари бўлса, шу эллипсининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартига кўра $2a = 10 \Rightarrow a = 5$, яъни $\pm \frac{a}{e} = \pm 6$, бундан $\frac{a}{e} = 6$, аммо $e = \frac{c}{a}$, у ҳолда $\frac{a^2}{c} = -6$ ёки

$$c = \frac{a^2}{6} = \frac{25}{6} = 4 \frac{1}{6}.$$

Эллипс учун

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - \frac{625}{36} = \frac{900 - 625}{36} = \frac{275}{36}.$$

Демак, эллипсининг изланаётган тенгламаси $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\frac{275}{36}} = 1$

кўринишда бўлади.

7-§. Иккинчи тартибли чизиқнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш

Бирор тўғри бурчакли декарт координаталар системасида координаталари

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (14)$$

тенгламани қаноатлантирувчи текислик нуқталарининг геометрик ўрни иккинчи тартибли чизиқ дейилади. Бунда a_{ij} коэффициентлар ҳақиқий сонлардан иборат бўлиб, a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентлардан ҳеч бўлмаганда биттаси нолдан фарқли бўлади.

Иккинчи тартибли чизиқ назариясининг асосий масалаларидан бири унинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш масаласи ҳисобланади. Иккинчи тартибли чизиқ тенгламасини соддалаштириш икки босқичдан иборат:

1) координаталар системасини буриш ёрдамида соддалаштириш. Агар иккинчи тартибли чизиқ бирор R тўғри бурчакли координаталар системасида (14) тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда бу координаталар системасини буриш ёрдамида шундай бир R' тўғри бурчакли координаталар системасига ўтиш мумкинки, у системада чизиқ ўз тенгламасида ўзгарувчилар купайтмасини, яъни xu ни сақламайди (бу

босқич $a_{22} \neq 0$ ҳолда қўлланилади). Бунинг учун утиш формулалари (5-бо5, 7-§)

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad (15)$$

дан x , y ларни (14) га қўйсак ва ўхшаш ҳадларни ихчамласак, (14) тенглама R' координаталар системасида қуйидаги кўринишни олади:

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a'_{00} = 0, \quad (16)$$

бу ерда

$$\begin{aligned} a'_{11} &= a_{11} \cos^2 \alpha + 2a_{22} \cos \alpha \sin \alpha + a_{22} \sin^2 \alpha, \\ a'_{12} &= -a_{11} \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha - a_{12} \sin^2 \alpha + \\ &\quad + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha, \\ a'_{22} &= a_{11} \sin^2 \alpha - 2a_{12} \sin \alpha \cos \alpha + a_{22} \cos^2 \alpha, \\ a'_{10} &= a_{11} \cos \alpha + a_{20} \sin \alpha, \\ a'_{20} &= -a_{10} \sin \alpha + a_{20} \cos \alpha, \\ a'_0 &= a_{00}. \end{aligned} \quad (17)$$

(17) белгилашлардан кўринадики, (16) тенгламадаги a'_{11} , a'_{12} , a'_{22} коэффициентлар (14) тенгламадаги a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентларга ва α бурчакка боғлиқ, шунинг билан бирга a'_{11} , a'_{12} , a'_{22} нинг камида бири нолдан фарқли, акс ҳолда биринчи тартибли тенгламага эга бўламиз.

α бурчакнинг ихтиёрийлигидан фойдаланиб, уни шундай танлаб оламизки, натижада (16) тенгламадаги a'_{12} коэффициент нолга тенг бўлсин:

$$\begin{aligned} a'_{12} &= -a_{11} \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha - a_{12} \sin^2 \alpha + \\ &+ a_{22} \sin \alpha \cos \alpha = -(a_{11} \cos \alpha + a_{12} \sin \alpha) \sin \alpha + \\ &+ (a_{21} \cos \alpha + a_{22} \sin \alpha) \cos \alpha = 0 \end{aligned}$$

ёки

$$\frac{a_{11} \cos \alpha + a_{12} \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a_{21} \cos \alpha + a_{22} \sin \alpha}{\sin \alpha}. \quad (18)$$

Бу нисбатни бирор λ га тенглаб, уни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda) \cos \alpha + a_{12} \sin \alpha = 0, \\ a_{12} \cos \alpha + (a_{22} - \lambda) \sin \alpha = 0. \end{cases} \quad (19)$$

Бу система бир жинсли, шунинг учун унинг детерминанти нолга тенг, яъни

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Маълумки,

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \quad (20)$$

булгандагина система нолдан фарқли ечимга эга булади. (20) тенглама (14) чизикнинг *характеристик тенгламаси* дейилади. (20) тенгламанинг дискриминанти:

$$\begin{aligned} D &= (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = \\ &= (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 > 0. \end{aligned}$$

Демак, (20) тенгламанинг λ_1 ва λ_2 илдизлари турли ва ҳақиқийдир. (18) дан

$$\begin{cases} a_{11} \cos \alpha + a_{12} \sin \alpha = \lambda \cos \alpha, \\ a_{21} \cos \alpha + a_{22} \sin \alpha = \lambda \sin \alpha \end{cases} \quad (21)$$

тенгликларни ёза оламиз. Уларнинг ҳар бирини $\cos \alpha \neq 0$ га бўлиб (агар $\cos \alpha = 0$ бўлса, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ бўлиб, $a_{12} = -0$ булади) ушбуни ҳосил қиламиз:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\lambda - a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{21}}{\lambda - a_{22}}. \quad (22)$$

(22) муносабатга навбат билан (20) характеристик тенгламанинг λ_1 , λ_2 илдизларини қуямиз:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}}; \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\lambda_2 - a_{11}}{a_{12}}. \quad (23)$$

(23) формулалардан фойдаланиб $\alpha = \alpha_1$ бурчакни аниқлаб, R координаталар системасини шу α_1 бурчакка буриш билан янги R' координаталар системасига ўтиш мумкинки, бу системага нисбатан (14) тенглама соддалашиб қуйидаги кўринишга келади:

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a_{00} = 0. \quad (24)$$

Агар берилган (14) тенгламада $a_{10} = a_{20} = 0$ бўлса, у ҳолда $a'_1 = a'_{20} = 0$ бўлиб, (16) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a'_{00} = 0. \quad (25)$$

Шундай қилиб, координаталар системасини буриш ёрдамида (14) тенгламани (24) кўринишдаги тенгламага келтирдик. (24) кўринишдаги тенгламани янада соддалаштириш учун координаталар бошини кўчиришдан фойдаланамиз:

2) координаталар бошини кўчириш пўли билан иккинчи тартибли чизиқ тенгламасини соддалаштириш (бу ҳолда R' координаталар системасининг ўқлари йўналишини ўзгартирмасдан, координаталар бошини бошқа нуқтага кўчирамиз, яъни R'' координаталар системасига ўтамиз).

Иккинчи тартибли чизиқнинг тенгламаси (24) кўринишда бўлсин. (20) характеристик тенгламанинг илдизлари λ_1 ва λ_2 эса бир вақтда нолга тенг бўлмасин. Қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

$$a) \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0 \Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0.$$

Бу ҳолда (24) тенгламада қуйидагича шакл алмаштириш бажарамиз:

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{a'_{10}}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right) + a'_{00} = 0,$$

бу ерда $a''_{00} = a'_{00} - \frac{a'^2_{10}}{\lambda_1} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2}$ деб белгилаймиз. Тубандаги шакл алмаштиришни бажарамиз:

$$x' = X + \left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1} \right); \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right).$$

У ҳолда R'' координаталар системасида эгри чизиқ қуйидаги тенгламага эга бўлади:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + a''_{00} = 0, \quad (26)$$

бу ерда $O' \left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1}; -\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$; агар $a''_{00} \neq 0$ бўлса, (26) ни каноник кўринишда ёзиш мумкин:

$$\frac{X^2}{-\frac{a''_{00}}{\lambda_1}} + \frac{Y^2}{-\frac{a''_{00}}{\lambda_2}} = 1, \quad (*)$$

агар $a''_{00} = 0$ бўлса, унинг каноник кўриниши тубандагича бўлади:

$$\frac{X^2}{\frac{1}{\lambda_1}} + \frac{Y^2}{\frac{1}{\lambda_2}} = 0. \quad (**)$$

Шундай қилиб, R координаталар системасида (14) тенглама билан берилган иккинчи тартибли чизиқнинг характеристик тенгламаси илдизлари λ_1 ва λ_2 нолга тенг бўлмаса, у ҳолда чизиқ қуйидаги чизиқлардан бирортасини ифодалайди. Юқоридаги (*), (**) формулаларга кўра чизиқларнинг каноник тенгламасини тубандаги жадвалда ифодалаймиз:

№№	λ_1	λ_2	a'_{00}	Каноник тенгламаси	Чизиқнинг номи
1	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix}$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Эллипс
2	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$	Мавҳум эллипс
3	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	0	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	Нуқта (кесишувчи мавҳум тўғри чизиқлар жуфти)
4	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix}$	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	Гипербола
5	$\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - \\ + \end{smallmatrix}$	0	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	Кесишувчи тўғри чизиқлар жуфти

б) $\lambda_1 = 0, (\lambda_2 \neq 0); a'_{10} = 0$.

Бу ҳолда (24) тенгламани қуйидагича ёзиш мумкин.

$$\lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + 2a'_{10} \cdot \left(x' - \frac{a'_{20} \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}} \right) = 0.$$

Қуйидаги координата алмаштириш формуласи

$$x' = X + \frac{a'_{20} \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}}; \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

ни қўлласак, (24) тенгламадан чизиқнинг R'' даги каноник тенгламаси келиб чиқади:

Шундай қилиб, координаталар системасини буриш ёрдамида (14) тенгламани (24) кўринишдаги тенгламага келтирдик. (24) кўринишдаги тенгламани янада соддалаштириш учун координаталар бошини кўчиришдан фойдаланамиз:

2) координаталар бошини кўчириш йўли билан иккинчи тартибли чизиқ тенгламасини соддалаштириш (бу ҳолда R' координаталар системасининг ўқлари йўналишини ўзгартирмасдан, координаталар бошини бошқа нуқтага кўчирамиз, яъни R'' координаталар системасига ўтамиз).

Иккинчи тартибли чизиқнинг тенгламаси (24) кўринишда бўлсин. (20) характеристик тенгламанинг илдизлари λ_1 ва λ_2 эса бир вақтда нолга тенг бўлмасин. Қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

$$a) \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0 \Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0.$$

Бу ҳолда (24) тенгламада қуйидагича шакл алмаштириш бажарамиз:

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{a'_{10}}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + a''_{00} = 0,$$

бу ерда $a''_{00} = a'_{00} - \frac{a'^2_{10}}{\lambda_1} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2}$ деб белгилаймиз. Тубандаги шакл алмаштиришни бажарамиз:

$$x' = X + \left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1} \right); \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right).$$

У ҳолда R'' координаталар системасида эгри чизиқ қуйидаги тенгламага эга бўлади:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + a''_{00} = 0, \quad (26)$$

бу ерда $0' \left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1}; -\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$; агар $a''_{00} \neq 0$ бўлса. (26) ни каноник кўринишда ёзиш мумкин:

$$\frac{X^2}{-\frac{a''_{00}}{\lambda_1}} + \frac{Y^2}{-\frac{a''_{00}}{\lambda_2}} = 1, \quad (*)$$

агар $a''_{00} = 0$ бўлса, унинг каноник кўриниши тубандагича бўлади:

$$\frac{X^2}{\frac{1}{\lambda_1}} + \frac{Y^2}{\frac{1}{\lambda_2}} = 0. \quad (**)$$

Шундай қилиб, R координаталар системасида (14) тенглама билан берилган иккинчи тартибли чизиқнинг характеристик тенгламаси илдиэлари λ_1 ва λ_2 нолга тенг бўлмаса, у ҳолда чизиқ қуйидаги чизиқлардан бирортасини ифодалайди. Юқоридаги (*), (**) формулаларга кўра чизиқларнинг каноник тенгламасини тубандаги жадвалда ифодалаймиз:

№№	λ_1	λ_2	a'_{00}	Каноник тенгламаси	Чизиқнинг номи
1	+	+	-	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Эллипс
2	+	+	+	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$	Мавҳум эллипс
3	+	+	0	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	Нуқта (кесишувчи мавҳум тўғри чизиқлар жуфти)
4	+	-	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	Гипербола
5	+	-	0	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	Кесишувчи тўғри чизиқлар жуфти

б) $\lambda_1 = 0$, ($\lambda_2 \neq 0$); $a'_{10} = 0$.

Бу ҳолда (24) тенгламани қуйидагича ёзиш мумкин.

$$\lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + 2a'_{10} \cdot \left(x' - \frac{a'_{20} \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}} \right) = 0.$$

Қуйидаги координата алмаштириш формуласи

$$x' = X + \frac{a'_{20} \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}}; \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

ни қўлласак, (24) тенгламадан чизиқнинг R' даги каноник тенгламаси келиб чиқади:

$$\lambda^2 Y^2 + 2a'_{10} X = 0; \quad Y^2 = -2 \frac{a'_{10}}{\lambda_2} X. \quad (27)$$

Агар $\lambda_2 = 0$; $a'_{20} \neq 0$ бўлса, у ҳолда (24) нинг кўринишн тубандагича бўлади: $X^2 = -2 \frac{a'_{20}}{\lambda_1} Y$. Шундай қилиб, агар $\lambda_1 = 0$ бўлиб, $a'_{10} \neq 0$ бўлса ёки $\lambda_2 = 0$ бўлиб, $a'_{20} \neq 0$ бўлса, у ҳолда (14) тенглама параболани ифодалар экан.

в) $\lambda_1 = 0$, $a'_{10} = 0$. Бу ҳолда

$$(24) \Rightarrow \lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + a'_{00} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2} = 0.$$

$a'_{00} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2}$ ни a''_{00} билан белгиласак ва қуйидагича координата алмаштириш формуласи

$$x' = X; \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

ни қўлласак, (24) тенглама R'' координаталар система-сида қуйидаги кўринишни олади:

$$Y^2 + \frac{a''_{00}}{\lambda_2} = 0. \quad (28)$$

Бунда, агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} < 0$ бўлса ва уни $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = -a^2$ деб белгиласак, (28) ни қуйидагича ёзамиз:

$$Y^2 - a^2 = 0 \Rightarrow Y - a = 0; \quad Y + a = 0. \quad (29)$$

Демак, чизик ҳар хил параллел тўғри чизиклар жуфтига ажралади, агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} > 0$ бўлса, яъни $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = a^2$ бўлса, у ҳолда

$$Y^2 + a^2 = 0 \Rightarrow Y + ai = 0; \quad Y - ai = 0 \quad (30)$$

бўлади. Бу ҳолда чизик мавҳум параллел тўғри чизиклар жуфтига ажралади. Агар $a''_{00} = 0$ бўлса,

$$(28) \Rightarrow Y^2 = 0 \Rightarrow Y = 0; \quad Y = 0 \quad (31)$$

бўлади. Бу ҳолда чизик устма-уст тушувчи тўғри чизиклар жуфтини ифодалайди. Шундай қилиб, (14)

тенглама қуйидаги 9 та чизиқдан биттасини ифода-
лайди:

1) эллипс; 2) гиперболла; 3) парабола; 4) кесишувчи
тўғри чизиқлар жуфти; 5) ҳар хил параллел тўғри чи-
зиқлар жуфти; 6) устма-уст тушувчи тўғри чизиқлар
жуфти; 7) мавҳум эллипс; 8) мавҳум кесишувчи тўғри
чизиқлар жуфти; 9) мавҳум параллел тўғри чизиқлар
жуфти.

8-§. Иккинчи тартибли чизиқни умумий тенгламасига кўра яшаш

Фараз қилайлик, R тўғри бурчакли координата сис-
темасида иккинчи тартибли чизиқ умумий тенгламаси

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (32)$$

билан берилган бўлсин. Олдинги темадаги умумий
тенгламани каноник кўринишга келтиришга асосан чи-
зиқнинг нуқталарини яшаш мумкин. Бунинг учун ту-
бандагиларни бажарамиз:

1) $\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ характеристик
тенгламани ёзиб, тенгламанинг илдизларини топамиз;

2) текисликни O нуқта атрофида α бурчакка бур-
ганда R координаталар системасидан R' координаталар
системаси ҳосил бўлади. Буриш бурчагининг каттали-
гини топамиз:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} \Rightarrow \left(\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}; \right. \\ &\quad \left. \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad a'_{10} &= a_{10} \cos \alpha + a_{20} \sin \alpha, \\ a'_{20} &= -a_{10} \sin \alpha + a_{20} \cos \alpha \end{aligned}$$

Формулалар бўйича a'_{10} , a'_{20} коэффициентларни ҳисоб-
лашимиз ва R' координаталар системасидаги чизиқнинг

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a_{00} = 0 \quad (33)$$

тенгламасини тузамиз;

4) (33) тенгламадан координаталар бошини O' нуқ-
тага кўчириш ёрдамида эгри чизиқнинг R'' коорди-
наталар системасидаги каноник тенгламасини ҳосил қи-
ламиз.

$$\lambda^2 Y^2 + 2a'_{10}X = 0; \quad Y^2 = -2 \frac{a'_{10}}{\lambda_2} X. \quad (27)$$

Агар $\lambda_2 = 0$; $a'_{20} \neq 0$ бўлса, у ҳолда (24) нинг кўриниши тубандагича бўлади: $X^2 = -2 \frac{a'_{20}}{\lambda_1} Y$. Шундай қилиб, агар $\lambda_1 = 0$ бўлиб, $a'_{10} \neq 0$ бўлса ёки $\lambda_2 = 0$ бўлиб, $a'_{20} \neq 0$ бўлса, у ҳолда (14) тенглама параболани ифодалар экан.

в) $\lambda_1 = 0$, $a'_{10} = 0$. Бу ҳолда

$$(24) \Rightarrow \lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + a'_{00} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2} = 0.$$

$a'_{00} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2}$ ни a''_{00} билан белгиласак ва қуйидагича координата алмаштириш формуласи

$$x' = X; \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

ни қўлласак, (24) тенглама R'' координаталар системасида қуйидаги кўринишни олади:

$$Y^2 + \frac{a''_{00}}{\lambda_2} = 0. \quad (28)$$

Бунда, агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} < 0$ бўлса ва уни $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = -a^2$ деб белгиласак, (28) ни қуйидагича ёзамиз:

$$Y^2 - a^2 = 0 \Rightarrow Y - a = 0; \quad Y + a = 0. \quad (29)$$

Демак, чизик ҳар хил параллел тўғри чизиклар жуфтига ажралади, агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} > 0$ бўлса, яъни $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = a^2$ бўлса, у ҳолда

$$Y^2 + a^2 = 0 \Rightarrow Y + ai = 0; \quad Y - ai = 0 \quad (30)$$

бўлади. Бу ҳолда чизик мавҳум параллел тўғри чизиклар жуфтига ажралади. Агар $a''_{00} = 0$ бўлса,

$$(28) \Rightarrow Y^2 = 0 \Rightarrow Y = 0; \quad Y = 0 \quad (31)$$

бўлади. Бу ҳолда чизик устма-уст тушувчи тўғри чизиклар жуфтининг ифодалиди. Шундай қилиб, (14)

тенглама қуйидаги 9 та чизиқдан биттасини ифода-
лайди:

1) эллипс; 2) гипербола; 3) парабола; 4) кесишувчи
тўғри чизиқлар жуфти; 5) ҳар хил параллел тўғри чи-
зиқлар жуфти; 6) устма-уст тушувчи тўғри чизиқлар
жуфти; 7) мавҳум эллипс; 8) мавҳум кесишувчи тўғри
чизиқлар жуфти; 9) мавҳум параллел тўғри чизиқлар
жуфти.

8-§. Иккинчи тартибли чизиқни умумий тенгламасига кўра яшаш

Фараз қилайлик, R тўғри бурчакли координата сис-
темасида иккинчи тартибли чизиқ умумий тенгламаси
 $F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$ (32)

билан берилган бўлсин. Олдинги темадаги умумий
тенгламани каноник кўринишга келтиришга асосан чи-
зиқнинг нуқталарини яшаш мумкин. Бунинг учун ту-
бандагиларни бажарамиз:

1) $\lambda^3 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ характеристик
тенгламани ёзиб, тенгламанинг илдизларини топамиз;

2) текисликни O нуқта агрофида α бурчакка бур-
ганда R координаталар системасидан R' координаталар
системаси ҳосил бўлади. Буриш бурчагининг каттали-
гини топамиз:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} \Rightarrow \left(\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}; \right. \\ &\quad \left. \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad a'_{10} &= a_{10} \cos \alpha + a_{20} \sin \alpha, \\ a'_{20} &= -a_{10} \sin \alpha + a_{20} \cos \alpha \end{aligned}$$

формулалар бўйича a'_{10} , a'_{20} коэффициентларни ҳисоб-
лаймиз ва R' координаталар системасидаги чизиқнинг

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a_{00} = 0 \quad (33)$$

тенгламасини тузамиз;

4) (33) тенгламадан координаталар бошини O' нуқ-
тага кўчириш ёрдамида эгри чизиқнинг R'' координата-
лар системасидаги каноник тенгламасини ҳосил қи-
ламиз.

5) Аввал R' координаталар системаси, кейин R'' координаталар системаси чизилади ва чизик каноник тенгламасига кўра ясалади.

1-мисол. Ушбу $x^2 - 8xy + 7y^2 + 5x - 6y + 7 = 0$ чизик тенгламасини соддалаштиринг.

Ечиш. 1) характеристик тенгламани тузиб, унинг илдизларини аниқлаймиз:

$$\lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0; \quad \lambda_1 = 9; \quad \lambda_2 = -1;$$

2) координаталар системасини буриш керак бўлган бурчакнинг қийматини топамиз:

$$\operatorname{tg} \alpha = -2; \quad \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}; \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Бу ердаги α ни жадвалдан топилади. Координата ўқларидаги векторлар қуйидагича бўлади:

$$\vec{i}' = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} - \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}; \quad \vec{j}' = \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{j};$$

3) коэффициентларни аниқлаймиз (3-банддаги формулага кўра)

$$a'_{10} = \frac{17}{\sqrt{5}}; \quad a'_{20} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Булардан фойдаланиб, янги координаталар системасига нисбатан қуйидаги тенгламани тузамиз:

$$9x'^2 - y'^2 + 2 \cdot \frac{17}{\sqrt{5}} x' + 2 \cdot \frac{4}{\sqrt{5}} y' + 7 = 0;$$

4) координаталар бошини O' нуқтага кўчириш йўли билан тенглама шаклини ўзгартирамиз:

$$9\left(x' + \frac{17}{9\sqrt{5}}\right)^2 - \left(y' - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 + \frac{34}{9} = 0.$$


Натижада тубандаги тенгламага эга бўламиз:

$$-\frac{x'^2}{\frac{34}{81}} + \frac{y'^2}{\frac{34}{9}} = 1; \quad O'\left(-\frac{17}{9\sqrt{5}}; \frac{4}{\sqrt{5}}\right).$$


Демак, чизик гиперболадан иборат экан (56-чизма).

2-мисол. $x^2 - 2xy + y^2 - 3x - 4y + 2 = 0$ эгри чизик тенгламасини соддалаштиринг.

Ечиш. 1) характеристик тенглама тузиб, унинг илдизларини аниқлаймиз:



56-чизма.



57-чизма.

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0; \quad \lambda_1 = 0; \quad \lambda_2 = 2.$$

2) координата ўқларини буриш керак бўлган бурчакнинг қийматини топамиз:

$$\operatorname{tg} \alpha = 1; \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$\vec{i}' = \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j}; \quad \vec{j}' = -\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{j};$$

3) коэффициентларни аниқлаймиз:

$$a'_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad a'_{20} = -\frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$2y'^2 + \frac{2}{\sqrt{2}} x' - \frac{2}{\sqrt{2}} y' + 2 = 0$$

ёки


$$y'^2 + \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' + 1 = 0;$$

4) координаталар бошини O' нуқтага кучириш йўли билан тенгламани соддалаштирамиз:

$$\left(y' - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x' + \frac{7}{4\sqrt{2}}\right) = 0,$$

бундан $Y^2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} X$; $O'\left(-\frac{7}{4\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$ тенгламага эга бўламиз.

Демак, чизик параболадан иборат экан (57-чизма)



58-чизма.

3-мисол. $x^2 - 6xy + 9y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$ чизик тенгламасини соддалаштиринг.

Ечиш. Берилган тенгламани тубандагича ёзиш мумкин:

$$(x - 3y)^2 - 2(x - 3y) + 1 = 0$$

$$x - 3y = 1 \text{ ёки}$$

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}.$$

Бундан кўринадикки, берилган эгри чизик устма-уст тушувчи тўғри чизиклар жуфтига ажралади (58-чизма).

9-§. Иккинчи тартибли чизикларнинг татбиқи

Осмон жисмларининг ҳаракат траекториялари иккинчи тартибли чизиклар ёрдамида ўрганилади, чунки планеталар Қуёш атрофида эллиптик орбиталар бўйлаб, қуёш системасидаги кометалар эса ёки эллипс, ёки гиперболо, ёки парабола бўйлаб ҳаракатланадилар.

Шунингдек, техникада кривошип-шатун механизмда, шатуннинг уртасида ётувчи нуқта траекториясини текширсак, эллипс бўйича ҳаракатланади, автомобиль фарасининг кесими парабола шаклида ишланади. Умуман айтганда, иккинчи тартибли чизиклар назарияси амалиёт ва техникада кенг қўлланилади. Мисоллар кўрайлик.


1-мисол. Ер Қуёш атрофида эллипс бўйича айланади. Қуёш эса бу эллипснинг фокусларида бирида туради. Ер орбитасининг катта ўқи $2a = 300\,000\,000$ км.

Орбитанинг эксцентриситети $e = \frac{1}{60}$ га тенг. Ер орби-


тасининг маркази Қуёшдан қанча масофада ётади? Қуёшдан Ергача энг қисқа масофа (декабрда) энг катта масофадан (июнда) қанча кичик?

Ечиш. Масала шартига кўра $2a = 300\,000\,000$ км, бундан $a = 150\,000\,000$ км.

1) Ер орбитасининг маркази Қуёшдан қанча масофада ётишини аниқлаш учун марказдан фокусгача масофасини топсак етарли, чунки Қуёш унинг фокусларида бирида жойлашган, аниқлик учун F_1 да жой-



59-чизма.



60-чизма.

лашган бўлсин (59-чизма). Эксцентриситет таърифига асосан:

$$e = \frac{c}{a}, \text{ бу ердан } c = a \cdot e.$$

$$c = 150\,000\,000 \cdot \frac{1}{60} = 2\,500\,000.$$

Ер орбитасининг маркази Қуёшдан $2\,500\,000$ км масофада экан.

2) Қуёшдан Ергача энг қисқа масофани, яъни F_1A_1 ни топамиз:

$$F_1A_1 = a - c = 150\,000\,000 - 2\,500\,000 = 147\,500\,000 \text{ км.}$$

Энг катта масофани, яъни A_2F_1 ни топамиз.

$$A_2F_1 = a + c = 150\,000\,000 + 2\,500\,000 = 152\,500\,000 \text{ км.}$$

Қуёшдан ергача энг қисқа масофа энг катта масофадан қанча кичик эканини топамиз. Агар бу масофани r десак, қуйидагига эга бўламиз:

$$r = A_2F_1 - F_1A_1 = 152\,500\,000 - 147\,500\,000 = 5\,000\,000 \text{ км.}$$

2-мисол. Автомобиль фонарининг кесими парабола формасида бўлиб, унинг диаметри 20 см, чуқурлиги 10 см. Парабола фокусиинг координаталарини топинг.

Ечиш. F фокусдан параболанинг учигача бўлган масофани топиш учун парабола тенгламасини тузамиз. Координаталар системасини шундай танлаб оламизки, фонарнинг симметрия ўқи Ox ўқи билан, учи эса координаталар боши билан устма-уст тушсин (60-чизма).

Бу ҳолда парабола тенгламасини $y^2 = 2px$ (*) кўри-
нишда излаймиз. Танлаб олинган координаталар систе-
масида параболага тегишли нуқтанинг координаталари
(10; 10) бўлади. Бу нуқтанинг координаталарини (*)
тенгламага қўйсак:

$$10^2 = 2p \cdot 10$$

бўлиб, бундан $p = 5$ га эга бўламиз. Демак, парабола-
нинг фокуси $F\left(\frac{5}{2}; 0\right)$ нуқтада бўлади.

М а ш қ л а р

1. Маркази $C(-1; 4)$ нуқтада бўлиб, $A(3; 5)$ нуқ-
тадан ўтувчи айлана тенгламасини тузинг.

2. Айлана $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 16$ тенглама билан
берилган. $A(3; 1)$; $B(2; 3)$; $C(3; -9)$; $D(0; 3)$ нуқталар
берилган айланага тегишлими?

3. Айлананинг тенгламаси $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0$
бўлса, унинг маркази координаталарини ва радиуси
узунлигини топинг.

4. Иккита айлана $x^2 + y^2 = 16$ ва $x^2 + y^2 - 12x + 11 = 0$
тенгламалар билан берилган. Шу айланалар марказлари
орасидаги масофани топинг.

5. Эллипснинг фокуслари орасидаги масофа 6 см,
унинг кичик ўқи 8 см га тенг. Эллипснинг каноник
тенгламасини тузинг ва эксцентриситетини топинг.

6. Эксцентриситети $e = \frac{4}{5}$ бўлган ва $A(5\sqrt{3}; 3)$ нуқ-
тадан ўтувчи эллипснинг тенгламасини тузинг.

7. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ эллипсда фокал радиусларининг айир-
маси 8 га тенг бўлган нуқтани топинг.

8. M нуқта $F(2; 0)$ нуқтага $x = 9$ тўғри чизиққа
қараганда 3 марта яқин туриб ҳаракат қилади. M нуқ-
танинг ҳаракат траекториясини топинг.

9. $5x^2 - 4y^2 = 20$ гиперболанинг ярим ўқларини, экс-
центриситетини ва фокусларининг координаталарини
топинг. $M(-4; \sqrt{15})$ нуқтадаги фокал радиусларининг
узунликларини топинг.

10. Асимптотаси $y = \pm \frac{1}{2}x$ тўғри чизиқдан иборат
ва $(3; 1)$ нуқтадан ўтувчи гиперболанинг тенгламасини
тузинг.

11. Гиперболанинг директрисалари орасидаги масофа

8 га, фокуслари орасидаги масофа 12 га тенг. Гипербола-нинг тенгламасини тузинг.

12. $y^2 - 12x$ парабола фокусининг координаталарини топинг ва директрисасининг тенгламасини тузинг.

13. Директрисасининг тенгламаси $x = -3$ ва фокуси $F(1; 0)$ бўлган парабола-нинг тенгламасини тузинг.

14. Учи $(5; 4)$ нуқтада, ўқи Ox ўқига параллел ва $(4; 2)$ нуқтадан ўтувчи парабола-нинг тенгламасини тузинг ва графигини ясанг.

15. Координаталар бошини параллел кўчириш ёрдамида қуйидаги эгри чизиқ тенгламаларини соддалаштиринг:

а) $\frac{(x-5)^2}{9} + (y-3)^2 = 1;$

б) $(x+2)^2 = 16 + 4(y-4)^2;$

в) $(x-3)^2 = 7(y+4).$

16. $x(x-6) + 4y(y-3) - 3 = 0$ эгри чизиқ тенгламасини каноник кўринишга келтиринг ва қандай чизиқ тенгламаси эканини аниқланг.

17. $xy - 2$ гипербола тенгламасини каноник кўринишга келтирилсин.

18. $x^2 - 9y^2 + 2x + 36y - 44 = 0$ тенглама қандай эгри чизиқни тасвирлашини аниқланг ва уни соддалаштиринг.

19. Қуйидаги эгри чизиқ тенгламаларини каноник кўринишга келтиринг:

а) $14y^2 + 24xy + 21x^2 - 4y + 18x - 139 = 0;$

б) $25x^2 + 10xy + y^2 = 1;$

в) $9x^2 + 16y^2 = 20x - 110y + 24xy + 50.$

VIII б о б

ФАЗОДА ТЕКИСЛИКЛАР ВА ТЎҒРИ ЧИЗИҚЛАР

1-§. Текисликнинг берилиш усуллари

1. Ҳар қандай текислик фазода ўзининг бирор $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтасининг ва нормалининг берилиши билан тўла аниқланади. Текисликка перпендикуляр бўлган $n \neq 0$ вектор текисликнинг *нормали* дейилади. Те-

кислик тенгламасини келтириб чиқариш учун декарт координаталар системасини танлаймиз. A, B, C лар n нормалнинг шу системадаги координаталари, x_0, y_0, z_0 лар эса Π текислик M_0 нуқтасининг шу системадаги координаталари бўлсин. $M(x; y; z)$ — фазонинг ихтиёрий нуқтаси бўлсин. У ҳолда M нуқта Π текисликка тегишли бўлиши учун $\vec{M_0M}$ вектор n векторга перпендикуляр бўлиши, яъни $\vec{M_0M} \cdot n = 0$ (уларнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг) бўлиши зарур ва етарли. $\vec{M_0M}$ вектор $\{x - x_0; y - y_0; z - z_0\}$ координаталарга эга бўлгани учун:

$$\vec{M_0M} \cdot n = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$


Демак, Π текислик ихтиёрий M нуқтасининг координаталари

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (1)$$

тенгламани қаноатлантиради.

$n \neq 0$ бўлгани учун $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Энди аксинча (1) тенгламанинг ҳар қандай x_1, y_1, z_1 ечими Π текислигининг бирор нуқтасини аниқлашини исботлаймиз. Ҳақиқатан ҳам, M_1 нуқта x_1, y_1, z_1 координаталарга эга бўлсин, у ҳолда $\vec{M_0M_1}$ вектор $\{x_1 - x_0; y_1 - y_0; z_1 - z_0\}$ координаталарга эга бўлади ва (1) муносабат уриини бўлгани учун $\vec{M_0M_1}$ вектор n векторга перпендикуляр бўлади.

2. Текислик π зининг бирор $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтасининг ва текисликка параллел бўлган иккита ноколлинеар $p = \{\alpha_1, \beta_1, \gamma_1\}$, $q = \{\alpha_2, \beta_2, \gamma_2\}$ векторларнинг берилиши билан аниқланади. Текисликда ихтиёрий $M(x, y, z)$ нуқтани олсак, $\vec{M_0M}$ вектор p, q векторлар билан компланар бўлади, демак, бу векторлар чизиқли



61-чизма.

боғлиқ бўлиб, бундан уларнинг координаталаридан тузилган учинчи тартибли детерминантнинг нолга тенг бўлиши келиб чиқади (61-чизма). Қуйидагига эгамиз:

$$\vec{M_0M} = \{x - x_0; y - y_0; z - z_0\},$$

$$\vec{p} = \{\alpha_1, \beta_1, \gamma_1\},$$

$$\vec{q} = \{\alpha_2, \beta_2, \gamma_2\}.$$

У ҳолда юқориди айтилганига кура қуйидаги тенглама ҳосил бўлади:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (2)$$

Аксинча, бу шарт бажарилса, M нуқта Π текисликка ётишли бўлади. Демак, (2) Π текисликнинг тенгламасидир. Бу тенглама берилган нуқтадан ўтиб, берилган ноколлинеар икки векторга параллел бўлган текисликнинг тенгламаси деб аталади.

Текисликнинг параметрик тенгламаларини ҳосил қилиш учун $\vec{M_0M}$, $\vec{p}$, $\vec{q}$ векторларнинг бир текисликда ётишига эътибор берамиз, демак, улар чизиқли боғлиқдир, яъни

$$\vec{M_0M} = t\vec{p} + n\vec{q}, \quad t, n \in R, \quad (3)$$

бу ерда t , n сонлар параметрлардир, (3) дан:

$$x = x_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 n,$$

$$y = y_0 + \beta_1 t + \beta_2 n,$$

$$z = z_0 + \gamma_1 t + \gamma_2 n. \quad (4)$$

(4)— текисликнинг параметрик тенгламалари дейилади.

3. Уч нуқтадан ўтувчи текислик тенгламасини келтириб чиқарамиз. Бир текисликда ётмаган учта нуқта текисликнинг вазиятини тула аниқлайди. Айтайлик, учта $M_1(x_1, y_1, z_1)$; $M_2(x_2, y_2, z_2)$; $M_3(x_3, y_3, z_3)$ нуқта берилган бўлсин.

Агар $M_0 = M_1$, $\vec{p} = \vec{M_1M_2}$, $\vec{q} = \vec{M_1M_3}$ деб олиб, $\vec{M_1M_2} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\}$, $\vec{M_1M_3} = \{x_3 - x_1; y_3 - y_1; z_3 - z_1\}$ бўлишини ҳисобга олсак, (2) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Бу уч нуқтадан ўтувчи текислик тенгламасидан иборатдир.

4. Текислик ўзининг координата ўқларидан кесган кесмалари a, b, c ларнинг берилиши билан аниқланиши ҳам мумкин. Айтайлик, текислик координаталар бошидан ўтмасин ҳамда Ox, Oy, Oz ўқларини мос равишда $M_1(a, 0, 0); M_2(0, b, 0); M_3(0, 0, c)$ нуқталарда кессин. У ҳолда (5) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{vmatrix} x-a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0,$$

бу ердан қуйидаги тенгламани ҳосил қиламиз:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (6)$$

(6) — текисликнинг координата ўқларидан ажратган кесмалари бўйича тенгламаси дейилади.

Текисликнинг юқорида кўриб чиқилган тенгламалари биринчи даражали бўлиб,

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (7)$$

кўринишга эга бўлади. Шунинг учун (7) кўринишдаги тенглама текисликнинг умумий тенгламаси дейилади. Бунда A, B, C лар бир вақтда нолга тенг эмас. Текисликнинг умумий тенгламасига кўра унинг координата ўқларига нисбатан жойлашуви тўғрисида фикр юритиш мумкин:

а) агар $D = 0$ бўлса, (7) текислик координаталар бошидан ўтади (62-а чизма).




б) агар $A = 0$ бўлса, (7) текислик Ox ўқига параллел, (62-б чизма). $B = 0$ бўлса, Oy ўқига параллел, $C = 0$ бўлса, Oz ўқига параллел бўлади. Худди шундай, қуйидаги ҳолларни кўриш мумкин:

$$A = 0 \Leftrightarrow P \parallel (Ox), \quad A = D = 0 \Leftrightarrow P \supset (Ox);$$

$$B = 0 \Leftrightarrow P \parallel (Oy), \quad B = D = 0 \Leftrightarrow P \supset (Oy);$$

$$C = 0 \Leftrightarrow P \parallel (Oz), \quad C = D = 0 \Leftrightarrow P \supset (Oz) \quad (62-в чизма).$$

в) агар $A = B = 0, C \neq 0$ бўлса, $P \parallel (xOy)$. Хусусий ҳолда $D = 0$ бўлса, $z = 0$, яъни xOy текислик тенгламасига эга бўламиз. Шунга ўхшаш, $x = a$ тенглама yOz текисликка параллел P текисликини ифодалайди. $x = 0$ тенглама yOz текисликини ифодалайди. $y = b$ эса $P \parallel (xOz)$ текислики, $y = 0$ эса xOz текисликини ифодалайди.



62-а, б, в чизма.

1-мисол. $M(2; -3; 4)$ нуқта орқали ўтувчи ва $\vec{n} = \{1; -1; 4\}$ векторга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Маълумки, берилган $M_1(x_1, y_1, z_1)$ нуқтадан ўтиб, берилган $\vec{n} = \{A, B, C\}$ векторга перпендикуляр бўлган текисликнинг тенгламаси

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0$$

кўринишга эга. Масала шартидан:

$$x_1 = 2; \quad y_1 = -3; \quad z_1 = 4;$$

$$A = 1; \quad B = -1; \quad C = 4.$$

Буларни юқоридаги тенгламага қуйиб, изланган текислик тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$1(x - 2) - 1 \cdot (y + 3) + 4(z - 4) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x - 2 - y - 3 + 4z - 16 = 0 \Rightarrow x - y + 4z - 21 = 0.$$

2-мисол. Текислик $A(2; 2; 3)$ нуқтадан ўтиб, $\vec{p} = \{1; 1; 2\}$; $\vec{q} = \{2; 4; 3\}$ векторларга параллел бўлсин. Шу текисликнинг умумий тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилганларни (2) тенглама билан солиштириб, қуйидагиларни аниқлаймиз:

$$x_0 = 2; \quad y_0 = 2; \quad z_0 = 3,$$

$$\alpha_1 = 1; \quad \beta_1 = 2; \quad \gamma_1 = 1,$$

$$\alpha_2 = 2; \quad \beta_2 = 4; \quad \gamma_2 = 3.$$

Натижада бу ҳол учун (2) детерминант қуйидаги қўринишга бўлади:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

Учинчи тартибли детерминантни ҳисобласак, изланган текисликнинг умумий тенгламасига эга бўламиз:

$$x - y + z - 3 = 0.$$

3-мисол. $2x + 3y - 5z - 30 = 0$ текислик берилган. Бу текисликнинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталарининг координаталарини топинг.

Ечиш. Текисликнинг берилган тенгламасини унинг координата ўқларидан кесган кесмалари бўйича тенгламаси кўринишига келтирамиз:

$$\frac{2x}{30} + \frac{3y}{30} - \frac{5z}{30} = 1$$

ёки

$$\frac{x}{15} + \frac{y}{10} - \frac{z}{6} = 1.$$

Демак, текислик Ox ўқини $(15; 0; 0)$, Oy ўқини $(0; 10; 0)$, Oz ўқини $(0; 0; -6)$ нуқталарда кеседи.

2-§. Фазода иккита ва учта текисликнинг ўзаро жойлашуви

1. Айтайлик, декарт координаталар системасида иккита Π_1 ва Π_2 текислик ўзларининг тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (8)$$

$$\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (8^*)$$

Бу икки текисликнинг ўзаро жойлашувида қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

а) текисликлар тўғри чизиқ бўйича кесишади;

б) текисликлар ўзаро параллел (умумий нуқтага эга эмас);

в) текисликлар устма-уст тушади;

(63-а, б, в чизма). Бу ҳоллар қандай шартлар бажарилганда юз беришини билиш учун Π_1 , Π_2 ларни

ифодаловчи тенгламалар системасини текшириш керак. Бунинг учун қуйидаги матрицаларни тузамиз:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix},$$

$$A^* = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix}.$$

А матрицанинг рангини r билан, A^* матрицанинг рангини r^* билан белгилайлик. Юқоридаги ҳолларнинг юз беришини қараймиз.

а) агар текисликлар кесишса, система биргаликда бўлади, яъни Π_1 ва Π_2 текисликлар умумий нуқтага эга бўлиб, бир тўғри чизиқ бўйлаб кесишади, бунда $r = r^* = 2$ бўлади:

б) Π_1 ва Π_2 текисликлар параллел бўлса, $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$, $C_1 = \lambda C_2$ бажарилади ҳамда $r^* = 2$; $r = 1$ бўлади.

в) текисликлар устма-уст тушса, $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$, $C_1 = \lambda C_2$, $D_1 = \lambda D_2$ бўлиб, $r = r^* = 1$ бўлади.

2. Айтилик, декарт координаталар системасида учта текислик ўзининг тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (9)$$

$$\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad (10)$$

$$\Pi_3: A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0. \quad (11)$$


Бу учта текисликнинг фазода узаро жойлашувида 8 та ҳол рўй бериш мумкин (64-чизма):

1) учта текислик битта умумий нуқтага эга (64-а чизма);


2) текисликлар жуфт-жуфт кесишади, аммо умумий нуқтага эга эмас (64-б чизма);

3) Учта текислик битта тўғри чизиқ бўйича кесишади (64-в чизма);


4) иккита текислик узаро параллел бўлиб, учинчи текислик уларни кесади (64-г чизма);



а)




б)



в)

63-а, б, в чизма.



С4-а, б, в, г, д, е, ж, з чизма.

5) учта текислик ўзаро параллел жойлашган бўлади (64-д чизма);

6) иккита текислик устма-уст тушади ва учинчи текислик уларни кесади (64-е чизма);

7) иккита текислик устма-уст тушади ва учинчи текислик уларга параллел бўлади (64-ж чизма);

8) учала текислик ҳам устма-уст тушади (64-з чизма).

Бу ҳоллардан қайси бири юз беришини билиш учун Π_1, Π_2, Π_3 текисликларни ифодаловчи тенгламалар системасини текшириш керак (бу ҳам матрицалар ёрдамида текширилади).

Мисол. $2x + y = 5$; $x + 3z = 16$ ва $5y - z = 10$ текисликларнинг ўзаро жойлашишини аниқланг.

Ечиш. Бу текисликларнинг кесишиш-кесишмаслигини аниқлаш учун қуйидаги системанинг ечимини топамиз:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x + 3z = 16, \\ 5y - z = 10. \end{cases}$$

Системани ечиш учун қуйидаги детерминантларни тузамиз ва уларни ҳисоблаймиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -30 + 1 = -29;$$

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 16 & 0 & 3 \\ 10 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 16 & 3 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= -75 + 46 = -29; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 1 & 16 & 3 \\ 0 & 10 & -1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 16 & 3 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= -92 + 5 = -87; \end{aligned}$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 16 \\ 0 & 5 & 10 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 16 \\ 5 & 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 10 \end{vmatrix} = -160 + 15 = -145,$$


$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-29}{-29} = 1,$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-87}{-29} = 3,$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-145}{-29} = 5.$$

Демак, текисликлар (1; 3; 5) нуқтада кесишади.

3-§. Икки текислик орасидаги бурчак



65-чизма.

Фазода декарт координаталар системасида кесишувчи икки текислик узининг тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$P_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (12)$$

$$P_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (13)$$

Икки текислик кесишганда тўртта икки ёқли бурчак ҳосил бўлиб, улардан ўзаро вертикал бўлганларни тенг бўлади (65-чизма). Демак, иккита ҳар хил бурчак ҳосил бўлиб, буларнинг бири иккинчисини тўлдиради. Шунинг учун шу икки бурчакдан бирини топиш егарлидир. Бу иккита икки ёқли бурчакдан бирининг чизиқли бурчаги берилган текисликларнинг $n_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ ва $n_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ нормал векторлари орасидаги бурчакни φ десак,

$$\cos \varphi = \cos (\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \quad (14)$$

ёки

$$\cos \varphi = \cos (\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

(14) формуладан хусусий ҳолда иккита текисликнинг перпендикулярлик шarti келиб чиқади: P_1 ва P_2 текисликлар перпендикуляр бўлиши учун $\cos \varphi = 0$, яъни $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ ёки $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ бўлиши керак. Икки текисликнинг параллеллик шартлари эса қуйидагича ифодаланади:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad \text{ёки} \quad A_1 : B_1 : C_1 = A_2 : B_2 : C_2. \quad (15)$$

Мисол. Берилган $2x + 3y - z + 2 = 0$ ва $x + y + 5z - 1 = 0$ текисликлар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. Икки текислик орасидаги бурчак форму-
ласи

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

дан фойдаланамиз Берилишта кўра:

$$A_1 = 2, \quad B_1 = 3, \quad C_1 = -1$$

ва

$$A_2 = 1, \quad B_2 = 1, \quad C_2 = 5.$$

Буларни юқоридаги формулага қўямиз:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 1 \cdot 5}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 5^2}} = \\ &= \frac{2 + 3 - 5}{\sqrt{4 + 9 + 1} \sqrt{1 + 1 + 25}} = \frac{0}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{27}} = 0, \\ \cos \varphi &= 0: \quad \varphi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Демак, берилган икки текислик ўзаро перпендикуляр экан.

4-§. Нуқтадан текисликкача бўлган масофа


Фазода декарт координаталар системасида $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқта ва $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ текислик берилган бўлсин. M_0 нуқтадан текисликкача бўлган масофани ҳисоблаш талаб қилинсин. Бунинг учун берилган M_0 нуқтадан текисликка туширилган перпендикулярнинг асосини H билан белгилаймиз (66-чизма).

$\rho(H, \vec{M}_0) = \rho(M_0, \Pi)$ биз излаётган масофа бўлади. Текисликнинг нормал век-

тори $\vec{n} = \{A, B, C\}$ ни ўт-

казамиз. $\vec{HM}_0$ вектор $\vec{n}$ векторга коллинеар.

$\vec{HM}_0$ ва $\vec{n}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини то-
памиз:



66-чизма.

$$\vec{HM}_0 \cdot \vec{n} = |\vec{HM}_0| \cdot |\vec{n}| \cdot \cos(\vec{HM}_0, \vec{n}) = \rho(M_0, \Pi) |\vec{n}| \cdot (\pm 1).$$

Бундан

$$\rho(M_0, \Pi) = \frac{|\vec{HM}_0 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}. \quad (16)$$

(16) формулани координаталарда ифодалаймиз. Айтайлик, H нуқтанинг координаталари x_1, y_1, z_1 бўлсин. У ҳолда

$$\begin{aligned} \vec{HM}_0 \cdot \vec{n} &= A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1) = \\ &= Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1). \end{aligned}$$

H нуқта берилган текисликда ётгани учун $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$ бўлади, бундан эса $\vec{HM}_0 \cdot \vec{n} = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$.

$\vec{n} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ эканини эътиборга олсак,

$$\rho(M_0, \Pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (17)$$

формулага эга бўламиз. Бу формула берилган нуқтадан текисликкача бўлган масофани ҳисоблаш формуласидир.

Мисол. $M(3; -2; 1)$ нуқтадан $3x + 6y - 5z + 2 = 0$ текисликкача бўлган масофани топинг.

Ечиш. Берилишига кўра:

$$\begin{aligned} x_0 &= 3; \quad y_0 = -2; \quad z_0 = 1; \\ A &= 3; \quad B = 6; \quad C = -5; \quad D = 2, \end{aligned}$$

Буларни (17) формулага қўямиз, у ҳолда

$$\rho(M, \Pi) = \frac{|3 \cdot 3 + 6 \cdot (-2) + (-5) \cdot 1 + 2|}{\sqrt{3^2 + 6^2 + (-5)^2}} = \frac{6}{\sqrt{70}};$$

$$d = \frac{6}{\sqrt{70}} \text{ бирлик.}$$

5-§. Тўғри чизиқнинг берилиш усуллари

Тўғри чизиққа параллел бўлган ҳар қандай вектор шу тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори дейилади.

1. Тўғри чизиқ ўзининг бирор $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтаси ва шу тўғри чизиқнинг йўналтирувчи

вектори $\vec{l} = \{l_1; l_2; l_3\}$ нинг берилиши билан аниқланади (67-чизма). Тўғри чизиқнинг ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуқтасини

олаёлик: M_0M ва $\vec{l}$ векторлар коллинеар бўлгани учун:

$$\vec{M_0M} = t \cdot \vec{l} \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (18)$$

$\vec{OM}_0 = \vec{r}_0$, $\vec{OM} = \vec{r}$ десак ҳамда $\vec{M_0M} = \vec{OM} - \vec{OM}_0$ ни ҳисобга олсак, (18) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{l}. \quad (19)$$

(19) тенглама тўғри чизиқнинг векторли тенгласи деб ағалади. $\vec{M_0M} = \{x - x_0; y - y_0; z - z_0\}$ ва (10) дан қуйидагини ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + l_1 t, \\ y &= y_0 + l_2 t, \\ z &= z_0 + l_3 t. \end{aligned} \quad (2)$$

(20) кўринишдаги тенгламалар системаси тўғри чизиқнинг параметрик тенгламалари дейилади.

2. (20) тенгламадан параметр t ни чиқариб,


$$\frac{x - x_0}{l_1} = \frac{y - y_0}{l_2} = \frac{z - z_0}{l_3} \quad (21)$$

кўринишдаги тенгламага эга бўламиз. Бу тўғри чизиқнинг каноник тенгламалари дейилади.


3. Иккита $M_1(x_1; y_1; z_1)$ ва $M_2(x_2; y_2; z_2)$ нуқта орқали ўтувчи тўғри чизиқнинг тенгламаси

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (22)$$

кўринишда ифодаланади (бу тенглама биринчи нуқтадаги M_0 нуқта ўрнига M ва $\vec{l} = \vec{M_0M_1}$ деб олинса, (18)



67-чизма.



65-чизма.

муносабатдан келиб чи-
қади). (22) ни қуйидаги-
ча ҳам ёзиш мумкин:

$$x = x_1 + (x_2 - x_1)t,$$

$$y = y_1 + (y_2 - y_1)t,$$

$$z = z_1 + (z_2 - z_1)t. \quad (23)$$

(23) тенгламалар систе-
маси параметрик қури-
нишдаги тенгламадир.

4. Тўғри чизиқ икки-
та Π_1 ва Π_2 текислик-
ларнинг кесишиш чизиғи

сифатида ҳам берилиши мумкин, яъни $d = \Pi_1 \cap \Pi_2$, бу
ерда

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (24)$$

Бу тенгламалар системаси $A_1: B_1: C_1 \neq A_2: B_2: C_2$ шарт
бажарилганда тўғри чизиқни аниқлайди (68-чизма).

1-мисол. (1; 4; 3) нуқтадан ўтган ва йўналтирув-
чи вектори $l = \{2; 3; 1\}$ бўлган тўғри чизиқ тенгламасини
тузинг.

Ечиш. (21) тенгламадан фойдаланамиз. Масала
шартига кўра:

$$x_0 = 1; y_0 = 4; z_0 = 3, l_1 = 2; l_2 = 3; l_3 = 1.$$

У ҳолда изланаётган тўғри чизиқ тенгламаси қуйида-
гича бўлади:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{1}.$$

2-мисол. $A(-3; 1; 2)$ ва $B(8; -2; 5)$ нуқталардан
ўтувчи тўғри чизиқ тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Берилган икки нуқтадан ўтувчи тўғри чи-
зиқ тенгламаси

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

қўринишда бўлиб, унга A, B нуқталарнинг координна-
таларини қўйсак,

$$\frac{x+3}{8+3} = \frac{y-1}{-2-1} = \frac{z-2}{5-2}$$

$$\frac{x+3}{11} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-2}{3}$$

туғри чизик тенгламаларига эга бўламиз.

6-§. Туғри чизик ва текисликнинг узаро жойлашуви. Туғри чизик ва текислик орасидаги бурчак

Айтайлик, l туғри чизик $R = \{0; \vec{l}; \vec{j}\}$ декарт координаталар системасига нисбатан ўзининг

$$\begin{aligned} x &= x_0 + l_1 t, \\ y &= y_0 + l_2 t, \\ z &= z_0 + l_3 t \end{aligned} \quad (25)$$

параметрик тенгламалари, Π текислик эса

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (26)$$

тенгламаси билан берилган бўлсин. Туғри чизик билан текисликнинг, узаро жойлашувини текшириш учун (25) даги x , y , z ларнинг қийматларини (26) га қўйиб, соддалаштирсак. тубандаги t га нисбатан тенглама ҳосил бўлади:

$$(Al_1 + Bl_2 + Cl_3)t + (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) = 0.$$

Бу тенгламани текширамыз. Бунда қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

1) агар $Al_1 + Bl_2 + Cl_3 \neq 0$ бўлса, l туғри чизик Π текислик билан кесишади.

2) агар

$$\left. \begin{aligned} Al_1 + Bl_2 + Cl_3 &= 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D &\neq 0 \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

бажарилса, $l \cap \Pi = \emptyset$ бўлади.

3) агар

$$\left. \begin{aligned} Al_1 + Bl_2 + Cl_3 &= 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D &= 0 \end{aligned} \right\}$$

бўлса, $l \subset \Pi$ бўлади.

Туғри чизик билан текислик орасидаги бурчак леб, туғри чизик билан унинг шу текисликдаги ортогонал проекцияси орасидаги бурчакка айтилади. (25) туғри

чирик билан (26) текислик орасидаги бурчак (69-чи-
ма)

$$\sin \theta = \frac{|Al_1 + Bl_2 + Cl_3|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + l_3^2}} \quad (28)$$

формула ёрдамида топилади.

Берилган текисликнинг берилган тўғри чирикка парал-
леллик шarti

$$Al_1 + Bl_2 + Cl_3 = 0, \quad (29)$$

перпендикулярлик шarti эса

$$\frac{A}{l_1} = \frac{B}{l_2} = \frac{C}{l_3} \quad (30)$$

кўрinishда ifodalanaди.

Энди текислик ва тўғри чирикка доир машқлар ба-
жаришда зарур бўладиган тенгламаларни келтириб
ўтамыз.

1) берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқтадан ўтиб, берилган
 $\frac{x-x_0}{l_1} = \frac{y-y_0}{l_2} = \frac{z-z_0}{l_3}$ тўғри чирикка параллел бўлган
тўғри чирик тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{l_2} = \frac{z-z_1}{l_3}. \quad (31)$$


2) берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқтадан ўтиб, берилган
 $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка перпендикуляр бўл-
ган тўғри чирикнинг тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{A} = \frac{y-y_1}{B} = \frac{z-z_1}{C}. \quad (32)$$

3) берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқтадан ўтиб, берилган
 $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка параллел бўлган
текисликнинг тенгламаси:

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0. \quad (33)$$

4) Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$
нуқта орқали ўтиб, $\frac{x-x'}{l_1} =$
 $= \frac{y-y'}{l_2} = \frac{z-z'}{l_3}$ тўғри чи-
рикка перпендикуляр бўлган
текислик тенгламаси:



69-чи-ма.

$$l_1(x - x_1) + l_2(y - y_1) + l_3(z - z_1) = 0. \quad (34)$$

1-мисол. Берилган $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-2}$ тўғри чизик ва $2x + y - 2z - 6 = 0$ текислик орасидаги бурчакни ва уларнинг кесишиш нуқтасини топинг.

Ечиш. Тўғри чизик ва текислик орасидаги бурчак

$$\sin \theta = \frac{|Al_1 + Bl_2 + Cl_3|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + l_3^2}}$$

формула ёрдамида аниқланади. Шунинг учун берилган $A = 2$; $B = 1$; $C = -2$; $l_1 = 1$; $l_2 = 2$; $l_3 = -2$ ларни бу формулага қўйиб топамиз:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-2)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \\ &= \frac{2 + 2 + 4}{\sqrt{1 + 4 + 4} \cdot \sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{8}{3 \cdot 3} = \frac{8}{9}. \end{aligned}$$

$$\text{Демак, } \theta = \arcsin \frac{8}{9}.$$

Энди уларнинг кесишиш нуқтасини топамиз, унинг учун тўғри чизик тенгламасини параметрик кўринишга келтирамиз:

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-2} = t, \\ \frac{x-1}{1} = t; \quad \frac{y-1}{2} = t; \quad \frac{z-1}{-2} = t, \\ \left. \begin{aligned} x &= t + 1, \\ y &= 2t + 1, \\ z &= -2t + 1 \end{aligned} \right\} (\alpha) \end{aligned}$$

Буни текислик тенгламасига қўямиз:

$$2(t + 1) + (2t + 1) - 2(-2t + 1) - 6 = 0;$$

$$2t + 2 + 2t + 1 + 4t - 2 - 6 = 0;$$

$$8t + 3 - 8 = 0;$$

$$8t - 5 = 0; \quad t = \frac{5}{8}.$$

t нинг бу қийматини (α) га қўямиз:

$$x = \frac{5}{8} + 1 = \frac{13}{8};$$

$$y = -\frac{10}{8} + 1 = -\frac{18}{8} = -\frac{9}{4};$$

$$z = -\frac{10}{8} + 1 = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}.$$

Демак, берилган тўғри чизиқ ва текисликнинг кесилиш нуқтаси $(\frac{13}{8}; \frac{9}{4}; -\frac{1}{4})$ дан иборат.

2-мисол. $M(-1; 3; 0)$ нуқтадан ўтиб, $2x - y - 2z - 4 = 0$ текисликка перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

Ечиш. $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқтадан ўтиб, $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламаси

$$\frac{x - x_1}{A} = \frac{y - y_1}{B} = \frac{z - z_1}{C}$$

формула ёрдамида аниқланади. Демак,

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 3}{-1} = \frac{z - 0}{-2}$$

ёки

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 3}{-1} = \frac{z}{-2}.$$

7-§. Икки тўғри чизиқ орасидаги бурчак

Иккита тўғри чизиқ $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}$ тўғри бурчакли координаталар системасида ўзининг тенгламалари билан берилган бўлсин:

$$l: \frac{x - x_0}{l_1} = \frac{y - y_0}{l_2} = \frac{z - z_0}{l_3},$$

$$l': \frac{x - x'_0}{l'_1} = \frac{y - y'_0}{l'_2} = \frac{z - z'_0}{l'_3}. \quad (35)$$

Икки тўғри чизиқ орасидаги бурчак деб, бу тўғри чизиқларнинг йуналтирувчи векторлари орасидаги бурчакка айтилади.

l тўғри чизиқнинг йуналтирувчи вектори $\vec{l} = \{l_1; l_2; l_3\}$, l' тўғри чизиқнинг йуналтирувчи вектори $\vec{l}' = \{l'_1; l'_2; l'_3\}$ бўлсин. $\vec{l}'$ ва $\vec{l}$ векторлар орасидаги бурчакни φ десак, у l ва l' тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни

ёради. Шунинг учун икки тўғри чизиқ орасидаги бурчак икки вектор орасидаги бурчак каби

$$\cos \varphi = \frac{\vec{l} \cdot \vec{l}'}{|\vec{l}| |\vec{l}'|} = \frac{l_1 l'_1 + l_2 l'_2 + l_3 l'_3}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2 + l_3^2} \sqrt{l'^2_1 + l'^2_2 + l'^2_3}} \quad (37)$$

формула ёрдамида аниқланади.

(37) формуладан эса қуйидаги келиб чиқади:

$$l \perp l' \iff \vec{l} \cdot \vec{l}' = 0 \iff l_1 l'_1 + l_2 l'_2 + l_3 l'_3 = 0.$$

Мисол. Йуналтирувчи векторлари мос равишда

$$\vec{l} = \{10; 2; 11\}; \quad \vec{l}' = \{3; 12; 4\}$$

бўлган тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. Бу векторлар орасидаги бурчак тўғри чизиқлар орасидаги бурчакка тенг. Демак, берилган тўғри чизиқлар орасидаги бурчак (37) формулага қўра қуйидагича аниқланади:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{l} \cdot \vec{l}'}{|\vec{l}| \cdot |\vec{l}'|} = \frac{10 \cdot 3 + 2 \cdot 12 + 11 \cdot 4}{\sqrt{10^2 + 2^2 + 11^2} \sqrt{3^2 + 12^2 + 4^2}} = \frac{98}{195},$$

$$\varphi = \arccos \frac{98}{195} \approx 59^\circ 50'.$$

Машқлар

1. Декарт координаталар системасида $4x + y - 2z - 6 = 0$ текислиқни ясанг.

2. $M(4; -2; 6)$ нуқтадан ўтиб, координата ўқларидан тенг кесмалар ажратувчи текислик тенгламасини ёзинг.

3. $M_1(-1; 3; 2)$ ва $M_2(2; 7; 4)$ нуқталар берилган. M_1 нуқтадан ўтувчи ва $\vec{N} = \vec{M_1 M_2}$ векторга перпендикуляр текислик тенгламасини ёзинг ва текисликни ясанг.

4. $3x - 2y + 6z + 4 = 0$ ва $2x + y - 2z + 3 = 0$ текисликлар орасидаги бурчакни топинг.

5. $(3; 5; 2)$ нуқтадан ўтувчи ва $x - 2y + 3z - 8 = 0$ текисликка параллел текислик тенгламасини топинг.

6. Ox ўқдан ва $M(1; -4; 3)$ нуқтадан ўтувчи текислик тенгламасини ёзинг ва текисликни ясанг.

7. $M_1(2; 3; 5)$ ва $M_2(0; 4; 6)$ нуқталардан ўтувчи ва Oy ўққа параллел текислик тенгламасини ёзинг.

8. Оз уққа параллел, Ox ва Oy уқларидан мос равишда $a=4$ ва $b=6$ кесмалар ажратувчи текислик тенгламасини ёзинг. Бу текисликни ясанг.

9. Қуйидаги текисликларнинг кесишиш нуқтасини топинг:

$$2x - 4y + 3z - 1 = 0; \quad x - 2y + 4z - 3 = 0$$

ва

$$4x + y + 6z - 2 = 0.$$

10. $x + 2y - 2z + 4 = 0$ ва $2x + y + 2z - 5 = 0$ текисликлар орасидаги бурчакни топинг.

11. $A(-2; 3; 1)$ ва $B(3; 4; 2)$ нуқталардан ўтувчи тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

12. $A(1; 5; 3)$ нуқтадан ўтиб, $p = \{2; 1; 4\}$ векторга параллел бўлган тўғри чизиқ тенгламасини ёзинг.

13. Ушбу $x - z - 5$

$$y = 2 + 4x \text{ тўғри чизиқни ясанг.}$$

Унинг xOy ва xOz текисликлардаги изларини топинг.

Кўрсатма. Тўғри чизиқ тенгламасида $z=0$ дейолинг.

14. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{2}$ тўғри чизиқ билан $4x - 2y + 4z - 4$ текислик орасидаги бурчакни топинг.

15. Ушбу $x = 3t,$

$$y = t - 2,$$

$z = t - 1$ тўғри чизиқнинг $x + 3y - 2z = 0$ текислик билан кесишиш нуқтасини топинг.

16. Берилган $\frac{x-5}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ ва $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-2}{1}$ тўғри чизиқларнинг бир текисликда ётишини кўрсатинг.

17. $M(3; 1; -2)$ нуқтадан ўтиб, $x + 3y - 2z = 0$ текисликка параллел бўлган текислик тенгламасини ёзинг.

18. Қуйидаги тўғри чизиқлар орасидаги бурчакни топинг:

$$\begin{cases} 2x - 5y + 2z + 4 = 0, \\ x + 4y - 3z - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} 3x + 2y - z - 3 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

Кўрсатма: Берилган тўғри чизиқларнинг ҳар бирининг йўналтирувчи векторини текисликлар нормал векторларининг вектор кўпайтмаси сифатида аниқлаш керак.

19. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{1}$ тўғри чизиқдан ўтувчи ва $x + 2y - 3z + 5 = 0$ текисликка перпендикуляр текислиkning тенгламасини ёзинг.

20. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{4}$ тўғри чизиқдан ва $F(2; 1; 0)$ нуқтадан ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

IX БОБ

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ СИРТЛАР

1-§. Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси

Бирор декарт координаталар системасида координаталари қуйидаги тенгламани қансатлантирувчи нуқталар тўплами иккинчи тартибли сирт дейилади:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0, \quad (1)$$

бу тенгламадаги a_{11} , a_{22} , a_{33} , a_{12} , a_{13} , a_{23} коэффициентларнинг камида бигтаси нолдан фарқли бўлиши керак. Агар бирор сирт декарт системасида 2- даражали тенглама билан берилган бўлса, бошқа системада ҳам 2- даражали тенглама билан берилади. Биз оддий куришнишдаги иккинчи даражали тенгламаларнинг баъзиларини қараймиз.

2-§. Сфера тенгламаси. Сферик сирт

Сферанинг Охуз тўғри бурчакли декарт координаталар системасидаги тенгламасини тузамиз. Айтайлик, $(a; b; c)$ нуқта сферанинг маркази, R эса унинг радиуси бўлсин. Сферанинг ихтиёрий нуқтаси $M(x; y; z)$ унинг маркази бўлган $(a; b; c)$ нуқтадан R масофада жойлашиш хоссасидан фойдалансак, сфера тенгламаси қуйидагича бўлади (айлана тенгламасига ўхшаш келтириб чиқарилади):

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2. \quad (2)$$

(2) тенглама маркази $(a; b; c)$ нуқтада ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенгламаси дейилади. Агар

$a = b = c = 0$ булса, (2) тенгламадан маркази координаталар бошида, радиуси R га тенг булган сферанинг ушбу тенгламасига эга буламиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Энди (2) ни қуйидагича (очиб) ёзамиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 0, \quad (3)$$

бу ердан сферанинг иккинчи тартибли сирт эканини кўрамыз;

Энди сиртнинг умумий тенгламаси (1) да $a_{11} = -a_{12} = a_{23} = 0$ ва $a_{11} = a_{22} = a_{33}$ леб олинса, у ҳолда

$$a_{11}x^2 + a_{11}y^2 + a_{11}z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0 \quad (4)$$

га эга буламиз ва бу тенглама сферани ифода қилишини текширамыз. (3) ни $a_{11} \neq 0$ га буламиз на

$$\frac{2a_{14}}{a_{11}} = A; \quad \frac{2a_{24}}{a_{11}} = B; \quad \frac{2a_{34}}{a_{11}} = C; \quad \frac{a_{44}}{a_{11}} = D$$

белгилашларни киритиб,

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0 \quad (5)$$

кўринишдаги тенгламага эга буламиз.

(5) тенгламани ҳам биров шакл ўзгартиришлардан кейин ушбу кўринишда ёзамиз:

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}(A^2 + B^2 + C^2 - 4D) \quad (6)$$

ёки

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}\right)^2. \quad (7)$$

(7) дан кўринадики, $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$ булганда (4) тенглама маънога эга булади. $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$ булса, (7) тенглама маркази $\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}; -\frac{C}{2}\right)$

нуқтада ва радиуси $R = \frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}$ булган

сферани ифодалашини биллиради. Агар $A^2 + B^2 + C^2 - 4D = 0$ булса, (7) тенглама $\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = 0$ кўринишда бўлиб, у фақат битта $\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}; -\frac{C}{2}\right)$ нуқтани ифодалайди. Демак, (5) тенглама фақатгина $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$ шартда сферани аниқлайди.

Мисол. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 8z + 6 = 0$ сферанинг маркази ва радиусини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ кўринишга келтирамыз. Бунинг учун тенгламада x, y, z ли ҳадларни олиб, уларни тула квадратга келтирамыз:

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + y^2 + 4y + z^2 + 8z + 6 &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 + 6 - 1 - 4 - 16 &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 &= 15 \text{ ёки} \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 &= (\sqrt{15})^2. \end{aligned}$$

Демак, сферанинг маркази $(1; -2; -4)$ нуқтада, радиуси эса $R = \sqrt{15}$ га тенг.

3-§. Иккинчи тартибли цилиндрик сирт

Айтайлик, Π текисликда γ иккинчи тартибли чизик ва σ текисликка параллел булмаган d тўғри чизик берилган бўлсин. Бизга маълумки, d тўғри чизик ўзига параллел булган ε тўғри чизиклар боғламнини аниқлайди. Шу ε боғламнинг γ чизик билан кесишадиган тўғри чизикларига тегишли булган фазонинг Φ нуқталар тўплами иккинчи тартибли цилиндрик сирт дейилади, бунда γ чизик унинг йўналтирувчиси, γ чизикни кесувчи ε боғламнинг тўғри чизиклари Φ цилиндрик сиртнинг ясовчилари дейилади.



70-чизма.

Ф цилиндр сиртнинг $R = \{0, i; j; k\}$ координаталар системасидаги тенгламасини келтириб чиқарамиз.

Ушбу $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ($a_3 \neq 0$) вектор $\vec{a}$ тўғри чи-
зиқнинг йўналтирувчи вектори бўлсин (70-чизма), γ
чизиқ эса берилган координаталар системасида

$$F(x; y) = 0 \quad (8)$$

тенглама билан аниқланган бўлсин. Ихтиёрий $M(x; y; z) \in \Phi$ нуқтани оламиз. Шу M нуқтадан утган ясовчининг xOy текислик билан кесишган нуқтаси $N(x_1; y_1; 0)$ бўлсин. У ҳолда $\vec{MN} = \{x_1 - x; y_1 - y; -z\}$ ва $\vec{a}$

вектор билан $\vec{MN}$ вектор коллинеар бўлгани учун:
 $\vec{MN} = t \cdot \vec{a}$, бундан

$$x_1 = x + a_1 t; y_1 = y + a_2 t; 0 = z + a_3 t;$$

$$x_1 = x - \frac{a_1}{a_3} z; y_1 = y - \frac{a_2}{a_3} z. \quad (9)$$

$$(8), (9) \Rightarrow F\left(x - \frac{a_1}{a_3} z; y - \frac{a_2}{a_3} z\right) = 0. \quad (10)$$

(10) — цилиндр сиртнинг тенгламасидир. Агар иккинчи тартибли цилиндр сиртнинг йўналтирувчиси эллипсдан иборат бўлса, у эллиптик цилиндр, гиперболадан (параболадан) иборат бўлса, гиперболик (параболик) цилиндр дейилади. Агар Φ цилиндр сиртнинг йўналтирувчиси жуфт кесишувчи (параллел) тўғри чи-
зиқлардан иборат бўлса, сирт жуфт кесишувчи (мос равишда параллел) текисликлардан иборат бўлади.

Мисол. Йўналтирувчиси xOy текисликда $x^2 + 3xy - 2y^2 - x + y + 1 = 0$ тенглама билан аниқланувчи, ясовчилари $\{1; 2; 1\}$ векторга параллел бўлган цилиндр сирт тенгламасини ёзинг.

Ечиш. Қўидагиларга эгамиз:

$$F(x; y) = x^2 + 3xy - 2y^2 - x + y + 1 = 0;$$

$$\vec{a} = \{1; 2; 1\}; a_1 = 1; a_2 = 2; a_3 = 1.$$

У ҳолда изланаётган сирт тенгламаси қўидаги кури-
нишда бўлади:

$$F(x - z, y - 2z) = (x - z)^2 + 3(x - z)(y - 2z) - 2(y - 2z)^2 - (x - z) + (y - 2z) + 1 = 0$$


ёки

$$x^2 - 2y^2 + z^2 + 3xy - 8xz + 5yz - x + y - z + 1 = 0.$$

4-§. Иккинчи тартибли конус сирг

Айтайлик, Π текисликда γ иккинчи тартибли чизик ва $S \in \Pi$ нуқта берилган бўлсин. Бизга маълумки, S нуқта орқали ўтувчи тўғри чизиклар $\varepsilon(S)$ тўғри чизиклар боғламини аниқлайди. $\varepsilon(S)$ боғламнинг γ чизик билан кесувчи тўғри чизикларига ёки γ га нисбатан асимптотик йўналишга эга бўлган тўғри чизикларга тегишли булган фазонинг нуқталар тўплами Φ иккинчи тартибли конус сирт (ёки кокус) дейилади. Бунда γ — сиртнинг йўналтирувчиси, $\varepsilon(S)$ ясовчилар, S эса конус сиртнинг учи дейилади.

Конус сирт (конус) тенгламасини келтириб чиқарамиз. Бунинг учун xOy координата текислиги Π текисликка параллел бўлган



71-чизма.

$$R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$$

координаталар системасини оламир. Айтайлик, текислик Oz ўқини $O(0; 0; h)$ нуқтада кессин ҳамда Φ конус сиртнинг учи $S(x_0; y_0; z_0)$ координаталарга эга бўлсин (71-чизма). Агар γ иккинчи тартибли чизикнинг тенгламаси

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00}$$

кўринишда бўлса, конус сиртнинг тенгламаси тубандаги кўринишда бўлади:

$$G(x, y, z) = \left(\frac{z - z_0}{h - z_0} \right)^2 \cdot F \left\{ x_0 + \frac{x - x_0}{z - z_0} (h - z_0), y_0 + \frac{y - y_0}{z - z_0} (h - z_0) \right\}. \quad (11)$$

Агар Φ конус сиртнинг учи R координаталар системасининг боши билан устма-уст тушса, у ҳолда $x_0 = y_0 = z_0 = 0$, $h \neq 0$ бўлиб, тенглама

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}y + a_{22}y^2 + 2\frac{a_{10}}{h}x^2 + 2\frac{a_{20}}{h}yz + \frac{a_{00}}{h_1}z^2 = 0$$

кўринишга эга бўлади.

Мисол. Тўғри бурчакли декарт координаталар системасида конус сиртининг учи $S(0; 0; 3)$ нуқтада, йўналтирувчиси эса

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 1 \end{cases}$$

тенгламалар билан аниқланган бўлиб, xOy текисликка параллел тенгламаси $z = 1$ бўлган Π текисликда ётади. Π текислик эса Oz ўқини $O'(0; 0; 1)$ нуқтада кесди. Конус сирт тенгламасини тузинг.

Еч иш. Йўналтирувчи Π текисликда $x^2 + y^2 - 1 = 0$ тенглама билан аниқланади. Берилганларга кура:

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1; h = 1, z_0 = 3.$$

У ҳолда (11) формуладан қуйидагига эга бўламиз:

$$G(x, y, z) = \frac{(z-3)^2}{4} \left[\left[\frac{x}{z-3}(-2) \right]^2 + \left[\frac{y}{z-3}(-2) \right]^2 - 1 \right] = 0$$

ёки

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{4}(z-3)^2 = 0.$$


5-§. Айланма сиртлар

Айтайлик, Π текисликда s тўғри чизик ва γ эгри чизик берилган бўлсин. Фазода шундай $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ ортонормал репер оламизки. унинг Oz ўқи s тўғри чизик билан устма-уст тушсин. Π текисликда эса ортонормал Ouz координаталар системасини киритамиз, бунда $Ou = \Pi \cap xOy$. Бу координаталар системасига нисбатан γ чизик $u = f(z)$ тенглама билан аниқланади. Ox ва Ou ўқлар орасидаги мусбат бурчакни φ билан белгилаймиз ва $M \in \gamma$ оламиз. φ бурчак $[0; 2\pi)$ оралиқда ўзгарганда M нуқта маркази $O' \in Oz$ нуқтада Σ_M текисликда ётувчи $O\varphi$ ўққа перпендикуляр бўлган γ_M айлана ясайди (72-чизма). У ҳолда $F = \bigcup_{M \in \gamma} \gamma_M$ фигура **айланма** сирт дейилади. s тўғри чизик айла-

ниш ўқи дейилади. F сиртининг айланиш ўқи орқали утувчи текисликлар билан кесишишидан ҳосил бўлган чизиқлар меридианлар дейилади. Айланиш ўқиға параллел текисликлар билан F нинг кесишишидан ҳосил бўлган чизиқлар параллеллар дейилади. Агар ихтиёрий $M \in F$ нуқтанинг координаталари $(x; y; z)$ бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} x &= u \cos \varphi, \\ y &= u \sin \varphi, \\ u &= f(z) \end{aligned} \quad (12)$$

бўлади.



72-чизма.

$$(12) \Rightarrow x^2 + y^2 = f^2(z). \quad (13)$$

Шундай қилиб, (13) тенглама R реперда $\begin{cases} x = f(z) \\ y = 0 \end{cases}$

тенгламалар билан берилган γ чизиқнинг Oz ўқи атрофида айланишдан ҳосил бўлган айланма сиртининг тенгламасидир. Шунга ўхшаш, $x^2 + z^2 = y^2(x)$ тенглама $\begin{cases} y = y(x), \\ z = 0 \end{cases}$ тенгламалар билан берилган γ чизиқнинг

Oz ўқи атрофида айланишдан ҳосил бўлган айланма сирт тенгламасидир. $x^2 + y^2 = h^2(y)$ эса $\begin{cases} x = h(y), \\ z = 0 \end{cases}$

тенгламалар билан берилган чизиқнинг Oy ўқи атрофида айланишдан ҳосил бўлган айланма сирт тенгламасидир.

1-мисол. $y = x$ тўғри чизиқнинг Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган айланма сирт тенгламасини тузинг.

Ечиш. Тўғри чизиқ тенгламасидаги y ни $\pm \sqrt{y^2 + z^2}$ билан алмаштирамиз:

$$x = \pm \sqrt{y^2 + z^2} \text{ ёки } y^2 + z^2 - x^2 = 0.$$

бу изланаётган айланма сирт тенгламасидир. Айланма сирт доиравий конус сирт экани равшан.

2-мисол. $\frac{z^2}{c^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипснинг Оу ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган айланма сирт тенгламасини тузинг.

Ечиш. Эллипс тенгламасидаги z ни $\pm \sqrt{x^2 + z^2}$ билан алмаштирамиз:

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2 + z^2}{c^2} = 1.$$

Бу изланган сирт тенгламаси бўлиб, $b = c$ бўлганда бу сирт сферага айланади.

3-мисол. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ гиперболанинг Оу ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган айланма сиртнинг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган тенгламада x ни $\pm \sqrt{x^2 + z^2}$ билан алмаштириб, изланаётган сиртнинг ҳосил қиламиз:

$$\frac{x^2 + z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

6-§. Эллипсоид

γ эллипснинг симметрия ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган Ф сирт айланма *эллипсоид* дейилади.

Айтайлик, γ эллипс $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ ортонормал репернинг xOz текислигида ётган бўлсин, у ҳолда $R_1 = \{0; \vec{i}; \vec{k}\}$ реперга нисбатан

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \Rightarrow z^2 = c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

тенгламага эга бўлади. γ эллипснинг Ох ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган Ф' айланма эллипсоиднинг тенгламаси эса тубандагича бўлади:


$$y^2 + z^2 = c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (14)$$

xOz текислигига нисбатан f сиқишни бажарамиз, яъни $x' = x$; $y' = ky$; $z' = z$ деймиз. У ҳолда R реперга нисбатан $\Phi = f(\Phi')$ эллипсоид тенгламасига эга бўламиз:

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{c^2 k^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1.$$

$k^2 \cdot c^2 = b^2$ деб белгилаб ҳамда координаталарни олдингидай қилиб олсак,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (15)$$



13-чизма.

тенгламага эга бўламиз. (15) тенглама эллипсоиднинг каноник тенгламаси бўлиб, a, b, c лар эллипсоиднинг ярим ўқларидир. Эллипсоид учун берилган R реперининг координата текисликлари симметрия текисликлари, координата ўқлари эса симметрия ўқлари бўлиб хизмат қилади. Симметрия ўқлари эллипсоиднинг ўқлари дейилади. Эллипсоиднинг ўқлар билан кесишиш нуқталари унинг *учлари* дейилади. Симметрия маркази эллипсоиднинг *маркази* дейилади (13-чизма).

Агар эллипсоидни xOy текислигига параллел бўлган $z = h$ текислик билан кессак, кесим тубандаги тенглама билан ифодаланади:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2},$$

бунда, агар $|h| < c$ бўлса, кесим эллипси, агар $|h| > c$ бўлса, кесим бўш тўпلامни, агар $|h| = c$ бўлса, кесим эллипсоиднинг учини ифодалайди. Шунга ўхшаш, эллипсоидни xOz ва yOz координата текисликларига параллел текисликлар билан кесиш натижасида (кесимда) эллипс, бўш тўплам ёки эллипсоид учи ҳосил бўлишини кўриш мумкин.


Мисол. Ярм ўқлари мос равишда 2, 3, 7 га тенг бўлган эллипсоид тенглімасини тузинг.

Ечиш. Масала шартда берилганларга кўра $a = 2$; $b = 3$; $c = 7$. У ҳолда эллипсоид тенглімаси куйидагича бўлади:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{49} = 1.$$

7-§. Гиперболоидлар

Дастлаб, гиперболоидлар икки хил — бир паллали гиперболоид ва икки паллали гиперболоид бўлишини айтиб ўтамиз.



74-чизма.

1. γ гиперболанинг узининг мавҳум ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган Φ' сирт бир паллали айланма гиперболоид дейилади. Фазони айланиш ўқи орқали ўтувчи Π текисликка f сиқишда Φ' бир паллали айланма гиперболоиднинг олган вазияти Φ бир паллали гиперболоид дейилади. Ушбу

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (16)$$

кўринишдаги тенглама бир паллали гиперболоиднинг каноник тенгламаси дейилади. (16) тенгламадан кўринадикки, R репернинг координата текисликлари бир паллали гиперболоиднинг

симметрия текисликлари ҳисобланади. Ox ва Oy ўқлар бир паллали гиперболоидни кесадилар ва унинг ҳақиқий ўқларини дейилади. Oz ўқ эса бир паллали гиперболоид билан кесишмайди, шунинг учун у мавҳум ўқ дейилади. Бир паллали гиперболоиднинг симметрия ўқлари билан кесишиш нуқталари унинг учлари дейилади. Координата боши (0 нуқта) бир паллали гиперболоиднинг симметрия маркази бўлиб, унинг маркази дейилади, a , b сонлари бир паллали гиперболоиднинг ҳақиқий ярим ўқлари, c эса унинг мавҳум ярим ўқини дейилади (74-чизма). Гиперболоидни lOy текислик билан кессак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

эллипс ҳосил бўлади. Шунга ўхшаш, гиперболоидни xOz , yOz текисликлар билан кессак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$

гипербололар ҳосил бўлади. Агар гиперболоидни xOy текисликка параллел бўлган $x = h$ текислик билан кес-
сак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 \left(1 + \frac{h^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 + \frac{h^2}{c^2}\right)} = 1 \\ z = h \end{cases}$$

эллипс ҳосил бўлади. Бу эллипснинг ярим ўқлари:

$$\tilde{a} = \frac{a}{c} \sqrt{c^2 + h^2}; \quad \tilde{b} = \frac{b}{c} \sqrt{c^2 + h^2}.$$

$h = 0$ бўлса, эллипснинг ярим ўқлари ўзининг ми-
нимал қийматига эга бўлади, яъни $\tilde{a} = a$; $\tilde{b} = b$. Бир
паллали гиперболоидни Oy ва Ox ўқиға перпендикуляр
бўлган текисликлар ($z = h$; $y = h$) билан кесс к, кесим-
да γ' ва γ'' чизиқлар ҳосил бўлади:

$$\gamma' : \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{b^2} \\ y = h \end{cases}$$

ва

$$\gamma'' : \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2} \\ x = h \end{cases}$$

Агар $|h| \neq a$; $|h| \neq b$ бўлса, у ҳолда γ' ва γ'' лар ги-
пербололарни ифодалайди. Агар $|h| = b$ бўлса, у ҳол-
да γ' кесишувчи тўғри чизиқлар жуфтини, $|h| = a$ бўл-
са, γ'' кесишувчи тўғри чизиқлар жуфтини ифодалай-
ди.

2. γ гиперболани ўзининг ҳақиқий ўқи атрофида ай-
ланишидан ҳосил бўлган сирт Φ' икки паллали айланма
гиперболоид дейилади. Фазони айланиш ўқи орқали
утувчи Π текисликка f сиқишда Φ' нинг олган вазияти
 Φ икки паллали гиперболоид дейилади. Ушбу

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (17)$$

тенглама икки паллали гиперболоиднинг каноник тенг-
ламаси дейилади (75-чизма). (17) те гламадан кўри-
надики, координата текисликлари икки паллали гипер-



75-чизма.

болоид учун симметрия текисликлари ҳисобланади. Ox ўқи Φ сиртни икки ҳақиқий нуқтада кесади, шунинг учун унга ҳақиқий ўқ дейилади. Oy ; Oz ўқлар икки паллати гиперболоид билан умумий ҳақиқий нуқталарга эга эмас, шунинг учун улар мавҳум ўқлар дейилади. Икки паллани гиперболоиднинг ўқлар билан кесишиш нуқталари, унинг учлари дейилади. У иккита ҳақиқий ўчга эга.

a сон икки паллани гиперболоиднинг ҳақиқий ярим ўқи, b ва c лар эса мавҳум ярим ўқлари дейилади. Икки паллани гиперболоидни Ox ўққа перпендикуляр бўлган текислик билан кессак, кесимда

$$\gamma''': \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{a^2} - 1, \\ h = x \end{cases}$$

ҳосил бўлади.

Агар $|h| > a$ бўлса, γ''' эллипсдан иборат бўлади; агар $|h| < a$ бўлса, у ҳолда $\gamma''' = \emptyset$, агар $|h| = a$ бўлса, γ''' нуқтадан иборат бўлади. Шунга ўхшаш, икки паллани гиперболоидни мавҳум ўқларга перпендикуляр бўлган текисликлар билан кессак, кесимда гипербола бўлишига ишонч ҳосил қиламиз.

1-мисол. $x^2 - 7y^2 - 7z^2 + 49 = 0$ тенглама билан берилган сиртнинг шаклини аниқланг.

Ечиш. Тенгламанинг иккала томонини -49 га бўламиз, у ҳолда

$$-\frac{x^2}{49} + \frac{y^2 + z^2}{7} = 1.$$

Демак, берилган тенглама айланиш ўқи Ox бўлган бир паллани гиперболоиднинг тенгламасидир.

2-мисол. Ушбу $3x^2 + 4y^2 - 8z^2 + 24 = 0$ тенглама ндай сиртни тасвирлайди?

Ечиш. Тенгламанинг иккала томонини 24 га бўлиб, уни

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{3} = -1$$

форманига келтирамиз. Бу тенглама ярим ўқлари $a = 2\sqrt{2}$, $b = \sqrt{6}$, $c = \sqrt{3}$ бўлган уч ўқли икки паллали гиперболоидни тасвирлайди.


8-§. Параболоидлар

Параболанинг ўз ўқлари атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт *айланича параболоид* дейилади. Эллиптик ва гиперболик параболоидлар айланиш ўқи орқали ўтувчи Π_1 текисликка f сиқишни бажариш натижасида ҳосил бўлади.

1. Тўғри бурчакли декарт координаталар системасида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z \quad (18)$$

тенглама билан тасвирланган сирт *эллиптик параболоид* деб аталади (76-чизма). (18) тенгламадан кўри-



76-чизма.

надики, yOz ва xOz текисликлар эллиптик параболоид учун симметрия текисликлари ҳисобланади. Oz ўқи эллиптик параболоиднинг симметрия ўқи ҳисобланиб, унинг ўқи дейилади. Координаталар системасининг боши эллиптик параболоиднинг координата ўқлари билан кесишган нуқтаси бўлиб, унинг учи дейилади. Эллиптик параболоидни унинг ўқиға перпендикуляр бўлган $z = h$ текислик билан кессак, кесим тубандаги тенглама билан аниқланади:


$$\gamma: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2h, \\ z = h; \end{cases}$$

агар $h > 0$ бўлса, γ — эллипс, агар $h < 0$, у ҳолда $\gamma = \emptyset$, агар $h = 0$ бўлса, γ кесим O учдан иборат бўлади. Эллиптик параболоидни Ox , Oy ўқларға перпендикуляр бўлган $x = h$ ва $y = h$ текисликлар билан кессак, кесимда парабола ҳосил бўлади.

2.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z \quad (19)$$

тенглама билан тасвирланган сирт *гиперболик параболоид* дейилади. (19) тенглама унинг каноник тенгламасидир (77- чизма). Гиперболик параболоидни xOy текисликка параллел бўлган $z = h$ текислик билан кессак, кесим қуйидаги тенглама билан аниқланади:



77-чизма.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h, \\ z = h. \end{cases}$$

$h > 0$ бўлганда, бу тенглама (чизик) ҳақиқий ўқи $z = h$ текисликда ва Ox ўққа параллел гиперболани, $h < 0$ бўлганда эса, ҳақиқий ўқи Oy ўққа параллел гиперболани тасвирлайди. $h = 0$ бўлганда, кесим икки-та кесишувчи тўғри чизиклар жуфтини аниқлайди. Шунга ўхшаш гиперболик параболоидни Oy ва Ox ўқларга перпендикуляр текисликлар билан кессак, кесимда парабола ҳосил бўлишини кўриш мумкин.

1-мисол. $3x^2 + 2y^2 = 24z$ тенглама билан берилган сирт шаклини аниқланг.

Ечиш. Сирт шаклини аниқлаш учун тенгламанинг ҳар иккала томонини 24 га бўламиз. У ҳолда $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{12} = z$ кўринишдаги тенгламага эга бўламиз. Бу тенгламани $z = \frac{x^2}{2 \cdot 4} + \frac{y^2}{2 \cdot 6}$ кўринишда ёзсак, берилган тенглама эллиптик параболоидни тасвирлашини кўрамыз.

2-мисол. $x^2 - y^2 = 6z$ тенглама билан берилган сиртнинг шаклини аниқланг.

Ечиш. Берилган сирт тенгламасини $z = \frac{x^2}{2 \cdot 3} - \frac{y^2}{2 \cdot 3}$ кўринишда ёзиш мумкин. Демак, берилган тенглама гиперболик параболоидни тасвирлар экан.

9-§. Иккинчи тартибли сиртларнинг техникада қўлланилиши

Иккинчи тартибли сиртларнинг тўғри чизикли ясовчиларга эга бўлишидан улардан техниканинг турли соҳаларида, қурилишда фойдаланилади. Агар тўғри чизикнинг ҳаракати натижасида сирт ҳосил қилиш мумкин бўлса, сирт тўғри чизикли сирт дейилади. Конус, цилиндр, шунингдек, бир паллали гиперboloид ва гиперболик параболоидлар ҳам тўғри чизикли сиртлардир.

СССР Фанлар Академиясининг фахрий аъзоси Владимир Григорьевич Шухов лойиҳасига кўра Москва телевизион мачтаси қурилишида бир паллали айланма гиперboloид шаклидан фойдаланилди. Бу шаклда ишланган мачта мустаҳкам бўлиб, ишлаш учун енгил бўлади.

Эллиптик параболоид шаклидаги ҳар хил кузгулар нурларни кучли ўзгартиради. Нурлар дастасининг таъсирини бир нуқтага туплаш ёки параллел нурлар олиш учун ана шу хоссадан фойдаланилади.

М а ш қ л а р

1. Қуйидаги сфераларнинг маркази ва радиусини аниқлаиғ:

а) $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 81$;

б) $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 72$.

2. Ушбу $x^2 - 4x + y^2 - 4y - z^2 + 8z + 7 = 0$ тенглама қандай сиртни тасвирлайди?

3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипсининг Оу ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт тенгламасини ёзинг.

4. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{25} = 1$ эллипсоиднинг энг катта доиравий кесими юзини топинг.

5. Ушбу $25x^2 + 3y^2 - 15z^2 - 75 = 0$ тенглама қандай сиртни тасвирлайди?

6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1$ бир паллали гиперболоиднинг ҳақиқий ярим ўқларини топинг.

7. Ушбу $4x^2 + 25y^2 + 10z^2 - 100 = 0$ тенглама қандай сиртни тасвирлайди. Сирт тенгламасини каноник кўринишдаги тенгламага келтиринг.

8. Ушбу $8z = 4x^2 + y^2$ тенглама қандай сиртни тасвирлайди? Уни ясаиғ.

9. Ушбу $\frac{x^2}{45} - \frac{y^2}{15} - \frac{z^2}{10} = 1$ тенглама қандай сиртни аниқлайди? Унинг $z = 1$ текислик билан кесишишидан қандай чизиқ ҳосил бўлади?

ИЛОВА


Баъзи бир ажойиб эгри чизиқлар

1. Циклоида. Берилган бирор l тўғри чизиқ бўйлаб сирпанмай гилдираб борувчи r радиусли айлананинг ихтиёрий M нуқтаси чизган эгри чизиқ циклоида дейилади. l тўғри чизиқни абсциссалар ўқи, M нуқтанинг бошланғич ҳолатини координаталар боши сифатида танлаб, координата векторларини эса, 78-чизмадагидек олиб, циклоида тенгламасини келтириб чиқарамиз. Дастлаб, тенгламани параметрик кўринишда келтириб чиқарамиз. Айтайлик, $M(x; y)$ нуқта циклоиданинг ихтиёрий нуқтаси, S эса, гилдираб борувчи r радиусли айлананинг маркази бўлсин (78-чизма). $[SM]$ ва $[SH]$ лар орасидаги φ бурчакни параметр деб танлаймиз. Чизмадан:


$$x = OM_1 = OH - M_1H = r\varphi - r \sin \varphi = r(\varphi - \sin \varphi),$$

$$y = OM_2 = r = r \cos \varphi = r(1 - \cos \varphi).$$

Бу циклоиданинг параметрик тенгламаларидир. Энди циклоида тенгламасини тўғри бурчакли декарт координаталар системасида келтириб чиқарамиз. Бунинг учун (1) дан φ ни чиқарамиз, у ҳолда $x + \sqrt{y(2r - y)} = -r \arccos \frac{r - y}{2}$ га эга бўламиз. Тенгламадан y нинг даврий экани кўринади. Унинг даври $OA = 2\pi r$ га тенг. Шунинг учун, циклоидани ясашда $0 \leq x \leq 2\pi r$ шартни қаноатлантирувчи нуқталарни ясаш етарли.



78-ЧИЗМА.



79-чизма.

танлайлик (79-чизма). Ҳаракатланувчи айлана марказини O , билан белгиласак ва параметр сифатида $\angle O, OX$ ни танласак, эпициклоиднинг тенгламаси тубандагича бўлади:

$$x = (R + r) \cos t - r \cos \frac{R+r}{r} t;$$

$$y = (R + r) \sin t - r \sin \frac{R+r}{r} t.$$

Эпициклоида ғилдирайдиган айлана радиуси қўзғалмас айлана радиусидан неча марта катта бўлишига қараб турли хилда бўлади (яъни унинг сиртмоғи сони шунга боғлиқ бўлади).

Хусусий ҳолда: $r = R$ бўлганда тенглама

$$x = 2r \cos t - r \cos 2t,$$

$$y = 2r \sin t - r \sin 2t$$

куринишни олади. Бу эгри чизик кардиоида дейилади. Эпициклоида битта сиртмоғининг узунлиги $l_1 = \frac{8(n+1)}{n} \cdot r$ га, умумий узунлиги эса $l = n \cdot l_1 = 8r(n+1)$ га тенг. Унинг битта сиртмоғининг юзи $S_1 = \frac{3n+2}{n} \pi r^2$ га, эпициклоиднинг умумий юзи эса $S = 3\pi r^2 (n+1)$ га тенг.

3. Гипоциклоида. Бирор қўзғалмас R радиусли айлана буйлаб ичкаридан сирпанмай, ғилдираб боровчи r радиусли айланадаги ихтиёрий M нуқта чизган эгри чизик гипоциклоида дейилади.

Қўзғалмас R радиусли айлана маркази O ни тўғри бурчакли координатлар системасининг боши қилиб, у орқали ўтувчи ихтиёрий иккита узро перпендикуляр тўғри чизикларни координата ўқлари қилиб танланлик. O , ғилдирайдиган айлана маркази бўлсин. Параметр сифатида $\varphi = \angle O, OX$ ни олсак, у ҳолда гипоциклоиднинг тенгламаси тубандагича бўлади (80-чизма):

$$x = (R - r) \cos \varphi + r \cdot \cos \frac{R-r}{r} \varphi,$$

$$y = (R - r) \sin \varphi - r \sin \frac{R-r}{r} \varphi.$$

Қўзғалмас ва қўзғалувчи айланалар радиуслари орасидаги мумосабатга қараб, гипоциклоиднинг турли хиллари ҳосил бўлади. Хусусий ҳолда: $r = \frac{1}{4}R$ бўлганда, тенглама

$$x = 3r \cos \varphi + r \cos 3\varphi,$$

$$y = 3r \sin \varphi - r \sin 3\varphi$$

куринишга эга бўлади ва эгри чизик астроида дейилади. Гипоциклоида бир сиртмоғи (ёйи) нинг узунлиги $l_1 = \frac{8(n-1)}{n} r$ га, умумий узунлиги $l = 8(n-1)r$ га тенг. Унинг битта сиртмоғи юзи $S_1 = \frac{3n-2}{n} \pi r^2$ га, умумий юзи эса $S = (n-1)(n-2)\pi r^2$ га тенг.

4. Никомерд конхондаси. l тўғри чизик ва ундан $a \neq 0$ масофада S нуқта берилган. S нуқта орқали мумкин бўлган барча тўғри чизиклар ўтказамизки, унинг тўғри чизик билан кесишиш нуқтаси A нинг икки томонида b кесма жойлашсин. Бу b кесма учларининг геометрик ўрни Никомерд конхондаси дейилади. S нуқтани қутб координаталар системасининг қутби



80-чизма.

деб ва қутб ўқини S нуқтадан l тўғри чизиққа перпендикуляр йўналтириб, Никомед конхондаси тенгламасини келтириб чиқарамиз.

Айтайлик, SA S нуқта орқали ўтувчи ва l тўғри чизиқни A нуқтада кесувчи ихтиёрий тўғри чизиқ бўлсин. У ҳолда A нуқтадан b масофада ётувчи M_1 ва M_2 нуқталар изланувчи нуқталар тўпламига тегишли бўлади. Агар (ρ_1, φ) ва $(\rho_2, \varphi) - M_1$ ва M_2 нуқталарнинг мос равишда умумлашган қутб координаталари бўлса, у ҳолда

$$\rho_1 = SM_1 = SA + AM_1 = \frac{a}{\cos \varphi} + b,$$

$$\rho_2 = SM_2 = SA - AM_2 = \frac{a}{\cos \varphi} - b.$$

Шундай қилиб, умумлашган декарт координаталар системасида эгри чизиқ тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:


$$\rho = \frac{a}{\cos \varphi} \pm b. \quad (2)$$

Бу тенглама

$$\left(\rho - \frac{a}{\cos \varphi}\right)^2 = b^2 \quad (3)$$

тенгламага тенг кучли. Шунинг учун (3) тенглама ҳам Никомед конхондаси тенгламасидир.

Агар қутб координаталар системасидан декарт координаталар системасига ўтиш формуласидан фойда-



81-а, б чизма.

ансак, Никомед конхондасининг декарт координаталар системасидаги тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$(x - a)(x^2 + y^2) = b^2 x^2. \quad (4)$$

(81-а чизмада $a > b$ ҳол, 81-б чизмада $a = b$ ҳол тасвирланган.)


5. Бернулли лемнискатаси. Ихтиёрий нуқтасидан берилган икки нуқтасигача бўлган масофалар кўпайтмаси ўзгармас сон p га тенг бўлган текислик нуқталарининг геометрик ўрни Бернулли лемнискатаси дейилади. Агар берилган F_1, F_2 нуқталар орасидаги масофани c десак, у ҳолда $[F_1 F_2]$ кесма ўргасидаги O нуқтадан F_1, F_2 нуқталаргача бўлган масофа $\frac{c}{2}$ га тенг бўлади. Аввало, O нуқта лемниската нуқтаси бўлгани учун (82-чизмага кўра)

$$MF_1 \cdot MF_2 = \frac{c^2}{4}$$


га тенг бўлсин деймиз, у ҳолда лемнискатанинг кўриниши ётқизилган 8 сонига ўхшайди. Агар ўзгармас кўпайтма p ни $\frac{c^2}{4}$ дан фарқли деб олсак, лемниската ўз

кўринишини ўзгартиради. $p < \frac{c^2}{4}$ дан кичик бўлса, лемниската иккита овалдан ташкил топади, уларнинг бири F_1 нуқтани, иккинчи эса F_2 нуқтани ўз ичига олади (83-чизма). Агар $p > \frac{c^2}{4}$ дан катта, $\frac{c^2}{4}$ дан кичик бўлса,


лемниската „бисквит“ кўринишга эга бўлади. Агар, $p > \frac{c^2}{4}$ дан кам фарқ қилса, „бисквитнинг бели“ k_1, k_2 жуда нозик бўлади (84-чизма). Агар $p < \frac{c^2}{4}$ дан кам фарқ




82-чизма.



83-чизма.



84-чизма.



85-чизма.

қилса, у ҳолда бисквит „белга“ эга бўлмайди. Агар $\rho = \frac{c}{2}$ га тенг бўлса ёки ундан катта бўлса, у ҳолда лем-
нискага овал кўринишга келади (85-чизма).

6. Архимед спирали. Ўзгармас V см/сек тезлик билан циферблат марказидан чексиз узун секунд стрелкаси устида югураётган қўнғизни кўз олдимизга келтирайлик. Қўнғиз бир минутдан кейин марказдан $60 \times v$ см, икки минутдан кейин $120 \cdot v$ см ва x к. узоқликда бўлади. Умуман олганда қўнғиз t секунд юргандан кейин, марказдан $v \cdot t$ узоқликда бўлади. Бу вақтда секунд стрелкаси $6t^\circ$ бурчакка бурилади (чунки у бир секундда $360^\circ : 60 = 6^\circ$ га бурилади.) Агар стрелканинг бурилиш бурчагини α ва қўнғизнинг циферблат марказидан узоқлигини r десак, унда улар орасидаги боғланиш қуйидагича бўлади:

$$r = \frac{v}{6} \alpha.$$

Бошқача айтганда, r бурилиш бурчаги α га тўғри пропорционал, пропорционаллик коэффициенти $k = \frac{v}{6}$.



86-чизма.



87-чизма.

лади. Агар биз югурувчи қўнғизнинг стрелка билан циферблатдаги ҳаракатининг траекториясини чизсак, унда биз биринчи марта Архимед томонидан урганилган эгри чизиққа эга бўламиз (86-чизма). Бу чизиқ олим шарафига Архимед спирали деб аталади. Архимед спиралининг ажойиб хоссаларидан бири, унинг ёрдамида ҳар қандай бурчакни истаган булакка бўлиш мумкин.

7. Логарифмик спираль. Бизга нур устида ҳаракатланётган нуқтанинг, нур бошидан узоқлиги, нурнинг бурилиш бурчагига тўғри пропорционал бўлиши Архимед спиралидан маълум, яъни $r = k\alpha$. Агар биз нуқтанинг нур бошидан узоқлигининг логарифмини ёйнинг бурилиш бурчагига тўғри пропорционал бўлишини талаб қилсак, у ҳолда биз логарифмик спиралга эга бўламиз (87-чизма), яъни $\ln r = k\alpha$ десак, унда $r = e^{\frac{\alpha}{k}}$ — бу логарифмик спиралнинг тенгламаси. Логарифмик спиралнинг асосий хоссаларидан бири: Спираль бошидан чиққан ҳар қандай нур, шу спирални бир хил бурчак остида кесиб ўтади.

М а ш қ л а р

1. Бернулли лемнискатасини ясанг:

$$r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi.$$

2. Ушбу

$$\begin{aligned}x &= 3(t - \sin t), \\y &= 1 - \cos t\end{aligned}$$

циклондани ясанг,

3. $r = e^{2\varphi}$ логарифмик спирални ясанг.

4. $r = 3\varphi$ ($r \geq 0$) Архимед спирални ясанг.

5. Ушбу

$$\begin{cases} x = 2a \cos^3 t, \\ y = 3a \sin^3 t \end{cases}$$

гипоциклоида (астроида) ни ясанг.

6. $r = 2a(1 + \cos \varphi)$ кардиондани ясанг.

7. Никомед конхондасини ясанг:

$$r = \frac{2a}{\cos \varphi} + 3b, \text{ бу ерда } a = 1; b = 1 \text{ деб олинг.}$$

АДАБИЕТ

1. Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии. М., „Наука“, 1968.
2. Атанасян Л. С. Геометрия, часть I, М., „Просвещение“, 1973.
3. Атанасян Л. С. Сборник задач по аналитической геометрии. М., „Просвещение“, 1968.
4. Базылев В. Т., Дуничев К. И., Иваницкая В. П. Геометрия, часть I, М., „Просвещение“, 1974.
5. Бакельман И. Я. „Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра“. Т., „Ўқитувчи“, 1978.
6. Бахвалов С. В., Бабушкин Л. И., Иваницкая В. П. Аналитическая геометрия. М., „Просвещение“, 1970.
7. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М., „Наука“, 1980.
8. Дадажонов Н. Д., Жураева М. Ш. Геометрия, I курс, Т., „Ўқитувчи“, 1982.
9. Камолов М. А. Аналитик геометрия. Т., „Ўқитувчи“, 1972.
10. Курош А. Г. Олий алгебра курси. Т., 1976.
11. Погорелов А. В. Геометрия. М., „Наука“, 1983.
12. Луканкин Г. Л., Мартынов И. Н., Шадрин Г. А., Яковлев Г. Н. Высшая математика. М., „Просвещение“, 1988.

МУНДАРИЖА

Суз боши

I боб. Детерминантлар ва чизиқли тенгламалар системалари

- 1-§. Иккинчи тартибли детерминантлар
- 2-§. Икки номаълумли иккита тенглама системасини текшириш
- 3-§. Учинчи тартибли детерминантлар
- 4-§. Детерминантни берилган устуни еки сатри элементлари бўйича ёйиш
- 5-§. Детерминантнинг хоссалари
- 6-§. n номаълумли n та чизиқли тенгламалар системаси
- 7-§. Уч номаълумли учта чизиқли тенглама системаси
- 8-§. Уч номаълумли учта тенгламанинг бир жинсли системаси
- 9-§. Чизиқли тенгламалар системасини Гаусс методи билан ечиш

Машқлар

II боб. Чизиқли тенгламалар системасининг умумий назарияси

- 1-§. Матрицанинг ранги
- 2-§. Чизиқли тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш шarti

Машқлар

III боб. Матрицалар алгебраси

- 1-§. Матрицаларни кўпайтириш
- 2-§. Тескарчи матрица
- 3-§. Чизиқли тенгламалар системасини матрицалар кўришишида ёфодалаш

IV боб. Векторлар алгебраси элементлари

- 1-§. Вектор тушунчаси Векторнинг абсолют қиймати ва йўналиши
- 2-§. Векторлар устида амаллар
- 3-§. Векторлар орасидаги бурчак, Векторларнинг ўқдаги проекцияси
- 4-§. Чизиқли комбинация, Базис
- 5-§. Координаталари билан берилган векторлар устида амаллар
- 6-§. Векторларнинг скаляр кўпайтмаси

Машқлар

ўқимасан ўзимга
20 мин
ҳақиқат

V б о б Текисликда ва фазода ўғри бурчакли декарт координаталари

1-§. Текисликда координаталар системасини киритиш	68
2-§. Фазада координаталар системасини киритиш	72
3-§. Кесмани берилган нисбатда бўлиш	75
4-§. Қутб координаталар системаси. Нуқтанинг декарт ва қутб координаталари орасидаги боғланиш	77
5-§. Икки векторнинг вектор кўпайтмаси ва унинг хоссалари. Учбурчакнинг юзи	81
6-§. Векторларнинг аралаш кўпайтмаси ва унинг хоссалари. Тетраэдрнинг ҳажми	87
7-§. Декарт координаталарини алмаштириш	91
<i>Машқлар</i>	95

VI б о б. Текисликда тўғри чизиқлар

1-§. Икки ўзгарувчили тенглама ва унинг графиги	97
2-§. Тўғри чизиқнинг турли тенгламалари	100
3-§. Текисликда икки тўғри чизиқнинг ўзаро жойлашуви	107
4-§. Икки тўғри чизиқ орасидаги бурчак	108
5-§. Нуқтадан тўғри чизиққача бўлган масофа	111
6-§. Тўғри чизиқлар дастаси	112
<i>Машқлар</i>	113

VII б о б. Иккинчи тартибли чизиқлар

1-§. Айлана	114
2-§. Чизиқларнинг кесишиш нуқталари. Икки айлананинг ўзаро жойлашуви	116
3-§. Эллипс	117
4-§. Гипербола	122
5-§. Парабола	126
6-§. Эллипс ва гиперболанинг директрисалари	130
7-§. Иккинчи тартибли чизиқнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш	131
8-§. Иккинчи тартибли чизиқни умумий тенгламасига кўра яшаш	137
9-§. Иккинчи тартибли чизиқларнинг татбиқи	140
<i>Машқлар</i>	142

VIII б о б. Фазада текисликлар ва тўғри чизиқлар

1-§. Текисликнинг берилиш усуллари	143
2-§. Фазада иккита ва учта текисликнинг ўзаро жойлашуви	148
3-§. Икки текислик орасидаги бурчак	152
4-§. Нуқтадан текисликкача бўлган масофа	153
5-§. Тўғри чизиқнинг берилиш усуллари	154
6-§. Тўғри чизиқ ва текисликнинг ўзаро жойлашуви. Тўғри чизиқ ва текислик орасидаги бурчак	157
7-§. Икки тўғри чизиқ орасидаги бурчак	160
<i>Машқлар</i>	161

IX боб Иккинчи тартибли сиртлар

1-§. Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси . . .	163
2-§. Сфера тенгламаси. Сферик сирт	163
3-§. Иккинчи тартибли цилиндрик сирт	165
4-§. Иккинчи тартибли конус сирт	167
5-§. Айланма сиртлар	168
6-§. Эллипсоид	170
7-§. Гиперболоидлар	171
8-§. Параболоидлар	175
9-§. Иккинчи тартибли сиртларнинг техникада қўллани- лиши	177
Машқлар	178
Илова. Баъзи бир ажойиб эгри чизиқлар	179
Машқлар	185
Адабиёт	187

На узбекском языке

ФАРХАД РАДЖАБОВИЧ РАДЖАБОВ
АХМЕД НУРМЕТОВИЧ НУРМЕТОВ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Учебное пособие для студентов педагогических институтов

Ташкент — „Уқитувчи“ — 1990

Муҳаррир Х. Алимов
Баллиқ муҳаррир С. Соли
Техмуҳаррирлар: Д. Габдрахманова, Т. Скиба
Мусаххих М. Минахмедова

ИБ № 5147

Геришга берилди 10.11.89. Босишга рухсат этилди 2.11.90. Формати 84×108/32. Типо-
коғози № 2. Кегль 10 шпониш. Литературная гарнитураси. Юқори босма усулда
босилди. Шартли б.-л. 10.08. Шартли кр.-оғт 16.29. Нашр. л. 7,19. Тиражи 6000.
Зак. № 10. Баҳоси 40 т.

„Уқитувчи“ нашриёти. Тошкент—129, Навоий кўчаси, 30.
Шартнома № 9—301—89.

Область газеталарининг М. В. Морозов номлиги босмахонаси ва бирлашган
нашриёти. Самарқанд, У. Турсунов кўчаси, 12. 1990

Объединенное издательство и типография областных газет имени
М. В. Морозова. г. Самарканд, ул. У. Турсунова, 12.

Ражабов Ф. Р., Нурметов А. Н.

Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра:
Пед. ин-тларининг студентлари учун ўқув
қўлланма. (Махсус муҳаррир Н. Дадажонов).
—Т.: Ўқитувчи, 1990. — 192 б.

1. Автордош.

Раджабов Ф. Р., Нурметов А. Н. Аналитическая
геометрия и линейная алгебра: Учеб. пособие для сту-
дентов пед. ин-тов.

ББК 22.151.5я73 + 22.143я73.