


Ш. И. Тожиев

**ОЛИЙ
МАТЕМАТИКАДАН
МАСАЛАЛАР ЕЧИШ**



51
Т-24

Ш. И. ТОЖИЕВ

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШ

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлиги олий техника ўқув юртлари талабалари
учун дарслик сифатида тавсия этган*

ТОШКЕНТ «ЎЗБЕКИСТОН» 2002

БИБЛИОТЕКА
Бух. ТНП и ЛП
№ 8/2658

Тақризчилар: Ўзбекистон Миллий университети профессори, физика-математика фанлари доктори, акад. Н. Ю. Сатимов.

ТошДТУ доценти, физика-математика фанлари номзоди Э. Қаюмов.

Физика-математика фанлари доктори, профессор Ф.У.Носиров таҳрири остида.

Дарслик Олий техника университети ва техника институтлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ундан сиртқи бўлим талабалари ҳам фойдаланишлари мумкин.

Ушбу дарслик 8 бобдан иборат бўлиб, 7 та боби биринчи курсда амалий машғулот дарсларида утиладиган «Олий математика» курсини тулиқ ўз ичига олади.

Ҳар бир параграф бошида зарур бўлган қисқача назарий маълумот, сўнгра мисол ва масалалар батафсил ечиб кўрсатилган. Параграф охирида талаба мустақил ечиши учун етарли миқдорда мисол ва масалалар келтирилган. Ҳар бир бобнинг охирида талабалар мустақил ўй иши бажариши учун вариантлар ва бу вариантларни ечиш намунаси келтирилган.

8-бобда олий математика татбиқида доир масалалар ва олий математикадан ёзма иш ўтказиш вариантлари келтирилган.

Т 1602010000 - 12 2002
М 351 (04)2002

ISBN 5-640-03140-9

© «ЎЗБЕКИСТОН» нашриёти, 2002 й.

СЎЗ БОШИ

Мазкур дарслик техника олий ўқув юртларида таълим олаётган биринчи курс талабаларга мўлжалланган бўлиб, бакалавр мутахассислар тайёрлайдиган бундай ўқув юртлар учун тасдиқланган «Олий математика» дастури асосида ёзилган.

Дарсликни ёзишда муаллифнинг Абу Райҳон Беруний номидаги Тошкент Давлат техника университети талабаларига «Олий математика» курсидан кўп йиллар давомида ўқиган маърузалари ва муттасил амалий машғулотлар олиб бориш тажрибаларидан ҳамда олий математикага доир рус ва ўзбек тилларидаги мавжуд ўқув қўлланма ва дарсликлардан фойдаланилди.

Бу дарсликдан бошқа ихтисосдаги (олий математикадан кам соат ажратилган) ўқув юртлари ҳамда техника олий ўқув юртларининг сиртқи бўлим талабалари бемалол фойдаланишлари мумкин.

Олий математика курси бўйича олиб бориладиган амалий машғулот материаллари бобларга бўлинган бўлиб, ҳар бир тема бошида масала ва мисолларни ечишда керак бўладиган зарур назарияга оид маълумотлар (асосий таъриф, тушунчалар, теоремалар, формулалар) берилди.

Сўнгра амалий машғулот дарсида мустақил ёки доскада ечиш учун мисол ва масалалар берилди.

Ҳар бир бобнинг охирида 25 та вариантдан иборат (1—4 тагача) мустақил ўй иши ва бу вариантларни ечиш намунаси келтирилди. Гуруҳ журнал рўйхат номери билан вариант номери тўғри келган вариантдаги мисол ва масалаларни талабалар алоҳида дафтарга бажаришлари керак.

Саккизинчи бобда талабаларнинг олий математикадан олган билимларини амалда татбиқ қила билишлари

учун юздан ортиқ масала ва машқлар (зарур бўлган жойларда методик кўрсатмалар билан) берилди.

2-§ да амалий машғулот дарсида ёзма иш ўтказиш вариантидан намуналар берилди.

Дарсликни тайёрлашда ўзларининг қимматли ёрдамларини аямаганлари учун Ўзбекистон Миллий университети «Оптимал бошқарув назарияси» кафедраси мудир акадмик Н.Ю. Сатимовга ва «Математик анализ» кафедраси доценти Т.Т. Тўйчиевга, Тошкент Давлат техника университети биринчи ва иккинчи «Олий математика» кафедраси мудирлари Х.Р. Латипов ва Ф. У. Носировларга ҳамда доцент Э. Қаюмовга муаллиф ўз миннатдорчилигини билдиради.

Қўлланма ҳақида билдирилган фикр ва мулоҳазаларни мамнуният билан қабул қилинади.

Муаллиф

I бoб

ФУНКЦИЯЛАР. ЛИМИТЛАР. ФУНКЦИЯНИНГ ЎЗЛУКСИЗЛИГИ

1-§. Сонли тўплamlар.

Функциянинг таърифи ва бeрилиш усуллари

Барча рационал (Q) ва иррационал (I) сонлар тўплaми биргаликда ҳақиқий сонлар тўплaмини тaшкил қилaди. Ҳақиқий сонлар тўплaми R ҳарфи билан белгиланади.

Тўғри чизиқдаги нуқталар тўплaми билан R тўплaм орасида ҳар доим ўзарo бир қиймaтли мослик ўрнатиш мумкин. Агар бу мослик ўрнaтилгaн бўлса, у ҳoлдa тўғри чизиқ *сонлар ўқи* дейилaди. Қуйидаги $a < x < b$ ($a \leq x \leq b$) тенгсизликни қaнoатлaнтирувчи ҳaммa x сонлар тўплaми очик (ёпиқ) oрaлиқ ёки интервал (кесмa, сегмент) дейилaди ва (a;b) ёки $]a;b[$ ($[a;b]$) кўринишларнинг бири билан белгиланади, $a \leq x < b$ ($[a;b)$) ва $a < x \leq b$ ($(a;b]$) лар эсa ярим очик интерваллар дейилaди.

Ҳақиқий сон a нинг *абсолют қиймaти (мoдули)* қуйидагичa aниқлaнади:

$$|a| = \begin{cases} -a, & \text{агар } a < 0 \text{ бўлса,} \\ a, & \text{агар } a > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Ихтиёрий иккитa a ва b ҳақиқий сон учун 1) $|a + b| \leq |a| + |b|$, 2) $|a| - |b| \leq |a - b|$, 3) $\frac{|a|}{|b|} = \frac{|a|}{|b|}$ ($b \neq 0$) муносабатлар ҳар доим тўғридир.

Таъриф. D ва E тўплaмлар берилгaн бўлсин. Агар D тўплaмдаги ҳар бир x сонгa бирor қoида ёки қонунгa кўрa $E = \{f(x), x \in D\}$ тўплaмдан биттa y сон мос қўйилса, D тўплaмда *функция* берилгaн (aниқлaнгaн) деб атaлaди ва $y = f(x)$ кaби белгиланади, бундa x *эркли ўзгaрувчи ёки аргумент* дейилaди.

Бу таърифдаги D ва E лар орасидаги боғланиш *функционал боғланиш* дейилади.

D тўплам функциянинг *аниқланиш соҳаси* дейилади. E тўплам, яъни D нинг ҳар бир x элементиға мос келган $f(x)$ элементлар тўплами функциянинг *ўзгариш соҳаси* дейилади.

D ва E тўпламлар $[a;b]$ кесма, $(a;b)$ интервал, $(a;b]$ ёки $[a;b)$, ярим интерваллар, сон ўқининг бирор нуқтаси, бутун сон ўқи $(-\infty; +\infty)$ бўлиши мумкин.

Функциялар *жадвал*, *график*, *аналитик* усулларда берилиши мумкин: $y = f(x)$ функция аналитик усулда берилганда унинг D ва E соҳалари берилмаган бўлиши мумкин, аммо уларни $f(x)$ функциянинг хоссаларидан фойдаланиб аниқланади.

Мисол. $y = \lg(4 - 3x - x^2)$ функциянинг аниқланиш ва ўзгариш соҳаларини топинг.

Ечиш. Логарифмик функция $4 - 3x - x^2 > 0$ бўлганда маъноға эға бўлади. Квадрат учҳаднинг илдизлари $x_1 = -4$, $x_2 = 1$ бўлгани учун юқоридаги тенгсизликни $-(x+4)(x-1) > 0$ кўринишда ёзиб оламиз. Бундан $x > -4$ ва $x < 1$ келиб чиқади. Демак, функциянинг аниқланиш соҳаси, яъни x нинг берилган функция маъноға эға бўладиган қийматлари тўплами (D) $(-4; 1)$ интервалдан иборат. D соҳада функциянинг қийматлари $0 < 4 - 3x - x^2 \leq \frac{25}{4}$ оралиқда ўзгариши учун (бунда $y_0 = \frac{25}{4}$ берилган функция аниқлайдиган парабола учининг ординатаси) $(-\infty; \lg(\frac{25}{4}))$ интервал E соҳадан иборат бўлиб, у функциянинг қийматлари тўплами бўлади.

Агар D соҳани E соҳаға акслантирганда ўзаро бир қийматли мослик, яъни $y = f(x)$ функция бажарилса, у ҳолда x ни у орқали $x = g(y)$ каби ифодалаш мумкин. Охириги функция $y = f(x)$ функцияға *тескари функция* дейилади. $x = g(y)$ функция учун E — аниқланиш соҳаси D эса функциянинг ўзгариш соҳаси бўлади. $g(f(x)) = x$ ва $f(g(y)) = y$ бўлгани учун $y = f(x)$ ва $x = g(y)$ функциялар *ўзаро тескари функциялар* бўлади.

Одатда $x = g(y)$ тескари функциядаги x ни у билан, у ни x билан алмаштириб $y = g(x)$ кўринишда ёзилади. Масалан, $y = x^3$ ва $y = \sqrt[3]{x}$, $y = 2^x$ ва $y = \log_2 x$, $y = \sin x$ ва

$y = \arcsin x$ ҳар бир жуфт функциялар ўзаро тескари функциялар. Уларнинг аниқланиш соҳаси мос равишда қуйидагича:

$$x \in (-\infty; +\infty) \text{ ва } x \in (-\infty; +\infty), \quad x \in (-\infty; +\infty) \text{ ва } x \in (0; +\infty), \\ x \in (-\infty; +\infty) \text{ ва } x \in [-1; +1].$$

Агар $u = \varphi(x)$ функция D соҳада аниқланган, G унинг ўзгариш соҳаси, $y = f(u)$ функция G соҳада аниқланган бўлса, у ҳолда $y = f[\varphi(x)] = F(x)$ функция *мураккаб функция* дейилади.

$y = f[\varphi(x)]$ мураккаб функция $y = f(u)$ ва $u = \varphi(x)$ функцияларнинг *композицияси* дейилади.

Функцияларнинг композицияси бир нечта функциялардан иборат бўлиши мумкин. Масалан, $y = \sin(x^2 + 1)$ функция $y = \sin u$ ва $u = x^2 + 1$, яъни иккита функциянинг композицияси бўлса, $y = \lg(\cos 2^{x^2})$ функция эса учта: $y = \lg u$, $u = \cos v$, $v = 2^w$, $w = x^2$ функцияларнинг композициясидан иборатдир u , v , w ўзгарувчилар *оралиқ аргументлари* дейилади.

Агар бирор $(a;b)$ оралиқда аниқланган $y = f(x)$ функция $F(x, y) = 0$ тенгламани қаноатлантирса, у ҳолда $y = f(x)$ функция $F(x, y) = 0$ тенглик билан аниқланган *ошкормас функция* дейилади. Функцияни ошкор кўринишға келтириш учун $F(x, y) = 0$ тенгликдан у ни топиш керак. у ни ҳар доим ҳам топиб бўлавермайди, баъзан эса умуман топиб бўлмайди. Масалан, $y + x \cdot 3^y = 1$ тенгламани у га нисбатан умуман ечиб бўлмайди.

Текисликнинг $(x; f(x))$ каби аниқланган нуқталаридан иборат ушбу

$$\{(x; f(x))\} = \{(x; y) : x \in X, y = f(x) \in Y\}$$

тўплам $y = f(x)$ функциянинг графиги деб аталади. Мураккаб функцияларнинг графиги уларнинг ординаталари устида (кўшиш, айириш, кўпайтириш, бўлиш, даражаға кўтариш, илдиз чиқариш, логарифмлаш ва ҳ.к.) амаллар бажариш ёрдамида тақрибан чизилади.

Даражали, кўрсаткичли, логарифмик, тригонометрик ва тескари тригонометрик функциялар *асосий элементар функциялар* дейилади.

Асосий элементар функцияларнинг аниқланиш ва ўзгариш соҳалари

№	Функция	Функциянинг аниқланиш соҳаси	Функциянинг ўзгариш соҳаси
1.	$y = x^n$, n — натурал сон	$(-\infty; +\infty)$	n жуфт бўлганда: $[0; +\infty)$, n тоқ бўлганда: $(-\infty; +\infty)$
2.	$y = \sqrt[n]{x}$	$[0; +\infty)$	$[0; +\infty)$
3.	$y = \sqrt[n]{x}$	$(-\infty; +\infty)$	$(-\infty; +\infty)$
4.	$y = a^x$	$(-\infty; +\infty)$	$(0; +\infty)$
5.	$y = \lg x$	$(0; +\infty)$	$(-\infty; +\infty)$
6.	$y = \sin x$	$(-\infty; +\infty)$	$[-1; +1]$
7.	$y = \cos x$	$(-\infty; +\infty)$	$[-1; +1]$
8.	$y = \operatorname{tg} x$	$\left((2n-1)\frac{\pi}{2}; (2n+1)\frac{\pi}{2} \right)$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$	$(-\infty; +\infty)$
9.	$y = \operatorname{ctg} x$	$(n\pi; (n+1)\pi)$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$	$(-\infty; +\infty)$
10.	$y = \arcsin x$	$[-1; +1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2} \right]$
11.	$y = \arccos x$	$[-1; +1]$	$[0; \pi]$
12.	$y = \operatorname{arctg} x$	$(-\infty; +\infty)$	$\left(-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2} \right)$
13.	$y = \operatorname{arctg} x$	$(-\infty; +\infty)$	$[0; \pi]$

Машқлар

Куйидаги функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг:

- $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$
- $y = \arccos \frac{2x}{1+x}$
- $y = \sqrt{25 - x^2} + \ln \sin x$
- $y = \lg(-x^2 - 5x + 6)$
- $y = \lg(2^{3x} - 4)$
- $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$

Куйидаги мураккаб функцияларни функцияларнинг композицияси кўринишида, яъни элементар функциялар кўринишида ёзинг:

$$7. y = 2^{\sin \sqrt{x}} \quad 9. y = \operatorname{tg} \sqrt[3]{\lg x}.$$

$$8. y = \sqrt[3]{\lg \sin x^3} \quad 10. y = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{2x^4}.$$

Куйидаги функцияларнинг графигини чизинг:

$$11. y = \frac{2x+3}{x-1} \quad 12. y = |3x+4-x^2|$$

$$13. y = -2\sin(2x+2) \quad 14. y = x \sin x.$$

$$15. y = \begin{cases} 1+x, & \text{агар } a < 0 \text{ бўлса,} \\ 2\sin x, & \text{агар } 0 \leq x < \pi \text{ бўлса,} \\ x-\pi, & \text{агар } x \geq \pi \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Куйидаги функцияларга тескари функцияларни топинг:

$$16. \begin{aligned} \text{а) } y &= 3x; & \text{д) } y &= 10^{x+1}; \\ \text{б) } y &= 1-5x; & \text{е) } y &= 1+\lg(x+2); \\ \text{в) } y &= x^2+1; & \text{ж) } y &= \frac{2^x}{1+2^x}; \\ \text{г) } y &= \sqrt[3]{x^2+1}; & \text{з) } y &= 2\sin 3x. \end{aligned}$$

2-§. Кетма-кетлик ва функциянинг limiti.

Энг содда аниқмасликларни ечиш

1-таъриф. Агар ҳар қандай $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $n_0 = n_0(\varepsilon) > 0$ сон топилсаки (бунда n_0 — бутун сон), барча $n > n_0$ лар учун $|x_n - A| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, у ҳолда A сон $\{x_n\}$ сонли кетма-кетликнинг *limiti* дейилади ва бу

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$$

кўринишда ёзилади.

кўринишда ёзилади.

Лимитга эга бўлган кетма-кетлик *яқинлашувчи*, акс ҳолда эса *узоқлашувчи* кетма-кетлик дейилади.

1-мисол. $\{x_n\} = \left\{\frac{2n+3}{n+1}\right\}$ кетма-кетликнинг лимити $A = 2$ га тенглигини исбот қилинг.

Исбот. Бу ҳолда $\{x_n\} = \left\{\frac{2n+3}{n+1}\right\}$, $A = 2$. Ихтиёрий $\varepsilon > 0$ сон оламиз ва $|x_n - A|$ айирманинг абсолют қийматини қараймиз:

$$|x_n - A| = \left|\frac{2n+3}{n+1} - 2\right| = \left|\frac{2n+3-2n-2}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Охириги тенгсизлиكنи ечиб $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$ ни ҳосил қиламиз, демак, $n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1\right] + 1$ деб олиш мумкин. Шундай қилиб, n_0 сони мавжуд ва $n > n_0$ лар учун $|x_n - 2| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилади. Бу эса $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{n+1} = 2$ эканини билдиради.

$y = f(x)$ функция бирор x_0 нуқтанинг атрофида аниқланган бўлсин.

2-таъриф. Агар ҳар қандай $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta > 0$ ($\delta = \delta(\varepsilon)$) сон топилсаки, аргумент x нинг $0 < |x - x_0| < \delta$ қийматлари учун $|f(x) - A| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, A сон $y = f(x)$ функциянинг $x \rightarrow x_0$ даги лимити дейилади ва бу қуйидагича ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

3-таъриф. Агар ҳар қандай $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$ сон топилсаки, x аргумент нинг $x_0 < x < x_0 + \delta$ ($x_0 - \delta < x < x_0$) тенгсизликларни қаноатлантирувчи барча $x \in X$ қийматларида $|f(x) - A| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, A сон $f(x)$ функциянинг x_0 нуқтадаги *ўнг (чап) лимити* деб аталади ва қуйидагича ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A \text{ ёки } f(x_0+0) = A,$$

$$(\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A \text{ ёки } f(x_0-0) = A).$$

Агар $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ лимит мавжуд бўлса, A сон $y = f(x)$ функциянинг $x \rightarrow \infty$ даги лимити дейилади.

Функциянинг чап ва ўнг лимитлари унинг *бир томонлама лимитлари* дейилади.

Агар иккала бир томонлама лимит мавжуд бўлиб, улар ўзаро тенг ($f(x_0-0) = f(x_0+0)$) бўлса, $f(x)$ функция $x \rightarrow x_0$ да лимитга эга дейилади.

Қуйидаги лимитлар ҳақидаги асосий теоремалар ўринли.

1-теорема. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x)$ ($i = \overline{1, n}$) лимитлар мавжуд бўлсин.

У ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{i=1}^n f_i(x) = \sum_{i=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \prod_{i=1}^n f_i(x) = \prod_{i=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x).$$

2-теорема. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ва $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \neq 0$ лимитлар мавжуд бўлсин.

У ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)}.$$

(Бу теоремалар $x_0 = \pm \infty$ бўлганда ҳам ўринли).

Агар бу теорема шартлари бажарилмаса, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ ва бошқа кўринишдаги аниқмасликлар ҳосил бўлиб, уларни алгебраик алмаштиришлар ёрдамида ҳисоблаш мумкин. Умуман $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0^0 , ∞^0 , 1^∞ аниқмасликлар мавжуд ва уларни ҳисоблашни мисолларда кўрсатамиз.

2-мисол. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right)$ лимитни топинг.

Ечиш. Агар x ўрнига 2 ни қўйсак, $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмаслик ҳосил бўлади. Бу аниқмаслиكنи ечиш учун қавс ичидаги ифодани умумий махражга келтирамиз.

Натижада $\lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{2-x}{x^2-4} \right)$, яъни $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмаслик ҳосил бўлади. Агар $x - 2 \neq 0$ деб касрни қисқар-

тирилса, аниқмаслик осонгина ечилади, яъни берилган лимит қуйидагига тенг бўлади:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \left(-\frac{1}{x+2} \right) = -\frac{1}{4}.$$

3-мисол. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^3 - x^2 + 5}{x^3 + x^2 - x}$ лимитни топинг

Ечиш. Бу ҳолда $\frac{\infty}{\infty}$ қуринишдаги аниқмасликка эга-миз. Уни ечиш учун лимит белгиси остидаги касрнинг сурат ва махражини x^3 га бўламиз.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^3}}{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}.$$

Юқорида келтирилган лимитлар ҳақидаги теоремаларга кўра қуйидагига эга бўламиз:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^3 - x^2 + 5}{x^3 + x^2 - x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 3 - \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{x^3}}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2}} = 3.$$

Машқлар

17. $\{x_n\} = \left\{ \frac{4n+5}{n-1} \right\}$ кетма-кетлик $A = 4$ лимитга эга бўлишини исбот қилинг.

Қуйидаги функцияларнинг лимитини ҳисобланг:

18. а) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{6x^2 - 5x + 1};$

б) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 4}{x^2 - 9}.$

19. а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 3n - 5}{1 - n^2};$

б) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2+4x^2-3x^3}{7x-10-x^2}.$

20. а) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{7x^2 + 10x + 20}{x^3 - 10x^2 + x};$

б) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{x^2 - 3}.$

21. а) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 5x + 6};$

б) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 25}{\sqrt{x-1} - 2}.$

22. а) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^2 - 4x + 3};$

б) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(\sqrt{x^2 + 5} - \sqrt{x^2 + 1} \right) \right).$

23. а) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{8 - x^2};$

б) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^2 - 7x + 6}.$

24. а) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{\sqrt{x+2} - 2};$

б) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(\sqrt{x^2 + 4} - x \right) \right).$

25. а) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right);$

б) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x^2 - 8x + 3}{x^2 - 4x + 3}.$

3-§. Ажойиб лимитлар

Мисол ва масалалар ечишда қуйидаги иккита ажойиб лимит жуда кўп ишлатилади:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

2. $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)^\alpha = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{1/\alpha} = e \approx 2,71828.$

1-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\sin 3x}$ лимитни топинг.

Ечиш. Лимит белгиси остидаги каср $x \neq 0$ да маънога эга бўлгани учун касрни қуйидаги қуринишда ёзиб оламиз ва ечишни давом эттирамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 7x}{7x} \cdot 7x}{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7x}{3x} \right) \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x}} = \frac{7}{3}.$$

2-мисол. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x+1}{3x-1} \right)^{3x+1}$ лимитни топинг.

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x+1}{3x-1} \right)^{3x+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x-1+2}{3x-1} \right)^{3x+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{2}{3x-1} \right)^{3x+1},$$

$\frac{2}{3x-1} = \frac{1}{y}$ деб белгилаймиз. У ҳолда $x = \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}$ ва $x \rightarrow \pm\infty$ да $y \rightarrow \pm\infty$ бўлади. Буларни ўрнига қўйиб, лимитни топамиз:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{2}{3x-1} \right)^{3x+1} = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y} \right)^{2(y+1)} =$$

$$= \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{y} \right)^y \right)^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{y} \right) = e^2,$$

бунда $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y} \right) = 1, \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{y} \right)^y = e.$

Машқлар

Қуйидаги лимитларни топинг:

26. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{\sin 3x}$
27. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x \sin 3x}$
28. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 2(x-1)}{x^2 - 7x + 6}$
29. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\sin 3x}$
30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{5x}$
31. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{2x-1} \right)^x$
32. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{4x-1}$
33. $\lim_{x \rightarrow \infty} ((2x+1)(\ln(3x+1) - \ln(3x-2)))$
34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x} \right)^{5x}$
35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3} \right)^{3x}$
36. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+1} \right)^{-2x}$

4-§. Чексиз кичик функцияларни таққослаш. Узлуксиз функциялар

Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, яъни ихтиёрий $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta > 0$ мавжуд бўлсаки, барча $0 < |x - x_0| < \delta$ лар учун $|\alpha(x)| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $x \rightarrow x_0$ да ($x \rightarrow x_0$ га интилганда) *чексиз кичик функция* дейилади.

Иккита $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ чексиз кичик функцияларни таққослаш учун улар нисбатининг $x \rightarrow x_0$ да limiti топилади:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C. \quad (1.1)$$

Агар $0 < |C| < \infty$ бўлса, $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ функциялар $x \rightarrow x_0$ да бир хил тартибдаги чексиз кичик функциялар дейилади.

Агар $C = 0$ бўлса, $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ функцияга нисбатан юқори тартибдаги чексиз кичик функция, $\beta(x)$ функция $\alpha(x)$ функцияга нисбатан қуйи тартибдаги чексиз кичик функция дейилади.

Агар

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \quad (0 < |C| < \infty)$$

бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ функцияга нисбатан $x \rightarrow x_0$ да k тартибли чексиз кичик функция дейилади.

Агар

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

бўлса, $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ чексиз кичик функциялар $x \rightarrow x_0$ да *эквивалент* (ёки тенг кучли) функциялар дейилади ва $\alpha(x) \sim \beta(x)$ каби белгиланади.

1-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1+x)}$ лимитни топинг.

Ечиш. $x \rightarrow 0$ да $\sin 5x \sim 5x$, $\ln(1+x) \sim x$ функциялар ўзаро эквивалент бўлгани учун берилган лимитни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x} = 5.$$

Функция узлуксизлиги тушунчаси муҳим тушунчалардан ҳисобланади.

1) $f(x)$ функция $x = x_0$ нукта ва унинг атрофида аниқланган;

2) x_0 нуктада $f(x)$ функция лимитга эга;

3) функциянинг $x \rightarrow x_0$ даги limiti функциянинг x_0 нуктадаги қийматига тенг, яъни

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (1.2)$$

бўлса, $y = f(x)$ функция $x = x_0$ нуктада *узлуксиз* дейилади.

Агар x ўрнига $x = x_0 + \Delta x$ ни қўйсак, (1.2) узлуксизлик шартига тенг кучли бўлган шартга эга бўламиз:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) = 0,$$

яъни функция аргументининг x_0 нуктадаги чексиз кичик орттирмаси Δx га функциянинг чексиз кичик орттирмаси $\Delta f(x)$ мос келганда ва фақат шунда $y = f(x)$ функция шу нуктада узлуксиз бўлади.

Бирор соҳанинг ҳамма нуқталарида узлуксиз бўлган $y = f(x)$ функция шу соҳада узлуксиз дейилади.

2-мисол. Ихтиёрий $x \in \mathbb{R}$ учун $y = \sin 5x$ функция узлуксиз эканини исбот қилинг.

Ечиш. Ихтиёрий Δx орттирма учун функциянинг орттирмаси қуйидагича бўлади:

$$\Delta y = \sin 5(x + \Delta x) - \sin 5x = 2 \cos \left(5x + \frac{5}{2} \Delta x \right) \cdot \sin \frac{5}{2} \Delta x.$$

У ҳолда

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(5x + \frac{5}{2} \Delta x \right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{5}{2} \Delta x = 0.$$

Демак, $y = \sin 5x$ функция сонлар ўқининг ҳамма нуқталарида узлуксиз.

Агар x_0 нуқтада функция узлуксизлигининг юқоридаги учта шартдан бирортаси бажарилмаса, x_0 нуқта *узилиш нуқтаси* дейилади.

Агар x_0 нуқтада $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0 - 0)$ ва $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0 + 0)$ лимитлар мавжуд бўлиб, $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$ бўлса, x_0 нуқта *I тур узилиш нуқтаси* дейилади.

Агар $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ лимитлар ёки уларнинг бирортаси мавжуд бўлмаса ёки ∞ га тенг бўлса, x_0 нуқта *II тур узилиш нуқтаси* дейилади.

Агар x_0 нуқтада бир томонлама лимитлар мавжуд ва $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0)$ бўлса, у ҳолда x_0 нуқта *бартараф қилиниш мумкин бўлган узилиш нуқтаси* дейилади.

Масалан,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{агар } x \neq 0, \text{ бўлса,} \\ 2, & \text{агар } x = 0 \text{ бўлса} \end{cases}$$

функция учун $x = 0$ нуқта бартараф қилиниши мумкин бўлган узилиш нуқтаси бўлади.

Машқлар

Қуйидаги лимитларни топинг:

$$37. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 3(x-2)}{x^2 - 3x + 2}$$

$$38. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin 3(x+1)}{x^2 + 4x - 5}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin 10x}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{\sin 7x} - 1}{x^2 + 3x}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+7x)}{\sin 7x}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\lg(x^2 - 3x + 2)}{x^2 - 4}$$

43. $y = \frac{7x^8}{x^4 + 1}$ чексиз кичик функциянинг $x \rightarrow 0$ да x чексиз кичик миқдорга нисбатан тартибини аниқланг.

44. $y = \frac{3x+3}{2x+4}$ функциянинг узлуксизлик соҳасини аниқланг ва унинг узилиш нуқтасини топинг.

45. $y = 3^{x+1} + 1$ функциянинг $x_1 = 1$ ва $x_2 = -1$ нуқталарда узлуксизлигини текширинг.

46. $f(x) = \frac{2x+4}{3x+9}$ функциянинг $x_1 = -1$ ва $x_2 = -3$ нуқталарда узлуксизлигини текширинг ва чизмасини чизинг.

$$47. \text{ Ушбу } f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{агар } x < 0 \text{ бўлса,} \\ \sin x, & \text{агар } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ бўлса,} \\ y = x - \frac{\pi}{2} + 1, & \text{агар } x \geq \frac{\pi}{2} \text{ бўлса} \end{cases}$$

функция берилган. Функциянинг узилиш нуқталарини топинг ва унинг графигини чизинг.

$$48. \text{ Ушбу } f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } x < 0 \text{ бўлса,} \\ \cos x, & \text{агар } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ бўлса,} \\ 1 - x, & \text{агар } x \geq \frac{\pi}{2} \text{ бўлса} \end{cases}$$

функциянинг узлуксизлигини текширинг ва графигини чизинг.

5-§. Биринчи мустақил уй иши

Бу параграфда талабаларнинг мустақил бажаришлари учун мўлжалланган 25 та вариантга бўлинган мисоллар келтирилган. Ҳар бир вариантда тўққизта мисол бўлиб, уларнинг лимитини ҳисоблаш керак.

Куйида вариант мисолларини ечиш намунасини келти-
рамыз.

Берилган лимитларни ҳисобланг.

$$1. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^2 + 13x + 6}{3x^2 + 2x - 8}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^2 + 13x + 6}{3x^2 + 2x - 8} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(5x+3)}{(x+2)(3x-4)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x+3}{3x-4} = \frac{7}{10} = 0,7.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{4x^2 + 6x - 64}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{4x^2 + 6x - 64} = \frac{0}{24} = 0.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 + 2x^3 + 5}{6x^4 + 3x^3 - 7x}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 + 2x^3 + 5}{6x^4 + 3x^3 - 7x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 \left(7 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^4} \right)}{x^4 \left(6 + \frac{3}{x} - \frac{7}{x^3} \right)} = \frac{7}{6}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x-3}{2x^3+4x+3}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x-3}{2x^3+4x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(10 - \frac{3}{x} \right)}{x^3 \left(2 + \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10 - \frac{3}{x}}{x^2 \left(2 + \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right)} = \frac{10}{\infty} = 0.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 - 3x^3 - 4}{3x^2 - 4x + 2}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 - 3x^3 - 4}{3x^2 - 4x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left(2 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^5} \right)}{x^2 \left(3 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \left(2 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^5} \right)}{3 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}} =$$

$$= \frac{-\infty}{3} = -\infty.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{21+x}-5}{x^3-64}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{21+x}-5}{x^3-64} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{21+x}-5)(\sqrt{21+x}+5)}{(x^3-64)(\sqrt{21+x}+5)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{21+x-25}{(x^3-64)(\sqrt{21+x}+5)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(x^2+4x+16)(\sqrt{21+x}+5)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(x^2+4x+16)(\sqrt{21+x}+5)} = \frac{1}{480}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3} \right)^{2-5x}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3} \right)^{2-5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{2x-3} - 1 \right)^{2-5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-2x+3}{2x-3} \right)^{2-5x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{2x-3} \right)^{2-5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{2x-3} \cdot \frac{2-5x}{2x-3}} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2-5x}{2x-3}} = e^{-\frac{5}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e^{15}}}.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+3}{2x-5} \right)^{1+7x}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+3}{2x-5} \right)^{1+7x} = 2^{\lim_{x \rightarrow \infty} (1+7x)} = 2^{-\infty} = 0.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin \frac{x}{2}}{\pi^2 - x^2}$$

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin \frac{x}{2}}{\pi^2 - x^2} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \cos \left(\frac{\pi - x}{2} \right)}{\pi^2 - x^2} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2 \sin^2 \frac{\pi - x}{4}}{(\pi - x)(\pi + x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2 \sin^2 \frac{\pi - x}{4}}{4 \cdot \frac{\pi - x}{4} (\pi + x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin \frac{\pi - x}{4}}{\pi + x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0}{2\pi} = 0.$$

1-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 + x - 6}$;
- $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{4x^2 + 19x - 5}{2x^2 + 11x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5x + 7}{3x^2 - 2x^2 + x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 6x^4 - x^3}{2x^2 + 6x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+4} \right)^{3x+2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-3}{x+4} \right)^{x+3}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{\sin x} \right)$.

2-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x^3 + x - 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x + 1}{x^4 - x^3 + 2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 4x^2 - 7}{2x^2 + 7x - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 3x - 2x^2}{3x^4 + 5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7-x} - \sqrt{7+x}}{\sqrt{7} \cdot x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-1} \right)^{x+2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{7x+4} \right)^x$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x - \sin^2 x}{x^2}$.

3-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 + x - 20}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{2x^2 - 7x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 9}{2x^3 - x + 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 3x^2 + 7}{2x^4 - 4x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 - 3x^4}{2x^3 + 3x^2 - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^{2x-3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-5}{3x+4} \right)^{2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin 3x}{x \sin x}$.

4-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^3 + 4x - 24}{x^2 + 2x - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{2x^2 - 9x + 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 7}{3x^2 + x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{1 + 2x - x^4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 + 7x^3 - 3}{3x^2 - 5x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-1} - \sqrt{3}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-3} \right)^{x-3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{4x-5} \right)^{2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{2x^2}$.

5-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 7x - 6}{2x^2 - 7x + 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{9x^2 + 17x - 2}{x^2 + 2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 7x - 2}{3x^2 - x - 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{3x^2 - 4x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 7}{2 - 3x + 4x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x} - 2}{\sqrt{8-x} - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2} \right)^{2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{3x+1} \right)^{5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2}$.

6-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 7x - 2}{3x^2 + 8x + 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{18x^2 + 5}{8 - 3x - 9x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 5x + 2}{4x^3 + 2x - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x + 1}{7x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{\sqrt{x-1} - 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+4} \right)^{3x-1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{x+4} \right)^{x-1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\operatorname{tg} 3x}$.

7-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^2 + 4x - 1}{3x^2 + x - 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 - 2x^2 + 5x}{3x^2 + 7x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 6x^2 + 2}{x^4 + 4x - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11x^3 + 3x}{2x^2 - 2x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x - 7}{3x^4 + 2x^3 + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{\sqrt{x+2} - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-4}{2x} \right)^{-3x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{3x+10} \right)^{3x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x - \sin 3x}{2x^2}$.

8-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{3x^2 + x - 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4 - 5x^2 + 1}{x^2 - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 4x - 5}{4x^2 - 3x + 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 3x + 5}{4x^3 - 2x^2 + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 - 3x^2}{1 + 2x + 3x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x-3} - 3}{x^2 - 9}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x} \right)^{3x+4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{x+4} \right)^{6x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{\pi - 4x}$.

9-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 4x - 3}{2x^3 + 3x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^3 - 5x + 6}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 + 4x^3 + 2}{2x^4 + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^3 + 5x^2 + 3}{2x^3 - x + 7}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x + 3}{x^3 - 4x^2 - x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{5x+1} - 4}{x^3 + 2x - 15}$;
- $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x-7}{x+1} \right)^{4x-2}$;
- $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x+3}{3x-1} \right)^{2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos^3 4x}{3x^2}$;

10-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 3x - 20}{x^2 - x - 12}$;
- $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - x - 30}{x^3 + 125}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 2}{6x^2 + 5x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x - 7}{x^4 - 2x^3 + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 5x}{2x^3 - 3x - 7}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{x^2 + 4} - 4}{3x^3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{3-2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x+5}{x-10} \right)^{\frac{5x}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin 2x} - \frac{1}{\operatorname{tg} 2x} \right)$;

11-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 9x + 10}{x^2 + 3x - 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 3x - 28}{x^3 - 64}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 4x}{x^3 - 3x + 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 - 4x^3 + 3}{2x^3 + x - 7}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 3}{3x^4 - 2x^2 + x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{\sqrt{x^2 + 16} - 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2-3x}{5-3x} \right)^x$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+7}{x+4} \right)^{\frac{4x}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{x^2}$;

12-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + x - 5}{x^2 - 2x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{x^2 - \frac{1}{4}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 4x - x^4}{x + 3x^2 + 2x^4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 7x + 1}{x^3 + 4x^2 - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 - x^3}{4x^2 + 3x - 6}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{x-5} - \sqrt{x+5}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-x} \right)^{3x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{4x+5} \right)^{\frac{1}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{x^2 - x}$;

13-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 11x - 2}{3x^2 - x - 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 3x - 28}{x^2 - 4x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x^2 - 2}{6x^3 - 4x + 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 - 2x^3 + 3}{2x^2 + 3x - 7}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x^3 - 5x^2 + 4x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{2x+7} - 5}{3 - \sqrt{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+1} \right)^{2x+3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-7}{x+6} \right)^{\frac{3x}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 2x}{x \arcsin x}$;

14-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 5x - 14}{2x^2 - 9x - 35}$;
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 11x + 10}{x^2 - 5x - 14}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 14x^3}{1 + 2x + 7x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 + x^2 - 7}{2x^2 - 5x + 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x - 3x^2}{x^3 - 16}$;
- $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2 - \sqrt{x}}{\sqrt{6x+1} - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+4}{3x} \right)^{-2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-4x}{2-x} \right)^{\frac{4x}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x \sin x}$;

15-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3x^2 - 6x - 45}{2x^2 - 3x - 35}$;
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{3x^2 + x - 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^6}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x^2 - 3}{8x^3 - 4x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 10x + 7}{2x^3 - 3x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{\sqrt{3x} - x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+4} \right)^{-2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-2x}{3-x} \right)^{-x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x - \cos x}{4x^2}$;

16-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 - 3x - 27}{x^2 + 2x - 15}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + x}{4x^2 - 5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x^2 - 7}{3x^4 + 3x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x - 4}{3x^2 - 4x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^3 + 4x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^3 + x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+4}{3x+5} \right)^{x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4+3x}{5+x} \right)^{\frac{4x}{x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + \sin x}{\arcsin x}$;

17-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x^2 - 26x - 225}{2x^2 + 11x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x^2 - 11x - 6}{3x^2 - 20x + 12}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 5x^2 - 3x^3}{x^2 + 6x + 8}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 2x + 4}{2x^2 + x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 13}{x^2 - 3x^3 + 4x}$;
- $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+20} - 4}{x^3 + 64}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2x}{3+2x} \right)^{x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{2x+5} \right)^{3x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2}$;

18-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{2x^2 + 15x - 8}{3x^2 + 25x + 8}$;
- $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{x^2 + 2x - 24}{2x^2 + 15x + 18}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 7x^2 + 3}{2 + x^2 - x^3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 5x^2 - 3x}{3x^2 + x - 10}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 + 2x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{\sqrt{8+x} - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x}{3x+2} \right)^{x^2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x$;

19-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 2x - 40}{x^2 - 3x - 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^2 - 11x + 18}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 3x^2 + 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 10x - 11}{3x^4 - 2x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 81}{3x^2 + 4x + 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x^2 + x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-1} \right)^{1-2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{9x-4} \right)^{2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{\sin x + \sin 7x}$;

20-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{3x^2 + 10x + 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{7x^2 - 27x - 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{3x^2 + x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 3x - 4}{2x^2 - 5x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x + 4}{3x^3 - 5x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1} - 3}{x^3 - 8}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4-2x}{1-2x} \right)^{x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{4x-2} \right)^{3x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{5x^2}$;

21-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 7x + 6}{x^2 - 5x + 6}$;
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - x^2 + x + 1}{x^4 - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 29x}{5x^3 + 3x^2 + x - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 7x - 1}{3x^4 + 2x + 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x^2 + x}{3x^2 - x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+2x} - \sqrt{x+4}}{3x^2 - 4x + 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x+1} \right)^{5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+8}{x-2} \right)^{x+4}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{3x^2}$;

22-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{12 - x - x^2}{x^3 - 27}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^4 - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 10x + 3}{2x^2 + 5x - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x^2 + 4}{x^4 + 5x - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x + 1}{3x^2 + 2x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x} \right)^{-5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{3x-1} \right)^{2x+1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\sin 3x}$;

23-вариант

- $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{3x^2 + 2x - 1}{27x^3 - 1}$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{5x^2 + 3x - 26}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^4 + x^2 + x}{x^4 + 3x - 2}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 5x^2 + 2}{2x^3 + 4x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^4 + 3x^2 - 9}$;
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+1} \right)^{1+2x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x-1} \right)^{4x}$;
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin 5x}{\pi - 2x}$;

24-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{x^2 - 2x - 3}$;
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 7x + 3}{5x^2 - 3x + 4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 5x^2 - 4x}{3x^2 + 11x - 7}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 4x + 2}{4x^2 + 2x - 5}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 9x + 7}{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+3}}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-1} \right)^{x-4}$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{3x-1} \right)^{5x}$;
- $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$;

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{-x^2 + x + 2}$;
2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 3x + 2}$;
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 + 3x + 1}{3x^2 + x - 5}$;
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + 5x + 9}{1 + 4x - x^2}$;
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x^2 + 2x}{x^2 + 7x + 1}$;
6. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+6}}{2x^2 - 7x - 15}$;
7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{2x-3} \right)^{3x}$;
8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{2x-4} \right)^{x+2}$;
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg 2x - \sin 2x}{x^2}$.

6-§. Иккинчи мустақил уй иши

Иккинчи мустақил уй ишининг ҳар бир вариантида тўртта мисол бўлиб, уларнинг шарты қуйидагича:

Биринчи мисолда: $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар $x \rightarrow 0$ да бир хил тартибли чексиз кичик функциялар бўлишини исбот қилиш керак.

Иккинчи мисолда: чексиз кичик функцияларнинг эквивалентлигидан фойдаланиб лимитни топиш керак.

Учинчи мисолда: берилган функцияларнинг узлуксизлигини текшириш ва чизмасини чизиб берилган.

Тўртинчи мисолда: берилган функциянинг кўрсатилган нуқталарда узлуксизлигини текшириш керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамиз:

1. $f(x) = \cos 2x - \cos^3 2x$ ва $\varphi(x) = 3x^2 - 5x^3$ функциялар $x \rightarrow 0$ да бир хил тартибли чексиз кичик функциялар бўлишини исбот қилинг.

Исботи. $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ нисбатнинг лимитини топамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos^3 2x}{3x^2 - 5x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos^2 2x) \cos 2x}{x^2 (3 - 5x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \sin^2 2x}{x^2 (3 - 5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cos 2x \sin 2x \cdot \sin 2x}{2x \cdot 2x (3 - 5x)} = \frac{4}{3}.$$

бунда $\lim_{x \rightarrow 0} \cos 2x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(3 - 5x)} = \frac{1}{3}$, демак, $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар нисбатининг лимити мавжуд ва у

нолдан фарқли ўзгармас бўлгани учун (1.1) формулага асосан берилган функциялар бир хил тартибли чексиз кичик функциялар бўлади деган хулосага келамиз.

2. Чексиз кичик функцияларнинг эквивалентлигидан фойдаланиб $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\ln(1 + 4x)}$ лимитни топинг.

Ечиш.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\ln(1 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{4x} = 2, \text{ бунда } \arcsin 8x \approx 8x, \ln(1 + 4x) \approx 4x.$$

3. Берилган функциянинг узлуксизлигини текширинг ва чизмасини чизинг:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{агар } -\infty < x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ (x-1)^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бўлса,} \\ 5-x, & \text{агар } 2 < x < \infty \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Ечиш. $f(x)$ функция $(-\infty; 0)$, $(0; 2)$ ва $(2; +\infty)$ интервалларда аниқланган ва узлуксиз бўлган элементар функциялар билан берилган.

Демак, фақат $x_1 = 0$ ва $x_2 = 2$ нуқталарда узилишга эга бўлиши мумкин. $x_1 = 0$ нуқта учун чап ва ўнг лимитларни ҳисоблаймиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} x^2 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} (x-1)^2 = 1, \\ f(0) = x^2 \Big|_{x=0} = 0.$$


Бу эса $x_1 = 0$ нуқтада $f(x)$ функция биринчи тур узилиш нуқтасига эга бўлишини билдиради. $x_2 = 2$ нуқта учун:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} (x-1)^2 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} (5-x) = 3.$$

$f(2) = (x-1)^2 \Big|_{x=2} = 1$ ларга эга бўламиз. Бу эса, $x_2 = 2$ нуқтада $f(x)$ функциянинг биринчи тур узилиш нуқтасига эга бўлишини билдиради.

Берилган функциянинг графиги 1-чизмада тасвирланган.

4. $f(x) = 8^{x-3} + 1$ функциянинг $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ нуқталарда узлуксизлигини текширинг.



1-чизма.

Ечиш. $x_1 = 3$ учун қуйидагиларга эга бўламиз.

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-0} \left(8^{\frac{1}{x-3}} + 1 \right) = 8^{-\infty} + 1 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} \left(8^{\frac{1}{x-3}} + 1 \right) = 8^{+\infty} + 1 = \infty.$$

Бу эса $f(x)$ функция $x_1 = 3$ нуктада иккинчи тур узилиш нуктасига эга эканлигини билдиради.

$x_2 = 4$ нукта учун эса:

$$\lim_{x \rightarrow 4-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-0} \left(8^{\frac{1}{x-3}} + 1 \right) = 9,$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+0} \left(8^{\frac{1}{x-3}} + 1 \right) = 9,$$

$$f(4) = \left(8^{\frac{1}{4-3}} + 1 \right) = 8^1 + 1 = 9.$$

Демак, $f(x)$ функция $x_2 = 4$ нуктада узлуксиз.

1-вариант

1. $f(x) = \lg 2x, \varphi(x) = \arcsin x.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{2x^2}.$

3. $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & x > 2. \end{cases}$

4. $f(x) = (x-3)(x+4), x_1 = -5, x_2 = -4.$

2-вариант

1. $f(x) = \frac{x^2}{5+x}, \varphi(x) = \frac{4x^2}{x-1}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{4x^2}.$

3. $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi, \\ 2, & x \geq \pi. \end{cases}$

4. $f(x) = \frac{x+5}{x-2}, x_1 = 3, x_2 = 2.$

3-вариант

1. $f(x) = \sin 8x, \varphi(x) = \arcsin 5x.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{\ln(1+2x)}.$

3. $f(x) = \begin{cases} x-1, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 2, \\ 2x, & x \geq 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 5^{\frac{1}{x-3}}, x_1 = 3, x_2 = 4.$

4-вариант

1. $f(x) = \sin 3x + \sin x, \varphi(x) = 10x.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 4x}{\lg 5x}.$

3. $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x^2-1, & 0 \leq x < 2, \\ -x, & x \geq 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 4^{\frac{2}{x-1}} - 3, x_1 = 1, x_2 = 2$

5-вариант

1. $f(x) = \cos 7x - \cos x$, $\varphi(x) = 2x^2$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}}{\sin 2x}$.

3. $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x^2 + 1, & 0 \leq x < 2, \\ x + 1, & x \geq 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 2^{\frac{5}{1-x}} - 1$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$.

6-вариант

1. $f(x) = 1 - \cos 2x$, $\varphi(x) = 8x^2$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg(x+2)}{x^2 - 4}$.

3. $f(x) = \begin{cases} x+3, & x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq 2, \\ x^2 - 1, & x > 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 8^{\frac{4}{x-2}} - 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

7-вариант

1. $f(x) = 3\sin^2 4x$, $\varphi(x) = x^2 - x^4$.

2. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(x+2)}{x^2 + 8}$.

3. $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 3, & x \geq \pi. \end{cases}$

4. $f(x) = 5^{\frac{4}{x-1}} + 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

8-вариант

1. $f(x) = \lg(x^2 + 2x)$, $\varphi(x) = x^2 + 2x$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\lg 4x}$.

3. $f(x) = \begin{cases} -x+1, & x < -1, \\ x^2 + 1, & -1 \leq x \leq 2, \\ 2x, & x > 2. \end{cases}$

4. $f(x) = \frac{3x}{x-4}$, $x_1 = 4$, $x_2 = 5$.

9-вариант

1. $f(x) = \arcsin(x^2 - x)$, $\varphi(x) = x^3 - x$.

2. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{\lg(x-4)}$.

3. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 2^x, & 0 < x \leq 2, \\ x+3, & x > 2. \end{cases}$

4. $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

10-вариант

1. $f(x) = \sin 7x + \sin x$, $\varphi(x) = 4x$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{2x^2}$.

3. $f(x) = \begin{cases} -x+2, & x \leq -2, \\ x^3, & -2 < x \leq 2, \\ 2, & x > 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 2^{\frac{3}{x+2}} + 1$, $x_1 = -2$, $x_2 = -1$.

11-вариант

1. $f(x) = \sqrt{4+x} + 2$, $\varphi(x) = 3x$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x^3)}{2x^3}$.

3. $f(x) = \begin{cases} 3x+4, & x \leq -1, \\ x^2 - 2, & -1 \leq x < 2, \\ x, & x \geq 2. \end{cases}$

4. $f(x) = 4^{\frac{3}{x-2}} + 2$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

12-вариант

1. $f(x) = \sin(x^2 - 2x)$, $\varphi(x) = x^4 - 8x$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 5x}{\lg 2x}$.

$$3. f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1, \\ (x-2)^2, & 1 < x < 3, \\ -x+6, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 3^{\frac{2}{x+1}} - 2, \quad x_1 = -1, x_2 = 0.$$

13-вариант

$$1. f(x) = \frac{2x}{3-x}, \varphi(x) = 2x-x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 1, \\ x^2+2, & -1 \leq x \leq 2, \\ -2x, & x > 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 5^{\frac{3}{x+4}} + 1, \quad x_1 = -5, x_2 = -4.$$

14-вариант

$$1. f(x) = \frac{x^2}{7+x}, \varphi(x) = 3x^3-x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 8x}{\operatorname{tg} 4x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} -x^3, & x < -1, \\ x-1, & -1 \leq x \leq 2, \\ -x+5, & x > 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = \frac{x-4}{x+2}, x_1 = -2, x_2 = -1.$$

15-вариант

$$1. f(x) = \sin(x^2+5x), \varphi(x) = x^3-25x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x}}{\operatorname{tg} 2x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} x, & x < -2, \\ -x-1, & -2 \leq x \leq 1, \\ x^2-1, & x > 1. \end{cases}$$

$$4. f(x) = \frac{x-4}{x+3}, x_1 = -3, x_2 = -2.$$

16-вариант

$$1. f(x) = \cos x - \cos^3 x, \varphi(x) = 6x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{\sin 2x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} x+3, & x \leq 0, \\ -x^2+4, & 0 < x < 2, \\ x-2, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = \frac{x+5}{x-3}, x_1 = 3, x_2 = 4.$$

17-вариант

$$1. f(x) = \arcsin 2x, \varphi(x) = 8x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 27} \frac{\sin(x-3)}{x^3-27}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ x^2-1, & -1 < x \leq 2, \\ 2x, & x > 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 5^{\frac{4}{1-x}} + 1, \quad x_1 = 1, x_2 = 2.$$

18-вариант

$$1. f(x) = 1 - \cos 4x, \varphi(x) = x \sin 2x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 25} \frac{\operatorname{tg}(x+5)}{x^2-25}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 1-x, & x > \pi. \end{cases}$$

$$4. f(x) = \frac{4x}{x+5}, x_1 = -5, x_2 = -4.$$

19-вариант

$$1. f(x) = \sin x + \sin 5x, \varphi(x) = 2x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 2x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x \leq 0, \\ 0, & 0 < x \leq 2, \\ x-2, & x > 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 5^{\frac{1}{x-4}} - 2, \quad x_1 = 3, x_2 = 4.$$

20-вариант

$$1. f(x) = \frac{3x}{1-x}, \quad \varphi(x) = \frac{x}{4+x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\lg 3x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} x-3, & x < 0, \\ x+1, & 0 \leq x \leq 4, \\ 3+x, & x > 4. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 6^{\frac{1}{x-3}} + 3, \quad x_1 = 3, x_2 = 4.$$

21-вариант

$$1. f(x) = \cos 3x - \cos x, \quad \varphi(x) = 7x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 6x}{2x^2 - 3x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1, \\ 2x, & 1 < x \leq 3, \\ x+2, & x > 3. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 4^{\frac{1}{3-x}} + 2, \quad x_1 = 2, x_2 = 3.$$

22-вариант

$$1. f(x) = x^2 - \cos 2x, \quad \varphi(x) = 6x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{2x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 2, \\ x+1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 9^{\frac{1}{2-x}}, \quad x_1 = 0, x_2 = 2.$$

23-вариант

$$1. f(x) = \sqrt{1+x} - 1, \quad \varphi(x) = 2x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\arctg 2x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} -2(x+1), & x \leq -1, \\ (x+1)^3, & -1 < x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 2^{\frac{1}{x-5}} + 1, \quad x_1 = 4, x_2 = 5.$$

24-вариант

$$1. f(x) = \sqrt{9-x} - 3, \quad \varphi(x) = 2x.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{2x^2}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 2, & x < -1, \\ 1-x, & -1 \leq x \leq 1, \\ \ln x, & x > 1. \end{cases}$$

$$4. f(x) = 6^{\frac{2}{4-x}}, \quad x_1 = 3, x_2 = 4.$$

25-вариант

$$1. f(x) = \cos 3x - \cos 5x, \quad \varphi(x) = x^2.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{\sin 3x}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 2, \\ x+4, & x > 2. \end{cases}$$

$$4. f(x) = \frac{x+1}{x-2}, \quad x_1 = 2, x_2 = 3.$$

II б о б

БИР ЎЗГАРУВЧИ ФУНКЦИЯСИНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИСОБИ ВА УНИНГ ТАТБИҚЛАРИ


1-§. Ҳосила, унинг геометрик ва физик маъноси.

Дифференциаллаш қоидалари ва формуллари

$y = f(x)$ функциянинг орттирмаси

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

қўринишда ифодаланишини эслатиб ўтамиз, бунда Δx аргумент x нинг орттирмаси.



2-чизма

2-чизмадан

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \beta \quad (2.1)$$

тенгликни ёзиш мумкин.

Таъриф. $y = f(x)$ функциянинг x нуқтадаги ҳосиласи деб, шу нуқтадаги функция орттирмасининг уни шу орттирмага эриштирадиган аргумент орттирмасига нисбатининг ихтиёрий Δx нолга интилгандаги лимитига айтилади ва қуйидаги белгилашларнинг бири билан белгиланади:

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx}.$$

Шундай қилиб, таърифта кура:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

Агар (2.2) формуладаги лимит мавжуд бўлса, $f(x)$ функция x нуқтада дифференциалланувчи дейилади.

Ҳосилани топиш амали функцияни дифференциаллаш дейилади.

(2.1) тенглик ва ҳосила таърифидан x нуқтадаги ҳосила $y = f(x)$ функция графигидаги $M(x, y)$ нуқтадан ўтказилган уринманинг Ox ўқи билан ташкил этган α бурчаги

тангенсига тенг эканлиги келиб чиқади (2-чизмага қаранг). $y' = f'(x)$ ҳосилани физик нуқтаи назардан қараганимизда y функциянинг x нуқтадаги ўзгариш тезлигини билдиради.

Агар C — ўзгармас сон ва $u = u(x)$, $v = v(x)$ бирор дифференциалланувчи функциялар бўлса, y ҳолда қуйидаги дифференциаллаш қоидалари уринлидир:

- 1) $(C)' = 0$;
- 2) $(x)' = 1$;
- 3) $(u \pm v)' = u' \pm v'$;
- 4) $(Cu)' = Cu'$;
- 5) $(uv)' = u'v + uv'$;
- 6) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$;
- 7) $\left(\frac{C}{v}\right)' = -\frac{Cv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$;

8) агар $y = f(u)$ бўлиб, $u = \varphi(x)$ бўлса, яъни $y = f[\varphi(x)]$ мураккаб функция дифференциалланувчи функциялардан тузилган бўлса, y ҳолда

$$y_x = y_u \cdot u'_x \quad \text{ёки} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

9) агар $y = f(x)$ функция учун дифференциалланувчи $x = g(y)$ тескари функция мавжуд ва $\frac{dg}{dy} = g'(y) \neq 0$ бўлса, y ҳолда

$$f'(x) = \frac{1}{g'(y)}.$$

Ҳосила таърифи ва дифференциаллаш қоидаларидан фойдаланиб асосий элементар функцияларнинг ҳосилалари жадвалини тузиш мумкин:

- | | |
|--|---|
| 1) $(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$, $(\alpha \in R)$; | 2) $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$; |
| 3) $(e^u)' = e^u \cdot u'$; | 4) $(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$; |
| 5) $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$; | 6) $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$; |
| 7) $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$; | 8) $(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$; |

$$\begin{aligned}
 9) (\operatorname{ctgu})' &= \frac{-1}{\sin^2 u} \cdot u'; & 10) (\arcsin u)' &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'; \\
 11) (\arccos u)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'; & 12) (\operatorname{arctgu})' &= \frac{1}{1+u^2} \cdot u'; \\
 13) (\operatorname{arccctgu})' &= -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'; & 14) (\operatorname{shu})' &= \operatorname{chu} \cdot u'; \\
 15) (\operatorname{chu})' &= \operatorname{shu} \cdot u'; & 16) (\operatorname{thu})' &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \cdot u'; \\
 17) (\operatorname{cthu})' &= \frac{1}{\operatorname{sh}^2 u} \cdot u'.
 \end{aligned}$$

$y = f(x)$ эгри чизиқнинг $M_0(x_0; f(x_0))$ нуқтасидан ўтказилган уринма тенгламаси:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

$y = f(x)$ эгри чизиқнинг $M_0(x_0; f(x_0))$ нуқтасидан ўтказилган нормал (перпендикуляр) тенгламаси:

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

Агар $f'(x_0) = 0$ бўлса, нормал тенгламаси $x = x_0$ кўринишда бўлади.

Эгри чизиқ билан нуқта орасидаги бурчак деганда, шу нуқтадан ўтувчи уринма билан эгри чизиқ орасидаги бурчакни тушуниш керак.

1-мисол. Ҳосила таърифидан фойдаланиб (2.2 формулага қаранг) $y = \frac{2x}{3x+1}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. Ихтиёрий Δx орттирма учун функция орттирмасини топамиз:

$$\begin{aligned}
 \Delta y &= \frac{2(x+\Delta x)}{3(x+\Delta x)+1} - \frac{2x}{3x+1} = \frac{6x^2+6x\Delta x+2x+2\Delta x-6x^2-6x\Delta x-2x}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)} = \\
 &= \frac{2\Delta x}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)}.
 \end{aligned}$$

Иккала қисмини Δx га бўламиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)}.$$

Бу нисбатнинг $\Delta x \rightarrow 0$ да лимитини ҳисоблаймиз:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)} = \frac{2}{(3x+1)^2}.$$

2-мисол. $y = |x|$ функция ҳосиласининг $x = 0$ нуқтадаги қийматини топинг.

Ечиш. Эркин ўзгарувчи x нинг ихтиёрий орттирмасида функциянинг $x = 0$ нуқтадаги Δy орттирмаси $|\Delta x|$ га тенг:

$$\Delta y = |\Delta x| = \begin{cases} -\Delta x, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ \Delta x, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Ҳосила таърифига кўра:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} -1, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Бу эса $x = 0$ нуқтада $y = |x|$ функция ҳосилага эга эмаслигини билдиради.

Аммо, бу функция бу нуқтада узлуксиз, яъни

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta x| = 0.$$

Демак, x нуқтада узлуксиз бўлган ҳамма функциялар бу нуқтада дифференциалланувчи бўлавермас экан.

Машқлар

49. Ҳосила таърифидан фойдаланиб $y = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ функциянинг ҳосиласини топинг.

50. Ҳосила таърифидан фойдаланиб $y = \frac{3x-1}{2x+5}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

51. $y = \sqrt{x}$ функция $x = 0$ нуқтада узлуксиз ва дифференциалланувчи эканлигини кўрсатинг.

$$\begin{aligned}
 9) (\operatorname{ctgu})' &= \frac{-1}{\sin^2 u} \cdot u'; & 10) (\arcsin u)' &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'; \\
 11) (\arccos u)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'; & 12) (\operatorname{arctgu})' &= \frac{1}{1+u^2} \cdot u'; \\
 13) (\operatorname{arcctgu})' &= -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'; & 14) (\operatorname{shu})' &= \operatorname{chu} \cdot u'; \\
 15) (\operatorname{chu})' &= \operatorname{shu} \cdot u'; & 16) (\operatorname{thu})' &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \cdot u'; \\
 17) (\operatorname{cthu})' &= \frac{1}{\operatorname{sh}^2 u} \cdot u'.
 \end{aligned}$$

$y = f(x)$ эгри чизиқнинг $M_0(x_0; f(x_0))$ нуқтасидан ўтказилган уринма тенгламаси:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

$y = f(x)$ эгри чизиқнинг $M_0(x_0; f(x_0))$ нуқтасидан ўтказилган нормал (перпендикуляр) тенгламаси:

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

Агар $f'(x_0) = 0$ бўлса, нормал тенгламаси $x = x_0$ куришида бўлади.

Эгри чизик билан нуқта орасидаги бурчак деганда, шу нуқтадан ўтувчи уринма билан эгри чизик орасидаги бурчакни тушуниш керак.

1-мисол. Ҳосила таърифидан фойдаланиб (2.2 формулага қаранг) $y = \frac{2x}{3x+1}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. Ихтиёрий Δx орттирма учун функция орттирмасини топамиз:

$$\begin{aligned}
 \Delta y &= \frac{2(x+\Delta x)}{3(x+\Delta x)+1} - \frac{2x}{3x+1} = \frac{6x^2+6x\Delta x+2x+2\Delta x-6x^2-6x\Delta x-2x}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)} = \\
 &= \frac{2\Delta x}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)}.
 \end{aligned}$$

Иккала қисмини Δx га бўламиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)}.$$

Бу нисбатнинг $\Delta x \rightarrow 0$ да лимитини ҳисоблаймиз:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2}{(3x+3\Delta x+1)(3x+1)} = \frac{2}{(3x+1)^2}.$$

2-мисол. $y = |x|$ функция ҳосиласининг $x = 0$ нуқтадаги қийматини топинг.

Ечиш. Эркин узгарувчи x нинг ихтиёрий орттирмасида функциянинг $x = 0$ нуқтадаги Δy орттирмаси $|\Delta x|$ га тенг:

$$\Delta y = |\Delta x| = \begin{cases} -\Delta x, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ \Delta x, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Ҳосила таърифига кўра:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} -1, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Бу эса $x = 0$ нуқтада $y = |x|$ функция ҳосилага эга эмаслигини билдиради.

Аммо, бу функция бу нуқтада узлуксиз, яъни

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta x| = 0.$$

Демак, x нуқтада узлуксиз бўлган ҳамма функциялар бу нуқтада дифференциалланувчи бўлавермас экан.

Машқлар

49. Ҳосила таърифидан фойдаланиб $y = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ функциянинг ҳосиласини топинг.

50. Ҳосила таърифидан фойдаланиб $y = \frac{3x-1}{2x+5}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

51. $y = \sqrt[3]{x}$ функция $x = 0$ нуқтада узлуксиз ва дифференциалланувчи эканлигини кўрсатинг.

52. Куйидаги функцияларнинг ҳосиласини топинг:

1. $y = 5x^4 - 3\sqrt[3]{x^3} + \frac{7}{x^3} + 4$.
2. $y = 3x^2 + 5\sqrt{x^5} - \frac{4}{x}$.
3. $y = \sqrt{x^5} - \frac{2}{x^4} + 7x^5$.
4. $y = 4\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} + 3x^2$.
5. $y = (x^2 + 3x - 1)^4$.
6. $y = x^3 \sin x$.
7. $y = (x^9 + 1) \cos 5x$.
8. $y = x^3 \cdot \sin x \cdot \ln x$.
9. $y = x^2 \cdot \operatorname{tg} x \cdot e^{2x}$.
10. $y = \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1}$.
11. $y = \left(\frac{x^4 + 1}{x^4 - 4} \right)^3$.
12. $y = \frac{\sin^2 x}{x^2 + 1}$.
13. $y = \sqrt{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$.
14. $y = \sqrt[4]{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$.

53. $y = x^3 + 2x - 2$ эгри чизикқа абсциссаси $x_0 = 1$ булган нуқтадан ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

54. $y = \ln(x^2 - 4x + 4)$ эгри чизикқа абсциссаси $x_0 = 1$ булган нуқтадан ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

55. $y = x^2$ ва $x^2 + 2y^2 = 3$ тенгламалар билан берилган эгри чизикларнинг кесилган нуқталаридаги бурчакларни топинг.

56. Молдий нуқтанинг t вақт ичида босиб ўтган масофаси $s = \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{3}t^3 + 2t + 1$ га тенг. Берилган нуқтанинг тезлигини топинг.

57. Дифференциаллаш қоидалари ва формулаларидан фойдаланиб берилган функцияларнинг ҳосиласини топинг:

- 1) $y = x^3 \sin 3x$;
- 2) $y = x \sin^3 x$;
- 3) $y = x^2 \cos^2 3x$;
- 4) $y = e^x \operatorname{tg} 4x$;
- 5) $y = x \operatorname{ctg}^2 7x$;
- 6) $y = \sqrt{x} \cdot \cos \sqrt{x}$;
- 7) $y = 2^{-\cos^4 5x}$;
- 8) $y = (2^{x^4} - \operatorname{tg}^4 x)$;
- 9) $y = 2^{\frac{x}{\ln x}}$;
- 10) $y = 3^{\lg^3 5x}$;
- 11) $y = (2^{\lg 3x} + \operatorname{tg} 3x)^2$;
- 12) $y = x \cdot \sin^2 x \cdot 2^x$.

- 13) $y = \sin(\operatorname{tg} \sqrt{x})$;
- 14) $y = (\sin^3 x + \cos^3 x)$;
- 15) $y = x \sin 7x \operatorname{tg} x$;
- 16) $y = x \operatorname{ctg}^2 5x$;
- 17) $y = e^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$;
- 18) $y = e^{-\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$;
- 19) $y = x^3 e^{\lg^3 x}$;
- 20) $y = \ln(x^4 - \sin^3 x)$;
- 21) $y = \ln^3(x - 2^x)$;
- 22) $y = \log_3(x^2 + \sin 3)$.

2-§. Мураккаб курсаткичли ва ошқормас функцияларнинг ҳосилалари

1. Асоси ҳам, даража курсаткичи ҳам x нинг функцияси бўлган, яъни

$$y = [u(x)]^{v(x)} = u^v$$

куринишдаги функция **мураккаб курсаткичли** функция дейилади.

Масалан, $y = (\cos x)^{x^2}$, $y = x^{\cos x}$, $y = x^x$, $y = (\log x)^x$ шунга ўхшаш функциялар мураккаб курсаткичли функциялардир. Бундай функцияларнинг ҳосиласини топишда берилган функция логарифмининг ҳосиласини топишдан иборат булган усулни қўллаш кўпинча ҳисоблаш бирмунча соддалаштиради.

Масалан, $y = u^v$ функцияни логарифмлаб ҳосиласини топишдан куйидаги формулага эга бўламиз:

$$y' = u^v \ln u \cdot v' + v u^{v-1} \cdot u'$$

бунда $u = u(x)$ ва $v = v(x)$.

1-мисол. $y = (\sin 4x)^{x^3}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. Тенгликнинг иккала томонини логарифмлаймиз:

$$\ln y = x^3 \ln \sin 4x$$

Бу тенгликнинг иккала томонини x бўйича дифференциаллаймиз:

$$(\ln y)' = (x^3)' \cdot \ln \sin 4x + x^3 (\ln \sin 4x)'$$

Бундан

$$\frac{y'}{y} = 3x^2 \ln \sin 4x + 4x^3 \cdot \frac{1}{\sin 4x} \cos 4x.$$

Соддалаштирамиз:

$$y' = y(3x^2 \ln \sin 4x + 4x^3 \operatorname{ctg} 4x).$$

у ўрнига $y = (\sin 4x)^{x^3}$ ифодани қўйиб, ушбу натижани ҳосил қиламиз:

$$y' = (\sin 4x)^{x^3} (3x^2 \ln \sin 4x + 4x^3 \operatorname{ctg} 4x).$$

2. Иккита x ва y ўзгарувчилар орасидаги боғланиш

$$F(x, y) = 0 \quad (2.3)$$

тенглама кўринишида берилган бўлсин.

(2.3) ошқормас функцияни ошқор кўринишга келтирмасдан ҳосиласини топиш қоидасини кўрсатамиз.

у ни x нинг функцияси деб (2.3) тенгламанинг иккала қисмини дифференциаллаш, сўнгра ҳосил қилинган тенгламадан y' ни топиш керак. Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

2-мисол. $x^4 + y^4 - 3xy = 0$ ошқормас функциянинг y' ҳосиласини топим.

Ечиш. у ни x нинг функцияси деб берилган тенгламанинг иккала қисмини дифференциаллаймиз:

$$4x^3 + 4y^3 \cdot y' - 3y - 3xy' = 0.$$

Бундан эса

$$y' = \frac{4x^3 - 3y}{3x - 4y^3}$$

ни топамиз.

Машқлар

58. Берилган функцияларни логарифмлаб сўнгра ҳосиласини топим:

$$1) y = 3x^2 - \operatorname{tg}^4 2x; \quad 2) y = x^3 \operatorname{th}^3 x;$$

$$3) y = \lg^4(x^5 - \sin^2 2x); \quad 4) y = \operatorname{arctg} \sqrt{1 + e^{-x^2}};$$

$$5) y = x^3 \ln^2(\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x); \quad 6) y = (\sin 3x)^{\cos 5x};$$

$$7) y = (x^3 + 1)^{\operatorname{tg} 2x}; \quad 8) y = (\operatorname{tg} 3x)^{x^2};$$

$$9) y = (1 + x^4)^{\operatorname{tg} 7x}; \quad 10) y = (\operatorname{ctg} 5x)^{x^3 - 1}.$$

59. Қуйидаги ошқормас кўринишда берилган функцияларнинг ҳосиласини топим:

$$1) \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = a; \quad 2) y^2 + x^2 - \sin(x^2 - y^2) = 5;$$

$$3) 2^x + 2^y = 2^{x+y}; \quad 4) e^{xy} - x^4 + y^4 = 5;$$

$$5) e^{xy} - x^3 - y^3 = 3; \quad 6) xy - \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = 3.$$

3-§. Юқори тартибли ҳосилалар

1. Биринчи тартибли ҳосиладан олинган ҳосила, яъни

$$(y')' = (f'(x))' \text{ ёки } y'' = f''(x)$$

ҳосила $y = f(x)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи дейилади ва y'' , $f''(x)$, $\frac{d^2 y}{dx^2}$ белгиларнинг бири билан белгиланади.

Иккинчи тартибли ҳосиланинг ҳосиласига учинчи тартибли ҳосила дейилади ва y''' , $f'''(x)$, $\frac{d^3 y}{dx^3}$ белгиларнинг бири билан белгиланади.

Умуман, $y = f(x)$ функциянинг n -тартибли ҳосиласи деб, унинг $(n-1)$ -тартибли ҳосиласининг ҳосиласига айтилади ва $y^{(n)}$, $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^n y}{dx^n}$ белгиларнинг бири билан белгиланади.

1-мисол. $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топим.

Ечиш. Дастлаб ҳосилалар жадвалидан фойдаланиб биринчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \cdot (x + \sqrt{x^2 + a^2})' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

Ҳосил булган натижадан яна ҳосила оламиз:

$$y'' = (y')' = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}\right)' = \left((x^2 + a^2)^{-\frac{1}{2}}\right)' =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot (x^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{x}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}}.$$

2-мисол. $y = (2x - 1)^4$ функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларининг $x_1 = 1$, $x_2 = -1$ нуқталардаги қийматларини ҳисобланг.

Ечиш. Биринчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y' = 8(2x - 1)^3.$$

$$x_1 = 1 \text{ да } y'(1) = 8; x_2 = -1 \text{ да } y'(-1) = -216.$$

Энди иккинчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y'' = 48(2x - 1)^2; x_1 = 1 \text{ да } y''(1) = 48,$$

$$x_2 = -1 \text{ да } y''(-1) = 432.$$

3-мисол. $y = \sin x$ функциянинг n -тартибли ҳосиласини топинг.

Ечиш.

Берилган функцияни кетма-кет n марта дифференциаллаб топамиз:

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = \cos x \left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = \cos x \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\dots \dots \dots y^{(n)} = \cos\left(x + (n-1) \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

2. Параметрик берилган функцияларнинг ҳосилалари.

Агар x нинг функцияси у ушбу

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (2.4)$$

параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, (2.4) ифодада функциянинг параметрик кўринишидаги берилиши дейилади.

Бу ҳолда у нинг x бўйича ҳосиласи y'_x

$$y'_x = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} \quad (2.5)$$

тенглик билан аниқланади.

Иккинчи ҳосила y'' ёки $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ни топиш учун x нинг функцияси t эканлигини назарда тутиб, (2.5) тенгликни x бўйича дифференциаллаймиз:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dx}{dt} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2}$$

ёки

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\varphi'(t) \cdot \psi''(t) - \psi'(t) \cdot \varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \quad (2.6)$$

Шунга ўхшаш $\frac{d^3 y}{dx^3}$, $\frac{d^4 y}{dx^4}$ ва ҳокасо ҳосилаларни топиш мумкин.

4-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x = \sin^2 t, \\ y = \sin 2t \end{cases}$$

параметрик тенгламалари билан берилган y функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

Ечиш.

I усул. (2.6) формула бўйича ҳосилаларни топиб, сўнгра ўрнига қўямиз:

$$x_t' = 2 \sin t \cos t = \sin 2t, \quad x_t'' = 2 \cos 2t,$$

$$y_t' = 2 \cos 2t, \quad y_t'' = -4 \sin 2t,$$

$$y'' = \frac{\sin 2t (-4 \sin 2t) - 2 \cos 2t \cdot 2 \cos 2t}{(\sin 2t)^3} = \frac{-4(\sin^2 2t + \cos^2 2t)}{\sin^3 2t} = -\frac{4}{\sin^3 2t}.$$

II усул. Биринчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y' = \frac{y_t'}{x_t'} = \frac{2 \cos 2t}{\sin 2t} = 2 \operatorname{ctg} 2t,$$

Бу ҳосилани

$$\begin{cases} y' = 2 \operatorname{ctg} 2t, \\ x = \sin^2 t \end{cases}$$

кўринишда параметрик берилган функция деб қараб, (2.5) формула бўйича иккинчи ҳосилани топамиз:

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(y')_t'}{x_t'} = \frac{(2 \operatorname{ctg} 2t)'}{\sin^2 t} = \frac{-2 \frac{2}{\sin^2 2t}}{2 \sin t \cos t} = -\frac{\frac{4}{\sin^2 2t}}{\sin 2t} = -\frac{4}{\sin^3 2t}.$$

Кўриб турганимиздек, натижалар бир хил.

Машқлар

60. Қуйидаги функцияларнинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг:

- 1) $y = (1 + 4x^2) \operatorname{arctg} 2x;$
- 2) $y = (x^2 + 1) \ln(1 + x^2);$
- 3) $y = e^{-3x} (\cos 2x + \sin 2x);$
- 4) $y = \sqrt{1 - 4x^2} \cdot \arcsin 2x.$

61. Қуйидаги тенгламалар билан берилган функцияларнинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг:

$$1) \begin{cases} y = t^3 + t^2 - 1, \\ x = t^2 + t + 1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} y = 2 \sin^3 t, \\ x = 2 \cos^3 t; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y = t^3 + t, \\ x = t^2 - 2t; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} y = t^3 + t^2 + 1, \\ x = \frac{1}{t}; \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} y = (2t + 1) \cos t, \\ x = \ln t; \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} y = 1 - \cos t, \\ x = t - \sin t. \end{cases}$$

62. $x^4 - xy + y^4 - 1 = 0$ тенглама билан берилган функция иккинчи тартибли ҳосиласининг $M(0;1)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

63. $e^x + y - x = 0$ тенглама билан берилган функция иккинчи тартибли ҳосиласининг $N(1;0)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

64. $x^3 + y^3 - xy = 1$ ва $x^2 + 2y^2 - xy + x + y = 4$ тенгламалар билан берилган функциялар иккинчи тартибли ҳосилаларининг $Q(1;1)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

65. Нуқтанинг Ox бўйича ҳаракат тенгламаси $x = 100 - 5t - 0,001t^3$ берилган (бунда x — метрда, t — секундда). Бу нуқтанинг вақтнинг $t_0 = 0$, $t_1 = 1$, $t_2 = 10$ с пайтлардаги тезлиги ва тезланишларини топинг.

4-§. Функциянинг биринчи ва юқори тартибли дифференциали ва унинг татбиқи

Ҳосила таърифига кўра

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

лимитнинг таърифига асосан

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = y' + \varepsilon(x)$$

ёки

$$\Delta y = y' \Delta x + \varepsilon(x) \Delta x \quad (2.7)$$

ифодага эга буламиз (бунда $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$). (2.7) тенгликдан кўриниб турибдики, функция орттирмаси Δy ни икки қисмга ажратиш мумкин. Биринчи қисм эрки ўзгарувчининг орттирмаси Δx га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик миқдордан иборат. Биринчи қисм $y' \Delta x$ функция орттирмасининг асосий қисми (бош қисми) ёки дифференциали дейилади ва

$$dy = y' \Delta x \quad (2.8)$$

каби белгиланади. Эрки ўзгарувчининг дифференциали унинг орттирмасига тенг, яъни $dx = \Delta x$. У ҳолда (2.8) ифода

$$dy = y' dx \text{ ёки } dy = f'(x) dx \quad (2.9)$$

каби ёзилади.

Юқори тартибли дифференциаллар қуйидагича аниқланади:

$$d^2 y = d(dy); d^3 y = d(d^2 y), \dots, d^n y = d(d^{n-1} y).$$

Агар $y = f(x)$ функция берилган бўлса, унинг юқори тартибли дифференциаллари қуйидагича аниқланади:

$$d^2 y = f''(x) dx^2, d^3 y = f'''(x) dx^3, \dots, d^n y = f^{(n)}(x) dx^n.$$

Агар $y = f(u)$, бунда $u = \varphi(x)$ бўлса, $dy = f'(u) du$, $du = \varphi'(x) dx$, $d^2 y = y''(du)^2 + y' d^2 u$ ва ҳоказо.

(2.9) формуладан кўриниб турибдики, функциянинг дифференциалини топиш учун унинг ҳосиласини топиб, ҳосилани эрки ўзгарувчининг орттирмасига кўпайтириш керак экан.

1-мисол $y = \sin^3 x$ функциянинг дифференциалини топиш.

Ечиш. Берилган функциянинг ҳосиласини топамиз:

$$y' = 4\sin^2 x \cos x \cdot 1.$$

(2.9) формулага кўра функция дифференциали:

$$dy = 12\sin^2 x \cdot \cos x dx$$

га тенг.

2-мисол $y = \ln(1 + x^3)$ функциянинг иккинчи тартибли дифференциалини топиш.

Ечиш. Функциянинг биринчи тартибли ҳосиласини топамиз:

$$y' = \frac{3x^2}{1+x^3}.$$

Энди y' функциядан ҳосила олиб, иккинчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y'' = \frac{6x(1+x^3) - 3x^2 \cdot 3x^2}{(1+x^3)^2} = \frac{6x + 6x^4 - 9x^4}{(1+x^3)^2} = \frac{6x - 3x^4}{(1+x^3)^2}.$$

Демак,

$$d^2 y = \frac{3x(2-x^3)}{(1+x^3)^2} dx^2.$$

$y = f(x)$ функциянинг бирор x нуқтадаги қиймати ва ҳосиласи берилган бўлсин. $f(x + \Delta x)$ функциянинг бирор $x + \Delta x$ нуқтага яқин қийматини қандай топишни курсатамиз. $\Delta y \approx dy$ ёки $\Delta y \approx f'(x) \Delta x$ тенгсизликдан фойдаланамиз. $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ бўлгани сабабли $f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x$, бундан

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x. \quad (2.10)$$

(2.10) формула эрки ўзгарувчи x нинг кичик орттирмаси Δx учун функция қийматини топишда кенг қўлланилади.

3-мисол. Агар кубнинг ҳажми 27 м^3 дан $27,1 \text{ м}^3$ га ортганлиги маълум бўлса, унинг томонининг орттирмасини ҳисобланг.

Ечиш. Агар кубнинг ҳажми x бўлса, унинг томони $y = \sqrt[3]{x}$ бўлади. Масала шартига кўра: $x = 27$, $\Delta x = 0,1$. Куб томонининг орттирмаси

$$\Delta y \approx dy = y'(x) \Delta x = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} \cdot 0,1 = \frac{0,1}{27} \approx 0,0037 \text{ м}$$

ни ташкил этади.

4 - м и с о л . Баландлиги $H = 40$ см, асосининг радиуси $R = 30$ см бўлган цилиндр берилган. Асос радиусини $0,5$ см га орттирилганда цилиндр ҳажмининг қанчалик ортишини тақрибий ҳисобланг.

Е ч и ш . H баландлиқ ўзгармас ва асос радиуси ўзгарувчи бўлганда V ҳажм R нинг функцияси бўлади: $V = \pi H \cdot R^2$. Ҳажмнинг ΔV орттирмасини топиш учун dV ни ΔV билан алмаштирамиз:

$$\Delta V \approx 2\pi HR\Delta R.$$

Масала шартига кўра $H = 40$ см, $R = 30$ см ва $\Delta R = 0,5$ см бўлгани учун

$$\Delta V \approx 2\pi \cdot 40 \cdot 30 \cdot 0,5 = 1200\pi \approx 3770 \text{ (см}^3\text{)}.$$

Тақрибий ҳисоблашларда у ёки бу сабабларга кўра хатоликларга йўл қўйилади. Уларни абсолют ва нисбий хатоликларга бўлиш мумкин.

1. Абсолют хатолик. Агар аргументнинг абсолют хатоси ϵ_x берилган бўлса, функциянинг ϵ_y абсолют хатоси функция дифференциали ёрдамида ҳисобланади.

Амалий масалаларда аргументнинг қийматлари ўлчашлар ёрдамида аниқланади ва унинг абсолют хатоси ҳам топилади.

Функциянинг абсолют хатоси қуйидагича аниқланади:

$$|f(x) - f(x_0)| = |f'(x_0)| \cdot |dx| < |f'(x_0)| \cdot \epsilon_x,$$

бундан

$$\epsilon_y = |f'(x_0)| \cdot \epsilon_x.$$

2. Нисбий хатолик. Нисбий хатолик деб ϵ_y абсолют хатоликнинг ўлчанаётган катталикнинг тақрибий қиймати $f(x_0)$ модулига нисбатига айтилади ва қуйидагича белгиланади:

$$\delta_y = \frac{\epsilon_y}{|f(x_0)|} = \frac{|f'(x_0)|}{|f(x_0)|} \cdot \epsilon_x = |(\ln f(x_0))'| \cdot \epsilon_x.$$

5 - м и с о л . $\sin 31^\circ$ нинг тақрибий қийматини топинг.

Е ч и ш . $x = \frac{\pi}{6}$ деб оламиз, у ҳолда

$$\Delta x = 1^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0,017.$$

Демак, аргументнинг абсолют хатоси $\epsilon_x = 0,017$.

$$\begin{aligned} \sin 31^\circ &= \sin(30^\circ + 1^\circ) \approx \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \cdot 0,017 = \\ &= 0,5 + 0,017 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,515. \end{aligned}$$

Функциянинг абсолют хатоси:

$$\epsilon_y = \left| \cos \frac{\pi}{6} \right| \cdot 0,017 = 0,015.$$

Нисбий хато:

$$\delta_y = \frac{0,015}{0,5} \cdot 100\% = 3\%.$$

Машқлар

66. Қуйидаги функцияларнинг биринчи тартибли дифференциалларини топинг:

- 1) $y = x \operatorname{tg}^3 x$; 2) $y = \sqrt{\operatorname{arctg} x} + (\arcsin x)^2$;
- 3) $y = \ln(x + \sqrt{4 + x^2})$; 4) $y = \frac{a}{x} + \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$;
- 5) $y = \frac{b}{x^2} - \operatorname{arctg} \frac{a}{x}$; 6) $y = \sqrt[3]{(x+1)^3 - \sqrt{x^5 + 1}}$;
- 7) $y = (x^2 - 1)^2 - x^4$; 8) $y = \cos 2x - \ln \sin 4x$;
- 9) $x^2 y^2 = (a+x)^3(a-x)$; 10) $y = \ln(1 + e^{10x}) + \operatorname{arctg} e^{3x}$.

67. Қуйидаги функцияларнинг иккинчи тартибли дифференциалларини топинг:

- 1) $y = 3x^3 + x^3 - 2x + 5$; 2) $y = \ln(3^x - \cos 2x)$;
- 3) $y = x^2 e^{2x}$; 4) $y = \operatorname{arctg}(3x + \sqrt{x})$;
- 5) $y = e^{-x} \cdot \sin 2x$; 6) $y = x^3 \cdot \sin(4x + 1)$.

68. Куйидаги функцияларнинг учинчи тартибли дифференциалларини топинг:

$$1) y = \sin^2 2x; \quad 2) y = \frac{\ln x}{x}; \quad 3) y = x^2 \ln x.$$

69. $y = x^3 - 4x^2 + 5x + 3$ функциянинг $x = 1,03$ да тақрибий қийматини вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан топинг.

70. $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ функциянинг $x = 0,1$ да тақрибий қийматини вергулдан кейинги учта рақамигача аниқлик билан топинг.

71. $y = \sqrt{x^2 - 7x + 10}$ функциянинг $x = 0,98$ да тақрибий қийматини вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан топинг.

72. Куйидаги ифодаларнинг тақрибий қийматини вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан топинг.

$$a) y = \sqrt[3]{17}; \quad б) y = \sqrt{82}; \quad в) \sin 61^\circ; \quad г) \operatorname{tg} 31^\circ.$$

5-§. Дифференциалланувчи функциялар ҳақида баъзи теоремалар. Лопиталь қоида

1. **Ролль теоремаси.** Агар $y = f(x)$ функция $[a; b]$ кесмада аниқланган ва узлуксиз бўлиб, шу кесманинг ички нуқталарида дифференциалланувчи ва $f(a) = f(b)$ бўлса, у ҳолда камида битта $x = c$ ($a < c < b$) нуқта топиладики, бу нуқтада $f'(c) = 0$ бўлади.

2. **Лагранж теоремаси** Агар $y = f(x)$ функция $[a; b]$ кесмада аниқланган ва узлуксиз, шу кесманинг ички нуқталарида дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда бу кесмада энг камида битта $x = c$ ($a < c < b$) нуқта топиладики, бу нуқтада

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad (2.11)$$

тенглик уринли бўлади.

(2.11) формула Лагранж формуласи ёки чекли ортгирмалар формуласи дейилади.

3. **Коши теоремаси.** Агар $y = f(x)$ ва $y = \varphi(x)$ функциялар $[a; b]$ кесмада узлуксиз ва унинг барча ички нуқталарида дифференциалланувчи ҳамда шу кесмада $\varphi'(x) \neq 0$ бўлса, у ҳолда шу кесмада энг камида битта $x = c$ ($a < c < b$) нуқта топиладики, бу нуқтада куйидаги тенглик уринли бўлади:

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)} \quad (2.12)$$

4-теорема. **Лопиталь қоида.** $\frac{0}{0}$ ва $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларни ечиш. Агар $y = f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар $x = x_0$ нуқтанинг бирор атрофида Коши теоремасининг шартларини қаноатлантирса, $x \rightarrow x_0$ да $\lim f(x) = 0$, $\lim \varphi(x) = 0$ (ёки $+\infty$ га) интилса ва $\lim \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ лимит мавжуд бўлса, у ҳолда $\lim \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ лимит ҳам мавжуд бўлиб, бу лимитлар узаро тенг бўлади, яъни

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

Лопиталь қоида $x_0 \rightarrow +\infty$ бўлганида ҳам уринлидир.

Агар $f'(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$ (ёки ∞) бўлса ва теорема шартларида $y = f(x)$ ва $y = \varphi(x)$ функцияларга қўйилган шартларни $f''(x)$ ва $\varphi''(x)$ ҳосилалар ҳам қаноатлантирса, у ҳолда $\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ нисбатга Лопиталь қоидасини қўлланиб $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{\varphi''(x)}$ формулага эга бўламиз ва ҳоказо.

1-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\sin 6x}$ ни ҳисобланг.

Ечиш. Берилган касрнинг сурат ва махражи узлуксиз, дифференциалланувчи ва лимити нолга тенг, яъни $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Шунинг учун унга Лопиталь қоидасини қўллаш мумкин:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\sin 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{4x} - 1)'}{(\sin 6x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{4x}}{6 \cos 6x} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ва $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ бўлса, у ҳолда $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функцияларнинг кўпайтмасидан $0 \cdot \infty$ кўринишдаги аниқмасликка эга бўламиз.

Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ва $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ бўлса, у ҳолда бу функцияларнинг айирмасидан $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмасликка эга бўламиз.

Иккала ҳолда ҳам, яъни $0 \cdot \infty$ ёки $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмасликларни ечиш учун уларни алгебраик ўзгаришлар ёрдамида $\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишга келтирилади.

2-мисол. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x}$ лимитни ҳисобланг.

Ечиш. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ бўлгани учун $0 \cdot \infty$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x)'}{(e^x)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{\infty} = 0. \end{aligned}$$

3-мисол. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ лимитни топинг.

Ечиш. $x \rightarrow 1$ да $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Қавс ичидаги ифодани умумий махражга келтирамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}.$$

Натижада $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эга бўлди. Энди унга Лопиталь қондасини татбиқ этамиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x \ln x - x + 1)'}{((x-1) \ln x)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + \frac{x-1}{x}}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(\ln x)' + \left(\frac{x-1}{x} \right)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$[f(x)]^{\varphi(x)}$ кўринишдаги функцияларни қараймиз, бунда қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

1. Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ бўлса, 0^0 кўринишдаги аниқмасликка эга бўламиз.

2. Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ бўлса, 1^∞ кўринишдаги аниқмасликка эга бўламиз.

3. Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ бўлса, ∞^0 кўринишдаги аниқмасликка эга бўламиз.

Бундай аниқмасликларни ечиш учун логарифмлаш усулидан фойдаланиб уларни юқорида кўрилган аниқмасликка келтирилади. Ушбу

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{\varphi(x)} = A$$

белгилашни киритамиз ва унинг ҳар иккала қисмини логарифмлаймиз ва логарифмнинг хоссаларидан фойдаланамиз:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [\varphi(x) \cdot \ln f(x)] = \ln A.$$

Бу $0 \cdot \infty$ кўринишдаги аниқмасликдан иборат. Уни $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишга келтириб ечилади:

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x)}{\frac{1}{\varphi(x)}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

4-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$ лимитни ҳисобланг.

Ечиш. Изланаётган ифоданинг лимитини A деб белгилаб оламиз ва иккала қисмини логарифмлаймиз:

$$\begin{aligned} \ln A &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln (e^x + x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (e^x + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln (e^x + x))'}{x'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{e^x + x} = 2. \end{aligned}$$

Демак, $\ln A = 2$, бундан $A = e^2$.

Машқлар

73. $f(x) = x - x^3$ функция $[-1;0]$ ва $[0;1]$ кесмаларда Ролль теоремаси шартларини қаноатлантиришини курсатинг ва унга мос C нинг қийматини топинг.

74. $[1;e]$ кесмада $y = \ln x$ функция учун Лагранж теоремаси тўғрилигини текширинг.

75. $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада $f(x) = \sin x$ ва $\varphi(x) = x + \cos x$ функциялар учун Коши теоремаси тўғрилигини текширинг.

76. Қуйидаги лимитларни топинг:

а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x^2 + 4x + 2}{x^3 - 5x + 4}$

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3}$

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - 1}{\lg 3x}$

г) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

д) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{1+x} \right)^x$

е) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\lg x)^{2x-\pi}$

ж) $\lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a} \right)^{\frac{1}{2x-a}}$

77. Қуйидаги лимитларни топинг:

а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{x \sin 7x}$

б) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{1}{x}}$

в) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4}}{x-2}$

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right)^{e^x}$

д) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{3}{x} \right)$

е) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

6-§. Функцияларни текшириш ва уларнинг графикларини ясашга ҳосиланинг татбиқи

1-таъриф. Агар x аргументнинг $(a;b)$ интервалдаги катта (кичик) қийматига функциянинг катта (кичик) қиймати мос келса, яъни $x_1 < x_2$ да $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$) бўлса, $y = f(x)$ функция *ўсувчи* (*камаювчи*) дейилади.

Функциянинг ўсиш (камайиш) аломатларини курсатамиз.

1. Агар дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция $[a;b]$ кесмада ўсувчи (камаювчи) бўлса, унинг шу кесмадаги ҳосиласи мусбат (манфий), яъни $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) бўлади.

2. Агар $[a;b]$ кесмада узлуксиз ва кесманинг ички нуқталарида дифференциалланувчи функция мусбат (манфий) ҳосиллага эга бўлса, $y = f(x)$ функция шу кесмада *ўсувчи* (*камаювчи*) бўлади.

Агар ихтиёрий $x_1 < x_2$ лар учун $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) \geq f(x_2)$) бўлса, $y = f(x)$ функция бирор интервалда *камаймайдиган* (*ўсмайдиган*) функция дейилади.

Функциянинг камаймайдиган ёки ўсмайдиган интерваллари унинг *монотонлик интерваллари* дейилади.

Агар берилган кесмада $y = f(x)$ функция фақат ўсувчи ёки фақат камаювчи бўлса, шу кесмада $y = f(x)$ функция *монотон* дейилади.

Функциянинг монотонлик характери функциянинг ҳосиласи ишорасини ўзгартирмайдиган нуқталарда ўзгариши мумкин.

Функциянинг биринчи тартибли ҳосиласини нолга айлантирадиган ёки ўзилишга эга буладиган нуқталари $y = f(x)$ функциянинг *критик нуқталари* дейилади.

1-мисол. $y = 2x^2 - \ln x$ функциянинг монотонлик интерваллари ва критик нуқталарини топинг.

Еч иш. Берилган функция $x > 0$ да аниқланган. Унинг ҳосиласини топамиз:

$$y' = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}$$

$$y' = 0, 4x^2 - 1 = 0, \text{ бундан } x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = -\frac{1}{2}$$

$x_2 = -\frac{1}{2}$ критик нуқта функциянинг аниқланиш соҳасига кирмагани учун уни ташлаб юборамиз. Топилган $x_1 = \frac{1}{2}$ критик нуқта функциянинг аниқланиш соҳасини $(0; \frac{1}{2})$ ва $(\frac{1}{2}; +\infty)$ интервалларга бўлади.

Бу интервалларда y' ҳосиланинг ишорасини аниқлаймиз.

а) $(0; \frac{1}{2})$ да $y'(\frac{1}{3}) = -\frac{5}{3} < 0$, б) $(\frac{1}{2}; +\infty)$ да $y'(1) = 3 > 0$.

Бу эса биринчи интервалда функция камаювчи, иккинчи интервалда ўсувчи эканини билдиради.

2-таъриф. Агар ихтиёрий кичик $|\Delta x| \neq 0$ аргумент орттирмаси учун $f(x_1 + \Delta x) < f(x_1)$ ($f(x_1 + \Delta x) > f(x_1)$) тенгсизлик бажарилса, у ҳолда x_1 нуқта $y = f(x)$ функциянинг *локал максимуми* (*локал минимуми*) дейилади.

Функциянинг локал максимуми ва локал минимуми унинг *локал экстремуми* дейилади.

1-теорема (функция экстремуми мавжуд бўлишининг зарурий шarti). Агар $y = f(x)$ функция $x = x_0$ нуқтада экстремумга эга бўлса, у ҳолда $f'(x_0) = 0$ бўлади ёки $f'(x_0)$ мавжуд бўлмайди.

Экстремум нуқтасидан дифференциалланувчи функция графигига ўтказилган уринма Ох ўқига параллел бўлади.

2-мисол. $y = (x+2)^3$ функциянинг экстремумини текширинг.

Ечиш. Берилган функциянинг ҳосиласини топамиз:

$$y' = 3(x+2)^2, y' = 0, x_1 = -2.$$

$x_1 = -2$ нуқтада берилган функция экстремумга эга эмас, чунки $x > -2$ да $y = (x+2)^3 > 0$, $x < -2$ да $y = (x+2)^3 < 0$, $x = -2$ да $y = (x+2)^3 = 0$.

Демак, функциянинг ҳосиласини нолга айлантирадиган нуқтанинг мавжуд бўлиши функциянинг экстремуми мавжуд бўлади. дейиш нотўғри экан.

2-теорема (локал экстремум мавжудлигини етарли шarti). $y = f(x)$ функция $x = x_0$ критик нуқта бўлган бирор интервалда узлуксиз ва бу интервалнинг ҳамма нуқталарида дифференциалланувчи бўлсин. Агар $x < x_0$ да $f'(x) > 0$ мусбат, $x > x_0$ да $f'(x) < 0$ манфий бўлса, у ҳолда $y = f(x)$ функция максимумга эга бўлади. Агар $x < x_0$ да $f'(x) < 0$ манфий, $x > x_0$ да $f'(x) > 0$ мусбат бўлса, $y = f(x)$ функция минимумга эга бўлади.

Теоремада кўрсатилган тенгсизлик $f'(x) > 0$ ёки $f'(x) < 0$ $x = x_0$ критик нуқтанинг етарлича кичик атрофида бажарилиши кераклигини эслатиб ўтамиз.

$y = f(x)$ функциянинг экстремумларини биринчи ҳосила ёрдамида топиш учун қуйидаги амалларни бажариш керак.

1. Берилган функциянинг биринчи тартибли y' ҳосиласи топилади.

2. y' ҳосилани нолга айлантирадиган критик ва $f'(x)$ мавжуд бўлмаган нуқталари топилади.

3. Ҳар бир критик нуқтадан чап ва ўнг томонда $f'(x)$ нинг ишораси аниқланади; $y = f(x)$ функция x_1, x_2, x_3 критик нуқталарга эга бўлса, у ҳолда қуйидаги ҳоллардан бири бўлиши мумкин.

а) агар x_1 критик нуқтанинг чап томонида ҳосиланинг ишораси мусбат, ўнг томонида манфий бўлса, бу нуқтада $f(x)$ функция локал максимумга эришади;

б) агар x_2 критик нуқтанинг чап томонида ҳосиланинг ишораси манфий, ўнг томонида мусбат бўлса, бу нуқтада $f(x)$ функция локал минимумга эришади;

в) агар x_3 критик нуқтанинг чап ва ўнг томонида ҳосиланинг ишораси бир хил бўлса, бу нуқтада функция экстремумга эришмайди.

Функция экстремумини биринчи тартибли ҳосила ёрдамида текширишни қуйидаги жадвал (2.1-жадвалга қаранг) кўринишда ёзиш мумкин.

2.1-жадвал

Критик нуқта x_i дан ўтишда $f'(x)$ ҳосиланинг ишораси			Критик нуқтанинг характери
$x < x_i$	$x = x_i$	$x > x_i$	
+	$f'(x_i) = 0$ ёки узилиш нуқтаси	—	Максимум нуқтаси
—	$f'(x_i) = 0$ ёки узилиш нуқтаси	+	Минимум нуқтаси
+	$f'(x_i) = 0$ ёки узилиш нуқтаси	+	Экстремум йўқ (функция ўсади)
—	$f'(x_i) = 0$ ёки узилиш нуқтаси	—	Экстремум йўқ (функция камаяди)

3-мисол. Ушбу $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1 = 0$ функциянинг максимум ва минимумини текширинг ва графигини ясанг.

Ечиш. 1) Биринчи ҳосилани топамиз: $y' = x^2 - 4x + 3$.

2) $y' = 0$ ёки $x^2 - 4x + 3 = 0$ тенгламанинг ҳақиқий иллизларини, яъни критик нуқталарни топамиз: $x_1 = 1, x_2 = 3$.

Ҳосила сонлар ўқининг ҳамма нуқталарида узлуксиз. Узилиш нуқтаси йуқ. Шунинг учун $x_1 = 1$, ва $x_2 = 3$ критик нуқтадан бошқа критик нуқта йуқ.

3) Сонлар ўқини бу нуқталар ёрдамида учта интервалга бўламиз ва бу интервалларнинг ҳар бирида берилган функция ҳосиласининг ишорасини аниқлаймиз. $y' = (x-1)(x-3)$.

а) $]-\infty; 1[$ да $f'(0) = 3 > 0$,

б) $]1; 3[$ да $f'(2) = -1 < 0$,


в) $]3; +\infty[$ да $f'(4) = 3 > 0$.

Демак, $x_1 = 1$ қийматда функция максимум, $x_2 = 3$ қийматда минимумга эришади. Функциянинг критик нуқталардаги қийматларини топаемиз:

$$y_{\max} = y|_{x=1} = f(1) = \frac{7}{3}, \quad y_{\min} = y|_{x=3} = f(3) = 1.$$

Баъзи ҳолларда $y = f(x)$ функциянинг критик нуқталарида локал максимум ёки локал минимумга эга бўлишини иккинчи ҳосила ёрдамида текшириш осонроқ бўлади.

3-теорема. $y = f(x)$ функциянинг биринчи тартибли ҳосиласи нолга тенг ($f'(x_0) = 0$) бўлиб, иккинчи тартибли ҳосиласи мавжуд ва нолдан фарқли ($f''(x) \neq 0$) бўлсин. Агар $f''(x) < 0$ бўлса, y ҳолда $x = x_0$ нуқтада функция максимумга эга, агар $f''(x) > 0$ бўлса, y ҳолда $x = x_0$ нуқтада функция минимумга эга бўлади.



3-чизма.

$f''(x) = 0$ бўлганда, $x = x_0$ нуқта экстремал нуқта бўлмаслиги мумкин. Функциянинг экстремумини иккинчи ҳосила ёрдамида текширишни қуйидаги жадвал-схема куринишда ёзиш мумкин (2.2 жадвал).

2.2-жадвал

$f'(x_0)$	$f''(x_0)$	Критик нуқтанинг характери
0	-	Максимум нуқтаси
0	+	Минимум нуқтаси
0	0	Номавълум

$y = f(x)$ функциянинг экстремумларини иккинчи тартибли ҳосила ёрдамида топиш учун қуйидаги амалларни бажариш керак:

- 1) биринчи тартибли ҳосилани топиш;
- 2) ҳосилани нолга айлантирадиган критик нуқталарининг сонини аниқлаш;
- 3) иккинчи тартибли ҳосилани топиш;
- 4) топилган критик нуқталарда иккинчи тартибли ҳосила ишорасини аниқлаш.

4-мисол. Иккинчи тартибли ҳосила ёрдамида $y = x^2 - e^{-x}$ функциянинг экстремумларини текширинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топаемиз:

$$y' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x},$$

$$y'' = (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Биринчи тартибли ҳосила $x \in \mathbb{R}$ да узлуксиз бўлгани учун берилган функциянинг критик нуқталари $2x - x^2 = 0$ тенгламани қаноатлантиради. Бундан $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

Энди иккинчи тартибли ҳосиланинг критик нуқталардаги ишорасини текшираемиз:

$y'(0) = 2 > 0$, шунинг учун берилган функция $x_1 = 0$ нуқтада минимумга эришади, $y_{\min} = y(0) = 0$.

$y'(2) = -2e^{-2} < 0$, шунинг учун функция $x_2 = 2$ нуқтада максимумга эришади, $y_{\max} = y(2) = 4e^{-2}$.

Функциянинг энг катта ва энг кичик қийматларини топишни кўрамиз.

$y = f(x)$ функция $[a; b]$ кесмада узлуксиз бўлсин. Бундай функция ўзининг энг катта ва энг кичик қийматларига кесманинг ичида ва учларида эришиши мумкин. Уни топиш қоидаси қуйидагича:

1) функциянинг биринчи тартибли ҳосиласини топамиз ва уни нолга тенглаб, барча критик нуқталарни аниқлаймиз;

2) функциянинг барча критик (агар бу критик нуқталар берилган кесмага тегишли бўлса) ва кесманинг ички, четки ($f(a)$; $f(b)$) нуқталардаги қийматларини ҳисоблаймиз;

3) бу қийматлар ичидан энг катта ва энг кичигини танлаймиз ва улар мос равишда функциянинг энг катта ва энг кичик қийматлари бўлади.

5-мисол. $f(x) = x^3 - 3x$ функциянинг $[-1, 5; 2, 5]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматини топинг.

Ечиш. 1. Функциянинг критик нуқталарини топамиз.

$y' = f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, бу ердан $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ нуқталарда $f'(x) = 0$ эканлиги келиб чиқади ва улар берилган кесмага тегишлидир.

2. Функциянинг критик ва берилган кесманинг четки нуқталардаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \cdot (-1) = 2;$$

$$f(1) = (1)^3 - 3 \cdot 1 = -2;$$

$$f(-1,5) = (-1,5)^3 - 3 \cdot (-1,5) = 1,125;$$

$$f(2,5) = (2,5)^3 - 3 \cdot (2,5) = 8,125.$$

3. Демак, функциянинг берилган кесмадаги энг катта қиймати $x = 2,5$ (учидаги) нуқтада $f(2,5) = 8,125$ га ва энг кичик қиймати $x = 1$ (ички) нуқтада $f(1) = -2$ га тенгдир.

Функциянинг қавариқ ва ботиқлиги.

Бурилиш нуқтаси

3-таъриф. Агар функциянинг графиги унинг ихтиёрий нуқтасидан ўтказилган уринмасидан пастда (юқорида) жойлашган бўлса, $(a; b)$ интервалда дифференциалланувчи

$y = f(x)$ функциянинг графиги шу интервалда қавариқ (ботиқ) дейилади.

4-таъриф. Функция графигининг қавариқлик қисмидан ботиқлик қисмини ажратадиган нуқтаси бурилиш нуқтаси дейилади.

4-теорема (функция графиги қавариқ (ботиқ) бўлишининг етарли шarti). Агар $(a; b)$ интервалнинг барча нуқталарида $y = f(x)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи манфий (мусбат), яъни $f''(x) < 0$ ($f''(x) > 0$) бўлса, $y = f(x)$ эгри чизиқ бу интервалда қавариқ (ботиқ) бўлади.

Бурилиш нуқтасида функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи ўзининг ишорасини ўзгартиралади, шунинг учун бундай нуқталарда функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи нолга тенг бўлади ёки узилишга эга бўлади ёки мавжуд бўлмайди.

5-теорема (бурилиш нуқтаси мавжуд бўлишининг етарли шarti). Агар функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи $f''(x_0) = 0$ бўлса ёки мавжуд бўлмаса ва x_0 нуқтадан ўтаётганда $f''(x)$ ўз ишорасини ўзгартирса, $x = x_0$ абсциссали нуқта $y = f(x)$ эгри чизиқнинг бурилиш нуқтаси бўлади.

6-мисол. $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$ эгри чизиқнинг қавариқлик, ботиқлик интервалларини ва бурилиш нуқтасини топинг.

Ечиш. Биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларни топамиз:

$$y' = -xe^{-\frac{x^2}{2}}, y'' = (x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$


Биринчи ва иккинчи тартибли ҳосила ихтиёрий $x \in \mathbb{R}$ да маънога эга. y'' ни нолга тенглаб, $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ ларни топамиз. $x_1 = -1$ нуқтанинг атрофида иккинчи ҳосила ишорасининг ўзгариш қонунини аниқлаймиз:

$$x < -1 \text{ да } y''(-2) = 3e^{-2} = \frac{3}{e^2} > 0;$$

$$x > -1 \text{ да } y''(0) = -1 < 0;$$

$$x > 1 \text{ да, } y''(2) = 3e^{-2} > 0.$$

Демак, $(-\infty; -1)$ ва $(1; +\infty)$ интервалларда $y'' > 0$ бўлгани учун шу интервалларда эгри чизиқ ботиқ, $(-1; 1)$ интервалда $y'' < 0$ бўлгани учун эгри чизиқ қавариқ бўлади.



4-чизма.

$x_1 = -1, x_2 = 1$ қийматлар бурилиш нүктасининг абсциссалари. Бурилиш нүктасининг ординатаси эса: $y(-1) = e^{-1/2}$, $y(1) = e^{-1/2}$. Бурилиш нүкталари: $M_1(-1; e^{-1/2})$, $M_2(1; e^{-1/2})$ лар бўлади. Берилган функциянинг графиги 4-чизмада тасвирланган.


Функциянинг асимптоталари

Функция аргументи x чексизликка интилганда функция графиги бирор тўғри чизиққа чексиз яқинлашиш хосаси унинг графигини чизишда муҳим роль ўйнайди.

5-таъриф. Агар $y = f(x)$ эгри чизиқнинг M нүктасидан L тўғри чизиқкача бўлган S масофа M нүқта чексиз узоқлашганда нолга интилса, L тўғри чизиқ $y = f(x)$ эгри чизиқнинг асимптотаси дейилади.

Агар шундай $x = x_i (i = 1, n)$ нүкталар мавжуд бўлсаки, улар учун $\lim_{x \rightarrow x_i} (f(x)) = \pm \infty$ бўлса, яъни функция иккинчи тур узилишга эга бўлса, у ҳолда $x = x_i (i = 1, n)$ тўғри чизиқлар $y = f(x)$ эгри чизиқнинг вертикал асимптоталари дейилади.

Агар $k = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - kx)$ лимитлар мавжуд бўлса, у ҳолда $y = kx + b$ тўғри чизиқ $y = f(x)$ эгри чизиқнинг оғма асимптотаси дейилади.



5-чизма.

Агар $y = kx + b$ оғма асимптота тенгламасини аниқлашда $k = 0$ (хусусий ҳолда $k = 0, b = 0$) бўлса, у ҳолда $y = b$ (ёки $y = 0$) тўғри чизиқ горизонтал асимптота дейилади.

7-мисол. $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$ эгри чизиқнинг асимптотасини топинг.

Ечиш. $\lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \pm \infty$ бўлгани учун берилган эгри чизиқ иккита, яъни $x = 1$ ва $x = -1$ вертикал асимптотага эга. Оғма асимптотасини топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x^3}{x(x^2 - 1)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0.$$

Шундай қилиб, берилган эгри чизиқ тенгламаси $y = x$ бўлган битта оғма асимптотага ва иккита $x = \pm 1$ вертикал асимптоталарга эга экан (5-чизма).

Машқлар

Қуйидаги функцияларнинг монотонлик оралиқларини топинг:

$$78. y = x^4 - 2x^2 - 5.$$

$$79. y = \frac{x}{x^2 - 6x - 16}.$$

$$80. y = x^3 - 3x^2 - 9x + 7.$$

$$81. y = \ln(1 - x^2).$$

Биринчи тартибли ҳосила ёрдамида қуйидаги функцияларнинг экстремумларини топинг:

$$82. y = 3\sqrt{x^2} - x^2. \checkmark$$

$$83. y = x(x+1)^2(x-3)^2.$$

$$84. y = 3\sqrt{(x^2 - 6x + 5)^2}.$$

$$85. y = 3\sqrt{(x^2 - 1)^2}.$$

$$86. y = x - \ln(1 + x).$$

$$87. y = x \ln^2 x. \checkmark$$

Иккинчи тартибли ҳосила ёрдамида қуйидаги функцияларнинг экстремумларини топинг:

$$88. y = 2x^3 - 15x^2 - 84x + 8. \checkmark$$

$$89. y = \sqrt{e^{x^2-4}}.$$

$$90. y = \frac{14}{x^4 - 8x^2 + 2}.$$

$$91. y = \sin 3x - 3 \sin x.$$

Қуйидаги функцияларнинг берилган оралиқдаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг:

$$92. y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1, \quad [-1; 5] \text{ кесмада.}$$

$$93. y = x + 3\sqrt{x}, \quad \checkmark \quad [-1; 1] \text{ кесмада.}$$

$$94. y = x^2 \ln x, \quad \checkmark \quad [-1; e] \text{ кесмада.}$$

$$95. y = 2 \sin x + \sin 2x, \quad [0; \frac{3}{2}\pi] \text{ кесмада.}$$

Қуйидаги функцияларнинг қавариклик, ботиқлик оралиқлари ва бурилиш нуқталарини топинг:

$$96. y = x - \ln x. \checkmark \quad 97. y = \ln(1 + x^2). \quad 98. y = \arctg x - x.$$

$$99. y = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}. \checkmark \quad 100. y = \frac{1}{(x+1)^3}. \quad 101. y = x \cdot \arctg x.$$

Қуйидаги эгри чизиқларнинг асимптоталарини топинг:

$$102. y = x + \frac{\ln x}{x}. \quad 103. y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}. \quad 104. y = \frac{x^2}{2(x+1)^2}.$$

7-§. Функцияни текширишнинг умумий схемаси.

Функция графигини яшаш

Функцияни тўлиқ текшириш ва унинг графигини яшашни қуйидаги тартибда олиб бориш тавсия этилади:

1) функциянинг аниқланиш соҳаси, жуфт ёки тоқлиги, даврийлиги текширилади;

2) функциянинг узилиш нуқталари, унинг графигининг координата ўқлари билан кесишиш нуқталари аниқланади;

3) функциянинг монотонлиги ва экстремумлари текширилади;

4) қавариклик ва ботиқлик интерваллари, бурилиш нуқтаси аниқланади;

5) функциянинг асимптоталари топилади;

6) бу маълумотлар графикни чизиш учун камлик қилса, қўшимча зарур бўлган ҳисоблашларни бажариш керак;

7) юқоридаги маълумотларга кўра функция графиги ясалади.

Мисол кўрамиз.

Мисол. $y = \sqrt[3]{(x+3)x^2}$ функцияни тўлиқ текширинг ва графигини ясанг.

Ечиш. Тавсия этилган схемадан фойдаланамиз.

1. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси: $x \in \mathbb{R}$.
2. Функция узилиш нуқтасига эга эмас ва Ox ўқини $x = -3$ ва $x = 0$; Oy ўқини эса $x = 0$ нуқталарда кесди.
3. Функция жуфт ҳам, тоқ ҳам, даврий ҳам эмас.
4. Функциянинг ҳосиласини топамиз:

$$f'(x) = \frac{x+2}{\sqrt[3]{x(x+3)^2}}$$

$x_1 = -2$ нуқтада $f'(x) = 0$ ва $x_2 = -3$, $x_3 = 0$ нуқталарда $f'(x)$ мавжуд эмас. Бу нуқталар функциянинг аниқланиш соҳасини $(-\infty; -3)$, $(-3; -2)$, $(-2; 0)$, $(0; +\infty)$ интервалларга бўлади. Ҳар бир ҳосил қилинган интервалларнинг ичида ҳосила ишораси сақланади, яъни $(-\infty; 3)$, $(-3; 2)$, $(0; +\infty)$ интервалларда $f'(x) > 0$ ва $(-2; 0)$ интервалда $f'(x) < 0$. Бу эса $(-\infty; -3)$, $(-3; -2)$ интервалларда функ-

ция ўсувчи, $(-2; 0)$ интервалда камаювчи ва $(0; +\infty)$ интервалда ўсувчи эканини билдиради. $x_1 = -2$ нуқтанинг атрофида x ўсиши билан биринчи тартибли ҳосила ишорасини «+» дан «-» га ўзгартиради, шунинг учун $x_1 = -2$ нуқта максимум нуқтаси бўлиб,

$$y_{\max} = y(-2) = \sqrt[3]{4} \text{ бўлади.}$$

$x_2 = 0$ нуқта учун биринчи тартибли ҳосила ишорасини «-»дан «+» га ўзгартиради, шунинг учун $x_2 = 0$ минимум нуқтаси бўлиб,

$$y_{\min} = y(0) = 0 \text{ бўлади.}$$

$x_2 = -3$ нуқтада функция экстремумга эга эмас, чунки унинг атрофида $f'(x)$ ишорасини ўзгартирмайди.

5. Иккинчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$f''(x) = -\frac{2}{\sqrt[3]{(x+3)^5 \cdot x^4}}.$$

Ихтиёрий чекли x учун $f''(x) > 0$. Шунинг учун бурилиш нуқтаси иккинчи тартибли ҳосиласи мавжуд бўлмаган $x_3 = -3$ ва $x_3 = 0$ нуқталари бўлиши мумкин. Бу нуқталар билан бўлинган интервалларда y'' нинг ишорасини аниқлаймиз:

$x \in (-\infty; -3)$ интервалда $f''(x) > 0$ — эгри чизик ботик;

$x \in (-3; 0)$ интервалда $f''(x) < 0$ — эгри чизик қаварик;

$x \in (0; +\infty)$ интервалда $f''(x) < 0$ — эгри чизик қаварик;

$x_2 = -3$ нуқта атрофида иккинчи тартибли ҳосила ишорасини ўзгартиргани учун $M(-3; 0)$ нуқта бурилиш нуқтаси бўлади. $x_3 = 0$ нуқта бурилиш нуқтаси бўлмайди, чунки унинг атрофида иккинчи тартибли ҳосила ишорасини ўзгартирмайди.


6. Берилган функция барча сонлар ўқида аниқланганлиги сабабли вертикал асимптотага эга эмас. $y = kx + b$ оғма асимптотасини аниқлаймиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{1 + \frac{3}{x}} = 1.$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} - x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} - x)(\sqrt[3]{(x+3)^2 \cdot x^4} + x\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} + x^2)}{\sqrt[3]{(x+3)^2 \cdot x^4} + x\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} + x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x+3)x^2 - x^3}{\sqrt[3]{(x+3)^2 \cdot x^4} + x\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} + x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2}{\sqrt[3]{(x+3)^2 \cdot x^4} + x\sqrt[3]{(x+3) \cdot x^2} + x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{1 + \frac{6}{x} + \frac{9}{x^2}} + \sqrt[3]{1 + \frac{3}{x}} + 1} = 1. \end{aligned}$$

Оғма асимптотанинг тенгламаси $y = x + 1$ эканлигини топдик.

7. Функция графигини чизишдан олдин эгри чизикнинг абсциссалар ўқини $x_2 = -3$ ва $x_3 = 0$ нуқталарда қандай бурчак остида кесишини аниқлаш керак. Бу нуқталарда $y' = \tan \alpha = \infty$ ва $\alpha = \frac{\pi}{2}$. $x_3 = 0$ қийматида берилган функция нол қийматга эришади, яъни бу нуқта атрофида



6-чизма.

функция графиги Ox ўқининг юқори қисмида ётишини билдиради. Шунинг учун $x_1 = 0$ нуқта функция графигининг қайтиш нуқтаси бўлади.

8. Текшириш натижаларига кура функция графигини чизамиз (6-чизма).

Машқлар

105. Куйидаги функцияларни тўлиқ текширинг ва графигини ясанг:

а) $y = x^3 - 3x^2$; б) $y = x^2 + \frac{2}{x}$; в) $y = \frac{x^3}{3-x^2}$;
г) $y = \ln(x^2 + 2x + 2)$; д) $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$; е) $y = -\ln(x^2 - 4x + 5)$.

8-§. Максимум ва минимум назариясининг амалий масалаларни ечишга татбиқи

Максимум ва минимум назарияси ёрдамида геометрия, механика ва бошқа фанларга доир кўпгина масалалар ечилади.

Шундай масалаларнинг баъзиларини ечиб кўрсатамиз. 1-масала. Юзи $S = 75 \text{ м}^2$ бўлган тунукадан асосининг радиуси R ва баландлиги H бўлган усти очиқ шундай цилиндр бак ясангки, унинг ҳажми энг катта бўлсин.

Ечиш. Бакнинг сифими (ҳажми) $V = \pi R^2 H$, уни яшаш учун $S = \pi R^2 + 2\pi RH$ юзга эга бўлган материал кетади. Бундан H баландликни топамиз:

$$H = \frac{S - \pi R^2}{2\pi R}. \quad (A)$$

У ҳолда бакнинг сифими:

$$V = \pi R^2 \frac{S - \pi R^2}{2\pi R} = \frac{SR - \pi R^3}{2} = V(R)$$

га тенг ва у R га боғлиқ функциядан иборатдир.

R нинг шундай қийматини топамизки, унда сифим $V(R)$ максимум бўлсин. $V(R)$ дан R га нисбатан биринчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$V' = \frac{1}{2}(S - 3\pi R^2), V' = 0,$$


$$S - 3\pi R^2 = 0, \quad R = \sqrt{\frac{S}{3\pi}} = \sqrt{\frac{75\pi}{3\pi}} = 5\text{м}.$$

Иккинчи тартибли ҳосила $V'' = -3\pi R < 0$ бўлгани учун топилган $R = 5$ қийматда бакнинг сифими энг катта (максимум) бўлади.

Юқоридаги (A) формуладан бакнинг баландлигини топамиз:

$$H = \frac{S - \pi R^2}{2\pi R} = \frac{S - \pi \frac{S}{3\pi}}{2\pi \sqrt{\frac{S}{3\pi}}} = \sqrt{\frac{S}{3\pi}} = \sqrt{\frac{75\pi}{3\pi}} = 5\text{м}.$$

2-масала. Сугориш каналининг кўндаланг кесими тенг ёнли трапеция шаклида бўлиб, унинг ён томони кичик асосига тенг (7-чизма). Бу трапециянинг ён томони нишаблик бурчаги α қандай бўлганда каналнинг кўндаланг кесими юзи энг катта бўлади?



7-чизма.

Ечиш. Трапециянинг ён томони ва кичик асосини a деб, каналнинг кўндаланг кесим юзини α бурчакнинг функцияси каби аниқлаймиз. У ҳолда 7-чизмадан:

$$|AB| = a, |BE| = a \cos \alpha, |DC| = a + 2a \cos \alpha, CE = a \sin \alpha,$$

$$S = \frac{|AB| + |DC|}{2} \cdot |CE| = \frac{2a + 2a \cos \alpha}{2} \cdot a \sin \alpha = a^2 \left(\sin \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)$$

ни ҳосил қиламиз. Бу α ўзгарувчининг функциясидан иборат бўлгани учун, унинг экстремумини текшира-миз:

$$S' = a^2(\cos \alpha + \cos 2\alpha).$$

Критик нуқталарда $S' = 0$, яъни $\cos \alpha + \cos 2\alpha = 0$ ёки


$$\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Аниқланиш соҳаси $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ бўлгани учун $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$. Шунинг учун $\cos \frac{3\alpha}{2} = 0$, бундан $\frac{3\alpha}{2} = \frac{\pi}{2}$ ёки $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

Энди $\alpha = \frac{\pi}{3}$ бўлганда S функция $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада энг катта қийматга эришишини исбот қиламиз.

Ҳақиқатан, $S'' = a^2(-\sin \alpha - 2\sin 2\alpha)$, $S''(\frac{\pi}{3}) = a^2(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}) = -a^2 \frac{\sqrt{3}}{2} < 0$. Шунинг учун $\alpha = \frac{\pi}{3}$ да функция $S''(\frac{\pi}{3}) = S_{\max} \frac{3\sqrt{3}}{4} a^2$ локал максимумга эга, $S(0) = 0$, $S(\frac{\pi}{2}) = a^2 < S_{\max}$ бўлгани учун $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада S функция энг катта қийматга эришади.

3-масала. Брусонинг маҳкамлиги унинг қўндаланг кесими бўлган тўғри тўртбурчакнинг эни b га ва h баландлигининг квадратига пропорционалди маълум. Радиуси $R = 2\sqrt{3}$ дм бўлган ҳодадан шундай брусок тайёрланганки, унинг маҳкамлиги энг катта бўлсин (8-чизма).



8-чизма.

Ечиш. Брусонинг маҳкамлиги қуйидагича ифодаланadi:

$$N = kh^2 b,$$

бунда k — пропорционаллик коэффициент, $k > 0$. 8-чизмадан $h^2 + b^2 = 4R^2$ ёки $h^2 = 4R^2 - b^2$ тенгликни ёзамиз. У ҳолда брусонинг маҳкамлиги:

$$N = k(4R^2 - b^2) b.$$

$N = N(b)$ функциянинг экстремумини топамиз:

$$N' = k(4R^2 - 3b^2).$$

Агар $N' = 0$ бўлса, $4R^2 - 3b^2 = 0$ бўлади, бундан $b = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4$ дм. Баландлик эса

$$h = \sqrt{4R^2 - b^2} = \sqrt{4R^2 - \frac{4R^2}{3}} = \sqrt{\frac{12R^2 - 4R^2}{3}} = 2R \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{2},$$

яъни $h = 4\sqrt{2}$ дм га тенг. Иккинчи тартибли ҳосила $N'' = -6kb < 0$ бўлгани учун, аниқланган b ва h нинг қийматларида брусонинг маҳкамлиги энг катта бўлади.

Машқлар

106. Сигими $V = 16\pi \approx 50$ м³ бўлган ёпиқ цилиндр бак яшаш талаб қилинади. Бакнинг ўлчамлари (радиуси R ва баландлиги H) қандай бўлганда уни тайёрлаш учун энг кам материал кетади?

107. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипснинг ичига чизилган юзи энг катта бўлган тўғри тўртбурчакнинг томонларини топинг.

108. Ясовчиси 20 см бўлган конус шаклидаги воронка яшаш талаб қилинади. Воронканинг ҳажми энг катта бўлиши учун унинг баландлиги қандай бўлиши керак?

109. R радиусли шар ичига энг катта ҳажмга эга бўлган мунтазам уч бурчакли призма чизинг.

110. Қўндаланг кесими тўғри тўртбурчак бўлган ёғочнинг маҳкамлигини энига ва баландлигининг кубига тўғри пропорционал деб қабул қилиб, диаметри 16 см бўлган ҳодадан кесиб олинadиган тўрт қиррали тўсиннинг эни қандай бўлганда у энг катта маҳкамликка эга бўлишини топинг.

9-§. Биринчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй ишининг ҳар бир вариантда 14 та мисол бўлиб, уларда берилган функциянинг биринчи тартибли ҳосиласини топиш керак.

Куйида вариант мисолларини ечиш намунасини келти-
рамыз.

Берилган функцияларни дифференциалланг (бирин-
чи тартибли ҳосилани топинг).

$$1. y = 9x^4 - \frac{4}{x^3} + \sqrt[3]{x^2} - 3x + 4.$$

Ечиш.

$$y' = 9 \cdot 4x^3 - 4 \cdot (-3)x^{-4} + \frac{7}{3} \cdot x^{\frac{2}{3}} - 3 = 36x^3 + \frac{12}{x^4} + \frac{7}{3} \sqrt[3]{x^4} - 3.$$

$$2. y = \sqrt[4]{(2x^2 - 3x + 1)^3} - \frac{6}{(x+1)^2}.$$

Ечиш.

$$y' = \frac{3}{4} (2x^2 - 3x + 1)^{-\frac{1}{4}} \cdot (4x - 3) - 6 \cdot (-2)(x+1)^{-3} = \\ = \frac{3}{4} \cdot \frac{4x-3}{\sqrt[4]{2x^2-3x+1}} + \frac{18}{(x+1)^4}.$$

$$3. y = \operatorname{tg}^3(x+2) \cdot \arccos 3x^2.$$

Ечиш.

$$y' = 5 \operatorname{tg}^4(x+2) \cdot \frac{1}{\cos^2(x+2)} \arccos 3x^2 + \operatorname{tg}^5(x+2) \cdot \\ \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-9x^4}} \right) \cdot 6x = \frac{5 \operatorname{tg}^4(x+2) \arccos 3x^2}{\cos^2(x+2)} - \frac{6x \operatorname{tg}^5(x+2)}{\sqrt{1-9x^4}}.$$

$$4. y = \arcsin^5 4x \cdot \log_2(x-5).$$

Ечиш.

$$y' = 5 \arcsin^4 4x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-16x^2}} \cdot 4 \log_2(x-5) + \arcsin^5 4x \cdot \\ \cdot \frac{1}{(x-5) \ln 2} = \frac{20 \arcsin^4 4x \log_2(x-5)}{\sqrt{1-16x^2}} + \frac{\arcsin^5 4x}{(x-5) \ln 2}.$$

$$5. y = 3^{-x^4} \cdot \operatorname{ctg} 7x^3.$$

Ечиш.

$$y' = 3^{-x^4} \cdot \ln 3 \cdot (-4x^3) \cdot \operatorname{ctg} 7x^3 + 3x^{-x^4} \cdot x^4 \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 7x^3} \right) \cdot 21x^2 = \\ = -4 \ln 3 \cdot 3^{-x^4} \cdot x^3 \cdot \operatorname{ctg} 7x^3 - \frac{21x^4 \cdot 3^{-x^4}}{\sin^2 7x^3}.$$

$$6. y = \operatorname{cth}^2 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}.$$

Ечиш.

$$y' = 2 \operatorname{cth} 3x \cdot \left(-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 3x} \right) \cdot 3 \operatorname{arctg} \sqrt{x} + \operatorname{cth}^2 3x \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ = -\frac{6 \operatorname{cth} 3x \operatorname{arctg} \sqrt{x}}{\operatorname{sh}^2 3x} + \frac{\operatorname{cth}^2 3x}{2(1+x)\sqrt{x}}.$$

$$7. y = \frac{\sqrt{3x^2-7x+5}}{e^{-x^4}}.$$

Ечиш.

$$y' = \left(\sqrt{3x^2-7x+5} \cdot e^{x^4} \right)' = \frac{(6x-7)e^{x^4}}{2\sqrt{3x^2-7x+5}} + \sqrt{3x^2-7x+5} \times \\ \times e^{x^4} \cdot 4x^3 = \frac{(6x-7)e^{x^4}}{2\sqrt{3x^2-7x+5}} + 4x^3 e^{x^4} \sqrt{3x^2-7x+5}.$$

$$8. y = \frac{\lg(x^2-3x+5)}{\operatorname{arctg}^2 5x}.$$

Ечиш.

$$y' = \left(\lg(x^2-3x+5) \cdot \operatorname{arctg}^{-2} 5x \right)' = \frac{(2x-3) \operatorname{arctg}^{-2} 5x}{(x^2-3x+5) \ln 10} + \\ + (-2) \operatorname{arctg}^{-3} 5x \left(-\frac{1}{1+25x^2} \right) 5 \cdot \lg(x^2-3x+5) = \\ = \left(\frac{(2x-3) \operatorname{arctg}^2 5x}{(x^2-3x+5) \ln 10} + \frac{10 \lg(x^2-3x+5) \operatorname{arctg} 5x}{1+25x^2} \right) \cdot \operatorname{arctg}^{-4} 5x.$$

$$9. y = \frac{\sqrt{\arcsin 3x}}{\operatorname{sh}^4 x}.$$

Ечиш.

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{\arcsin 3x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot 3 \cdot \operatorname{sh}^2 x - 2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x \sqrt{\arcsin 3x}}{\operatorname{sh}^8 x} =$$

$$= \frac{3\operatorname{sh}^2 x}{2\sqrt{\arcsin 3x} \cdot \sqrt{1-9x^2}} - \frac{\operatorname{sh} 2x \cdot \sqrt{\arcsin 3x}}{\operatorname{sh}^4 x}.$$

$$10. y = \frac{3 \ln(x^2 - 5)}{(x+3)^7}.$$

Ечиш.

$$y' = \frac{\frac{1}{x^2-5} \cdot 2x \cdot 3(x+3)^7 - 7(x+3)^6 \cdot 3 \ln(x^2-5)}{(x+3)^{48}} = 3 \cdot \frac{2x(x+3) - 7 \ln(x^2-5)}{(x+3)^8}.$$

$$11. y = \sqrt[7]{\frac{x+5}{x-5}} \cdot \operatorname{ctg}(3x-4).$$

Ечиш.

$$y' = \frac{1}{7} \left(\frac{x+5}{x-5} \right)^{-\frac{6}{7}} \cdot \frac{x-5-(x+5)}{(x-5)^2} \operatorname{ctg}(3x-4) - \frac{1}{\sin^2(3x-4)} \cdot 3 \sqrt[7]{\frac{x+5}{x-5}} =$$

$$= -\frac{10}{7} \cdot \operatorname{ctg}(3x-4) \sqrt[7]{\frac{(x-5)^8}{(x+5)^6}} - \frac{3}{\sin^2(3x-4)} \sqrt[7]{\frac{x+5}{x-5}}.$$

$$12. y = \left(\operatorname{th} \sqrt{x+2} \right)^{\ln(3x+2)}.$$

Ечиш.

Берилган функцияни логарифмлаймиз:

$$\ln y = \ln(3x+2) \ln(\operatorname{th} \sqrt{x+2}).$$

У ҳолда

$$\frac{1}{y} y' = \frac{3}{3x+2} \ln(\operatorname{th} \sqrt{x+2}) + \frac{\ln(3x+2)}{\operatorname{th} \sqrt{x+2} \operatorname{ch}^2 \sqrt{x+2} \cdot 2\sqrt{x+2}}.$$

Бундан y' ни топамиз:

$$y' = \left(\operatorname{th} \sqrt{x+2} \right)^{\ln(3x+2)} \cdot \left(\frac{3 \ln(\operatorname{th} \sqrt{x+2})}{3x+2} + \frac{\ln(3x+2)}{2\sqrt{x+2} \operatorname{sh} \sqrt{x+2} \operatorname{ch} \sqrt{x+2}} \right).$$

$$13. y = (\sin 7x)^{\operatorname{arctg}(3x-5)}.$$

Ечиш.

Берилган функцияни логарифмлаймиз:

$$\ln y = \operatorname{arctg}(3x-5) \cdot \ln(\sin 7x).$$

У ҳолда

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{1+(3x-5)^2} \cdot 3 \ln(\sin 7x) + \operatorname{arctg}(3x-5) \cdot \frac{1}{\sin 7x} \cdot 7 \cos 7x.$$

Бундан y' ни топамиз:

$$y' = (\sin 7x)^{\operatorname{arctg}(3x-5)} \cdot \left(\frac{3 \ln(\sin 7x)}{1+(3x-5)^2} + \frac{7 \operatorname{arctg}(3x-5) \cos 7x}{\sin 7x} \right).$$

$$14. y = \frac{\sqrt[7]{(x+5)^6}}{(x-1)^2 (x+3)^5}.$$

Ечиш.

Логарифмлаш усулини татбиқ этиб дифференциаллаймиз:

$$\ln y = \frac{6}{7} \ln(x+5) - 2 \ln(x-1) - 5 \ln(x+3),$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{6}{7(x+5)} - \frac{2}{x-1} - \frac{5}{x+3}.$$

$$y' = \frac{\sqrt[7]{(x+5)^6}}{(x-1)^2 (x+3)^5} \left(\frac{6}{7(x+5)} - \frac{2}{x-1} - \frac{5}{x+3} \right).$$

1-вариант

1. $y = 2\sqrt{x^3} - \frac{7}{x} + 3x^2 - \frac{2}{x^3}$
2. $y = \frac{7}{(x-1)^3} + \sqrt{8x-3+x^2}$
3. $y = 3^{7x} \cdot \arcsin 7x^4$
4. $y = (x-4)^5 \cdot \operatorname{arccctg} 3x^2$
5. $y = \operatorname{arctg}^4 x \cdot \cos 7x^4$
6. $y = \sin^4 2x \cdot \operatorname{arccos} x^2$
7. $y = \frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{e^x}$
8. $y = \frac{\lg^2(x-2)}{\lg(x+3)}$
9. $y = \frac{\arcsin^2 4x}{\lg(5x-3)}$
10. $y = \frac{2\lg(4x+5)}{(x+6)^4}$
11. $y = \sqrt[4]{\frac{x+6}{x-6}} \cdot \sin(3x^2+1)$
12. $y = (\operatorname{ch} 3x)^{\frac{\operatorname{ctg} x}{x}}$
13. $y = (\operatorname{arctg} 5x)^{\lg 2(x+4)}$
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x+4)^3}}{(x-1)^4(x+3)^4}$

2-вариант

1. $y = 7x + \frac{5}{x^2} - \sqrt[3]{x^4} + \frac{6}{x}$
2. $y = \sqrt{3x^4-2x^3} + x - \frac{4}{(x+2)^3}$
3. $y = \sin^3 2x \cdot \cos 8x^5$
4. $y = \operatorname{arctg}^2 5x \cdot \ln(x-4)$
5. $y = \operatorname{tg}^4 x \cdot \arcsin 2x^3$
6. $y = (x-3)^4 \cdot \arccos 5x^3$
7. $y = \frac{e^{\arccos^2 x}}{\sqrt{x+5}}$
8. $y = \frac{\log_5(3x-7)}{\operatorname{ctg} 7x^3}$
9. $y = \frac{\operatorname{arccctg}^4 5x}{\operatorname{sh} \sqrt{x}}$
10. $y = \frac{9\operatorname{arctg}(x+7)}{(x-1)^2}$
11. $y = \sqrt[3]{\frac{2x-5}{2x+3}} \cdot \lg(4x+7)$
12. $y = (\operatorname{cth} 3x)^{\arcsin x}$
13. $y = (\arccos x)^{\lg 2x}$
14. $y = \frac{\sqrt{x+7} \cdot (x-3)^4}{(x+2)^3}$

3-вариант

1. $y = 5x^2 - \sqrt[3]{x^8} + \frac{4}{x^3} - \frac{5}{x}$
2. $y = \sqrt[3]{(x-7)^5} + \frac{5}{4x^2+3x-5}$
3. $y = \cos^5 3x \cdot \operatorname{tg}(4x+1)^3$
4. $y = \operatorname{arctg}^3 2x \cdot \ln(x+5)$
5. $y = (x-2)^4 \cdot \arcsin 5x^4$
6. $y = (3x-4)^3 \cdot \operatorname{arccos} 3x^2$
7. $y = \frac{(x-4)^2}{e^{\operatorname{arctg} x}}$
8. $y = \frac{\ln(5x-3)}{4\lg 3x^4}$
9. $y = \frac{\operatorname{arctg}^3 2x}{\operatorname{ch} \frac{1}{x}}$
10. $y = \frac{8\operatorname{arctg}(2x+3)}{(x+1)^3}$
11. $y = \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \ln(5x^2-2x+1)$
12. $y = (\cos(x+2))^{\ln x}$
13. $y = (\arcsin 2x)^{\operatorname{ctg}(x+1)}$
14. $y = \frac{(x-3)^5(x+2)^3}{\sqrt{(x-1)^3}}$

4-вариант

1. $y = 3x^5 - \frac{3}{x}\sqrt{x^3} + \frac{10}{x^2}$
2. $y = \sqrt[3]{(x+4)^6} - \frac{2}{2x^2-3x+7}$
3. $y = \operatorname{tg}^4 x \cdot \arcsin 4x^5$
4. $y = \arccos^4 x \cdot \ln(x^2+x+1)$
5. $y = 2^{-x^2} \cdot \operatorname{arctg} 7x^4$
6. $y = \operatorname{sh}^3 x \cdot \arccos \sqrt{x}$
7. $y = \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{x^2+5x-1}}$
8. $y = \frac{\ln(7x+2)}{5\cos 4x}$
9. $y = \frac{\arccos 3x^4}{\operatorname{th}^3 x}$
10. $y = \frac{7\arccos(4x-1)}{(x+2)^4}$
11. $y = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \log_3(x^2+x+4)$
12. $y = (\sin 3x)^{\arccos x}$
13. $y = (\operatorname{arctg}(x+7))^{\cos 2x}$
14. $y = \frac{(x-2)^3 \cdot \sqrt{(x+1)^5}}{(x-4)^4}$

5-вариант

1. $y = \sqrt[3]{x^7} + \frac{3}{x} - 4x^5 + \frac{4}{x^2}$
2. $y = \frac{3}{(x-4)^2} - \sqrt{5x^2 - 4x + 3}$
3. $y = \arcsin^2 2x \cdot \operatorname{ctg} 7x^4$
4. $y = \sqrt{\arccos 2x} \cdot 3^{-x}$
5. $y = (x+6)^4 \cdot \operatorname{arctg} 3x^5$
6. $y = \operatorname{th}^2 \sqrt{x} \cdot \operatorname{arccotg} 3x^2$
7. $y = \frac{e^{-\operatorname{ctg} 2x}}{(3x^2 - 4x + 2)^2}$
8. $y = \frac{\sin^3 5x}{\ln(2x-3)}$
9. $y = \frac{\arcsin 5x^3}{\operatorname{ch} \sqrt{x}}$
10. $y = \frac{6 \arcsin(3x+2)}{(x-3)^2}$
11. $y = \sqrt[6]{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \log_5(3x^2 + 2x)$
12. $y = (\operatorname{th} 5x)^{\arcsin(x+1)}$
13. $y = (\operatorname{arccotg}(x-3))^{\sin 4x}$
14. $y = \frac{(x-3)^5(x-2)^2}{(x+1)^3}$

6-вариант

1. $y = 7x^2 + \sqrt[3]{x^4} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x^2}$
2. $y = \sqrt[3]{4x^2 - 3x - 4} - \frac{2}{(x-3)^2}$
3. $y = \operatorname{ctg} 3x \cdot \arccos 3x^2$
4. $y = \operatorname{tg}^4 3x \cdot \operatorname{arctg} 7x^2$
5. $y = 3^{\cos x} \cdot \ln(x^2 - 3x + 7)$
6. $y = \operatorname{cth}^3 5x \cdot \arcsin 3x^2$
7. $y = \frac{\sqrt{7x^3 - 5x + 1}}{e^{\cos x}}$
8. $y = \frac{\cos^2 3x}{\lg(x-4)}$
9. $y = \frac{\operatorname{cth}^2(x+1)}{\arccos 2x}$
10. $y = \frac{3 \operatorname{arccotg}(2x-1)}{(x+1)^4}$
11. $y = \sqrt{\frac{2x-3}{2x+1}} \cdot \lg(7x-10)$
12. $y = (\operatorname{sh}(x+2))^{\arcsin 2x}$
13. $y = (\operatorname{ctg}(3x-1))^{\arcsin 3x}$
14. $y = \frac{(x+2)^7(x-3)^3}{\sqrt{(x+1)^5}}$

7-вариант

1. $y = 4x^5 + \frac{5}{x} - \sqrt[3]{x^7} - \frac{7}{x^4}$
2. $y = \sqrt[3]{3x^2 + 4x - 5} + \frac{4}{(x-4)^4}$
3. $y = \arccos^2 x \cdot \ln(x-3)$
4. $y = 5^{-x} \cdot \arcsin 3x^3$
5. $y = \log_2(x-7) \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$
6. $y = \operatorname{ch} \frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2)$
7. $y = \frac{e^{\lg x}}{\sqrt{3x^2 + x - 4}}$
8. $y = \frac{\operatorname{tg}^3 2x}{\lg(5x+1)}$
9. $y = \frac{\operatorname{th} 3x^5}{\operatorname{arctg}^2 3x}$
10. $y = \frac{2 \operatorname{arccotg}(3x+2)}{(x-1)^4}$
11. $y = \sqrt{\frac{5x+1}{5x-1}} \cdot \ln(3x-x^2)$
12. $y = (\cos 5x)^{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$
13. $y = (\operatorname{tg}(4x-3))^{\arccos 3x}$
14. $y = \frac{(x-1)^3(x+2)^5}{\sqrt[3]{(x-4)^2}}$

8-вариант

1. $y = 4x^4 - \frac{3}{x} - \sqrt{x^2} + \frac{6}{x^2}$
2. $y = \sqrt{5x^2 - 2x - 1} + \frac{8}{(x-5)^2}$
3. $y = \ln^2 x \cdot \operatorname{arctg} 7x^4$
4. $y = \operatorname{arctg}^4 x \cdot \log_2(x-3)$
5. $y = \arccos^3 5x \cdot \operatorname{tg} x^4$
6. $y = \operatorname{ch}^3 4x \cdot \arccos 4x^2$
7. $y = \frac{e^{\sin x}}{(x-5)^7}$
8. $y = \frac{\log_2(4x+5)}{2 \operatorname{ctg} \sqrt{x}}$
9. $y = \frac{\arccos^7 2x}{\operatorname{th} x^3}$
10. $y = \frac{4 \arccos 3x}{(x+2)^5}$
11. $y = \sqrt{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \log_4(2x-3)$
12. $y = (\operatorname{arctg} 2x)^{\operatorname{th}(4x+1)}$
13. $y = (\cos(2x-5))^{\operatorname{arctg} 5x}$
14. $y = \frac{(x-3)^2 \sqrt{x+4}}{(x+2)^7}$

9-вариант

1. $y = 5x^3 - \frac{8}{x^2} + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x}$.
2. $y = \frac{3}{(x+2)^5} - \sqrt[3]{5x-7x^2-3}$.
3. $y = \arctg^3 4x \cdot 3^{\sin x}$.
4. $y = \arccos 3x \cdot \log_3(x+5)$.
5. $y = (x-5)^7 \cdot \arctg 7x^3$.
6. $y = \operatorname{sh}^3 3x \cdot \operatorname{arctg} 5x^2$.
7. $y = \frac{\sqrt[3]{2x^2-3x+1}}{e^{-x}}$.
8. $y = \frac{\ln(7x-3)}{3\lg^2 4x}$.
9. $y = \frac{\arcsin^3 4x}{\operatorname{sh}(3x+1)}$.
10. $y = \frac{\arcsin(3x+8)}{(x-7)^4}$.
11. $y = \sqrt{\frac{6x+5}{6x-5}} \cdot \lg(4x+7)$.
12. $y = (\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}}$.
13. $y = (\sin(7x+4))^{\operatorname{arctg} x}$.
14. $y = \frac{(x-7)^{10} \sqrt{3x-1}}{(x+3)^3}$.

10-вариант

1. $y = \frac{4}{x^5} - \frac{9}{x} + \sqrt[3]{x^2} - 7x^3$.
2. $y = \sqrt[4]{(x-1)^5} - \frac{4}{7x^2-3x+2}$.
3. $y = 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arctg}^2 5x$.
4. $y = e^{-x} \cdot \arcsin^2 5x$.
5. $y = \arccos x^2 \cdot \operatorname{ctg} 7x^3$.
6. $y = \operatorname{th}^5 3x \cdot \arcsin \sqrt{x}$.
7. $y = \frac{\sqrt{x^3+4x-5}}{e^{x^2}}$.
8. $y = \frac{\lg(11x+9)}{\cos^2 5x}$.
9. $y = \frac{\operatorname{th}^4(2x+5)}{\arccos 3x}$.
10. $y = \frac{7\operatorname{arctg}(4x+1)}{(x-4)^2}$.
11. $y = \sqrt[3]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \lg(2x^3-3)$.
12. $y = (\log_2(x+4))^{\operatorname{ctg} 7x}$.
13. $y = (\arcsin 2x)^{\ln(x+3)}$.
14. $y = \frac{(x+1)^8(x-3)^2}{\sqrt{(x+2)^5}}$.

11-вариант

1. $y = \frac{8}{x^3} + \frac{3}{x} - 4\sqrt{x^2} + 2x^7$.
2. $y = \sqrt[3]{(x-2)^6} - \frac{3}{7x^3-x^2-4}$.
3. $y = 4^{-x} \cdot \ln^5(x+2)$.
4. $y = \log_4(x-1) \cdot \arcsin^4 x$.
5. $y = 5^{-x^2} \cdot \arccos 5x^4$.
6. $y = \operatorname{cth}^2(x+1) \cdot \arccos \frac{1}{x}$.
7. $y = \frac{e^{\operatorname{ctg} 5x}}{(x+4)^2}$.
8. $y = \frac{\operatorname{ctg}^2 5x}{\ln(7x-2)}$.
9. $y = \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{\operatorname{sh}^2 x}$.
10. $y = \frac{3\arcsin(2x-7)}{(x+2)^4}$.
11. $y = \sqrt[4]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \sin(3x^2+1)$.
12. $y = (\operatorname{sh} 3x)^{\operatorname{arctg}(x+3)}$.
13. $y = (\arccos 2x)^{\lg(5x-3)}$.
14. $y = \frac{(x+2)(x-7)^8}{\sqrt[3]{(x-1)^4}}$.

12-вариант

1. $y = 5x^2 + \frac{4}{x} - \sqrt[3]{x^7} + 2x^6$.
2. $y = \frac{3}{(x+4)^2} - \sqrt[3]{4+3x-x^2}$.
3. $y = 5x^2 \cdot \arccos 2x^5$.
4. $y = \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3$.
5. $y = 4(x-7)^6 \cdot \arcsin 3x^5$.
6. $y = \operatorname{ch}^3(2x+3) \cdot \operatorname{arctg} 2x$.
7. $y = \frac{e^{2x}}{\sqrt{3x^2-4x+7}}$.
8. $y = \frac{\sin^2(5x+1)}{\lg(2x+3)}$.
9. $y = \frac{\operatorname{ch}^2(4x+2)}{\operatorname{arctg} x^3}$.
10. $y = \frac{5\ln(5x+7)}{(x-7)^4}$.
11. $y = \sqrt{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \cos(2x^3+x)$.
12. $y = (\arcsin 5x)^{\lg \sqrt{x}}$.
13. $y = (\operatorname{arctg} 7x)^{\lg(x+1)}$.
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x-1)^7}}{(x+1)^5(x-5)^3}$.

Николаев 13-вариант

1. $y = 10x^2 + 3\sqrt{x^5} - \frac{4}{x} - \frac{5}{x^4}$
2. $y = \frac{2}{(x-1)^3} - \frac{8}{6x^2 + 3x - 7}$
3. $y = \sin^4 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3$
4. $y = e^{-\cos x} \cdot \operatorname{arctg} 7x^5$
5. $y = (x+5)^2 \cdot \operatorname{arccos}^3 5x$
6. $y = \operatorname{th}^3 4x \cdot \operatorname{arctg} 3x^4$
7. $y = \frac{e^{-\sin 2x}}{(x+5)^4}$
8. $y = \frac{\cos^2(5x+7)}{\lg(x+5)}$
9. $y = \frac{\arcsin 4x^5}{\operatorname{th}^3 x}$
10. $y = \frac{4 \log_3(3x+1)}{(x+1)^2}$
11. $y = \sqrt{\frac{x-9}{x+9}} \cdot \operatorname{tg}(3x^2 - 4x + 1)$
12. $y = (\operatorname{arccos} 5x)^{\ln x}$
13. $y = (\log_4(2x+3))^{\operatorname{arcsin} x}$
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x-2)^5(x+3)^2}}{(x-7)^3}$

Усманов 14-вариант

1. $y = \sqrt{x^5} - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^3} - 3x^3$
2. $y = \sqrt{1+5x-2x^2} + \frac{3}{(x-3)^4}$
3. $y = \cos^4 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$
4. $y = (x+1) \cdot \operatorname{arccos} 3x^4$
5. $y = 2^{-\sin x} \cdot \operatorname{arcsin}^3 2x$
6. $y = \operatorname{cth}^4 7x \cdot \operatorname{arcsin} \sqrt{x}$
7. $y = \frac{e^{\cos 5x}}{\sqrt{x^2-5x-2}}$
8. $y = \frac{\sin^2(4x+1)}{\ln(7x-1)}$
9. $y = \frac{\operatorname{arctg}^3(2x+1)}{\operatorname{ch} \sqrt{x}}$
10. $y = \frac{7 \log_4(2x-5)}{(x-1)^5}$
11. $y = \sqrt{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \operatorname{ctg}(2x+5)$
12. $y = (\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x}$
13. $y = (\log_3(3x+2))^{\operatorname{arccos} x}$
14. $y = \frac{\sqrt{(x+2)^3(x-1)^4}}{(x+2)^7}$

Орлов 15-вариант

1. $y = 9x^2 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^4} + \sqrt[3]{x^7}$
2. $y = \sqrt[3]{5+4x-x^2} - \frac{5}{(x+1)^5}$
3. $y = \operatorname{tg}^3 2x \cdot \sin x^5$
4. $y = 2^{\sin x} \cdot \operatorname{arctg} x^4$
5. $y = (x+2)^3 \cdot \operatorname{arccos} \sqrt{x}$
6. $y = \operatorname{sh}^3 2x \cdot \operatorname{arcsin} 7x^2$
7. $y = \frac{(2x+5)^2}{e^{\lg x}}$
8. $y = \frac{\operatorname{ctg}^3(2x+3)}{\log_2(x+2)}$
9. $y = \frac{\operatorname{arccos} 4x^3}{\operatorname{sh}^4 x}$
10. $y = \frac{\ln(7x+2)}{(x-6)^4}$
11. $y = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \sin(4x^2 - 7x + 2)$
12. $y = (\ln(x+7))^{\operatorname{ctg} 2x}$
13. $y = (\lg(7x+5))^{\operatorname{arctg} 2x}$
14. $y = \frac{\sqrt[4]{(x-8)(x+2)^8}}{(x-1)^5}$

Рыжов 16-вариант

1. $y = 3\sqrt{x} + \frac{4}{x^4} + \sqrt[3]{x^2} - \frac{7}{x}$
2. $y = \sqrt[4]{5x^2-4x+1} - \frac{7}{(x-5)^2}$
3. $y = \operatorname{ctg} 7x \cdot \operatorname{arccos} 2x^3$
4. $y = 3^{-x^2} \cdot \operatorname{arctg} x^5$
5. $y = (x-7)^3 \cdot \operatorname{arcsin} 7x^8$
6. $y = \operatorname{th}^5 4x \cdot \operatorname{arccos} 3x^4$
7. $y = \frac{e^{-\lg 2x}}{4x^2-3x+5}$
8. $y = \frac{\lg^2 x}{\sin 5x^2}$
9. $y = \frac{\operatorname{cth}^3(x-2)}{\operatorname{arccos} 3x}$
10. $y = \frac{4 \lg(3x+7)}{(x+1)^7}$
11. $y = \sqrt{\frac{x-3}{x+3}} \cdot \cos(x^2 - 3x + 2)$
12. $y = (\operatorname{ctg}(7x+4))^{\sqrt{x+3}}$
13. $y = (\ln(5x-4))^{\operatorname{arctg} x}$
14. $y = \frac{\sqrt[3]{x+1} \cdot (x-3)^7}{(x+8)^3}$

17-вариант

1. $y = \sqrt{x^3 + \frac{2}{x}} - \frac{4}{x^2} - 5x^3$.
2. $y = \sqrt[3]{3 - 7x + x^2} - \frac{4}{(x-7)^5}$.
3. $y = e^{-\sin x} \cdot \operatorname{tg} 7x^5$.
4. $y = 3^{\cos x} \cdot \arcsin^2 3x$.
5. $y = \ln(x-3) \cdot \arccos 3x^4$.
6. $y = \operatorname{ch}^3 5x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$.
7. $y = \frac{e^{-\sin 4x}}{(2x-5)^6}$.
8. $y = \frac{\ln^2(x+1)}{\cos 3x^4}$.
9. $y = \frac{\operatorname{th}^3(3x+1)}{\arcsin 3x}$.
10. $y = \frac{5 \log_2(x^2+1)}{(x-3)^4}$.
11. $y = \sqrt{\frac{3x-2}{3x+2}} \cdot \operatorname{tg}(2x^2-9)$.
12. $y = \left(\operatorname{th}(\sqrt{x+1}) \right)^{\operatorname{arctg} 2x}$.
13. $y = (\log_2(6x+1))^{\operatorname{arcsin} 2x}$.
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x-2)^4}}{(x+1)^2(x-6)^5}$.

18-вариант

1. $y = 7x^2 + \frac{3}{x} - \sqrt{x^4} + \frac{8}{x^3}$.
2. $y = \sqrt{(x-3)^7} + \frac{9}{7x^2-5x-8}$.
3. $y = e^{\cos x} \cdot \operatorname{ctg} 8x^3$.
4. $y = \ln(x-10) \cdot \arccos^2 4x$.
5. $y = \log_2(x-4) \cdot \operatorname{arctg}^3 4x$.
6. $y = \operatorname{cth}^4 2x \cdot \operatorname{arctg} x^3$.
7. $y = \frac{3x^2-5x+10}{e^{-x^2}}$.
8. $y = \frac{\log_2(7x+1)}{\operatorname{tg} \sqrt{x}}$.
9. $y = \frac{\operatorname{cth}^3(3x-1)}{\arccos x^2}$.
10. $y = \frac{6 \log_3(2x+9)}{(x+4)^2}$.
11. $y = \sqrt{\frac{2x+3}{2x-3}} \cdot \operatorname{ctg}(3x^2+5)$.
12. $y = \left(\operatorname{cth} \frac{1}{x} \right)^{\operatorname{arcsin} 7x}$.
13. $y = (\lg(4x-3))^{\operatorname{arccos} 4x}$.
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2}}{(x-3)^4(x-4)^7}$.

19-вариант

1. $y = 8x^3 - \frac{4}{x} - \frac{7}{x^4} + \sqrt[3]{x^2}$.
2. $y = \sqrt[3]{(x-8)^4} - \frac{1}{1+3x-4x^2}$.
3. $y = \cos^5 x \cdot \arccos 4x$.
4. $y = \lg(x-2) \cdot \arcsin^3 x$.
5. $y = (x-7)^4 \cdot \operatorname{arctg}^2 7x$.
6. $y = \operatorname{sh}^3 5x \cdot \arccos 3x^2$.
7. $y = \frac{e^{-x}}{(2x^2-x+4)^2}$.
8. $y = \frac{\log_3(4x-1)}{\operatorname{ctg} 2x}$.
9. $y = \frac{\operatorname{sh}^3 x}{\arccos 4x}$.
10. $y = \frac{3 \log_2(5x-4)}{(x-3)^5}$.
11. $y = \sqrt{\frac{x+5}{x-5}} \cdot \sin(3x^2+x+4)$.
12. $y = (\cos(x+3))^{\operatorname{arcsin} 3x}$.
13. $y = (\ln(7x-3))^{\operatorname{arctg} 5x}$.
14. $y = \frac{\sqrt{x^2-2x-3}}{(x+3)^7(x-4)^2}$.

20-вариант

1. $y = 8x - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x} - \sqrt[3]{x^4}$.
2. $y = \frac{3}{4x-3x^2+1} - \sqrt{(x+1)^8}$.
3. $y = \sin^3 7x \cdot \operatorname{arctg} 5x^2$.
4. $y = \log_4(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^5 7x$.
5. $y = \sqrt[3]{x-3} \cdot \arccos^4 2x$.
6. $y = \operatorname{ch}^3 9x \cdot \operatorname{arctg}(5x-1)$.
7. $y = \frac{e^{4x}}{(3x+5)^2}$.
8. $y = \frac{\ln^3(x-5)}{\operatorname{tg} \frac{1}{x}}$.
9. $y = \frac{\sqrt{\operatorname{ch}^3 x}}{\operatorname{arctg} 5x}$.
10. $y = \frac{7 \log_5(x^2+x)}{(x+3)^3}$.
11. $y = \sqrt{\frac{x-6}{x+6}} \cdot \cos(7x+2)$.
12. $y = (\sqrt{x+5})^{\operatorname{arccos} 3x}$.
13. $y = (\log_5(2x+5))^{\operatorname{arctg} x}$.
14. $y = \frac{\sqrt[3]{(x-2)^4}}{(x-5)^7(x+1)^2}$.

№ 21-вариант

1. $y = \sqrt[4]{x^3} - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^5} + 3x$.
2. $y = \frac{3}{x-4} + \sqrt[6]{(2x^2-3x+1)^5}$.
3. $y = \sin^3 2x \cdot \operatorname{arctg} 3x^5$.
4. $y = \ln(x+9) \cdot \operatorname{arctg}^3 2x$.
5. $y = \sqrt[3]{x-4} \cdot \arcsin^4 5x$.
6. $y = \operatorname{th}^4 x \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$.
7. $y = \frac{e^{\operatorname{ctg} 5x}}{(3x-5)^3}$.
8. $y = \frac{\lg(x+2)}{\sin 2x^3}$.
9. $y = \frac{\operatorname{th}^2(x+3)}{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}$.
10. $y = \frac{\log_7(2x^2+5)}{(x-4)^2}$.
11. $y = \sqrt{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \arcsin(2x+3)$.
12. $y = (\sin 4x)^{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}$.
13. $y = (\sin(8x-1))^{\operatorname{ch}(x+3)}$.
14. $y = \frac{(x+4)^3(x-2)^4}{\sqrt[3]{(x-2)^5}}$.

№ 22-вариант

1. $y = 4x^3 + \frac{3}{x} - \sqrt[3]{x^5} - \frac{2}{x^4}$.
2. $y = \sqrt{(x-4)^7} - \frac{10}{3x^2+5x+1}$.
3. $y = \cos \sqrt[3]{x} \cdot \operatorname{arctg} x^4$.
4. $y = \lg(x+2) \cdot \arcsin^2 3x$.
5. $y = (x-5)^4 \cdot \arccos 3x^5$.
6. $y = \operatorname{cth}^3 4x \cdot \arcsin(3x+1)$.
7. $y = \frac{(2x-3)^7}{e^{-2x}}$.
8. $y = \frac{\lg^3 7x}{\ln(3x+2)}$.
9. $y = \frac{\arcsin^2 3x}{\operatorname{ch}(x-2)}$.
10. $y = \frac{2 \ln(3x-10)}{(x+5)^2}$.
11. $y = \sqrt{\frac{x-8}{x+8}} \cdot \arccos(3x-5)$.
12. $y = (\operatorname{tg} 3x^4)^{\sqrt{x+1}}$.
13. $y = (\cos(3x+8))^{\operatorname{th}(x-7)}$.
14. $y = \frac{(x-1)^5(x+2)^3}{\sqrt[3]{(x+3)^2}}$.

№ 23-вариант

1. $y = 4x^5 - \frac{5}{x} - 4\sqrt{x^3} + \frac{2}{x^2}$.
2. $y = \frac{4}{(x-7)^3} - \sqrt[3]{(3x^2-x+1)^4}$.
3. $y = \operatorname{tg}^6 2x \cdot \cos 7x^3$.
4. $y = 4^{-\sin x} \cdot \operatorname{arctg} 3x$.
5. $y = \sqrt{(x+3)^5} \cdot \arcsin 3x^4$.
6. $y = \operatorname{ch}^2 5x \cdot \operatorname{arctg} x^4$.
7. $y = \frac{(3x+1)^4}{e^{\frac{2}{x}}}$.
8. $y = \frac{\operatorname{ctg} \sqrt{x-2}}{\lg(3x+5)}$.
9. $y = \frac{\operatorname{arctg}^3 x}{\operatorname{sh}(2x-5)}$.
10. $y = \frac{8 \lg(4x+5)}{(x-1)^3}$.
11. $y = \sqrt[3]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \operatorname{arctg}(5x+1)$.
12. $y = (\operatorname{ctg} 2x^3)^{\sin \sqrt{x}}$.
13. $y = (\operatorname{tg}(9x+5))^{\operatorname{ch}(2x-1)}$.
14. $y = \frac{(x-1)^4(x-7)^2}{\sqrt[3]{(x+2)^5}}$.

№ 24-вариант

1. $y = \frac{7}{x} + \frac{4}{x^3} - \sqrt[3]{x^3} - 2x^6$.
2. $y = \frac{7}{(x+2)^2} - \sqrt{8-5x+2x^2}$.
3. $y = \operatorname{ctg}^3 4x \cdot \arcsin \sqrt{x}$.
4. $y = 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arctg}^3 x$.
5. $y = \sqrt[3]{(x+1)^2} \cdot \arccos 3x$.
6. $y = \operatorname{th}^4 7x \cdot \arccos x^2$.
7. $y = \frac{5x^2+4x-2}{e^{-x}}$.
8. $y = \frac{\lg(3x-5)}{\ln^3(x+3)}$.
9. $y = \frac{\arccos^3 5x}{\operatorname{th}(x-2)}$.
10. $y = \frac{2 \log_3(4x+7)}{(x+3)^4}$.
11. $y = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \operatorname{arctg}(7x+2)$.
12. $y = (\operatorname{tg} 7x)^{\sqrt{x+2}}$.
13. $y = (\operatorname{ctg}(7x+5))^{\operatorname{sh} 3x}$.
14. $y = \frac{(x+7)^3(x-3)^5}{\sqrt{x^2+3x-1}}$.

1. $y = \frac{6}{x^6} + \frac{3}{x} + 3x^3 - \sqrt{x^7}$.
2. $y = \sqrt[3]{(x-1)^5} + \frac{5}{2x^2+4x-7}$.
3. $y = \operatorname{ctg} \frac{1}{x} \cdot \arccos x^4$.
4. $y = \lg(x-3) \cdot \arcsin^2 5x$.
5. $y = \operatorname{tg}^3 x \cdot \operatorname{arctg} 3x$.
6. $y = \operatorname{cth} 4x^5 \cdot \arccos 2x$.
7. $y = \frac{\sqrt{5x^2-x+1}}{e^{1/x}}$.
8. $y = \frac{\cos^2 x}{\lg(x^2-2x+1)}$.
9. $y = \frac{\sqrt{\arccos 3x}}{\operatorname{sh}^2 x}$.
10. $y = \frac{3 \log_4(2x+9)}{(x-7)^2}$.
11. $y = \sqrt{\frac{7x-4}{7x+4}} \cdot \arcsin(x^2+1)$.
12. $y = (\arccos x)^{\sqrt{\cos x}}$.
13. $y = (\operatorname{sh}(3x-7))^{\cos(x+8)}$.
14. $y = \frac{\sqrt[3]{x-3} \cdot (x+7)^5}{(x-4)^2}$.

10-§. Иккинчи мустақил уй иши

Иккинчи мустақил уй ишининг ҳар бир вариантида олти мисол бўлиб уларнинг шартлари қуйидагича.

Биринчи мисолда: берилган ошқормас функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топиш керак.

Иккинчи мисолда: параметрик кўринишдаги функциянинг y' ва y'' ҳосилаларини топиш керак.

Учинчи мисолда: берилган y функция учун аргументнинг x_0 қийматида $y'''(x_0)$ ни ҳисоблаш керак.

Тўртинчи мисолда: берилган функцияларнинг n -тартибли ҳосиласини топиш керак.

Бешинчи ва олтинчи мисолларнинг шартлари вариантда берилган.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1. Агар $x^3y - y^2 = 6x$ функция берилган бўлса, y' ва y'' ларни топинг.

Ечиш. Биринчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$3x^2y + x^3y' - 2yy' = 6. \quad (A)$$

Бундан y' ни топамиз:

$$y' = \frac{6-3x^2y}{x^3-2y}. \quad (B)$$

Иккинчи тартибли ҳосилани топиш учун (A) ёки (B) тенгликларнинг ҳар иккала қисмини дифференциаллаш:

$$6xy + 3x^2y' + 3x^2y' + x^3y'' - 2y'y' - 2yy'' = 0,$$

бундан

$$y''(x^3 - 2y) = 2y'^2 - 6x^2y' - 6xy,$$

$$y'' = 2 \cdot \frac{(6-3x^2y)^2}{(x^3-2y)^3} - 6x^2 \frac{6-3x^2y}{(x^3-2y)^2} - \frac{6xy}{x^3-2y}.$$

$$2. \text{ Агар } \begin{cases} x = 3t^4 - t^2, \\ y = t^3 - 5 \end{cases}$$

бўлса, y' ва y'' ларни топинг.

$$\text{Ечиш. } \begin{cases} x' = 12t^3 - 2t, \\ y' = 3t^2 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} x'' = 36t^2 - 2, \\ y'' = 6t \end{cases} \text{ бўлгани учун}$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2}{12t^3-2t} = \frac{3t}{12t^2-2},$$

$$y''_x = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} = \frac{6t(12t^3-2t) - (3t^2)(36t^2-2)}{(12t^3-2t)^3} =$$

$$= \frac{72t^4 - 12t^2 - 108t^4 + 6t^2}{(12t^3-2t)^3} = -\frac{3(6t^2+1)}{4(6t^2-1)^2}.$$

3. Агар $y = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} \cos^2 x$ бўлса, $y'''(\frac{\pi}{4})$ ни топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг учинчи тартибгача ҳосилаларини топамиз:

$$y' = \frac{1}{2} \cos x \cdot \sin x = \frac{1}{4} \sin 2x,$$

$$y'' = \frac{1}{2} \cos 2x, \quad y''' = -\sin 2x.$$

Демак,

$$y'''(\frac{\pi}{4}) = y'''(45^\circ) = -\sin 2 \cdot 45^\circ = -\sin 90^\circ = -1.$$

4. $y = xe^x$ функциянинг n -тартибли ҳосиласини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи, иккинчи, учинчи ва ҳоказо тартибли ҳосилаларини топамиз:

$$y' = e^x + xe^x$$

$$y'' = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$$y''' = 2e^x + e^x + xe^x = 3e^x + xe^x.$$

y', y'', y''' лар учун ҳосил қилинган ифодаларни солиштириб n -тартибли ҳосила учун

$$y^{(n)} = ne^x + xe^x$$

формулани ёзамиз.

5. $y = x^2 - 9x - 4$ эгри чизиққа абсциссаси $x = -1$ бўлган нуқтадан ўтказилган уринма тенгламасини ёзинг.

Ечиш. Уринманинг уриниш нуқтаси ординатаси $y(-1) = 1 + 9 - 4 = 6$ га тенг. Ихтиёрий нуқта учун $y' = 2x - 9$, уриниш нуқтасида: $y'(-1) = -11$. Шунинг учун $M(-1; 6)$ нуқтада ўтувчи ва бурчак коэффициентини $k = -11$ бўлган уринманинг тенгламаси $y - 6 = -11(x + 1) \Rightarrow y = -11x - 5$ бўлади.

6. Ох ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x_1 = \frac{t^2}{3} - 4$ ва $x_2 = \frac{7}{2}t^2 - 12t + 3$ қонун бўйича ҳаракатланади. Қандай вақтдан кейин уларнинг тезлиги тенг бўлади?

Ечиш. Иккала нуқтанинг тезлигини топамиз:

$$x_1' = t, \quad x_2' = 7t - 12.$$

Масаланинг шартига асосан: $x_1' = x_2'$, яъни $t^2 = 7t - 12$, $t^2 - 7t + 12 = 0$, бундан $t_1 = 3$ с, $t_2 = 4$ с.

1-вариант

$$1. \arctg y = 4x + 5y.$$

$$2. \begin{cases} x = \sqrt{t}, \\ y = \sqrt[3]{t}. \end{cases}$$

$$3. y = e^x \cos x, \quad x_0 = 0.$$

$$4. y = \frac{1}{x+5}.$$

5. $y = x^3 - 5x^2 + 7x - 2$ эгри чизиқнинг (1; 1) нуқтасида ўтказилган нормалнинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $S = t^4 - 3t^2 + 2t - 4$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = 2$ с даги тезлигини топинг.

2-вариант

$$1. y^2 - x = \cos x.$$

$$2. \begin{cases} x = \frac{2t}{1+t^2}, \\ y = \frac{t^2}{1+t^2}. \end{cases}$$

$$3. y = \sin 2x, \quad x_0 = \pi.$$

$$4. y = e^{-2x}.$$

5. $x^2 - y^2 + xy - 1 = 0$ эгри чизиқнинг (3; 2) нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини аниқланг.

6. Моддий нуқта $S = 3t^4 - t^3 + 4t^2 + 6$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = 2$ с даги тезлигини топинг.

3-вариант

$$1. 3x + \sin y = 5y.$$

$$2. \begin{cases} x = \sqrt{t^2 - 1}, \\ y = \frac{t+1}{\sqrt{t^2 - 1}}. \end{cases}$$

$$3. y = (2x + 1)^5, \quad x_0 = 1.$$

$$4. y = \ln(3 + x).$$

5. $y^2 = 4x^3$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $x + 3y - 1 = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр бўлади?

6. Моддий нуқта $s = 4 \cos\left(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + 6$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = \pi$ с даги тезлигини топинг.

4-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. \operatorname{tg} y = 3x + 5y. & 2. \begin{cases} x = 4t + 2t^2, \\ y = 5t^3 - 3t^2. \end{cases} \\ 3. y = \ln(1+x), x_0 = 2. & 4. y = \sqrt{x}. \end{array}$$

5. $y = x^2 - 6x + 2$ эгри чизикқа абсциссаси $x = 2$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $s = 4 \sin\left(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}\right) - 8$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = \frac{\pi}{2}$ с даги тезлигини топинг.

5-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. xy = \operatorname{ctg} y. & 2. \begin{cases} x = \frac{\ln t}{t}, \\ y = t \ln t. \end{cases} \\ 3. y = \frac{1}{2} x^2 e^x, x_0 = 0. & 4. y = x e^{3x}. \end{array}$$

5. $y = \frac{x^2}{4} - x + 5$ эгри чизикқа абсциссаси $x = 4$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $s = -3 \cos\left(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{12}\right) + 10$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = \frac{\pi}{3}$ с даги тезлигини топинг.

6-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. y = e^x + 4x. & 2. \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t. \end{cases} \\ 3. y = \arcsin x, x_0 = 0. & 4. y = \ln(x-3). \end{array}$$

5. $y = \frac{x^4}{4} - 27x + 60$ эгри чизикқа абсциссаси $x = 2$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $s = \frac{5}{3} t^3 - \frac{1}{2} t^2 + 7$ қонун бўйича ҳаракатланади. Неча секунддан кейин унинг тезлиги 42 м/с га тенг бўлади?

7-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. \ln y - \frac{y}{x} = 7. & 2. \begin{cases} x = t^4, \\ y = \ln t. \end{cases} \\ 3. y = (5x-4)^5, x_0 = 2. & 4. y = \ln(5+x)^2. \end{array}$$

5. $y = -\frac{x^2}{2} + 7x - \frac{15}{2}$ эгри чизикқа абсциссаси $x = 3$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $S = 4t^3 - 2t + 11$ қонун бўйича ҳаракатланади. Неча секунддан кейин унинг тезлиги 190 м/с га тенг бўлади?

8-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. y^2 + x^2 = \sin y. & 2. \begin{cases} x = 5 \cos t, \\ y = 4 \sin t. \end{cases} \\ 3. y = x \sin 2x, x_0 = \frac{\pi}{2}. & 4. y = e^{4x}. \end{array}$$

5. $y = 3 \operatorname{tg} 2x + 1$ эгри чизикқа абсциссаси $x = \frac{\pi}{2}$ бўлган нуқтада ўтказилган нормалнинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $S = 2t^5 - 6t^3 - 58$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = 2$ с даги тезлигини топинг.

9-вариант

$$\begin{array}{ll} 1. e^x = 4x - 7y. & 2. \begin{cases} x = 5 \cos^2 t, \\ y = 3 \sin^2 t. \end{cases} \\ 3. y = x^2 \ln x, x_0 = \frac{1}{3}, & 4. y = \frac{1}{x-7}. \end{array}$$

5. $y = 4\lg 3x$ эгри чизикқа абсциссаси $x = \frac{\pi}{9}$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини ёзинг.

6. Моддий нуқта $s = \frac{5}{3}t^3 - 2t + 7$ қонун бўйича ҳаракатланади. Нуқта ҳаракатининг $t = 4$ с даги тезлигини топинг.

10-вариант

1. $4\sin^2(x+y) = x$.

2. $\begin{cases} x = \arctg t, \\ y = \ln(1+t^2). \end{cases}$

3. $y = x \sin 2x, x_0 = -\frac{\pi}{4}$.

4. $y = 5^x$.

5. $y = 6\lg 5x$ эгри чизикқа абсциссаси $x = \frac{\pi}{20}$ бўлган нуқтада ўтказилган нормалнинг тенгламасини ёзинг.

6. Ох ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x = 3t^2 - 8$ ва $x = 2t^2 + 5t + 6$ қонун бўйича ҳаракатланади. Бу нуқталар бир-бирлари билан учрашганларидан кейин қандай тезликлар билан узоқлашадилар?

11-вариант

1. $\sin y = 7x + 3y$.

2. $\begin{cases} x = \arcsin t, \\ y = \sqrt{1-t^2}. \end{cases}$

3. $y = x \cos 2x, x_0 = \frac{\pi}{12}$.

4. $y = e^{-5x}$.

5. $y = 4\sin 6x$ эгри чизикқа абсциссаси $x = \frac{\pi}{18}$ бўлган нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини тузинг.

6. Ох ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x = 5t^2 - t + 6$ ва $x = 4t^2 + 18$ қонун бўйича ҳаракатланади. Бу нуқталар бир-бирлари билан учрашганларидан кейин қандай тезликлар билан узоқлашадилар?

12-вариант

1. $\operatorname{tg} y = 4y - 5x$.

2. $\begin{cases} x = 3(t - \sin t), \\ y = 3(1 - \cos t). \end{cases}$

3. $y = x^4 \ln x, x_0 = 1$.

4. $y = \ln(4+x)$.

5. $y = \sin 2x$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма Ох ўқи билан $\frac{\pi}{4}$ бурчак ташкил этишини аниқланг.

6. Ох ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x = \frac{4}{3}t^3 - 7t + 16$ ва $x = t^3 + 2t^2 + 5t - 8$ қонун бўйича ҳаракатланади. Қандай вақтдан кейин уларнинг тезликлари тенг бўлади?

13-вариант

1. $y = 7x - \operatorname{ctg} y$.

2. $\begin{cases} x = 3(\sin t - t \cos t), \\ y = 3(\cos t + t \sin t). \end{cases}$

3. $y = x + \arctg x, x_0 = 1$.

4. $y = \frac{1}{x-6}$.

5. $y = 2x^3 - 1$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма Ох ўқи билан $\frac{\pi}{3}$ бурчак ташкил этишини аниқланг.

6. Моддий нуқта $s = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 - 11t + 275$ қонун бўйича ҳаракатланади. Қандай вақтдан кейин унинг тезлиги 10 м/с га тенг бўлади?

14-вариант

1. $xy - 6 = \cos y$.

2. $\begin{cases} x = \sin 2t, \\ y = \cos^2 t. \end{cases}$

3. $y = \cos^2 x, x_0 = \frac{\pi}{4}$.

4. $y = 10^x$.

5. $y = \frac{x^2}{1} - \frac{x^2}{2} - 7x + 9$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма Ох ўқи билан $-\frac{\pi}{4}$ бурчак ташкил этишини аниқланг.

6. Моддий нуқта $xy = 20$ гипербола бўйича ҳаракатланади. Унинг абсциссаси 1 м/с тезлик билан текис ўсади. Нуқта (4;5) ҳолатга келганда унинг ординатаси қандай тезликда бўлади.

15-вариант

1. $3y = 7 + xy^3$.

2. $\begin{cases} x = e^{3t}, \\ y = e^{-3t}. \end{cases}$

$$3. y = \ln(x^2 - 4), x_0 = 3.$$

$$4. y = 7^x.$$

5. $y = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 7x + 4$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма Ox ўқи билан $\frac{\pi}{4}$ бурчак ташкил этади?

6. $y^2 = 8x$ параболаининг қайси нуқтасида ординатаси абсциссасига қараганда икки марта тез ўсади?

16-вариант

$$1. y^2 = x + \ln \frac{y}{x}.$$

$$2. \begin{cases} x = \frac{\ln t}{t}, \\ y = t^2 \ln t. \end{cases}$$

$$3. y = x^2 \cos x, x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$4. y = \cos 3x.$$

5. $y = \frac{x^3}{3} - \frac{9x^2}{2} + 20x - 7$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма Ox ўқига параллел бўлади?

6. Ox ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x = 5t^2 + 2t + 6$ ва $4t^2 + 3t + 18$ қонун бўйича ҳаракатланади. Бу нуқталар бир-бирлари билан учрашганларидан кейин қандай тезликлар билан узоқлашадилар?

17-вариант

$$1. xy^2 - y^3 = 4x - 5.$$

$$2. \begin{cases} x = \arccos t, \\ y = \sqrt{1 - t^2}. \end{cases}$$

$$3. y = x \arccos x, x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$4. y = \ln(3x - 5).$$

5. $y = \frac{x^4}{4} - 7$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $y = 8x - 4$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. $y^2 = 16x$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ординатаси абсциссасига қараганда тўрт марта тез ўсади?

18-вариант

$$1. x^2 y^2 + x = 5y.$$

$$2. \begin{cases} x = \frac{1}{t+1}, \\ y = \frac{t^2}{(e+1)^t}. \end{cases}$$

$$3. y = (x+1)\ln(x+1), x_0 = -\frac{1}{2}.$$

$$4. y = \frac{x}{x+5}.$$

5. $y = -3x^2 + 4x + 7$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $x - 20y + 5 = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр бўлади?

6. $x^2 = 9y$ параболаининг қайси нуқтасида абсциссаси ординатасига қараганда икки марта тез ўсади?

19-вариант

$$1. x^4 + x^2 y^2 + y = 4.$$

$$2. \begin{cases} x = 5 \sin^3 t, \\ y = 3 \cos^3 t. \end{cases}$$

$$3. y = \ln^3 x, x_0 = 1.$$

$$4. y = \ln \frac{1}{4-x}.$$

5. $y = 3x^2 - 4x + 6$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $8x - y - 5 = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. $x^2 = 10y$ параболаининг қайси нуқтасида абсциссаси ординатасига қараганда беш марта тез ўсади?

20-вариант

$$1. \sin y = xy^2 + 5.$$

$$2. \begin{cases} x = e^{-3t}, \\ y = e^{3t}. \end{cases}$$

$$3. y = 2^{x^2}, x_0 = 1.$$

$$4. y = \sqrt{x+7}.$$

5. $y = 5x^2 - 4x + 1$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $x + 6y + 15 = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр бўлади?

6. Ox ўқи бўйича иккита моддий нуқта $x = 2t^3 - 2t^2 + 6t - 7$ ва $x = \frac{5}{3}t^3 - t^2 + 14t + 4$ қонун бўйича ҳаракатланади. Қандай вазиятдан кейин уларнинг тезлиги тенг бўлади?

21-вариант

$$1. x^3 + y^3 = 5x.$$

$$2. \begin{cases} x = \sqrt[3]{(t-1)^2}, \\ y = \sqrt{t-1}. \end{cases}$$

$$3. y = (4x-3)^5, x_0 = 1.$$

$$4. y = xe^{5x}.$$

5. $y = 3x^2 - 5x - 11$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $x - y + 10 = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. Моддий нуқта эгри чизик бўйича $S = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 30t + 18$ формула билан берилган қонун асосида ҳаракатланади. Вақтнинг қандай пайтида нуқтанинг тезлиги нолга тенг бўлади?

22-вариант

1. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{7}$.

2. $\begin{cases} x = \ln^2 t, \\ y = t + \ln t. \end{cases}$

3. $y = x \operatorname{arccotg} x$, $x_0 = 2$.

4. $y = \frac{4}{x+3}$.

5. $y = -x^2 + 7x + 16$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $y = 3x + 4$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. Жисм Ox тўғри чизик бўйлаб $y = \frac{1}{3}t^3 - \frac{7}{2}t^2 - 10t - 16$ қонун бўйича ҳаракатланди. Жисмнинг тезлиги ва тезланишини аниқланг.

23-вариант

1. $y^2 = \frac{x-y}{x+y}$.

2. $\begin{cases} x = te^t, \\ y = \frac{t}{e^t}. \end{cases}$

3. $y = (7x - 4)^6$, $x_0 = 1$.

4. $y = \frac{1+x}{\sqrt{x}}$.

5. $y = 4x^2 - 10x + 13$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $y = 6x - 7$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. t вақтда бирор кимёвий реакция натижасида олинган модданинг массаси $x = 7(1 - e^{-4t})$ (кг) тенглама билан ифодаланади. $t = 0$ бўлганда реакция тезлигини аниқланг.

24-вариант

1. $\sin^2(3x^2 + y^2) = 5$.

2. $\begin{cases} x = 6t^2 - 4, \\ y = 3t^5. \end{cases}$

3. $y = x \sin 2t$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

4. $y = \frac{1}{x+1}$.

5. $y = 7x^2 - 5x + 4$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $23y + x - 1 = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр бўлади?

6. Моддий нуқта тўғри чизик бўйлаб $v' = 6x$ қонун бўйича ҳаракатланади (бунда v — тезлик, x — ўтилган йўл). Тезлик 6 м/с бўлганда нуқта тезланишини аниқланг.

25-вариант

1. $\operatorname{ctg}^2(x + y) = 5x$.

2. $\begin{cases} x = \arcsin t, \\ y = \ln t. \end{cases}$

3. $y = \sin(x^3 + \pi)$, $x_0 = \sqrt[3]{\pi}$.

4. $y = \ln(5x - 1)$.

5. $y = \frac{x^2}{4} - 7x + 5$ эгри чизикнинг қайси нуқтасида ўтказилган уринма $y = 2x + 5$ тўғри чизикқа параллел бўлади?

6. Моддий нуқта $S = 3t + t^3$ қонун бўйича ҳаракатланади. Унинг $t = 2$ с даги ҳаракат тезлигини топинг.

11-§. Учинчи мустақил уй иши

Учинчи мустақил уй ишининг ҳар бир вариантида етти мисол бўлиб, уларнинг шарти қуйидагича.

1—5 мисолларда: берилган функцияларнинг лимитини Лопиталь қоидаи ёрдамида топиш керак.

6—7 мисолларда: берилган ифодаларни дифференциал ёрдамида тақрибий ҳисоблаш ва хатолиқни баҳолаш (вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан) керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

Қуйидаги лимитларни Лопиталь қоидаидан фойдаланиб топинг.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{\sqrt[3]{3x-1}}$

Ечиш. $x \rightarrow \infty$ да лимит белгиси остидаги касрнинг сурат ва махражи чексизликка интилади.

Демак, $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Бинобарин, унга Лопиталь қоидаини қўллаш мумкин:

$$\begin{aligned}
 1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2+1)}{\sqrt[3]{3x-1}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x^2+1}}{\frac{1}{5\sqrt[3]{(3x-1)^4}}} = \\
 &= \frac{10}{5} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt[3]{(3x-1)^4}}{x^2+1} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \frac{10}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{(3x-1)^4} + x \cdot \frac{4}{3}(3x-1)^{\frac{1}{3}}}{2x} = \\
 &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{15x-5+12x}{10x-\sqrt[3]{3x-1}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{27x-5}{x-\sqrt[3]{3x-1}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{27-\frac{5}{x}}{\sqrt[3]{3x-1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{27}{\infty} = 0.
 \end{aligned}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{\operatorname{tg}^2 2x}.$$

Ечиш. $x = \frac{\pi}{2}$ да $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмаслик ҳосил бўлади. Унга Лопиталь қоидасини татбиқ этамиз:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{\operatorname{tg}^2 2x} \left(\frac{0}{0} \right) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{2 \operatorname{tg} 2x \cdot \frac{2}{\cos^2 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos^3 2x \cos x}{4 \sin 2x} = \\
 &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (-\cos^3 2x) \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{4} \cdot 1 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 \sin x} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 4x}{e^{3x}-1}.$$

Ечиш. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмаслик, уни Лопиталь қоидаси ёрдамида ечамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 4x}{e^{3x}-1} \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{1+16x^2}}{3e^{3x}} = \frac{4}{5}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2-\sqrt{4+x^2}} - \frac{3}{\sqrt{16+x-4}} \right).$$

Ечиш. Бу ерда $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмаслик бўлгани учун уни алгебраик алмаштириш ёрдамида $\frac{0}{0}$ кўринишга келтирамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2-\sqrt{4+x^2}} - \frac{3}{\sqrt{16+x-4}} \right) (\infty - \infty) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{16+x-4}-6+3\sqrt{4+x^2}}{(2-\sqrt{4+x^2})(\sqrt{16+x-4})} \right) \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{16+x}} + \frac{3x}{\sqrt{4+x^2}}}{\frac{x}{\sqrt{4+x^2}}(\sqrt{16+x-4}) + \frac{1}{2\sqrt{16+x}}(2-\sqrt{4+x^2})} = \frac{\frac{1}{8}}{0} = \infty.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3} \right)^x.$$

Ечиш. 1^∞ кўринишдаги аниқмаслик.

$y = \left(\frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3} \right)^x$ белгилаш киритамиз, сўнгра ҳар иккала томонини логарифмлаймиз:

$$\ln y = x \ln \frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3}}{\frac{1}{x}} \left(\frac{0}{0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3} \right)^{-1} \cdot \frac{(2x+3)(x^2-x-3) - (2x-1)(x^2+3x-4)}{(x^2-x+3)^2}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2(2x^3-2x^2-6x+3x^2-3x-9-2x^2-6x^2+8x+x^2+3x-4)}{(x^2+3x-4)(x^2-x-3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2(-4x^2+2x-13)}{(x^2+3x-4)(x^2-x-3)} = 4.$$

$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3} \right)^x = 4$ бўлгани учун $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+3x-4}{x^2-x+3} \right)^x = e^4$ бўлади.

6. $\sqrt[3]{84}$ ни вергулдан кейинги икки рақамигача аниқлик билан топинг.

Ечиш. Берилган ифодани қуйидаги қуринишда ёзиб оламиз: $\sqrt[3]{84} = \sqrt[3]{4^3 + 20}$ ва $y = \sqrt[3]{x}$ функцияни киритамиз, бунда

$$x = x_0 + \Delta x, \Delta x = 20,$$

$$y = (x_0 + \Delta x) \approx y(x_0) + y'(x_0)\Delta x$$

формуладан фойдаланамиз.

$$y(x_0) = \sqrt[3]{64} = 4, y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}; y'(64) = \frac{1}{3 \cdot 16} = \frac{1}{48}.$$

У ҳолда

$$\sqrt[3]{84} \approx 4 + \frac{20}{48} = 4,42.$$

Нисбий хато

$$\delta = \frac{4,42 - 4,3}{4,42} \cdot 100\% = 2,7\%.$$

7. $\arctg 0,98$ ни тақрибий ҳисобланг.

Ечиш. 6-мисолдаги каби ишларни бажарамиз:

$$y = \arctg x, x_0 = 1, \Delta x = 0,98 - 1 = -0,02.$$

$$y(x_0) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4},$$

$$y' = \frac{1}{1+x^2}; y'(1) = 0,5, \arctg 0,98 \approx \frac{\pi}{4} - 0,5 \cdot 0,02 = 0,77.$$

Нисбий хато

$$\delta = \left| \frac{0,77 - 0,78}{0,77} \right| \cdot 100\% = 13\%.$$

1-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} (\pi - 2\arctg x) \ln x. \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{3x}}{\sin x}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1-x) + \lg \frac{\pi x}{2}}{\arctg x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{x^2}.$$

$$7. \cos 59^\circ.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{\lg x^2}}.$$

$$6. \sqrt[3]{70}.$$

2-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a^{\frac{1}{x}} - 1 \right) x.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x \cdot \ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (\ln \arctg x)^{\lg x}.$$

$$7. e^{2,01}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{x}{\arctg x} - \frac{\pi}{2 \cos x} \right).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x}.$$

$$6. (2,01)^3 + (2,01)^2.$$

3-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right).$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2} \cdot \ln(1-x)}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a} \right)^{\frac{\pi x}{2a}}.$$

$$7. \ln \arctg 46^\circ.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) \cdot \arctg \frac{x}{2}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} (\ln(x + e^x))^{\frac{1}{x}}.$$

$$6. \sqrt[3]{65}.$$

4-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 - \sin x^2}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(e^{x^2} - 1)}{\cos x - 1}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctg x}{x^3}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\lg x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}.$$

$$7. \arctg \sqrt{1,02}.$$

5-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{2 \sin x + x}.$$

$$6. \frac{2,9}{\sqrt{(2,9)^2 + 16}}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{1 - \sin ax}{(2ax - \pi)^2}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - \cos \alpha x}{e^{\beta x} - \cos \beta x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9 + x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}}.$$

$$6. \sqrt{\frac{4 - 3,02}{1 + 3,02}}.$$

$$7. \arctg \sqrt{0,97}.$$

6-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{e^{\frac{1}{x^2}} - 1}}{2 \arctg x - \pi}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2 \sin x}{\cos 3x}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x)^{\frac{\cos \pi x}{2}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^x.$$

$$6. \sqrt[3]{15,8}.$$

$$7. \arctg 1,01.$$

7-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 7x + 6}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\ln(1 + 2x)}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{a}{6x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$6. \sqrt[3]{10}.$$

$$7. \ln(e^2 + 0,2).$$

8-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{e^x - 1}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \operatorname{tg} 4x - 12 \operatorname{tg} x}{3 \sin 4x - 12 \sin x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg} x)^{2x - \pi}.$$

$$6. \sqrt[3]{200}.$$

$$7. \arctg 1,03.$$

9-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} x^{x-1}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x.$$

$$6. \sqrt[3]{34}.$$

$$7. \ln \operatorname{tg} 47^\circ 15'.$$

10-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1 - x^3}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\frac{\pi x}{2}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

$$6. \sqrt{\frac{(2,037)^2 - 3}{(2,037)^2 + 5}}.$$

$$7. \lg 9,5.$$

11-вариант

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{1 - \cos bx}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\lg \frac{\pi x}{2}}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^x$
- $\sqrt[3]{130}$
- $\arctg \sqrt{3,1}$

12-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - 1}{1 - \cos x}$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{x^n - a^n}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4}{x+3} \right)^{3x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right)^x$
- $\sqrt[3]{27,5}$
- $2^{2,1}$

13-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{x}}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x}$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\pi 2x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\lg x}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)e^{\frac{1}{x-1}}$
- $\sqrt{17}$
- $4^{1,2}$

14-вариант

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 2 \operatorname{tg} x}{1 + \cos 4x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x)$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg} x)^{\sin x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$
- $\sqrt[3]{640}$
- $\operatorname{tg} 59^\circ$

15-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin mx)}{\ln(\sin x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2}$
- $\sqrt{1,2}$
- $\log_2 1,9$

16-вариант

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 5x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^{2x}) \operatorname{ctg} x$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{5}{1 + 2 \ln x}}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1 - 2x}$
- $\sqrt[10]{1025}$
- $\arctg \sqrt{3,2}$

17-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) \operatorname{ctg} x$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x \sqrt{1 - x^2}}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-0,01x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^x)^{\frac{1}{x}}$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x} \right)^x.$$

$$6. (3,02)^4 + (3,02)^3.$$

$$7. \operatorname{ctg} 29^\circ.$$

18-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x^2}{\sin^2 2x}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+xe^x)}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)^{\frac{1}{\ln 2(x-1)}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\cos \sqrt{x}}.$$

$$6. (5,07)^3.$$

$$7. \sin 93^\circ.$$

19-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{3}{x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x\sqrt{x}}}{\sqrt{\sin bx}}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\lg 2 x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{m}{x} \right)^x.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}.$$

$$6. (4,01)^{1,5}.$$

$$7. \lg 1,5.$$

20-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{1+2x}+1}{\sqrt{2+x}+x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\cos 3x - e^{-x}}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2} - 1}{2 \operatorname{arctg} x^2 - \pi}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg} 2x)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x.$$

$$6. \sqrt[3]{1,02}.$$

$$7. \sin 29^\circ.$$

21-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln 2x \cdot \ln(2x-1).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{1}{x-5} - \frac{5}{x^2-x-20} \right).$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}.$$

$$6. \cos 151^\circ.$$

$$7. \lg 101.$$

22-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-\sin \frac{\pi x}{2}}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+7)}{\sqrt[4]{x-3}}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{x}{3x-1} - \frac{1}{\ln 3x} \right).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \sin \frac{a}{x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} x^{4+\ln x}.$$

$$6. \operatorname{arctg} 1,05.$$

$$7. \sin 31^\circ.$$

23-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{4x - \sin x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{x}}{\operatorname{ctg} \frac{x}{2}}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \arcsin x \cdot \operatorname{tg} x.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})} \right).$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x}.$$

$$6. \cos 61^\circ.$$

$$7. \lg 0,9.$$

24-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 5x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 2x) \operatorname{ctg} 4x.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\frac{\cos x}{2}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\lg x}.$$

$$6. \operatorname{tg} 44^\circ.$$

$$7. e^{0.25}.$$

25-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x - 2 \operatorname{tg} x}{1 + \cos 4x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^2 \sin \frac{b}{x}\right).$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg} x)^{\sin x}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 7x + 6}.$$

$$6. \operatorname{arctg} 0,98.$$

$$7. \sqrt{15}.$$

12-§. Тўртинчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй ишининг ҳар бир вариантда тўртта мисол бўлиб, уларнинг шarti қуйидагича:

Биринчи мисолнинг шarti вариантда берилган.

Иккинчи ва учинчи мисолларда: берилган функцияларни тўлиқ текшириш ва уларнинг чизмасини чизиш керак.

Тўртинчи мисолда: берилган $y = f(x)$ функциянинг $[a; b]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топиш керак:

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1. Берилган S тўла сиртга эга ва асоси квадрат бўлган барча тўғри параллелепипедлар ичидан энг катта ҳажмга эга бўлганини топинг.

Ечиш. Параллелепипед асосининг томони x ва баландлиги y бўлсин, у ҳолда унинг тўла сирти:

$$S = 2x^2 + 4xy$$

112

бўлади, бундан

$$y = \frac{S - 2x^2}{4x}.$$

Параллелепипеднинг ҳажми:

$$V = x^2 y \text{ ёки } V = x^2 \cdot \frac{S - 2x^2}{4x} = \frac{x(S - 2x^2)}{4},$$

$$V = \frac{1}{4} Sx - \frac{1}{2} x^3 \quad \left(0 < 2x^2 < S, 0 < x < \sqrt{\frac{S}{2}}\right).$$

Биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топамиз:

$$V' = \frac{1}{4} S - \frac{3}{2} x^2; \quad V' = 0, \quad \frac{1}{4} \cdot S - \frac{3}{2} x^2 = 0, \quad x = \frac{1}{6} \sqrt{6S},$$

$$V'' = -3x, \quad V'' \left(\frac{1}{6} \sqrt{6S}\right) = -3 \cdot \frac{1}{6} \sqrt{6S} = -\frac{1}{2} \sqrt{6S} < 0$$

бўлгани учун аргументнинг бу қийматида функция (V) максимумга эришади. Параллелепипеднинг баландлиги:

$$y = \frac{S - 2 \left(\frac{1}{6} \sqrt{6S}\right)^2}{4 \cdot \frac{1}{6} \sqrt{6S}} = \frac{1}{6} \sqrt{6S}.$$

Демак, энг катта ҳажмга қирраси $\frac{1}{6} \sqrt{6S}$ бўлган куб эга бўлади.

2. $y = \frac{(x+3)^2}{x-4}$ функцияни тўлиқ текширинг ва унинг графигини чизинг.

Ечиш. Берилган функцияни юқорида баён қилинган схема бўйича текширамыз.

1. Функциянинг аниқланиш соҳаси: $x \in (-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$.

2. $x > 4$ қийматларда $y > 0$ ва $x < 4$ қийматларда $y < 0$ бўлгани учун берилган функциянинг графиги $x = 4$ нинг ўнг томонида Ox ўқининг юқорисида, $x = 4$ нинг чап томонида эса Ox ўқининг пастки қисмида жойлашиши билдиради.

3. Берилган функция графигининг координата ўқлари билан кесишган нуқтаси: $(0; -\frac{9}{4})$ ва $(-3; 0)$.

4. $x = 4$ — вертикал асимптотаси, чунки $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+3)^2}{x-4} = \infty$ бўлгани учун:

$$\lim_{x \rightarrow 4-0} y = \lim_{x \rightarrow 4-0} \frac{(x+3)^2}{x-4} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 4+0} y = \lim_{x \rightarrow 4+0} \frac{(x+3)^2}{x-4} = +\infty.$$

Оғма асимптотасини топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{(x+3)^2}{x(x-4)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(\frac{(x+3)^2}{x-4} - x \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{x^2 + 6x + 9 - x^2 + 4x}{x-4} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{10x + 9}{x-4} = 10.$$

Шундай қилиб, функция ягона $y = x + 10$ оғма асимптотага эга экан.

5. Функциянинг ўсиш, камайиш оралиқларини ва локал экстремумларини текшираемиз:

$$y' = \frac{2(x+3)(x-4) - (x+3)^2}{(x-4)^2} = \frac{2x^2 - 2x - 24 - x^2 - 6x - 9}{(x-4)^2} = \frac{x^2 - 8x - 33}{(x-4)^2}.$$

$y' = 0$ дан, $x^2 - 8x - 33 = 0$, бундан $x_1 = 11$, $x_2 = -3$.

а) $(-\infty; -3)$ интервалда $y' > 0$, демак, функция бу интервалда ўсувчи;

б) $(-3; 4)$ интервалда $y' < 0$, функция камаювчи. Шунинг учун $x = -3$ нуқтаси локал максимум бўлиб, $y(-3) = 0$ бўлади;

в) $(4; 11)$ интервалда $y' < 0$, функция камаяди;

г) $(11; +\infty)$ интервалда $y' > 0$, функция ўсади.

Шунинг учун $x = 11$ нуқта локал минимум бўлиб, $y(11) = 28$ бўлади.

6. Функция графигининг қавариқлик, ботиқлик интервалларини ва букилиш нуқтасини текшираемиз, унинг учун икинчи тартибли ҳосилани топамиз:

$$y'' = \frac{(2x-8)(x-4)^2(x^2-8x-33)2(x-4)}{(x-4)^4} = \frac{2x^2-8x-8x+32-2x^2+16x+66}{(x-4)^3} = \frac{98}{(x-4)^3}.$$

а) $(-\infty; 4)$ интервалда $y'' < 0$ ва бу интервалда эгри чирик қавариқ;

б) $(4; +\infty)$ интервалда $y'' > 0$ ва бу интервалда эгри чирик ботиқ.


$x = 4$ нуқтада функция маънога эга бўлмаганлиги учун букилиш нуқтаси йўқ.

7. Функциянинг графиги 9-чизмада тасвирланган.

3. $y = xe^{\frac{x^2}{2}}$ функцияни тўлиқ текширинг ва унинг графигини ясанг.

Ечиш. 1. Функциянинг аниқланиш соҳаси: $(-\infty; +\infty)$.

2. $x = 0$ да $y = 0$ бўлгани учун график координаталар бошидан ўтади.



9-чизма.

3. Функция $(0; +\infty)$ интервалда мусбат қийматларни ва $(-\infty; 0)$ интервалда манфий қийматларни қабул қилади.

4. Вертикал асимптотаси йўқ.

Оғма асимптотасини аниқлаймиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{xe^{-\frac{x^2}{2}}}{x} = 0.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{e^{\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{\frac{x^2}{2}}} = 0.$$

$y = 0$ горизонтал асимптотага эга бўлдиқ.

5. $y(-x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}} = -y(x)$ бўлгани учун функция тоқ ва унинг графиги координаталар бошига нисбатан симметрик бўлади.

6. Функциянинг монотонлик оралиқларини текшира-миз:

$$y' = \left(\frac{x}{e^{\frac{x^2}{2}}} \right)' = \frac{\frac{x^2}{2} - x \cdot xe^{\frac{x^2}{2}}}{e^{x^2}} = \frac{\frac{x^2}{2}(1-x^2)}{e^{x^2}}.$$

Агар $y' = 0$ бўлса, y ҳолда $1 - x^2 = 0$ бўлади, бундан $x_1 = -1$, $x_2 = 1$. Бу нуқталар сон ўқини учта интервалга бўлади:

а) $(-\infty; -1)$ интервалда $y' < 0$ ва функция бу интервалда камаяди;

б) $(-1; 1)$ интервалда $y' > 0$ ва функция бу интервалда ўсади;

в) $(1; +\infty)$ интервалда $y' < 0$ ва функция камаяди.

Демак, берилган функция $x = -1$ қийматида $y(-1) =$

$$= -1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{e}} \approx -0,6 \text{ бўлиб, } (-1; -0,6) \text{ нуқта минимум нуктаси, } x = 1 \text{ қийматида эса } y(1) = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,6$$

бўлиб, $(1; 0,6)$ нуқта максимум нуктаси бўлади.

7. Функция графигининг қавариқлик, ботиқлик ора-лиқлари ва букилиш нуқтасини топамиз:

$$y' = \frac{1-x^2}{e^{\frac{x^2}{2}}},$$

$$y'' = \frac{-2xe^{\frac{x^2}{2}} - (1-x^2)xe^{\frac{x^2}{2}}}{e^{x^2}} = \frac{xe^{\frac{x^2}{2}}(-2-1+x^2)}{e^{x^2}} = \frac{x(x^2-3)}{e^{\frac{x^2}{2}}}.$$

Агар $y'' = 0$ бўлса, $x(x^2-3) = 0$ бўлиб, бундан $x_1 = 0$, $x_2 = -\sqrt{3}$, $x_3 = \sqrt{3}$.

а) $(-\infty; \sqrt{3})$ интервалда $y'' < 0$ ва эгри чизик бу интервалда қавариқ;

б) $(-\sqrt{3}; 0)$ интервалда $y'' > 0$ ва эгри чизик бу интервалда ботик;

в) $(0; \sqrt{3})$ интервалда $y'' < 0$ ва эгри чизик бу интервалда қавариқ;

г) $(\sqrt{3}; +\infty)$ интервалда $y'' > 0$ ва эгри чизик бу интервалда ботик.

$x = \pm\sqrt{3}$, $x = 0$ нуқталарда y'' иккинчи ҳосила ишорасини ўзгартиргани учун x нинг бу қийматлари функциянинг графиги учун букилиш нуқталарининг абсциссаси бўлиб, унинг координатлари

$$y(\pm\sqrt{3}) = \pm\sqrt{3}/e^{3/2} \approx \pm 0,4, \quad y(0) = 0$$

бўлади.

8. Бу олинган маълумотлар ёрдамида функциянинг графигини чизамиз (10-чизма).


4. $y = 2\sin x + \cos 2x$ функциянинг $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматини топинг.

Е ч и ш. Критик нуқталарни топамиз: $y' = 2\cos x - 2\sin 2x$.

Агар $y' = 0$ бўлса, y ҳолда

$$2\cos x - 4\sin x \cos x = 0, \quad 2\cos x(1 - 2\sin x) = 0.$$

Агар $\cos x = 0$ бўлса, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; агар $\sin x = \frac{1}{2}$ бўлса, $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n$, бунда $k, n \in \mathbb{Z}$.



10-чизма.

Аниқланган критик нуқталардан фақат $x = \frac{\pi}{6}$ ва $x = \frac{\pi}{2}$ нуқталар берилган $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмага тегишли. Шунинг учун $x = 0$, $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{\pi}{2}$ да функциянинг қийматларини ҳисоблаймиз:

$$y(0) = 1, \quad y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ = 1 + \frac{1}{2} = 1,5,$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin 90^\circ + \cos \pi = 2 - 1 = 1.$$

Демак, $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада берилган функция $x = \frac{\pi}{6}$ да энг катта қиймати $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,5$ га, $x = 0$ ва $x = \frac{\pi}{2}$ нуқталарда энг кичик қийматига, яъни $y(0) = y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ га эришади.

1-вариант

1. Кундаланг кесими тўғри тўртбурчак бўлган ходанинг маҳкамлиги энига ва баландлигининг кубига тўғри пропорционал деб қабул қилиб, диаметри 16 см бўлган ходадан кесиб олинadиган тўрт қиррали ёғочнинг эни қандай бўлганда у энг катта маҳкамликка эга бўлади?

$$2. y = \frac{x^2}{4x^2 - 1}, \quad 3. y = x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad 4. y = \frac{x^3}{x^2 - x + 1}; [-1; 1].$$

2-вариант

1. Маълумки, тўсиннинг сиқишга бўлган қаршилиги кесим юзига пропорционал. d диаметри думалоқ хо-

дан кесим юзи тўғри тўртбурчак бўлган шундай тўсин қирқиб олиш керакки, унинг сиқишга бўлган қаршилиги энг катта бўлсин.

$$2. y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, \quad 3. y = x e^{\frac{1}{x}}, \quad 4. y = \frac{(x+1)^3}{x^3}; [1; 2].$$

3-вариант

1. Иккита мусбат соннинг йигиндиси a га тенг. Агар уларнинг кублари йигиндиси энг кичик сон бўлса, у ҳолда шу сонларни топинг.

$$2. y = x + \frac{\ln x}{x}, \quad 3. y = \frac{2+x}{(x+1)^2}, \quad 4. y = \sqrt{x-x^3}; [-2; 2].$$

4-вариант

1. Тўғри бурчакли координаталар системасида (5; 4) нуқта берилган. Бу нуқтадан шундай тўғри чизик ўтказилсинки, у координата ўқларининг мусбат йўналишлари билан энг кичик юзли учбурчак ҳосил қилсин.

$$2. y = x - \ln(1+x^2), \quad 3. y = \frac{(1-x)^2}{(x-2)^2}, \quad 4. y = 4 - e^{-x^2}; [0; 1].$$

5-вариант

1. Узунлиги 50 см бўлган сим бўлагидан энг катта юзга эга бўлган тўғри тўртбурчак ясанг.

$$2. y = x + \frac{x^3}{x^2 - x + 1}, \quad 3. y = x e^x, \quad 4. y = \frac{x^3 + 4}{x^2}; [1; 2].$$

6-вариант

1. Берилган p периметрли тўғри тўртбурчаклар ичидан юзи энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = x^2 - 2 \ln x, \quad 3. y = x^2 e^{\frac{1}{x}}, \quad 4. y = x e^x; [-2; 0].$$

7-вариант

1. Қирраси a бўлган куб ичига қуйидагича цилиндр ясалган: Цилиндр уқи куб диагонали билан устма-уст тушади, асосларининг айланалари кубнинг ёқларига уринади. Шундай цилиндрларнинг энг катта ҳажмга эга бўлганини топинг.

$$2. y = x^3 e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad 3. y = \frac{x^2}{(x+1)^2}. \quad 4. y = (x-x^2) e^x; [-2; 1].$$

8-вариант

1. Иккита мусбат соннинг йиғиндиси a га тенг. Уларнинг кўпайтмаси энг катта бўлиши учун бу сонлар қандай бўлиши керак?

$$2. y = \frac{x^2-x-1}{x^2-2x}. \quad 3. y = (x+2) e^{1-x}. \quad 4. y = (x-1) e^{-x}; [0; 3].$$

9-вариант

1. R радиусли доирага ички чизилган барча тўғри тўртбурчаклар ичидан энг катта юзга эга бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{(x-2)^2}{x+1}. \quad 3. y = \frac{\ln x}{x}. \quad 4. y = \frac{x}{9-x^2}; [-2; 2].$$

10-вариант

1. Берилган $2p$ периметрли барча тўғри тўртбурчаклар ичидан диагонали энг кичик бўлганини топинг.

$$2. y = -\ln \frac{1+x}{1-x}. \quad 3. y = \left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2. \quad 4. y = \frac{1+\ln x}{x}; \left[\frac{1}{e}; e\right].$$

11-вариант

1. Юқорига тик отилган жисмнинг ҳаракат қонуни $S = 18t - 6t^2$ тенглама билан берилган. Жисм энг юқорига кўтарилган баландликни топинг.

$$2. y = \ln(x^2 + 1). \quad 3. y = \frac{x^3}{9-x^2}. \quad 4. y = e^{4x-x^2}; [1; 3].$$

12-вариант

1. Юқорига тик отилган жисмнинг ҳаракат қонуни $S = 9_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ тенглама билан берилган. Жисм энг юқорига кўтарилган баландликни топинг.

$$2. y = \frac{x^2+6}{x^2+1}. \quad 3. y = (x+1) e^{2x}. \quad 4. y = \frac{x^3-8}{x^4}; [-3; 1].$$

13-вариант

1. Жисмнинг тўғри чизиқли ҳаракати $S = -t^3 + 9t^2 - 24t - 8$ тенглама билан берилган бўлса, жисм ҳаракатининг максимал тезлигини топинг.

$$2. y = x \ln x. \quad 3. y = \frac{4x}{4+x^2}. \quad 4. y = \frac{e^{2x}+1}{e^x}; [-1; 2].$$

14-вариант

1. Радиуси 16 га тенг бўлган доиравий майдоннинг чегараси максимал ёритилган бўлиши учун фонарни майдон ўртасидан қандай h баландликка ўрнатиш керак?

$$2. y = (x-1) e^{3x+1}. \quad 3. y = \frac{x^4}{x^2-1}. \quad 4. y = x \ln x; \left[\frac{1}{e}; 1\right].$$

15-вариант

1. R радиусли шарга ички чизилган барча конуслар ичидан ён сирти энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{x^2-3x+2}{x+1}. \quad 3. y = \ln(x^2 - 2x + 6). \\ 4. y = x^3 e^{x+1}; [-4; 0].$$

16-вариант

1. R радиусли шарга ички чизилган барча конуслар ичидан ҳажми энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{2x-1}{(x+1)^2}. \quad 3. y = \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right). \\ 4. y = x^2 - 2x + \frac{2}{x-1}; [-1; 3].$$

17-вариант

1. R радиусли шарга ички чизилган барча цилиндрлар ичидан ён сирти энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{x^3}{x^4-1} \quad 3. y = x^3 e^{x+1} \quad 4. y = (x+1)\sqrt[3]{x^2}; \left[-\frac{4}{3}; 3\right].$$

18-вариант

1. R радиусли шарга ички чизилган барча цилиндрлар ичидан ҳажми энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{x^3+4}{x^2} \quad 3. y = x - \ln(1+x)^2 \quad 4. y = e^{6x-x^2}; [-3; 3].$$

19-вариант

1. Берилган конусга ички чизилган барча цилиндрлар ичидан ҳажми энг катта бўлганини топинг (конус асосининг радиуси R ва баландлиги H берилган).

$$2. y = \frac{1}{3}\sqrt{x^3}(x-5) \quad 3. y = 1 - \ln^3 x \quad 4. y = \frac{\ln x}{x}; [1; 4].$$

20-вариант

1. Берилган конусга ички чизилган барча цилиндрлар ичидан тула сирти энг катта бўлганини топинг (конус асосининг радиуси R ва баландлиги H берилган).

$$2. y = \frac{x^3}{x^4-1} \quad 3. y = (x-1)e^{4x+2}.$$

$$4. y = 3x^4 - 16x^3 + 2; [-3; 1].$$

21-вариант

1. Берилган конусга ички чизилган барча цилиндрлар ичидан ён сирти энг катта бўлганини топинг (конус асосининг радиуси R ва баландлиги H берилган).

$$2. y = \frac{e^{2x}+1}{e^x} \quad 3. y = \frac{2x^2+4x+2}{2-x}.$$

$$4. y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1; [-1; 2].$$

22-вариант

1. Ҳажми V берилган, тула сирти эса энг кичик бўлган туби квадрат шаклидаги усти очик (қопқоқсиз) яшиқнинг ўлчамларини топинг.

$$2. y = x^2 + \frac{1}{x^2} \quad 3. y = -x \ln^2 x \quad 4. y = (3-x)e^{-x}; [0; 5].$$

23-вариант

1. Ўлчамлари 100×60 см бўлган тўғри тўртбурчак шаклидаги тунуканинг учларидан тенг квадратлар қирқиб олиб ташлаб, сўнгра унинг четларини букиб, энг катта ҳажмга эга бўлган усти очик яшиқ ясаш керак. Қирқиб олиб ташланадиган квадратларнинг томони қандай бўлиши керак?

$$2. y = \frac{5x^4+3}{x} \quad 3. y = x^2 - 2 \ln x \quad 4. y = \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos x; \left[0; \frac{\pi}{2}\right].$$

24-вариант

1. Асоси ва баландлигининг йиғиндиси a га тенг бўлган барча учбурчаклар ичидан юзи энг катта бўлганини топинг.

$$2. y = \frac{4-2x}{1-x^2} \quad 3. y = e^{\frac{1}{3-x}} \quad 4. y = 108x - x^4; [-1; 4].$$

25-вариант

1. a радиусли доирага тўғри бурчакли учбурчак ички чизилган. Катетларининг муносабати қандай бўлганда учбурчак энг катта юзга эга бўлади.

$$2. y = \frac{5x}{4-x^2} \quad 3. y = \ln(4-x^2) \quad 4. y = \frac{x^4}{49} - 6x^3 + 7; [16; 20].$$

III боб КОМПЛЕКС СОНЛАР

1-§. Комплекс сон ҳақида тушунча.

Комплекс сонлар устида асосий амаллар

Комплекс сон деб $z = x + iy$ кўринишдаги ифодага ай-тилади, бу ерда x ва y ҳақиқий сонлар, $i = \sqrt{-1}$ — мавҳум бирлик деб аталади.

x — комплекс сон z нинг ҳақиқий қисми, iy эса мавҳум қисми дейилади. Улар $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$ билан белгилана-ди. Агар $x = 0$ бўлса, $0 + iy = iy$ соф мавҳум сон дейилади, агар $y = 0$ бўлса, $x = x \in R$ ҳақиқий сон ҳосил бўлади.

Фақат мавҳум қисмининг ишораси билан фарқ қиладиган $z = x + iy$ ва $\bar{z} = x - iy$ комплекс сонлар бир-бирига қўшма дейилади (11-чизмага қаранг). Геометрик нуқтаи назардан $z = x + iy$ комплекс сон Oxy текисликда координатлари x ва y бўлган $M(x, y)$ нуқтанинг OM вектори-ни аниқлайди ва аксинча ҳар бир $M(x, y)$ нуқтага $z = x + iy$ комплекс сонлар мос келади.


Комплекс сонлар тўплами билан Oxy текисликдаги нуқталар орасида ўзаро бир қийматли мослик ўрнатилган-ни учун берилган Oxy текислик комплекс текислик дейи-лади ва у Z билан белгиланади.

Комплекс сонлар тўплами G ҳарфи билан белгилана-ди, $R \subset G$.

Ўзгарувчи Z комплекс текислигининг ($z = x$) Ox ўқда ётувчи нуқталарига ҳақиқий сонлар мос келади, шунинг учун Ox ўқ комплекс текислигининг ҳақиқий ўқи дейилад-ди. Oy ўқда ётувчи нуқталар ($z = iy$) соф мавҳум сонни ифодалагани учун Oy ўқ комплекс текислигининг мавҳум сонлар ўқи ёки мавҳум ўқи дейилади.

Агар иккита $z_1 = x_1 + iy_1$ ва $z_2 = x_2 + iy_2$ комплекс сон берилган бўлса, уларнинг устида арифметик амаллар қуй-идаги қоида бўйича бажарилади:

- 1) $z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$,
- 2) $z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$,
- 3) $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$,
- 4) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$, ($z_2 \neq 0$).



11-чизма.

Комплекс сонлар устида амаллар бажариш қоидалари шуни кўрсатадики, комплекс сонларни қўшиш, айириш, қўпайтириш ва бўлиш натижасида яна комплекс сон ҳосил бўлади.

1-мисол. $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 3 - 4i$, $z_3 = 1 + i$ комплекс сонлар берилган. $z = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{z_1 + z_2}$ ни топинг.

Е ч и ш. Дастлаб қуйидагиларни ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (2 + 3i) + (1 + i) = 3 + 4i, \\ z_1 \cdot z_2 &= (2 + 3i) \cdot (3 - 4i) = (6 + 12) + i(9 - 8) = 18 + i, \\ z_2^2 &= (3 - 4i)^2 = 9 - 24i - 16 = -7 - 24i, \\ z_1 + z_1 \cdot z_2 + z_2^2 &= 2 + 3i + 18 + i - 7 - 24i = 13 - 20i. \end{aligned}$$

Бу қийматларни ўрнига қўямиз:

$$z = \frac{13 - 20i}{3 + 4i} = \frac{(13 - 20i)(3 - 4i)}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{(39 - 80) + i(-60 - 52)}{25} = \frac{41}{25} - i \frac{112}{25}.$$

$r = |OM| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ сон z комплекс соннинг модули дейилади.

OM вектор ва Ox ўқининг мусбат йўналиши орасида-ги бурчак z комплекс соннинг аргументи дейилади ва $\varphi = \operatorname{Arg} z$ деб белгиланади.

Ҳар қандай $z = x + iy$ комплекс сон учун (11-чизмага қаранг)

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, y = r \sin \varphi \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, \cos \varphi = \frac{x}{r}, \sin \varphi = \frac{y}{r} \end{aligned} \quad (3.1)$$

формула уринлидир, бунда $y = \arg z$ аргументнинг асосий қиймати $-\pi < \arg z \leq \pi$ ёки $0 \leq \arg z < 2\pi$ тенгсизликни қаноатлантиради.

Ҳар қандай $z = x + iy$ комплекс сонни тригонометрик шаклда

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (3.2)$$

ёки кўрсаткичли шаклда

$$z = re^{i\varphi} \quad (3.3)$$

каби ёзиш мумкин. (3.2) ва (3.3) дан

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (3.4)$$

Эйлер формуласига эга бўламиз. Комплекс сонларни қўпайтиришда, даражага кўтаришда (3.2) ва (3.3) формулалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Агар $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ комплекс сонлар берилган бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}, \quad (z_2 \neq 0), \\ z^n &= r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r^n \cdot e^{in\varphi}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

(3.5) формула *Муавр формуласи* дейилади.

(3.2) комплекс соннинг n -даражали ($n > 1$, $n \in \mathbb{Z}$) илдизи куйидаги формула билан топилади:

$$\begin{aligned} z_k &= \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) = \sqrt[n]{r} \cdot e^{\frac{i(\varphi + 2\pi k)}{n}}, \\ &(k = 0, \overline{n-1}). \end{aligned} \quad (3.6)$$

(3.6) ифода илдизнинг n та қийматини аниқлайди, $\sqrt[n]{r}$ эса арифметик илдиздир.

2-мисол. $(i + i)^{12}$ ни ҳисобланг.

Ечиш. $z = 1 + i$ комплекс сонни (3.2) ёки (3.3) формулалар ёрдамида тригонометрик ёки кўрсаткичли шаклда ёзиб оламиз:

$$r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Муавр формуласига кўра:

$$\begin{aligned} z^{12} &= (\sqrt{2})^{12} \left(\cos \left(12 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(12 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{2}^{12} \cdot e^{12i\frac{\pi}{4}} = \\ &= 64 \cdot (\cos 3\pi + i \sin 3\pi) = -64. \end{aligned}$$

3-мисол. $z^6 + 1 = 0$ тенгламанинг илдизларини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $z^6 = -1$ ёки $z = \sqrt[6]{-1}$ кўринишда ёзиб оламиз.

-1 соннинг (3.2) формулага асосан тригонометрик шакли

$$-1 = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi)$$

кўринишда бўлади. (3.6) формулага кўра берилган тенгламанинг илдизлари

$$z_k = \sqrt[6]{-1} = 1 \cdot \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{6} \right) = e^{\frac{i(\pi + 2k\pi)}{6}}$$

каби топилади, бунда $k = \overline{0,5}$; k га кетма-кет $0, 1, \dots, 5$ қийматлар бериб, $z^6 + 1 = 0$ тенгламанинг олти илдизини топамиз:

$$z_0 = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{i\frac{\pi}{6}};$$

$$z_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i = e^{i\frac{\pi}{2}};$$

$$z_2 = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{-\frac{5\pi i}{6}};$$

$$z_3 = \cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{\frac{7\pi i}{6}} = e^{-\frac{5\pi i}{6}};$$

$$z_4 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i = e^{-\frac{\pi i}{2}} = e^{\frac{3\pi i}{2}};$$

$$z_5 = \cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{\frac{11\pi i}{6}} = e^{-\frac{\pi i}{6}}.$$

4-мисол. $z^3 - 1 + i\sqrt{3} = 0$ тенгламанинг илдишларини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $z^3 = 1 - i\sqrt{3}$ кўринишда ёзиб оламиз. Унг қисмидаги комплекс сонни тригонометрик шаклда ёзиб сўнгра (3.6) формулага кўра топамиз:

$$z^3 = 1 - i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

$$z_k = \sqrt[3]{2} \cdot \left(\cos \frac{\pi + 2\pi k}{3} - i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{3} \right), \quad (k = \overline{0, 2}).$$

Демак, берилган тенгламанинг илдишлари:

$$z_0 = \sqrt[3]{2} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{9} - i \sin \frac{\pi}{9} \right),$$

$$z_1 = \sqrt[3]{2} \cdot \left(\cos \frac{7\pi}{9} - i \sin \frac{7\pi}{9} \right),$$

$$z_2 = \sqrt[3]{2} \cdot \left(\cos \frac{13\pi}{9} - i \sin \frac{13\pi}{9} \right).$$

Машқлар

111. Қуйидаги комплекс сонларни тасвирловчи нуқталарни кўрсатинг. $z_1 = 2 + 2i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = -1 + 3i$,

$$z_4 = -\sqrt{3} + i, \quad z_5 = -6, \quad z_6 = 8, \quad z_7 = \sqrt{2} \cdot i, \quad z_8 = 5 + 12i.$$

112. Агар $z_1 = 4 + 5i$, $z_2 = 1 + i$, $z_3 = 7 - 9i$ бўлса,

$z = \frac{z_1(z_2 + z_3)}{z_2}$ ифоданинг қийматини топинг.

113. Агар $z_1 = 4 + 8i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = 9 + 13i$ бўлса,

$z = \frac{z_1 + z_2 z_3}{z_2}$ ифоданинг қийматини топинг.

114. Агар $z_1 = 2 - i$, $z_2 = -1 + 2i$, $z_3 = 8 + 12i$ бўлса,

$z = \frac{z_1^2 + z_2 + z_3}{z_2}$ ифоданинг қийматини топинг.

115. Қуйидаги комплекс сонларни тригонометрик ва кўрсаткичли шаклда ёзинг.

$$z_1 = \sqrt{3} + i, \quad z_2 = -1 + \sqrt{3}i, \quad z_3 = \frac{1}{2}, \quad z_4 = \frac{2}{1+i},$$

$$z_5 = -\sqrt{3} - i, \quad z_6 = 2 - 2i, \quad z_7 = -1 + i, \quad z_8 = -i.$$

116. Қуйидаги тенгламаларнинг илдишларини топинг:

$$1) z^2 - i = 0; \quad 2) z^4 + i = 0; \quad 3) z^3 + i = 0; \quad 4) z^8 - i = 0.$$

IV боб

АНИҚМАС ИНТЕГРАЛ

1-§. Бошланғич функция ва аниқмас интеграл

Берилган $y = f(x)$ функция $(a; b)$ интервалда аниқланган бўлсин. Агар $F(x) = f(x)$ (бунда $x \in (a; b)$) тенглик ўринли бўлса, $F(x)$ функция $f(x)$ функциянинг $(a; b)$ интервалдаги бошланғич функцияси дейилади. Берилган $f(x)$ функциянинг ихтиёрий иккита бошланғич функцияси бир-биридан ўзгармас сонга фарқ қилади.

$f(x)$ функциянинг $F(x) + C$ (бунда C — ўзгармас сон) бошланғич функциялар тўплами $f(x)$ функциянинг аниқмас интеграли дейилади ва

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (4.1)$$

кўринишда белгиланади.

Асосий интеграллаш қоидаларини келтирамиз:

1. $\int f'(x)dx = \int d[f(x)] = f(x) + C$.
2. $d \int f(x)dx = d(F(x) + C) = f(x)dx$.
3. $\int (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int f(x)dx \pm \int \varphi(x)dx$.
4. $\int af(x) = a \int f(x)dx$, ($a = \text{const}$).
5. Агар $\int f(x)dx = F(x) + C$ бўлса, $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$, бунда $a \neq 0$, b — ўзгармас сонлар.
6. Агар $\int f(x)dx = F(x) + C$ бўлиб, $u = \varphi(x)$ — ихтиёрий дифференциалланувчи функция бўлса, у ҳолда

$$\int f(u)du = F(u) + C.$$

Интеграллаш натижасини тўғри бажарилганлигини текшириш учун аниқланган бошланғич функциядан ҳосил олиш керак, яъни

$$(F(x) + C)' = f(x)$$

тенглик ўринли бўлиши зарур ва старлидир.

Интеграллашни енгиллаштириш учун асосий интеграллар жадвалини тузамиз:

- 1) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$); $n = 0$ бўлса, $\int dx = x + C$;
- 2) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$; ($n = -1$);
- 3) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$;
- 4) $\int e^x dx = e^x + C$;
- 5) $\int \sin x dx = -\cos x + C$;
- 6) $\int \cos x dx = \sin x + C$;
- 7) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C = -\frac{1}{a} \text{arcctg} \frac{x}{a} + C$; ($a \neq 0$);
- 8) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C = -\frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$;

$$9) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C; (a \neq 0);$$

$$10) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C = -\arccos \frac{x}{a} + C; (a > 0);$$

$$11) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \text{tg} x + C;$$

$$12) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\text{ctg} x + C;$$

$$13) \int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \text{tg} \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\sin x} - \text{ctg} x \right| + C;$$

$$14) \int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \text{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \text{tg} x \right| + C;$$

$$15) \int \text{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$16) \int \text{ctg} x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$17) \int \text{sh} x dx = \text{ch} x + C;$$

$$18) \int \text{ch} x dx = \text{sh} x + C;$$

$$19) \int \frac{dx}{\text{ch}^2 x} = \text{th} x + C;$$

$$20) \int \frac{dx}{\text{sh}^2 x} = -\text{cth} x + C;$$

$$21) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C;$$

$$22) \int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + C.$$

1-мисол. Интеграллаш қоидалари ва интеграллар жадвалидан фойдаланиб, қуйидаги интегралларни топинг:

$$1) \int \left(3x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{3}{x^2} + 1 \right) dx; \quad 2) \int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x)^2} dx;$$

$$3) \int 9^x e^{2x} dx; \quad 4) \int (3x - 6)^8 dx;$$

$$5) \int \sin(4x - 5) dx;$$

$$6) \int \frac{x - \arctg x}{1 + x^2} dx;$$

$$7) \int \frac{\sin 2x}{4 + \sin^2 x} dx;$$

$$8) \int \frac{x-2}{x^2-4x+6} dx.$$

Ечиш. 1) Берилган интегралда интеграл остидаги функциянинг шаклини ўзгартириб ёзамиз, сўнгра интеграллар жадвалидаги I-формуладан фойдаланамиз:

$$\int (3x^2 - 2\sqrt[3]{x} + \frac{3}{x} + 1) dx = 3 \int x^2 dx - 2 \int x^{\frac{1}{3}} dx + 3 \int x^{-1} dx + \int dx =$$

$$= 3 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1} - 2 \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + 3 \cdot \frac{x^{-1+1}}{-1+1} + x + C =$$

$$= x^3 - \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} - x^{-1} + x + C =$$

$$= x^3 - 3x\sqrt[3]{x} - \frac{1}{x} + x + C.$$

2) Берилган интегралда интеграл остидаги функция-интеграллаш учун қулай кўринишда ёзиб оламиз, сўнгра I,7-формулардан фойдаланамиз:

$$\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x)^2} dx = \int \frac{(1+x^2)+x^2}{x^2(1+x)^2} dx = \int \frac{1+x^2}{x^2(1+x)^2} dx + \int \frac{x^2}{x^2(1+x)^2} dx =$$

$$= \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \arctg x + C.$$

Қолган интеграллар ҳам интеграл остидаги функцияни бошқача кўринишда ёзиб олинган, жадвалдаги тегишли формулар ёрдамида топилади:

$$3) \int 9^x e^{2x} dx = \int 3^{2x} e^{2x} dx = \int (3e)^{2x} dx = \frac{(3e)^{2x}}{2 \ln(3e)} + C.$$

$$4) \int (3x-6)^8 dx = \frac{1}{3} \int (3x-6)^8 3 dx = \frac{1}{3} \int (3x-6)^8 d(3x-6) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x-6)^9}{9} + C = \frac{1}{27} (3x-6)^9 + C.$$

$$5) \int \sin(4x - 5) dx = \frac{1}{4} \int \sin(4x - 5) 4 dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \sin(4x - 5) d(4x - 5) = -\frac{1}{4} \cos(4x - 5) + C.$$

$$6) \int \frac{x - \arctg x}{1 + x^2} dx = \int \frac{x}{1 + x^2} dx - \int \frac{\arctg x}{1 + x^2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1 + x^2} dx - \int \arctg x d(\arctg x) =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|1 + x^2| - \frac{1}{2} (\arctg x)^2 + C =$$

$$= \frac{1}{2} [\ln|1 + x^2| - (\arctg x)^2] + C.$$

$$7) \int \frac{\sin 2x}{4 + \sin^2 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{4 + \sin^2 x} dx = \int \frac{d(4 + \sin^2 x)}{4 + \sin^2 x} dx =$$

$$= \ln(4 + \sin^2 x) + C.$$

$$8) \int \frac{x-2}{x^2-4x+6} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+6} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-4x+6)}{x^2-4x+6} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x + 6) + C = \ln \sqrt{x^2 - 4x + 6} + C.$$

Машқлар

Асосий интеграллар жадвалидан фойдаланиб, қуйидаги интегралларни топинг ва натижани дифференциаллаб текширинг:

$$117. \int (3x^5 - 4\sqrt[3]{x^3} + \frac{2}{x^6}) dx. \quad 118. \int (\sqrt{x} - \sqrt[3]{x})^2 dx.$$

$$119. \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx.$$

$$120. \int \left(3 \sin x - 2^{2x} 3^x - \frac{1}{9+x^2} \right) dx.$$

$$121. \int \sqrt[3]{(5x+3)^3} dx.$$

$$122. \int \frac{x^2}{\sqrt{(x^3+7)^2}} dx.$$

123. $\int \frac{3-2\operatorname{ctg}^3 x}{\cos^2 x} dx$. 124. $\int (4x - \sqrt[3]{x^5} + 2 \sin x - 2) dx$.
125. $\int \left(x^5 - \frac{1}{\sqrt{x}} + 2^x\right) dx$. 126. $\int \frac{x+1}{x^2+2x+4} dx$.
127. $\int \left(\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} - \cos^7 x \sin x\right) dx$. 128. $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x}+5} dx$.
129. $\int e^{2x} \left(1 + \frac{e^{-2x}}{\cos^2 x}\right) dx$. 130. $\int 2^{3x} \left(1 - \frac{2^{-3x}}{x^2}\right) dx$.
131. $\int 2^{3x} \cdot 4^{2x} \cdot 5^x dx$. 132. $\int \frac{dx}{x \ln^4 x}$.
133. $\int x \sin(x^2) dx$. 134. $\int (ax^2 + b)^{\frac{2}{3}} x dx$.
135. $\int \sqrt{\cos x} \sin x dx$. 136. $\int \cos(\sin x) \cdot \cos x dx$.

2-§. Функцияларни бевосита интеграллаш

Агар интеграл остидаги функция бир нечта функциялардан иборат бўлса, у ҳолда бу функцияларни алгебраик алмаштиришлар ёрдамида ёки айрим қўпайтувчи функцияларни дифференциал белгиси остига киритиш ёрдамида жадвал интегралларидан бирига келтирилади. Буни қуйидаги мисолларда кўрсатамиз.

1-мисол. $\int \operatorname{ctg}^3 x dx$ интегрални топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \operatorname{ctg}^3 x dx &= \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \cdot \operatorname{ctg} x dx = \int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x} \cdot \operatorname{ctg} x dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x\right) dx = -\int \operatorname{ctg} x d(\operatorname{ctg} x) - \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \\ &= -\frac{\operatorname{ctg}^2 x}{2} - \ln |\sin x| + C. \end{aligned}$$

2-мисол. $\int \frac{x-3}{x+5} dx$ интегрални топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{x-3}{x+5} dx &= \int \frac{x+5-8}{x+5} dx = \int \left(1 - \frac{8}{x+5}\right) dx = \int dx - 8 \int \frac{d(x+5)}{x+5} = \\ &= x - 8 \ln |x+5| + C. \end{aligned}$$

3-мисол. $\int \frac{dx}{x^2+4x+8}$ интегрални топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2+4x+8} &= \int \frac{dx}{x^2+4x+4+4} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+4} = \int \frac{d(x+2)}{4+(x+2)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2} + C. \end{aligned}$$

Ушбу $\int \sin mx \cos nxdx$, $\int \sin mx \sin nxdx$, $\int \cos mx \cos nxdx$ қўринишдаги интеграллар берилган бўлса, уларни интеграллаш учун тригонометриядан маълум бўлган қуйидаги формулалардан фойдаланиш керак:

$$\sin mx \cos nxdx = \frac{1}{2} (\sin(m+n)x + \sin(m-n)x),$$

$$\sin mx \sin nxdx = \frac{1}{2} (\cos(m-n)x - \cos(m+n)x),$$

$$\cos mx \cos nxdx = \frac{1}{2} (\cos(m-n)x + \cos(m+n)x).$$

4-мисол. $\int \sin(2x-1) \sin(3x+5) dx$ интегрални топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \sin(2x-1) \sin(3x+5) dx &= \\ &= \frac{1}{2} \int (\cos(2x-1-3x-5) - \cos(2x-1+3x+5)) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int (\cos(x+6) - \cos(5x+4)) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \cos(x+6) d(x+6) - \frac{1}{10} \int \cos(5x+4) d(5x+4) = \\ &= \frac{1}{2} \sin|x+6| - \frac{1}{10} \sin(5x+4) + C. \end{aligned}$$

Ушбу $\int \cos^m x \sin^n x dx$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) кўринишдаги интегралларни интеграллашда қуйидаги ҳоллардан бири бўлиши мумкин:

а) m ёки n тоқ, масалан $m = 2k + 1$ тоқ сон бўлсин, у ҳолда

$$\begin{aligned}\int \cos^m x \sin^n x dx &= \int \cos^{2k} x \sin^n x \cos x dx = \\ &= \int (1 - \sin^2 x)^k \sin^n x d(\sin x)\end{aligned}$$

кўринишдаги даражали функциянинг интегрални ҳосил қилинади.

5-мисол. $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^3 x dx &= \int \sin^4 x \cos^2 x \cos x dx = \\ &= \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) d(\sin x) = \int \sin^4 x d(\sin x) - \int \sin^6 x d(\sin x) = \\ &= \frac{1}{6} \sin^6 x - \frac{1}{8} \sin^8 x + C.\end{aligned}$$

б) m ва n жуфт бўлсин. У ҳолда тригонометрик функцияларнинг даражасини пасайтирадиган қуйидаги формулалардан фойдаланилади:

$$2 \cos^2 \alpha x = 1 + \cos 2\alpha x, \quad 2 \sin^2 \alpha x = 1 - \cos 2\alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

6-мисол. $\int \sin^2 4x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 4x dx &= \int \frac{1 - \cos 8x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 8x d(8x) = \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{16} \sin 8x + C.\end{aligned}$$

7-мисол. $\int \frac{dx}{7-6x-x^2}$ ни топинг.

Ечиш.

Интеграл остидаги каср махражидан тўлиқ квадрат ажратамиз. Натижада қуйидагига эга бўламиз:

$$\int \frac{dx}{7-6x-x^2} = \int \frac{dx}{7+9-(9+6x+x^2)} = \int \frac{dx}{16-(x+3)^2} = \frac{1}{2 \cdot 4} \ln \left| \frac{x+3+4}{x+3-4} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{8} \ln \left| \frac{x+7}{x-1} \right| + C.$$

8-мисол. $\int \frac{x^4+2}{x^2+9}$ ни топинг.

Ечиш.

Берилган интегрални ҳисоблаш учун интеграл остидаги функциянинг суратини махражига (кўпхадни кўпхадга бўлиш қоидаси бўйича) бўлиб, унинг бутун қисмини ва каср қисмини (қолдиқни) аниқлаш керак.

$$\begin{array}{r|l} x^4+2 & x^2+9 \\ \hline x^4+9x^2 & x^2-9 \\ \hline -9x^2+2 & \\ \hline -9x^2-81 & \\ \hline 83 & \end{array}$$

Бу эса интеграл остидаги функцияни бутун кўпхад ва бирор тўғри каср йиғиндиси кўринишида ёзиш имконини беради.

Натижада берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4+2}{x^2+9} dx &= \int \left(x^2 - 9 + \frac{83}{x^2+9} \right) dx = \int x^2 dx - 9 \int dx + 83 \int \frac{dx}{3^2+x^2} = \\ &= \frac{x^3}{3} - 9x + \frac{83}{3} \arctg \frac{x}{3} + C.\end{aligned}$$

Машқлар

Қуйидаги берилган интегралларни топинг:

137. $\int (2^{2x} + 2^{-3x}) dx$.

138. $\int (e^{3x} - e^{-2x}) dx$.

139. $\int \sqrt[3]{1-6x^3x^2} dx$.

140. $\int \sqrt[3]{1+3x^4x^3} dx$.

141. $\int \frac{4x-6}{\sqrt{4+x^2}} dx$.

142. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}} dx$.

143. $\int \cos^4 2x \sin^3 2x dx$.

144. $\int \cos^2 3x \sin^3 3x dx$.

145. $\int \operatorname{ctg}^2 2x dx$.

146. $\int \operatorname{tg}^2 8x dx$.

147. $\int \frac{x^2-1}{x^2+1} dx$.

148. $\int \frac{x^2-5}{x^2+4} dx$.

149. $\int \sin 6x \sin 8x dx$.

150. $\int \cos 10x \sin 2x dx$.

151. $\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$.

152. $\int \frac{dx}{x^2-6x+7}$.

153. $\int \frac{dx}{8-2x-x^2}$.

154. $\int \frac{dx}{9-8x-x^2}$.

155. $\int \frac{x^2+3}{x+1} dx$.

156. $\int \frac{x^2+x+1}{x+1} dx$.

3-§. Квадрат учқал қатнашган функцияларнинг интеграллари

Қуйидаги қўринишдаги интегралларни қараймиз:

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+bx+c} dx. \quad (4.2)$$

Агар $A \neq 0$ бўлса, у ҳолда каср суратидан махраждаги квадрат учқалнинг ҳосиласига тенг бўлган $2x+b$ қўшилувчини ажратиби олиш мумкин. Натижада олдий алмаштириш ёрдамида берилган интеграл қуйидаги қўринишга олади:

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+bx+c} dx = \frac{A}{2} \int \frac{(2x+b) + \left(\frac{2B}{A} - b\right)}{x^2+bx+c} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} dx + \left(B - \frac{Ab}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+bx+c} = \frac{A}{2} \ln|x^2+bx+c| + \left(B - \frac{Ab}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+bx+c}.$$

Охирги интегрални топиш учун махраждаги квадрат учқални қуйидаги қўринишга келтириб оламиз:

$$x^2+bx+c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + C - \frac{b^2}{4}.$$

Бунда $C = \frac{b^2}{4}$ ифодани ишорасига қараб қуйидаги

$$\int \frac{dx}{x^2 \pm a^2}$$

жадвал интегралнинг бирига эга бўламиз.

1-мисол. $\int \frac{5x-2}{x^2+4x+13} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-2}{x^2+4x+13} dx &= \frac{5}{2} \int \frac{2x+4-4-2}{x^2+4x+13} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+4x+13} dx - \\ &- 12 \int \frac{dx}{x^2+4x+13} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2+4x+13)}{x^2+4x+13} - 12 \int \frac{dx}{(x+2)^2+9} = \\ &= \frac{5}{2} \ln(x^2+4x+13) - 4 \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C. \end{aligned}$$

2-мисол. $\int \frac{5x-7}{x^2-8x+7} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-7}{x^2-8x+7} dx &= \frac{5}{2} \int \frac{2x-8+8-14}{x^2-8x+7} dx = \\ &= \frac{5}{2} \int \frac{2x-8}{x^2-8x+7} dx + 13 \int \frac{dx}{(x-4)^2-9} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2-8x+7)}{x^2-8x+7} + 13 \int \frac{dx}{(x-4)^2-9} = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2-8x+7| + \frac{13}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{x-4-3}{x-4+3} \right| + C = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2-8x+7| + \frac{13}{6} \ln \left| \frac{x-7}{x-1} \right| + C. \end{aligned}$$

Эслатма. Агар (4.2) интегралнинг махражидаги квадрат учқал ax^2+bx+c ($a \neq 0$) қўринишда бўлса, у ҳолда a ни қавсдан ташқарига чиқариш керак, яъни

$$ax^2+bx+c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right).$$

3-мисол. $\int \frac{4x-3}{2x^2-12x+10} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x-3}{2x^2-12x+10} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{4x-3}{x^2-6x+5} dx = \int \frac{2x-6+\frac{3}{2}}{x^2-6x+5} dx = \\ &= \int \frac{2x-6}{x^2-6x+5} dx + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x^2-6x+5} = \int \frac{d(x^2-6x+5)}{x^2-6x+5} + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{(x-3)^2-4} = \\ &= \ln|x^2-6x+5| + \frac{3}{8} \ln \left| \frac{x-1}{5-x} \right| + C. \end{aligned}$$

Ушбу

$$\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \quad (4.3)$$

қўринишдаги интеграл (4.2) қўринишдаги интеграл каби топилади, аммо натижада ҳосил бўлган интеграл бошқа жадвал интеграл бўлади. $A \neq 0$ бўлса, (4.3) ни қуйидаги қўринишда ёзиб оламиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx &= \frac{A}{2a} \int \frac{2ax+b+\frac{2Ba}{a}}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{A}{2a} \int \frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx + \\ &+ \left(B - \frac{bA}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{A}{2a} \int \frac{d(ax^2+bx+c)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \\ &+ \left(B - \frac{bA}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{4a}\right)}} = \\ &= \frac{A}{2a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \left(B - \frac{bA}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{4a}\right)}} \end{aligned}$$

Охирги интеграл учун $c - \frac{b^2}{4a} = \pm k^2$ ва $a > 0$ бўлса,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm k^2}} = \ln \left| x^2 \sqrt{x^2 \pm k^2} \right| + C$$

қўринишдаги, $C > \frac{b^2}{4a}$ ва $a < 0$ бўлса,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-k^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

қўринишдаги жадвал интеграллари ҳосил бўлади.

4-мисол. $\int \frac{5x-1}{\sqrt{x^2-4x+20}} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-1}{\sqrt{x^2-4x+20}} dx &= \frac{5}{2} \int \frac{2x-4+2/5}{\sqrt{x^2-4x+20}} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x-4}{\sqrt{x^2-4x+20}} dx + \\ &+ 9 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+20}} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2-4x+20)}{\sqrt{x^2-4x+20}} + 9 \int \frac{dx}{\sqrt{(x-2)^2+16}} = \\ &= 5\sqrt{x^2-4x+20} + 9 \ln|x-2+\sqrt{(x-2)^2+16}| + C. \end{aligned}$$

5-мисол. $\int \frac{4x+5}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+5}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx &= -2 \int \frac{-2x+2-5/2}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx - 2 \int \frac{2-2x}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx + \\ &+ 9 \int \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}} = -2 \int \frac{d(8+2x-x^2)}{\sqrt{8+2x-x^2}} + 9 \int \frac{dx}{\sqrt{9-(1-x)^2}} = \\ &= -\sqrt{8+2x-x^2} + 9 \cdot \arcsin \frac{1-x}{3} + C. \end{aligned}$$

Қуйидаги интеграл берилган бўлсин:

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx, \quad (4.4)$$

бунда k — бутун сон, $k > 0$, $p^2 - 4q < 0$ бўлсин. Агар $A \neq 0$ ($k = 1$) бўлса, у ҳолда (4.4) дан (4.3) га ўхшаш интегрални ажратиб оламиз:

$$\begin{aligned} \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} = \\ &= \frac{A}{2} \cdot \frac{(x^2+px+q)^{-k+1}}{-k+1} + C, \quad (k \neq 1). \end{aligned}$$

Энди (4.4) ни тўлиқ топиш учун иккинчи интегрални топамиз:

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k} = \int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4-p^2}{4}\right]^k} = \int \frac{dx}{(u^2+a^2)^k}, \quad (4.5)$$

бунда $u = x + \frac{p}{2}$, $a = \frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$, $4q-p^2 > 0$.

(4.5) кўринишдаги интегралларни топиш учун қуйидаги маҳраж даражасини пасайтиришнинг рекуррент формуласидан фойдаланамиз:

$$\int \frac{du}{(u^2+a^2)^k} = \frac{u}{2a^2(k-1)(u^2+a^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} \int \frac{du}{(u^2+a^2)^{k-1}}, \quad (4.6)$$

Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

6-мисол. $\int \frac{4x+5}{(x^2+6x+25)^2} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+5}{(x^2+6x+25)^2} dx &= 2 \int \frac{2x+6+\frac{5}{2}}{(x^2+6x+25)^2} dx = 2 \int \frac{2x+6}{(x^2+6x+25)^2} dx - \\ &- 7 \int \frac{dx}{(x^2+6x+25)^2} = \int \frac{d(x^2+6x+25)}{(x^2+6x+25)^2} - 7 \int \frac{dx}{[(x+3)^2+4^2]^2} = \\ &= -\frac{2}{x^2+6x+25} - 7 \int \frac{dx}{[(x+3)^2+4^2]^2} = -\frac{2}{x^2+6x+25} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -7 \left[\frac{x+3}{2 \cdot 4^2 (2-1)} \cdot \frac{1}{[(x+3)^2+4^2]} + \frac{1}{32} \int \frac{dx}{(x+3)^2+4^2} \right] &= -\frac{2}{x^2+6x+25} - \\ &- \frac{7(x+3)}{32(x^2+6x+25)} - \frac{7}{128} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{4} + C. \end{aligned}$$

Бунда иккинчи интегралга (4.6) формулани қўладик.

Машқлар

Қуйидаги интегралларни топинг.

- | | |
|--|--|
| 157. $\int \frac{dx}{x^2+x+\frac{101}{4}}$ | 158. $\int \frac{dx}{x^2+2x+17}$ |
| 159. $\int \frac{3x-7}{x^2+x+1} dx$ | 160. $\int \frac{x-2}{x^2-8x+7} dx$ |
| 161. $\int \frac{7x+3}{2x^2+4x+9} dx$ | 162. $\int \frac{x+1}{5x^2+2x+1} dx$ |
| 163. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2-6x+13}} dx$ | 164. $\int \frac{x-3}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx$ |
| 165. $\int \frac{7x-2}{\sqrt{5-4x-x^2}} dx$ | 166. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-3x^2-1}}$ |
| 167. $\int \frac{3x-1}{(x^2+2x+10)^2} dx$ | 168. $\int \frac{x-7}{(x^2+10x+9)^2} dx$ |

4-§. Ўзгарувчини алмаштириш усули билан интеграллаш

Агар $x = \varphi(t)$ функция узлуксиз ва ҳосилага эга бўлса, у ҳолда $\int f(x) dx$ интегрални янги ўзгарувчи (t) киритиш орқали қуйидаги формула бўйича топиш мумкин:

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt. \quad (4.7)$$

(4.7) формуланинг ўнг қисмидаги интегрални (агар уни топиш мумкин бўлса) топамиз ва уни яна x ўзгарувчи орқали ифодалаймиз. Бундай усулга аниқмас интегралда ўзгарувчи алмаштириш ёки ўрнига қўйиш усули билан интеграллаш дейилади. $x = \varphi(t)$ алмаштириш бажарилганда D_1 ва D_2 аниқланиш сохалари ўзаро бир қийматли ($D_1 \subset D_2$) ҳамда $\varphi(t)$ ва $f(x)$ функциялари аниқланган ва $x \in D_1$ нинг ҳамма қийматларини $\varphi(t)$ функция ҳам қабул қилиши керак.

Буларни қуйидаги мисолларни ечиш ёрдамида кўрсатамиз.

1-мисол. $\int x\sqrt{1-x} dx$ ни топинг.

Ечиш.

$t = \sqrt{1-x}$ формула ёрдамида янги ўзгарувчи t ни кiritамиз.

У ҳолда

$$t^2 = 1-x \Rightarrow x = 1-t^2, dx = -2tdt.$$

Бунда $D_1: 0 \leq t < \infty$, $D_2: 1 \leq x < \infty$ ва $D_1 \Leftrightarrow D_2$. (4.7) формулага асосан қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{1-x} dx &= \int (1-t^2) \cdot t \cdot (-2tdt) = -2 \int (1-t^2)t^2 dt = \\ &= 2 \int (t^4 - t^2) dt = 2 \left(\int t^4 dt - \int t^2 dt \right) = 2 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right) + C = \\ &= 2 \left(\frac{\sqrt{1-x}^5}{5} - \frac{\sqrt{1-x}^3}{3} \right) + C = \frac{2(1-x)^2\sqrt{1-x}}{5} - \frac{2(1-x)\sqrt{1-x}}{3} + C. \end{aligned}$$

2-мисол. $\int \frac{\sqrt{x^2+b^2}}{x^2} dx$ ни топинг.

Ечиш. $x = \varphi(t) = b \operatorname{tg} t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз. $x = b \operatorname{tg} t$ нинг аниқланиш соҳаси $D_1: -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ бўлиб, у қуйидаги шартни қаноатлантиради: $D_1 \Leftrightarrow D_2: (-\infty; +\infty)$ ва D_1 да $\varphi'(t)$ ҳосила узлуксиз. У ҳолда $dx = \frac{b dt}{\cos^2 t}$ ва (4.7) формулага асосан берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2+b^2}}{x^2} dx &= \int \frac{\sqrt{b^2 \operatorname{tg}^2 t + b^2} \cdot b dt}{b^2 \operatorname{tg}^2 t \cos^2 t} = \int \frac{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t}}{\sin^2 t} dt = \int \frac{1}{\cos t \sin^2 t} dt = \\ &= \int \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t \sin^2 t} dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt + \int \frac{dt}{\cos t} = -\frac{1}{\sin t} + \ln \left| \operatorname{tg} t + \frac{1}{\cos t} \right| + \\ C &= -\frac{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t}}{\operatorname{tg} t} + \ln \left| \operatorname{tg} t + \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t} \right| + C = -\frac{\sqrt{b^2+x^2}}{x} + \\ &+ \ln \left| \frac{x+\sqrt{b^2+x^2}}{b} \right| + C. \end{aligned}$$

3-мисол. $\int \sqrt{a^2-x^2} dx$ ни топинг.

Ечиш. $x = a \sin t$ тригонометрик ўрнига қўйишни татиқ этишимиз. У ҳолда $dx = a \cos t dt$. $D_1: -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, $D_2: -a \leq x \leq a$. $D_1 \Leftrightarrow D_2$ бажарилади. Берилган интегрални янги ўзгарувчи t орқали ифодалаб топамиз:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2-x^2} dx &= \int \sqrt{a^2-a^2 \sin^2 t} \cdot a \cos t dt = a^2 \int |\cos t| \cos t dt = \\ &= a^2 \int \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \int dt + \frac{a^2}{2} \int \cos 2t dt = \\ &= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cdot \cos t + C. \end{aligned}$$

Энди $t = \arcsin \frac{x}{a}$ ва $\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ тенгликлардан фойдаланиб, охириги ифодани x ўзгарувчи орқали ифодалаймиз. Натижада қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2-x^2} dx &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a} \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} + C = \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C. \end{aligned}$$

Айрим функцияларнинг интегралини топишда $x = \varphi(t)$ алмаштириш эмас, балки $t = \psi(x)$ алмаштириш мақсадга мувофиқдир. Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

4-мисол. $\int \sqrt[3]{1+\cos x} \cdot \sin x \, dx$ ни топинг.

Ечиш. $1+\cos x = t$ ўрнига қўйишни бажарамиз. У ҳолда $-\sin x dx = dt$ бўлиб, берилган интегрални топиш қуйидаги қўринишни олади:

$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{1+\cos x} \cdot \sin x \, dx &= -\int \sqrt[3]{t} \cdot dt = -\int t^{\frac{1}{3}} dt = -\frac{t^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \\ &= -\frac{3\sqrt[3]{t^4}}{4} + C = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{(1+\cos x)^4} + C. \end{aligned}$$

5-мисол. $\int e^{-x^4} x^3 \, dx$ ни топинг.

Ечиш. $-x^4 = t$ ўрнига қўйишни бажарамиз. У ҳолда $-4x^3 dx = dt$, $x^3 dx = -\frac{1}{4} dt$ ва берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int e^{-x^4} x^3 \, dx &= \int e^t \left(-\frac{1}{4}\right) dt = -\frac{1}{4} \int e^t dt = -\frac{1}{4} e^t + C = \\ &= -\frac{1}{4} e^{-x^4} + C. \end{aligned}$$

6-мисол. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+2x+2}}$ ни топинг.

Ечиш. Бу ҳолда $t = \frac{1}{x-1}$ ўрнига қўйишдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бундан $x = \frac{1}{t} + 1$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ бўлиб, берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+2x+2}} &= \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \left(\frac{1}{t}-1\right)^2 - 2\left(\frac{1}{t}-1\right) + 2} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} + 9}} = \\ &= -\int \frac{dx}{\sqrt{9t^2+1}} = -\int \frac{dx}{\sqrt{(3t)^2+1}} = -\frac{1}{3} \ln \left| 3t + \sqrt{9t^2+1} \right| + C = \\ &= -\frac{1}{3} \ln \left| \frac{3}{x+1} + \sqrt{\frac{9}{(x+1)^2} + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

Эслатма. Аниқмас интегрални ўрнига қўйиш ёки бўлаклар интеграллаш усулларидан фойдаланиб топишда ёзувни соддалаштириш ва қисқартириш мақсадида қи-

ртилаётган белгилашларни иккита вертикал чизиқ ичига ёзишни тавсия этамиз. Буни юқорида ечилган 3-мисолда кўрсатамиз.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \left| \begin{array}{l} x = a \sin t \\ dx = a \cos t \, dt \end{array} \right| = \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cdot a \cdot \cos t \, dt = \\ &= a^2 \int |\cos t| \cos t \, dt = a^2 \int \cos^2 t \, dt = a^2 \int \frac{1+\cos 2t}{2} \, dt = \\ &= \frac{a^2}{2} \int dt + \frac{a^2}{2} \int \cos 2t \, dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin 2t + C = \\ &= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C = \left| \begin{array}{l} t = \arcsin \frac{x}{a}, \sin t = \frac{x}{a} \\ \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \end{array} \right| = \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + C = \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

Машқлар

Қуйидаги интегралларни ўзгарувчини алмаштириш усули билан топинг:

- | | |
|---|---|
| 169. $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x+3}}$ | 170. $\int x \sqrt[3]{(5x^2-3)^7} \, dx$ |
| 171. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^2}} \, dx$ | 172. $\int x^2 \sqrt{x^3+5} \, dx$ |
| 173. $\int \frac{(2 \ln x + 3)^3}{x} \, dx$ | 174. $\int \frac{e^{\sqrt{2x-1}}}{\sqrt{2x-1}} \, dx$ |
| 175. $\int x^3 (1-2x^4)^3 \, dx$ | 176. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x}}$ |
| 177. $\int \frac{\sin 4x \, dx}{\cos^4 2x+4}$ | 178. $\int \frac{e^{2x}}{e^{4x}} \, dx$ |
| 179. $\int \frac{\arctg x}{1+x^2} \, dx$ | 180. $\int \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} \, dx$ |

5-§. Булаклаб интеграллаш

Булаклаб интеграллаш усули куйидаги формулага асосланади:

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad (4.8)$$

бунда $u(x)$, $v(x)$ лар узлуксиз дифференциалланувчи функциялар деб қаралади. (4.8) формула булаклаб интеграллаш формуласи дейилади.

(4.8) формулани ҳамма интегралларга ҳам қўллай бериш мумкин эмас. Агар интеграл остидаги функциялар $P_n(x) \sin nx$, $P_n(x) \cos nx$, $P_n(x) e^{ax}$, $P_n(x) \ln^k x$, $P_n(x) \operatorname{sh} nx$, $a^{kx} \sin nx$, $a^{kx} \cos nx$, $\arcsin x$, $\operatorname{arctg} x$ (бунда k, n — мусбат бутун сонлар), $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ кўпхад кўринишда бўлса, у ҳолда (4.8) формулани қўллаш натижасида берилган интеграл жадвал интегралига келади.

Айрим мисолларда булаклаб интеграллаш формуласи бир неча мартаба қўлланилади. Булаклаб интеграллашда куйидаги уч ҳолга эътибор бериш керак:

а) агар интеграллар $\int P_n(x) \cdot \sin nx dx$, $\int P_n(x) \cdot e^{ax} dx$, ... кўринишларда бўлса, у ҳолда $u = P_n(x)$, $dv = \sin nx dx$ деб белгилаш керак.

Буни куйидаги мисолда кўрамыз.

1-мисол. $\int (x^2 + 2x) \cos 2x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x) \cos 2x dx & \left| \begin{array}{l} u = x^2 + 2x, \quad du = (2x + 2) dx \\ dv = \cos 2x dx, \quad v = \int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \\ & = (x^2 + 2x) \cdot \frac{1}{2} \sin 2x - \int \frac{1}{2} \sin 2x \cdot (2x + 2) dx = \\ & = \frac{1}{2} (x^2 + 2x) \cdot \sin 2x - \int (x + 1) \sin 2x dx \cdot \\ & \left| \begin{array}{l} u = x + 1, \quad du = dx \\ dv = \sin 2x dx, \quad v = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{1}{2} (x^2 + 2x) \sin 2x - \left[(x + 1) \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) - \int -\frac{1}{2} \cos 2x dx \right] = \\ & = \frac{1}{2} (x^2 + 2x) \sin 2x + \frac{1}{2} (x + 1) \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C. \end{aligned}$$

б) агар интеграллар $\int P_n(x) \ln^k x dx$, $\int P_n(x) \arcsin x dx$, ... кўринишларда бўлса, у ҳолда $u = \ln^k x$ ёки $u = \arcsin x$ $dv = P_n(x) dx$ деб белгилаш керак.

2-мисол. $\int x \operatorname{arctg} x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{arctg} x dx & \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2} \\ dv = x dx, \quad v = \int x dx = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \\ & = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1+x^2} dx = \\ & = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C. \end{aligned}$$

3-мисол. $\int x^2 \ln^2 x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln^2 x dx & \left| \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx \\ dv = x^2 dx, \quad v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right| = \\ & = \frac{x^3}{3} \ln^2 x - \int \frac{x^3}{3} 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln^2 x - \frac{2}{3} \int x^2 \ln x dx \cdot \\ & \left| \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x^2 dx, \quad v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right| = \frac{x^3}{3} \ln^2 x - \frac{2}{3} \left[\frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^3}{3} dx \right] = \\ & = \frac{x^3}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} x^3 \ln x + \frac{2}{27} x^3 + C. \end{aligned}$$

в) агар интеграллар $\int a^{nx} \sin mx dx$, $\int e^{nx} \cos kx dx$, ... кўри-
нишларда бўлса, у ҳолда (4.8) формулани икки марта тат-
биқ этиш натижасида берилган интеграл ҳосил бўлади. Бунда
биринчи марта u деб кўрсаткичли функцияни белгиланган
бўлсак, иккинчи марта (4.8) формулани татбиқ этилганда
яна кўрсаткичли функцияни u деб белгилаш керак.

4-мисол. $\int e^{3x} \sin x dx$ ни топинг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int e^{3x} \sin x dx & \left| \begin{array}{l} u = \sin x, \quad du = \cos x dx \\ dv = e^{3x} dx, \quad v = \frac{1}{3} e^{3x} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{3} e^{3x} \sin x - \frac{1}{3} \int e^{3x} \cos x dx \left| \begin{array}{l} u = \cos x, \quad du = -\sin x dx \\ dv = e^{3x} dx, \quad v = \frac{1}{3} e^{3x} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{3} e^{3x} \sin x - \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} e^{3x} \cos x - \int \frac{1}{3} e^{3x} \cdot (-\sin x) dx \right] = \\ &= \frac{1}{3} e^{3x} \sin x - \frac{1}{9} e^{3x} \cos x - \frac{1}{9} \int e^{3x} \sin x dx. \end{aligned}$$

Унг томондаги охириги интегрални чап қисмига ўтқа-
зиб соддалаштирсак, қуйидагига эга бўламиз:

$$\frac{10}{9} \int e^{3x} \sin x dx = \frac{1}{3} e^{3x} \sin x - \frac{1}{9} e^{3x} \cos x + \frac{10}{9} C.$$

Демак,

$$\int e^{3x} \sin x dx = \frac{3}{10} e^{3x} \sin x - \frac{1}{10} e^{3x} \cos x + C.$$

Машқлар

Қуйидаги интегралларни бўлаклаб интеграллаш усули
билан топинг:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 181. $\int x \sin x dx$. | 182. $\int x \ln x dx$. |
| 183. $\int \arcsin x dx$. | 184. $\int \ln^2 x dx$. |

- | | |
|---|--|
| 185. $\int \sqrt{x} \ln x dx$. | 186. $\int x \arccos 2x dx$. |
| 187. $\int x^2 e^{3x} dx$. | 188. $\int \arccos x dx$. |
| 189. $\int (x^2 - 2x + 5) e^{-x} dx$. | 190. $\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} dx$. |
| 191. $\int x^3 e^{-x^2} dx$. | 192. $\int x^2 \cdot 2^{-3x} dx$. |
| 193. $\int e^{\sqrt{x}} dx$. | 194. $\int \sin(\ln x) dx$. |
| 195. $\int x e^{\frac{1}{x}+1} dx$. | 196. $\int \ln(1+x^2) dx$. |
| 197. $\int x \cos\left(\frac{\pi}{2}+1\right) dx$. | 198. $\int \ln(x-3) dx$. |
| 199. $\int e^{3x} \cos x dx$. | 200. $\int 2^{2x} \sin 3x dx$. |

6-§. Рационал функцияларни интеграллаш

Қуйидаги икки кўпхаднинг нисбати *каср-рационал*
функция ёки *рационал каср* дейилади:

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = \frac{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n} \quad (4.9)$$

бунда m, n — мусбат бутун сонлар, $a_p, b_j \in \mathbb{R}$ ($i = \overline{0, n}, j = \overline{0, m}$).

Агар $m < n$ бўлса, у ҳолда (4.9) функция тўғри рацио-
нал каср, $m > n$ бўлса, нотўғри рационал каср дейилади.

Ҳар қандай нотўғри касрнинг суратини махражига
булиш натижасида уни бирор кўпхад ва тўғри каср йи-
гиндиси шаклида ёзиш мумкин:

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = M_{m-n}(x) + \frac{Q_1(x)}{P_n(x)}.$$

Масалан, $\frac{x^4+4}{x^2+3x-1}$ нотўғри касрнинг суратини махра-
жига бўлсак, қуйидагига эга бўламиз:

$$\frac{x^4+4}{x^2+3x-1} = x^2 - 3x + 10 + \frac{-3x+14}{x^2+3x-1}.$$

Ҳар қандай кўпхад осон интегралланади ва рационал функцияни интеграллаш тўғри касрни интеграллашга келтирилади. Шунинг учун рационал функцияларнинг $m < n$ шартда интеграллини топишни кўрамиз.

Қуйидаги кўринишдаги касрларга энг содда рационал касрлар дейилади:

$$1) \frac{A}{x-a}; \quad 2) \frac{A}{(x-a)^n}; \quad 3) \frac{Mx+N}{x^2+px+q}; \quad 4) \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}.$$

бунда A, M, N, p, q — ўзгармас сонлар; n — бутун сон, $p^2 - 4q < 0$.

Биринчи ва иккинчи турдаги касрларнинг аниқмас интеграли осон топилади:

$$\int \frac{Adx}{x-a} = A \ln|x-a| + C.$$

$$\int \frac{Adx}{(x-a)^n} = \frac{A}{(1-n)(x-a)^{n-1}} + C.$$

3) ва 4) кўринишдаги касрларни интеграллаш 4-§ да қўрилган.

Шундай қилиб, ҳар қандай энг содда рационал касрни уни ташкил этувчи элементар функцияларнинг интеграллари каби интеграллаш мумкин экан.

Ҳар қандай ҳақиқий коэффициентли $P_n(x)$ кўпхадни ҳақиқий сонлар тўпламида қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \dots (x - \alpha_p)^{k_p} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_sx + q_s)^{l_s}, \quad (4.10)$$

бунда $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ лар $P_n(x)$ кўпхаднинг $k_1, \dots, k_p$ каррали ҳақиқий илдизлари, $p^2 - 4q_\gamma < 0$ ($\gamma = 1, s$); $k_1 + k_2 + \dots + k_p + 2l_1 + \dots + 2l_s = n$; $k_1, \dots, k_p, l_1, \dots, l_s$ мусбат бутун сонлар. Агар кўпхадни (4.10) кўринишда ёзиш мумкин бўлса, (4.9) рационал касрни қуйидаги рационал касрлар йигиндиси кўринишида ёзиш мумкин:

$$\frac{A}{x-\alpha_r} + \frac{A_1}{(x-\alpha_r)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-\alpha_r)^{k_1}}. \quad (4.11)$$

(4.10) кўпхад l_s каррали жуфт қўшма комплекс сондан иборат илдизларга эга бўлса, у ҳолда (4.9) рационал каср қуйидаги элементар касрлар йигиндиси кўринишида ёзилади:

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+p_1x+q_1} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+p_2x+q_2)^2} + \dots + \frac{M_sx+N_s}{(x^2+p_sx+q_s)^{l_s}}. \quad (4.12)$$

Энди (4.11) ва (4.12) даги номаълум A_1, A_2, A_k ва $M_1, M_2, \dots, M_s, N_1, N_2, \dots, N_s$ коэффициентларни топиш учун (4.11) ва (4.12) ни қўшиб умумий махражга келтирамиз, натижада ўзаро тенг бўлган

$$Q_m(x) = Q_{m-n}^*(x) \quad (4.13)$$

$(n-1)$ -даражали кўпхадларга эга бўламиз.

(4.13) дан осонгина номаълум коэффициентлар топилади. Уларни икки усул билан топишни қуйидаги мисолларда кўрсатамиз:

1-мисол. $\int \frac{2x-3}{x(x+1)(x+2)} dx$ ни топинг.

Ечиш. (4.11) формулага асосан элементар касрларнинг йигиндиси қуйидагича бўлади:

$$\frac{2x-3}{x(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2}. \quad (A)$$

(A) нинг ўнг томонини умумий махражга келтирсак, у ҳолда иккита касрнинг тенглик аломатига кўра

$$2x-3 = A(x+1)(x+2) + B(x+2)x + C(x+1)x \quad (B)$$

ни ҳосил қиламиз.

(B) нинг иккала қисмидаги x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\begin{aligned} x^2 &| \quad 0 = A + B + C, \\ x^1 &| \quad 2 = 3A + 2B + C, \\ x^0 &| \quad -3 = 2A. \end{aligned}$$

Бундан $A = -\frac{3}{2}$, $B = 5$, $C = -\frac{7}{2}$ келиб чиқади.

Бу усул номаълум коэффициентларни топиш усули дейилади.

Энди A , B , C номаълум коэффициентларни x нинг махражни нолга айлантирадиган сон қийматларини қўйиш усули билан топишни кўрамиз. Агар (B) тенгликдаги x ўрнига кетма-кет 0 , -1 , -2 қийматларни қўйсак, натижада A , B , C номаълум коэффициентлар топилади:

$$x = 0 : \text{ да } 2 \cdot 0 - 3 = 2A \Rightarrow A = -\frac{3}{2};$$

$$x = -1 : \text{ да } 2 \cdot (-1) - 3 = B(-1 + 2)(-1) = > B = 5;$$

$$x = -2 : \text{ да } 2 \cdot (-2) - 3 = C(-2 + 1) \cdot (-2) = > C = -\frac{7}{2};$$

натижа бир хил чиқади.

Энди бу топилган қийматларни ўрнига қўямиз:

$$\frac{2x-3}{x(x+1)(x+2)} = \frac{3}{2x} + \frac{5}{x+1} - \frac{7}{2(x+2)}.$$

Натижада берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{x(x+1)(x+2)} dx &= \int \left(\frac{3}{2x} + \frac{5}{x+1} - \frac{7}{2(x+2)} \right) dx = \\ &= -\frac{3}{2} \ln|x| + 5 \ln|x+1| - \frac{7}{2} \ln|x+2| + C. \end{aligned}$$

$$2\text{-мисол. } \int \frac{x dx}{(x-2)(x+2)^2} \text{ ни топинг.}$$

Ечиш. Тўғри касрни энг содда касрлар йиғиндиси кўринишида ёзиш қоида-сига кўра:

$$\int \frac{x dx}{(x-2)(x+2)^2} = \int \left(\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{x+2} \right) dx.$$

Кавс ичидаги касрларни умумий махражга келтирамиз ва унинг суратини x га тенглаймиз:

$$x = A(x+2)^2 + B(x-2) + C(x-2)(x+2).$$

$$x = 2 \text{ да: } 2 = 16A \Rightarrow A = \frac{1}{8};$$

$$x = -2 \text{ да: } -2 = 4B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}.$$

C номаълумни топиш учун тенгликнинг ўнг томонидаги қавсларни очиб x^2 олдидаги коэффициентлар йиғиндиси нолга тенглаймиз, натижада

$$0 = A + C, \quad \text{бундан } C = -\frac{1}{8}$$

келиб чиқади. Бу қийматларни ўрнига қўйиб берилган интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(x-2)(x+2)^2} &= \int \left(\frac{1}{8(x-2)} + \frac{1}{2(x+2)^2} - \frac{1}{8(x+2)} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-2| - \frac{1}{2(x+2)} - \frac{1}{8} \ln|x+2| + C. \end{aligned}$$

$$3\text{-мисол. } \int \frac{x^4+3x^2-5}{x^3+2x^2+5x} dx \text{ ни топинг.}$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция нотўғри каср бўлгани учун унинг суратини махражга бўлиб, касрни бутун қисм ва тўғри рационал каср йиғиндиси кўринишида ёзиб оламиз:

$$\frac{x^4+3x^2-5}{x^3+2x^2+5x} = x - 2 + \frac{2x^2+10x-5}{x^3+2x^2+5x}.$$

Энди охириги тўғри касрни энг содда касрлар йиғиндиси кўринишида ёзиб оламиз:

$$\frac{2x^2+10x-5}{x(x^2+2x+5)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+2x+5}.$$

Бу тенгликнинг ўнг қисмини умумий махражга келтириб, касрларнинг суратларини тенглаймиз:

$$2x^2 + 10x - 5 = A(x^2 + 2x + 5) + Mx^2 + Nx.$$

x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаймиз:

$$x^2 \mid 2 = A + M,$$

$$x^1 \mid 10 = 2A + N,$$

$$x^0 \mid -5 = 5A,$$

$$\text{бундан } A = -1, M = 3, N = 12.$$

Натижада берилган интеграл қуйидагича ҳисобланади:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4+3x^2-5}{x^3+2x^2+5x} dx &= \int \left(x-2-\frac{1}{x}+\frac{3x+12}{x^2+2x+5} \right) dx = \\ &= \int (x-2)d(x-2) - \int \frac{dx}{x} + \frac{3}{2} \int \frac{2x+2+6}{x^2+2x+5} dx = \\ &= \frac{(x-2)^2}{2} - \ln|x| + \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+2x+5)}{x^2+2x+5} + \frac{3}{2} \cdot 6 \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} = \\ &= \frac{(x-2)^2}{2} - \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|x^2+2x+5| + \frac{9}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C. \end{aligned}$$

Машқлар

Қуйидаги интегралларни топинг:

- | | |
|--|--|
| 201. $\int \frac{dx}{x^3-x}$ | 202. $\int \frac{x-4}{x^2-5x+6} dx$ |
| 203. $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx$ | 204. $\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2} dx$ |
| 205. $\int \frac{x^2-2x+3}{(x-1)(x^2-4x^2+3x)} dx$ | 206. $\int \frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)} dx$ |
| 207. $\int \frac{x^2 dx}{x^4-1}$ | 208. $\int \frac{2x dx}{(x+1)(x^2+1)^2}$ |
| 209. $\int \frac{4}{x(x^2+4)} dx$ | 210. $\int \frac{1}{x(x+1)^2} dx$ |
| 211. $\int \frac{dx}{x(x^2-1)}$ | 212. $\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)^2}$ |
| 213. $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx$ | 214. $\int \frac{13dx}{x(x^2+6x+13)} dx$ |

7-§. Баъзи иррационал функцияларни интеграллаш

Қуйидаги кўринишдаги интеграллар берилган бўлсин:

$$\int R(x, x^a, x^b, x', \dots) dx, \quad (4.14)$$

$$\int R(x, (ax+b)^\alpha, (ax+b)^\beta + (ax+b)^\gamma, \dots) dx, \quad (4.15)$$

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^\alpha, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^\beta + \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^\gamma, \dots\right) dx. \quad (4.16)$$

Бу ерда $\alpha = \frac{m_1}{n_1}$, $\beta = \frac{m_2}{n_2}$, $\gamma = \frac{m_3}{n_3}$ рационал сонлар бўлиб, k уларнинг умумий махражи бўлса, у ҳолда (4.14) учун $x = t^k$, (4.15) учун эса $\frac{ax+b}{cx+d} = t^k$ алмаштиришлар ёрдамида бу интегралларни топиш рационал функцияни интеграллашга келади. Бундай интегралларни топишни мисолларда кўрамыз.

1-мисол. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x^3+4}}$ ни топинг.

Ечиш. Бу мисолда $k = 4$ бўлгани учун юқоридагига кўра берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x^3+4}} \left| \sqrt{x} = t, x = t^4 \right| &= 4 \int \frac{t^2}{t^3+4} t^3 dt = 4 \int \frac{t^5 dt}{t^3+4} = \\ &= 4 \int \left(t^2 - \frac{4t^2}{t^3+4} \right) dt = 4 \left(\int t^2 dt - \frac{4}{3} \int \frac{3t^2}{t^3+4} dt \right) = 4 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{16}{3} \int \frac{d(t^3+4)}{t^3+4} \right) = \\ &= \frac{4}{3} t^3 - \frac{16}{3} \ln|t^3+4| + C = \frac{4}{3} \sqrt{x^3} - \frac{16}{3} \ln|\sqrt[4]{x^3+4}| + C. \end{aligned}$$

2-мисол. $\int \frac{\sqrt[5]{x+2}}{\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+2}} dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Бу мисолда $k = 6$ бўлгани учун интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[5]{x+2}}{\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+2}} dx \left| \sqrt{x+2} = t, x+2 = t^6 \right| &= \int \frac{t}{t^3+t^2} 6t^5 dt = \\ &= 6 \int \frac{t^6}{t^2(t+1)} dt = 6 \int \frac{t^4}{t+1} dt = 6 \int (t^3 - t^2 + t - 1 + \frac{1}{t+1}) dt = \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2}t^4 - 2t^3 + 3t^2 - 6t + 6\ln|t+1| + C = \frac{3}{2}\sqrt{(x+2)^2} -$$

$$-2\sqrt{x+2} + 3\sqrt{x+2} - 6\sqrt{x+2} + 6\ln|\sqrt{x+2}+1| + C.$$

3-мисол. $\int \frac{2}{(2-x)^2} \cdot \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx$ ни топинг.

Ечиш. $\sqrt{\frac{2-x}{2+x}} = t$ алмаштиришни бажарамиз, бундан

$$\frac{2-x}{2+x} = t^2 \Rightarrow x = \frac{2-2t^2}{1+t^2}, \quad 2-x = \frac{4t^2}{1+t^2} \quad \text{ва} \quad dx = \frac{-12t^2}{(1+t^2)^2} dt \text{ бўлади.}$$

$$\text{Демак, } \int \frac{2}{(2-x)^2} \cdot \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx = -\int \frac{2(1+t^2)t \cdot 12t^2}{16t^3(1+t^2)^2} dt = -\frac{3}{2} \int \frac{dt}{t^3} =$$

$$= \frac{3}{4t^2} + C = \frac{3}{4} \cdot \sqrt{\left(\frac{2+x}{2-x}\right)^2} + C.$$

Куйидаги кўринишдаги интегрални қараймиз:

$$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad (4.17)$$

бунда $P_n(x)$ n -даражали кўпхад. (4.17) кўринишдаги интегрални ҳар доим қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad (4.18)$$

бунда $\lambda \in R$; $Q_{n-1}(x)$ эса $(n-1)$ -даражали коэффициентлари номаълум бўлган кўпхад бўлиб, улар қуйидагича аниқланади. (4.18) тенгликнинг ҳар иккала қисмини дифференциаллаш ёрдамида $Q_{n-1}(x)$ кўпхаднинг номаълум коэффициентлари ва λ сон топилади.

Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

4-мисол. $\int \frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} dx$ ни топинг.

Ечиш. (4.18) формулага асосан:

$$\int \frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} dx = (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)\sqrt{x^2+4} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$$

Охирги тенгликни дифференциаллаймиз:

$$\frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} = (3Ax^2 + 2Bx + C)\sqrt{x^2+4} +$$

$$+(Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + \lambda \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}.$$

Бу тенгликнинг иккала томонини $\sqrt{x^2+4}$ га кўпайтирамиз. У ҳолда $x^4 + 4x^2 = (3Ax^2 + 2Bx + C)(x^2 + 4) + (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)x + \lambda$.

Бундан қуйидаги системага эга бўламиз:

$$x^4 | \quad 1 = 3A + \lambda,$$

$$x^3 | \quad 0 = 2B + B,$$

$$x^2 | \quad 4 = 12A + C + B,$$

$$x^1 | \quad 0 = 4B + D,$$

$$x^0 | \quad 0 = 4C + \lambda.$$

Бу системанинг ечимини топамиз: $A = \frac{1}{4}$, $B = 0$, $C = \frac{1}{2}$, $D = 0$, $\lambda = -2$. Демак,

$$\int \frac{x^4+4x^2}{\sqrt{x^2+4}} dx = \frac{x^3+2x}{4} \sqrt{x^2+4} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} =$$

$$= \frac{x^3+2x}{4} \sqrt{x^2+4} - 2 \ln|x + \sqrt{x^2+4}| + C.$$

Биномиал дифференциалларни интеграллаш
Ушбу

$$x^m(a + bx^n)^p dx$$

дифференциал ифода биномиал дифференциал деб аталади. Унинг интеграли

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx \quad (4.19)$$

берилган бўлсин. Бунда a , b ўзгармас сонлар, m , n , p — рационал сонлар. (4.19) интегрални ҳисоблаш m , n , p рационал сонларга боғлиқлигини рус математиги П.Л.Чебишев кўрсатган. (4.19) интеграл қуйидаги учта

Агар куйидаги $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ тенглик ўринли бўлса, $t = \operatorname{tg} x$ алмаштириш қулай. Бу алмаштиришда тригонометриядан маълум бўлган

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \\ x &= \arctg t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}\end{aligned}\quad (4.22)$$

формулалардан фойдаланилади.

2-мисол. $\int \frac{dx}{3+\sin^2 x}$ ни топинг.

Ечиш: $t = \operatorname{tg} x$ алмаштиришни бажарамиз ва (4.22) тенгликларга кура топамиз:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3+\sin^2 x} &= \int \frac{\frac{1}{1+t^2} dt}{3+\frac{t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{3+4t^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctg \frac{2t}{\sqrt{3}} + C = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctg \frac{2\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C.\end{aligned}$$

3-мисол. $\int \operatorname{tg}^5 2x dx$ ни топинг.

Ечиш: $t = \operatorname{tg} 2x$ алмаштиришни бажарамиз. Бунда

$$x = \frac{1}{2} \arctg t, \quad dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt,$$

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^5 2x dx &= \int t^5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{t^5}{1+t^2} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int \left(t^3 - t + \frac{t}{1+t^2} \right) dt = \frac{1}{8} t^4 - \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{4} \ln |1+t^2| + C = \\ &= \frac{1}{8} \operatorname{tg}^4 x - \frac{1}{4} \operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{4} \ln |1+\operatorname{tg}^2 x| + C.\end{aligned}$$

Агар интеграллар $\int \sin x \cdot f(\cos x) dx$ ёки $\int \cos x \cdot f(\sin x) dx$ кўринишда бўлса, у ҳолда

$$\cos x = t \quad \text{ёки} \quad \sin x = t$$

162

алмаштириш натижасида улар t га боғлиқ рационал функцияга келади.

4-мисол. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$ ни топинг.

Ечиш: $\cos x = t$ алмаштириш бажарамиз, у ҳолда $dt = -\sin x dx$ ва

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx &= \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^4 x} \sin x dx = \int \frac{1-t^2}{t^4} (-dt) = \\ &= -\int \frac{1}{t^4} dt + \int \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{3} t^{-3} - \frac{1}{t} + C = \\ &= \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

5-мисол. $\int \frac{\cos 2x dx}{\sqrt[3]{(2+3\sin 2x)^2}}$ ни топинг.

Ечиш: $2+3\sin 2x = t^3$ деб оламиз. У ҳолда $\cos 2x dx = \frac{1}{2} t^2 dt$ ва берилган интеграл қуйидагича топилади:

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos 2x dx}{\sqrt[3]{(2+3\sin 2x)^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{t^2 dt}{\sqrt[3]{t^6}} = \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{t^2} dt = \frac{1}{2} t + C = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt[3]{(2+3\sin 2x)} + C.\end{aligned}$$

Эслатма. $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ алмаштиришни юқоридаги ҳамма мисоллар учун қўллаш мумкин.

Машқлар

Қуйидаги интегралларни топинг:

225. $\int \frac{dx}{3+5\cos x}$

226. $\int \frac{dx}{4-5\sin x}$

227. $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{3+4\sin 2x}} dx$

228. $\int \frac{\sin 3x}{\sqrt[3]{(3+2\cos 3x)^2}} dx$

229. $\int \frac{\sin^3 x dx}{1+\cos^2 x}$

230. $\int \frac{dx}{3\sin^2 x + 5\cos^2 x}$

163

$$231. \int \cos^3 x \sin^{10} x dx.$$

$$232. \int \frac{dx}{\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + \cos^2 x}.$$

$$233. \int \sin^4 8x dx.$$

$$234. \int \frac{\cos^4 x + \sin^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} dx.$$

$$235. \int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x}.$$

$$236. \int \frac{\sin x dx}{\sin x + 1}.$$

9-§. Биринчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда 14 та мисол бўлиб, уларнинг интегралларини топиш керак, шунингдек, 1—5-мисолларда натижани дифференциаллаш орқали текшириш керак.

Куйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

Аниқмас интегралларни топиш ва 1—5-мисолларнинг натижасини дифференциаллаш орқали текширинг.

$$1. \int \frac{3-2x^4+\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x}} dx.$$

Е ч и ш. Интеграл остидаги ифоданинг суратини маҳражига бўламыз ва интеграллар жадвалига кура қуйидагига эга бўламыз:

$$\begin{aligned} \int \frac{3-2x^4+\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x}} dx &= 3 \int x^{-\frac{1}{3}} dx - 2 \int x^{\frac{15}{4}} dx + \int x^{\frac{5}{12}} dx = \\ &= 4x^{\frac{2}{3}} - \frac{8}{19}x^{\frac{19}{4}} + \frac{12}{17}x^{\frac{17}{12}} + C = 4\sqrt[3]{x^2} - \frac{8}{19}\sqrt[4]{x^{19}} + \frac{12}{17}\sqrt[12]{x^{17}} + C. \end{aligned}$$

Натижани текширамыз:

$$\begin{aligned} \left(4\sqrt[3]{x^2} - \frac{8}{19}\sqrt[4]{x^{19}} + \frac{12}{17}\sqrt[12]{x^{17}} + C \right)' &= \\ &= 4 \cdot \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{8}{19} \cdot \frac{19}{4}x^{\frac{15}{4}} + \frac{12}{17} \cdot \frac{17}{12}x^{\frac{5}{12}} = 3x^{-\frac{1}{3}} - 2x^{\frac{15}{4}} + x^{\frac{5}{12}}. \end{aligned}$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-8x)^2}}.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-8x)^2}} &= \int (4-8x)^{-\frac{2}{3}} dx \left| \begin{array}{l} d(4-8x) = -8dx \\ dx = -\frac{1}{8}d(4-8x) \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{8} \int (4-8x)^{-\frac{2}{3}} d(4-8x) = -\frac{1}{8} \cdot \frac{(4-8x)^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} + C = \\ &= -\frac{3}{8}(4-8x)^{\frac{1}{3}} + C. \end{aligned}$$

Натижани текширамыз:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{3}{8}(4-8x)^{\frac{1}{3}} + C \right)' &= -\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3}(4-8x)^{\frac{1}{3}-1} \cdot (-8) = \\ &= (4-8x)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(4-8x)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(4-8x)^2}}. \end{aligned}$$

$$3. \int \frac{dx}{5-6x}.$$

Е ч и ш.

$$\int \frac{dx}{5-6x} \left| \begin{array}{l} d(5-6x) = -6dx \\ dx = -\frac{1}{6}d(5-6x) \end{array} \right| = -\frac{1}{6} \int \frac{d(5-6x)}{5-6x} = -\frac{1}{6} \cdot \ln|5-6x| + C.$$

Натижани текширамыз:

$$\left(-\frac{1}{6} \cdot \ln|5-6x| + C \right)' = -\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5-6x} \cdot (-6) = \frac{1}{5-6x}.$$

$$4. \int \cos(2-5x) dx.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \cos(2-5x) dx &\left| \begin{array}{l} d(2-5x) = -5dx \\ dx = -\frac{1}{5}d(2-5x) \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{5} \int \cos(2-5x) \cdot d(2-5x) = -\frac{1}{5} \sin(2-5x) + C. \end{aligned}$$

Натижани текшираимиз:

$$\left(-\frac{1}{5} \sin(2-5x) + C\right)' = -\frac{1}{5} \cos(2-5x) \cdot (-5) = \cos(2-5x).$$

$$5. \int \frac{3dx}{\sqrt{4x^2-3}}.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3dx}{\sqrt{4x^2-3}} &= \frac{3}{2} \int \frac{2dx}{\sqrt{(2x)^2-(\sqrt{3})^2}} = \frac{3}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2-(\sqrt{3})^2}} = \\ &= \frac{3}{2} \ln |2x + \sqrt{4x^2-3}| + C. \end{aligned}$$

Натижани текшираимиз:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2} \ln |2x + \sqrt{4x^2-3}| + C\right)' &= \frac{3}{2} \cdot \frac{2 + \frac{8x}{2\sqrt{4x^2-3}}}{2x + \sqrt{4x^2-3}} = \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{2(\sqrt{4x^2-3} + 2x)}{(2x + \sqrt{4x^2-3})\sqrt{4x^2-3}} = \frac{3}{\sqrt{4x^2-3}}. \end{aligned}$$

$$6. \int \frac{7x}{3x^2+4} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функциянинг (касрнинг) шаклини шундай алмаштирамизки, натижада суратида махражининг ҳосиласи ҳосил бўлсин:

$$\int \frac{7x}{3x^2+4} dx = \frac{7}{6} \int \frac{6x}{3x^2+4} dx = \frac{7}{6} \int \frac{d(3x^2+4)}{3x^2+4} = \frac{7}{6} \ln |3x^2+4| + C.$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{6-5x^2}}.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{6-5x^2}} &= \int \frac{\sqrt{5}dx}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5} \cdot x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5}x)^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \arcsin \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{6}} + C. \end{aligned}$$

$$8. \int e^{5-4x} dx.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int e^{5-4x} dx &\left| \begin{array}{l} d(5-4x) = -4dx \\ dx = -\frac{1}{4} d(5-4x) \end{array} \right| = -\frac{1}{4} \int e^{5-4x} d(5-4x) = \\ &= -\frac{1}{4} e^{5-4x} + C. \end{aligned}$$

$$9. \int \frac{\sqrt[3]{\ln^3(x+2)}}{x+2} dx.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{\ln^3(x+2)}}{x+2} dx &= \int \ln^{\frac{3}{3}}(x+2) d(\ln(x+2)) = \\ &= \frac{7}{10} \ln^{\frac{10}{7}}(x+2) + C = \frac{7}{10} \sqrt[7]{\ln^{10}(x+2)} + C. \end{aligned}$$

$$10. \int \frac{\cos 3x dx}{\sqrt[3]{\sin 3x-4}}.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 3x dx}{\sqrt[3]{\sin 3x-4}} &= \frac{1}{3} \int (\sin 3x-4)^{-\frac{1}{3}} \cos 3x dx = \\ &= \frac{1}{3} \int (\sin 3x-4)^{-\frac{1}{3}} d(\sin 3x-4) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} (\sin 3x-4)^{\frac{4}{3}} + C = \\ &= \frac{5}{12} \sqrt[3]{(\sin 3x-4)^4} + C. \end{aligned}$$

$$11. \int \frac{dx}{\sin^2 4x \cdot \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 4x}}.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 4x \cdot \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 4x}} &= \int -\left(\frac{1}{4}\right) \operatorname{ctg}^{\frac{2}{3}} 4x \cdot \left(-\frac{4}{\sin^2 4x} dx\right) = \\ &= -\frac{1}{4} \int \operatorname{ctg}^{\frac{2}{3}} 4x d(\operatorname{ctg} 4x) = -\frac{3}{4} \operatorname{ctg}^{\frac{1}{3}} 4x + C = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{\operatorname{ctg} 4x} + C. \end{aligned}$$

$$12. \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^5 2x}}{1+4x^2} dx.$$

Е ч и ш .

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^5 2x}}{1+4x^2} dx &= \frac{1}{2} \int \operatorname{arctg}^{\frac{5}{3}} 2x \left(\frac{2}{1+4x^2} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \operatorname{arctg}^{\frac{5}{3}} 2x d(\operatorname{arctg} 2x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} \operatorname{arctg}^{\frac{8}{3}} 2x + C = \\ &= \frac{3}{16} \sqrt[3]{\operatorname{arctg}^8 2x} + C. \end{aligned}$$

$$13. \int e^{3 \cos x + 2} \sin x dx.$$

Е ч и ш .

$$\int e^{3 \cos x + 2} \sin x dx = -\frac{1}{3} \int e^{3 \cos x + 2} d(3 \cos x + 2) = -\frac{1}{3} e^{3 \cos x + 2} + C.$$

$$14. \int \frac{3x+10}{6x^2-4} dx.$$

Е ч и ш .

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+10}{6x^2-4} dx &= \int \frac{3x}{6x^2-4} dx + 10 \int \frac{dx}{6x^2-4} = \frac{1}{4} \int \frac{12x}{6x^2-4} dx + \\ &+ \frac{10}{\sqrt{6}} \int \frac{d(\sqrt{6} \cdot x)}{(\sqrt{6}x)^2 - 2^2} = \frac{1}{4} \ln |6x^2 - 4| + \frac{5}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{6}x - 2}{\sqrt{6}x + 2} \right| + C. \end{aligned}$$

1-вариант

1. $\int \frac{\sqrt[3]{x^5 - 5x^2 + 3}}{x} dx.$
2. $\int \sqrt{5 - 4x} dx.$
3. $\int \frac{dx}{3x+4}.$
4. $\int \sin(3 - 4x) dx.$
5. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2 + 3}}.$
6. $\int \frac{x}{2x^2 - 7} dx.$
7. $\int \frac{dx}{3x^2 - 7}.$
8. $\int e^{2x-10} dx.$
9. $\int \frac{\sqrt{\ln^5(x+1)}}{x+1} dx.$
10. $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{(\sin x - 4)^3}}.$
11. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg} 3x}}{\sin^2 3x} dx.$
12. $\int \frac{\arccos^2 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx.$
13. $\int e^{5x^3-3} x dx.$
14. $\int \frac{x-1}{5-2x^2} dx.$

2-вариант

1. $\int \left(x\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}} + 1 \right) dx.$
2. $\int \sqrt{(2-x)^2} dx.$
3. $\int \frac{dx}{6x+1}.$
4. $\int \sin(9x+7) dx.$
5. $\int \frac{dx}{\sqrt{4-7x^2}}.$
6. $\int \frac{x}{3x^2+8} dx.$
7. $\int \frac{dx}{3x^2+7}.$
8. $\int e^{4-7x} dx.$
9. $\int \frac{\ln(3x+5)}{3x+5} dx.$
10. $\int \frac{\cos 6x}{\sin^4 6x} dx.$
11. $\int \frac{\operatorname{tg}^4 7x}{\cos^2 7x} dx.$
12. $\int \frac{\operatorname{arctg}^3 3x}{1+9x^2} dx.$
13. $\int e^{1-4x^2} x dx.$
14. $\int \frac{2x+3}{1-3x^2} dx.$

3-вариант

1. $\int \left(x^2 - \frac{\sqrt{x}}{x} - 3 \right) dx.$
2. $\int \sqrt[3]{(3+5x)^3} dx.$
3. $\int \frac{dx}{7x-3}.$
4. $\int \cos(10x-3) dx.$
5. $\int \frac{\sqrt{5} dx}{\sqrt{3-4x^2}}.$
6. $\int \frac{2x}{3x^2-7} dx.$
7. $\int \frac{dx}{6x^2-7}.$
8. $\int e^{8x+1} dx.$
9. $\int \frac{\ln^5(x+9)}{x+9} dx.$
10. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt[3]{\cos x^4 2x}} dx.$
11. $\int \frac{\operatorname{ctg}^3 6x}{\sin^2 6x} dx.$
12. $\int \frac{\arccos 4x}{\sqrt{1-16x^2}} dx.$
13. $\int e^{3x^2+4} x dx.$
14. $\int \frac{2x+3}{5x^2+2} dx.$

4-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2-2x^5+3}}{x} dx.$
2. $\int \sqrt{3+2x} dx.$
3. $\int \frac{dx}{2x+9}.$
4. $\int \sin(9x-1) dx.$
5. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-9}}.$
6. $\int \frac{2x}{\sqrt{2x^2+5}} dx.$
7. $\int \frac{dx}{7x^2+6}.$
8. $\int e^{2x+3} dx.$
9. $\int \frac{dx}{(x+4) \ln^5(x+4)}.$

10. $\int \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos 4x}} dx$. 11. $\int \frac{\sqrt{\lg^2 4x}}{\cos^2 4x} dx$. 12. $\int \frac{\arcsin^4 x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
13. $\int e^{\sin x+1} \cos x dx$. 14. $\int \frac{x-3}{4x^2+1} dx$.

5-вариант

1. $\int \left(\frac{\sqrt{x}}{x} + 2x^3 - 4 \right) dx$. 2. $\int \sqrt{3-4x} dx$. 3. $\int \frac{dx}{2x+7}$.
4. $\int \cos(8x-4) dx$. 5. $\int \frac{dx}{2x^2+7}$. 6. $\int \frac{x}{\sqrt{7-3x^2}} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{7-3x^2}}$. 8. $\int e^{7+3x} dx$. 9. $\int \frac{\sqrt{\ln^3(x+6)}}{x+6} dx$.
10. $\int \sin^5 4x \cos 4x dx$. 11. $\int \frac{\operatorname{ctg}^4 3x}{\sin^2 3x} dx$. 12. $\int \frac{\arcsin^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$.
13. $\int e^{4-x^2} x dx$. 14. $\int \frac{x-3}{1-4x^2} dx$.

6-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^3-3x^2+2}}{x} dx$. 2. $\int \sqrt{4-2x} dx$. 3. $\int \frac{dx}{5-2x}$.
4. $\int \sin(8x-5) dx$. 5. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+1}}$. 6. $\int \frac{x}{2x^2+9} dx$.
7. $\int \frac{dx}{6x^2+1}$. 8. $\int e^{5-x} dx$. 9. $\int \frac{\ln^3(x-8)}{x-8} dx$.
10. $\int \sin^4 8x \cos 8x dx$. 11. $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{\lg^2 x}}$. 12. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-25x^2} \arcsin 5x}$.
13. $\int e^{3x^3} x^2 dx$. 14. $\int \frac{3x-2}{x^2-8} dx$.

7-вариант

1. $\int \left(2x^3 - 3\sqrt{x^3} + \frac{4}{x} \right) dx$. 2. $\int \sqrt[4]{2-5x} dx$. 3. $\int \frac{dx}{7-3x}$.

4. $\int \cos(3x-7) dx$. 5. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}}$. 6. $\int \frac{5x}{\sqrt{3-5x^2}} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-1}}$. 8. $\int e^{4-5x} dx$. 9. $\int \frac{dx}{(x+3)\ln^4(x+3)}$.
10. $\int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x dx$. 11. $\int \frac{\operatorname{tg}^6 2x}{\cos^2 2x} dx$. 12. $\int \frac{\operatorname{arctg}^3 3x}{1+9x^2} dx$.
13. $\int \frac{x^4 dx}{e^{x^5}+1}$. 14. $\int \frac{x-5}{8-4x^2} dx$.

8-вариант

1. $\int \frac{2x^4-\sqrt{x^3}+5}{x^2} dx$. 2. $\int \sqrt[3]{(6-5x)^2} dx$. 3. $\int \frac{dx}{2+7x}$.
4. $\int \sin(7-4x) dx$. 5. $\int \frac{\sqrt{2} dx}{\sqrt{7-2x^2}}$. 6. $\int \frac{x}{\sqrt{3x^2+8}} dx$.
7. $\int \frac{dx}{3x^2-5}$. 8. $\int e^{3-8x} dx$. 9. $\int \frac{\sqrt{\ln^4(x-5)}}{x-5} dx$.
10. $\int \frac{\cos 6x}{\sin^6 x} dx$. 11. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^5 x}}{\sin^2 x} dx$. 12. $\int \frac{\arccos^2 7x}{\sqrt{1-49x^2}} dx$.
13. $\int \frac{x}{e^{x^2}-3} dx$. 14. $\int \frac{x+4}{7x^2+3} dx$.

9-вариант

1. $\int \frac{3x^2-\sqrt{x^5}+7}{x^3} dx$. 2. $\int \sqrt{5-4x} dx$. 3. $\int \frac{dx}{1+6x}$.
4. $\int \cos(7x+3) dx$. 5. $\int \frac{\sqrt{14} dx}{2x^2-7}$. 6. $\int \frac{5x}{\sqrt{5x^2+3}} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}$. 8. $\int e^{2-4x} dx$. 9. $\int \frac{\sqrt{\ln^2(x+3)}}{x+3} dx$.
10. $\int \sin^6 3x \cos 3x dx$. 11. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x}}{\sin^2 x} dx$. 12. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^3 x}}{1+x^2} dx$.
13. $\int \frac{x}{e^{2x^2}+5} dx$. 14. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{2x^2-1}} dx$.

10-вариант

1. $\int \frac{3x^4 - \sqrt{x^2+1}}{x^2} dx$.
2. $\int \sqrt{5-2x} dx$.
3. $\int \frac{dx}{1-7x}$.
4. $\int \sin(7x+1) dx$.
5. $\int \frac{dx}{8x^2+9}$.
6. $\int \frac{x}{3x^2-6} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{8-3x^2}}$.
8. $\int e^{2-6x} dx$.
9. $\int \frac{\ln^3(x-7)}{x-7} dx$.
10. $\int \sqrt{\cos 7x} \sin 7x dx$.
11. $\int \frac{\lg^2 4x}{\cos^2 4x} dx$.
12. $\int \frac{\operatorname{arctg}^2 8x}{1+64x^2} dx$.
13. $\int e^{4-5x^2} x dx$.
14. $\int \frac{x-5}{\sqrt{4-9x^2}} dx$.

11-вариант

1. $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{x^3} + 4 \right) dx$.
2. $\int \frac{dx}{(2+x)^2}$.
3. $\int \frac{dx}{6+5x}$.
4. $\int \cos(5x-6) dx$.
5. $\int \frac{dx}{3x^2-2}$.
6. $\int \frac{x}{5x^2+1} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+8}}$.
8. $\int e^{3x+1} dx$.
9. $\int \frac{\sqrt{\ln(x+7)}}{x+7} dx$.
10. $\int \frac{\sin 5x dx}{\cos^4 5x}$.
11. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^3 x}}{\sin^2 x} dx$.
12. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg}^5 3x}}{1+9x^2} dx$.
13. $\int \frac{x dx}{e^{2x^2+1}}$.
14. $\int \frac{x-1}{7x^2+4} dx$.

12-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x-2x^3+6}}{x} dx$.
2. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{3+x}}$.
3. $\int \frac{dx}{6-3x}$.
4. $\int \cos(3x-7) dx$.
5. $\int \frac{dx}{4x^2+3}$.
6. $\int \frac{5x}{5x^2-3} dx$.
7. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}}$.
8. $\int e^{3x-4} dx$.
9. $\int \frac{\ln^3(x-5)}{x-5} dx$.

10. $\int \frac{\cos 5x}{\sqrt{\sin^3 5x}} dx$.
11. $\int \frac{dx}{\cos^3 x \sqrt{\operatorname{tg} 3x}}$.
12. $\int \frac{\sqrt[3]{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
13. $\int \frac{x dx}{e^{x^2+3}}$.
14. $\int \frac{1-2x}{5x^2-1} dx$.

13-вариант

1. $\int \frac{\sqrt[3]{x-2x^2+4}}{x^2} dx$.
2. $\int \frac{dx}{\sqrt{(3-x)^5}}$.
3. $\int \frac{dx}{5+4x}$.
4. $\int \cos(5x-8) dx$.
5. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+3}}$.
6. $\int \frac{x}{2x^3-7} dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2+7}$.
8. $\int e^{2-3x} dx$.
9. $\int \frac{dx}{(x+5) \ln^3(x+5)}$.
10. $\int \sin^3 5x \cos 5x dx$.
11. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^3 x}$.
12. $\int \frac{\arccos^3 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx$.
13. $\int \frac{x^2}{e^{x^3+1}} dx$.
14. $\int \frac{2x+1}{5x^3+1} dx$.

14-вариант

1. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{3x^2}{\sqrt{x}} + 2 \right) dx$.
2. $\int \sqrt[3]{1+3x} dx$.
3. $\int \frac{dx}{3-5x}$.
4. $\int \sin(3x+6) dx$.
5. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}}$.
6. $\int \frac{9x}{\sqrt{1-9x^2}} dx$.
7. $\int \frac{dx}{4x^2-3}$.
8. $\int e^{1-4x} dx$.
9. $\int \frac{dx}{(x+3) \ln^4(x+3)}$.
10. $\int \frac{\sin 4x dx}{\sqrt[3]{\cos^2 4x}}$.
11. $\int \frac{\operatorname{ctg}^5 2x}{\sin^2 2x} dx$.
12. $\int \frac{\operatorname{arctg}^3 2x}{1+4x^2} dx$.
13. $\int e^{\sin x} \cos x dx$.
14. $\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+4}} dx$.

15-вариант

1. $\int \left(\sqrt[3]{x} - \frac{4}{x^5} + 2 \right) dx$.
2. $\int \sqrt[4]{1+3x} dx$.
3. $\int \frac{dx}{5+3x}$.

4. $\int \sin(5-3x) dx$. 5. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-8x^2}}$. 6. $\int \frac{3x}{9x^2+2} dx$.
 7. $\int \frac{dx}{3x^2+1}$. 8. $\int e^{3-5x} dx$. 9. $\int \frac{\ln^4(3x+1)}{3x+1} dx$.
 10. $\int \sqrt{\cos^3 2x} \sin 2x dx$. 11. $\int \frac{\lg^3 4x}{\cos^2 4x} dx$. 12. $\int \frac{\sqrt[3]{\arccos^2 x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
 13. $\int e^{2x^3-1} x^2 dx$. 14. $\int \frac{3x-2}{2x^2+7} dx$.

16-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^6-2x^2+3}}{x} dx$. 2. $\int \sqrt{3-2x} dx$. 3. $\int \frac{dx}{3-2x}$.
 4. $\int \sin(5x-3) dx$. 5. $\int \frac{dx}{4x^2-3}$. 6. $\int \frac{5x}{\sqrt{7x^2-1}} dx$.
 7. $\int \frac{dx}{\sqrt{8x^2-9}}$. 8. $\int e^{4-3x} dx$. 9. $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{\ln(x+3)}}$.
 10. $\int \sqrt{\cos 2x} \cdot \sin 2x dx$. 11. $\int \frac{\sqrt[3]{\lg 5x}}{\cos^2 5x} dx$. 12. $\int \frac{\sqrt[3]{\arccos^2 3x}}{\sqrt{1-9x^2}} dx$.
 13. $\int \frac{\sin x}{e^{\cos x}} dx$. 14. $\int \frac{5+x}{3x^2+1} dx$.

17-вариант

1. $\int \left(\frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{2}{x^2} + 1 \right) dx$. 2. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2-5x}}$. 3. $\int \frac{dx}{5x-3}$.
 4. $\int \cos(3x+5) dx$. 5. $\int \frac{dx}{8x^2-9}$. 6. $\int \frac{3x}{\sqrt{9x^2+5}} dx$.
 7. $\int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}}$. 8. $\int e^{5-2x} dx$. 9. $\int \frac{\sqrt{\ln^7(x+4)}}{x+4} dx$.
 10. $\int \sin^3 4x \cos 4x dx$. 11. $\int \frac{\lg^3 2x}{\cos^2 2x} dx$. 12. $\int \frac{\operatorname{arctg}^3 3x}{1+9x^2} dx$.
 13. $\int \frac{x^2}{e^{x^3+1}} dx$. 14. $\int \frac{x-5}{8-4x^2} dx$.

18-вариант

1. $\int \left(\frac{2x^2}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{5}{x} + 6 \right) dx$. 2. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-4x)^2}}$. 3. $\int \frac{dx}{4-7x}$.
 4. $\int \cos(2+5x) dx$. 5. $\int \frac{dx}{4x^2+7}$. 6. $\int \frac{2x}{5x^2-3} dx$.
 7. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}}$. 8. $\int e^{6x-1} dx$. 9. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{\ln(x+1)}}$.
 10. $\int \frac{\cos 4x}{\sin^3 4x} dx$. 11. $\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^5 4x}}{\sin^3 x} dx$. 12. $\int \frac{\arccos^2 7x}{\sqrt{1-49x^2}} dx$.
 13. $\int \frac{x}{e^{x^2+2}} dx$. 14. $\int \frac{x+4}{7x^2+3} dx$.

19-вариант

1. $\int \left(\frac{\sqrt{x^2}}{x} - \frac{7}{x^2} + 5 \right) dx$. 2. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-4x)^2}}$. 3. $\int \frac{dx}{5-3x}$.
 4. $\int \cos(3-4x) dx$. 5. $\int \frac{2dx}{4+3x^2}$. 6. $\int \frac{x}{3x^2-2} dx$.
 7. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+5}}$. 8. $\int e^{4x+5} dx$. 9. $\int \frac{\sqrt{\ln^3(x+1)}}{x+1} dx$.
 10. $\int \frac{\sin 5x}{\sqrt{\cos 5x}} dx$. 11. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x}}{\sin^2 x} dx$. 12. $\int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^2 x}}{1+x^2} dx$.
 13. $\int \frac{x}{e^{2x^2+1}} dx$. 14. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{2x^2-1}} dx$.

20-вариант

1. $\int \left(\frac{5x^2}{\sqrt{x}} - \sqrt{x^2} + 2 \right) dx$. 2. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{5+3x}}$. 3. $\int \frac{dx}{4x-2}$.
 4. $\int \cos(4x+3) dx$. 5. $\int \frac{2dx}{3x^2-2}$. 6. $\int \frac{7x}{7x^2+1} dx$.

$$7. \int \frac{dx}{3x^2-2}, \quad 8. \int e^{4x+3} dx, \quad 9. \int \frac{\sqrt{\ln^2(x+1)}}{x+1} dx.$$

$$10. \int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx, \quad 11. \int \frac{\lg^2 3x}{\cos^2 3x} dx, \quad 12. \int \frac{\operatorname{arccotg}^4 8x}{1+64x^2} dx.$$

$$13. \int e^{4-5x^2} x dx, \quad 14. \int \frac{x-5}{\sqrt{4-9x^2}} dx.$$

21-вариант

$$1. \int \frac{2x^2+3\sqrt{x}-1}{2x} dx, \quad 2. \int \sqrt[3]{1+x} dx, \quad 3. \int \frac{dx}{2+3x},$$

$$4. \int \cos(3-4x) dx, \quad 5. \int \frac{dx}{4x^2+3}, \quad 6. \int \frac{x}{\sqrt{5-4x^2}} dx,$$

$$7. \int \frac{dx}{4x^2-5}, \quad 8. \int e^{2+4x} dx, \quad 9. \int \frac{\sqrt{\ln^2(1-x)}}{x-1} dx,$$

$$10. \int \frac{\cos 3x}{\sin^3 3x} dx, \quad 11. \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{\lg^3 x}}, \quad 12. \int \frac{\sqrt{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

$$13. \int \frac{x}{e^{3x^2-3}} dx, \quad 14. \int \frac{1-2x}{5x^2-1} dx.$$

22-вариант

$$1. \int \frac{\sqrt{4x+5}}{2x^2} dx, \quad 2. \int \sqrt[3]{(1+x)^2} dx, \quad 3. \int \frac{dx}{4-5x},$$

$$4. \int \sin(6-7x) dx, \quad 5. \int \frac{dx}{9x^2+3}, \quad 6. \int \frac{3x}{4x^2+1} dx,$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{7x^2-3}}, \quad 8. \int e^{3-5x} dx, \quad 9. \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{\ln^2(1-x)}},$$

$$10. \int \frac{\sin 3x}{\cos^4 3x} dx, \quad 11. \int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^4 x}, \quad 12. \int \frac{\arccos^2 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx,$$

$$13. \int e^{\sin x} \cos x dx, \quad 14. \int \frac{3x+1}{5x^2+1} dx.$$

23-вариант

$$1. \int \frac{2\sqrt{x}-x^2+3}{\sqrt{x}} dx, \quad 2. \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x}}, \quad 3. \int \frac{dx}{1-5x},$$

$$4. \int \cos(3-4x) dx, \quad 5. \int \frac{9dx}{\sqrt{9x^2-3}}, \quad 6. \int \frac{4x}{\sqrt{3-4x^2}} dx,$$

$$7. \int \frac{dx}{5x^2+2}, \quad 8. \int e^{2x+1} dx, \quad 9. \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{\ln^3(1-x)}},$$

$$10. \int \frac{\sin 2x}{\sqrt[3]{\cos 2x}} dx, \quad 11. \int \frac{\operatorname{ctg}^5 2x}{\sin^2 2x} dx, \quad 12. \int \frac{\operatorname{arctg}^2 2x}{1+4x^2} dx,$$

$$13. \int e^{\cos x} \sin x dx, \quad 14. \int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+4}} dx.$$

24-вариант

$$1. \int \frac{\sqrt{x-2x^2+5}}{x^2} dx, \quad 2. \int \frac{dx}{\sqrt{(1-2x)^3}}, \quad 3. \int \frac{dx}{3+5x},$$

$$4. \int \cos(3+5x) dx, \quad 5. \int \frac{dx}{\sqrt{3-9x^2}}, \quad 6. \int \frac{2x}{\sqrt{8x^2-9}} dx,$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2+5}, \quad 8. \int e^{7x-2} dx, \quad 9. \int \frac{\ln^3(1-x)}{1-x} dx,$$

$$10. \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx, \quad 11. \int \frac{\lg^3 4x}{\cos^3 4x} dx, \quad 12. \int \frac{\sqrt{\arccos^2 x}}{\sqrt{1+x^2}} dx,$$

$$13. \int e^{2x^3-1} x^2 dx, \quad 14. \int \frac{3x-2}{2x^2+9} dx.$$

25-вариант

$$1. \int \frac{4x^3-\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}} dx, \quad 2. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2+x}}, \quad 3. \int \frac{dx}{2-3x},$$

$$4. \int \sin(4-7x) dx, \quad 5. \int \frac{dx}{7x^2-4}, \quad 6. \int \frac{4x}{\sqrt{4x^2+3}} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{7x^2+1}} \quad 8. \int e^{3x-5} dx \quad 9. \int \frac{\sqrt{\ln(2x-1)}}{2x-1} dx$$

$$10. \int \sin^7 2x \cos 2x dx \quad 11. \int \frac{\sqrt{1-5x}}{\cos^2 5x} dx \quad 12. \int \frac{dx}{(1+x^2) \arctg x}$$

$$13. \int \frac{\sin x}{e^{\cos x}} dx \quad 14. \int \frac{5-x}{3x^2+1} dx$$

10-§. Иккинчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда 10 та мисол бўлиб, уларда берилган интегралларни ҳисоблаш керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

Аниқмас интегралларни топинг:

$$1. \int \frac{3-7x}{4x^2+5} dx$$

Ечиш.

$$\int \frac{3-7x}{4x^2+5} dx = 3 \int \frac{dx}{(2x)^2+(\sqrt{5})^2} - 7 \int \frac{x dx}{4x^2+5} = \frac{3}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2+(\sqrt{5})^2} - \frac{7}{8} \int \frac{d(4x^2+5)}{4x^2+5} =$$

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \arctg \frac{2x}{\sqrt{5}} - \frac{7}{8} \ln(4x^2+5) + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{e^{3x}(2-e^{-3x})}$$

Ечиш.

$$\int \frac{dx}{e^{3x}(2-e^{-3x})} \left| t = 2 - e^{-3x} \right. \\ \left. dt = 3e^{-3x} dx \quad \frac{dt}{3} = \frac{dx}{e^{3x}} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} \ln |t| + C = \frac{1}{3} \ln |2 - e^{-3x}| + C.$$

$$3. \int \frac{3x^5-4x}{x^2+1} dx$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция нотўғри каср бўлгани учун, унинг суратини махражига бўлиб, касрнинг

бутун қисми ва каср қисмини топамиз. Натижада алгебраик йиғиндининг интегралига эга бўламиз:

$$\begin{array}{r|l} 3x^5-4x & x^2+1 \\ \hline 3x^5+3x^3 & 3x^3-3x \\ \hline -3x^3-4x & \\ -3x^3-3x & \\ \hline -x & \end{array}$$

$$\int \frac{3x^5-4x}{x^2+1} dx = \int \left(3x^3 - 3x - \frac{x}{x^2+1} \right) dx =$$

$$= \frac{3}{4} x^4 - \frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C.$$

$$4. \int \cos^3(7x+2) dx$$

Ечиш.

$\cos^2(7x+2) = 1 - \sin^2(7x+2)$ тригонометрик айниятдан фойдаланамиз:

$$\int \cos^3(7x+2) dx = \int \cos^2(7x+2) \cos(7x+2) dx =$$

$$= \frac{1}{7} \int (1 - \sin^2(7x+2)) d(\sin(7x+2)) =$$

$$= \frac{1}{7} \int d(\sin(7x+2)) - \frac{1}{7} \int \sin^2(7x+2) d(\sin(7x+2)) =$$

$$= \frac{1}{7} \sin(7x+2) - \frac{1}{21} \sin^3(7x+2) + C.$$

$$5. \int \operatorname{ctg}^4 5x dx$$

Ечиш.

$\operatorname{ctg}^2 5x = \frac{1}{\sin^2 5x} - 1$ бўлгани учун берилган интегрални қуйидаги қўринишда ёзиб оламиз.

$$\int \operatorname{ctg}^4 5x dx = \int \operatorname{ctg}^2 5x \left(\frac{1}{\sin^2 5x} - 1 \right) dx =$$

$$= \int \operatorname{ctg}^2 5x \cdot \frac{1}{\sin^2 5x} dx - \int \operatorname{ctg}^2 5x dx =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{5} \int \operatorname{ctg}^2 5x \left(-\frac{5}{\sin^2 5x} \right) dx - \int \left(\frac{1}{\sin^2 5x} - 1 \right) dx = \\
&= -\frac{1}{5} \int \operatorname{ctg}^2 5x d(\operatorname{ctg} 5x) - \frac{1}{5} \int \frac{5dx}{\sin^2 5x} + \int dx = \\
&= -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 5x + \frac{1}{5} \operatorname{ctg} 5x + x + C = \\
&= -\frac{1}{15} \operatorname{ctg}^3 5x + \frac{1}{5} \operatorname{ctg} 5x + x + C.
\end{aligned}$$

6. $\int \sin \frac{7}{2} x \sin \frac{3}{2} x dx$.

Ечиш.

$$\begin{aligned}
\int \sin \frac{7}{2} x \sin \frac{3}{2} x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 2x - \cos 5x) dx = \\
&= \frac{1}{2} \int \cos 2x dx - \frac{1}{2} \int \cos 5x dx = \\
&= \frac{1}{4} \int \cos 2x d(2x) - \frac{1}{10} \int \cos 5x d(5x) = \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{10} \sin 5x + C.
\end{aligned}$$

7. $\int \frac{dx}{6x^2 - 3x + 2}$.

Ечиш. Интеграл остидаги функциянинг махражидан тулиқ квадрат ажратамиз ва интеграллаймиз:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{6x^2 - 3x + 2} &= \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{3} - \frac{1}{16}} = \\
&= \frac{1}{16} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{13}}{4\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{4\sqrt{13}}{6\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{13}}{4\sqrt{3}}} + C = \\
&= \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{13}} \operatorname{arctg} \frac{(4x-1)\sqrt{3}}{\sqrt{13}} + C.
\end{aligned}$$

8. $\int \frac{3x-6}{2-5x-x^2} dx$.

Ечиш. Интеграл остидаги функциянинг суратидан махражининг ҳосиласини ажратиб оламиз:

$$\begin{aligned}
\int \frac{3x-6}{2-5x-x^2} dx &= -\frac{3}{2} \int \frac{-2x+4-5+5}{2-5x-x^2} dx = \\
&= -\frac{3}{2} \int \frac{-2x-5}{2-5x-x^2} dx - \frac{3}{2} \cdot 9 \int \frac{dx}{2-5x-x^2} = \\
&= -\frac{3}{2} \int \frac{d(2-5x-x^2)}{2-5x-x^2} + \frac{27}{2} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{33}}{2}\right)^2} = \\
&= -\frac{3}{2} \ln |2-5x-x^2| + \frac{27}{2\sqrt{33}} \ln \left| \frac{x - \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2}}{x - \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{33}}{2}} \right| + C = \\
&= -\frac{3}{2} \ln |2-5x-x^2| + \frac{9\sqrt{3}}{2\sqrt{11}} \ln \left| \frac{2x-5-\sqrt{33}}{2x-5+\sqrt{33}} \right| + C.
\end{aligned}$$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2+2x-7}}$.

Ечиш. Интеграл остидаги функциянинг махражидан тулиқ квадрат ажратамиз:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2+2x-7}} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{7}{5}}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{7}{5} - \frac{1}{25}}} = \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| x + \frac{1}{5} + \sqrt{x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{7}{5}} \right| + C.
\end{aligned}$$

10. $\int \frac{2x-7}{\sqrt{1-4x-3x^2}} dx$.

Ечиш. Берилган интегрални шундай иккита интеграл йиғиндиси кўринишида ёзиб оламизки, бунда интеграллар-

дан бирининг суратида илдиз остидаги ифоданинг ҳосиласи турган бўлсин:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-7}{\sqrt{1-4x-3x^2}} dx &= -\frac{1}{3} \int \frac{-6x+21-4+4}{\sqrt{1-4x-3x^2}} dx = \\ &= -\frac{1}{3} \int \frac{-6x-4}{\sqrt{1-4x-3x^2}} dx - \frac{25}{3\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{3}-\frac{4}{3}x-x^2}} = \\ &= -\frac{1}{3} \int \frac{d(1-4x-3x^2)}{\sqrt{1-4x-3x^2}} - \frac{25}{3\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^2 - \left(x+\frac{2}{3}\right)^2}} = \\ &= -\frac{2}{3} \int \frac{1-4x-3x^2}{\sqrt{1-4x-3x^2}} - \frac{25}{3\sqrt{3}} \arcsin \frac{x+\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{7}}{3}} + C = \\ &= -\frac{2}{3} \sqrt{1-4x-3x^2} - \frac{25}{3\sqrt{3}} \arcsin \frac{3x+2}{\sqrt{7}} + C. \end{aligned}$$

1-вариант

1. $\int \frac{2-3x}{x^2+2} dx$.
2. $\int \frac{\sin x}{1+3\cos 2x} dx$.
3. $\int \frac{1-2x-x^2}{1+x^2} dx$.
4. $\int \sin^2(1-x) dx$.
5. $\int \lg^2 x dx$.
6. $\int \sin 3x \cos x dx$.
7. $\int \frac{dx}{4x^2-5x+4}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{4+8x-x^2}}$.
9. $\int \frac{x+1}{2x^2+3x-4} dx$.
10. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-3x-16}} dx$.

2-вариант

1. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-4}} dx$.
2. $\int \frac{3x^2}{1-x^2} dx$.
3. $\int \frac{2x^2+3}{2x^2-1} dx$.
4. $\int \sin^3(1-x) dx$.
5. $\int \lg^5 4x dx$.
6. $\int \sin^5 2x \cos 2x dx$.

7. $\int \frac{dx}{3x^2+5x+1}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-4x-1}}$.
9. $\int \frac{x+6}{3x^2+x+1} dx$.
10. $\int \frac{x-3}{\sqrt{2x^2-4x-1}} dx$.

3-вариант

1. $\int \frac{8-13x}{\sqrt{x^2-1}} dx$.
2. $\int \frac{\sin 3x}{3-\cos 3x} dx$.
3. $\int \frac{x^2+2}{x^2-1} dx$.
4. $\int \left(1-2\sin \frac{x}{5}\right)^2 dx$.
5. $\int \lg^4 3x dx$.
6. $\int \sin^2 3x \cos 3x dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2-7x+1}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x-2x^2}}$.
9. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-2x+8}} dx$.
10. $\int \frac{x-1}{\sqrt{3x^2-x+5}} dx$.

4-вариант

1. $\int \frac{6x+1}{2x^2-1} dx$.
2. $\int \frac{e^x}{2e^x+3} dx$.
3. $\int \frac{8x^3-1}{2x+1} dx$.
4. $\int \cos^3 5x \sin 5x dx$.
5. $\int \lg^2 7x dx$.
6. $\int \cos^3 5x \sin 5x dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2+x-6}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+8}}$.
9. $\int \frac{xdx}{2x^2+x+5}$.
10. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{1+x-3x^2}} dx$.

5-вариант

1. $\int \frac{x-2}{\sqrt{2-x^2}} dx$.
2. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^3 x-4} dx$.
3. $\int \frac{x^3-2}{x^2-4} dx$.
4. $\int \cos^3(1-x) dx$.
5. $\int \lg^5 x dx$.
6. $\int \sin \frac{x}{4} \cos x \frac{x}{4} dx$.
7. $\int \frac{dx}{5x^2+2x+7}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{2+8x-2x^2}}$.
9. $\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx$.
10. $\int \frac{2x+5}{\sqrt{4x^2+8x+9}} dx$.

6-вариант

1. $\int \frac{3-7x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$.
2. $\int \frac{e^x}{4-3e^x} dx$.
3. $\int \frac{2x^4-3}{x^2+1} dx$.
4. $\int (3 - \sin 2x)^2 dx$.
5. $\int x \lg^2 x^2 dx$.
6. $\int \cos x \cdot \sin 9x dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2-2x+1}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-2x^2}}$.
9. $\int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2} dx$.
10. $\int \frac{2x-10}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$.

7-вариант

1. $\int \frac{5-3x}{\sqrt{2x^2+1}} dx$.
2. $\int \frac{x^2}{7-5x^3} dx$.
3. $\int \frac{x^3-1}{2x+1} dx$.
4. $\int \sin^2 \frac{3x}{2} dx$.
5. $\int \operatorname{ctg}^3 x dx$.
6. $\int \sin^4 2x \cos 2x dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2-11x+2}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-2x-3x^2}}$.
9. $\int \frac{x+4}{2x^2-6x-8} dx$.
10. $\int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x+x^2}} dx$.

8-вариант

1. $\int \frac{1+x}{\sqrt{2-x^2}} dx$.
2. $\int \frac{\sin 2x}{3\sin^2 x+4} dx$.
3. $\int \frac{x^3}{1-x^2} dx$.
4. $\int (\cos x + 3)^2 dx$.
5. $\int \lg^2 \frac{x}{2} dx$.
6. $\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2+x+2}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$.
9. $\int \frac{x+4}{2x^2-7x+1} dx$.
10. $\int \frac{2x-13}{\sqrt{x^2+6x+13}} dx$.

9-вариант

1. $\int \frac{3x+2}{2x^2+1} dx$.
2. $\int \frac{e^{2x}}{5+e^{2x}} dx$.
3. $\int \frac{x^2}{x^2+3} dx$.

4. $\int \cos^3(x+3) dx$.
5. $\int \lg^3 \frac{x}{2} dx$.
6. $\int \cos^5 x \sin x dx$.
7. $\int \frac{dx}{3x^2-12x+3}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{5x^2-10x+4}}$.
9. $\int \frac{5x-2}{2x^2-5x+3} dx$.
10. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{2x^2-5x+1}} dx$.

10-вариант

1. $\int \frac{1-5x}{1+25x^2} dx$.
2. $\int \frac{4x^3}{7+2x^4} dx$.
3. $\int \frac{6x^3+x^2-2x+1}{2x-1} dx$.
4. $\int \sin^3 \frac{4x}{5} dx$.
5. $\int \lg^2 4x dx$.
6. $\int \cos 2x \cos 3x dx$.
7. $\int \frac{dx}{2x^2+3x}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x+3-x^2}}$.
9. $\int \frac{4x-1}{4x^2-4x+5} dx$.
10. $\int \frac{5x+2}{\sqrt{x^2+3x-4}} dx$.

11-вариант

1. $\int \frac{4x-3}{3x^2-4} dx$.
2. $\int \frac{4x-5}{2x^2-5x+17} dx$.
3. $\int \frac{x^4}{x^2-3} dx$.
4. $\int (1 - \cos x)^2 dx$.
5. $\int \operatorname{ctg}^3 x dx$.
6. $\int \sin 5x \sin 7x dx$.
7. $\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$.
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-8x+3}}$.
9. $\int \frac{x+1}{2x^2+x+1} dx$.
10. $\int \frac{x-4}{\sqrt{2x^2-x+7}} dx$.

12-вариант

1. $\int \frac{5x+1}{\sqrt{x^2-6}} dx$.
2. $\int \frac{7x^3}{2x^4+5} dx$.
3. $\int \frac{x^3+5x}{x^2+1} dx$.
4. $\int \sin^2(2x-1) dx$.
5. $\int \operatorname{ctg}^2 5x dx$.
6. $\int \sin 4x \cos 2x dx$.

$$7. \int \frac{dx}{2x-3-4x^2} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{1+2x-x^2}} \quad 9. \int \frac{x+1}{3x^2-2x+3} dx$$

$$10. \int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}} dx$$

13-вариант

$$1. \int \frac{x-3}{9x^2+7} dx \quad 2. \int \frac{\cos 3x}{\sqrt{\sin 3x-2}} dx \quad 3. \int \frac{x^2-5x+6}{x^2-4} dx$$

$$4. \int \sin^3 6x dx \quad 5. \int \operatorname{tg}^3 \frac{x}{3} dx \quad 6. \int \cos^3 4x \sin 4x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{3x^2-8x-3} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-x+4}} \quad 9. \int \frac{4x+8}{4x^2+6x-13} dx$$

$$10. \int \frac{4x+1}{\sqrt{2+x-x^2}} dx$$

14-вариант

$$1. \int \frac{5-3x}{\sqrt{4-3x^2}} dx \quad 2. \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx \quad 3. \int \frac{x^3-1}{x+3} dx$$

$$4. \int \sin^2 0.5x dx \quad 5. \int (1-\operatorname{tg} 2x)^2 dx \quad 6. \int \cos^3 2x \sin 2x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{8-2x-x^2} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{2+4x-3x^2}} \quad 9. \int \frac{5x+1}{x^3-4x+1} dx$$

$$10. \int \frac{5x-3}{\sqrt{2x^2+4x-5}} dx$$

15-вариант

$$1. \int \frac{4-2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx \quad 2. \int \frac{\sin x}{1+3\cos x} dx \quad 3. \int \frac{x^3}{x^2-1} dx$$

$$4. \int \sin^2 \left(\frac{x}{6} + 1 \right) dx \quad 5. \int \operatorname{tg}^5 2x dx \quad 6. \int \cos x \sin 9x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{5x-x^2-6} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+2x+4}} \quad 9. \int \frac{xdx}{2x^2+2x+5} dx$$

$$10. \int \frac{3x+2}{\sqrt{4+2x-x^2}} dx$$

16-вариант

$$1. \int \frac{5-x}{2+x^2} dx \quad 2. \int \frac{\sin 2x}{4-\sin^2 x} dx \quad 3. \int \frac{x^4+1}{x^2+1} dx$$

$$4. \int \cos^2 2x dx \quad 5. \int (2x + \operatorname{tg}^2 7x) dx \quad 6. \int \sin 4x \cos 2x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{x^3+4x+25} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{3x+2-2x^2}} \quad 9. \int \frac{x-3}{x^2-5x+4} dx$$

$$10. \int \frac{x-7}{\sqrt{3x^2-2x+1}} dx$$

17-вариант

$$1. \int \frac{1+3x}{\sqrt{1+4x^2}} dx \quad 2. \int \frac{e^{3x}}{e^{3x}-5} dx \quad 3. \int \frac{x^4-2x^2-1}{x^2+1} dx$$

$$4. \int \left(1 + 2 \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx \quad 5. \int \operatorname{tg}^4 \frac{2x}{3} dx \quad 6. \int \sin 3x \cos 2x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2-8x+30} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-8x+1}} \quad 9. \int \frac{2x-1}{2x^2+8x-6} dx$$

$$10. \int \frac{x+5}{\sqrt{3-6x-x^2}} dx$$

18-вариант

$$1. \int \frac{5-4x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad 2. \int \frac{x^2}{7+3x^3} dx \quad 3. \int \frac{x^4+2}{x^2-4} dx$$

$$4. \int \cos^2 3x dx \quad 5. \int (\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} 2x)^2 dx \quad 6. \int \sin^3 7x \cos 7x dx$$

$$7. \int \frac{dx}{3x^2-9x+6} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-5x+6}} \quad 9. \int \frac{2-x}{4x^2+16x-12} dx.$$

$$10. \int \frac{2x+4}{\sqrt{3x^2+x-5}} dx.$$

19-вариант

$$1. \int \frac{5x-1}{\sqrt{x^2-3}} dx. \quad 2. \int \frac{3x+2}{x^2+2x} dx. \quad 3. \int \frac{x^3-3}{x+5} dx.$$

$$4. \int \sin^4 2x dx. \quad 5. \int (1-\operatorname{ctg} x)^2 dx. \quad 6. \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2-2x+5}. \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{3x-2x^2}}. \quad 9. \int \frac{2x-1}{3x^2-6x-9} dx.$$

$$10. \int \frac{7x-2}{\sqrt{x^2-5x+1}} dx.$$

20-вариант

$$1. \int \frac{1-3x}{4x^3-1} dx. \quad 2. \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx. \quad 3. \int \frac{x^3+1}{x^2+1} dx.$$

$$4. \int \sin^2 3x dx. \quad 5. \int \operatorname{ctg}^3 3x dx. \quad 6. \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 2x} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2-3x-2}. \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-x+3}}. \quad 9. \int \frac{2x-1}{3+x-2x^2} dx.$$

$$10. \int \frac{x-8}{\sqrt{4x^2+x-5}} dx.$$

21-вариант

$$1. \int \frac{x-5}{3-2x^2} dx. \quad 2. \int \frac{3x^2-2}{\sqrt{2x^3-4x}} dx. \quad 3. \int \frac{2x^2+5}{x+1} dx.$$

$$4. \int \cos^2 \frac{2x}{5} dx. \quad 5. \int \operatorname{tg}^3 4x dx. \quad 6. \int \cos 2x \cos 5x dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{5x^2-10x+25} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-x+5}} \quad 9. \int \frac{x-3}{4x^2+2x-3} dx.$$

$$10. \int \frac{2x+3}{\sqrt{2x^2-x+6}} dx.$$

22-вариант

$$1. \int \frac{x+4}{\sqrt{9-x^2}} dx. \quad 2. \int \frac{\cos 7x}{\sqrt{5-\sin 7x}} dx. \quad 3. \int \frac{x^3+3x+1}{x^2+2} dx.$$

$$4. \int \sin^3 5x dx. \quad 5. \int \operatorname{tg}^4 \frac{x}{2} dx. \quad 6. \int \frac{\cos x}{\sin^4 x} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2+6x+3}. \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{5-7x-3x^2}}. \quad 9. \int \frac{x+2}{3x^3-x+5} dx.$$

$$10. \int \frac{x-9}{\sqrt{4+2x-x^2}} dx.$$

23-вариант

$$1. \int \frac{2x-7}{x^2-5} dx. \quad 2. \int \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos 4x+3}} dx. \quad 3. \int \frac{x^2+x}{2-x} dx.$$

$$4. \int \sin^4 x dx. \quad 5. \int \operatorname{tg}^4(x+6) dx. \quad 6. \int \sin 2x \sin 3x dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{x^2+7x+11}. \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x-x^2}}. \quad 9. \int \frac{x-5}{2x^2+x-4} dx.$$

$$10. \int \frac{2x+7}{\sqrt{x^2+5x-4}} dx.$$

24-вариант

$$1. \int \frac{7x-2}{\sqrt{x^2-1}} dx. \quad 2. \int \frac{12x^2+5x^4}{4x^3+x^5} dx. \quad 3. \int \frac{2x+5}{x-7} dx.$$

$$4. \int \cos^4 x dx. \quad 5. \int \operatorname{tg}^3(x-5) dx. \quad 6. \int \sin x \cos^3 x dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2-3x+1} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}} \quad 9. \int \frac{2x+3}{3x^2+2x-7} dx.$$

$$10. \int \frac{3x-4}{\sqrt{2x^2-6x+1}} dx.$$

25-вариант

$$1. \int \frac{x-5}{x^2-7} dx \quad 2. \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{6-\cos^2 x}} dx \quad 3. \int \frac{2x^3+3}{x-1} dx.$$

$$4. \int \cos^3 4x dx \quad 5. \int \lg^2(4x+1) dx \quad 6. \int \sin x \cos 4x dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2x^2-3x+2} \quad 8. \int \frac{dx}{\sqrt{4-3x-x^2}} \quad 9. \int \frac{3x+1}{x^2-4x-2} dx.$$

$$10. \int \frac{2x+5}{\sqrt{3x^2+9x-4}} dx.$$

11-§. Учинчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй иши вариантларининг ҳар бирида 8 та мисол бўлиб, уларни бажаришда қуйидагиларга эътибор бериш керак.

1-мисолда: берилган интегрални тригонометрик алмаштиришлар ёрдамида топиш керак;

2-мисолда: берилган интегрални ўзгарувчини алмаштириш ёрдамида топиш керак;

3-8-мисолларда: берилган интегралларни бўлаклаб интеграллаш формуласи ёрдамида топиш керак.

Қуйида вариант мисолларни ечиш намунасини келтирамыз

Аниқмас интегралларни ҳисобланг.

$$1. \int x^2 \sqrt{16-x^2} dx.$$

Е ч и ш .

$$\int x^2 \sqrt{16-x^2} dx \left| \begin{array}{l} x = 4 \sin t, \quad dx = 4 \cos t dt \\ \sin t = \frac{x}{4}, \quad t = \arcsin \frac{x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= \int 16 \sin^2 t \cdot \sqrt{16-16 \sin^2 t} \cdot 4 \cos t dt = 256 \int \sin^2 t \cos^2 t dt =$$

$$= 64 \int \sin^2 2t dt = 32 \int (1 - \cos 4t) dt = 32t - 8 \sin 4t + C =$$

$$= 32 \arcsin \frac{x}{4} - 8 \sin 4 \left(\arcsin \frac{x}{4} \right) + C =$$

$$= 32 \arcsin \frac{x}{4} - \frac{x}{4} (8-x^2) \sqrt{16-x^2} + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2+5x+1}}.$$

Е ч и ш .

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2+5x+1}} \left| \begin{array}{l} x = \frac{1}{t}, \quad t = \frac{1}{x} \\ dx = -\frac{1}{t^2} dt \end{array} \right| = - \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{5}{t} + 1}} =$$

$$= - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+5t+1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{\left(t+\frac{5}{2}\right)^2 - \frac{21}{4}}} =$$

$$= - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{5}{2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{5}{x} + 1} \right| + C = C - \ln \left| \frac{1}{x} + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{x^2+5x+1}}{x} \right|.$$

$$3. \int (x+2) \sin 4x dx :$$

Е ч и ш .

$$\int (x+2) \sin 4x dx \left| \begin{array}{l} u = x+2, \quad du = dx \\ dv = \sin 4x dx, \quad v = -\frac{1}{4} \cos 4x \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{4} (x+2) \cos 4x + \frac{1}{4} \int \cos 4x dx =$$

$$= -\frac{1}{4} (x+2) \cos 4x + \frac{1}{16} \sin 4x + C.$$

4. $\int \arccos 5x dx$.

Е ч и ш .

$$\int \arccos 5x dx \left| \begin{array}{l} u = \arccos 5x, \quad du = -\frac{5dx}{\sqrt{1-25x^2}} \\ dv = dx, \quad v = -x \end{array} \right| =$$

$$= -x \arccos 5x + 5 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-25x^2}} = -x \arccos 5x - \frac{1}{10} \int \frac{-50x dx}{\sqrt{1-25x^2}} =$$

$$= -x \arccos 5x - \frac{1}{5} \sqrt{1-25x^2} + C.$$

5. $\int x e^{x+3} dx$.

Е ч и ш .

$$\int x e^{x+3} dx \left| \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx \\ dv = e^{x+3} dx, \quad v = e^{x+3} \end{array} \right| =$$

$$= x e^{x+3} - \int e^{x+3} dx = x e^{x+3} - e^{x+3} + C.$$

6. $\int \frac{x \arctg x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

Е ч и ш .

$$\int \frac{x \arctg x}{\sqrt{1+x^2}} dx \left| \begin{array}{l} u = \arctg x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2} \\ dv = \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}}, \quad v = \sqrt{1+x^2} \end{array} \right| = \sqrt{1+x^2} \arctg x -$$

$$- \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2} \arctg x - \ln |x + \sqrt{1+x^2}| + C.$$

7. $\int (x^2 - 4x + 3) e^{-2x} dx$.

Е ч и ш .

$$\int (x^2 - 4x + 3) e^{-2x} dx \left| \begin{array}{l} u = x^2 - 4x + 3, \quad du = (2x - 4) dx \\ dv = e^{-2x} dx, \quad v = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 - 4x + 3) e^{-2x} + \int (x - 2) e^{-2x} dx.$$

$$\left| \begin{array}{l} u = x - 2, \quad du = dx \\ dv = e^{-2x} dx, \quad v = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 - 4x + 3) e^{-2x} - \frac{1}{2} (x - 2) e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx =$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 - 4x + 3) e^{-2x} - \frac{1}{2} (x - 2) e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C.$$

8. $\int \frac{\ln(\ln(x+2)) \ln(x+2)}{x+2} dx$.

Е ч и ш .

$$\int \frac{\ln(\ln(x+2)) \ln(x+2)}{x+2} dx \left| \begin{array}{l} u = \ln(\ln(x+2)), \quad du = \frac{dx}{(x+2) \ln(x+2)} \\ dv = \frac{\ln(x+2)}{x+2} dx, \quad v = \frac{1}{2} \ln^2(x+1) \end{array} \right| =$$

$$= \frac{\ln^2(x+2)}{2} \cdot \ln(\ln(x+2)) - \frac{1}{2} \int \frac{\ln(x+2)}{x+2} dx =$$

$$= \frac{\ln^3(x+2)}{2} \cdot \ln(\ln(x+2)) - \frac{1}{4} \ln^2(x+2) + C.$$

1-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^5} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x-x^2}}$. 3. $\int \ln(x+4) dx$.

4. $\int \frac{x \arccos 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$. 5. $\int x^2 e^{-x} dx$. 6. $\int (x-5) \cos x dx$.

7. $\int x \arctg x dx$. 8. $\int x \cos(x-7) dx$.

2-вариант

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x-2}}$. 3. $\int \frac{x \ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4. $\int \arccos 2x dx$. 5. $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx$. 6. $\int (x+5) \sin x dx$.
7. $\int x^2 e^{3x} dx$. 8. $\int x \sin(x-3) dx$.

3-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-x+1}}$. 3. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx$.
4. $\int \arctg x dx$. 5. $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$. 6. $\int (x+9) \sin x dx$.
7. $\int x \cos(x+4) dx$. 8. $\int (x-4)e^x dx$.

4-вариант

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2-1)^3}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-x-1}}$. 3. $\int x^2 \ln(x+1) dx$.
4. $\int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$. 5. $\int x \lg^2 x dx$. 6. $\int (x+7) \sin 2x dx$.
7. $\int x \cos(x+3) dx$. 8. $\int x e^{-6x} dx$.

5-вариант

1. $\int x^3 \sqrt{9-x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$. 3. $\int \frac{\ln x \ln(\ln x)}{x} dx$.
4. $\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$. 5. $\int (x^2+2)e^{-x} dx$. 6. $\int (x+4) \sin 3x dx$.
7. $\int x \cos(x-2) dx$. 8. $\int \arctg 7x dx$.

6-вариант

1. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(x^2-1)^3}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}$. 3. $\int \ln(x^2+1) dx$.

4. $\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} dx$. 5. $\int x^2 \sin^2 x dx$. 6. $\int (x+3) \sin 5x dx$.
7. $\int x e^{x+2} dx$. 8. $\int \arcsin 5x dx$.

7-вариант

1. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}}$. 3. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$.
4. $\int \arctg 2x dx$. 5. $\int x^2 (\cos 2x+3) dx$. 6. $\int (x-4) \cos 2x dx$.
7. $\int x e^{-7x} dx$. 8. $\int \ln(x-7) dx$.

8-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x+1}}$. 3. $\int \sqrt{x} \ln^2 x dx$.
4. $\int \frac{x \arctg x}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$. 5. $\int (x^2+2)e^{-x} dx$. 6. $\int (x-8) \sin x dx$.
7. $\int \arcsin 2x dx$. 8. $\int x \cos(x+6) dx$.

9-вариант

1. $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2-1}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-x+1}}$. 3. $\int \ln \frac{1-x}{1+x} dx$.
4. $\int \arcsin 2x dx$. 5. $\int (x^3+3) \sin x dx$. 6. $\int (x+4) \cos 3x dx$.
7. $\int x \sin(x+7) dx$. 8. $\int \arctg \frac{x}{2} dx$.

10-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^4} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x-1}}$. 3. $\int (x^2-x+1) \ln x dx$.

4. $\int \frac{x \arcsin 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$. 5. $\int (x^2 - 3) \cos x dx$. 6. $\int (x + 8) \sin 3x dx$.
7. $\int x \cos(x - 4) dx$. 8. $\int \ln(x + 8) dx$.

11-вариант

1. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 9}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x - 1}}$. 3. $\int \sqrt{x} \ln x dx$.
4. $\int \frac{\arccos x}{\sqrt{1+x}} dx$. 5. $\int (x^2 + 1)e^{-x} dx$. 6. $\int (x + 6) \cos 4x dx$.
7. $\int x \sin(x + 4) dx$. 8. $\int \arctg \frac{x}{5} dx$.

12-вариант

1. $\int x^2 \sqrt{1 - x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1+x-x^2}}$. 3. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x} dx$.
4. $\int x^2 \arctg x dx$. 5. $\int (x^2 - 1)e^x dx$. 6. $\int (x - 6) \sin \frac{x}{2} dx$.
7. $\int x \cos(x + 9) dx$. 8. $\int \ln(x + 12) dx$.

13-вариант

1. $\int x^3 \sqrt{1 - x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x-x^2}}$. 3. $\int x \ln(x^2 + 1) dx$.
4. $\int x \arctg 2x dx$. 5. $\int x^2 \cos^2 x dx$. 6. $\int (x + 1) \cos 7x dx$.
7. $\int (x + 3)e^{-x} dx$. 8. $\int \arcsin \frac{x}{3} dx$.

14-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^4} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1-x-x^2}}$. 3. $\int x \ln^2 x dx$.
4. $\int \arctg(x + 5) dx$. 5. $\int (x^2 + x) \sin x dx$. 6. $\int (x + 2) \sin \frac{x}{2} dx$.
7. $\int \arccos x dx$. 8. $\int \ln(2x - 1) dx$.

15-вариант

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(4+x^2)^3}}$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x-x^2}}$. 3. $\int x^2 \ln x dx$.
4. $\int x^2 \arctg x dx$. 5. $\int (x^2 + x) \cos x dx$. 6. $\int x \sin \frac{x}{2} dx$.
7. $\int (x^2 - 3)e^x dx$. 8. $\int \ln(2x + 3) dx$.

16-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x^4} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x-3}}$. 3. $\int x \ln(x + 1) dx$.
4. $\int x \arctg^2 x dx$. 5. $\int (x^2 + 1)e^x dx$. 6. $\int (x + 4) \cos \frac{x}{2} dx$.
7. $\int xe^{-4x} dx$. 8. $\int \arccos \frac{x}{5} dx$.

17-вариант

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(9+x^2)^3}}$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-2}}$. 3. $\int \sin(\ln x) dx$.
4. $\int x^2 \cos \frac{x}{3} dx$. 5. $\int (x^2 - 1)e^{-x} dx$. 6. $\int (x + 1) \sin \frac{x}{3} dx$.
7. $\int x \cos(x + 7) dx$. 8. $\int \arctg \frac{x}{4} dx$.

18-вариант

1. $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{2-x-x^2}}$. 3. $\int (x^2 - 4) \sin 5x dx$.
4. $\int x \arctg^2 x dx$. 5. $\int x \sin^2 x dx$. 6. $\int (x + 2) \cos \frac{x}{4} dx$.
7. $\int xe^{-5x} dx$. 8. $\int \arcsin \frac{x}{7} dx$.

19-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-3x-2x^2}}$. 3. $\int \ln(x + 5) dx$.

4. $\int x^2 \sin 2x dx$. 5. $\int \arcsin 9x dx$. 6. $\int (x+3) \sin \frac{x}{4} dx$.
7. $\int x e^{x+3} dx$. 8. $\int \operatorname{arctg} 6x dx$.

20-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-3x+2}}$. 3. $\int \ln \frac{2-x}{2+x} dx$.
4. $\int (x^2+4)e^{2x} dx$. 5. $\int x \operatorname{arctg} 2x dx$. 6. $\int (x-9) \sin \frac{x}{2} dx$.
7. $\int x \cos(2-x) dx$. 8. $\int \arccos \frac{x}{3} dx$.

21-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}$. 3. $\int \cos(\ln x) dx$.
4. $\int \sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} dx$. 5. $\int x \sin^2 x dx$. 6. $\int (x-2)e^x dx$.
7. $\int (x+1) \cdot e^{-4x} dx$. 8. $\int x \cos 6x dx$.

22-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2+4}}{x} dx$. 2. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}$. 3. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$.
4. $\int x \operatorname{arctg} 2x dx$. 5. $\int x \sin x \cos x dx$. 6. $\int (x-7) \cos 2x dx$.
7. $\int x^2 e^{-x} dx$. 8. $\int \arcsin 3x dx$.

23-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$. 3. $\int \ln(x+2) dx$.
4. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}} dx$. 5. $\int x^2(\sin 2x-3) dx$. 6. $\int (x+2) \cos 3x dx$.
7. $\int x^2 e^{-2x} dx$. 8. $\int (x+2) \cos 3x dx$.

24-вариант

1. $\int \sqrt{4-x^2} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$. 3. $\int \frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x} dx$.
4. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx$. 5. $\int x^2(\sin x+1) dx$. 6. $\int (x-2) \cos 4x dx$.
7. $\int \operatorname{arctg} 3x dx$. 8. $\int x \sin(x-2) dx$.

25-вариант

1. $\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x} dx$. 2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}$. 3. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$.
4. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$. 5. $\int (x^2+x)e^{-x} dx$. 6. $\int (x-4) \sin 2x dx$.
7. $\int x \cos 8x dx$. 8. $\int \arcsin 8x dx$.

12-§. Тўртинчи мустақил уй иши

Мазкур мустақил уй иши вариантларининг ҳар бири-да 9 та мисол бўлиб, уларни бажаришда қуйидагиларга эътибор бериш керак.

1—4-мисолларда: берилган интегрални интеграл остидаги касрнинг махражини кўпайтувчиларга ажратиб, сўнгра тўғри касрни энг содда рационал касрлар йиғиндиси кўринишида ифодалаш ёрдамида топиш керак.

5—6-мисолларда: берилган интегрални интеграл остидаги функциянинг илдиз остидаги ифодасини бирор ўзгарувчи билан алмаштириш ёрдамида топиш керак.

7—8-мисолларда: берилган интегрални $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ ва $t = \operatorname{tg} x$ тригонометрик алмаштиришлар ёрдамида топиш керак.

9-мисолда: берилган интегрални илдиз остидаги ифодада янги ўзгарувчи киритиш ёрдамида топиш керак.

Вариант мисолларини ечиш намунаси келтирамиз.

1. $\int \frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x^2-5x+6)} dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция рационал касрдан иборат. Унинг махражини кўпайтувчиларга ажратамиз: $(x+1)(x-2)(x-3)$.

Тўғри касрни энг содда рационал касрлар йиғиндиси кўринишида ёзишдан фойдаланамиз, яъни

$$\frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}.$$

Бу тенгликнинг ўнг томонини умумий махражга келтириб, суратларини ўзаро тенглаб куйидаги айниятга эга бўламиз:

$$7x - x^2 - 4 = A(x-2)(x-3) + B(x+1)(x-3) + C(x+1)(x-2).$$

A, B, C коэффициентларни хусусий қийматлар бериш усули билан аниқлаймиз:

$$\left. \begin{aligned} x = -1 & \quad -12 = 12A, \\ x = 2 & \quad 6 = -3B, \\ x = 3 & \quad 8 = 4C. \end{aligned} \right\}$$

Бундан: $A = -1, B = -2, C = 2$. Бу қийматларни ўрнига қўйсак, берилган интеграл энг содда рационал функцияларнинг интегралига келади:

$$\begin{aligned} \int \frac{7x-x^2-4}{(x+1)(x-2)(x-3)} dx &= \int \left(-\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x-2} + \frac{2}{x-3} \right) dx = \\ &= -\int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{dx}{x-2} + 2 \int \frac{dx}{x-3} = -\ln|x+1| - 2\ln|x-2| + \\ &+ 2\ln|x-3| + C = \ln \frac{(x-3)^2}{|x+1|(x-2)^2} + C. \end{aligned}$$

$$2. \int \frac{15x-x^2-11}{(x-1)(x^2+x-2)} dx \text{ интегрални топинг.}$$

Е ч и ш.

$$\int \frac{15x-x^2-11}{(x-1)(x^2+x-2)} dx = \int \frac{15x-x^2-11}{(x-1)^2(x+2)} dx = \int \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2} \right) dx.$$

$$\left. \begin{aligned} 15x - x^2 - 11 &= A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2, \\ x = 1 & \quad 3 = 3B, \quad B = 1 \\ x = -2 & \quad -45 = 9C, \quad C = -5 \\ x^2 & \quad -1 = A + C, \quad A = 4 \end{aligned} \right\} =$$

$$= \int \left(\frac{4}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{5}{x+2} \right) dx = -4\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - 5\ln|x+2| + C.$$

Номпълум коэффициентларни топишда x га $x = 1, x = -2$ хусусий қийматларни бериб B ва C топилиди, x^2 олдидаги коэффициентларни тенглаб эса A топилиди.

$$3. J(x) = \int \left(\frac{x^4-8x^3+23x^2-43x+27}{(x-2)(x^2-2x+5)} \right) dx \text{ интегрални топинг.}$$

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция нотўғри каср бўлгани учун унинг суратини махражга бўлиб, қўпқад ва тўғри рационал каср йиғиндиси кўринишида ёзиб олиш мумкин:

$$J(x) = \int \left(\frac{x^4-8x^3+23x^2-43x+27}{(x-2)(x^2-2x+5)} \right) dx =$$

$$= \int \left(x - 4 + \frac{-2x^2+3x+13}{(x-2)(x^2-2x+5)} \right) dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} - 4x + \int \left(\frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+5} \right) dx =$$

$$\left. \begin{aligned} -2x^2 + 3x + 13 &= A(x^2 - 2x + 5) + (Bx + C)(x - 2) \\ x = 2 & \quad -15 = 5A, \quad A = -3, \\ x^2 & \quad A + B = -2, \quad B = 1, \\ x^0 & \quad 5A - 2C = -13, \quad C = -1, \end{aligned} \right\} =$$

$$= \frac{x^2}{2} - 4x + \int \left(\frac{-3}{x-2} + \frac{x-1}{x^2-2x+5} \right) dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} - 4x - 3\ln|x^2 - 2x + 5| + C.$$

4. $\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 8x - 32}{x^4 + 9x^2 + 20} dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 - 5x^2 + 8x - 32}{x^4 + 9x^2 + 20} dx &= \int \frac{2x^3 - 5x^2 + 8x - 32}{(x^2 + 4)(x^2 + 5)} dx = \\ &= \int \left(\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{x^2 + 5} \right) dx = \\ \left. \begin{aligned} 2x^3 - 5x^2 + 8x - 32 &= (Ax + B)(x^2 + 5) + (Cx + D)(x^2 + 4) \\ x^3 & 2 = A + C \\ x^2 & -5 = B + D \\ x & 8 = 5A + 4C \\ x^0 & -22 = 5B + 4D \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A &= 0, B = -2, \\ C &= 2, D = -3. \end{aligned} \end{aligned}$$

$$= \int \left(\frac{-2}{x^2 + 4} + \frac{2x - 3}{x^2 + 5} \right) dx = -\arctg \frac{x}{2} + \ln(x^2 + 5) - \frac{3}{\sqrt{5}} \arctg \frac{x}{\sqrt{5}} + C.$$

5. $\int \frac{x+1}{3-\sqrt{x-2}} dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{3-\sqrt{x-2}} dx &\left| \begin{aligned} \sqrt{x-2} = t, \quad x-2 = t^2 \\ x = t^2 + 2, \quad dx = 2t dt \end{aligned} \right| = -2 \int \frac{(t^2+3)t dt}{t-3} = \\ &= -2 \int \left(t^2 + 3t + 12 + \frac{36}{t-3} \right) dt = \\ &= -2 \left(\frac{1}{3} t^3 + \frac{3}{2} t^2 + 12t + 36 \ln |t-3| \right) + C = \\ &= -\frac{2}{3} \sqrt{(x-2)^3} - 2(x-2) - 24\sqrt{x-2} - 72 \ln |\sqrt{x-2} - 3| + C. \end{aligned}$$

6. $\int \frac{4\sqrt{x-2} - \sqrt[3]{x-2}}{\sqrt{x-2} + 2\sqrt[3]{x-2}} dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш. $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ касрларнинг умумий махражи $m = 6$ булгани учун керакли алмаштиришни бажариб интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{4\sqrt{x-2} - \sqrt[3]{x-2}}{\sqrt{x-2} + 2\sqrt[3]{x-2}} dx &\left| \begin{aligned} x-2 = t^6, \quad x = t^6 + 2 \\ dx = 6t^5 dt \end{aligned} \right| = \int \frac{(4t^3 - 1)6t^5}{t^3 + 2t^3} dt = \\ &= 6 \int \frac{4t^6 - t^4}{t^3 + 2} dt = \int (4t^3 - 8t^4 + 15t^3 - 30t^2 + 60t - 120 + \frac{240}{t^3 + 2}) dt = \\ &= 6 \left(\frac{2}{3} t^6 - \frac{8}{5} t^5 + \frac{15}{4} t^4 - 10t^3 + 60t^2 - 120t + 240 \ln |t+2| \right) + C = \\ &= 4(x-2) - \frac{48}{5} \sqrt{(x-2)^5} + \frac{45}{2} \sqrt[3]{(x-2)^2} - 60\sqrt{x-2} + \\ &+ 180\sqrt[3]{x-2} - 720\sqrt{x-2} + 1440 \ln |\sqrt[3]{x-2} + 2| + C. \end{aligned}$$

7. $\int \frac{dx}{3 \sin x - 2 \cos x + 1}$ интегрални топинг.

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 \sin x - 2 \cos x + 1} &\left| \begin{aligned} t = \tg \frac{x}{2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = 2 \arctg t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{aligned} \right| = \\ &= 2 \int \frac{dt}{6t - 2 + 2t^2 + 1 + t^2} = 2 \int \frac{dt}{3t^2 + 6t - 1} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{(t+1)^2 - \frac{4}{3}} = \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \ln \left| \frac{t+1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{t+1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3} \tg \frac{x}{2} + \sqrt{3} - 2}{\sqrt{3} \tg \frac{x}{2} + \sqrt{3} + 2} \right| + C. \end{aligned}$$

8. $\int \frac{dx}{2 \sin^2 x - \sin 2x + 3 \cos^2 x}$ интегрални топинг.

Е ч и ш.

$$\int \frac{dx}{2 \sin^2 x - \sin 2x + 3 \cos^2 x} \left| \begin{aligned} t = \tg x, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \\ \sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{aligned} \right| =$$

$$= \int \frac{dt}{2t^2-2t+3} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2-t+\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2tx-1}{\sqrt{5}} + C.$$

9. $\int \frac{\cos^3 6x}{\sqrt{\sin 6x}} dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш .

$$\int \frac{\cos^3 6x}{\sqrt{\sin 6x}} dx \left| \begin{array}{l} \sin 6x = t \\ dt = 6 \cos 6x dx \end{array} \right| = \frac{1}{6} \int \frac{(1-t^2)}{\sqrt{t}} dt =$$

$$= \frac{1}{6} \int \left(t^{-\frac{1}{2}} - t^{\frac{3}{2}} \right) dt = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{4} t^{\frac{5}{2}} - \frac{5}{14} t^{\frac{7}{2}} \right) + C =$$

$$= \frac{5}{24} \sqrt{\sin^4 6x} - \frac{5}{84} \sqrt{\sin^6 6x} + C.$$

1-вариант

1. $\int \frac{3x^2+20x+9}{(x^2+4x+3)(x+5)} dx.$
2. $\int \frac{x^3+1}{x^2-x} dx.$
3. $\int \frac{3x+13}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx.$
4. $\int \frac{5x}{x^4+3x^2-4} dx.$
5. $\int \frac{dx}{2+\sqrt{x+3}}.$
6. $\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{(1+\sqrt{x+1})\sqrt{x+1}} dx.$
7. $\int \frac{dx}{5+2\sin x+3\cos x}.$
8. $\int \frac{dx}{8\sin^2 x-16\sin x \cos x}.$
9. $\int \cos^4 3x \sin^2 3x dx.$

2-вариант

1. $\int \frac{12dx}{(x-2)(x^2-2x+3)}.$
2. $\int \frac{x^3-2x^2-2x+1}{x^3-x^2} dx.$
3. $\int \frac{x^2-6x+8}{x^3+8} dx.$
4. $\int \frac{2x^5-2x+1}{1-x^4} dx.$

5. $\int \frac{xdx}{\sqrt{x+3}}.$

7. $\int \frac{dx}{5-4\sin x+2\cos x}.$

9. $\int \sqrt{\sin^4 x} \cos^3 x dx.$

6. $\int \frac{\sqrt{x}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} dx.$

8. $\int \frac{dx}{16\sin^4 x-8\sin x \cos x}.$

3-вариант

1. $\int \frac{43x-67}{(x-1)(x^2-x-12)} dx.$
2. $\int \frac{3x^2+1}{(x-1)(x^2-1)} dx.$
3. $\int \frac{12-6x}{(x-1)(x^2-4x+13)} dx.$
4. $\int \frac{x^4+x^3+2x^2+x+2}{x^4+5x^2+4} dx.$
5. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-3}}.$
6. $\int \frac{\sqrt{(x+1)^2+\sqrt{x+1}}}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}} dx.$
7. $\int \frac{3\sin x-2\cos x}{1+\cos x} dx.$
8. $\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x} dx.$
9. $\int \cos^3 x \sin^8 x dx.$

4-вариант

1. $\int \frac{2x^4+8x^3+9x^2-7}{(x^2+x-2)(x+3)} dx.$
2. $\int \frac{x+2}{x^3-x^2} dx.$
3. $\int \frac{2x^2+2x+20}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx.$
4. $\int \frac{5dx}{x^4+3x^2-4}.$
5. $\int \frac{xdx}{2+\sqrt{x+4}}.$
6. $\int \frac{(\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1})}{\sqrt[3]{x^3}} dx.$
7. $\int \frac{dx}{5+3\cos x-5\sin x}.$
8. $\int \frac{2\lg x+3}{\sin^2 x+2\cos^2 x} dx.$
9. $\int \cos^4 x \sin^5 x dx.$

5-вариант

1. $\int \frac{8xdx}{(x^3+6x+5)(x+3)} dx.$
2. $\int \frac{4x^4+8x^3-3x-3}{x^3+2x^2+x} dx.$

$$3. \int \frac{x^2+3x-6}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx$$

$$4. \int \frac{x^3+8x-2}{x^4+4x^2} dx$$

$$5. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x+1}}$$

$$6. \int \frac{x+\sqrt{x^2+6\sqrt{x}}}{x(1+\sqrt[3]{x})} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{5\cos x+10\sin x}$$

$$8. \int \frac{dx}{3\cos^2 x+4\sin^2 x}$$

$$9. \int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[3]{\sin^4 x}}$$

6-вариант

$$1. \int \frac{2x^4-7x^3+7x^2-8x}{(x^2-5x+6)(x+1)} dx$$

$$2. \int \frac{x+2}{x^3+x^2} dx$$

$$3. \int \frac{x^2+3x+2}{x^3-1} dx$$

$$4. \int \frac{2x^3-2x^2+5}{(x-1)^2(x^2+4)} dx$$

$$5. \int \frac{x+1}{x\sqrt{x+2}} dx$$

$$6. \int \frac{\sqrt{2x+1}+\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt{2x+1}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{3+2\cos x-\sin x}$$

$$8. \int \frac{\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{ctg}^2 x} dx$$

$$9. \int \sqrt[3]{\sin^2 2x} \cdot \cos^3 2x dx$$

7-вариант

$$1. \int \frac{2x^4+8x^3-45x-64}{(x-1)(x^2+5x+6)} dx$$

$$2. \int \frac{4x^2}{(x^2-2x+1)(x+1)} dx$$

$$3. \int \frac{36dx}{(x+2)(x^2-2x+10)}$$

$$4. \int \frac{x^3+x^2-x-3}{x^4-x^2} dx$$

$$5. \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+4}}$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[6]{x-1}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{5-3\cos x}$$

$$8. \int \frac{dx}{4\sin^2 x-5\cos^2 x}$$

$$9. \int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[3]{\sin^2 x}} dx$$

8-вариант

$$1. \int \frac{2x^4+17x^3+32x^2-7x}{(x^2+4x+3)(x+5)} dx$$

$$2. \int \frac{2x^2-2x-1}{x^2-x^3} dx$$

$$3. \int \frac{9x-9}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx$$

$$4. \int \frac{x^3-x-5}{x^4+3x^2-4} dx$$

$$5. \int \frac{\sqrt{x+2}}{x-3} dx$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x-1}-2\sqrt[3]{x-1}}{2\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{x-1}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{8-4\sin x+7\cos x}$$

$$8. \int \frac{dx}{7\cos^2 x+2\sin^2 x}$$

$$9. \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx$$

9-вариант

$$1. \int \frac{6x^2+6x-6}{(x+1)(x^2+x-2)} dx$$

$$2. \int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x} dx$$

$$3. \int \frac{7x-10}{x^3+8} dx$$

$$4. \int \frac{x^3-x-1}{x^4-x^2} dx$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x+3}}$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[3]{x+3}+\sqrt{x+3}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{3+5\cos x}$$

$$8. \int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x+\cos^4 x} dx$$

$$9. \int \frac{3\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$$

10-вариант

$$1. \int \frac{37x-85}{(x^2+2x-3)(x-4)} dx$$

$$2. \int \frac{4x^4+8x^3-x-2}{x(x+1)^2} dx$$

$$3. \int \frac{4x^2+3x+17}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx$$

$$4. \int \frac{2x^2-7x+10}{(x-1)(x^3-x^2+4x-4)} dx$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x(x+3)}}$$

$$6. \int \frac{\sqrt[6]{x-1}}{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{x-1}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{2 \sin x + 3 \cos x + 3}.$$

$$9. \int \sin^3 x \cos^4 x dx.$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x}.$$

11-вариант

$$1. \int \frac{3x^2 + 3x - 24}{(x^2 - x - 2)(x - 3)} dx.$$

$$2. \int \frac{2x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1}{x(x-1)^2} dx.$$

$$3. \int \frac{4x+2}{x^4+4x^2} dx.$$

$$4. \int \frac{4x+2}{x^4+4x^2} dx.$$

$$5. \int \frac{1+x}{x+\sqrt{x}} dx.$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x+3}}{1+\sqrt[3]{x+3}} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{5+4 \sin x}.$$

$$8. \int \frac{dx}{1+\sin^2 x}.$$

$$9. \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^3 x}} dx.$$

12-вариант

$$1. \int \frac{2x^4 - 7x^3 + 3x + 20}{(x-2)(x^2 - 2x - 3)} dx.$$

$$2. \int \frac{3x - x^2 - 2}{x(x+1)^2} dx.$$

$$3. \int \frac{x^2 - 5x + 40}{(x+2)(x^2 - 2x + 10)} dx.$$

$$4. \int \frac{x^3 - x + 2}{x^4 + x^2} dx.$$

$$5. \int \frac{xdx}{\sqrt{x}-1}.$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{8+4 \cos x}.$$

$$8. \int \frac{dx}{4 \sin^2 x + 8 \sin x \cos x}.$$

$$9. \int \sqrt{\cos^2 x} \sin^2 x dx.$$

13-вариант

$$1. \int \frac{3x^2 - 15}{(x-1)(x^2 + 5x + 6)} dx.$$

$$2. \int \frac{2x^3 + 1}{x^2(x+1)} dx.$$

$$3. \int \frac{4x - x^2 - 12}{x^3 + 8} dx.$$

$$4. \int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

$$5. \int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx.$$

$$6. \int \frac{\sqrt[3]{x+3}}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x+3}} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x}.$$

$$8. \int \frac{\sin 2x}{4 \sin^4 x + \cos^4 x} dx.$$

$$9. \int \sqrt{\sin^2 x} \cos^3 x dx.$$

14-вариант

$$1. \int \frac{x^2 - 19x + 6}{(x-1)(x^2 + 5x + 6)} dx.$$

$$2. \int \frac{x^3 - 3}{(x-1)(x^2 - 1)} dx.$$

$$3. \int \frac{x^2 - 13x + 10}{(x+1)(x^2 - 4x + 13)} dx.$$

$$4. \int \frac{2x^5 - 2x^3 + x^2}{1-x^2} dx.$$

$$5. \int \frac{dx}{3+\sqrt{x+5}}.$$

$$6. \int \frac{x+1+\sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{7 \sin x - 3 \cos x}.$$

$$8. \int \frac{dx}{\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x}.$$

$$9. \int \sqrt{\cos^2 2x} \sin^3 2x dx.$$

15-вариант

$$1. \int \frac{6xdx}{x^3 + 2x^2 - x - 2}.$$

$$2. \int \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + x} dx.$$

$$3. \int \frac{3-9x}{x^4 + 4x^2} dx.$$

$$4. \int \frac{x^4 dx}{x^4 + 5x^2 + 4}.$$

$$5. \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}-1}.$$

$$6. \int \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt[3]{x}+1)\sqrt{x}} dx.$$

$$7. \int \frac{dx}{2+4 \sin x + 3 \cos x}.$$

$$8. \int \frac{dx}{4 \cos^2 x + 3 \sin^2 x}.$$

$$9. \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^3 x}} dx.$$

16-вариант

$$1. \int \frac{4x^2 + 32x + 52}{(x^2 + 6x + 5)(x+3)} dx.$$

$$2. \int \frac{x+2}{x^3 - 2x^2 + x} dx.$$

3. $\int \frac{6-9x}{x^3+8} dx$.

4. $\int \frac{x^3-2x+5}{x^4-1} dx$.

5. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-7}} dx$.

6. $\int \frac{\sqrt{3x+1}+2}{\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{3x+1}} dx$.

7. $\int \frac{dx}{4\cos x+3\sin x}$.

8. $\int \frac{dx}{3\cos^2 x-2}$.

9. $\int \sin^2 2x \cos^4 2x dx$.

17-вариант

1. $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x^2+2x-3)(x-4)} dx$.

2. $\int \frac{4x^4+8x^3-1}{(x^2+x)(x+1)} dx$.

3. $\int \frac{4x-10}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx$.

4. $\int \frac{x^3+4x-3}{x^4+4x^2} dx$.

5. $\int \frac{1+x}{x\sqrt{x-1}} dx$.

6. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2-2x+1}}$.

7. $\int \frac{2-\sin x+3\cos x}{1+\cos x} dx$.

8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x+\sin 2x+3\cos^2 x}$.

9. $\int \sqrt[3]{\cos^4 x} \sin^3 x dx$.

18-вариант

1. $\int \frac{2x^4+8x^3-17x-5}{(x^2+2x-3)(x+2)} dx$.

2. $\int \frac{4x dx}{(x^2-1)(x+1)}$.

3. $\int \frac{x^2+23}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx$.

4. $\int \frac{7x-2}{(x-1)(x^2+4)} dx$.

5. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-7}}$.

6. $\int \frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-\sqrt{x}-1} dx$.

7. $\int \frac{dx}{5+\sin x+3\cos x}$.

8. $\int \frac{dx}{5\sin^2 x-3\cos^2 x}$.

9. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx$.

19-вариант

1. $\int \frac{2x^4+17x^3+40x^2+37x+36}{(x+1)(x^2+8x+15)} dx$.

2. $\int \frac{dx}{x^3+x^2}$.

3. $\int \frac{2x^2+7x+7}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx$.

4. $\int \frac{x^3+2x^2+4x-2}{x^4+3x^2-4} dx$.

5. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-4}}$.

6. $\int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx$.

7. $\int \frac{dx}{4\sin x+3\cos x+5}$.

8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x+3\sin x \cos x-\cos^2 x}$.

9. $\int \sin^4 2x \cos^2 2x dx$.

20-вариант

1. $\int \frac{6x^2}{(x-1)(x^2+3x+2)} dx$.

2. $\int \frac{x^3+4x^2+2x-1}{x^3-x^2} dx$.

3. $\int \frac{19x-x^2-34}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx$.

4. $\int \frac{4x^2-2}{x^4-x^2} dx$.

5. $\int \frac{\sqrt{x+4}}{x} dx$.

6. $\int \frac{\sqrt[3]{3x+1}}{\sqrt{3x+1}-\sqrt[3]{3x+1}} dx$.

7. $\int \frac{7+6\sin x-5\cos x}{1+\cos x} dx$.

8. $\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x+4\cos^4 x} dx$.

9. $\int \frac{\cos^3 2x}{\sqrt[3]{\sin^2 2x}} dx$.

21-вариант

1. $\int \frac{2x^4-5x^3-15x^2+40x-70}{(x^2+2x-3)(x-4)} dx$.

2. $\int \frac{x^3-4x+5}{(x^2-1)(x-1)} dx$.

3. $\int \frac{2x+22}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx$.

4. $\int \frac{(2x+3)}{(x-1)(x^3-x^2+4x-4)} dx$.

5. $\int \frac{dx}{2+\sqrt{x-8}}$.

6. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{4x-\sqrt[3]{x^2}}$.

7. $\int \frac{dx}{2-3\cos x+\sin x}$

8. $\int \frac{\sin^2 x}{3\sin^2 x - \cos^2 x} dx$

9. $\int \sin^4 3x \cos^2 3x dx$

22-вариант

1. $\int \frac{2x^4-7x^3+2x^2+13}{(x^2-5x+6)(x+1)} dx$

2. $\int \frac{3x^2+2}{x(x+1)^2} dx$

3. $\int \frac{5x^2+17x+36}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx$

4. $\int \frac{x^3+x^2+x-1}{x^4+5x^2+4} dx$

5. $\int \frac{dx}{3+\sqrt{x-6}}$

6. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{1+\sqrt[3]{x}}$

7. $\int \frac{dx}{3\sin x - \cos x}$

8. $\int \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x + 3\cos^2 x} dx$

9. $\int \sin^4 x \cos^5 x dx$

23-вариант

1. $\int \frac{7x^2-17x}{(x-2)(x^2-2x-3)} dx$

2. $\int \frac{x+5}{x^3-x^2-x+1} dx$

3. $\int \frac{6x}{x^3-1} dx$

4. $\int \frac{2x^5-2x^3-x^2}{1-x^4} dx$

5. $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x+6}}$

6. $\int \frac{x-\sqrt[3]{x^2}}{x(1+\sqrt[3]{x})} dx$

7. $\int \frac{dx}{4-4\sin x+3\cos x}$

8. $\int \frac{dx}{6-3\cos^2 x}$

9. $\int \sin^5 x \cdot \sqrt[3]{\cos^3 x} dx$

24-вариант

1. $\int \frac{6x^4-30x^2+30}{(x^2-1)(x+2)} dx$

2. $\int \frac{3x^2-7x+2}{(x^2-x)(x-1)} dx$

3. $\int \frac{3x^2+2x+1}{x^3-1} dx$

4. $\int \frac{5x^3-x^2+21x-9}{x^4+10x^2+9} dx$

5. $\int \frac{x-1}{x\sqrt{x-2}} dx$

6. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{1-\sqrt[3]{x}}$

7. $\int \frac{dx}{\cos x - 3\sin x}$

8. $\int \frac{dx}{2\sin^2 x - \sin 2x + \cos^2 x}$

9. $\int \frac{3\cos^3 x}{\sin^4 x} dx$

25-вариант

1. $\int \frac{3x^2-17x+2}{(x-1)(x^2+5x+6)} dx$

2. $\int \frac{x^2+x+2}{x^3+x^2} dx$

3. $\int \frac{4x^2+7x+5}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx$

4. $\int \frac{x^3-x^2+4x}{x^4-1} dx$

5. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x-2}} dx$

6. $\int \frac{\sqrt{x}}{3x+\sqrt[3]{x^2}} dx$

7. $\int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}$

8. $\int \frac{\cos^2 x}{1+\sin^2 x} dx$

9. $\int \sin^3 x \cos^8 x dx$

V боб

АНИҚ ИНТЕГРАЛ

1-§. Аниқ интеграл ҳақида тушунча.

Аниқ интегрални ҳисоблаш

Бирор $[a; b]$ кесмада узлуксиз $y = f(x)$ функция берилган бўлсин. Бу кесмани ихтиёрий равишда нуқталар билан n та қисмга бўламиз (12-чизма):


$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Бу қисмларнинг узунликлари мос равишда

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \dots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

га тенг. Ҳар бир қисмий интервалларнинг ичида биттадан ихтиёрий ξ_i нуқта танлаб оламиз:

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n.$$



12-чизма.

Бу танланган нуқталарда функциянинг қийматларини ҳисоблаймиз:


$$f(\xi_1), f(\xi_2), \dots, f(\xi_n).$$

Бу миқдорлардан

$$S_n = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_n)\Delta x_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \quad (5.1)$$

йиғиндини тузамиз. (5.1) йиғинди $y = f(x)$ функциянинг $[a; b]$ кесмадаги интеграл йиғиндисидеяи дейилади. S_n йиғинди геометрик нуқтаи назардан 12-чизмадаги штрихланган тўғри тўртбурчаклар юзларининг йиғиндисини билдиради. (5.1) интеграл йиғиндининг Δx_i ларнинг энг каттаси узунлиги нолга интилгандаги ($\Delta x_i \rightarrow 0$) лимити (қиймати) $[a; b]$ кесманинг бўлиниш усулига ва ундаги $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ нуқталарнинг танланишига боғлиқ бўлмаса, бу лимит $y = f(x)$ функциянинг $x = a$ дан $x = b$ гача олинган аниқ интеграл дейилади ва қуйидагича белгиланади ("f(x) дан x буйинча a дан b гача олинган аниқ интеграл" деб ўқилади):

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx. \quad (5.2)$$



13-чизма.

$f(x)$ — интеграл остидаги функция, $f(x)dx$ — интеграл остидаги ифода, $[a; b]$ — интеграллаш оралиғи, a ва b — сонлар мос равишда интеграллашнинг қуйи ва юқори чегаралари дейилади.

Теорема. Агар $y = f(x)$ функция $[a; b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у ҳолда $f(x)$ функция шу кесмада интегралланувчидир, яъни бундай функциянинг аниқ интеграли мавжуддир.

Агар $f(x) \geq 0$, $x \in [a; b]$ бўлса, у ҳолда бу функциянинг аниқ интегрални $y = f(x)$ функциянинг графиги, Ox ўқ ва $x = a$, $x = b$ тўғри чизиқлар билан чегараланган шаклнинг юзини ифодалайди. Бундай шакл эгри чизиқли трапеция дейилади.

Масалан, 13-чизмада кўрсатилган функциянинг графиги билан чегараланган юз учун:

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3.$$

Аниқ интегралнинг асосий хоссаларини кўрамиз (қуйида келтирилган $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функцияларни $[a; b]$ кесмада интегралланувчи деб оламиз).

$$1. \int_a^b (f(x) \pm \varphi(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b \varphi(x) dx.$$

$$2. \int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx \quad (c = \text{const}).$$

$$3. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

$$4. \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

5. Агар $[a; b]$ кесмада $f(x) \geq 0$ ва $a < b$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

6. Агар $\varphi(x) \leq f(x)$, $x \in [a; b]$ ва $a < b$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b \varphi(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$.

7. Агар $m = \min_{x \in [a; b]} f(x)$, $M = \max_{x \in [a; b]} f(x)$ ва $a < b$ бўлса, у ҳолда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

8. Агар $f(x)$ функция $[a; b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у ҳолда шу кесмада $x = c$ ($a < c < b$) нукта топиш мумкинки,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

тенглик уринли бўлади;

9. Агар $f(x)$ функция узлуксиз ва $\Phi'(x) = \int_a^x f(t) dt$ бўлса, у ҳолда қуйидаги тенглик уринли бўлади:

$$\Phi'(x) = f(x),$$

бунда $\Phi(x)$ га $f(x)$ функциянинг бошлангич функцияси дейилади;

10. Агар $F(x)$ функция $f(x)$ функциянинг қандайдир бошлангич функцияси бўлса, у ҳолда қуйидаги тенглик уринли бўлади:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b. \quad (5.3)$$

Бу тенглик *Ньютон — Лейбниц формуласи* дейилади. Аниқ интеграллар асосан (5.3) формула ёрдамида ҳисобланади. Энди қуйидаги аниқ интегралларни ҳисоблаймиз.

1-мисол. $\int_1^3 2(x+2)^2 dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int_1^3 2(x+2)^2 dx &= 2 \int_1^3 (x+2)^2 d(x+2) = \frac{2}{3} (x+2)^3 \Big|_1^3 = \\ &= \frac{2}{3} ((3+2)^3 - (1+2)^3) = \frac{2}{3} (125 - 27) = \frac{2}{3} 98 = \frac{196}{3}. \end{aligned}$$

2-мисол. $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx &= \sqrt{2} \int_0^8 \sqrt{x} dx + \int_0^8 \sqrt[3]{x} dx = \sqrt{2} \int_0^8 x^{\frac{1}{2}} dx + \int_0^8 x^{\frac{1}{3}} dx = \\ &= \frac{\sqrt{2} \cdot 2x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^8 + \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} \Big|_0^8 = \frac{2\sqrt{2}}{3} 8^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{4} 8^{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \sqrt{8^3} + \frac{3}{4} \sqrt{2^{14}} = \\ &= \frac{64}{3} + 12 = 33\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

3-мисол. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d(\cos x) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x d(\cos x) = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\cos^3 x}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

4-мисол. $\int_1^2 \frac{2x-1}{x^3+x} dx$ интегрални ҳисобланг.

Е чи ш. Интеграл остидаги функция тўғри рационал каср. Уни энг содда рационал касрлар йиғиндиси кури-нишида ифодалаймиз ва кейин интегрални ҳисоблаймиз:

$$\frac{2x-1}{x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}, \quad 2x-1 = A(x^2+1) + Bx^2+Cx.$$

$$\begin{cases} x^2 & A+B=0, \\ x^1 & C=2, \\ x^0 & A=-1 \end{cases}$$

бундан $A=-1$, $B=1$, $C=2$.

Демак,

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{2x-1}{x^3+x} dx &= \int_1^2 \left(-\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} + \frac{2}{1+x^2} \right) dx = \\ &= \left(-\ln|x| + \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + 2\operatorname{arctg}x \right) \Big|_1^2 = \\ &= -\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 5 + 2\operatorname{arctg} 2 - \frac{1}{2} \ln 2 - 2\operatorname{arctg} 1 = \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{5}{8} + 2 \left(\operatorname{arctg} 2 - \frac{\pi}{4} \right) \approx 0,38. \end{aligned}$$

Агар $y=f(x)$ функция $[a;b]$ кесмада узлуксиз, $x=\varphi(t)$ функция эса ўзининг ҳосиласи билан бирга $[a;b]$ кесмада узлуксиз ва монотон бўлиб, $\varphi(a)=a$, $\varphi(b)=b$ ва $f[\varphi(t)]$ мураккаб функция $[a;b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у ҳолда аниқ интеграл учун қуйидаги ўзгарувчини алмаштириш формуласи ўринли бўлади:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt. \quad (5.4)$$

Бу алмаштиришни қўллашга доир мисолар кўрамиз.

5-мисол. $\int_3^8 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$ интегрални ҳисобланг.

Е чи ш. $\sqrt{1+x}=t$ алмаштиришни бажарамиз. У ҳолда $t^2=1+x$, $x=t^2-1$, $dx=2t dt$
 $x=3$ да $t=2$, $x=8$ да эса $t=3$.

Булар учун юқорида санаб ўтилган ҳамма шартлар бажарилади. Демак,

$$\begin{aligned} \int_3^8 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx &= \int_2^3 \frac{(t^2-1)2t dt}{t} = 2 \int_2^3 (t^2-1) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_2^3 \\ &= 2 \left(9 - 3 - \frac{8}{3} + 2 \right) = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

6-мисол. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2\cos x+3}$ интегрални ҳисобланг.

Е чи ш.

$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ алмаштиришни бажарамиз. У ҳолда

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad x = 2\operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \\ \alpha &= \operatorname{tg} 0 = 0, \quad \beta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \end{aligned}$$

Демак,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2\cos x+3} &= \int_0^1 \frac{\frac{2t}{1+t^2} dt}{2 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 3} = \int_0^1 \frac{2dt}{t^2+5} = \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{5}} \Big|_0^1 = \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,28. \end{aligned}$$

Агар $u(x)$ ва $v(x)$ функциялар $[a;b]$ кесмада узлуксиз ва ҳосилага эга бўлсалар, у ҳолда

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x) \quad (5.5)$$

тенглик ўринли бўлади. (5.5) формула аниқ интегрални булаклаб интеграллаш формуласи дейилади. (5.5) формула татбиқига доир мисолар қараймиз.

7-мисол. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш.

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx \left| \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx \\ dv = \sin x dx, \quad v = -\cos x \end{array} \right| =$$

$$= -x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx = -x \cos x \Big|_0^{\pi} - \sin x \Big|_0^{\pi} =$$

$$= -\pi \cdot \cos \pi + 0 \cdot \cos 0 = \pi$$

8-мисол. $\int_1^e x \ln^2 x dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш.

$$\int_1^e x \ln^2 x dx \left| \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = \frac{2}{x} \ln x dx \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln^2 x \Big|_1^e - \int_1^e x \ln x dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln^2 x \Big|_1^e - \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e + \frac{1}{2} \int_1^e x dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln^2 x \Big|_1^e - \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e + \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{2} + \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(e^2 - 1).$$

Машқлар

Қуйидаги аниқ интегралларни ҳисобланг:

237. $\int_1^2 \left(2x^2 + \frac{2}{x} \right) dx;$

238. $\int_1^4 \left(2x + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx;$

239. $\int_0^1 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + x^3 \right) dx;$

240. $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}};$

241. $\int_0^1 \frac{dx}{x^3+4x+5};$

242. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx;$

243. $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx;$

244. $\int_0^4 \frac{xdx}{1+\sqrt{x}};$

245. $\int_4^9 \frac{y-1}{\sqrt{y+1}} dy;$

246. $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}};$

247. $\int_0^{\sqrt{5}} x^5 \sqrt{1+x^2} dx;$

248. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx;$

249. $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}};$

250. $\int_0^1 \frac{dx}{2x+\sqrt{3x+1}};$

251. $\int_4^9 \frac{xdx}{(1+x^2)^3};$

252. $\int_0^4 \frac{xdx}{\cos^2(x^2)};$

253. $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x \sin^3 x dx;$

254. $\int_{-1}^0 \frac{dx}{4x^2-9};$


255. $\int_0^1 x \operatorname{arctg} x dx;$

256. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \operatorname{tg}^2 x dx;$

2-§. Хосмас интеграллар

Агар $y = f(x)$ функция $a \leq x \leq +\infty$ да узлуксиз бўлиб, $\int_a^b f(x) dx = J(b)$ бўлса, бунда $J(b)$ — бирор узлуксиз функция (14-чизма), ушбу

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (5.6)$$



14-чизма.

лимит юқори чегараси чексиз бўлган хосмас интеграл дейилади ва у

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad (5.7)$$

каби белгиланади. Демак, таърифга кўра:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Агар (5.6) лимит мавжуд бўлса, (5.7) интеграл яқинлашувчи, агар (5.6) лимит мавжуд бўлмаса ёки чексизликка интилса, (5.7) интеграл узоқлашувчи дейилади.

Худди шунингдек, қуйи чегараси чексиз бўлган хосмас интеграл тўғрисида ҳам гапириш мумкин, у қуйидагича аниқланади:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^a f(x) dx, \\ \int_{-\infty}^a f(x) dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^c f(x) dx, \end{aligned}$$

бунда $-\infty < c < \infty$.

Агар $\int_a^{\infty} |f(x)| dx$ интеграл яқинлашувчи бўлса, (5.7) интеграл абсолют яқинлашувчи дейилади. (5.7) интегралнинг яқинлашишини аниқлаш учун қуйидаги таққослаш аломатларидан фойдаланилади.

1-теорема. x нинг барча $x \geq a$ қийматларида $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ тенгсизлик ўринли бўлса, у ҳолда

1) агар $\int_a^{\infty} \varphi(x) dx$ яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^{\infty} f(x) dx$ ҳам яқинлашувчи;

2) агар $x \geq a$ қийматларда $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ тенгсизлик ўринли бўлса, у ҳолда $\int_a^{\infty} \varphi(x) dx$ узоқлашувчи бўлса, $\int_a^{\infty} f(x) dx$ ҳам узоқлашувчи бўлади.

Бу теоремага доир мисоллар қараймиз.

1-мисол. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^n}$ ($n > 0$) интеграл n нинг қандай қийматларида яқинлашувчи ва қандай қийматларида узоқлашувчи бўлишини аниқланг.

Ечиш. $n \neq 1$ бўлсин деб фараз қиламиз. У ҳолда

$$\int_1^b \frac{dx}{x^n} = \frac{1}{1-n} x^{1-n} \Big|_1^b = \frac{1}{1-n} (b^{1-n} - 1),$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^n} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{1-n} (b^{1-n} - 1).$$

Демак, агар $n > 1$ бўлса,

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^n} = \frac{1}{1-n}.$$

бўлиб, берилган интеграл яқинлашувчи бўлади; агар $n < 1$ бўлса,

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^n} = +\infty$$

бўлиб, берилган интеграл узоқлашувчи бўлади. $n = 1$ бўлса,

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = +\infty$$

бўлиб, интеграл узоқлашувчи бўлади.

Демак, $0 < n < 1$ да хосмас интеграл яқинлашувчи, $1 \leq n < \infty$ да эса узоқлашувчи экан.

2-мисол. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 13}$ хосмас интегрални ҳисобланг ёки унинг узоқлашувчи ёки яқинлашувчилигини аниқланг.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 13} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{(x+2)^2 + 9} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \arctg \frac{x+2}{3} \Big|_1^b = \\ &= \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\arctg \frac{b+2}{3} - \arctg 1 \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

Демак, интеграл мавжуд ва яқинлашувчи экан.

3-мисол. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)e^x}$ интеграл яқинлашувчи эканлигини курсатинг.

Ечиш. $x \geq 1$ бўлганда $\frac{1}{(1+x^2)e^x} \leq \frac{1}{1+x^2}$ тенгсизлик ўринли ва хосмас интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)e^x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \arctg x \Big|_1^b = \\ = \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctg b - \arctg 1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$


яқинлашувчи бўлгани учун (1-теоремага кўра) берилган интеграл ҳам яқинлашувчи бўлади.

$y = f(x)$ функция $[a; b]$ кесманинг $x = c$ нуқтасидан бошқа ҳамма нуқталарида узлуксиз бўлсин, $x = c$ нуқтада эса узилишга эга бўлсин (15-чизма). У ҳолда таърифга кўра

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0} \int_a^{c-\epsilon_1} f(x) dx + \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0} \int_{c+\epsilon_2}^b f(x) dx \quad (5.8)$$

бунда $\epsilon_1 > 0$, $\epsilon_2 > 0$. (5.8) интеграл узлукли функциянинг хосмас интеграл дейилади. Агар (5.8) нинг ўнг томонидаги иккала интеграл мавжуд бўлса, у ҳолда берилган интеграл яқинлашувчи бўлади.

Агар (5.8) нинг ўнг томонидаги интеграллардан бирортаси узоқлашувчи бўлса, у ҳолда берилган интеграл ҳам узоқлашувчи бўлади.



15-чизма.

$a = c$ ёки $b = c$ бўлган ҳолда (5.8) тенгликнинг ўнг томони битта лимитдан иборат бўлиб қолади.

4-мисол. $\int_0^1 \frac{dx}{x^n}$ ($n = \text{const} > 0$) хосмас интегралнинг яқинлашувчи ва узоқлашувчи бўлиш шартларини топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функция $x = 0$ да узилишга эга. Агар $n \neq 1$ бўлса, у ҳолда

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^n} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+0} \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x^n} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+0} \frac{x^{-n+1}}{-n+1} \Big|_{\epsilon}^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+0} \left(\frac{1}{-n+1} - \frac{\epsilon^{-n+1}}{-n+1} \right) = \\ = \begin{cases} n < 1 & \text{да } \frac{1}{1-n}, \\ n > 1 & \text{да } \infty. \end{cases}$$

Агар, $n = 1$ бўлса, у ҳолда

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+0} \ln [x] \Big|_{\epsilon}^1 = - \lim_{\epsilon \rightarrow 0+0} \ln \epsilon = +\infty.$$

Демак, берилган интеграл $0 < n < 1$ да яқинлашувчи ва $n \geq 1$ да узоқлашувчи экан.

5-мисол. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ хосмас интегрални ҳисобланг.

Ечиш. $x = 1$ да интеграл остидаги функция узилишга эга. Шунинг учун таърифга кўра:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{1-\epsilon} (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (-2)(1-x)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^{1-\epsilon} = \\ = -2 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (\sqrt{1-1+\epsilon} - \sqrt{1-0}) = 2 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (1 - \sqrt{\epsilon}) = 2 \quad (\epsilon > 0).$$

Демак берилган интеграл яқинлашувчи.

2-теорема. $f(x)$, $\varphi(x)$ функциялар $[a; b]$ кесмадаги $x = c$ нуқтада узилишга эга ва $[a; b]$ кесманинг $x = c$ нуқтасидан бошқа ҳамма нуқталарда $\varphi(x) \geq f(x) \geq 0$ тенгсизлик бажарилсин. У ҳолда

1) агар $\int_a^b \varphi(x) dx$ яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ ҳам яқинлашувчи;

2) агар $x = c$ дан бошқа барча нуқталар учун $f(x) \geq \varphi(x) \geq 0$ тенгсизлик ўринли бўлса, у ҳолда $\int_a^b \varphi(x) dx$ узоқлашувчи бўлганда, $\int_a^b f(x) dx$ ҳам узоқлашувчи бўлади.

6-мисол. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2x^3}}$ интегралнинг яқинлашувчилигини текширинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функция $x=0$ да узилишга эга. $x \geq 0$ да $\frac{1}{\sqrt{x+2x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$ бўлгани учун қуйидаги хосмас интегрални ҳисоблаймиз:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left. 2\sqrt{x} \right|_{\epsilon}^1 = 2 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (1 - \sqrt{\epsilon}) = 2 \quad (\epsilon > 0).$$

Хосмас интеграл яқинлашувчи бўлгани учун берилган интеграл ҳам яқинлашувчи бўлади.

Машқлар

Қуйидаги аниқ интегралларни ҳисобланг:

$$257. \int_0^1 x e^{3x} dx.$$

$$258. \int_0^{\pi} x \sin x dx.$$

$$259. \int_1^e \ln x dx.$$

$$260. \int_0^{\pi} x^2 \cos x dx.$$

$$261. \int_{\sqrt{3}}^{\pi/2} \cos \sqrt{x} dx.$$

$$262. \int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx.$$

$$263. \int_0^1 x e^{-x} dx.$$

$$264. \int_0^1 x^2 e^x dx.$$

Қуйидаги хосмас интегралларни ҳисобланг ёки яқинлашувчилигини текширинг:

$$265. \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}.$$

$$266. \int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}.$$

$$267. \int_0^{1/e} \frac{dx}{x(\ln x)^2}.$$

$$268. \int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3}.$$

$$269. \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^3}.$$

$$270. \int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2} dx.$$

$$271. \int_1^{\infty} \frac{2+\sin x}{\sqrt{x}} dx.$$

$$272. \int_1^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}.$$

3-§. Аниқ интегралнинг геометрияга оид масалаларни ечишга татбиқи

1. Ясси шакллар юзларини ҳисоблаш. 1-§ дан маълумки, агар $[a; b]$ кесмада $y = f(x) \geq 0$ бўлса, у ҳолда $y = f(x)$ эгри чизиқ, Ox ўқи ва $x = a$, $x = b$ тўғри чизиқлар билан чегараланган эгри чизиқли трапециянинг юзи


$$S = \int_a^b f(x) dx$$

формула билан аниқланади. Бу формула ёрдамида юзларни ҳисоблашга доир мисолларни кўраемиз.


1-мисол. $y = x^2 - 2x$ эгри чизиқ, $x = -1$, $x = 1$ тўғри чизиқлар ва Ox ўқи билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Дастлаб берилган чизиқлар билан чегараланган шаклни чизамиз (16-чизма). Изланаётган юз $S = |S_1| + |S_2| = S_1 - S_2$, шунинг учун:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^1 (x^2 - 2x) dx = \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \\ &= \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 = 2. \end{aligned}$$



16-чизма.



17-чизма.


Агар ясси шакл $x = a$, $x = b$ тўғри чизиқлар ва $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ эгри чизиқлар билан чегараланган ҳамда $f_1(x) \leq f_2(x)$, $x \in [a; b]$ бўлса, у ҳолда шаклнинг юзи (17-чизма)

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx \quad (5.9)$$

формула ёрдамида аниқланади.

2-мисол. $y = 3x - x^2$ ва $y = -x$ чизиқлар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Берилган чизиқларнинг кесишган нуқтасини, сўнгра изланаётган шаклнинг юзини чизамиз. (18-чизма).



18-чизма.


$$\begin{cases} y = 3x - x^2 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x, \\ -x = 3x - x^2 \end{cases}$$

Бу системанинг ечими $x_1 = 0$, $x_2 = 4$, $y_1 = 0$, $y_2 = -4$. (5.9) формулага асосан:

$$S = \int_0^4 (3x - x^2 - (-x)) dx = \int_0^4 (4x - x^2) dx = \left(2x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \frac{32}{3}.$$

Агар $y = f(x)$ эгри чизиқ тенгламаси параметрик, яъни $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ кўринишда берилган бўлса, эгри чизиқли трапециянинг юзи

$$S = \int_a^b \psi(t) \varphi'(t) dt \quad (5.10)$$



19-чизма.

формула билан топилади, бунда a ва b лар $\varphi(a) = a$


ва $\psi(b) = b$ тенгламалардан аниқланади. $[a; b]$ кесмала $\psi(t) \geq 0$ деб олинади (19-чизма).

3-мисол. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипс билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Эллипснинг параметрик тенгламаси $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ кўринишда эканлигидан ва ўқларга нисбатан симметриклигидан ҳамда (5.10) формулага асосан ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} y dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin t (-b \sin t) dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = 2ab \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi ab. \end{aligned}$$

Агар узлуксиз $y = f(x)$ эгри чизиқ қутб координаталарида $\rho = \rho(\varphi)$ тенглама билан берилган бўлса, OM_1 ва OM_2 қутб



20-чизма.

радиуслари билан чегараланган M_1OM_2 эгри чизиқли секторнинг юзи қуйидаги аниқ интеграл билан ифодаланади:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (\rho(\varphi))^2 d\varphi, \quad (5.11)$$

бунда φ_1 ва φ_2 мос равишда OM_1 ва OM_2 кутб радиусларининг кутб бурчаклари (20-

чизма).


4-мисол. Бернулли лемнискатаси $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг (21-чизма).

Ечиш. Берилган эгри чизиқ тенгламасини кутб координаталар системасида ифодалаймиз. Бунинг учун $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ алмаштириш бажарсак, $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$ ёки $\rho = a \sqrt{\cos 2\varphi}$ га эга бўламиз.

Шаклнинг симметриклиги хоссасини эътиборга олиб (5.11) формулага асосан изланаётган юзни топамиз:

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = 2a^2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2.$$

2. Эгри чизиқ ёйининг узунлигини ҳисоблаш. Агар AB ёй $y = f(x)$ тенглама билан берилган бўлса (бунда $f(x)$ — узлуксиз, дифференциалланувчи функция), у ҳолда унинг узунлиги



21-чизма.

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (5.12)$$

формула ёрдамида ҳисобланади (22-чизма).

Агар ёй тенгламаси $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ параметрик кўринишда (бунда $\varphi(t)$, $\psi(t)$ узлуксиз, дифференциалланувчи функциялар) берилган бўлса, у ҳолда ёй узунлиги l қуйидагича ҳисобланади:

$$l = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2} dt, \quad (5.13)$$

бунда α , β лар t параметрнинг мос равишда A ва B учлардаги қийматлари.

Агар ёй тенгламаси кутб координаталар системасида $\rho = \rho(\varphi)$ тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда қуйидаги формулага эга бўламиз:

$$l = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\varphi \quad (5.14)$$

бунда φ_1 ва φ_2 мос равишда M_1 ва M_2 ёй охирлари кутб радиусларининг Op ўқ билан ташкил этган кутб бурчаклари.

5-мисол. Учларининг абсциссалари $x_1 = \sqrt{3}$ ва $x_2 = \sqrt{8}$ бўлган $y = \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$ эгри чизиқнинг узунлигини ҳисобланг.

Ечиш. (2.12) формулага кўра, қуйидагига эга бўламиз:

$$l = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + (\sqrt{x})^2} dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + x} dx = \frac{(1+x)^{3/2}}{3/2} \Big|_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} = \frac{38}{3}.$$

6-мисол. $y = a(1 - \cos t)$, $x = a(t - \sin t)$ циклоида битта арки узунлигини ҳисобланг.

Ечиш. Циклоида арклари бир хил бўлгани учун унинг битта аркини оламиз. Бунда t параметр 0 дан 2π гача ўзгаради. $x' = a(1 - \cos t)$, $y' = a \sin t$ бўлгани учун (5.13) формулага кўра эгри чизиқнинг узунлиги қуйидагича аниқланади:


$$\begin{aligned}
 l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = \\
 &= \int_0^{2\pi} a \sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = \\
 &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a.
 \end{aligned}$$

7-мисол. $\rho = e^\varphi$ логарифмик спирал биринчи ўрамининг узунлигини ҳисобланг.


Ечиш. (2.14) формулага асосан:

$$\begin{aligned}
 l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{e^{2\varphi} + e^{2\varphi}} d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} e^\varphi d\varphi = \sqrt{2} e^\varphi \Big|_0^{2\pi} = \\
 &= \sqrt{2} (e^{2\pi} - 1) \approx 108,16.
 \end{aligned}$$

3. Жисмлар ҳажмини ҳисоблаш. Фазода $x = a$, $x = b$ текисликлар орасида жойлашган бирор жисм берилган бўлсин. Ox ўқига перпендикуляр ва $x \in [a; b]$ нуқталардан ўтувчи ҳар қандай текисликлар бу жисмни кесганда ҳосил бўлган кесимнинг юзи $S(x)$ га тенг бўлсин (23-чизма). У ҳолда $x = a$, $x = b$ текисликлар орасидаги жисмнинг ҳажми ушбу формула билан ҳисобланади:



23-чизма.



24-чизма.

$$V = \int_a^b S(x) dx. \quad (5.15)$$

Хусусий ҳолда $aABb$ эгри чизикли трапециянинг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг қўндаланг кесим юзи $S(x) = \pi(f(x))^2$ бўлади (24-чизма). Шунинг учун эгри чизикли трапециянинг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажми ушбу формула билан ҳисобланади:


$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx. \quad (5.16)$$

8-мисол. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ сирт билан чегараланган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг.

Ечиш. Берилган тенглама бўйича эллипсоид ясаймиз (25-чизма). Бу эллипсоидни Oy ўқига перпендикуляр, $y \in [-b; b]$ нуқталардан ўтувчи ихтиёрий текислик билан кесилганда ҳосил бўлган кесимни қараймиз.

Кесим тенгламаси $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$, ($y = \text{const}$) ёки $1 - \frac{y^2}{b^2} > 0$ бўлса, у ҳолда $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$, яъни $\left(\frac{x}{a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}} \right)^2 + \left(\frac{z}{c\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}} \right)^2 = 1$,

ярим ўқлари $a_1 = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$, $c_1 = c\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$ бўлган эллипсга



25-чизма.


эга бўламиз. Бу кесимни юзи эса $S(y) = \pi a_1 c_1 = \pi a c \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$ га тенг. У ҳолда (2.15) формулага кўра:

$$V = \int_{-b}^b \pi a c \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy = 2\pi a c \int_0^b \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy = \\ = 2\pi a c \left(y - \frac{y^3}{3b^2}\right) \Big|_0^b = \frac{4}{3} \pi a b c.$$

9-мисол. Оху текисликда ётувчи ва $y^2 = 4 - x$, $x = 0$ чизиқлар билан чегараланган шаклнинг Оу ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг (26-чизма).

Ечиш. (5.16) формула ва 26-чизмага кўра:

$$V_y = \pi \int_{-2}^2 x^2 dy = \pi \int_{-2}^2 (4 - y^2)^2 dy = 2\pi \int_0^2 (4 - y^2)^2 dy =$$



26-чизма.

$$= 2\pi \int_0^2 \left(16 - 8y^2 + y^4\right) dy = 2\pi \left(16y - \frac{8}{3}y^3 + \frac{y^5}{5}\right) \Big|_0^2 = \\ = 2\pi \left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5}\right) = \frac{512}{15} \pi \approx 107,23.$$


4. Айланиш жисмининг сиртиги ҳисоблаш. Агар AB эгри чизиқ $y = f(x)$ функциянинг графигидан иборат ва эгри чизиқнинг четки нуқталарини координатлари $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$, бўлса, (бунда $f(x)$ — узлуксиз, дифференциалланувчи функция) у ҳолда унинг Ох ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг юзи қуйидаги формула билан аниқланади:

$$Q_x = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (5.17)$$

10-мисол. Абсциссалари $x_1 = 1$, $x_2 = 7$ бўлган нуқталар билан чегараланган $y^2 = 2x + 1$ парабола ёйининг айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг юзини топинг.

Ечиш. 27-чизма ва (5.17) формулага кўра изланаётган сиртнинг юзи қуйидагича топилади: $y = \sqrt{2x + 1}$,

$$y' = \frac{1}{\sqrt{2x + 1}}.$$



27-чизма.

$$Q_x = 2\pi \int_1^2 \sqrt{2x+1} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right)^2} dx = 2\pi \int_1^2 \sqrt{2x+1} + 1 dx =$$

$$= 2\pi \int_1^2 \sqrt{2x+1} dx = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^{3/2}}{3/2} \Big|_1^2 = \frac{2}{3} 2\pi(64-8) = \frac{112\pi}{3}.$$

Машқлар

273. $y^2 = 9x$, $y = 3x$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
274. $y^2 = x + 5$, $y^2 = -x + 4$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
275. $y = x^2 + 4x$, $y = x + 4$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
276. $y = (x - 4)^2$, $y = 16 - x^2$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
277. $4y = 8x - x^2$, $4y = x + 6$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
278. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{x^2}{2}$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
279. $y^2 = x^2 - x^4$ ёпиқ чизик билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
280. Ox ўқи ва $y = a(1 - \cos t)$, $x = a(t - \sin t)$ циклоиданинг биринчи арки билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
281. $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$ чизик ва унинг асимптотаси билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
282. $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = x$, $y = \frac{-x}{\sqrt{3}}$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
283. $x = 3t^2$, $y = 3t - t^2$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
284. $y = 4t^2 - 6t$, $x = 2t$ чизиклар ва Ox ўқи билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.
285. $\rho = a \cos 2\varphi$ чизик билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

286. $r = a\varphi$ ($a > 0$) Архимед спиралининг биринчи ва иккинчи ўрамлари билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

287. $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ астроида узунлигини ҳисобланг.

288. $y = 2\sqrt{x}$ параболаининг абсциссалари $x_1 = 0$ ва $x_2 = 1$ бўлган нуқталар орасидаги ёйининг узунлигини ҳисобланг.

289. $y = \frac{1}{3}\sqrt{(2x-1)^3}$ эгри чизикнинг абсциссалари $x_1 = 2$ ва $x_2 = 8$ бўлган нуқталар орасидаги ёйининг узунлигини ҳисобланг.

290. $y = \frac{4}{3}x$ чизикнинг абсциссалари $x_1 = 2$ ва $x_2 = 8$ бўлган нуқталар орасидаги ёйининг узунлигини ҳисобланг.

291. $y = \ln x$ эгри чизикнинг абсциссалари $x_1 = \sqrt{3}$ ва $x_2 = \sqrt{8}$ бўлган нуқталар орасидаги ёйининг узунлигини ҳисобланг.

292. $y = \frac{2}{3}\sqrt{(x-1)^3}$ эгри чизикнинг абсциссалари $x_1 = 1$ ва $x_2 = 9$ бўлган нуқталар орасидаги ёйининг узунлигини ҳисобланг.

293. $\rho = (1 - \cos \varphi)$ кардиоиданинг узунлигини ҳисобланг.

294. $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2}$, $z = 1$ сиртлар билан чегараланган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг.

295. $y = \frac{x^2}{1} + \frac{z^2}{4}$, $y = 1$ сиртлар билан чегараланган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг.

296. Ox текисликда ётувчи ва $y = x^2$, $x = y^2$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг.

297. Ox ўқи ва $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ циклоида биринчи аркининг абсциссалар ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг.

298. $y = \frac{1}{2}\sqrt{4x-1}$ эгри чизик ёйининг абсциссалари $x_1 = 1$ ва $x_2 = 9$ бўлган нуқталар орасидаги қисмининг Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт юзини ҳисобланг.

299. $y = 3x$ тўғри чизик кесмасининг абсциссалари $x_1 = 0$ ва $x_2 = 2$ бўлган нуқталар орасидаги кесмасининг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт юзини ҳисобланг.

4-§. Аниқ интегралнинг физикага оид масалаларни ечишга татбиқи

1. Моддий нуқтанинг босиб ўтган йўлини тезлиги бўйича ҳисоблаш. Агар $u = f(t)$ функция моддий нуқта траекториясини ифодаласа, моддий нуқтанинг $[t_1; t_2]$ вақт оралиғида босиб ўтган йўли S қуйидаги

$$S = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \quad (5.18)$$

формула билан ҳисобланади.

1-мисол. Моддий нуқта бирор тўғри чизиқ бўйлаб $u(t) = 4t^3 + 2t + 1$ тезлик билан ҳаракатланади. Бу нуқтанинг $[0; 3]$ вақт оралиғида босиб ўтган йўлини топинг.

Ечиш. (5.18) формулага кўра:

$$S = \int_0^3 (4t^3 + 2t + 1) dt = (t^4 - t^2 + t) \Big|_0^3 = 75 \text{ (м)}.$$

2. Ўзгарувчи кучнинг бажарган ишини ҳисоблаш. $F(s)$ куч таъсирида моддий нуқта Oz тўғри чизиқ бўйлаб ҳаракатлансин.

Бу кучнинг $[a; b]$ кесмадаги бажарган иши

$$A = \int_a^b F(s) ds$$

формула билан топилади.

2-мисол. Агар пружинани 1 см га чўзиш учун 1кН куч қўйиш керак бўлса, пружинани 10 см га чўзишда бажарилган ишни ҳисобланг.

Ечиш. Гук қонунига асосан F кучнинг пружинани чўзиши унинг чўзилишига пропорционалдир, яъни, $F = kx$, бунда x — пружинанинг чўзилиши (метрда), k — пропорционаллик коэффициентини.

Масала шартига кўра $x = 0,01$ м, куч эса $F = 1$ кН бўлгани учун $1 = 0,01k$ тенгликни ҳосил қиламиз. Бундан k ни топамиз: $k = 100$ ва $F = 100x$.

Демак, изланаётган иш:

$$A = \int_0^{0,1} 100x dx = 50x^2 \Big|_0^{0,1} = 0,5 \text{ кЖ}.$$

3-мисол. Қозон $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ эллиптик параболоид шаклида бўлиб, унинг баландлиги $H = 4$ м. Қозон зичлиги $d = 0,8$ т/м³ бўлган суюқлик билан тўлдирилган. Қозондан суюқликни насос билан чиқариб ташлашда бажарилган ишни ҳисобланг.

Ечиш. z баландликда Δz қалинликдаги элементар суюқлик қатламини оламиз. Бу қатлам горизонтал кесими ярим ўқлари $a = 2\sqrt{z}$; $b = 3\sqrt{z}$ бўлган эллипс бўлиб, унинг массаси $\Delta m_i = 6\pi g \delta z_i \Delta z_i$, ҳажми эса $\Delta v_i = \pi \cdot 2\sqrt{z_i} \cdot 3\sqrt{z_i} \Delta z_i$ га тенг.

Суюқликни чиқариб ташлаш учун бажарилган иш:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 6\pi g \delta z_i (H - z_i) \Delta z_i = \int_0^H 6\pi g \delta z (H - z) dz = 6\pi g \delta \left(H \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} \right) \Big|_0^H = \pi g \delta H^3 = 6\pi g \delta \approx 1575,53 \text{ кЖ}.$$


3. Суюқликнинг пластинкаларга таъсир этувчи босим кучини ҳисоблаш. Бундай масалаларни ечишни аниқ мисолда кўрсатамиз.

4-мисол. Асоси $a = 3$ м ва баландлиги $H = 2$ м бўлган учбурчакли пластинка суюқликка учи пастга қилиб шундай ботирилганки, унинг асоси суюқлик сатҳи билан параллел ва ундан 1м узоқликда жойлашган. Суюқликнинг зичлиги $\delta = 0,9$ т/м³га тенг. Суюқликни пластинканинг ҳар бир томонига таъсир этувчи босим кучини ҳисобланг.

Ечиш. Паскаль қонунидан фойдаланиб суюқликнинг босим кучини аниқлаймиз. Унга кўра h чуқурликдаги ΔS юзга суюқликнинг Δp босими $\Delta p = \delta g h \Delta s$ га тенг, бунда δ — суюқлик зичлиги, g — эркин тушиш тезланиши.

Энди ΔS юзни суюқлик сатҳидан $y + d$ масофада ётувчи ва унга битта томони параллел бўлган du қалинлик билан фарқ қилувчи учбурчакларга ажратамиз (28-чизма). Ҳосил бўлган ABC ва $A_1B_1C_1$ учбурчаклар ўхшашлигидан:

$$\frac{|A_1B_1|}{a} = \frac{H-y}{H} \Rightarrow |A_1B_1| = \frac{a}{H} (H-y)'$$



28-чизма.

Кесилган (эни dy бўлган) юз

$$dS = \frac{a}{H} (H - y) dy.$$

Текис учбурчакнинг томонларига таъсир этувчи босим:

$$dP = \frac{a}{H} \delta g (d + y) (H - y) dy.$$

Охириги тенгликнинг иккала қисмини интеграллаб, изланаётган босимни топамиз:

$$P = \int_0^H \frac{a}{H} \delta g (d + y) (H - y) dy = \frac{3}{2} \delta g \int_0^2 (2 + y - y^2) dy = \frac{3}{2} \delta g \left(2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 5\delta g = 44,1 \text{ кН}.$$

4. Чизиқ ва доиранинг инерция моментларини ҳисоблаш.

а) узунлиги l бўлган бир жинсли таёқчанинг иккинчи учига нисбатан инерция моменти қуйидагича ҳисобланади:

$$J = \gamma \int_0^l x^2 dx = \gamma \frac{l^3}{3}.$$

Агар таёқчанинг массаси M берилган бўлса, у ҳолда $\gamma = \frac{M}{l}$ бўлиб,

$$J = \frac{M}{l} \cdot \frac{l^3}{3} = \frac{Me^2}{3} = \frac{1}{3} Me^2$$

га эга бўламиз.

б) радиуси r бўлган айлананинг марказига нисбатан инерция моменти

$$J = 2\pi r^3$$

формула орқали аниқланади.

в) радиуси R бўлган бир жинсли доиранинг марказига нисбатан инерция моментини ҳисоблаш учун доирани эни dr бўлган n та ҳалқаларга ажратамиз. Бу ҳалқачаларнинг ҳар бирининг юзи $dS = 2\pi r dr$ га, массаси $dm = 2\pi r \delta dr$ га тенг, бунда $\delta = \frac{M}{\pi R^2}$ — зичлик. Битта ҳалқачанинг инерция моменти (29-чизма):

$$dJ_0 = 2\pi \delta r^3 dr.$$

Бундай инерция моментлари йиғиндисининг $n \rightarrow \infty$ даги limiti мавжуд ва у қуйидаги аниқ интегралга тенг:


$$J_0 = \int_0^R 2\pi \delta r^3 dr = 2\pi \delta \frac{r^4}{4} \Big|_0^R = \frac{1}{2} \pi R^4 \frac{M}{\pi R^2} = \frac{1}{2} MR^2.$$

5. Текис шаклнинг оғирлик марказини ҳисоблаш. Қуйидаги ҳолларни қараймиз:

а) бирор текис шакл 19-чизмада кўрсатилганидек берилган бўлсин. Текис шакл $\delta = \delta(x)$ зичликка эга бўлса, у ҳолда текис шаклнинг оғирлик маркази $C(x_c, y_c)$ нинг координаталари қуйидаги формула билан топилади:

$$x_c = \frac{\int x \delta(x) \sqrt{1+y'^2} dx}{\int \delta(x) \sqrt{1+y'^2} dx}; \quad y_c = \frac{\int y \delta(x) \sqrt{1+y'^2} dx}{\int \delta(x) \sqrt{1+y'^2} dx}. \quad (5.19)$$

б) агар текис шакл $[a, b]$ кесмада пастдан $y = f_1(x)$, юқоридан $y = f_2(x)$ чизиқлар билан чегараланган (17-чизма) ва зичлиги $\delta = \delta(x)$ бўлса, у ҳолда унинг оғирлик маркази $C(x_c, y_c)$ нинг координаталари қуйидаги формула билан аниқланади:




29-чизма.

$$x_c = \frac{\int_a^b x \delta(x)(f_2(x) - f_1(x)) dx}{\int_a^b \delta(x)(f_2(x) - f_1(x)) dx}, \quad y_c = \frac{\int_a^b y \delta(x)(f_2^2(x) - f_1^2(x)) dx}{\int_a^b \delta(x)(f_2(x) - f_1(x)) dx}. \quad (5.20)$$

5-мисол. Марказий бурчаги 2α ва радиуси R бўлган бир жинсли айлана ёни билан чегараланган шаклнинг оғирлик марказини топинг.

Ечиш. Координаталар системасини 30-чизмада кўрсатилганидек олаимиз. Бу ҳолда ёйнинг симметриклигидан ва бир жинслилигидан $y_c = 0$ га эга бўламиз. x_c ни (5.19) формуладан топамиз:



30-чизма

Айланининг параметрик тенгламасидан фойдаланамиз:

$$x_c = \frac{\int_a^b x \sqrt{1+x^2} dy}{\int_a^b \sqrt{1+x^2} dy}.$$

$$\begin{cases} x = R \cos t, \\ y = R \sin t. \end{cases}$$


У ҳолда

$$x_c = \frac{\int_0^{\alpha} R^2 \cos t dt}{\int_0^{\alpha} R dt} = R \frac{\sin t \Big|_0^{\alpha}}{t \Big|_0^{\alpha}} = R \frac{\sin \alpha}{\alpha}.$$

6-мисол. $y = 6 - x^2$, $y = 2$ чизиқлар билан чегараланган бир жинсли текис шакл оғирлик марказининг координаталарини топинг.

Ечиш. 31-чизмада кўрсатилгандек шаклни чизиб оламиз. Чизмага кўра $x_c = 0$ бўлади. y_c ни топиш учун (5.20) формуладан фойдаланамиз:

$$y_c = \frac{1}{2} \cdot \frac{\int_{-2}^2 ((6-x^2)^2 - 2^2) dx}{\int_{-2}^2 (4-x^2) dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\int_{-2}^2 (32-12x^2+x^4) dx}{\int_{-2}^2 (4-x^2) dx} =$$



31-чизма.

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(32x - 4x^3 + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-2}^2}{\left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{192}{5}}{\frac{16}{3}} = 3,6.$$

Машқлар

300. $y^2 = 9x$, $y = 3x$ чизиқлар билан чегараланган шаклнинг юзини топинг.

301. $y^2 = 2px$, $x^2 = 2py$ параболалар орасидаги соҳанинг юзини топинг.

302. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипснинг Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини топинг.

303. Координаталар бошини $(a;b)$ нукта билан туташтирувчи тўғри чизиқ кесмаси Ou ўқ атрофида айланади. Ҳосил бўлган конуснинг ҳажмини топинг.

304. $y^2 = 4ax$ параболанинг Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг координаталар бошидан абсциссаси $x = 3a$ бўлган нуктагача оралиқдаги юзини топинг.

305. $y = 3x$ тўғри чизиқнинг $x = 0$ дан $x = 3$ гача оралиқдаги кесмасининг: а) Ox ўқ атрофида; б) Ou ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган конус сиртининг юзини ҳисобланг.

306. $ay^2 = x^3$ ярим кубик парабола ёйининг координаталар бошидан абсциссаси $x = 5a$ нуктагача бўлган узунлигини ҳисобланг.

307. $y = \ln x$ эгри чизиқ ёйининг $x = \sqrt{3}$ дан $x = \sqrt{8}$ гача бўлган узунлигини ҳисобланг.

308. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) эллипс чорак қисми юзининг оғирлик марказини топинг.

309. $x^2 + 4y = 16$ парабола ва Ox ўқ билан чегараланган шакл юзининг оғирлик марказини топинг.

310. Жисм тезлиги $v = \sqrt{2t+3}$ м/сек формула билан ифодаланади. Ҳаракат бошлангандан 3 с ичида жисм босиб ўтган йўлини топинг.

311. 48 км/соат тезлик билан ҳаракат қилаётган автомобиль тормозлана бошлади ва 3 с ўтгач тўхтади. Автомобиль батамом тўхтагунча босиб ўтган йўлни топинг.

312. Радиуси 3 см га тенг ярим доира шаклдаги текис тўсиқ сувга шундай ботирилганки, унинг диаметри сув сатҳида жойлашган. Сувнинг бу тўсиққа бўлган босим кучини аниқланг.

313. Тўғон вертикал тўғри трапеция шаклида бўлиб, унинг юқори ва пастки асослари мос равишда 80 ва 50 м га, баландлиги эса 25 м га тенг. Тўғонга таъсир қилаётган сувнинг босим кучини аниқланг.

314. Устки асоси a ва остки асоси b ($a > b$), баландлиги h бўлган тенг ёнли трапеция шаклидаги вертикал тўғонга таъсир қилаётган сувнинг босим кучини ҳисобланг.

5-§. Биринчи мустақил уй иши

Мазкур уй иши вариантларининг ҳар бирида 8 та мисол бўлиб, уларни бажаришда қуйидагиларга эътибор бериш керак:

1—7-мисолларда: берилган аниқ интегралларни вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан ҳисоблаш керак.

8-мисолда: берилган хосмас интегрални ҳисоблаш, узоқлашувчи ёки яқинлашувчи эканлигини аниқлаш керак.

Вариант мисолларининг ечиш намунасини келтирамиз.

Қуйидаги аниқ интегралларни вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан ҳисобланг:

$$1. \int_1^2 \frac{dx}{x(1+x^2)}.$$

Ечиш. Интеграл остидаги касрни рационал касрлар йиғиндиси кўринишда ёзиб оламиз ва ҳисоблашни давом эттирамиз:

$$\int_1^2 \frac{dx}{x(1+x^2)} = \int_1^2 \left(\frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{1+x^2} \right) dx \quad \left| \begin{array}{l} 1 = A(1+x^2) + (Bx+C)x, \\ x=0 \quad 1=A, \\ x^2 \quad 0=A+B, \\ x \quad 0=C, \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} A=1, \\ B=-1, \\ C=0 \end{array} \right. =$$

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \frac{dx}{x} - \int_1^2 \frac{xdx}{1+x^2} = \ln |x| \Big|_1^2 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_1^2 = \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 5 = \\ &= \frac{3}{2} \cdot 0,69 - \frac{1}{2} \cdot 1,61 = 0,24. \end{aligned}$$

$$2. \int_1^e \ln^2 x \, dx.$$

Ечиш. Булаклаб интеграллаш формуласини икки марта татбиқ этиб, қуйидаги натижага эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln^2 x \, dx & \left| \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x, \end{array} \right| = \\ &= x \ln^2 x \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln x \, dx \left| \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x, \end{array} \right| = \\ &= e \ln^2 e - 2(x \ln x - x) \Big|_1^e = e - 2e + 2e - 2 = 0,72. \end{aligned}$$

$$3. \int_3^4 \frac{9x^2 - 14x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция тўғри касрдан иборат. Унинг махражини купайтувчиларга ажратамиз, сунгра содда рационал касрларнинг йиғиндиси куринашида ёзиб оламиз ва интегрални ҳисоблаймиз:

$$\int_3^4 \frac{9x^2 - 14x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx = \int_3^4 \frac{9x^2 - 14x + 1}{(x+1)(x-1)(x-2)} dx = \int_3^4 \left(\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2} \right) dx.$$

$$\begin{cases} 9x^2 - 14x + 1 = A(x-1)(x-2) + B(x+1)(x-2) + C(x+1)(x-1), \\ x = -1 \quad \begin{cases} 24 = 6A, \\ -4 = -2B, \\ 9 = 3C, \end{cases} \quad \begin{cases} A = 4, \\ B = 2, \\ C = 3 \end{cases} \end{cases}$$

$$= \int_3^4 \left(\frac{4}{x+1} + \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x-2} \right) dx =$$

$$= (4 \ln|x+1| + 2 \ln|x-1| + 3 \ln|x-2|) \Big|_3^4 =$$

$$= 4 \ln 5 + 2 \ln 3 + 3 \ln 2 - 4 \ln 4 - 2 \ln 2 = \ln(5^4 \cdot 3^2 \cdot 2) - \ln 4^4 = \ln \frac{5^4 \cdot 3^2 \cdot 2}{4^4} = \ln \frac{11250}{256} = 3,78.$$

$$4. \int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Ечиш.

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}} \quad \left| \begin{array}{l} \sqrt{x^2+1} = t, \quad x^2+1 = t^2, \quad x dx = t dt, \\ x=0 \text{ да } t=1, \quad x=1 \text{ да } t=\sqrt{2}. \end{array} \right| =$$

$$= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{(t^2-1)t}{t} dt = \int_1^{\sqrt{2}} (t^2-1) dt = \left(\frac{1}{3} t^3 - t \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = 0,20.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{4-3\cos^2 x + 5\sin^2 x}.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан жуфт функция бўлгани учун $t = \operatorname{tg} x$ алмаштиришни татбиқ этамиз ((4.21) формулага қаранг):

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{4-3\cos^2 x + 5\sin^2 x}$$

$$\left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \\ x=0 \text{ да } t=0, \quad x=\frac{\pi}{4} \text{ да } t=1 \end{array} \right| =$$

$$= \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2) \left(4 - \frac{3}{1+t^2} + \frac{5t^2}{1+t^2} \right)} = \int_0^1 \frac{dt}{9t^2+1} = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} 3t \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} (\operatorname{arctg} 3 - \operatorname{arctg} 0) = 0,42.$$

$$6. \int_0^1 \frac{2x-11}{\sqrt{3x-2x-x^2}} dx$$

Ечиш. Берилган интегрални шундай иккита интегралга ажратамизки, биринчи интеграл остидаги функциянинг сурати квадрат илдиш остидаги квадрат учҳаднинг ҳосиласидан иборат бўлсин. Зарур алмаштиришларни бажариб, натижада қуйидагига эга бўламиз:

$$\int_0^1 \frac{2x-11}{\sqrt{3x-2x-x^2}} dx = -4 \int_0^1 \frac{-2x-2}{\sqrt{3-2x-x^2}} dx - 19 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-(x+1)^2}} =$$

$$= -8\sqrt{3-2x-x^2} \Big|_0^1 - 19 \arcsin \frac{x+1}{2} \Big|_0^1 =$$

$$= 8\sqrt{3} - \frac{19}{2} \pi + \frac{19}{2} \pi \approx -6,05.$$

$$7. \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{10}{3}} \frac{x dx}{(3x-1)\sqrt{3x-1}}.$$

Ечиш. Берилган интеграл $\sqrt{3x-1} = t$ алмаштириш ёрдамида жадвал интегралига келтирилади:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{10}{3}} \frac{x dx}{(3x-1)\sqrt{3x-1}}$$

$$\left| \begin{array}{l} \sqrt{3x-1} = t, \quad 3x-1 = t^2, \quad x = \frac{1}{3}(t^2+1), \quad dx = \frac{2}{3}t dt, \\ x = \frac{2}{3} \text{ да } t=1, \quad x = \frac{10}{3} \text{ да } t=3 \end{array} \right| =$$

$$= \int_1^3 \frac{\frac{1}{3}(t^2+1) \cdot \frac{2}{3}t dt}{t^2 \cdot t} = \frac{2}{9} \int_1^3 \frac{t^2+1}{t^3} dt = \frac{2}{9} \left(t - \frac{1}{t} \right) \Big|_1^3 = 0,59.$$

8. Хосмас интегралларни ҳисобланг:

$$a) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9}; \quad b) \int_{-1}^1 \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} a) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2+4x+9} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9} = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_{\alpha}^0 \frac{dx}{(x+2)^2+5} + \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_0^{\beta} \frac{dx}{(x+2)^2+5} = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{5}} \Big|_{\alpha}^0 + \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{\sqrt{5}} \Big|_0^{\beta} = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{\alpha+2}{\sqrt{5}} \right) + \\ &+ \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{\beta+2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{\pi}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Демак, берилган интеграл яқинлашувчи.

$$\begin{aligned} 6) \int_{-1}^1 \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}} dx &= \int_{-1}^0 \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}} dx + \int_0^1 \frac{3x^2+2}{\sqrt[3]{x^2}} dx = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 0} \int_{-1}^{\beta} \left(3x^{\frac{4}{3}} + 2x^{-\frac{2}{3}} \right) dx + \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^1 \left(3x^{\frac{4}{3}} + 2x^{-\frac{2}{3}} \right) dx = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 0} \left(\frac{9}{7} x^{\frac{7}{3}} + 6x^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_{-1}^{\beta} + \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\frac{9}{7} x^{\frac{7}{3}} + 6x^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_{\alpha}^1 = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow 0} \left(\frac{9}{7} \beta^{\frac{7}{3}} + 6\beta^{\frac{1}{3}} + \frac{9}{7} + 6 \right) + \\ &+ \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\frac{9}{7} + 6 - \frac{9}{7} \alpha^{\frac{7}{3}} - 6\alpha^{\frac{1}{3}} \right) = 14 \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

Демак, берилган хосмас интеграл яқинлашувчи.

1-вариант

$$1. \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{4}{3}} \frac{dx}{x^2+1}.$$

$$2. \int_1^2 (y-1) \ln y dy.$$

$$3. \int_2^3 \frac{3x^2+2x-3}{x^3-x} dx.$$

$$4. \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3-x^2} dx.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg}^2 x dx.$$

$$6. \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{4x^2+4x+5}.$$

$$7. \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x-1}}{e^x+3} dx.$$

$$8. a) \int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} \frac{16x dx}{16x^4-1};$$

$$6) \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+9}}.$$

2-вариант

$$1. \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{25+3x}}.$$

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \operatorname{tg}^2 x dx.$$

$$3. \int_1^2 \frac{x dx}{(x-1)^3}.$$

$$5. \int_2^{\pi} \frac{\sin x}{(1-\cos x)^3} dx.$$

$$7. \int_{\ln 2}^{2 \ln 2} \frac{dx}{e^x - 1}.$$

$$8. a) \int_0^{\pi} \frac{4x dx}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}};$$

$$4. \int_0^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx.$$

$$6. \int_2^3 \frac{3x-2}{x^2-4x+5} dx.$$

$$6) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln 2 dx}{(1-x) \ln^2(1-x)}.$$

3-вариант

$$1. \int_0^2 \frac{x dx}{\sqrt{x^4+4}}.$$

$$3. \int_4^5 \frac{dx}{(x-1)(x+2)}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos x \sin 3x dx.$$

$$7. \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$$

$$8. a) \int_{\frac{1}{4}}^{\pi} \frac{x dx}{x^2 - 4x + 1};$$

$$2. \int_0^1 x \operatorname{arctg} x dx.$$

$$4. \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{(1+x^2)^3}}.$$

$$6. \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{(x-1)^2}{x^2 + 3x + 4} dx.$$

$$6) \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt[3]{\ln(2-3x)}}{2-3x} dx.$$

4-вариант

$$1. \int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx.$$

$$3. \int_3^4 \frac{dx}{(x+1)(x-2)}.$$

$$2. \int_0^4 x^3 \sqrt{x^2 + 9} dx.$$

$$4. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx.$$

$$5. \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{3} dx.$$

$$7. \int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{x+4}}.$$

$$8. a) \int_{-1}^{\pi} \frac{dx}{\pi(x^2 + 4x + 5)};$$

$$6. \int_4^5 \frac{x}{x^4 - 4x^2 + 3} dx.$$

$$6) \int_0^1 \frac{x}{1-x^4} dx.$$

5-вариант

$$1. \int_0^1 \frac{z^3}{z^2+1} dz.$$

$$3. \int_0^1 \frac{2x+3}{(x-2)^3} dx.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{3}} (32 \cos^2 4x - 16) dx.$$

$$7. \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}}.$$

$$8. a) \int_{-1}^{\pi} \frac{x dx}{x^2 + 4x + 5};$$

$$2. \int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx.$$

$$4. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(x^2+3)^3}}.$$

$$6. \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{x^3}{x^2+x+1} dx.$$

$$6) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 3x}{\sqrt[6]{(1-\sin 3x)^5}} dx.$$

6-вариант

$$1. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 - \cos^2 x}.$$

$$3. \int_2^3 \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{\sin^2 x + 1}.$$

$$2. \int_0^1 \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\sqrt{2-x}} dx.$$

$$4. \int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx.$$

$$6. \int_7^{10} \frac{x^3 dx}{x^2 - 3x + 2}.$$

$$7. \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{2+3x}}.$$

$$8. a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\pi(1+4x^2)} dx;$$

$$6) \int_0^1 \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

7-вариант

$$1. \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}}.$$

$$2. \int_1^2 \ln(3x+2) dx.$$

$$3. \int_3^5 \frac{(x^2+2)dx}{(x-1)^2(x-1)}.$$

$$4. \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(x^2+1)^2}.$$

$$5. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg}^4 x) dx.$$

$$6. \int_3^5 \frac{x^2 dx}{\sqrt{8x-x^2-15}}.$$

$$7. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}.$$

$$8. a) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{16 dx}{\pi(4x^2+4x+5)};$$

$$6) \int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}}.$$

8-вариант

$$1. \int_0^1 x^3 \sqrt{4+5x^4} dx.$$

$$2. \int_1^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx.$$

$$3. \int_0^1 \frac{x^4+3x^3-1}{(x+1)^2} dx.$$

$$4. \int_{2\sqrt{3}}^6 \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+9}}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx.$$

$$6. \int_0^1 \frac{dx}{x^2+4x+5}.$$

$$7. \int_0^1 \frac{x^2 dx}{(1+x)^4}.$$

$$8. a) \int_1^{\infty} \frac{x dx}{4x^2+4x+5};$$

$$6) \int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{3-4x}}.$$

9-вариант

$$1. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} dx.$$

$$2. \int_{-1}^0 x \ln(1-x) dx.$$

$$3. \int_{-1}^0 \frac{x^5-2x^2+3}{(x-2)^2} dx.$$

$$4. \int_1^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+1}}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x \cos 5x dx.$$

$$6. \int_{\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt{2-6x-9x^2}}.$$

$$7. \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+1}}.$$

$$8. a) \int_0^{\infty} \frac{(x+2)dx}{\sqrt[3]{(x^2+4x+1)^4}};$$

$$6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\operatorname{tg} x}}{\cos 2x} dx.$$

10-вариант

$$1. \int_1^2 \frac{e^x dx}{x^2}.$$

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x dx}{\cos^2 3x}.$$

$$3. \int_0^1 \frac{x dx}{x^2+3x+2}.$$

$$4. \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} dx.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx.$$

$$6. \int_4^7 \frac{dx}{x^2+3x-10}.$$

$$7. \int_{\frac{1}{2}}^{\ln 2} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}.$$

$$8. a) \int_0^{\pi} \frac{3-x^2}{x^2+4} dx;$$

$$6) \int_0^1 \frac{2e^{1-\frac{2}{\pi} \arcsin x}}{\pi \sqrt{1-x^2}} dx.$$

11-вариант

$$1. \int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$2. \int_0^1 \arcsin(1-x) dx.$$

$$3. \int_3^{10} \frac{x^2+3}{x^3-x^2-6x} dx.$$

$$4. \int_0^1 \frac{dx}{(9+x^2)\sqrt{9+x^2}}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos x}.$$

$$6. \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}}.$$

$$7. \int_0^{\sqrt{7}} \frac{z dz}{\sqrt{9+z^2}}.$$

$$8. a) \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sqrt{\arctg 2x} dx}{1+4x^2};$$

$$6) \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2-4}}.$$

12-вариант

$$1. \int_0^1 3(x^2 + x^2 e^{x^3}) dx.$$

$$2. \int_1^e x \ln^2 x dx.$$

$$3. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^4+x^2}.$$

$$4. \int_2^4 \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx.$$

$$5. \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg}^3 x dx.$$

$$6. \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-3-x^2}}.$$

$$7. \int_0^5 \frac{x dx}{\sqrt{3x+1}}.$$

$$8. a) \int_1^{\infty} \frac{4 dx}{x(1+\ln^2 x)};$$

$$6) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^2 x}}.$$

13-вариант

$$1. \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx.$$

$$2. \int_{-3}^0 (x-2)e^{-\frac{x}{3}} dx.$$

$$3. \int_2^3 \frac{x^2 dx}{1-x^4}.$$

$$4. \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 3x \cos 5x dx.$$

$$6. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2+2x+3}.$$

$$7. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{(x+1)^3}}.$$

$$8. a) \int_0^{\pi} x \sin x dx;$$

$$6) \int_{-\frac{3}{4}}^0 \frac{dx}{\sqrt{4x+3}}.$$

14-вариант

$$1. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{1+x^5}.$$

$$2. \int_{\frac{3}{2}}^2 \operatorname{arctg}(2x-3) dx.$$

$$3. \int_2^3 \frac{dx}{x^4-1}.$$

$$4. \int_0^{\sqrt{2.3}} \frac{dx}{(5-x^2)^3}.$$

$$5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^2 x dx.$$

$$6. \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}.$$

$$7. \int_{\ln 3}^0 \frac{1-e^x}{1+e^x} dx.$$

$$8. a) \int_{-1}^1 \frac{7 dx}{(x^2-4x) \ln 5};$$

$$6) \int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{(x^2-1)^3} \ln 2}.$$

15-вариант

1. $\int_1^e \frac{\sin \ln x \, dx}{x}$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+3) \sin x \, dx$
3. $\int_{-1}^0 \frac{x \, dx}{x^2-1}$
4. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx$
6. $\int_1^2 \frac{dt}{t^2+5t+4}$
7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos y \, dy}{4+\sqrt{\sin y}}$
8. а) $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\pi dx}{(1+9x^2) \operatorname{arctg}^2 3x}$; б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{9x^2-9x+2}$

16-вариант

1. $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$
2. $\int_1^2 x^2 \ln x \, dx$
3. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{2x^2+4}{x^3-x^2+x-1} \, dx$
4. $\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2-3}}$
5. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x}$
6. $\int_0^2 \frac{x \, dx}{x^2+3x+2}$
7. $\int_2^5 \frac{x^2 \, dx}{(x-1)\sqrt{x-1}}$
8. а) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{7dx}{(x^2+4)\sqrt{\pi \operatorname{arctg} \frac{x}{2}}}$; б) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin^3 x \, dx}{\sqrt{\cos x}}$

17-вариант

1. $\int_1^8 \sqrt{x+1} \, dx$
2. $\int_1^2 \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} \, dx$
3. $\int_4^8 \frac{dx}{x^2(x-1)}$
4. $\int_2^4 \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4} \, dx$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx$
6. $\int_1^2 \frac{x-5}{x^2-2x+2} \, dx$
7. $\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{1-e^{-2x}}}$
8. а) $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(x^3+2x) \ln 3}$; б) $\int_0^3 \frac{\sqrt[3]{9x} \, dx}{\sqrt[3]{9-x^2}}$

18-вариант

1. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \cos^3 \alpha \, d\alpha$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+2) \cos \frac{x}{2} \, dx$
3. $\int_0^2 \frac{dx}{(x+1)(x^2+4)}$
4. $\int_0^{\frac{\sqrt{7}}{2}} x^3 \sqrt{7+x^2} \, dx$
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\sin x} \, dx$
6. $\int_{-1}^1 \frac{x-5}{x^2+2x+5} \, dx$
7. $\int_1^{\frac{e^2}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$
8. а) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-3x} x \, dx$; б) $\int_0^1 \frac{x^4 \, dx}{\sqrt[3]{1-x^5}}$

19-вариант

1. $\int_{-\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{18}} 12 \operatorname{tg} 3x \, dx$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin 4x \, dx$

3. $\int_7^9 \frac{(x^2 - x + 2) \, dx}{x^4 - 5x^2 + 4}$

4. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2 - 8}}{x^4} \, dx$

5. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \operatorname{tg} x}{\sin 2x} \, dx$

6. $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 + 2x}$

7. $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}}$

8. a) $\int_{-1}^0 \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} - \frac{x}{1 + x^2} \right) dx$

6) $\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{64 - x^6}} \, dx$

20-вариант

1. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4 - 3x}}$

2. $\int_1^2 \sqrt{x} \ln x \, dx$

3. $\int_4^6 \frac{x \, dx}{x^3 - 6x^2 + 16x - 6}$

4. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^5 \sqrt{x^2 - 1}}$

5. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin 2x \, dx}{\cos^3 x}$

6. $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}}$

7. $\int_2^e \frac{\ln x \, dx}{x(1 - \ln^2 x)}$

8. a) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1}$

6) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - 2x}}$

21-вариант

1. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x \, dx}{\sqrt{4 - x^2}}$

2. $\int_0^1 \operatorname{arctg} \sqrt{x} \, dx$

3. $\int_1^2 \frac{dx}{x^3 + 1}$

4. $\int_0^3 x^4 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sin 3x \, dx$

6. $\int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{2x - 8}{\sqrt{1 - x - x^2}} \, dx$

7. $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} \, dx$

8. a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)}$

6) $\int_1^5 \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{31(x^3 - 1)}}$

22-вариант

1. $\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} \, dx$

2. $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{x \, dx}{e^{\frac{1}{3x}}}$

3. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^4 + 1}{x^5 + x^4} \, dx$

4. $\int_0^3 \frac{x^3 \, dx}{\sqrt{9 + x^2}}$

5. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sin 2x \sin 3x \, dx$

6. $\int_{\frac{3}{4}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2 + 3x - 2x^2}}$

7. $\int_{\sqrt[3]{9}}^{\sqrt[3]{26}} \frac{x^3 \, dx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}}$

8. a) $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x - 1)^2}$

6) $\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{3x - x^2 - 2}}$

1. $\int_{-1}^0 \frac{dx}{4x^2-9}$
2. $\int_1^{\pi} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$
3. $\int_2^3 \frac{x^3+x^2+2}{x(x^2-1)^2} dx$
4. $\int_0^{\sqrt{6}} \sqrt{6-x^2} dx$
5. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 x \sin^4 x dx$
6. $\int_{\frac{1}{6}}^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{3x^2-x+1}$
7. $\int_0^{13} \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x-1}} dx$
8. а) $\int_1^{\pi} \frac{dx}{(6x^2-5x+1) \ln \frac{3}{4}}$
- б) $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[4]{(16-x^2)^3}}$

24-вариант

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha \sin^3 \alpha d\alpha$
2. $\int_0^2 (y+1) \ln y dy$
3. $\int_3^5 \frac{x^3-2x^2+4}{x^2(x-2)^2} dx$
4. $\int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx$
5. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^3 x}$
6. $\int_3^4 \frac{x^2}{x^3-6x+10} dx$
7. $\int_{\ln 3}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x+4}}$
8. а) $\int_1^{\pi} \frac{dx}{9x^2-9x+2}$
- б) $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt[3]{1-4x}}$

1. $\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{x dx}{\cos^2 x^2}$
2. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \cos x dx$
3. $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \frac{x^2 dx}{x^4-1}$
4. $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^6} dx$
5. $\int_0^{\pi} \sin^4 \frac{x}{2} dx$
6. $\int_{3.5}^5 \frac{x}{x^2-7x+13} dx$
7. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{5-4x}}$
8. а) $\int_3^{\pi} \frac{dx}{3x^2-3x+2}$
- б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(2x-1)^2}$

6-§. Иккинчи мустақил уй иши

Иккинчи мустақил уй ишининг ҳар бир вариантида 7 та мисол бўлиб, уни қуйидагича бажариш керак:


Биринчи мисолда: берилган чизик билан чегараланган шаклнинг юзини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисоблаш керак.

Иккинчи мисолда: берилган чизик ёйи узунлигини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисоблаш керак.

Учинчи мисолда: тенгламаси берилган чизиклар билан чегараланган Ф шаклнинг кўрсатилган координата ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажми-ни (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисоблаш керак.

Туртинчи мисолда: z эгри чизик ёйининг кўрсатилган ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг юзини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисоблаш керак.

Бешинчи мисолда: Ридишдаги сувни чиқариб ташлаш учун сарф бўлган ишни ҳисоблаш керак. Сувнинг солиштирма



32-чизма.

чизмаларда берилган.

1—13-вариантлардаги еттинчи мисолнинг шарти қуйидагича: z эгри чизик билан чегараланган бир жинсли текис шакл оғирлик марказининг координаталарини топиш керак.

14—25-вариантлардаги еттинчи мисолнинг шарти қуйидагича: берилган чизиклар билан чегараланган текис бир жинсли Φ шаклнинг оғирлик маркази координаталарини топиш керак.

Вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1. $y = \ln x$ ва $y = \ln^2 x$ чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисобланг.

Е ч и ш. Берилган чизикларни ясаймиз (32-чизма). Берилган чизиклар кесишган нуқталарнинг координаталарини топамиз: $M_1(1;0)$, $M_2(e;1)$. Энди (5.9) формуладан фойдаланамиз:

$$S = \int_1^e (\ln x - \ln^2 x) dx,$$

$$\int \ln^2 x dx \left| \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x \end{array} \right| =$$

$$= x \ln^2 x - 2 \ln x dx,$$

$$\int \ln x dx \left| \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx, \\ dv = dx, \quad v = x \end{array} \right| =$$

$$= x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

оғирлиги: $9,81 \text{ кН/м}^3$ ва $\pi = 3,14$ деб олинг. Натижани бутун қисмигача яхлитланг.

Олтинчи мисолда: сувга вертикал ботирилган пластинкага сувнинг босим кучини ҳисоблаш керак. Сувнинг солиштирма оғирлиги: $9,81 \text{ кН/м}^3$. Натижани бутун қисмигача яхлитланг. Пластинканинг шакли, ўлчамлари ва жойлашиш чизмаси 38—62-

У ҳолда

$$S = \int_1^e \ln x dx - \int_1^e \ln^2 x dx =$$

$$= (x \ln x - x) \Big|_1^e - (x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) \Big|_1^e =$$

$$= e \ln e - e + 1 - (e \ln^2 e - 2e \ln e + 2e) + 2 = 3 - e = 0,28.$$

2. $x = (t^2 - 2) \sin t + 2t \cos t$, $y = (2 - t^2) \cos t + 2t \sin t$ ($0 \leq t \leq \pi$) чизик ёйи узунлигини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисобланг

Е ч и ш. (5.13) формуладан фойдаланамиз:

$$l = \int_0^\pi \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

Интеграл остидаги функцияларни топамиз:

$$\frac{dx}{dt} = 2t \sin t + (t^2 - 2) \cos t + 2 \cos t - 2t \sin t = t^2 \cos t,$$

$$\frac{dy}{dt} = -2t \cos t - (2 - t^2) \sin t + 2 \sin t + 2t \cos t = t^2 \sin t,$$


$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{t^4 \cos^2 t + t^4 \sin^2 t} = t^2.$$

У ҳолда изланаётган ёй узунлиги:

$$l = \int_0^\pi t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_0^\pi = \frac{\pi^3}{3} \approx 10,32.$$

3. $x - 2y + 6 = 0$, $x = 2$ ва $y = 0$ чизиклар билан чегараланган текис шаклни абсциссалар ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисобланг.


Е ч и ш. Текис фигурани ясаймиз (33-чизма). $x - 2y + 6 = 0$ тўғри чизик Ox ўқни $A(-6;0)$ нуқтада кесиб ўтади. Интеграллаш чегаралари: $a = -6$, ва $b = 2$. ABC учбурчакнинг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган конуснинг ҳажмини (5.16) формула бўйича ҳисоблаймиз:



33-чизма.

$$V = \pi \int_{-6}^2 \left(\frac{1}{2}x + 3 \right)^2 dx = \pi \int_{-6}^2 \left(\frac{1}{4}x^2 + 3x + 9 \right) dx = \\ = \pi \left(\frac{x^3}{12} + \frac{3x^2}{2} + 9x \right) \Big|_{-6}^2 \approx 133,98.$$

4. $r = 10 \sin \varphi$ айлананинг O l кутб уқ атрофида айланишидан ҳосил булган сиртнинг юзини (вергулдан кейинги иккита рақамигача аниқлик билан) ҳисобланг (34-чизма).



34-чизма.

Е ч и ш. (5.17) ва (5.14) формулалардан (кутб координаталар системасида ёзилишидан) фойдаланамиз:

$$S = 2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} y \sqrt{r'^2 + r^2} d\varphi, \text{ бунда } y = r \sin \varphi.$$

Сўнгра, $r'_{\varphi} = 10 \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi = 10 \sin \varphi \sin \varphi = 10 \sin^2 \varphi$, $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi$.


Бу қийматларни ўрнига қўямиз:

$$S = 2\pi \int_0^{\pi} 10 \sin^2 \varphi \sqrt{100 \cos^2 \varphi + 100 \sin^2 \varphi} d\varphi = \\ = 200\pi \int_0^{\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = 200\pi \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi = \\ = 100\pi \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} = 985,96.$$

5. Асоснинг радиуси 1 м, узунлиги 5 м булган цилиндрик цистерна 35-чизмада кўрсатилганидек ҳолатда булиб, сув билан тўлдирилган. Цистернанинг юқоридаги тешигидан сувни тортиб чиқариш учун зарур буладиган ишни ҳисобланг. Сувнинг солиштирма оғирлиги: $g = 9,8 \text{ кН/м}^3$. Натижани бутун қисмигача яхлитланг.

Е ч и ш. z баландликдан dz қатлам сувни ажратиб оламиз (35-чизма). Унинг ҳажми:

$$dV = 2|0, B| Z dz = 2z \sqrt{R^2 - (R - r)^2} dz = 2z \sqrt{z(2R - r)} dz.$$



35-чизма.

Бу қатламни $H = 2R - z$ балангликка кўтариш керак. dz қатламдаги сувни чиқариб ташлаш учун dA элементар иш қуйидаги формула билан аниқланади:

$$dA = H \gamma dV = 2\gamma l(2R - z)\sqrt{z(2R - z)}dz.$$

Ҳамма сувни чиқариб ташлаш учун бажарилган A иш барча элементар ишларнинг йиғиндисига тенглигидан:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2R} dA = \int_0^{2R} 2\gamma l(2R - z)\sqrt{z(2R - z)}dz = \\ &= 2\gamma l \int_0^{2R} z^{\frac{1}{2}} (2R - z)^{\frac{3}{2}} dz. \end{aligned} \quad (1)$$

Энди (1) интегрални ҳисоблаймиз. Бу интеграл биномиал дифференциални интеграллашдан иборат бўлгани учун, (4.19) формула ёрдамида топамиз. $m = \frac{1}{2}$, $n = 1$, $p = \frac{3}{2}$ ва $\frac{m+1}{2} + p = 3$ бўлгани учун $a + bx^n = u^2 x^n$ алмаштиришни бажарамиз:

$$\begin{aligned} A &= 2\gamma l \int_0^{2R} z^{\frac{1}{2}} (2R - z)^{\frac{3}{2}} dz \quad \left| \begin{array}{l} 2R - z = u^2 z, \quad dz = \\ z = \frac{2R}{u^2 + 1}, \text{ агар } z = \end{array} \right. \\ &= -4Ru(u^2 + 1)^{-2} du, \\ &= 0 \text{ бўлса, } u = \infty, \text{ агар } z = 2R \text{ бўлса, } u = 0 \end{aligned}$$

$$= 32\gamma l R^3 \int_0^{\infty} \frac{u^4 du}{(u^2 + 1)^4}.$$

Ҳосил бўлган интеграл хосмас интеграл бўлиб, интеграл остидаги каср тўғри каср ва уни содда рационал касрлар йиғиндисига кўринишида ёзиб оламиз. Сўнгра ҳосил бўлган интегралларга (4.6) формулани, яъни махраж даражасини пасайтиришнинг рекуррент формуласини татбиқ қиламиз:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{u^4 du}{(u^2 + 1)^4} &= \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{(u^2 + 1)^2} - \frac{2}{(u^2 + 1)^3} + \frac{1}{(u^2 + 1)^4} \right) du = \\ &= \frac{\pi}{4} - 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$A = 32\gamma l R^3 \cdot \frac{\pi}{32} = \pi \gamma l R^3.$$

Агар $l = 5$ м, $R = 1$, $\gamma = 9,81$, $\pi = 3,14$ қийматларни ўрнига қўйсак,

$$A = 3,14 \cdot 9,81 \cdot 5 \cdot 1 = 154 \text{ кЖ}$$


натижага эга бўламиз.

6. 36-чизмада тасвирланган пластинка сувга вертикал қилиб шундай ботирилганки, унинг битта қирраси сув сиртида ётади. Сувнинг солиштира оғирлиги $9,81 \text{ кН/м}^3$ деб унинг пластинкага берган босим кучини ҳисобланг.

Е ч и ш. Координаталар системасини 36-чизмада кўрсатилганидек оламиз. У ҳолда эгри чизиқ $x^2 = -2py$ параболанинг содда тенгламаси бўлади. Парабола $A\left(\frac{1}{2}; -1\right)$ нуқтадан ўтганлиги учун $p = \frac{1}{8}$ бўлади ва $x^2 = -\frac{y}{4}$ параболанинг тенгламасига эга бўламиз. x чуқурликда эни dx бўлган горизонтал чизиқлар билан чегараланган юзчани оламиз. Унинг юзи: $ds = (1 - |y|) dx$. Бу юзчага таъсир этувчи сувнинг босими $\Delta P = \gamma x(1 - |y|) dx = \gamma x(1 - 4x^2) dx$ га тенг.

У ҳолда сувнинг бутун пластинкага босими:

$$P = \gamma \int_0^H x(1 - 4x^2) dx = \gamma \left(\frac{x^2}{2} - x^4 \right) \Big|_0^H = \gamma \left(\frac{H^2}{2} - H^4 \right).$$



36-чизма.

$H = \frac{1}{2}$ м ва $g = 9,81 \text{ кН/м}^3$ қийматларни ўрнига қўйсак:

$$P = 9,81 \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{16} \right) = \frac{9,81}{16} \approx 0,61 \text{ кН}.$$

7. $y = x^2$ ва $y = \sqrt{x}$ эгри чизиқлар билан чегараланган бир жинсли шакл оғирлик марказининг координаталарини топинг.

Ечиш. Берилган шакл (37-чизма) оғирлик марказининг координаталари (5.20) формула ёрдамида ҳисобланади, бунда

$$f_1(x) = x^2, f_2(x) = \sqrt{x}.$$


Эгри чизиқларнинг кесишиш нуқтаси $(0;0)$ ва $B(1;1)$ бўлгани учун $a = 0$, $b = 1$ бўлади. Дастлаб қуйидаги интегрални ҳисоблаб оламиз:

$$\int_0^1 (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\int_0^1 x(f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{20}.$$

Бу қийматларни (5.20) га қўйсак:

$$x_c = y_c = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{3}} = \frac{9}{20}.$$



37-чизма.

1-вариант

1. $r = 3 \cos 2\varphi$.

2. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$.

3. $\Phi: x = 3 \cos^2 t, y = 4 \sin^2 t \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$, Oy .

4. $J: y = \sqrt{x}$ эгри чизиқнинг $y = x$ тўғри чизиқ билан кесилган қисмини, Ox .

5. P — юқори асосининг радиуси 1 м, пастки асосининг радиуси 2 м, баландлиги 3 м бўлган кесик конус.

6. 38-чизма.

7. $J: \rho = a(1 + \cos \varphi)$, $(0 \leq \varphi \leq \pi)$ кардиоида ёйи.

2-вариант

1. $r = 2(1 - \cos \varphi)$.

2. $y^2 = (x + 1)^2$ эгри чизиқнинг $x = 4$ тўғри чизиқ билан кесилган қисми.

3. $\Phi: x = \sqrt{1 - y^2}$, $y = \sqrt{\frac{3}{4}}x$, $y = 0$, Ox .

4. $J: x = 2(t - \sin t)$, $y = 2(1 - \cos t)$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$, Ox .

5. P — асосининг радиуси 1 м, узунлиги 5 м бўлган цилиндрлик цистерна.

6. 39-чизма.

7. $J: \rho = ae^{\varphi} \left(\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi \right)$ логарифмик спирал ёйи.

3-вариант

1. $r^2 = 2 \sin 2\varphi$.

2. $y = 1 - \ln \cos x$, $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \right)$.

3. $\Phi: y^2 = (x - 1)^3$, $x = 2$, Ox .

4. $J: x = \cos t$, $y = 3 + \sin t$, Ox .


5. P — асоси 2 м ва баландлиги 5 м бўлган мунтазам учбурчакли пирамида.

6. 40-чизма.


7. $J: x = 3(t - \sin t)$, $y = 3(1 - \cos t)$ циклоиданинг бир арки.

4-вариант


1. $x = 4(t - \sin t)$, $y = 4(1 - \cos t)$.




38-чизма.



39-чизма.



40-чизма.



41-чизма.

2. $r = 6 \cos^3 \frac{\varphi}{3} \left(0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right)$.

3. $\Phi: y = \sqrt{1-x^2}, y = \sqrt{\frac{3}{2}}x, y=0, Ox$.

4. $J: 3x = y^3 (0 \leq y \leq 2), Oy$.

5. P — юқори асосининг томони 4 м, баландлиги 6 м, учи пастга йўналтирилган мунтазам учбурчакли пирамида.

6. 41-чизма.

7. $J: x = 2 \cos^3 \frac{t}{4}, y = 2 \sin^3 \frac{t}{4}$ биринчи квадрантда жойлашган астроида ёйи.

5-вариант

1. $r = 2(1 + \cos \varphi)$.

2. $x = 4 \cos^3 t, y = 4 \sin^4 t$.

3. $\Phi: y = \sin x, y = 0, (0 \leq x \leq 2), Ox$.

4. $J: y = \frac{x}{3} (-1 < x \leq 1), Ox$.

5. P — асосининг радиуси 3 м, баландлиги 5 м, учи пастга йўналтирилган конус.

6. 42-чизма.

7. $J: x = e^t \sin t, y = e^t \cos t \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$ эгри чизиқ ёйи.

6-вариант

1. $r = 2 \sin 3\varphi$.

2. $y^2 = (x-1)^3$ эгри чизиқнинг $A(1;0)$ нуқтадан $B(6; \sqrt{125})$ нуқтагача қисми.

3. $\Phi: y^2 = 4x; x^2 = 4y, Ox$.

4. $J: x = \cos t, y = 1 + \sin t, Ox$.

5. P — устки асосининг радиуси 3 м, пасткисиники 1 м, баландлиги 3 м бўлган кесик конус.

6. 43-чизма.


7. $J: \rho = 2(1 + \cos \varphi)$ кардиоида ёйи.

7-вариант


1. $r = 2 + \cos \varphi$.

2. $y^2 = x^2$, эгри чизиқнинг $x = 5$ тўғри чизиқ билан кесилган қисми.


3. $\Phi: x = 2 \cos t, y = 5 \sin t, Oy$.




42-чизма.




43-чизма.



44-чизма.



45-чизма.



46-чизма.

272

4. $J: x^2 = 4 + y$, эгри чизиқнинг $y = 2$ тўғри чизиқ билан кесилган қисмини. Оу.

5. P — асосининг радиуси 2 м ва баландлиги 5 м бўлган конус.

6. 44-чизма.

7. $J: r = 2 \sin \varphi$ эгри чизиқнинг $(0,0)$ нуқтасидан $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ нуқтасигача ёйи.

8-вариант

1. $y = \frac{1}{1+x^2}, y = \frac{x^2}{2}$.

2. $r = 3 \cos \varphi$.

3. $\Phi: y = x^2, 8x = y^2$, Оу.

4. $J: x = 3(t - \sin t), y = 3(1 - \cos t)$ ($0 \leq x \leq 2\pi$).

5. P — юқори асосининг томони 8 м, пастки асоснинг томони 4 м, баландлиги 2 м бўлган мунтазам туртбурчакли кесик пирамида.

6. 45-чизма.

7. $J: x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t)$ ($0 \leq x \leq \pi$) айлана ёйи.

9-вариант

1. $y^2 = x + 1, y^2 = 9 - x$.

2. $r = 3(1 - \cos \varphi)$.

3. $\Phi: y = e^x, x = 0, y = 0, x = 1$, Ох.

4. $J: x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$, Ох.

5. P — асосининг радиуси 2 м, чуқурлиги 4 м бўлган параболоид.

6. 46-чизма.


7. $J: \rho = 2\sqrt{3} \cos \varphi$ эгри чизиқнинг $\varphi = 0$ ва $\varphi = \frac{\pi}{4}$ нурлари орасидаги ёйи.

10-вариант


1. $y^2 = x^3, x = 0, y = 4$.

2. $r = 2 \cos^3 \frac{\varphi}{3}$.


3. $\Phi: y^2 = \frac{4x}{3}, x = 3$, Ох.




47-чизма.



48-чизма.



49-чизма.



50-чизма.

4. $J: r = \sqrt{\cos 2\varphi}$ қутб ўқи атрофида.
5. P — асосининг радиуси 1 м, чуқурлиги 2 м бўлган ярим эллипсоид.
6. 47-чизма.
7. $J: x = \sqrt{3}t^2, y = t - t^3 (0 \leq t \leq 1)$ эгри чизиқ ёйи.

11-вариант


1. $r = 4\sin^2\varphi$.
2. $x = 5\cos^2t, y = 5\sin^2t (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$.
3. $\Phi: y = 2x - x^2, y = 0, Ox$.
4. $J: y^2 = 4 + x$ параболани $x = 2$ тўғри чизиқ билан ажратган қисмини, Ox .
5. P — юқори асосининг томони 2 м, пастки асосининг томони 4 м, баландлиги 1 м бўлган мунтазам тўртбурчакли кесик пирамида.
6. 48-чизма.
7. $J: x^2 + y^2 = R^2$ айлананинг Ox ўқидан юқоридаги ярим қисми.

12-вариант


1. $x = 3\cos t, y = 2\sin t$.
2. $9y^2 = 4(3 - x)^2$ эгри чизиқнинг Oy ўқини кесган нуқталари орасидаги ёйни.
3. $\Phi: r = 2(1 + \cos\varphi)$, қутб ўқи.
4. $J: y^2 = 2x$, эгри чизиқнинг $2x = 3$ тўғри чизиқ билан ажратган қисмини, Ox .
5. P — асосининг томони 1 м ва баландлиги 2 м бўлган мунтазам тўртбурчакли пирамида.
6. 49-чизма.
7. $J: x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq x \leq 2\pi)$ циклоиданинг биринчи арк ёйи.

13-вариант


1. $y^2 = 9x, y = 3x$.
2. $r = 3\sin\varphi$.
3. $\Phi: x = 7\cos^3t, y = 7\sin^3t, Oy$.
4. $J: 3y = x^3 (0 \leq x \leq 1), Ox$.




51-чизма.



52-чизма.




53-чизма.



54-чизма.



55-чизма.



56-чизма.

5. P — асосининг томони 2 м, баландлиги 6 м ва учи пастга йўналган мунтазам олти бурчакли пирамида.

6. 50-чизма.

7. $J: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ астроиданинг учинчи квадрантда жойлашган ёйи.

14-вариант

1. $x = 3(\cos t + t \sin t)$, $y = 3(\sin t - t \cos t)$, $y = 0$, $(0 \leq x \leq 2\pi)$.

2. $y = \ln \sin x$ $(\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2})$.

3. $\Phi: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} = 1$, Ox .

4. $J: r^2 = 4 \cos 2\varphi$, қутб ўқи атрофида.

5. P — асосининг радиуси 1 м ва баландлиги 3 м бўлган цилиндр.

6. 51-чизма.

7. Φ — томонлари $x + y = a$, $x = 0$ ва $y = 0$ тўғри чиқлар устида ётувчи учбурчак

15-вариант

1. $y^2 = 4x$, $x^2 = 4y$.

2. $x = 9(t - \sin t)$, $y = 9(1 - \cos t)$ $(0 \leq t \leq 2\pi)$.

3. $\Phi: x^3 = (y - 1)^2$, $x = 0$, $y = 0$, Ox .

4. $J: r = 6 \sin \varphi$, қутб ўқи атрофида.

5. P — юқори асосининг томони 1 м, пастки асосининг томони 2 м, баландлиги 2 м бўлган мунтазам олти бурчакли кесик пирамида.

6. 52-чизма.

7. $\Phi: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипс ва $(x \leq 0, y \leq 0)$ координата ўқлари билан чегараланган шакл.

16-вариант

1. $y^2 = x^3$, $x = 2$.

2. $r = 2(1 - \cos \varphi)$.

3. $\Phi: xy = 4$, $2x + y - 6 = 0$, Ox .

4. $J: x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ $(0 \leq t \leq 2\pi)$.

5. P — тарновнинг перпендикуляр кесими радиуси 1 м бўлган ярим айланадан, тарновнинг узунлиги 10 м.

6. 53-чизма.

7. $\Phi: x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ циклоида биринчи аркининг Ox ўқи билан чегараланган қисми.

17-вариант

1. $y^2 = x^2, y = 2 - x^2$.

2. $y^2 = (x - 1)^2$ $A(2; -1)$ нуқтадан $B(5; -8)$ нуқтагача.

3. $\Phi: x = \sqrt{3} \cos t, y = 2 \sin t, Oy$.

4. $J: r = 2 \sin \varphi$, қутб ўқи атрофида.

5. P — юқори асосининг томони 2 м, пастки асосининг томони 1 м, баландлиги 2 м бўлган мунтазам олти бурчакли кесик пирамида.

6. 54-чизма.

7. $\Phi: y^2 = x, y = x^2$ эгри чизиқлар билан чегараланган шакл.

18-вариант

1. $y^2 = 4/0x^3, x = 0$.

2. $x = 7(t - \sin t), y = 7(1 - \cos t)$ ($2\pi \leq t \leq 4\pi$).

3. $\Phi: y = 2 - x^2, y = x^2, Ox$.

4. $J: r = \frac{2}{3} \cos \varphi$, қутб ўқи атрофида.

5. P — радиуси 2 м бўлган ярим сфера.

6. 55-чизма.

7. $\Phi: y = \sqrt{R^2 - x^2}$ айлананинг Ox ўқи билан чегараланган юқори қисми.

19-вариант

1. $r = 3 \sin 4\varphi$.

2. $y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}$ ($0 \leq x \leq 2$).

3. $\Phi: y = -x^2 + 8, y = x^2, Ox$.

4. $J: x = 3 \cos^3 t, y = 3 \sin^3 t, Ox$.

5. P — асосининг томони 2 м ва баландлиги 5 м бўлган мунтазам тўртбурчакли пирамида.

6. 56-чизма.

7. $\Phi: y = b\sqrt{\frac{x}{a}}$ ($a > 0, b > 0$) парабола ёйи, Oy ўқи ва $y = b$ тўғри чизиқлар билан чегараланган шакл.

20-вариант

1. $y = x^3, y = 1, x = 0$.

2. $x = 4 \cos^3 t, y = \sin^3 t$.

3. $\Phi: y^2 = (x + 4)^3, x = 0, Ox$.

4. $J: x = 2 \cos t, y = 3 + 2 \sin t, Ox$.

5. P — асосининг томони 2 м, баландлиги 6 м бўлган ва учи билан пастга йўналган мунтазам тўртбурчакли пирамида.

6. 57-чизма.

7. $\Phi: y^2 = ax^3 - x^4$ эпик чизиқ билан чегараланган шакл.

21-вариант

1. $xy = 6, x + y - 7 = 0$.

2. $x = \sqrt{3}t^2, y = t - t^3$ (сиртмоқ).

3. $\Phi: y = x^3, x = 0, y = 8, Oy$.

4. $J: r^2 = 9 \cos 2\varphi$, қутб ўқи атрофида.

5. P — шакли сферик сегментдан иборат бўлиб, радиуси 1 м ва баландлиги 1,5 м га тенг қозон.

6. 58-чизма.

7. Φ : координата ўқлари ва биринчи квадрантда жойлашган астроида ёйи билан чегараланган шакл.

22-вариант

1. $y = 2x, y = 2x - x^2, x = 0, x = 2$.

2. $r = 5 \sin \varphi$.

3. $\Phi: x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, Ox$.

4. $J: y = x^3$, эгри чизиқнинг $x = \pm \frac{2}{3}$ тўғри чизиқлар орасидаги қисмини.

5. P — асосининг радиуси 1 м, узунлиги 5 м бўлган ярим цилиндр.


6. 59-чизма.

7. $\Phi: r = a(1 + \cos \varphi)$ кардиоида билан чегараланган шакл.


23-вариант

1. $x^2 = 4y, y = \frac{8}{x^2 + 4}$.


2. $r = 4 \cos \varphi$.




57-чизма.




58-чизма.



59-чизма.



60-чизма.



61-чизма.


3. $\Phi: 2y = x^2, 2x + 2y - 3 = 0$.
4. $J: x = 2\cos^3 t, y = 2\sin^3 t, O\pi$.
5. P — тарновнинг перпендикуляр кесими параболадан иборат. Тарновнинг узунлиги 5 м, эни 4 м, чуқурлиги 4 м га тенг.
6. 60-чизма.
7. $\Phi: r^2 = a^2 \cos 2\varphi$ Бернулли лемнискатасининг биринчи сиртмоги билан чегараланган шакло.

24-вариант

1. $y = x + 1, y = \cos x, y = 0$.
2. $r = 5(1 + \cos \varphi)$.
3. $\Phi: y = x - x^2, y = 0, O\pi$.
4. $J: x = \cos t, y = 2 + \sin t, O\pi$.
5. P — асоснинг радиуси 8 м, баландлиги 10 м бўлган конус шаклидаги воронка учи пастга қилиб қўйилган.
6. 61-чизма.
7. Φ : координата ўқлари ва $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ парабола билан чегараланган шакл.

25-вариант

1. $x = 2\cos^3 t, y = 2\sin^3 t$.
2. $y^2 = x^3$ эгри чизиқнинг $A(0;0)$ нуқтадан $B(4;8)$ нуқтагача қисми.
3. $\Phi: y = 2 - \frac{x^2}{2}, x + y = 2, O\pi$.
4. $J: r = 4\sin \varphi$ қутб ўқи атрофида.
5. P — радиуси 1 м бўлган ярим шар шаклидаги қозон.
6. 62-чизма.
7. $\Phi: x = a (a > 0)$ тўғри чизиқ ва $ay^2 = x^3$ ярим кубик парабола билан чегараланган шакл.



62-чизма.

БИР НЕЧА ЎЗГАРУВЧИЛИ ФУНКЦИЯЛАРНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИСОБИ

1-§. Бир неча ўзгарувчиلى функциялар ҳақида тушунча. Хусусий ҳосила

1 таъриф. Агар D соҳадаги ҳар бир $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ нуқтага бирор қоида ёки қонунга кўра битта ҳақиқий сон $z (z \in R)$ мос қўйилган бўлса, D соҳада *кўп ўзгарувчиلى* (n та ўзгарувчиلى) функция берилган (аниқланган) деб аталади ва уни

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

каби белгиланади. Бунда D — функциянинг берилиш (аниқланиш) соҳаси, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — эркин ўзгарувчилар функциянинг аргументлари, z эркин ўзгарувчи эса $x_1, x_2, \dots, x_n$ ўзгарувчиларнинг функцияси дейилади.

Икки ўзгарувчиلى функция $z = f(x, y)$, $z = \varphi(x, y)$, $z = z(x, y)$ ва ҳ.к. кўринишда белгиланади.


Ҳар қандай $z = f(x, y)$ тенглама *Оху*з декарт координаталар системасида бирор сиртни ифодалайди. Бу сирт икки ўзгарувчиلى функциянинг графиги дейилади. Шунингдек, бу сиртдаги барча $M(x; y; z)$ нуқталар тўпламининг координаталари $z = f(x, y)$ тенгламани қаноатлантиради (63-чизма).

1-мисол. $z = \ln(y + 2x - x^2)$ функциянинг аниқланиш соҳаси D ни ва функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

Ечиш. Берилган функция *Оху*з текисликдаги $y + 2x - x^2 > 0$ ёки $y > x^2 - 2x$ тенгсизликни қаноатлантирадиган нуқталарда маънога эга.

Текисликда $y = x^2 - 2x$ тенгламани қаноатлантирувчи нуқталар тўплами D соҳанинг чегарасини ташкил этади. $y = x^2 - 2x$ тенглама параболадан иборат бўлиб, y D соҳага тегишли эмас (64-чизма). $y = x^2 - 2x$ парабола ичига жойлашган нуқталар тўплами $y > x^2 - 2x$ тенгсизликни қаноатлантиради. Шунинг учун D соҳа очиқ ва уни қуйидаги тенгсизликлар системаси ёрдамида ёзиш мумкин:

$$D: \{-\infty < x < +\infty; x^2 - 2x < y < +\infty\}.$$



63-чизма.

Логарифм ишораси остидаги ифода исталганча кичик ва исталганча катта мусбат қийматларни қабул қилганлиги учун функциянинг қийматлар соҳаси:


$$E: \{-\infty < z < +\infty\}.$$

2-таъриф. Агар исталган $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta > 0$ сон атофи топилсаки, ушбу $0 < |x - x_0| < \delta$ ва $0 < |y - y_0| < \delta$ тенгсизликларни қаноатлантирувчи барча $(x; y) \in D$ нуқталарда

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

тенгсизлик ўринли бўлса, y ҳолда A сон $z = f(x, y)$ функциянинг $M_0(x_0; y_0)$ нуқтадаги *лимити* деб аталади.

Агар A сон $z = f(x, y)$ функциянинг $M_0(x_0; y_0)$ нуқтадаги



64-чизма.

лимити бўлса, бу қуйидагича ёзилади:

$$A = \lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y).$$

2-мисол. $A = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ лимитини ҳисобланг.

Ечиш. Лимит белгиси остидаги ифодани элементар алмаштириш ёрдамида соддаштириб, топамиз:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)} = \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{x^2 + y^2 + 1 - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1) = 2. \end{aligned}$$

3-таъриф. Агар

$$A = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

тенглик ўринли бўлса, у ҳолда $z = f(x, y)$ функция $M_0(x_0, y_0)$ нуқтада узлуксиз дейилади.

Масалан, $z = \frac{1}{2x^2 + y^2}$ функция текисликнинг $M(0; 0)$ нуқтасидан бошқа ҳамма нуқталарда узлуксиз. Бунда $M(0; 0)$ нуқта узилиш нуқтаси бўлади.

Агар D соҳанинг ҳамма нуқталарида функция узлуксиз бўлса, у ҳолда, берилган функция шу соҳада узлуксиз дейилади.

Агар x ўзгарувчига Δx орттирма бериб, у ни ўзгармас деб олсак, у ҳолда $z = f(x, y)$ функциянинг x ўзгарувчи бўйича хусусий орттirmасига эга бўламиз ва у қуйидагича ёзилади:

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

Худди шунингдек, агар у ўзгарувчига Δy орттирма бериб, x ни ўзгармас деб олсак, у ҳолда $z = f(x, y)$ функциянинг y ўзгарувчи бўйича хусусий орттirmасини ҳосил қиламиз:

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Агар қуйидаги

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x} = z'_x = f'_x(x, y),$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \frac{\partial z}{\partial y} = z'_y = f'_y(x, y)$$

лимитлар мавжуд бўлса, улар $z = f(x, y)$ функциянинг x ва y ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳосилалари дейилади.

Бир неча ўзгарувчи функциянинг хусусий ҳосиласи бу ўзгарувчилардан бирининг функциясининг ҳосиласи сифатида топилади. Шунинг учун бир ўзгарувчи функциянинг ҳосилалари учун келтириб чиқарилган барча дифференциаллаш формулалари ва қоидалари бир неча ўзгарувчи функциянинг хусусий ҳосилалари учун ҳам сақланади. Бу ерда фақат бирор аргумент бўйича хусусий ҳосилани топиш учун бу қоидалар ва формулаларни қўлланилаётганда қолган аргументлар ўзгармас деб ҳисобланишини ёлда тутиш лозим.

3-мисол. $z = \operatorname{arccotg} \frac{y}{x}$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. Юқорида айтилганларга кўра топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{x}{x^2 + y^2}.$$

4-мисол. $u = \ln^2(x^2 + y^2 + z^2)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 \ln(x^2 + y^2 + z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2x = \frac{4x \ln(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2 \ln(x^2 + y^2 + z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2y = \frac{4y \ln(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2 \ln(x^2 + y^2 + z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2z = \frac{4z \ln(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$z = f(x, y)$ функциянинг хусусий дифференциаллари қуйидагича аниқланади:

$$d_x z = f'_x(x, y) dx, \quad d_y z = f'_y(x, y) dy,$$

бунда $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$ бўлиб, унга эркин x ва y ўзгарувчининг дифференциали дейилади.

5-мисол. $u = (xy^2)^{z^2}$ функциянинг хусусий дифференциалларини топинг.

Ечиш.

$$d_x u = z^2 (xy^2)^{z^2-1} \cdot y^2 dx,$$

$$d_y u = z^2 (xy^2)^{z^2-1} \cdot 2xy dy,$$

$$d_z u = (xy^2)^{z^2} \cdot \ln(xy^2) \cdot 2z dz.$$

6-мисол. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ функциянинг x , y , z ўзгарувчиларга нисбатан хусусий ҳосилаларининг $P(2; -2; 1)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - yz,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - xz,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - xy.$$

Бу ифодаларга берилган нуқтанинг координаталарини қўямиз:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = -\frac{2}{3} - 2 = -\frac{8}{3}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}.$$

315. Қуйидаги функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг:

а) $z = \sqrt{y^2 - 2x + 4}$;

б) $z = \frac{1}{\sqrt{x+y}} + \sqrt{x-y}$;

в) $z = \ln(4 - x^2 + y^2)$;

г) $z = \sqrt{4 - x^2 + y^2}$;

д) $z = \ln x + \ln \cos y$;

е) $z = \sqrt{x^2 - y^2 - 9}$;

ж) $z = \sqrt{xy} + \sqrt{x-y}$;

з) $z = \sqrt{4 - y^2 + x}$.

316. Қуйидаги функцияларнинг хусусий ҳосилаларини топинг:

а) $z = (x^3 + y^3 - xy^2)^3$;

б) $z = \arcsin \frac{y}{x}$;

в) $z = x\sqrt{y} + \frac{y}{x}$;

г) $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$;

д) $z = \ln(xy + \ln xy)$;

е) $z = \sin^2(x \cos^2 y + y \sin^2 x)$;

ж) $z = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{z}$;

з) $z = \ln \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{x^2 + z^2}}$.

317. Агар $u = \ln(1 + x + y^2 + z^2)$ бўлса, $u'_x + u'_y + u'_z$ нинг $M_0(1; 1; 1)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

318. $z = x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$ функция хусусий ҳосилаларининг $M_0(3; 4)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

319. Қуйидаги функцияларнинг хусусий дифференциалларини топинг:

а) $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$;

б) $z = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$;

в) $u = x^{yz}$;

г) $u = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{z^2 - x^2 - y^2}$;

д) $u = \ln \frac{xyz}{x^3 + y^3 + z^3}$;

е) $u = \operatorname{tg}^2(x - y^2 + z^2)$.

2-§. Функциянинг тўла дифференциали.
Мураккаб ва ошкормас функцияларни дифференциаллаш

$z = f(x, y)$ функциянинг тўла орттормаси деб

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

айирмага айтилади.

$z = f(x, y)$ функциянинг Δx ва Δy га нисбатан чизикли бўлган бош қисми бу функциянинг тўла дифференциали деб аталади ва dz билан белгиланади.

Агар $z = f(x, y)$ функция узлуксиз хусусий ҳосилаларга эга бўлса, у ҳолда тўла дифференциал мавжуд бўлади ва у қуйидагича ёзилади:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy, \quad (6.1)$$

бунда $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$.

Ита ўзгарувчи $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциянинг тўла дифференциали қуйидагича аниқланади:

$$dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_n} dx_n. \quad (6.2)$$

1-мисол. $z = x^2 - xy + y^2$ функциянинг тўла орттормаси ва тўла дифференциалини топинг.

Ечиш. Таърифта кўра:

$$\begin{aligned} \Delta z &= (x + \Delta x)^2 - (x + \Delta x)(y + \Delta y) + (y + \Delta y)^2 - x^2 + xy - y^2 = \\ &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - xy - x\Delta y - y\Delta x - \Delta x\Delta y + \\ &\quad + y^2 + 2y\Delta y + (\Delta y)^2 - x^2 + xy - y^2 = \\ &= 2x\Delta x - x\Delta y + 2y\Delta y - y\Delta x + (\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y + (\Delta y)^2 = \\ &= (2x - y)\Delta x + (2y - x)\Delta y + (\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y + (\Delta y)^2. \end{aligned}$$

Бунда $(2x - y)\Delta x + (2y - x)\Delta y$ ифода Δx ва Δy ларга нисбатан чизикли бўлган қисми функциянинг дифференциали dz дан иборат, $\alpha = (\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y + (\Delta y)^2$ миқдор эса $\Delta \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик миқдор. Шундай қилиб, $\Delta z = dz + \alpha$ ни ҳосил қиламиз.

2-мисол. $u = \ln^2(x^2 + y^2 - z^2)$ функциянинг тўла дифференциалини топинг.

Ечиш. Дастлаб функциянинг хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 \ln(x^2 + y^2 - z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 - z^2} \cdot 2x = \frac{4x \ln(x^2 + y^2 - z^2)}{x^2 + y^2 - z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2 \ln(x^2 + y^2 - z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 - z^2} \cdot 2y = \frac{4y \ln(x^2 + y^2 - z^2)}{x^2 + y^2 - z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2 \ln(x^2 + y^2 - z^2) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 - z^2} \cdot (-2z) = -\frac{4z \ln(x^2 + y^2 - z^2)}{x^2 + y^2 - z^2}.$$

(6.2) формулага кўра қуйидагича эга бўламиз:

$$du = \frac{4 \ln(x^2 + y^2 - z^2)}{x^2 + y^2 - z^2} \cdot (x dx + y dy - z dz).$$

Тўла дифференциалдан функциянинг қийматларини тақрибий ҳисоблашда фойдаланилади.

Бизга маълумки, $\Delta z \approx dz$, яъни

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + dz(x_0, y_0).$$

3-мисол. $(1, 02)^{3,01}$ ни тақрибий ҳисобланг.

Ечиш. $z = x^y$ функцияни қараймиз. $x_0 = 1$ ва $y_0 = 3$ да $z_0 = 1^3 = 1$ ни ҳосил қиламиз. У ҳолда $z = (1, 02)^{3,01} \approx z_0 + dz = 1 + 0,06 = 1,06$ га эга бўламиз.

$$\Delta x = 1,02 - 1 = 0,02, \quad \Delta y = 3,01 - 3 = 0,01.$$

$z = x^y$ функциянинг ихтиёрий нуқтадаги тўла дифференциалини топамиз.

Аниқланган $\Delta x = 0,02$ ва $\Delta y = 0,01$ орттормалари ва $M(1;3)$ нуқтадаги тўла дифференциалини ҳисоблаймиз:

$$dz = 3 \cdot 1^2 \cdot 0,02 + 1^3 \cdot \ln 1 \cdot 0,02 = 0,06.$$

У ҳолда $z = (1, 02)^{3,01} \approx z_0 + dz = 1 + 0,06 = 1,06$ га эга бўламиз:

Агар $z = f(u, v)$ функцияда $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ бўлса, у ҳолда берилган функция x ва y ўзгарувчиларга нисбатан

мураккаб функция бўлиб, унинг хусусий ҳосиласини топиш учун қуйидаги формулалардан фойдаланилади:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}. \quad (6.3)$$

$u = \varphi(x)$, $v = \psi(x)$ бўлган ҳол учун (6.3) формуладаги иккинчи ифода йўқолади (яъни нолга тенг бўлади) ва бу формула қуйидаги кўринишни олади:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (6.4)$$

Агар $u = x$, $v = y(x)$ бўлса, у ҳолда (6.4) формула қуйидаги кўринишни олади:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}. \quad (6.5)$$

(6.5) формула функциянинг тўла ҳосиласини ифодалайди.

4-мисол. Агар $z = \cos(uv)$ функцияда $u = 2x+3y$, $v = xy$ бўлса, унинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. (6.3) формулага асосан:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -v \cos(uv) \cdot 2 - u \cos(uv) \cdot y =$$

$$= -(4xy + 3y^2) \cdot \cos(2x^2y + 3xy^2),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -v \cos(uv) \cdot 3 - u \cos(uv) \cdot x =$$

$$= -(6xy + 2x^2) \cdot \cos(2x^2y + 3xy^2).$$

5-мисол. Агар $u = x + y^2 + z^3$ функцияда $y = \sin x$, $z = \cos x$ бўлса, унинг тўла ҳосиласини топинг.

Ечиш. (6.4) формулага кўра топамиз:

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx} = 1 + 2y \cos x + 3z^2 (-\sin x) =$$

$$= 1 + 2 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x \sin x.$$

Агар $y(x)$ ошқормас функция $F(x, y) = 0$ тенглама билан берилган ва $F'_y(x, y) \neq 0$ бўлса, у ҳолда унинг ҳосиласи

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} \quad (6.6)$$

формула билан аниқланади.

Агар $z(x, y)$ ошқормас функция $F(x, y, z) = 0$ тенглама билан берилган ва $F'_z(x, y, z) \neq 0$ бўлса, у ҳолда қуйидаги формула ўринли:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{dz}{dy} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}. \quad (6.7)$$

6-мисол. $x^3 + y^3 - e^{xy} - 5 = 0$ тенглама билан берилган ошқормас функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. (6.6) формулага асосан:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - ye^{xy}}{3y^2 - xe^{xy}}.$$

7-мисол. $xyz + x^3 - y^3 - z^3 + 5 = 0$ тенглама билан берилган ошқормас функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. (6.7) формулага асосан қуйидагиларга эга бўламиз:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{yz + 3x^2}{xy - 3z^2}, \quad \frac{dz}{dy} = -\frac{xz - 3y^2}{xy - 3z^2}.$$

Машқлар

320. Қуйидаги функцияларнинг тўла дифференциалларини топинг:

а) $z = x^3 + xy^2 + x^2y$; б) $z = e^{x^2-y^2}$;

в) $z = e^{\cos^3(x^2-y^2)}$; г) $z = \ln^2(x^2 + y^2)$;

д) $u = \sin^3(xy^2z^3)$; е) $u = \operatorname{ctg}^3(xy^2 - y^3 + xz^2)$.

321. Қуйидаги ифодаларни тақрибий ҳисобланг:

а) $(1.02)^3 \cdot (0.97)^3$; б) $\sqrt{(4.05)^2 + (2.93)^2}$.

322. Агар $u = x \sin y$, $v = y \cos x$ бўлса, $z = \sqrt{u^2 + v^2}$ функциянинг хусусий ҳосиласини топинг.

323. Агар $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$, $t = e^{xy}$ бўлса, $z = \ln(u^3 + v^3 - t^3)$ функциянинг хусусий ҳосиласини топинг.

324. Агар $y = \sin \sqrt{x}$ бўлса, $z = \operatorname{tg}^2(x^2 - y^2)$ функциянинг хусусий ҳосиласини топинг.

325. Агар $y = e^{-x^2}$ бўлса, $z = \arctg \sqrt{x^2 + y^2}$ функциянинг хусусий ҳосиласини топинг.

326. $\sin xy - x^2 - y^2 = 5$ тенглама билан берилган y ошкормас функциянинг ҳосиласини топинг.

327. Қуйидаги тенгламалар билан берилган z ошкормас функцияларнинг хусусий ҳосиласини топинг.

а) $xyz - \sin^2 xyz + x^3 + y^3 + z^3 = 7$;

б) $x^2 y^2 z^2 + 7y^4 - 8xz^3 + z^4 = 10$.

328. $x^3 + y^3 + z^3 - xyz = 2$ тенглама билан берилган z ошкормас функция хусусий ҳосиласининг $M_0(1;1;1)$ нуқтадаги қийматини ҳисобланг.

3-§. Юқори тартибли хусусий ҳосилалар.

Сиртга ўтказилган уринма ва нормал текисликларнинг тенгламалари

Биринчи тартибли хусусий ҳосиладан олинган хусусий ҳосила иккинчи тартибли хусусий ҳосила дейилади ва уни қуйидагича ёзилади:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f''_{xx}(x, y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f''_{yy}(x, y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f''_{xy}(x, y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f''_{yx}(x, y).$$

Худди шунингдек, уч ва ундан юқори тартибли хусусий ҳосилалар ҳам юқоридаги каби аниқланади.

$\frac{\partial^n z}{\partial x^k \partial y^{n-k}}$ ёзув z функция x ўзгарувчи бўйича k марта ва y ўзгарувчи бўйича $n-k$ марта дифференциалланганлигини билдиради.

$f''_{xy}(x, y)$ ва $f''_{yx}(x, y)$ хусусий ҳосилалар $z = f(x, y)$ функциянинг аралаш ҳосилалари дейилади.

1-мисол. $z = e^{x^2 y^2}$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. Дастлаб биринчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x^2 y^2} \cdot 2xy^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{x^2 y^2} \cdot 2x^2 y.$$

Буларни яна дифференциалласак, қуйидагиларга эга бўламиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^{x^2 y^2} \cdot 4x^3 y^2 + e^{x^2 y^2} \cdot 2y^2 = 2y^2 e^{x^2 y^2} (2x^2 y^2 + 1),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{x^2 y^2} \cdot 4x^4 y^2 + e^{x^2 y^2} \cdot 2x^2 = 2x^2 e^{x^2 y^2} (2x^2 y^2 + 1),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{x^2 y^2} \cdot 4x^3 y^3 + e^{x^2 y^2} \cdot 4xy = 4xy e^{x^2 y^2} (x^2 y^2 + 1),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = e^{x^2 y^2} \cdot 4x^3 y^3 + e^{x^2 y^2} \cdot 4xy = 4xy e^{x^2 y^2} (x^2 y^2 + 1).$$

Охириги икки ифодани солиштириб, уларнинг ўзаро тенг эканлигига ишонч ҳосил қиламиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

Демак, битта функциянинг фақат дифференциаллаш тартиби билан фарқ қиладиган аралаш хусусий ҳосилалари узлуксиз бўлса, улар ўзаро тенг булар экан.

2-мисол. $z = \arctg \frac{y}{x}$ функция $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ Лаплас тенгламасини қаноатлантиришини исбот қилинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2yx}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Буларни Лаплас тенгламасига қўямиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2yx}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

$z = f(x, y)$ функциянинг иккинчи тартибли тула дифференциали (d^2z)

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2$$

формула билан ифодаланади.

3 - мисол. $z = x^3 + y^3 + x^2 y^2$ функциянинг иккинчи тартибли тула дифференциалини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 2xy^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 + 2x^2 y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x + 2y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y + 2x^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xy.$$

Демак, $d^2z = (6x + 2y^2)dx^2 + 8xy dx dy + (6y + 2x^2)dy^2$.

Агар сирт $z = f(x, y)$ тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтада берилган сиртга утказилган уринма текислик тенгламаси

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (6.8)$$

формула билан, сиртга $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтадан утказилган нормалнинг каноник тенгламаси эса

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{f'_z(x_0, y_0)} \quad (6.9)$$

формула билан ифодаланади.

Агар сирт тенгламаси $F(x, y, z) = 0$ ошкормас кўринишда бўлиб, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ бўлса, у ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтада утказилган уринма текислик тенгламаси

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0, \quad (6.10)$$

нормал тенгламаси эса

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)} \quad (6.11)$$

кўринишда бўлади.

4 - мисол. $x^3 + y^3 + z^3 + xyz = 0$ сиртга $M_0(1; 2; -1)$ нуқтада утказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини топинг.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларнинг $M_0(1; 2; -1)$ нуқтадаги қийматларини ҳисоблаймиз.

$$F'_x(x_0, y_0, z_0) = (3x^2 + yz)|_{M_0} = 1,$$

$$F'_y(x_0, y_0, z_0) = (3x^2 + xz)|_{M_0} = 11,$$

$$F'_z(x_0, y_0, z_0) = (3x^2 + xy)|_{M_0} = 5.$$

Буларни (6.10) ва (6.11) тенгламаларга қўйиб, уринма текислик тенгламасини ва нормал тенгламасини ҳосил қиламиз.

$$(x - 1) + 11(y - 2) + 5(z + 1) = 0, \quad \frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{11} = \frac{z + 1}{5}.$$

Машқлар

329. Куйидаги функцияларнинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг ва аралаш хусусий ҳосилаларнинг тенглигини аниқланг:

$$a) z = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 + y^2)^3}; \quad б) z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2});$$

$$в) z = \ln(x^2 + y^2); \quad г) z = e^x (\sin y + \cos y);$$

$$д) z = \arctg \frac{x+y}{1-xy}; \quad е) z = \frac{x+y}{x-y}.$$

330. $z = e^x (x \cos y - y \sin y)$ функция $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ тенгламани қаноатлантиришини исбот қилинг.

331. $z = e^{-\cos(x+3y)}$ функция $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ тенгламани қаноатлантиришини исбот қилинг.

332. Куйидаги берилган сиртларга берилган нуқтада утказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини топинг:

$$a) xyz^2 + 2y^2 + 3yz + 4 = 0, \quad M_0(0; 2; -2);$$

$$\begin{aligned} \text{б) } z &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2, & M_0(3;1;4); \\ \text{в) } x^2 + 2y^2 + 3z^2 &= 6, & M_0(1;-1;1); \\ \text{г) } z &= 1 + x^2 + y^2, & M_0(1;1;4). \end{aligned}$$

4-§. Икки ўзгарувчи функциянинг экстремуми

Агар $M_0(x_0; y_0)$ нуқтанинг шундай кичик атрофи мавжуд бўлсаки, бу атрофнинг M_0 дан фарқли барча $M(x; y)$ нуқталари учун

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y) \quad (f(x_0, y_0) \leq f(x, y))$$

тенгсизликлар бажарилса, $M_0(x_0; y_0)$ нуқта $z = f(x, y)$ функциянинг *локал* максимуми (минимуми) дейилади. Функциянинг максимуми ёки минимуми унинг *экстремуми* дейилади. Функциянинг экстремумга эришадиган нуқтаси унинг *экстремум нуқтаси* дейилади.

1-теорема (экстремум мавжудлигининг етарли шarti). Агар $M_0(x_0; y_0)$ нуқта $z = f(x, y)$ функциянинг экстремум нуқтаси бўлса, у ҳолда унинг хусусий ҳосилалари $f'_x(x_0; y_0) = f'_y(x_0; y_0) = 0$ бўлади ёки бу ҳосилалардан би-рортаси мавжуд бўлмайди.

Бу шартни қаноатлантирадиган нуқталар *стационар* ёки *критик* нуқталар дейилади. Экстремум нуқталар ҳар доим стационар нуқта бўлади, аммо стационар нуқталар экстремум нуқтаси бўлиши ҳам, бўлмаслиги ҳам мумкин. Стационар нуқта экстремум нуқтаси бўлиши учун экстремум мавжуд бўлишининг зарурий шarti ҳам бажарилиши керак.

Икки ўзгарувчи функция экстремуми мавжуд бўлишининг зарурий шartини таърифлаш учун қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\begin{aligned} A &= f''_{xx}(x_0; y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0; y_0), \\ C &= f''_{yy}(x_0; y_0), \quad \Delta = AC - B^2. \end{aligned}$$

2-теорема (экстремум мавжудлигининг зарурий шarti). $M_0(x_0; y_0)$ стационар нуқтага эга бўлган бирор соҳа-

да $z = f(x, y)$ функция узлуксиз ва учинчи тартибли хусусий ҳосиллага эга бўлсин. У ҳолда:

1) агар $\Delta > 0$ бўлса, $M_0(x_0; y_0)$ нуқта берилган функция учун экстремум нуқтаси бўлиб, $A < 0$ ($C < 0$) да максимум нуқта, $A > 0$ ($C > 0$) да минимум нуқта бўлади;

2) агар $\Delta < 0$ бўлса, $M_0(x_0; y_0)$ нуқта экстремум нуқтаси бўлмайди;

3) агар $\Delta = 0$ бўлса, $M_0(x_0; y_0)$ нуқта экстремум нуқтаси бўлиши мумкин, бўлмаслиги ҳам мумкин.

Учинчи ҳолда қўшимча текшириш ўтказиш зарурлигини эслатиб ўтамиз.

1-мисол. $z = x^3 + y^3 - 3xy$ функциянинг экстремумини текширинг.

Ечиш. Берилган функция учун $\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ҳар доим мавжуд ва бу хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x.$$

Энди қуйидаги системани тузамиз:

$$\begin{cases} x^2 - y = 0, \\ y^2 - x = 0, \end{cases}$$

бундан $x_1 = 0, x_2 = 1, y_1 = 0, y_2 = 1$. Шундай қилиб, $M_1(0;0)$ ва $M_2(1;1)$ иккита стационар нуқтага эга бўлди.

Энди қуйидагиларни топамиз:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y.$$

У ҳолда

$$\Delta = AC - B^2 = 36xy - 9.$$

$M_1(0;0)$ нуқтада $\Delta = -9 < 0$ бўлгани учун бу нуқтада экстремум йўқ.

$M_2(1;1)$ нуқтада $\Delta = 27 > 0$ ва $A = 6 > 0$ бўлгани учун бу нуқтада берилган функция локал минимумга эришадими: $z_{\min} = -1$.

$\varphi(x, y) = 0$ функция ёрдамида $z = f(x, y)$ функциянинг топилган экстремумини шartли экстремум дейилади. $\varphi(x, y) = 0$ тенглама боғловчи тенглама дейилади.

Геометрик масалаларда шартли экстремумларни аниқлаш $z = f(x, y)$ сиртининг $\varphi(x, y) = 0$ цилиндр билан кесишишидан ҳосил бўлган эгри чизиқнинг экстремум нуқталарини топишга келтирилади.

Агар $\varphi(x, y)$ боғловчи тенгламадан $y = y(x)$ ни топиб (агар уни топиш мумкин бўлса), уни $z = f(x, y)$ функцияга қўйсақ, шартли экстремумни топиш масаласи $z = (x, y(x))$ бир ўзгарувчили функциянинг экстремумини топишга келтирилади.

2-мисол. $z = x^2 - y^2$ функциянинг $y = 2x - 6$ шарт буйича экстремумини топинг.

Ечиш. $y = 2x - 6$ ни берилган функцияга қўйиб, x ўзгарувчига нисбатан бир ўзгарувчили қуйидаги функцияни ҳосил қиламиз:

$$z = x^2 - (2x - 6)^2, \quad z = -3x^2 + 24x - 36.$$

Унинг ҳосиласини топамиз ва уни нолга тенглаймиз:

$$z' = -6x + 24; \quad z' = 0, \text{ бундан} \\ x = 4, \quad y = 2x - 6 = 8 - 6 = 2.$$

Иккинчи тартибли ҳосила $z'' = -6 < 0$ бўлгани учун $M(4; 2)$ нуқтада берилган функция шартли максимумга эришади: $z_{\max} = 12$.

Дифференциалланувчи функция чегараланган ёпиқ $\bar{D}$ соҳада ўзининг энг катта (энг кичик) қийматига ёпиқ $\bar{D}$ соҳа ичида ётувчи стационар нуқтасида ёки шу соҳанинг чегарасида эришади. $z = f(x, y)$ функциянинг чегараланган ёпиқ $\bar{D}$ соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топиш учун функциянинг бу соҳага тегишли критик нуқталардаги қийматларини ҳамда унинг $\bar{D}$ соҳанинг чегарасидаги энг катта ва энг кичик қийматлар аниқланади. Бу қийматларнинг орасидаги энг каттаси ва энг кичиги берилган функциянинг $\bar{D}$ соҳадаги мос равишда энг катта ва энг кичик қийматлари бўлади. Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

3-мисол. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ функциянинг $x = 0$, $y = 0$, $x + y = -3$ чизиқлар билан чегараланган соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг.

Ечиш. Оху текислигида $\bar{D}$ соҳани чизиб оламиз (65-чизма). $\bar{D}$ соҳага тегишли стационар нуқталарни аниқлаймиз:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x - y + 1 = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 2y - x + 1 = 0, \end{aligned} \right\}$$

бундан $x = -1$, $y = -1$.
 $M(-1; -1)$ нуқтани ҳосил қилдик, бу нуқтада $z_1 = z(-1; -1) = -1$.

Берилган функцияни соҳа чегарасида текшираемиз.

ОВ тўғри чизиқда (65-чизма) $x = 0$ бўлиб, $z = y^2 + y$ тенгламага эга бўламиз ва бу тенглама $[-3; 0]$ кесмада бир ўзгарувчили функциянинг энг катта ва энг кичик қийматини топиш масаласига келади. $z'_y = 2y + 1$ ни топиб, уни нолга тенглаймиз: $2y + 1 = 0$, бундан $y = -\frac{1}{2}$; $z''_{yy} = 2$ бўлгани учун $M_2(0; -\frac{1}{2})$ шартли локал минимум нуқтага эга бўламиз ва унда $z_2 = z(0; -\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ қийматни ҳосил қиламиз. ОВ кесма учларида:

$$z_3 = z(0, -3) = 6, \quad z_4 = z(0, 0) = 0.$$


ОА тўғри чизиқда, $y = 0$ бўлиб, $z = x^2 + x$ ни ҳосил қиламиз. $z'_x = 2x + 1 = 0$, $x = -\frac{1}{2}$, $z''_{xx} = 2$, яъни $M_3(-\frac{1}{2}; 0)$ локал минимум нуқтаси бўлиб, унда $z_5 = z(-\frac{1}{2}; 0) = -\frac{1}{4}$.

А нуқтада: $z_6 = z(-3, 0) = 6$.

АВ кесма тенгламаси $x + y = -3$ бўлиб, ундан $y = -x - 3$; $z = 3x^2 + 9x + 6$, $z'_x = 6x + 9$, $x = -\frac{3}{2}$, $M_4(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2})$ стационар нуқтага эга бўлдик: $z_7 = z(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}) = -\frac{3}{4}$. Функциянинг АВ кесма учларидаги қийматлари юқорида аниқланган эди.

Берилган z функциянинг топилган барча қийматларини солиштириб, функция $A(-3; 0)$ ва $B(0; -3)$ нуқталарда энг катта $z_{\max} = 6$ ва $M_1(-1; -1)$ стационар нуқтада энг кичик $z_{\min} = -1$ қийматларга эришишини аниқлаймиз.

4-мисол. Тула сиртининг юзи S , ҳажми эса энг катта бўлган тўғри бурчакли параллелепипеднинг ўлчамларини аниқланг.



65-чизма.

Ечиш. Тўғри бурчакли параллелепипеднинг ҳажми $V = xyz$ га тенг, бунда x, y, z — параллелепипеднинг ўлчамлари. Тўла сиртининг юзи: $S = 2(xy + xz + yz)$, бундан

$$z = \frac{S-2xy}{2(x+y)}, \quad V = xyz = \frac{Sxy-2x^2y^2}{2(x+y)} = V(x, y).$$

$V = V(x, y)$ функциянинг экстремумларини топамиз:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{y^2(S-2x^2-4xy)}{2(x+y)^2} = 0,$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{x^2(S-2y^2-4xy)}{2(x+y)^2} = 0,$$

$$S - 2x^2 - 4xy = 0,$$

$$S - 2y^2 - 4xy = 0.$$

Масала шартига кўра $x > 0, y > 0$ бўлгани учун охириги системадан $x = y = \sqrt{\frac{S}{6}}$ ни топамиз. Демак, ягона $M_0\left(\sqrt{\frac{S}{6}}, \sqrt{\frac{S}{6}}\right)$ стационар нуқтага эга. У $V = V(x, y)$ функция учун максимум нуқтаси бўлади.

Шундай қилиб, ҳажми энг катта бўлган параллелепипед, яъни қирраси $\sqrt{\frac{S}{6}}$ га тенг кубга эга бўламиз.

Машқлар

333. Қуйидаги функцияларнинг экстремумини текширинг:

а) $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$;

б) $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$;

в) $z = 3xy - x^2 - y^2 - 10x + 15y$;

г) $z = x^3 + x^2 - 3x + 2y$;

д) $z = x\sqrt{y} - x^2 - y + 6x + 3$;

е) $z = 3x^2 - x^3 + 3y^2 + 4y$.

334. $z = x + 2y$ функциянинг $x^2 + y^2 = 5$ шарт бўйича экстремумини топинг.

335. $z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x + 5$ функциянинг $x = 0, y = 0, x + y = 3$ чизиқлар билан чегараланган соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг.

336. $z = x^2y(4 - x - y)$ функциянинг $x = 0, y = 0, x + y = 6$ чизиқлар билан чегараланган соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг.

337. Тўла сиртининг юзи энг кичик бўлган V ҳажмга эга тўғри бурчакли параллелепипеднинг ўлчамларини аниқланг.

5-§. Биринчи мустақил уй иши

Мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда олти та мисол бўлиб, уларнинг шarti қуйидагича.

1-мисолда: берилган функциянинг аниқланиш соҳасини топиш керак.

2-мисолда: берилган функциянинг хусусий ҳосиласини ва хусусий дифференциалини топиш керак.

3-мисолда: берилган функциянинг $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтадаги хусусий ҳосилаларини ($f'_x(M_0), f'_y(M_0), f'_z(M_0)$) қийматларини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисоблаш керак.

4-мисолда: берилган функциянинг тўла дифференциалини топиш керак.

5-мисолда: $u = u(x, y)$ (бунда $x = x(t), y = y(t)$) мураккаб функция ҳосиласининг $t = t_0$ даги қийматини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисоблаш керак.


6-мисолда: $z(x, y)$ ошқормас кўринишда берилган функция хусусий ҳосиласининг $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтадаги қийматини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисоблаш керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1-мисол. $z = \ln(x^2 - 3y + 6)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

Ечиш. Логарифмик функцияларнинг аргументлари фақат мусбат бўлгандагина маънога эга бўлгани учун $x^2 - 3y + 6 > 0$ бўлиши керак. Бундан

$$3y < x^2 + 6 \text{ ёки } y < \frac{1}{3}x^2 + 2.$$



66-чизма.

Демак, аниқланиш соҳа чегараси $x^2 - 3y + 6 = 0$ ёки $x^2 = 3y - 6$ чизиқ, яъни параболадан иборат. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси парабола ташқарисидаги нуқталардан иборат (66-чизма).

2-мисол. $z = e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}}$ функциянинг хусусий ҳосилаларини ва хусусий дифференциалларини топинг.

Ечиш. Функциянинг x бўйича хусусий ҳосиласини топамиз. Унинг учун y ни ўзгармас деб бир ўзгарувчи мураккаб функцияни дифференциаллаш формуласидан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \left(-\frac{1}{3} (x^2+5y^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x \right) = \\ &= -\frac{2x}{3} e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2+5y^2)^2}}.\end{aligned}$$

Шунингдек, x ни ўзгармас деб y бўйича хусусий ҳосилани топамиз:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \left(-\frac{1}{3} (x^2+5y^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 10y \right) = \\ &= -\frac{10y}{3} e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2+5y^2)^2}}.\end{aligned}$$

Хусусий дифференциалларини топамиз:

$$d_x z = \frac{\partial z}{\partial x} dx = -\frac{2x}{3} e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2+5y^2)^2}} dx.$$

$$d_y z = \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{10y}{3} e^{-\sqrt[3]{x^2+5y^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2+5y^2)^2}} dy.$$

3-мисол. $f(x, y, z) = \sqrt{xy} \cos z$ функция хусусий ҳосилаларининг ($f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$) $M_0(1; 1; \frac{\pi}{3})$ нуқтадаги қийматларини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. Берилган функциянинг хусусий ҳосилаларини топамиз, сўнгра уларнинг $M_0(1; 1; \frac{\pi}{3})$ нуқтадаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$f'_x(x, y, z) = \frac{y}{2\sqrt{xy}} \cos z, \quad f'_x\left(1, 1, \frac{\pi}{3}\right) = 0.25,$$

$$f'_y(x, y, z) = \frac{x}{2\sqrt{xy}} \cos z, \quad f'_y\left(1, 1, \frac{\pi}{3}\right) = 0.25,$$

$$f'_z(x, y, z) = \sqrt{xy} \cdot (-\sin z), \quad f'_z\left(1, 1, \frac{\pi}{3}\right) = -0.86.$$

4-мисол. $z = \arctg \sqrt{\frac{x}{y}}$ функциянинг тўла дифференциалини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x+y} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}(x+y)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \frac{y}{x+y} \cdot \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}(x+y)}.$$

(6.1) формулага асосан қуйидагига эгамиз:

$$dz = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}(x+y)} dx - \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}(x+y)} dy.$$

5 - мисол. $z = \arccos \frac{x^2}{y}$ (бунда, $x = 1 + \ln t$, $y = -2e^{-t^2+1}$) мураккаб функция ҳосиласининг $t_0 = 1$ даги қийматини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. (6.4) формулага асосан қуйидагига эгамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^4}{y^2}}} \cdot \frac{2x}{y} \cdot \frac{1}{t} -$$

$$-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^4}{y^2}}} \cdot \left(-\frac{x^2}{y^2}\right) \cdot (-2e^{-t^2+1}) \cdot (-2t).$$

$t_0 = 1$ бўлса, $x = 1$, $y = -2$ ва $\frac{dz}{dt}\bigg|_{t=1} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ ни ҳосил қиламиз.

6 - мисол. $4x^3 - 3y^3 + 2xyz - 4xz = 3 - z^2$ ошқормас функция хусусий ҳосилаларининг $M_0(0; 1; -1)$ нуқтадаги қийматини вергулдан кейин иккита рақамгача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. Берилган мисол учун

$$F(x, y, z) = 4x^3 - 3y^3 + 2xyz - 4xz + z^2 - 3.$$

Унинг хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$F'_x = 12x^2 + 2yz - 4z, \quad F'_y = -9y^2 + 2xz,$$

$$F'_z = 2xy - 4x + 2z.$$

(6.7) формулага асосан:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{12x^2 + 2yz - 4z}{2xy - 4x + 2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{9y^2 + 2xz}{2xy - 4x + 2z}.$$

$\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ларнинг $M_0(0; 1; -1)$ нуқтадаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\frac{\partial z(0, 1, -1)}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial z(0, 1, -1)}{\partial y} = -4.5.$$

1-вариант

1. $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 5}$.
2. $z = \lg(x^3 + y^2)$.
3. $f(x, y, z) = \ln \cos(x^2 y^2 + z)$, $M_0\left(0; 0; \frac{\pi}{4}\right)$.
4. $z = \cos(x^2 - y^2) + x^3$.
5. $u = \ln(e^x + e^y)$, $x = t^2$, $y = t^3$, $t_0 = 1$.
6. $z^3 + 3xyz + 3y = 7$, $M_0(1; 1; 1)$.

2-вариант

1. $z = \arccos(x + y)$.
2. $z = \operatorname{ctg} \sqrt{xy^3}$.
3. $f(x, y, z) = 27\sqrt[3]{x^2 + y^2 + z^2}$, $M_0(3; 4; 2)$.
4. $z = \ln(3x^2 - 2y^2)$.
5. $u = x^y$, $x = e^t$, $y = \ln t$, $t_0 = 1$.
6. $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{3}{2}$, $M_0\left(\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$.

3-вариант

1. $z = 3x + \frac{y}{2-x+y}$.
2. $z = e^{-x^2+y^2}$.
3. $f(x, y, z) = \operatorname{arctg}(xy^2 + z)$, $M_0(2; 1; 0)$.
4. $z = 5xy^2 - 3x^3y^4$.
5. $u = e^{y-2x}$, $x = \sin t$, $y = t^3$, $t_0 = 0$.
6. $e^{z-1} = \cos x \cos y + 1$, $M_0\left(0; \frac{\pi}{2}; 1\right)$.

4-вариант

1. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
2. $z = \ln(3x^2 - y^4)$.

4. $z = \frac{\lg(x+y)}{x-y}$.
5. $u = \frac{x}{y}$, $x = e^t$, $y = 2 - e^{2t}$, $t_0 = 0$.
6. $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z + 2 = 0$, $M_0(1; 1; 1)$.

11-вариант

1. $z = \frac{x^3 y}{3+x-y}$.
2. $z = e^{2x^2 - y^2}$.
3. $f(x, y, z) = \ln(x + y^2) - \sqrt{x^2 y^2}$, $M_0(5; 2; 3)$.
4. $z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}$.
5. $u = \ln(e^{-x} + e^{2y})$, $x = t^2$, $y = \frac{1}{3}t^3$, $t_0 = 1$.
6. $x^2 + y^2 + z^2 - 2xz = 2$, $M_0(9; 1; -1)$.

12-вариант

1. $z = \arccos(x + 2y)$.
2. $z = \ln(\sqrt{xy} - 1)$.
3. $f(x, y, z) = \sqrt{z} \cdot x^y$, $M_0(1; 2; 4)$.
4. $z = xy^4 - 3x^2 y + 1$.
5. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + 3}$, $x = \ln t$, $y = t^2$, $t_0 = 1$.
6. $e^z - xyz - x + 1 = 0$, $M_0(2; 1; 0)$.

13-вариант

1. $z = \arcsin(2x - y)$.
2. $z = \arcsin(2x^3 y)$.
3. $f(x, y, z) = -\frac{z}{x^2 + y^2}$, $M_0(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \sqrt{2})$.
4. $z = \ln(x + xy - y^2)$.

$$5. u = \arcsin \frac{x^2}{y}, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t, \quad t_0 = \pi.$$

$$6. x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y - 15 = 0, \quad M_0(1; -1; 2).$$

14-вариант

1. $z = \ln(9 - x^2 - y^2)$.
2. $z = \operatorname{arctg} \frac{x^2}{y}$.
3. $f(x, y, z) = \ln(x^3 + \sqrt[3]{y} - z)$, $M_0(2; 1; 8)$.
4. $z = 2x^2 y^2 + x^3 - y^3$.
5. $u = \frac{y^2}{x}$, $x = 1 - 2t$, $y = 1 + \operatorname{arctg} t$, $t_0 = 0$.
6. $x^2 - 2xy - 3y^2 + 6x - 2y + z^2 - 8z + 20 = 0$, $M_0(0; -2; 2)$.

15-вариант

1. $z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$.
2. $z = \cos(x - \sqrt{xy^3})$.
3. $f(x, y, z) = \frac{z}{x^4 + y^2}$, $M_0(2; 3; 25)$.
4. $z = \sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}$.
5. $u = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$.
6. $x^2 + y^2 + z^2 = y - z + 3$, $M_0(1; 2; 0)$.

16-вариант

1. $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 5}}$.
2. $z = \sin \frac{x+y}{x-y}$.
3. $f(x, y, z) = 8\sqrt{x^3 + x^2 + z}$, $M_0(3; 2; 1)$.

$$4. z = \arcsin \frac{x+y}{x}.$$

$$5. u = \sqrt{x^2 + y^2 + 3}, \quad x = \ln t, \quad y = t^2, \quad t_0 = 1.$$

$$6. x + y + z + 2 = xyz, \quad M_0(2; 1; 0).$$

17-вариант

$$1. z = 4x + \frac{y}{2x-5y}.$$

$$2. z = \operatorname{tg} \frac{2x-y^2}{x}.$$

$$3. f(x, y, z) = \ln(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} - z), \quad M_0(1; 1; 1).$$

$$4. z = \operatorname{arctg}(x - y).$$

$$5. u = \arcsin \frac{x}{2y}, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t, \quad t_0 = \pi.$$

$$6. x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - yz - 3y - z = 0, \quad M_0(1; -1; 1).$$

18-вариант

$$1. z = \frac{\sqrt{3x-2y}}{x^2+y^2+4}.$$

$$2. z = \operatorname{ctg} \sqrt{\frac{x}{x-y}}.$$

$$3. f(x, y, z) = -\frac{2x}{\sqrt{z^2+y^2}}, \quad M_0(3; 0; 1).$$

$$4. z = \sqrt{3x^2 - y^2} + x.$$

$$5. u = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}, \quad x = \sin 2t, \quad y = \operatorname{tg}^2 t, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}.$$

$$6. x^2 - y^2 - z^2 + 6z + 2x - 4y + 12 = 0, \quad M_0(0; 1; -1).$$

19-вариант

$$1. z = \frac{5}{4-x^2-y^2}.$$

$$2. z = e^{-\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$$3. f(x, y, z) = z \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad M_0(0; 0; 1).$$

$$4. z = y^2 - 3xy - x^4.$$

$$5. u = \sqrt{x+y+3}, \quad x = \ln t, \quad y = t^2, \quad t_0 = 1.$$

$$6. \sqrt{x^2+y^2} + z^2 - 3z = 3, \quad M_0(4; 3; 1).$$

20-вариант

$$1. z = \ln(2x - y).$$

$$2. z = \ln(3x^2 - y^2).$$

$$3. f(x, y, z) = \frac{\sin(x-y)}{z}, \quad M_0\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}\right).$$

$$4. z = \arccos(x + y).$$

$$5. u = \frac{y}{x}, \quad x = e^t, \quad y = 1 - e^{2t}, \quad t_0 = 0.$$

$$6. x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 59, \quad M_0(3; 1; 4).$$

21-вариант

$$1. z = \frac{7x^3y}{x-4y}.$$

$$2. z = \arccos(x - y).$$

$$3. f(x, y, z) = \sqrt{z} \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y}), \quad M_0(4; 1; 4).$$

$$4. z = \ln(y^2 - x^2 + 3).$$

$$5. u = \arcsin \frac{2x}{y}, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t, \quad t_0 = \pi.$$

$$6. x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2z = 17, \quad M_0(-2; -1; 2).$$

22-вариант

$$1. z = \sqrt{1-x-y}.$$

$$2. z = \operatorname{arctg} \frac{x^3}{y}.$$

$$3. f(x, y, z) = \frac{x-z}{x-y}, \quad M_0(3; 1; 1).$$

4. $z = 2 - x^3 - y^3 + 5x$.
5. $u = \ln(e^{2x} + e^y)$, $x = t^2$, $y = t^4$, $t_0 = 1$.
6. $x^3 + 3xyz - z^3 = 12$, $M_0(3; 1; 3)$.

23-вариант

1. $z = e^{\sqrt{x^2 + y^2} - 1}$.
2. $z = \cos \frac{x-y}{x^2+y^2}$.
3. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z}$, $M_0(3; 4; \frac{\pi}{2})$.
4. $z = 7x - x^3 y^2 + y^4$.
5. $u = \arctg(x+y)$, $x = t^2 + 2$, $y = 4 - t^2$, $t_0 = 1$.
6. $\ln z = x + 2y - z + \ln 3$, $M_0(1; 1; 3)$.

24-вариант

1. $z = \frac{1}{x^2 + y^2 - 6}$.
2. $z = \sin \sqrt{\frac{y}{x+y}}$.
3. $f(x, y, z) = z \cdot e^{-xy}$, $M_0(0; 1; 1)$.
4. $z = e^{y-x}$.
5. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + 3}$, $x = \ln t$, $y = t^3$, $t_0 = 1$.
6. $2x^2 + 2y^2 + z^3 - 8xz - z + 6 = 0$, $M_0(2; 1; 1)$.

25-вариант

1. $z = \frac{4xy}{x^2 - y^2}$.
2. $z = e^{-(x^2 + y^2)}$.
3. $f(x, y, z) = \arcsin(x\sqrt{y}) - yz^2$, $M_0(0; 4; 1)$.
4. $z = \arctg(2x - y)$.
5. $u = \arctg(xy)$, $x = t + 3$, $y = e^t$, $t_0 = 0$.
6. $z^2 = xy - z + x^2 - 4$, $M_0(2; 1; 1)$.

6-§. Иккинчи мустақил уй иши

Мазкур мустақил уй ишининг ҳар бир вариантда бешта мисол бўлиб, уларнинг шarti қуйидагича:

1-мисолда: берилган S сиртга $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтада ўтказилган уринма ва нормал текисликлар тенгламасини топиш керак.

2-мисолда: берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосилаларини топиш ва $z''_{xy} = z''_{yx}$ тенглик тўғрилигини текшириш керак.

3-мисолда: берилган U функция берилган тенгламани қаноатлантиришини текшириш керак.

4-мисолда: функциянинг экстремумини текшириш керак.

5-мисолда: берилган чизиклар билан чегараланган $\bar{D}$ соҳада $z = z(x, y)$ функциянинг энг катта ва энг кичик қийматларини топиш керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1-мисол. $S: z = x^2 - y^2 + 3xy - 4x + 2y - 4$ сиртга $M_0(-1; 0; 1)$ нуқтада ўтказилган уринма ва нормал текисликлар тенгламасини топиш.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y - 4, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2y + 3x + 2.$$

Ҳосил қилинган ифодаларга $M_0(-1; 0; 1)$ нуқтанинг координаталарини қўямиз, натижада S сиртга перпендикуляр ва берилган нуқтадан ўтувчи $\vec{n}$ векторнинг координаталарига эга бўламиз:

$$A = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{M_0} = 6, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{M_0} = -1, \quad C = -1.$$

(6.8) формулага асосан уринма текислик тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$6(x+1) - y - (z-1) = 0 \text{ ёки } 6x + y + z + 5 = 0.$$

(6.9) формулага асосан нормал тенгламаси:

$$\frac{x+1}{6} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-1}.$$

2-мисол. $z = \arccos \sqrt{\frac{x}{y}}$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. Дастлаб берилган функциянинг биринчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$z'_x = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{y}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \cdot \frac{1}{y} = -\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{y-x}},$$

$$z'_y = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x}{y}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{y}}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{\sqrt{x}}{2y\sqrt{y-x}}.$$

Бу ҳосилаларнинг ҳар бирини x ва y бўйича дифференциаллаб, берилган функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$z''_{xx} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sqrt{y-x} - \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y-x}}}{2x(y-x)} = \frac{y-x-x}{4x\sqrt{x}\sqrt{y-x}(y-x)} = \frac{y-2x}{4x\sqrt{x}(y-x)\sqrt{y-x}},$$

$$z''_{yy} = -\frac{\sqrt{x}}{2} \left(\frac{\sqrt{y-x} + \frac{y}{2\sqrt{y-x}}}{y^2(y-x)} \right) = \frac{\sqrt{x} \cdot (2x+3y)}{2y^2(y-x)},$$

$$z''_{xy} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \left(-\frac{1}{2} \right) (y-x)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{4\sqrt{x}(y-x)\sqrt{y-x}},$$

$$z''_{yx} = \frac{1}{2y} \cdot \frac{\frac{\sqrt{y-x}}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y-x}}}{y-x} = \frac{y-x+x}{4y(y-x)\sqrt{x}\sqrt{y-x}} = \frac{1}{4\sqrt{x}(y-x)\sqrt{y-x}}.$$

Булардан аралаш хусусий ҳосилалар тенглиги ($z''_{xy} = z''_{yx}$) кўриниб турибди.

3-мисол. $u = \ln(x^2 + y^2)$ функция

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{4y^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

тенгламани қаноатлантиришини текширинг.

Ечиш. Берилган u функциянинг x ва y ўзгарувчилар бўйича биринчи ва иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Топилганларни берилган тенгламанинг чап ва ўнг томонига қўямиз. Чап томонда:

$$\frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{8x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{8x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ўнг томонда эса:

$$\frac{4y^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{8xy^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ҳосил қилинган натижалардан берилган функция тенгламани қаноатлантирмаслиги кўриниб турибди.

4-мисол. $z = xy(x + y - 2)$ функциянинг локал экстремумларини текширинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$z'_x = 2xy + y^2 - 2y, \quad z'_y = x^2 + 2xy - 2x.$$

Уларни нолга тенглаб қуйидаги тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} y(2x + y - 2) = 0, \\ x(x + 2y - 2) = 0. \end{cases}$$

Бундан берилган функциянинг $M_1(0;0)$, $M_2(2;0)$, $M_3(0;2)$, $M_4\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ стационар нуқталарини аниқлаймиз. 2-теорема ёрдамида бу нуқталарнинг қайси бирлари экстремум нуқталари эканлигини аниқлаймиз. Унинг учун берилган функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$z''_{xx} = 2y, \quad z''_{xy} = 2x + 2y - 2, \quad z''_{yy} = 2x.$$

Ҳосил қилинган ифодаларга стационар нуқталарнинг координатларини қўямиз ва экстремум мавжудлигини зарурий шартдан фойдаланиб қуйидагига эга бўламиз:

M_1 нуқта учун $\Delta = -4 < 0$, яъни экстремум йўқ;

M_2 нуқта учун $\Delta = -4 < 0$, яъни экстремум йўқ;

M_3 нуқта учун $\Delta = -4 < 0$, яъни экстремум йўқ;

M_4 нуқта учун $\Delta = \frac{12}{9} > 0$, $A = \frac{4}{3} > 0$, яъни экстремум нуқта йўқ, лекин берилган функция локал минимум нуқтага эга ва унда

$$z_{\min} = z\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}.$$

5-мисол. $x = 0$, $y = 0$, $x + y - 1 = 0$ чизиклар билан чегараланган $\bar{D}$ соҳада $z = xy - y^2 + 3x + 4y$ функциянинг энг катта ва энг кичик қийматини топинг.

Ечиш. Дастлаб берилган $\bar{D}$ соҳани чизиб оламиз (67-чизма). Берилган $\bar{D}$ соҳа, яъни OAB учбурчакнинг ичида ётувчи стационар нуқталар бор ёки йўқлигини аниқлаймиз. Унинг учун берилган функциянинг хусусий ҳосилларини топамиз:

$$z'_x = y + 3, \quad z'_y = x - 2y + 4.$$

Бундан

$$\left. \begin{aligned} z'_x = y + 3 = 0, \\ z'_y = x - 2y + 4 = 0 \end{aligned} \right\} \text{ёки} \left. \begin{aligned} y + 3 = 0, \\ x - 2y + 4 = 0. \end{aligned} \right\}$$

Ҳосил қилинган системани ечиб $M(-10; -3)$ стационар нуқтани топамиз. Бу нуқта $\bar{D}$ соҳа ташқарисида бўлгани учун уни масалани ечишда ҳисобга олмаймиз. Функциянинг қийматларини $\bar{D}$ соҳа чегарасида текширамиз.

OAB учбурчакнинг OA томонида ($y = 0$, $0 \leq x \leq 1$) z функция $z = 3x$ кўринишда бўлади. OA кесмада стационар нуқта йўқ, чунки $z' = 3$. O ва A нуқталарда, мос равишда $z(0,0) = 0$, $z(1,0) = 3$. Учбурчакнинг OB томонида ($x = 0$, $0 \leq y \leq 1$) z функция: $z' = y^2 + 4y$, $z' = -2y + 4$. Стационар нуқтани $-2y + 4 = 0$ тенгламадан топамиз, яъни $y = 2$. $M_1(0;2)$ нуқта $\bar{D}$ соҳага тегишли эмас. B нуқтадаги функци-

янинг қиймати $z(0,1) = 3$.

Энди тенгламаси $x + y = 1$

бўлган томондаги энг катта

ва энг кичик қийматини

топамиз. Бунда

$y = 1 - x$

$z = -2x^2 + 2x + 3$, у ҳолда

$z' = -4x + 2$ ва $z' = 0$ дан

$x = \frac{1}{2}$ га эга бўламиз ва натижада $\bar{D}$ соҳага тегишли

бўлган $M_2\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ стационар

нуқтага эга бўлдик. Бу

нуқтада функциянинг

қиймати: $z\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) = 3.5$. Олинган функциянинг барча қий-

матларига қўра

$$z_{\text{нг. кат.}} = z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 3.5, \quad z_{\text{нг. кич.}} = z(0,0) = 0.$$

1-вариант

$$1. S: x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 4 = 0, \quad M_0(2; 1; -1).$$

$$2. z = \arctg(x + y).$$

$$3. x^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad u = e^{xy}.$$

$$4. z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5.$$

$$5. z = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 8, \quad D: x = 0, y = 0, x + y - 1 = 0.$$

2-вариант

$$1. S: x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46, \quad M_0(1; 2; -3).$$


$$2. z = \arccos(2x + y).$$

$$3. x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad u = y\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

$$4. z = 3x^3 + 3y^3 - 9xy + 10.$$

$$5. z = 2x^3 - xy^2 + y, \quad D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 6.$$

3-вариант



67-чизма.

$$1. S: x^2 + y^2 - xz - yz = 0, M_0(0; 2; 2).$$

$$2. z = \operatorname{arccctg}(x - 3y).$$

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

$$4. z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1.$$

$$5. z = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2, D: x = 0, x = 1, y = 0, y = 1.$$

4-вариант

$$1. S: x^2 + y^2 + 2yz - z^2 + y - 2z = 2, M_0(1; 1; 1).$$

$$2. z = \arcsin(x - y).$$

$$3. a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, u = \sin^2(x - ay).$$

$$4. z = 4(x - y) - x^2 - y^2.$$

$$5. z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x - 1, D: x = 0, y = 0, x + y - 3 = 0.$$

5-вариант

$$1. S: y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z, M_0(1; 1; 1).$$

$$2. z = \ln(3x^2 - 2y^2).$$

$$3. a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, u = e^{-\cos(x + ay)}.$$

$$4. z = 6(x - y) - 3x^2 - 3y^2.$$

$$5. z = x^2 + 2xy - 10, D: y = 0, y = x^2 - 4.$$

6-вариант

$$1. S: z = x^2 + y^2 - 2xy + 2x - y, M_0(-1; -1; -1).$$

$$2. z = e^{2x^2 + y^2}.$$

$$3. \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0, u = (x - y)(y - z)(z - x).$$

$$4. z = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y.$$

$$5. z = xy - 2y - y, D: x = 0, y = 0, x = 3, y = 4.$$

7-вариант

$$1. S: z = y^2 - x^2 + 2xy - 3y, M_0(1; -1; 1).$$

$$2. z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}.$$

$$3. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u, u = x \ln \frac{u}{x}.$$

$$4. z = (x - 2)^2 + 2y^2 - 10.$$

$$5. z = \frac{1}{2}x^2 - xy, D: y = 8, y = 2x^2.$$

8-вариант

$$1. S: x^2 - y^2 - 2xy - x - 2y, M_0(-1; 1; 1).$$

$$2. z = \operatorname{tg} \sqrt{xy}.$$

$$3. y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 0, u = \ln(x^2 + y^2).$$

$$4. z = (x - 5)^2 + y^2 + 1.$$

$$5. z = 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2, D: x = 0, y = 0, x + y - 1 = 0.$$

9-вариант

$$1. S: x^2 - 2y^2 + z^2 + xz - 4y = 13, M_0(3; 1; 2).$$

$$2. z = \cos(x^2 y^2 - 5).$$

$$3. x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 = 0, u = \frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy).$$

$$4. z = x^3 + y^3 - 3xy.$$

$$5. z = 2x^2 + 3y^2 + 1, D: y = \sqrt{9 - \frac{9}{4}x^2}, y = 0.$$

10-вариант

$$1. S: 4y^2 - z^2 + 4xy - xz + 3z = 9, M_0(1; -2; 1).$$

$$2. z = \sin \sqrt{x^3 y}.$$

3. $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2xy, u = 0, u = e^{xy}.$
4. $z = 2xy - 2x^2 - 4y^2.$
5. $z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1, D: x = -3, y = 0, x + y + 1 = 0.$

11-вариант

1. $S: z = x^2 + y^2 - 3xy - x + y + 2, M_0(2; 1; 0).$
2. $z = \arcsin(x - 2y).$
3. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0, u = \arctg \frac{x+y}{1-xy}.$
4. $z = x\sqrt{y} - x^2 - y + 6x + 3.$
5. $z = 3x^2 + 3y^2 - x - y + 1, D: x = 5, y = 0, x - y - 1 = 0.$

12-вариант

1. $S: 2x^2 - y^2 + 2z^2 + xy + xz = 3, M_0(1; 2; 1).$
2. $z = \arccos(4x - y).$
3. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, u = \ln(x^2 + y^2 + 2x + 1).$
4. $z = 2xy - 5x^2 - 3y^2 + 2.$
5. $z = 2x^2 + 2xy^2 - \frac{1}{2}y^2 - 4x, D: y = 2x, y = 2, x = 0.$

13-вариант

1. $S: x^2 - y^2 + z^2 - 4x + 2y = 14, M_0(3; 1; 4).$
2. $z = \arctg(5x + 2y).$
3. $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0, u = \frac{2x+3y}{x^2+y^2}.$
4. $z = xy(12 - x - y).$
5. $z = x^2 - 2xy + \frac{5}{2}y^2 - 2x, D: x = 0, x = 2, y = 0, y = 2.$

14-вариант

1. $S: x^2 + y^2 - z^2 + xz + y + 4, M_0(1; 1; 2).$
2. $z = \arctg(2x - y).$

3. $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = 1, u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$
4. $z = xy - x^2 - y^2 + 9.$
5. $z = xy - 3x - 2y, D: x = 0, x = 4, y = 0, y = 4.$

15-вариант

1. $S: x^2 - y^2 - z^2 + xz + 4x = -5, M_0(-2; 1; 0).$
2. $z = \ln(4x^2 - 5y^2).$
3. $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 2u, u = (x^2 + y^2) \operatorname{tg} \frac{x}{y}.$
4. $z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 10.$
5. $z = x^2 + xy - 2, D: y = 4x^2 - 4, y = 0.$

16-вариант

1. $S: x^2 + y^2 - xz + yz - 3x + 11, M_0(1; 4; -1).$
2. $z = e^{\sqrt{x+y}}.$
3. $9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, u = e^{-(x+3y)} \cdot \sin(x + 3y).$
4. $z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1.$
5. $z = x^2 y(4 - x - y), D: x = 0, y = 0, y = 6 - x.$

17-вариант

1. $S: x^2 + 2y^2 + z^2 - 4xz = 8, M_0(0; 2; 0).$
2. $z = \arcsin(4x + y).$
3. $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, u = xe^{\frac{z}{x}}.$
4. $z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y.$
5. $z = x^3 + y^3 - 3xy, D: x = 0, x = 2, y = -1, y = 2.$

18-вариант

1. $S: x^2 - y^2 - 2z^2 - 2y = 0, M_0(-1; -1; 1).$
2. $z = \arccos(x - 5y).$

3. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $u = \arctg \frac{y}{x}$.
4. $z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$.
5. $z = 4(x - y) - x^2 - y^2$, $D: x = 0$, $x + 2y = 4$, $x - 2y = 4$.

19-вариант

1. $S: x^2 + y^2 - 3z^2 + xy = -2z$, $M_0(1; 0; 1)$.
2. $z = \sin \sqrt{xy}$.
3. $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, $u = \arctg \frac{x}{y}$.
4. $z = xy(6 - x - y)$.
5. $z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x$, $D: x = 3$, $y = 0$, $y = x + 1$.

20-вариант

1. $S: 2x^2 - y^2 + z^2 - 6x + 2y + 6 = 0$, $M_0(1; -1; 1)$.
2. $z = \cos(3x^2 - y^3)$.
3. $\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $u = \ln(x + e^{-y})$.
4. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$.
5. $z = 6xy - 9x^2 - 9y^2 + 4x + 4y$, $D: x = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $y = 2$.

21-вариант

1. $S: x^2 + y^2 - z^2 + 6xy - z = 8$, $M_0(1; 1; 0)$.
2. $z = \arctg(3x + 2y)$.
3. $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, $u = \arcsin \frac{x}{x+y}$.
4. $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$.
5. $z = x^2 + 2xy - y^2 - 2x + 2y$, $D: y = x + 2$, $y = 0$, $x = 2$.

22-вариант

1. $S: z = 2x^2 - 3y^2 + 4x - 2y + 10$, $M_0(-1; 1; 3)$.
2. $z = \ln(5x^2 - 3y^4)$.

$$3. \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{y^2}, u = \frac{y}{(x^2 - y^2)^5}.$$

4. $z = (x - 1)^2 - 2y^2$.
5. $z = 4 - 2x^2 - y^2$, $D: y = 0$, $y = \sqrt{1 - x^2}$.

23-вариант

1. $S: z = x^2 + y^2 - 4xy + 3x - 15$, $M_0(-1; 3; 4)$.
2. $z = \arctg(x - 4y)$.
3. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x+y}{x-y}$, $u = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$.
4. $z = xy - 3x^2 - 2y^2$.
5. $z = 5x^2 - 3xy + y^2 + 4$, $D: x = -1$, $x = 1$, $y = -1$, $y = 1$.

24-вариант

1. $S: z = x^2 + 2y^2 + 4xy - 5y - 10$, $M_0(-7; 1; 8)$.
2. $z = \ln(3xy - 4)$.
3. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{u}$, $u = \sqrt{2xy + y^2}$.
4. $z = x^2 + 3(y + 2)^2$.
5. $z = x^2 + 2xy + 4x - y^2$, $D: x + y + 2 = 0$, $x = 0$, $y = 0$.

25-вариант

1. $S: z = 2x^2 - 3y^2 + xy + 3x + 1$, $M_0(1; -1; 2)$.
2. $z = \lg(xy^2)$.
3. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $u = \ln(x^2 - y^2)$.
4. $z = 2(x + y) - x^2 - y^2$.
5. $z = 2x^2y - x^3y - x^2y^2$, $D: x = 0$, $y = 0$, $x + y = 6$.

ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР

1-§. Асосий тушунчалар.

Биринчи тартибли дифференциал тенгламалар.

Изоклин усули

Дифференциал тенглама деб эркли x ўзгарувчи, y номаълум функция ва унинг турли тартибли ҳосилалари ёки дифференциалларини боғловчи тенгламага айтилади.

Дифференциал тенгламанинг тартиби деб унга кировчи юқори ҳосиланинг (ёки дифференциалнинг) тартибига айтилади.

Агар номаълум функция бир аргументли функциядан иборат бўлса, бундай дифференциал тенглама оддий дифференциал тенглама дейилади.

Агар номаълум функция бир нечта аргументга боғлиқ бўлган функциядан иборат бўлса, бундай дифференциал тенглама хусусий ҳосилали дифференциал тенглама дейилади.

Масалан, $2xy' - 3y + x = 0$ (бунда $y = y(x)$) тенглама биринчи тартибли оддий дифференциал тенглама, $u' + u' - xy + 2 = 0$ (бунда $u = u(x, y)$) тенглама биринчи тартибли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламадир.

Бу бобда фақат оддий дифференциал тенгламаларни қараймиз, шу сабабли қисқалик учун "оддий" сўзини ишлатмаймиз.

Умумий ҳолда n -тартибли дифференциал тенгламани куйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\Phi(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0. \quad (7.1)$$

Агар (7.1) тенгламани энг юқори тартибли ҳосиллага нисбатан ечилган

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (7.2)$$

кўринишда ёзиш мумкин бўлса, бундай тенглама нормал кўринишдаги n -тартибли дифференциал тенглама дейилади.

Дифференциал тенгламанинг ечимини топиш жараёни тенгламани интеграллаш дейилади.

(7.1) (ёки (7.2)) дифференциал тенгламани қаноатлантирадиган, яъни уни айнайтга айлантирадиган ҳар қан-

дай $y = y(x)$ функция дифференциал тенгламанинг ечими (ёки интеграл) дейилади.

1-мисол. Сон ўқининг ҳамма нуқталарида аниқланган $y = xe^{2x}$ функция $y'' - 4y' + 4y = 0$ дифференциал тенгламанинг ечими бўлишини исбот қилинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топамиз:

$$y' = e^{2x}(1 + 2x), \quad y'' = 4e^{2x}(1 + x).$$

Берилган функция ва унинг ҳосилаларини тенгламага қўйсақ, куйидаги айнайтга эга бўламиз:

$$4e^{2x}(1 + x) - 4e^{2x}(1 + 2x) + 4xe^{2x} = 4e^{2x}(1 + x - 1 - 2x + x) = 0.$$

Демак, $y = xe^{2x}$ функция берилган тенгламанинг ечими экан.

2-мисол. $F(x, y) = \ln \frac{y}{x} - 5 + xy = 0$ ошқормас кўринишда берилган функциянинг $(x + xy^2)y' = y + xy^2$ дифференциал тенгламанинг ечими бўлишини исбот қилинг.

Ечиш. $F(x, y) = 0$ ошқормас функцияни дифференциаллаш қоидаси, яъни (6.6) формулага кўра

$$y' = \frac{F_x}{F_y} = -\frac{\left(\frac{y}{x} - \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x}} = \frac{y}{x} \cdot \frac{1 - xy}{1 + xy} = \frac{y - xy^2}{x + x^2y}$$

ни ҳосил қиламиз. Топилган ҳосилани берилган дифференциал тенгламага қўйсақ, айнайтга эга бўламиз.

(7.1) (ёки (7.2)) дифференциал тенглама ечимининг (ёки интегралнинг) Оху текислигидаги графиги интеграл эгри чизиқ дейилади. Демак, ҳар бир ечимга ёки интегралга унга мос битта интеграл эгри чизиқ тўғри келади.

(7.2) дифференциал тенглама ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги ҳақидаги масала куйидаги теорема ёрдамида ҳал қилинади.

1-теорема (Коши теоремаси). Агар (7.2) тенгламанинг ўнг қисми

$$x_0, y_0, y_0', \dots, y_0^{(n-1)} \quad (7.3)$$

қиймат атрофида узлуксиз функция бўлса, y ҳолда $(a; b)$ интервалда ётувчи x_0 учун y функция ва унинг ҳосилалари

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \quad (7.4)$$

қийматлар қабул қилса, (7.2) тенглама $y = y(x)$ хусусий ечимга эга бўлади.

Агар олинган атрофда бу функциянинг аргументларга нисбатан хусусий ҳосилалари узлуксиз бўлса, ечим ягона бўлади (Коши масаласи). (7.4) тенгликлар бошланғич шартлар дейилади.

Ихтиёрий (7.2) дифференциал тенглама Коши теоремасини қаноатлантирувчи соҳада чексиз кўп ечимга эга бўлади. Бу ечимлар тўпламини таърифлаш учун умумий ечим тушунчасини киритамиз. (7.1) ёки (7.2) дифференциал тенгламанинг умумий ечими (умумий интеграл) деб $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ ёки қисқача $y = \varphi(x, C_n)$ кўринишдаги функцияга айтилади, бунда $C_i (i = 1, n)$ ихтиёрий ўзгармас бўлиб, улар қуйидаги иккита шартни қаноатлантириши керак:

1) C_1 ихтиёрий қийматларида (7.1) ёки (7.2) дифференциал тенглама ечимга эга;

2) $x_0, y_0, y_0', \dots, y_0^{(n-1)}$ ихтиёрий бошланғич қийматлар учун $C_i = C_{i0}$ ўзгармаснинг қийматлари

$$\varphi(x_0, C_{i0}) = y_0, \varphi'(x_0, C_{i0}) = y_0', \dots, \varphi^{(n-1)}(x_0, C_{i0}) = y_0^{(n-1)}$$

бошланғич шартни қаноатлантиради.

C_{i0} ларга маълум қийматлар бериб ҳосил қилинадиган ҳар бир ечим (7.2) тенгламанинг хусусий ечими дейилади.

Дифференциал тенгламанинг умумий ечимидан бошқа, ихтиёрий ўзгармаснинг ҳеч қандай қийматида ҳосил бўлмайдиган ечими (интеграл) мавжуд бўлиши мумкин. Бундай ечим (интеграл) махсус ечим дейилади. Махсус ечимнинг ихтиёрий нуқтасида Коши теоремасининг бирор шarti бузилади. Масалан, $y'' = 3\sqrt[3]{(y-1)^2}$ дифференциал тенгламанинг умумий ечими

$$y = x + \frac{1}{4}(x + C_1)^4 + C_2$$

дан иборат, бунда C_1, C_2 — ихтиёрий ўзгармас. $y = x + C$ (бунда C — ихтиёрий ўзгармас) функция ҳам берилган тенгламани ечими. Лекин бу ечим умумий ечимдаги C_1 ва C_2 ўзгармасларнинг бирор қийматларида ҳосил бўлмайди. Бун-

дан ташқари $y = 1$ да ечимнинг ихтиёрий нуқтасида ечимнинг ягоналиги ҳақидаги Коши теоремасининг шarti бузилади ёки берилган тенгламанинг ўнг қисмида y' хусусий ҳосила $y' = 1$ да узлукли. Шунинг учун $y = x + C$ махсус ечим бўлади.

Аниқмас интеграллар назариясида кўрилган барча интеграллар энг содда $y' = f(x)$ дифференциал тенгламанинг умумий ечими эканлигини таъкидлаб ўтамиз:

$$y = \int f(x)dx = F(x) + C,$$

бунда $F(x) = \int f(x)dx$ функциянинг бошланғич функцияси, яъни $F'(x) = f(x)$; C — ихтиёрий ўзгармас сон.

Умумий ҳолда биринчи тартибли дифференциал тенглама қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$F(x, y, y') = 0 \quad (7.5)$$

ёки

$$y' = f(x, y). \quad (7.6)$$

(7.5) ёки (7.6) тенгламалар учун қуйидаги теоремани исботсиз келтирамиз.

2-теорема (Коши). Агар $f(x, y)$ функция $M(x_0, y_0)$ нуқта ва унинг атрофида узлуксиз бўлса, у ҳолда (7.6) тенглама $y(x_0) = y_0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи $y = \varphi(x)$ ечимга эга бўлади. Агар берилган функциянинг $\frac{\partial f}{\partial x}$ хусусий ҳосиласи бу нуқтада узлуксиз бўлса, у ҳолда $y = \varphi(x)$ ечим ягона ечим бўлади.

Биринчи тартибли дифференциал тенгламани қуйидагича қулай кўринишда ҳам ёзилади:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0. \quad (7.7)$$

(7.7) — дифференциал тенгламанинг дифференциалли кўринишдаги тенгламаси дейилади.

(7.5) ёки (7.6) дифференциал тенглама учун тенглама ечимининг мавжудлик ва ягоналиги ҳақидаги Коши теоремасини исботсиз келтирамиз.

Агар (7.6) тенгламанинг ўнг томони ва унинг $f'(x, y)$ хусусий ҳосиласи x ва y ўзгарувчиларнинг бирор ўзгариши соҳасида аниқланган ва узлуксиз бўлса, бу соҳанинг (x_0, y_0) ички нуқтаси қандай бўлмасин, берилган тенглама $y(x_0) = y_0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ягона $y = \varphi(x)$ ечимга эга бўлади.

Бу, геометрик нуқтаи назаридан, соҳанинг ҳар бир $(x_0; y_0)$ ички нуқтаси орқали ягона интеграл эгри чизиқ ўтишини билдиради.

$y' = f(x, y)$ тенгламанинг $y(x_0) = y_0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топиш масаласи Коши масаласи дейилади.

Ҳосиланинг геометрик маъносига кўра:

$$y' = f(x, y) = \operatorname{tg} \alpha = k,$$

бу ерда α — уринманинг Ox ўққа оғиш бурчаги. Бу эса интеграл эгри чизиққа унинг ҳар бир нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини (7.6) дифференциал тенглама ўнг томонининг бу нуқтадаги қийматига тенг эканини билдиради.

Текисликнинг ҳар бир нуқтасига Ox ўққа оғиш бурчанинг тангенсини (7.6) дифференциал тенглама ўнг томонининг шу нуқтадаги қийматига тенг бўладиган қилиб кесма қўйилган қисми бу дифференциал тенгламанинг *йўналишлар майдони* деб аталади.

Текисликнинг майдон кесмалари бир хил йўналишга эга бўладиган барча нуқталар тўплами дифференциал тенгламанинг *изоклинали* дейилади.

Ушбу

$$f(x, y) = k \quad (7.8)$$

муносабат (7.6) дифференциал тенгламанинг изоклиналар оиласининг тенгласи деб олинади. (7.8) изоклиналар оиласи ёрдамида интеграл эгри чизиқлар оиласини тақрибий ясаш мумкин.


3-мисол. $y' = -\frac{2y}{x}$ дифференциал тенгламанинг интеграл эгри чизиқларини изоклиналар усули билан тақрибий ясанг.

Ечиш. $-\frac{2y}{x} = k$ ($k = \text{const}$) деб берилган тенгламанинг $y = -\frac{k}{2}x$ изоклиналар оиласи тенгласини топамиз. Улар координаталар бошидан ўтувчи тўғри чизиқлардан иборат бўлиб, йўналишлар майдони эса $y' = k = \operatorname{tg} \alpha$ тенглик билан аниқланади. k га ҳар хил қийматлар бериб, уларга мос изоклиналарини топамиз ва интеграл эгри чизиққа ўтказилган уринманинг Ox ўққа оғиш

бурчаги α бўйича йўналишлар майдонини аниқлаймиз. Уларни қуйидаги жадвал кўринишида ёзиб оламиз:

k	0	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$	± 1	$\pm \sqrt{3}$	± 2	± 3	$\pm \infty$
α	0	$\pm 30^\circ$	$\pm 45^\circ$	$\approx \pm 60^\circ$	$\approx \pm 64^\circ$	$\approx \pm 72^\circ$	$\pm 90^\circ$
$y = -\frac{k}{2}x$	$y=0$	$y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$	$y = \pm \frac{1}{2}x$	$y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$	$y = \pm x$	$y = \pm \frac{3}{2}x$	$y=0$

Бу жадвалда берилганларга кўра майдон йўналишларини чизамиз (68-чизма) ва интеграл эгри чизиқларни тақрибий чизамиз. α бурчакнинг мусбат ёки манфий қийматига қараб Ox ўқидан соат стрелкасига қарама-қарши ёки соат стрелкаси йўналишида интеграл чизиқлар чизилади.



68-чизма.

2-§. Ўзгарувчилари ажраладиган ва бир жинсли дифференциал тенгламалар

Ушбу

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0 \quad (7.9)$$

тенглама ўзгарувчилари ажралган дифференциал тенглама дейилади. Унинг умумий интеграли

$$\int P(x)dx + \int Q(y)dy = C \quad (7.10)$$

каби аниқланади, бунда C — ихтиёрий ўзгармас.

Ушбу

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0 \quad (7.11)$$

ёки

$$y' = \frac{dy}{dx} = f_1(x)f_2(y) \quad (7.12)$$

тенгламалар ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенгламалар дейилади.

(7.11), (7.12) тенгламаларда ўзгарувчиларни ажратиш қуйидагича бажарилади. Фараз қилайлик, $N_1(y) \neq 0$, $M_2(x) \neq 0$ бўлсин. (7.11) тенгламанинг иккала қисмини $N_1(y)M_2(x)$ га бўламиз, (7.12) тенгламанинг иккала қисмини dx га қўлайтирамиз ва $f_2(y)$ га бўламиз. Натижада қуйидаги қўринишдаги ўзгарувчилари ажралган тенгламаларга эга бўламиз:

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = 0, \quad f_1(x)dx - \frac{dy}{f_2(y)} = 0.$$

Булар (7.10) формула ёрдамида интегралланади:

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = C, \quad \int f_1(x)dx - \int \frac{dy}{f_2(y)} = C.$$

1-мисол. $(xy + y)dx + (xy + x)dy = 0$ дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $x \neq 0$, $y \neq 0$ деб фараз қилиб, берилган тенгламанинг иккала қисмини xy га бўламиз. Натижада ўзгарувчилари ажралган қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)dx + \left(1 + \frac{1}{y}\right)dy = 0.$$

(7.10) формулага кўра унинг интегралини топамиз:

$$\int \left(1 + \frac{1}{x}\right)dx + \int \left(1 + \frac{1}{y}\right)dy = \ln|C|,$$

$$x + \ln|x| + y + \ln|y| = \ln|C|,$$

$$\ln|xy| + \ln e^{x+y} = \ln|C|, \quad xye^{x+y} = C.$$

Охирги тенглик берилган дифференциал тенгламанинг умумий интегралидир. Уни топишда $x \neq 0$, $y \neq 0$ деб қабул қилган эдик. Аммо $x = 0$ ва $y = 0$ ҳам берилган тенгламанинг ечими бўлишини осонгина текшириш мумкин. Иккинчи томондан, уларни умумий интегралда $C = 0$ деб топиш ҳам мумкин. Демак, $x = 0$, $y = 0$ берилган тенгламанинг хусусий ечими.

2-мисол. $(1 + e^{2x})y^2y' = e^x$ дифференциал тенгламанинг $y(0) = 1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани дифференциалли шаклда ёзиб оламиз ((7.7) формулага қаранг):

$$(1 + e^{2x})y^2dy - e^xdx = 0.$$

Ўзгарувчиларни ажратамиз:

$$y^2dy - \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx = 0.$$

Бу тенгламани интеграллаб берилган тенгламанинг умумий ечимини топамиз:

$$\int y^2dy - \int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx = \frac{C}{3}$$

ёки

$$\frac{y^3}{3} - \operatorname{arctge}^x = \frac{C}{3}, \quad y = \sqrt[3]{C + 3\operatorname{arctge}^x}.$$

Бошланғич шартдан фойдаланиб ихтиёрий ўзгармас C нинг қийматини аниқлаймиз:

$$1 = \sqrt[3]{C + \frac{3}{4}\pi} \Rightarrow C = 1 - \frac{3}{4}\pi.$$

Демак, берилган тенгламанинг хусусий ечими қуйидагича қўринишда бўлади:

$$y = \sqrt[3]{1 - \frac{3}{4} \pi + 3 \operatorname{arctg} e^x}.$$

Агар $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ (n — ўзгармас сон) тенглик ихтиёрий $t \in R$ учун ўринли ($f(tx, ty)$ функция аниқланган) бўлса, $f(x, y)$ функция x ва y аргументларга нисбатан n ўлчовли бир жинсли функция дейилади.

Масалан, $f(x, y) = 2x^4 - xy^3 + y^4$ функция тўрт ўлчовли ($n = 4$) бир жинсли функция бўлади, чунки

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= 2 \cdot (tx)^4 - (tx)^3(ty) + (ty)^4 = \\ &= t^4(2x^4 - x^3y + y^4) = t^4 f(x, y). \end{aligned}$$

$f(x, y) = 4\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{xy} - 3\sqrt[3]{y^2}$ функция

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= 4\sqrt[3]{(tx)^2} - 2\sqrt[3]{(tx)(ty)} - 3\sqrt[3]{(ty)^2} = \\ &= \sqrt[3]{t^2} (4\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{xy} - 3\sqrt[3]{y^2}) = t^{\frac{2}{3}} f(x, y) \end{aligned}$$

бўлгани учун $n = \frac{2}{3}$ ўлчовли бир жинсли функция бўлади.

Агар $n = 0$ бўлса, бундай функция ноль ўлчовли бир жинсли функция дейилади. Масалан,

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} \cdot \ln \left(\frac{x}{y} - 1 \right)$$

функция учун

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \frac{tx+ty}{tx-ty} \cdot \ln \left(\frac{tx}{ty} - 1 \right) = \frac{t(x+y)}{t(x-y)} \cdot \ln \left(\frac{x}{y} - 1 \right) = \\ &= \frac{x+y}{x-y} \cdot \ln \left(\frac{x}{y} - 1 \right) = f(x, y) \end{aligned}$$

(бунда $t \neq 0$) бўлгани учун берилган функция ноль ўлчовли бир жинсли функция бўлади.

Агар $f(x, y)$ функция ўзининг аргументларига нисбатан ноль ўлчовли бир жинсли функция, яъни

$$f(tx, ty) = t^0 f(x, y) = f(x, y)$$

бўлса, y ҳолда қуйидаги нормал кўринишдаги

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (7.13)$$

дифференциал тенглама x ва y ўзгарувчиларга нисбатан бир жинсли тенглама дейилади.

Агар бир жинсли $P(x, y)$, $Q(x, y)$ функциялар бир хил n ўлчовли, яъни

$$P(tx, ty) = t^n P(x, y), \quad Q(tx, ty) = t^n Q(x, y)$$

бўлса, y ҳолда тўлиқ дифференциалли

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

тенглама бир жинсли бўлади. Ҳақиқатан, уни қуйидаги нормал кўринишда ёзиб оламиз:

$$y' = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)} = f(x, y),$$

бундан

$$f(tx, ty) = -\frac{P(tx, ty)}{Q(tx, ty)} = -\frac{t^n P(x, y)}{t^n Q(x, y)} = f(x, y)$$

бўлгани сабабли $f(x, y)$ функция ноль ўлчовли бир жинсли функция бўлади.

Нормал кўринишдаги (7.13) бир жинсли дифференциал тенгламани ҳар доим $y' = f(x, y) = f(tx, ty)$ кўринишда ёзиш мумкин ва $t = \frac{1}{x}$ алмаштириш ёрдамида $y' = \frac{dy}{dx} = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ ни ҳосил қилинади. Демак, (7.13)

тенгламани $y = xu$ ($u = \frac{y}{x}$, $y' = u + xu'$) алмаштириш ёрдамида x ва янги $u(x)$ функцияларга нисбатан ўзгарувчиларни ажраладиган тенгламага келтирилади:

$$u + xu' = \varphi(u), \quad x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u, \quad \frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}.$$

3-мисол. $2x^2y' = x^2 + y^2$ дифференциал тенгламанинг умумий ва $y(1) = 0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. $2x^2$ ва $x^2 + y^2$ функциялар икки ўлчовли бир жинсли бўлгани учун берилган тенглама бир жинсли бўлади. $y = xu$, $y' = xu' + u$ алмаштиришни бажарамиз:

$$2x^2(u + xu') = x^2 + (xu)^2, \quad 2x^2(u + xu') = x^2(1 + u^2).$$

$x \neq 0$ деб тенгламанинг иккала қисмини x^2 га бўламиз. Сўнгра ўзгарувчиларни ажратамиз:

$$2u + 2x \frac{du}{dx} = 1 + u^2, \quad 2xdu = (1 - 2u + u^2)dx.$$

$$\frac{du}{(u-1)^2} = \frac{dx}{2x}, \quad \int \frac{du}{(u-1)^2} = \int \frac{dx}{2x}, \quad \int \frac{d(u-1)}{(u-1)^2} = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C,$$

$$-\frac{1}{u-1} = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C, \quad 1 = (1-u) \ln(C\sqrt{x}).$$

Охирги ифодадаги u нинг ўрнига $\frac{y}{x}$ қийматини қўямиз:

$$1 = \left(1 - \frac{y}{x}\right) \ln(C\sqrt{x}), \quad x = (x-y) \ln(C\sqrt{x}).$$

Уни y га нисбатан ечиб, берилган дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топамиз:

$$y = x - \frac{x}{\ln(C\sqrt{x})}.$$

$y(1) = 0$ бошланғич шартдан фойдаланиб, ўзгармас C нинг қийматини аниқлаймиз:

$$0 = 1 - \frac{1}{\ln C}, \quad \ln C = 1, \quad C = e.$$

Демак, берилган тенгламанинг хусусий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = x - \frac{x}{1 + \ln \sqrt{x}}.$$

Машқлар

338. $y(x, C)$ функция (бунда C — ихтиёрий ўзгармас сон) берилган дифференциал тенгламанинг ечими (интеграли) бўлади:

а) $y = x^2 \left(1 + Ce^{\frac{1}{x^2}}\right), \quad x^2 y' + (1 - 2x)y = x^2;$

б) $y = Ce^x - e^{-x}, \quad xy'' + 2y' - xy = 0;$

в) $x^2 + y^4 = Cy^2, \quad xydy = (x^2 - y^4)dy;$

г) $y = Cx + \frac{1}{C}, \quad xy' - y + \frac{1}{y} = 0;$

д) $y = \frac{2+Cx}{1+2x}, \quad 2(1+x^2y') = y - xy';$

е) $e^x = Cy, \quad xy' - y^2 = x^2 y';$

339. Қуйида берилган ҳар бир дифференциал тенглама учун изоклина усули ёрдамида йўналишлар майдонини ясанг ва интеграл эгри чизиқларни тақрибий чизинг:

а) $y' = x + y;$ б) $2xy' = \frac{y^2}{x};$ в) $xy' = 1 - y.$

340. Қуйидаги дифференциал тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $(1 + e^x)y' = ye^x;$

б) $xy' = y^2 + 1;$

в) $3y' = \frac{y^2}{x^2} + 9\frac{y}{x} + 9;$

г) $xy' = y + \sqrt{x^2 + y^2};$

д) $ydx + (\sqrt{xy} - \sqrt{x})dy = 0;$

е) $4(x^2y + y)dy + \sqrt{5 + y^2}dx = 0.$

341. Қуйидаги дифференциал тенгламаларнинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг:

а) $(x + xy)dy + (y - xy)dx = 0, \quad y(1) = 1;$

б) $xy' = x \sin \frac{y}{x} + y, \quad y(2) = \pi;$

в) $ydx + (\sqrt{xy} - x)dy = 0, \quad y(1) = 1;$

г) $xy' = y(1 + \ln y - \ln x), \quad y(1) = e^2.$

3-§. Биринчи тартибли чизиқли дифференциал тенгламалар. Бернулли тенгламаси

Номальум y функция ва унинг y' ҳосиласига нисбатан

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (7.14)$$

кўринишдаги тенглама (шунингдек, алгебраик алмаштришлар ёрдамида (7.14) кўринишга келтириладиган тенглама) биринчи тартибли чизиқли бир жинслимас дифференциал тенглама дейилади. $P(x) \neq 0$ ва $Q(x) \neq 0$ функ-

циялар бирор соҳада узлуксиз бўлиши керак. Масалан, $[a; b]$ кесмада Коши теоремасининг шарти бажарилсин. (7.14) тенгламанинг умумий ечимини ҳар доим қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right), \quad (7.15)$$

бунда C — ихтиёрий ўзгармас. Шундай қилиб, (7.14) тенгламанинг умумий ечими маълум бўлган $P(x)$, $Q(x)$ функцияларнинг интеграллари орқали ифодаланади.

Агар (7.14) тенгламада $Q(x) = 0$ ёки $P(x) = 0$ бўлса, у ҳолда ўзгарувчиларга нисбатан ажраладиган дифференциал тенглама ҳосил қиламиз ва унинг умумий ечимини мос равишда (7.14) тенгламада $Q(x) = 0$ ёки $P(x) = 0$ деб аниқлаймиз. $Q(x) = 0$ бўлган ҳолда (7.14) тенглама чизикли бир жинсли дифференциал тенгламага айланади.

1 - мисол. $(x^2 - x)y' + y = x^2(2x - 1)$ тенгламанинг умумий ечимини ва $y(-2) = 2$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламанинг иккала қисмини $x^2 - x \neq 0$ га бўлиб, уни (7.14) кўринишдаги тенгламага келтирамиз:

$$y' + \frac{y}{x^2 - x} = \frac{x^2(2x - 1)}{x^2 - x}.$$

$$\text{Бунда } P(x) = \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{x(x-1)}, \quad Q(x) = \frac{x^2(2x-1)}{x(x-1)} = \frac{x(2x-1)}{x-1}.$$

(7.15) формулага асосан берилган тенгламанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = e^{-\int \frac{dx}{x(x-1)}} \left(\int \frac{x(2x-1)}{x-1} e^{\int \frac{dx}{x(x-1)}} dx + C \right).$$

Бу ечимдаги интегралларни топамиз:

$$\begin{aligned} \text{а) } \int \frac{dx}{x(x-1)} &= \int \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} = \frac{1}{x(x-1)}, \quad A = -1, \quad B = 1 \\ &= \int \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \right) dx = -\ln|x| + \ln|x-1| = \ln \left| \frac{x-1}{x} \right|; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \int \frac{x(2x-1)}{x-1} e^{\ln \frac{x-1}{x}} dx &= \int \frac{x(2x-1)}{x-1} \cdot \left| \frac{x-1}{x} \right| dx = \\ &= \pm \int (2x-1) dx = \pm(x^2 - x), \end{aligned}$$

бунда (+) ва (-) ишоралар $\left| \frac{x-1}{x} \right| = \pm \frac{x-1}{x}$ тенгликдан ҳосил бўлади. Топилган (а) ва (б) интегралларни умумий ечимга қўямиз:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\ln \frac{x-1}{x}} (\pm(x^2 - x) + C) = \left| \frac{x}{x-1} \right| \cdot (\pm(x^2 - x) + C) = \\ &= \pm \frac{x}{x-1} \cdot (\pm x(x-1) + C) = x^2 + \frac{Cx}{x-1}. \end{aligned}$$

Ундан $y(-2) = 2$ шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини ажратиб оламиз:

$$2 = 4 - \frac{2C}{-2-1}, \quad C = -3, \quad y = x^2 - \frac{3x}{x-1}.$$

Айрим ҳолларда дифференциал тенгламалар x га нисбатан чизикли бўлиб, уларнинг умумий кўриниши қуйидагича бўлади:

$$\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y). \quad (7.16)$$

(7.16) нинг умумий ечими қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$x = e^{-\int P(y)dy} \left(\int Q(y) e^{\int P(y)dy} dy + C \right). \quad (7.17)$$

2 - мисол. $(2x - y^2)y' = 2y$ дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенглама $x(y)$ функцияга нисбатан чизикли бўлгани учун, уни қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$(2x - y^2) \frac{dy}{dx} = 2y, \quad 2x - y^2 = 2y \frac{dx}{dy}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} - \frac{y}{2},$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y} \cdot x = -\frac{y}{2}, \quad P(y) = -\frac{1}{y}, \quad Q(y) = -\frac{y}{2},$$

яъни (7.16) кўринишдаги тенгламага эга бўлди. (7.17) формулага асосан берилган тенгламанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$x = e^{\int \frac{dy}{y}} \left(-\int \frac{y}{2} e^{-\int \frac{dy}{y}} dy + C \right) = e^{\ln|y|} \left(-\int \frac{y}{2} e^{-\ln|y|} dy + C \right) =$$

$$= |y| \left(-\frac{1}{2} \int \frac{y}{|y|} dy + C \right) = -\frac{y}{2} \int \frac{dy}{y} + C = C - \frac{1}{2} y^2.$$

(7.14) чизикли дифференциал тенгламани Бернулли усули билан ҳам интеграллаш мумкин. Унинг учун иккита: $u(x)$ ва $v(x)$ номаълум функциялар бўлган $y = u(x) \cdot v(x)$ алмаштиришни (Бернулли алмаштиришини) қўлаймиз. У ҳолда $y' = u'v + uv'$ (7.14) тенгламадаги y ва y' ларни ўрнига қўйиб қуйидаги

$$u'v + uv' + P(x)uv = Q(x)$$

тенгламани ҳосил қиламиз. Бундан

$$(v' + P(x) \cdot v)u + u'v = Q(x). \quad (7.18)$$

Номаълум функцияларнинг бирини ихтиёрий танлаб олиш мумкин бўлгани учун, масалан, v ни шундай оламизки, у (7.18) тенгламадаги u нинг олдидаги коэффициентини нолга айлантирувчи тенгламанинг $v = v(x)$ хусусий ечими бўлсин. Бундан кейин (7.18) тенглама $u'v = Q(x)$ кўринишга келади. Бу тенгламанинг умумий ечими $u = u(x, C)$ бўлсин, у ҳолда $y = u(x, C) \cdot v(x)$ (7.14) тенгламанинг умумий ечими бўлади. Шундай қилиб, (7.14) тенгламани интеграллаш иккита ўзгарувчилари ажраладиган тенгламани интеграллашга келтирилади.

3-мисол. $y' + y \lg x = \frac{1}{\cos x}$ тенгламани Бернулли усули билан интеграллаган ва унинг $y(\pi) = 1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. $y = uv$, $y' = u'v + uv'$ Бернулли алмаштиришни бажариб, қуйидагига эга бўламиз:

$$u'v + uv' + u \lg x = \frac{1}{\cos x}, \quad (v' + \lg x)u + u'v = \frac{1}{\cos x}.$$

$v' + \lg x = 0$ тенгламанинг хусусий ечимини топамиз:

$$dv + v \lg x dx = 0, \quad \frac{dv}{v} + \lg x dx = 0,$$

$$\int \frac{dv}{v} + \int \lg x dx = 0, \quad \ln|v| - \ln|\cos x| = \ln C_1.$$

$C_1 = 1$ деб тенгламанинг $v = \cos x$ хусусий ечимни оламиз. Сўнгра $u'v = \frac{1}{\cos x}$ (бунда $v = \cos x$) тенгламанинг умумий ечимини излаймиз:

$$u' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad u = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + C = \operatorname{tg} x + C.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$y = uv = (\operatorname{tg} x + C) \cos x.$$

Ундан $y(\pi) = 1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимни ажратиб оламиз: $1 = (0 + C) \cdot (-1)$, бундан $C = -1$. Бу қийматни умумий ечимга қўйиб, берилган тенгламанинг хусусий ечимини топамиз:

$$y = (\operatorname{tg} x - 1) \cos x = \sin x - \cos x.$$

Ушбу

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (7.19)$$

дифференциал тенглама (бунда $n = \operatorname{const} \in \mathbb{R}$, $n \neq 0$, $n \neq 1$), шунингдек, бирор алгебраик алмаштиришлар ёрдамида (7.19) кўринишга келтириладиган исталган тенглама *Бернулли тенгламаси* дейилади.

$z(x)$ янги функцияни $z = y^{1-n}$ формула ёрдамида алмаштирилса, у ҳолда Бернулли тенгламаси шу функцияга нисбатан чизикли тенгламага келтирилади:

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x). \quad (7.20)$$

Юқоридаги усуллардан фойдаланиб, (7.20) тенгламанинг $z = z(x, c)$ ечимини топамиз. Сўнгра $y = z^{\frac{1}{1-n}}$ топилади.

Бернулли тенгламасининг ечимини $y = u(x) \cdot v(x)$ Бернулли алмаштириши ёрдамида ҳам топиш мумкин. Буни мисолда кўрсатамиз.

4-мисол. Ушбу $y' + 2e^x y = 2e^x \sqrt{y}$ Бернулли тенгламасининг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламада $n = \frac{1}{2}$ бўлгани учун $z = y^{1-n} = \sqrt{y}$ алмаштиришни бажарамиз. (7.20) тенгламага кўра $z' + e^x z = e^x$ тенгламани ҳосил қиламиз, унинг умумий ечими (7.15) формулага асосан қуйидаги кўринишда бўлади:

$$z = e^{-\int e^x dx} \left(\int e^x \cdot e^{\int e^x dx} dx + C \right) = e^{-e^x} \left(\int e^x e^{e^x} dx + C \right) =$$

$$= e^{-e^x} \left(\int e^{e^x} dx e^x + C \right) = e^{-e^x} (e^{e^x} + C) = 1 + Ce^{-e^x}.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$y = z^2 = (1 + Ce^{-e^x})^2.$$

5-мисол. Ушбу $xy' + y = xy^2 \ln x$ дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Тенгламанинг иккала қисмини $x \neq 0$ га бўламиз. Натижада $n = 2$ бўлган Бернулли тенгласига эга бўламиз. Уни Бернулли алмаштириши ($y = uv$, $y' = u'v + uv'$) усули билан ечамиз:

$$x(u'v + uv') + uv = x(uv)^2 \ln x.$$

$xv' + v = 0$ тенгламанинг хусусий ечими $v = x^{-1}$ оson-гина топилади. Энди $xuv' = xu^2v^2 \ln x$ тенгламанинг умумий ечимини топиш керак.

$v = x^{-1}$ қийматни ўрнига қўйиб, $u' = u^2 \cdot \frac{\ln x}{x}$ тенгламани ҳосил қиламиз.

Охириги тенгламадаги ўзгарувчиларни ажратамиз ва уни интеграллаймиз:

$$\frac{du}{u^2} = \ln x \frac{dx}{x}, \quad \int \frac{du}{u^2} = \int \ln x \frac{dx}{x},$$

$$-\frac{1}{u} = \frac{\ln^2 x}{2} + \frac{C}{2}, \quad u = -\frac{2}{C + \ln^2 x}.$$

Демак, берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$y = uv = -\frac{2}{x(C + \ln^2 x)}.$$

Машқлар

342. Қуйидаги дифференциал тенгламаларнинг турини аниқланг ва уларни ечиш йўллариини кўрсатинг:

а) $xy' + 2\sqrt{xy} = y$;

б) $y' \cos x = \frac{y}{\ln y}$;

в) $y' = \frac{y}{2x \ln y + y - x}$;

г) $(1 + e^{2x})y^2 dy - e^x dx = 0$;

д) $y' = e^{2x} - e^x y$;

е) $xy' + y - y^2 = 0$;

ж) $2x \cos^2 y dx + (2y - x^2 \sin 2y) dy = 0$;

з) $y^2 + x^2 y' = xy y'$.

343. Ушбу дифференциал тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y' + \frac{y}{x} = 1 + 2 \ln x$;

б) $y' + 4xy = 2x^{-x^2} y$;

в) $(2y - x^2 \sin 2y)y' + 2x \cos^2 y = 0$;

г) $(x^2 - xy)y' + y^2 = 0$;

д) $y' - \frac{y}{x-3} = \frac{y}{x-3}$;

е) $xdy = (e^{-x} - y)dx$.

344. Ушбу дифференциал тенгламаларнинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

а) $2xy dx + (y - x^2) dy = 0$, $y(-2) = 4$;

б) $y' = 2y - x + e^x$, $y(0) = -1$;

в) $y' + 3y = e^{2x} y^2$, $y(0) = 1$;

г) $y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$, $y(\pi) = 5$;

д) $y^2 dx = \left(x + ye^{\frac{1}{y}} \right) dy$, $y(0) = -3$;

е) $y' - 7y = e^{3x} y^2$, $y(0) = 2$.

4-§. Тўлиқ дифференциалли тенглама

Агар D соҳада $P(x,y)$, $Q(x,y)$ функциялар аниқланган ва

$$\frac{dP(x,y)}{dy} = \frac{dQ(x,y)}{dx} \quad (7.21)$$

тенгсизлик бажарилса,

$$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0 \quad (7.22)$$

тенглама ечими мавжуд бўлади. (7.22) кўринишдаги тенглама *тўлиқ дифференциалли* тенглама дейилади.

(7.22) тенгламанинг умумий интегрални қуйидаги формулаларнинг бири билан аниқланади:

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C, \quad (7.23)$$

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C, \quad (7.24)$$

бунда $M_0(x_0, y_0) \in D$.

Мисол. $(x^2 + y - 4)dx + (x + y + e^y)dy = 0$ тенгламанинг умумий интегралини топинг.

Ечиш. $P = x^2 + y - 4$, $Q = x + y + e^y$ деб белгиланган оламиз

$$\frac{dP}{dy} = 1, \quad \frac{dQ}{dx} = 1$$

булгани учун (7.21) шарт бажарилади ва берилган тенглама тўлиқ дифференциалли тенглама бўлади. Унинг умумий интегралини (7.23) ёки (7.24) формуладаги $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ деб топиш мумкин.

Танлаб олинган x_0 , y_0 нинг бу қийматларида $P(x,y)$, $Q(x,y)$ функциялар ва унинг хусусий ҳосилалари аниқланган, яъни $M_0(0,0) \in D$. (7.23) формулага асосан қуйидагига эга бўламиз:

$$\int_0^x (x^2 + 0 - 4) dx + \int_0^y (x + y + e^y) dy = C, \\ \frac{x^3}{3} - 4x + xy + \frac{y^2}{2} + e^y - 1 = C.$$

(7.24) формулага асосан:

$$\int_0^x (x^2 + y - 4) dx + \int_0^y (0 + y + e^y) dy = C, \\ \frac{x^3}{3} + xy - 4x + \frac{y^2}{2} + e^y - 1 = C,$$

яъни аниқланган умумий интеграл билан бир хил натижага эга бўлдик.

Машқлар

345. Қуйидаги дифференциал тенгламаларнинг умумий интегралини топинг:

а) $(e^y + y + \sin y)dx + (e^y + x + x \cos y)dy = 0$;

б) $\left(2x + e^y\right)dx + \left(1 - \frac{1}{y}\right)e^y dy = 0$;

в) $y' = \frac{y-3x^2}{4y-x}$;

г) $(3x^2y + \sin x)dx + (x^3 - \cos y)dy = 0$.

346. Қуйидаги дифференциал тенгламаларнинг хусусий ечимларини топинг:

а) $e^{-y}dx + (2y - xe^{-y})dy = 0$, $y(-3) = 0$;

б) $x dx + y dy = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $y(1) = 1$;

в) $x + ye^x + (y + e^x)y' = 0$, $y(0) = 4$;

г) $(2x + y + 3x^2 \sin y)dx + (x + x^3 \cos y + 2y)dy = 0$, $y(0) = 2$.

347. $A(1;0)$ нуқтадан ўтувчи шундай эгри чизиқнинг тенгламасини тузингки, унинг исталган уринмасининг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасининг абсциссасига тенг бўлсин.

348. $A(2;1)$ нуқтадан ўтувчи шундай эгри чизиқнинг тенгламасини тузингки, унинг ҳар қандай нуқтасига ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини уриниш нуқтасининг радиус-вектори бурчак коэффициентининг квадрати-га тенг бўлсин.

349. Радийнинг емирилиш тезлиги унинг мавжуд миқдорига пропорционалдир. Агар 1600 йилдан сўнг бошлангич миқдорнинг ярмиси қолиши маълум бўлса, неча йилдан сўнг 1 кг радийдан 650 г қолишини ҳисобланг.

350. Тандирдан олинган нон 20 мин. ичида 100° дан 60° гача совида. Атрофдаги ҳавонинг температураси 25° га тенг. Ноннинг совиш тезлигини нон температураси ва унинг атрофидаги ҳавонинг температураси айирмасига пропорционал деб ҳисоблаб, нон қанча вақт ичида 30° гача совишини аниқланг.

5-§. Тартибини пасайтириш мумкин бўлган юқори тартибли дифференциал тенгламалар

Тартибини пасайтириш мумкин бўлган юқори тартибли дифференциал тенгламаларнинг баъзи турларини кўриб чиқамиз.

$$I. \quad y^{(n)} = f(x) \quad (7.25)$$

кўринишдаги тенгламанинг умумий счими n марта интеграллаш усули билан топилади. Унинг иккала қисмини dx га қўпайтириб интегралласак, $(n-1)$ -тартибли тенгламага эга бўламиз:

$$y^{(n-1)} = \int y^{(n)} dx = \int f(x) dx = \varphi_1(x) + \bar{C}_1.$$

Бу ишни такрорласак $(n-2)$ -тартибли тенгламага эга бўламиз:

$$y^{(n-2)} = \int y^{(n-1)} dx = \int (\varphi_1(x) + \bar{C}_1) dx =$$

$$= \int \varphi_1(x) dx + \int \bar{C}_1 dx = \varphi_2(x) + \bar{C}_1 x + \bar{C}_2.$$

n марта интеграллаб (7.25) тенгламанинг умумий ечимини ҳосил қиламиз:

$$y = \varphi_n(x) + C_1 x^{n-1} + C_2 x^{n-2} + \dots + C_{n-1} x + C_n, \quad (7.26)$$

бунда $C_i (i = \overline{1, n})$ — ихтиёрий ўзгармас сонлар бўлиб, улар $\bar{C}_1, \bar{C}_2, \dots, \bar{C}_n$ ихтиёрий ўзгармас сонлар билан аниқланали.

1-мисол. Ушбу $y^{IV} = \frac{8}{(x-3)^5}$ дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламанинг иккала қисмини dx га қўпайтириб, учинчи тартибли тенгламага эга бўламиз:

$$y''' = \int y^{IV} dx = \int \frac{8dx}{(x-3)^5} = -\frac{2}{(x-3)^4} + \bar{C}_1.$$

Бу тенгликни яна уч марта интегралласак, берилган тенгламанинг умумий ечимига эга бўламиз:

$$y'' = \int y''' dx = \int \left(-\frac{2}{(x-3)^4} + \bar{C}_1 \right) dx = \frac{2}{3(x-3)^3} + \bar{C}_1 x + \bar{C}_2$$

$$y' = \int y'' dx = \int \left(\frac{2}{3(x-3)^3} + \bar{C}_1 x + \bar{C}_2 \right) dx =$$

$$= -\frac{1}{3(x-3)^2} + \frac{1}{2} \bar{C}_1 x^2 + \bar{C}_2 x + \bar{C}_3,$$

$$y = \int y' dx = \int \left(-\frac{1}{3(x-3)^2} + \frac{1}{2} \bar{C}_1 x^2 + \bar{C}_2 x + \bar{C}_3 \right) dx =$$

$$= \frac{1}{3(x-3)} + \frac{1}{6} \bar{C}_1 x^3 + \frac{1}{2} \bar{C}_2 x^2 + \bar{C}_3 x + \bar{C}_4 =$$

$$= \frac{1}{3(x-3)} + C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4,$$

бунда $C_1 = \frac{1}{6} \bar{C}_1$, $C_2 = \frac{1}{2} \bar{C}_2$, $C_3 = \bar{C}_3$, $C_4 = \bar{C}_4$.

II. n -тартибли дифференциал тенгламада изланаётган y функция ва унинг $k (1 \leq k \leq n)$ тартибгача ҳосиласи иштирок этмасин, яъни

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (7.27)$$

$z(x)$ номаълум функцияни $z = y^{(k)}$ формула бўйича кiritамиз ва $y^{(k+1)} = z'$, $y^{(k+2)} = z''$, ..., $y^{(n)} = z^{(n-k)}$ ларни эътиборга олиб, $z(x)$ функцияга нисбатан $(n-k)$ -тартибли

$$F(x, z, z', z'', \dots, z^{(n-k)}) = 0 \quad (7.28)$$

дифференциал тенгламага эга бўламиз, яъни (7.27) тенгламанинг тартиби k га пасайтирилади. Агар (7.28) тенгламанинг умумий ечимини $z = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k})$ кўринишда аниқлаш мумкин бўлса, қуйидаги дифференциал тенгламага эга бўламиз:

$$z=y^{(k)}=\varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k}).$$

Бу (7.25) кўринишдаги тенгламалардан иборат бўлиб, унинг ечими k марта интеграллаш ёрдамида топилади. Хусусий ҳолда, агар $n = 2$, $k = 1$ бўлса, (7.28) тенглама биринчи тартибли тенглама бўлади.

2-мисол. Ушбу $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$ дифференциал тенгламанинг $y(1) = e$, $y'(1) = e^2$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламада у қатнашмагани ва $n = 2$, $k = 1$ бўлгани учун у II тур кўринишдаги тенгламадир. $z = y'$ деб бу тенгламанинг тартибини биттага пасайтирамиз. У ҳолда $z' = y''$ ва берилган тенглама изланаётган z функцияга нисбатан биринчи тартибли бир жинсли дифференциал тенглама кўринишига келади:

$$xz' = z \ln \left(\frac{z}{x} \right).$$

Уни ечиш учун $z = xu(x)$, $z' = u + xu'$ алмаштиришни бажарсак, тенглама кўриниши қуйидагича бўлади:

$$u + xu' = u \ln u.$$

Бу тенгламада ўзгарувчиларни ажратамиз ва интеграллаймиз:

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}, \quad \ln |\ln u - 1| = \ln x + \ln C_1,$$

$$\ln u - 1 = C_1 x, \quad u = e^{1+C_1 x}, \quad z = xe^{1+C_1 x}.$$

$z = y'$ бўлгани учун, охириги тенглама биринчи тартибли дифференциал тенглама бўлади ва у бир марта интеграллаш ёрдамида ечилади:

$$\begin{aligned} z = y' &= xe^{1+C_1 x}, \quad y = \int xe^{1+C_1 x} dx = \frac{1}{C_1} \int xd(e^{1+C_1 x}) = \\ &= \frac{1}{C_1} (xe^{1+C_1 x} - \int e^{1+C_1 x} dx) = \frac{C_1 x - 1}{C_1^2} e^{1+C_1 x} + C_2. \end{aligned}$$

Берилган тенгламанинг умумий ечимини топдик. $y(1) = e$, $y'(1) = e^2$ бошланғич шартлардан фойдаланиб C_1 ва C_2 ихтиёрий ўзгармасларнинг қийматини аниқлаймиз:

$$\begin{cases} e = \frac{C_1 - 1}{C_1^2} e^{1+C_1} + C_2, \\ e^2 = e^{1+C_1}. \end{cases}$$

Бундан $C_1 = 1$, $C_2 = e$.

Демак, берилган тенгламанинг хусусий ечими $y = (x-1)e^{1+x} + e$ бўлади.

3-мисол. Ушбу $y''' \cdot \operatorname{ctgx} + y'' = 2$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенглама учун $n = 3$, $k = 2$, демак, берилган тенглама II тур кўринишдаги тенгламадир. $z = y'$ янги функция киритамиз ва берилган тенгламадан $z' \operatorname{ctgx} + z = 2$ чизиқли тенгламани ҳосил қиламиз. Уни қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$z' + z \operatorname{tg} x = 2 \operatorname{tg} x.$$

Унинг умумий ечимини (7.15) формулага асосан топамиз:

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \operatorname{tg} x dx} \left(\int 2 \operatorname{tg} x \cdot e^{\int \operatorname{tg} x dx} dx + C_1 \right) = \\ &= e^{\ln |\cos x|} \cdot \left(2 \int \operatorname{tg} x \cdot e^{-\ln |\cos x|} dx + C_1 \right) = \\ &= |\cos x| \cdot \left(2 \int \frac{\operatorname{tg} x}{|\cos x|} dx + C_1 \right) = 2 \cos x \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx + C_1 \cos x = \\ &= 2 \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} + C_1 \cos x = 2 + C_1 \cos x. \end{aligned}$$

$z = y'$ бўлгани учун I тур дифференциал тенглама кўринишга эга бўламиз. Уни қуйидагича ёзамиз:

$$y'' = 2 + C_1 \cos x, \quad y' = \int (2 + C_1 \cos x) dx = 2x + C_1 \sin x + C_2,$$

$$y = \int (2x + C_1 \sin x + C_2) dx = x^2 - C_1 \cos x + C_2 x + C_3.$$

Демак, умумий ечим $y = x^2 - C_1 \cos x + C_2 x + C_3$ бўлади.

III. Эркин ўзгарувчи x ошкор қатнашмайдиган қуйидаги n -тартибли дифференциал тенгламани кўрамиз:

$$F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (7.29)$$

Бу ҳолда $P(y) = y'$ (бунда y нинг аргументи деб қарала-
ди) янги функция киритиш тенгламанинг тартибини бир
бирликка пасайтиришга имкон беради. Бунинг учун
 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ ларни аргументи y бўлган янги функциянинг
ҳосилалари орқали ифодалаш керак. Мураккаб функция-
ни дифференциаллаш қоида-сига кўра:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = P, \quad y'' = \frac{dP}{dx} = \frac{dP}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = P \frac{dP}{dy}, \\ y''' &= \frac{d^2P}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(P \frac{dP}{dy} \right) = \frac{dP}{dx} \cdot \frac{dP}{dy} + P \frac{d^2P}{dy^2} = \\ &= P \left(\frac{dP}{dy} \right)^2 + P^2 \frac{d^2P}{dy^2} \end{aligned} \quad (7.30)$$

ва ҳоказо. Бажарилган ҳисоблашлардан кўриниб турибди-
ки, $y^{(k)}$ ҳосила тартиби $k-1$ дан катта бўлмаган P функ-
циянинг y га нисбатан ҳосилалари орқали ифодаланади. На-
тижада (7.30) тенгламаларни эътиборга олсак, (7.29) тенгла-
ма қуйидаги кўринишни олади:

$$\Phi \left(y, P, \frac{dP}{dy}, \frac{d^2P}{dy^2}, \dots, \frac{d^{(n-1)}P}{dy^{(n-1)}} \right) = 0. \quad (7.31)$$

Агар (7.31) тенглама

$$P = \Phi(y, C_1, C_2, \dots, C_{n-1})$$

умумий ечимга эга бўлса, $P = \frac{dy}{dx}$ ни эътиборга олиб (7.29)
тенгламанинг умумий ечимини топиш охириги тенглама-
да ўзгарувчиларни ажратиш ва уни ечишга келтирилади:

$$\int \frac{dy}{\Phi(y, C_1, C_2, \dots, C_{n-1})} = \int dx, \quad \Phi(y, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}) = x + C_n.$$

Агар (7.29) тенгламада $n = 2$ бўлса, (7.31) тенглама
биринчи тартибли тенглама бўлади.

4-мисол. Ушбу $y''' - \frac{(y')^2}{y} = 6(y')^2 y$ тенгламанинг
 $y(2) = 0, y'(2) = 1, y''(2) = 0$ бошланғич шартларни қано-
атлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенглама (7.29) кўринишдаги тенглама,
бунда $n = 3$. (7.30) тенгликларни эътиборга олиб, янги $P(y)$
функцияни киритамиз ва $P(y)$ функцияни топамиз:

$$P^2 \frac{d^2P}{dy^2} + P \left(\frac{dP}{dy} \right)^2 - \frac{\left(P \frac{dP}{dy} \right)^2}{P} = 6P^2 y,$$

$$P^2 \left(\frac{d^2P}{dy^2} - 6y \right) = 0, \quad (P \neq 0),$$

бундан $\frac{d^2P}{dy^2} = 6y$. Бу 1 тур тенглама бўлиб, унинг ечими
икки марта интеграллаш ёрдамида топилади:

$$\frac{dP}{dy} = \int 6y dy = 3y^2 + C_1, \quad P = \int (3y^2 + C_1) dy = y^3 + C_1 y + C_2,$$

$$P = y' = y^3 + C_1 y + C_2.$$

$y'(2) = P(0) = 1, y''(2) = P'(0) \frac{dP(0)}{dy} = 0$ бошланғич шарт-
лардан фойдаланиб, $C_1 = 0, C_2 = 1$ ларни топамиз. Энди
 $y' = y^3 + 1$ тенгламани интеграллаймиз:

$$\frac{dy}{dx} = y^3 + 1, \quad \frac{dy}{y^3 + 1} = dx, \quad \int \frac{dy}{y^3 + 1} = \int dx,$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2y-1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \ln \frac{|y+1|}{\sqrt{y^2-y+1}} = x + C_3.$$

Энди $y(2) = 0$ шартдан фойдаланамиз: $C_3 = -2 - \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$.
Демак, изланаётган хусусий ечим:

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2y-1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \ln \frac{|y+1|}{\sqrt{y^2-y+1}} + 2 + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}.$$

Машқлар

351. Қуйидаги тенгламаларнинг умумий ечимини то-
пинг:

а) $y''' = x^2 - \sin x$;

б) $y^{IV} = \frac{y'''}{x}$;

в) $yy'' = y'^2$;

г) $x^2 y''' = y''^2$;

$$д) xy'' - y' = x^2 e^x;$$

$$е) xy'' + y' = y'^2;$$

352. Қуйидаги тенгламаларнинг берилган бошланғич шартларни қаноатландирувчи хусусий ечимини топинг:

$$а) y'' = \frac{\ln x}{x^2}, y(1) = 3, y'(1) = 1;$$

$$б) xy''' - y'' = x^2 + 1, y(-1) = 0, y'(-1) = 1;$$

$$в) y'' = e^{2y}, y(0) = 0, y'(0) = 1;$$

$$г) 2y'^2 = (y-1)y'', y(0) = 0, y'(0) = 1;$$

$$д) y^3 y'' + 1 = 0, y(1) = 1, y'(1) = 0;$$

$$е) 2y'' = 3y^2, y(2) = 1, y'(2) = -1.$$

353. Тўғри чизиқли ҳаракат қилаётган моддий нуктанинг тезланиши вақтга боғлиқ бўлиб, у $a(t) = 6t - 2$ формула ёрдамида ифодаланади. Агар вақтнинг бошланғич momenti $t = 0$ да тезлик $v = 1$ м/сек, йўл эса $S = 0$ бўлса, нуктанинг ҳаракат қонунини топинг.

354. Йўлнинг горизонтал қисмида $v = 90$ км/соат тезлик билан ҳаракатланаётган автомобилга вақтнинг бирор momentiда тормоз берилди. Агар ҳаракатга қаршилиқ автомобил оғирлигининг 0,3 қисмига тенг бўлса, тормоз берилгандан кейин ўтган вақтни ва босиб утилган йўлни топинг.

6-§. Юқори тартибли чизиқли дифференциал тенгламалар

Умумий ҳол. Ушбу

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_n(x)y = f(x) \quad (7.32)$$

кўринишдаги (бунда $a_i(x)$ ($i = \overline{1, n}$), $f(x)$ — бирор D соҳада берилган функциялар) тенглама n -тартибли чизиқли бир жинсли бўлмаган дифференциал тенглама дейилади. Агар (7.32) нинг ўнг томони D соҳада $f(x) \equiv 0$ бўлса,

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_n(x)y = 0 \quad (7.33)$$

тенгламага эга бўламиз. (7.33) тенглама n -тартибли чизиқли бир жинсли дифференциал тенглама дейилади.

Агар $a_i(x)$, $f(x)$ функциялар D соҳадаги (a, b) интервалда узлуксиз бўлса, (7.32), (7.33) кўринишдаги исталган тенгламалар учун $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$, $x_0 \in (a, b)$ бошланғич шартларни қаноатландирувчи ягона ечим мавжудлиги ҳақидаги теорема ўринли бўлади.

(7.32) ва (7.33) тенгламаларнинг умумий ва хусусий ечимларини топишда $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ функцияларнинг чизиқли боғлиқлиги ва чизиқли эркилиги муҳим рол ўйнайди.

Агар ҳеч бўлмаганда биттаси нолдан фарқли $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ сонлар мавжуд бўлсаки, бирор (a, b) интервалга тегишли барча x лар учун

$$\sum_{i=1}^n \mu_i y_i(x) \equiv 0 \quad (7.34)$$

тенглик ўринли бўлса, $y_1, y_2, \dots, y_n$ функциялар (a, b) интервалда чизиқли боғлиқ дейилади.

Агар (7.34) тенглик (a, b) интервалга тегишли барча x лар учун фақат $\mu_i = 0$ да бажарилса, $y_i(x)$ функциялар шу интервалда чизиқли эркин дейилади. Ушбу

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \dots & y'_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \quad (7.35)$$

детерминант Вронский детерминанти (ёки вронскиан) дейилади.

Функцияларнинг чизиқли боғлиқ ва чизиқли эркин бўлиши аломати.

Агар $y_i(x)$ ($i = \overline{1, n}$) функциялар системаси (яъни (a, b) интервалда $(n-1)$ -тартибли ҳосиласигача узлуксиз бўлган функциялар) (a, b) интервалда чизиқли боғлиқ бўлса, у ҳолда (a, b) да $W \equiv 0$ бўлади.

Агар $W \not\equiv 0$ бўлса, у ҳолда $y_i(x)$ функциялари чизиқли эркин бўлади.

1-изоҳ. (7.39) формула ёрдамида интегралларни топишда n та ўзгармаслар ҳосил бўлади. Уларни нолга тенг деб олиш мумкин.

3-мисол. Ушбу $y''' - 2y'' - y' + 2y = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Бир жинсли тенгламанинг умумий ечими 1-мисолдан маълум:

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x}.$$

Берилган тенгламанинг хусусий ечими y^* ни Лагранж усули билан топамиз. (7.37) формулага асосан:

$$y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x} + C_3(x)e^{2x}.$$

(7.38) система бу ҳол учун қуйидаги қўринишни олади:

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' e^{-x} + C_3' e^{2x} = 0, \\ C_1' e^x - C_2' e^{-x} + 2C_3' e^{2x} = 0, \\ C_1' e^x + C_2' e^{-x} + 4C_3' e^{2x} = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}. \end{cases}$$

Унинг детерминанти $W = -6e^{2x} \neq 0$. Системани Крамер формуласи ёрдамида ечиб, қуйидагиларни топамиз:

$$C_1' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{e^x}{e^x + 1}, \quad C_2' = \frac{1}{6} \cdot \frac{e^{3x}}{e^x + 1}, \quad C_3' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{e^x + 1}.$$

Бу ифодаларни интеграллаймиз:

$$C_1 = -\frac{1}{2} \int \frac{e^x dx}{e^x + 1} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} = -\frac{1}{2} \ln(e^x + 1),$$

$$\begin{aligned} C_2 &= \frac{1}{6} \int \frac{e^{3x} dx}{e^x + 1} = \frac{1}{6} \int \frac{e^{2x} d(e^x)}{e^x + 1} = \frac{1}{6} \int \left(e^x - 1 + \frac{1}{e^x + 1} \right) d(e^x) = \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{e^{2x}}{2} - e^x + \ln(e^x + 1) \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{e^x + 1} = \frac{1}{3} \int \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} dx = \frac{1}{3} \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx = \\ &= \frac{1}{3} \left(x - \int \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} \right) = \frac{1}{3} (x - \ln(e^x + 1)). \end{aligned}$$

Тенгламанинг хусусий ечими:

$$\begin{aligned} y^* &= -\frac{1}{2} e^x \ln(e^x + 1) + \frac{1}{6} e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} - e^x + \ln(e^x + 1) \right) + \\ &+ \frac{1}{3} e^{2x} (x - \ln(e^x + 1)) = \frac{1}{12} e^x - \frac{1}{6} + \frac{1}{3} x e^{2x} + \\ &+ \left(\frac{1}{6} e^{-x} - \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{3} e^{2x} \right) \ln(e^x + 1). \end{aligned}$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$\begin{aligned} y &= \bar{y} + y^* = C_1 x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x} + \frac{1}{12} (4x e^{2x} + e^x - 2) + \\ &+ \frac{1}{6} (e^{-x} - 3e^x - 2e^{2x}) \ln(e^x + 1). \end{aligned}$$

2-изоҳ. (7.33) тенгламанинг фундаментал ечимлар системасини топиш мумкин бўлмаса, (7.32) тенгламанинг хусусий ечими y^* ни ва умумий ечимини топиш мумкин эмас. (7.32) тенгламаларни ечишнинг бошқа усуллари ҳам мавжуд бўлмаса, фақат хусусий ҳолда, яъни (7.32) тенгламадаги ҳамма $a_i(x)$ коэффицентлар ўзгармас сонлар бўлгандагина фундаментал ечимлар системасини ва (7.32) тенгламанинг умумий ечимини топиш усули мавжудлигини эслатиб ўтамыз.

Ўзгармас коэффицентли чизикли дифференциал тенглама. (7.32) ва (7.34) тенгламаларга $a_i(x) = P_i = \text{const}$, $P_i \in R$ ни қўямиз:

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + P_2 y^{(n-2)} + \dots + P_{n-1} y' + P_n y = f(x), \quad (7.40)$$

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + P_2 y^{(n-2)} + \dots + P_{n-1} y' + P_n y = 0, \quad (7.41)$$

(7.41) тенгламанинг фундаментал ечимлар системасини фақат алгебраик усулдан фойдаланиб қуйидагича топиш мумкин.

(7.41) тенгламага асосланиб

$$\lambda^n + P_1 \lambda^{n-1} + \dots + P_{n-1} \lambda + P_n = 0 \quad (7.42)$$

алгебраик тенглама тузамиз. (7.42) тенглама (7.41) тенгламанинг *характеристик* тенгламаси дейилади. У n та илдизга эга бўлиб, улар ичида содда ҳақиқий, қаррали илдизлар ва комплекс қўшма содда илдизлар бўлиши мумкин.

Е ч и ш. Ҳар бир ҳол учун характеристик тенглама тузамиз, унинг илдизларини, фундаментал ечимлар системасини ва умумий ечимини топамиз:

$$а) \lambda^2 - 15\lambda + 26 = 0, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 13;$$

$$y_1 = e^{2x}, y_2 = e^{13x};$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{13x};$$

$$б) \lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0, \lambda_1 = \lambda_2 = -3;$$

$$y_1 = e^{-3x}, y_2 = x e^{-3x};$$

$$\bar{y} = e^{-3x}(C_1 + C_2 x);$$

$$в) \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0, \lambda_{1,2} = 1 \pm 3i;$$

$$y_1 = e^x \cos 3x, y_2 = e^x \sin 3x;$$

$$\bar{y} = e^x(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

Шундай қилиб, ўзгармас коэффициентли чизиқли тенгламани ечиш учун:

1) унинг фундаментал ечимлар системасини топиш;

2) (7.41) бир жинсли тенгламанинг умумий ечимини тузиш;

3) Лагранж усули билан (7.40) тенгламанинг y^* хусусий ечимини топиш;

4) $\bar{y} = y + y^*$ формула ёрдамида (7.40) тенгламанинг умумий ечимини топиш керак.

(7.40) тенгламанинг ўнг қисми $f(x)$ кўп ҳолларда муҳандислик ишларида қўлланиладиган алоҳида кўринишларга эга бўлади:

$$f(x) = e^{ax}(P_r(x) \cos bx + Q_s(x) \sin bx), \quad (7.48)$$

бунда $P_r(x)$, $Q_s(x)$ — мос ҳолда r ва s даражали кўпхад;

a , b — бирор ўзгармас сонлар. $f(x)$ функциянинг хусусий ҳоллари қуйидагича бўлиши мумкин:

$$f(x) = P_r(x)e^{ax} \quad (b = 0); \quad (7.49)$$

$$f(x) = P_r(x) \cos bx + Q_s(x) \sin bx \quad (a = 0); \quad (7.50)$$

$$f(x) = e^{ax}(A \cos bx + B \sin bx) \quad (A = \text{const}, B = \text{const}); \quad (7.51)$$

$$f(x) = A \cos bx + B \sin bx \quad (a = 0, P_r(x) = A, Q_s(x) = B); \quad (7.52)$$

$$f(x) = P_r(x) \quad (a = 0, b = 0). \quad (7.53)$$

Бу ҳамма ҳоллар учун, шунингдек, умумий ҳол учун ((7.48) формулага қаранг) (7.40) тенгламанинг y^* хусусий ечими ўнг қисмининг тузилишига қараб топилиши исбот қилинган.

$f(x)$ функциянинг умумий ҳоли учун хусусий ечим

$$y^* = x^k e^{ax} (\bar{P}_m(x) \cos bx + \bar{Q}_m(x) \sin bx) \quad (7.54)$$

формула билан аниқланади, бунда $\bar{P}_m(x)$, $\bar{Q}_m(x)$ — даражаси $m = \max\{r, s\}$ бўлган кўпхад; k эса (7.42) характеристик тенгламанинг $\lambda = a + bi$ илдизлар сонига мос келувчи сонга тенг. Шундай қилиб, агар $\lambda_i (i = \bar{1}, n)$ илдизлар ичида λ сони бўлмаса, $k = 0$; агар битта илдиз λ сони бўлса, у ҳолда $k = 1$; агар илдизлар ичида икки қаррали илдиз λ сони бўлса, у ҳолда $k = 2$ ва ҳоказо.

Демак, (7.54) формула ёрдамида фақат $P_m(x)$ ва $Q_m(x)$ кўпхаднинг коэффициентлари маълум бўлган y^* хусусий ечимининг тузилишини бирдан ёзиш мумкин экан.

(7.40) тенгламага y^* хусусий ечимни ва унинг ҳосилларини қўйиб чап ва ўнг қисмидаги ўхшаш ҳадлари олдидаги коэффициентларни тенглаб, ноъмаълум коэффициентларни ҳисоблаш учун керакли бўлган сондаги чизиқли алгебраик тенгламаларни ҳосил қиламиз.

Демак, y^* тузилишини ((7.54) формулага қаранг) билган ҳолда, элементар амаллар ёрдамида (яъни дифференциаллаш ва чизиқли алгебраик тенгламалар системасини ечиш) интеграллаш амалини бажармасдан, (7.40) тенгламанинг хусусий y^* ечимини топиш мумкин экан.

6 - м и с о л. Ушбу $y^{IV} - 3y''' = 9x^2$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Тенгламанинг характеристик тенгламасини тузамиз, унинг илдизларини, фундаментал ечимлар системасини ва бир жинсли тенгламага мос $\bar{y}$ умумий ечимни топамиз:

$$\lambda^4 - \lambda^3 = 0, \lambda^2(\lambda^2 - 3) = 0, \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_{3,4} = \pm\sqrt{3};$$

$$y_1 = e^{0x} = 1, y_2 = x e^{0x} = x, y_3 = e^{\sqrt{3}x}, y_4 = e^{-\sqrt{3}x};$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 x + C_3 e^{\sqrt{3}x} + C_4 e^{-\sqrt{3}x}.$$

Берилган тенгламанинг ўнг қисми (7.53) хусусий ҳол кўринишда, шунинг учун $z = 0$. Характеристик тенгламанинг $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ қаррали илдизи $z = 0$ билан бир хил, бундан $k = 2$ эканлиги келиб чиқади. (7.54) формулага асосан y^* хусусий ечим

$$y^* = x^2(Ax^2 + Bx + C) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2$$

кўринишда бўлади. Ҳисоблашни осонлаштириш учун $y^*, y^{*'}, y^{*''}, y^{*'''}, y^{*''''}$ ифодаларни алоҳида сатрларга ёзамиз ва вертикал чизиқнинг чап томонига тенгламадаги уларнинг олдидаги мос коэффициентларни ёзамиз. Бу ифодаларни коэффициентларга кўпайтириб қўшамиз ва ўхшаш ҳадларни ихчамлаймиз:

$$\begin{array}{r|l} 0 & y^* = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2, \\ 0 & y^{*'} = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx, \\ -3 & y^{*''} = 12Ax^2 + 6Bx + 2Cx, \\ 0 & y^{*'''} = 24A + 6B, \\ 1 & y^{*''''} = 24A, \end{array}$$

$$y^{*''''} - 3y^{*'''} = -36Ax^2 - 18Bx - 6C + 24A = 9x^2.$$

Охириги тенгликнинг чап ва ўнг қисмидаги x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, A, B, C ларни аниқлаш учун қуйидаги алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\left. \begin{array}{l} x^2 \quad -36A = 9, \\ x^1 \quad -18B = 0, \\ x^0 \quad -6C + 24A = 0 \end{array} \right\}$$

бундан $A = -\frac{1}{4}, B = 0, C = -1$.

Демак,

$$y^* = x^2 \left(-\frac{1}{4}x^2 - 1 \right).$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 + C_2x + C_3e^{\sqrt{3}x} + C_4e^{-\sqrt{3}x} - \frac{1}{4}x^4 - x^2$$

функциядан иборат бўлади.

7-мисол. Ушбу $y'' - 7y' + 6y = (x-2)e^x$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$ характеристик тенглама илдизлари $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$ бўлгани учун $y'' - 7y' + 6y = 0$ бир жинсли тенгламанинг умумий ечими

$$\bar{y} = C_1e^x + C_2e^{6x}$$

функциядан иборат бўлади.

Берилган тенгламанинг ўнг қисми (7.49) кўринишдаги функциядан иборат, бунда $a = 1; b = 0$;

$P_1(x) = x - 2; z = 1, z$ характеристик тенгламанинг илдизи бўлгани учун $k = 1$ ва берилган тенгламанинг хусусий ечими

$$y^* = xe^x(Ax + B) = e^x(Ax^2 + Bx)$$

формула билан аниқланади. Сўнгра 6-мисолдаги каби давом этамиз:

$$\begin{array}{r|l} 6 & y^* = e^x(Ax^2 + Bx), \\ -7 & y^{*'} = e^x(Ax^2 + Bx) + e^x(2Ax + B), \\ 1 & y^{*''} = e^x(Ax^2 + (2A + B)x + B) + e^x(2Ax + 2A + B), \end{array}$$

$$y^{*''} - 7y^{*'} + 6y^* =$$

$$= e^x((6A - 7A + A)x^2 + (6B - 7B - 14A + 2A + B + 2A)x - 7B + 2A + 2B) = e^x(x - 2).$$

Охириги тенгликнинг иккала қисмини $e^x \neq 0$ га бўламиз ва x нинг чап ва ўнг қисмидаги бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаймиз:

$$\left. \begin{array}{l} x^2 \quad 0 = 0, \\ x^1 \quad -10A = 1, \\ x^0 \quad 2A - 5B = -2, \end{array} \right\}$$

бундан $A = -\frac{1}{10}, B = \frac{9}{25}$;

$$y^* = e^x \left(-\frac{1}{10}x^2 + \frac{9}{25}x \right).$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{6x} + e^x \left(-\frac{1}{10} x^2 + \frac{9}{25} x \right)$$

дан иборат бўлади.

Агар (7.40) тенгламада $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ бўлса, у ҳолда ўнг томони мос равишда $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ бўлган (7.40) кўринишдаги

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \dots + P_n y = f_1(x), \quad (7.55)$$

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \dots + P_n y = f_2(x) \quad (7.56)$$

иккита тенгламанинг хусусий ечимлари y_1^* ва y_2^* бўлади.

Ўнг томони $f(x)$ бўлган (7.40) тенгламанинг ечими $y^* = y_1^* + y_2^*$ функция бўлади.

$f_1(x)$ ва $f_2(x)$ функциялар (7.49)–(7.53) кўринишдаги функциялар бўлиши мумкин. У ҳолда (7.48) формула ёрдамида (7.55) ва (7.56) тенгламаларнинг y_1^* ва y_2^* хусусий ечимлари топилади. Бундан ташқари $f_1(x)$ юқорида кўрилган тур функциялари бўлиб, $f_2(x)$ умуман кўрилмаган функция бўлсин. Бу ҳолда (7.40) тенгламанинг y^* хусусий ечимини Лагранж усули билан топиш мумкин ёки (7.55) тенгламани ечиш учун (7.48) формуладан фойдаланиб, (7.56) тенгламанинг ечимини Лагранж усулини татибқ этиб топиш лозим.

8-мисол. Ушбу

$$y'' + y = x \sin x + \cos 2x \quad (A)$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $\lambda^2 + 1 = 0$ характеристик тенгламанинг илдизлари $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$, у ҳолда $y'' + y = 0$ бир жинсли тенгламанинг умумий ечими

$$\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

функция билан аниқланади. Берилган тенгламанинг ўнг қисми (7.50) ва (7.52) кўринишдаги иккита функциянинг йиғиндисидан иборат: $f_1(x) = x \sin x$, $f_2(x) = \cos 2x$. Шунинг учун (7.54) формуладан фойдаланиб

$$y'' + y = x \sin x \quad (B)$$

$$\text{тенгламанинг } y_1^* \text{ хусусий ечимини ва} \quad y'' + y = \cos 2x \quad (C)$$

тенгламанинг y_2^* хусусий ечимини топамиз. (B) тенглама учун $a = 0$, $b = 0$, $z = i = \lambda_{1,2}$ бўлгани учун $k = 1$ ва

$$y_1^* = x((Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x)$$

кўринишда бўлади. Номалум A , B , C , D коэффициентларни юқорида кўрилган схема асосида ҳисоблаймиз ва y_1^* ни топамиз:

$$\begin{aligned} y_1^* &= (Ax^2 + Bx) \cos x + (Cx^2 + Dx) \sin x, \\ y_1^{*'} &= (2Ax + B) \cos x - (Ax^2 + Bx) \sin x + (2Cx + D) \sin x + (Cx^2 + Dx) \cos x = (Cx^2 + 2Ax + Dx + B) \cos x + (-Ax^2 - Bx + 2Cx + D) \sin x, \\ y_1^{*''} &= (2Cx + 2A + D) \cos x - (Cx^2 + 2Ax + Dx + B) \sin x + (-2Ax - B + 2C) \sin x + (-Ax^2 - Bx + 2Cx + D) \cos x, \end{aligned}$$

$$y_1^{*''} + y_1^* = (Ax^2 + Bx + 2Cx + 2A + D - Ax^2 - Bx + 2Cx + D) \cos x + (Cx^2 + Dx - Cx^2 - 2Ax - Dx - 2Ax - B + 2C) \sin x = x \sin x.$$

Охириги тенгликнинг чап ва ўнг қисмидаги ўхшаш ҳадлар олдидаги коэффициентларни тенглаб, номалум A , B , C , D ларни топамиз:

$$\begin{cases} x \cos x & 4C = 0, \\ \cos x & 2A + 2D = 0, \\ x \sin x & -4A = 1, \\ \sin x & -2B = 2C = 0, \end{cases}$$

$$\text{бундан } A = -\frac{1}{4}, B = 0, C = 0, D = \frac{1}{4}.$$

Демак,

$$y^* = x \left(-\frac{1}{4} x \cos x + \frac{1}{4} \sin x \right) = \frac{1}{4} x (\sin x - x \cos x).$$

(C) тенглама учун $a = 0$, $b = 2$, $z = 2i$ бўлгани учун $k = 0$ ва

$$y_2^* = M \cos 2x + N \sin 2x$$

бўлади. M ва N номалумларни топамиз:

$$\begin{aligned} 1 \mid y_2'' &= M \cos 2x + N \sin 2x, \\ 0 \mid y_2'' &= -2M \sin 2x + 2N \cos 2x, \\ 1 \mid y_2'' &= -4M \cos 2x - 4N \sin 2x, \end{aligned}$$

$$y_2'' + y_2'' = -3M \cos 2x - 3N \sin 2x = \cos 2x,$$

бундан $-3M = 1, -3N = 0$ бўлгани учун

$$y_2'' = -\frac{1}{3} \cos 2x.$$

Натижада

$$y'' = y_1'' + y_2'' = \frac{1}{4}x(\sin x + \cos x) - \frac{1}{3} \cos 2x$$

ва берилган (A) тенгламанинг умумий ечими

$$\begin{aligned} y &= \bar{y} + y'' = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \\ &+ \frac{1}{4}x(\sin x - x \cos x) - \frac{1}{3} \cos 2x \end{aligned}$$

функциядан иборат бўлади.

9-мисол. Ушбу $y'' - 2y' + 5y = 3e^x + e^x \operatorname{tg} 2x$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $y'' - 2y' + 5y = 0$ бир жинсли тенгламанинг умумий ечимини топамиз.

Унга мос $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$ характеристик тенгламани тузамиз. У $\lambda_1 = 1 + 2i, \lambda_2 = 1 - 2i$ илдишларга эга.

Тенгламанинг умумий ечими

$$\bar{y} = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

дан иборат бўлади.

Берилган тенгламанинг ўнг қисми иккита функциянинг йиғиндисидан иборат. Улардан биринчиси $f_1(x) = 3e^x$ (7.48) кўринишдаги функциядан иборат бўлиб, у учун $P_r(x) = 3, a = 1, b = 0, z = 1 \neq \lambda_{1,2}, k = 0$ бўлади. $y'' - 2y' + 5y = 3e^x$ тенгламанинг y_1'' хусусий ечими $y_1'' = Ae^x$ кўринишда бўлади. Номалум A коэффициент қуйидаги тенгликдан топилади:

$$(A - 2A + 5A)e^x = 3e^x, A = \frac{3}{4}, y_1'' = \frac{3}{4}e^x.$$

Иккинчи $f_2(x) = e^x \operatorname{tg} 2x$ функция юқорида кўрилган функцияларнинг бирортасига ўхшамайди, шунинг учун $y'' - 3y' + 5y = e^x \operatorname{tg} 2x$ тенгламанинг y_2 хусусий ечимини ихтиёрий узгармасларни вариациялаш (Лагранж усули) усули ёрдамида қидириш керак.

(7.37) формулага асосан:

$$y_2'' = e^x (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x).$$

Бу ҳолда (7.38) система иккита тенгламадан тузилган бўлади ($y_1 = e^x \cos 2x, y_2 = e^x \sin 2x$):

$$\begin{aligned} C_1' e^x \cos 2x + C_2' e^x \sin 2x &= 0, \\ C_1' e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x) + C_2' e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x) &= e^x \operatorname{tg} 2x. \end{aligned}$$

Бу тенгламалар системасини e^x га қисқартирамиз:

$$\begin{aligned} C_1' \cos 2x + C_2' \sin 2x &= 0, \\ C_1' (\cos 2x - 2 \sin 2x) + C_2' (\sin 2x + 2 \cos 2x) &= \operatorname{tg} 2x. \end{aligned}$$

Охирги системанинг детерминанти (вронскиани)ни ҳисоблаймиз:

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ \cos 2x - 2 \sin 2x & \sin 2x + 2 \cos 2x \end{vmatrix} = 2.$$

C_1', C_2' ларни Крамер формуласига кўра топамиз:

$$C_1' = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & \sin 2x \\ \operatorname{tg} 2x & \sin 2x + 2 \cos 2x \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \sin 2x \operatorname{tg} 2x,$$

$$C_2' = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \cos 2x & 0 \\ \cos 2x - 2 \sin 2x & \operatorname{tg} 2x \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

Энди ҳосил қилинган тенгликларни интеграллаймиз:

$$C_1 = -\frac{1}{2} \int \sin 2x \operatorname{tg} 2x dx = -\frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 2x}{\cos 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos^2 2x}{\cos 2x} dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos 2x} + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = \frac{1}{4} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| + \frac{1}{4} \sin 2x,$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x.$$

Демак,

$$y_2^* = e^x \left(\frac{1}{4} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x \cos 2x \right) = \frac{1}{4} e^x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| \cos 2x.$$

Шундай қилиб, берилган тенгламанинг хусусий ечими қуйидаги курунишда бўлади:

$$y^* = y_1^* + y_2^* = \frac{3}{4} e^x + \frac{1}{4} e^x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| \cos 2x = \frac{1}{4} e^x \left(3 + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| \cos 2x \right).$$

Умумий ечим эса қуйидаги функциядан иборат бўлади:

$$y = \bar{y} + y^* = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{4} e^x \left(3 + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| \cos 2x \right).$$

Машқлар

355. Қуйидаги чиқиқли бир жинсли иккинчи тартибли дифференциал тенгламаларнинг фундаментал ечимлар системасини ва умумий ечимини топинг:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| а) $y'' + 5y' + 6y = 0$; | б) $y'' - 2y' - 4y = 0$; |
| в) $y'' - 7y' + 6y = 0$; | г) $y'' + 6y' + 9y = 0$; |
| д) $y'' - 6y' + 18y = 0$; | е) $y'' - 25y = 0$; |
| ж) $y'' + 2y' - 15y = 0$; | з) $y'' + 2y' + y = 0$; |
| и) $y'' + 36y = 0$; | к) $y'' - 2y' + 5y = 0$. |

356. Қуйидаги чиқиқли бир жинсли юқори тартибли дифференциал тенгламаларнинг фундаментал ечимлар системасини ва умумий ечимини топинг:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| а) $y'' + 9y' = 0$; | б) $y'' + 3y' - y = 0$; |
| в) $4y''' - 3y' + 5y = 0$; | г) $y''' - 5y'' + 16y' - 12y = 0$; |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| д) $y'' - 8y'' + 16y = 0$; | е) $y'' - 8y'' + 7y = 0$; |
| ж) $y'' - 6y'' + 9y''' = 0$; | з) $y'' - 3y'' + 3y''' = 0$. |

357. Қуйидаги бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламаларнинг берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечимларини топинг:

- | |
|--|
| а) $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}(x^2 + x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$; |
| б) $y''' - y' = 2x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = y''(0) = 2$; |
| в) $y'' - y = 8e^x$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$, $y'''(0) = 0$; |
| г) $y'' - 2y' + 2y = 4e^x \cos x$, $y(\pi) = \pi e^\pi$, $y'(\pi) = 2\pi$; |
| д) $y'' + 4y = 4(\sin 2x + \cos 2x)$, $y(\pi) = y'(\pi) = 2\pi$; |
| е) $y'' - 2y' = 2e^x$, $y(1) = -1$, $y'(1) = 0$; |
| ж) $y'' + 4y = x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{\pi}{2}$; |
| з) $y'' - 6y' + 9y = 10 \sin x$, $y(0) = -0,6$, $y'(0) = 0,8$. |

358. Қуйидаги бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламаларнинг хусусий ечимини топинг:

- | |
|--|
| а) $y'' - 8y' + 16y = e^{4x}(1 - x)$; |
| б) $y'' - 3y' = e^{3x} - 28$; |
| в) $y'' + 16y = x \sin 4x$; |
| г) $y''' + y'' = 2x + e^{-x}$; |
| д) $y'' - 4y' = 2 \cos^2 4x$; |
| е) $y'' - y = 3xe^x + \sin x$; |
| ж) $y'' - 7y' = (x - 1)^2$; |
| з) $y'' + y'' = x^2 + 2x$; |
| и) $y'' - 4y' + 13y = e^{2x}(x^2 \cos 3x + \sin 3x)$; |
| к) $y'' - y'' = 2xe^x - 4$. |

359. Қуйидаги бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- | | |
|-----------------------------|--|
| а) $y'' + 4y = \cos^2 x$; | б) $y'' + 5y' + 6y = e^{-x} + e^{-2x}$; |
| в) $4y'' - y = x^3 - 24x$; | г) $y''' + y'' = 6x + e^{-x}$; |

$$\begin{array}{ll} \text{д) } y'' + 4y = \frac{1}{\sin^2 x}; & \text{е) } y''' + y' = \operatorname{tg} x; \\ \text{ж) } y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x; & \text{з) } y'' + y + \operatorname{ctg}^2 x = 0; \\ \text{и) } y''' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}; & \text{к) } y'' - 3y' = 3x^3 + x^2. \end{array}$$

7-§. Дифференциал тенгламалар системаси хақида тушунча

Ушбу

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ y_2' &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ &\vdots \\ y_n' &= f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \right\} \quad (7.57)$$

қуринишдаги система биринчи тартибли n та дифференциал тенгламаларнинг нормал шаклдаги системаси ёки нормал система дейилади.

Бунда $f_i(i = 1, n)$ функция бирор $(n + 1)$ ўлчовли D соҳада аниқланган, $x, y_1, y_2, \dots, y_n$ — ўзгарувчилар, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ лар изланаётган функциялар.

Нормал система тенгламаларининг унг қисмида изла-
наётган функцияларнинг ҳосилалари бўлмайди.

(7.57) системанинг $(a; b)$ интервалдаги ечими деб $(a; b)$ интервалда узлуксиз дифференциалланувчи ва бу системанинг ҳар бир тенгласини қаноатлантирадиган $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ ечимлар тўпламига айtilади.

Биринчи тартибли дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласи қуйдагича ифодаланади.

Ушбү

$$y_1(x_0) = y_{10}, y_2(x_0) = y_{20}, \dots, y_n(x_0) = y_{n0} \quad (7.58)$$

бошланғич шартларни қаноатлантирувчи (7.57) система-
нинг $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ ечимларини то-
пиш лозим, бунда $y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}$ — берилган сонлар;
 $x_0 \in (a; b)$.

Теорема (Кошининг мавжудлик ва ечимининг ягоналиги масаласи). Агар $f_i (i = 1, n)$ функциялар $(x_0, y_0, y_0, \dots, y_0) \in D$ нукта атрофида узлуksиз ҳамда $\frac{df_i}{dy_j} (i = 1, n)$ узлуksиз хусусий ҳосилаларга эга бўлса, у ҳолда (7.57) системанинг (7.58) бошланғич шартни қаноатлантирувчи ягона ечими мавжуд бўлади.

(7.57) системанинг умумий ечими деб n та ихтиёрий ўзгармас $C_1, C_2, \dots, C_n$ сонларга боғлиқ бўлган n та $y_i = \varphi_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ ($i = 1, n$) функциялар тўпламига айтилади ва у қуйидаги шартларни қаноатлантириши керак:

1) $x, C_1, C_2, \dots, C_n$ ўзгаришчиларнинг бирор ўзгариш соҳасида φ_i функциялар аниқланган ва узлуксиз $\frac{d\varphi_i}{dx}$ хусусий ҳосилаларга эга бўлиши керак;

2) C_i нинг ихтиёрий қийматларида φ , функциялар
тўплами (7.57) системанинг ечими бўлиши керак;

3) Д соҳадаги ихтиёрий (7.58) бошланғич шартда Коши теоремасининг шартини қаноатлантирадиган шундай ихтиёрий ўзгармас $C_{10}, C_{20}, \dots, C_{n0}$ қийматларни топиш мумкинки, улар учун $y_{i0} = \varphi_i(x_0, C_{10}, C_{20}, \dots, C_{n0})$ тенглик ўринли бўлади.

(7.57) системанинг умумий ечимидан ихтиёрий ўзгар-масларнинг мумкин бўлган баъзи қийматларида ҳосил бўладиган ечимлар *хусусий ечимлар* дейилади.

Юқорида айтилганларнинг ҳаммаси (7.57) системанинг хусусий ҳоли бўлган

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}(x)y_1 + a_{21}(x)y_2 + \dots + a_{n1}(x)y_n + f_1(x), \\ y_2' &= a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{n2}(x)y_n + f_2(x), \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n + f_n(x) \end{aligned} \quad (7.59)$$

куринишдаги *чизикли дифференциал тенгламалар система-*си учун ҳам ўринли, бунда $a_j(x)$, $f_i(x)$ ($i, j = 1, n$) функциялар бирор (a, b) интервалда узлуксиз деб олинади. Агар ҳамма $f_i(x) = 0$ бўлса, у ҳолда (7.59) система *бир жинсли*, акс ҳолда *бир жинсли бўлмаган* система дейилади. Агар $a_j(x) = \text{const}$ бўлса, у ҳолда (7.59) система *ўзармас коэффициентли* система дейилади. Бундай системаларни интеграллаш усуллари мавжуд. Улардан иккитасини кўрамиз.

1-усул. (7.59) системада $a_j(x) = \text{const}$ бўлсин. Бу системанинг ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (7.60)$$

характеристик тенгламасини тузамиз. (7.60) тенглик λ га нисбатан n -даражали алгебраик тенгламадан иборат бўлиб, у n та илдизга эга бўлади. Қуйидаги ҳоллардан бири бўлиши мумкин.

1. (7.60) характеристик тенгламанинг илдизлари ҳақиқий ва ҳар хил. Уларни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ билан белгилаймиз. Маълумки, ҳар бир λ_i ($i = 1, n$) илдиз учун унга мос

$$y_1^{(i)} = \alpha_1^{(i)} e^{\lambda_i x}, y_2^{(i)} = \alpha_2^{(i)} e^{\lambda_i x}, \dots, y_n^{(i)} = \alpha_n^{(i)} e^{\lambda_i x} \quad (7.61)$$

қўринишдаги хусусий ечимларга эга бўлади, бундаги $\alpha_1^{(i)}, \alpha_2^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ коэффициентлар

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_i) \alpha_1^{(i)} + a_{12} \alpha_2^{(i)} + \dots + a_{1n} \alpha_n^{(i)} = 0, \\ a_{21} \alpha_1^{(i)} + (a_{22} - \lambda_i) \alpha_2^{(i)} + \dots + a_{2n} \alpha_n^{(i)} = 0, \\ \dots \\ a_{n1} \alpha_1^{(i)} + a_{n2} \alpha_2^{(i)} + \dots + (a_{nn} - \lambda_i) \alpha_n^{(i)} = 0 \end{cases} \quad (7.62)$$

чизикли алгебраик тенгламалар системасидан аниқланади.

Ҳамма (7.61) қўринишдаги хусусий ечимлар фундаментал ечимлар системасини ташкил қилади.

(7.59) системада $a_j(x) = \text{const}$, $f_i(x) = 0$ бўлган ҳол учун бир жинсли системанинг умумий ечими (7.61) ечимларнинг чизикли комбинациясидан иборат қуйидаги функциялар тўпламидан иборат бўлади:

$$\begin{cases} y_1 = \sum_{i=1}^n C_i y_1^{(i)} = C_1 \alpha_1^{(1)} e^{\lambda_1 x} + C_2 \alpha_1^{(2)} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n \alpha_1^{(n)} e^{\lambda_n x}, \\ y_2 = \sum_{i=1}^n C_i y_2^{(i)} = C_1 \alpha_2^{(1)} e^{\lambda_1 x} + C_2 \alpha_2^{(2)} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n \alpha_2^{(n)} e^{\lambda_n x}, \\ y_n = \sum_{i=1}^n C_i y_n^{(i)} = C_1 \alpha_n^{(1)} e^{\lambda_1 x} + C_2 \alpha_n^{(2)} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n \alpha_n^{(n)} e^{\lambda_n x} \end{cases} \quad (7.63)$$

бунда C_i — ихтиёрий ўзгармас сон.

1-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 + y_3, \\ y_2' = -y_1 + 5y_2 - y_3, \\ y_3' = y_1 - y_2 + 3y_3, \end{cases}$$

бир жинсли системанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган системанинг характеристик тенгламасини тузамиз:

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Бу тенглама ҳақиқий ҳар хил илдизларга эга: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$. Уларнинг ҳар бири учун (7.62) қўринишдаги система тузамиз:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \text{ учун: } \begin{cases} \alpha_1^{(1)} - \alpha_2^{(1)} + \alpha_3^{(1)} = 0, \\ -\alpha_1^{(1)} + 3\alpha_2^{(1)} - \alpha_3^{(1)} = 0, \\ \alpha_1^{(1)} - \alpha_2^{(1)} + \alpha_3^{(1)} = 0. \end{cases} \\ \lambda_2 = 3 \text{ учун: } \begin{cases} \alpha_2^{(2)} + \alpha_3^{(2)} = 0, \\ -\alpha_1^{(2)} + 2\alpha_2^{(2)} - \alpha_3^{(2)} = 0, \\ \alpha_1^{(2)} - \alpha_2^{(2)} = 0. \end{cases} \end{cases}$$

$$\lambda_3 = 6 \text{ учун: } \begin{cases} -3\alpha_1^{(3)} - \alpha_2^{(3)} + \alpha_3^{(3)} = 0, \\ -\alpha_1^{(3)} - \alpha_2^{(3)} - \alpha_3^{(3)} = 0, \\ \alpha_1^{(3)} - \alpha_2^{(3)} - 3\alpha_3^{(3)} = 0. \end{cases}$$

Бу системаларнинг детерминантлари нолга тенг бўлгани учун, уларнинг ҳар бири чексиз кўп ечимларга эга бўлади. Бу ҳол учун ечимлардан $\alpha_1^{(1)} = \alpha_1^{(2)} = \alpha_1^{(3)} = 1$ бўлганини ажратиб оламиз.

У ҳолда юқоридаги системаларнинг қуйидаги ечимларига эга бўламиз: агар $\lambda_1 = 2$ бўлса, $\alpha_1^{(1)} = 1$, $\alpha_2^{(1)} = 0$, $\alpha_3^{(1)} = -1$; агар $\lambda_2 = 3$ бўлса, $\alpha_1^{(2)} = 1$, $\alpha_2^{(2)} = 1$, $\alpha_3^{(2)} = 1$; агар $\lambda_3 = 6$ бўлса, $\alpha_1^{(3)} = 1$, $\alpha_2^{(3)} = -2$, $\alpha_3^{(3)} = 1$ бўлади. Бу қийматларни ўрнига

қўйиб қуйидаги фундаментал ечимлар системасига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} y_1^{(1)} &= e^{2x}, & y_2^{(1)} &= 0, & y_3^{(1)} &= -e^{2x}; \\ y_1^{(2)} &= e^{3x}, & y_2^{(2)} &= e^{3x}, & y_3^{(2)} &= e^{3x}; \\ y_1^{(3)} &= e^{6x}, & y_2^{(3)} &= -2e^{6x}, & y_3^{(3)} &= e^{6x}. \end{aligned}$$

Бу ечимларнинг чизиқли комбинацияси ва (7.63) функциялар тўпламига асосан берилган системанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + C_3 e^{6x}, \\ y_2 = C_2 e^{3x} - C_3 e^{6x}, \\ y_3 = -C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + C_3 e^{6x}. \end{cases}$$

2. (7.60) характеристик тенгламанинг илдиэлари $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ҳар хил, аммо улар орасида комплекс сонлар мавжуд. Маълумки, характеристик тенглама комплекс илдиэларга эга бўлган ҳолда $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ комплекс илдиэлар жуфтига иккита хусусий ечим мос келади:

$$y_j^{(1)} = \alpha_j^{(1)} e^{(a+ib)x}, \quad (7.64)$$

$$y_j^{(2)} = \alpha_j^{(2)} e^{(a-ib)x}, \quad (7.65)$$

бунда $j = \overline{1, n}$; $\alpha_j^{(1)}, \alpha_j^{(2)}$ коэффициентлар $\lambda = a - ib$ учун (7.62) системадан аниқланади.

Бу ҳолда $e^{ax} \cos bx$ ва $e^{ax} \sin bx$ кўринишдаги функцияларга эга бўлган ҳақиқий ечимлар жуфтига эга бўламиз.

2-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y_1' = -7y_1 + y_2, \\ y_2' = -2y_1 - 5y_2 \end{cases}$$

системанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган системанинг характеристик тенгламаси

$$\begin{vmatrix} -7-\lambda & 1 \\ -2 & -5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 12\lambda + 37 = 0$$

кўринишда бўлиб, у $\lambda_{1,2} = -6 \pm i$ илдиэларга эга.

(7.62) формулага асосан

$$\begin{cases} (-7-\lambda)\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ -2\alpha_1 + (-5-\lambda)\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

системага эга бўламиз. $\lambda_1 = -6 + i$ учун:

$$\begin{cases} (-7-\lambda_1)\alpha_1^{(1)} + \alpha_2^{(1)} = 0, \\ -2\alpha_1^{(1)} + (-5-\lambda_1)\alpha_2^{(1)} = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-1-i)\alpha_1^{(1)} + \alpha_2^{(1)} = 0, \\ -2\alpha_1^{(1)} + (1-i)\alpha_2^{(1)} = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1^{(1)} = 1, \\ \alpha_2^{(1)} = 1+i. \end{cases}$$

(7.64) формулага асосан хусусий ечим:

$$y_1^{(1)} = \alpha_1^{(1)} e^{(a+ib)x} = e^{(-6+i)x} = e^{-6x} (\cos x + i \sin x),$$

$$\begin{aligned} y_2^{(1)} &= \alpha_2^{(1)} e^{(a+ib)x} = (1+i) e^{(-6+i)x} = \\ &= e^{-6x} (\cos x - \sin x + i(\cos x + \sin x)). \end{aligned}$$

(Бу ерда Эйлер формуласи $e^{i(\cos x + i \sin x)} = e^{i \cos x} e^{-\sin x} = \cos x + i \sin x$ дан фойдаландик). Бу ечимнинг ҳақиқий ва мавҳум қисмларини алоҳида олиб, берилган системанинг фундаментал ечимлар системасини ташкил этувчи иккита ҳақиқий кўринишдаги ечимига эга бўламиз:

$$y_1^{(1)} = e^{-6x}, \quad y_2^{(1)} = e^{-6x} (\cos x - \sin x),$$

$$\bar{y}_1^{(1)} = e^{-6x} \sin x, \quad \bar{y}_2^{(1)} = e^{-6x} (\cos x + \sin x).$$

У ҳолда берилган системанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{cases} y_1 = C_1 y_1^{(1)} + C_2 \bar{y}_1^{(1)} = e^{-6x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x), \\ y_2 = C_1 y_2^{(1)} + C_2 \bar{y}_2^{(1)} = e^{-6x} (C_1 (\cos x - \sin x) + C_2 (\cos x + \sin x)). \end{cases}$$

Иккинчи $\lambda_2 = -6 - i$ илдиэдан фойдаланмадик, чунки бу илдиэ учун юқоридаги амалларни бажарсак, натижада охириги ҳосил қилган системанинг умумий ечимига эга бўламиз.

Бу усул ихтиёрий чизиқли бир жинсли дифференциал тенгламалар системаси учун тўғридир.

3. (7.60) характеристик тенгламанинг $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ илдизлари ичида карралиси мавжуд. Бу ҳолда қуйидагича иш тутамиз. (7.60) характеристик тенгламанинг λ илдизлари ичида k таси каррали бўлсин. У ҳолда (7.59) ечимлар системасини ($a_j(x) = \text{const}$, $f_i(x) = 0$, ($i, j = 1, n$) ҳол учун) қуйидаги кўринишда излаймиз:

$$\begin{aligned} y_1 &= (\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots + \alpha_{1k-1}x^{k-1})e^{\lambda x} \\ y_2 &= (\alpha_{20} + \alpha_{21}x + \alpha_{22}x^2 + \dots + \alpha_{2k-1}x^{k-1})e^{\lambda x} \end{aligned} \quad (7.66)$$

$$y_n = (\alpha_{n0} + \alpha_{n1}x + \alpha_{n2}x^2 + \dots + \alpha_{nk-1}x^{k-1})e^{\lambda x}$$

$a_j (j = \overline{1, n}, j = 0, k-1)$ сонларни қуйидагича аниқланади. (7.66) даги y_j функцияларнинг ва унинг y_j' ҳосилаларини (7.59) системага қўйиб, $e^{\lambda x} \neq 0$ га қисқартирамиз, сўнгра ҳосил қилинган тенгликнинг чап ва ўнг қисмидаги x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларини тенглаймиз. Бу жараёнларни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

3-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y_1' = y_2 + y_3, \\ y_2' = y_1 + y_2 - y_3, \\ y_3' = y_2 + y_3 \end{cases} \quad (1)$$

системанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган системанинг характеристик тенгламасини тузамиз:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)^2\lambda = 0. \quad (2)$$

Бундан $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ каррали ва $\lambda_3 = 0$ илдизга эга бўламиз. (7.66) формулага асосан $\lambda_{1,2} = 1$ илдиз учун

$$\begin{aligned} y_1^{(1,2)} &= (\alpha_{10} + \alpha_{11}x)e^x, \\ y_2^{(1,2)} &= (\alpha_{20} + \alpha_{21}x)e^x, \\ y_3^{(1,2)} &= (\alpha_{30} + \alpha_{31}x)e^x \end{aligned} \quad (3)$$

кўринишдаги ечимларга эга бўламиз. $a_j (j = \overline{1, 3}, j = 0, 1)$ коэффициентлар берилган системага $y_1, y_2, y_3, y_1', y_2', y_3'$ ларни қўйиш ёрдамида ҳосил бўлган қуйидаги системадан аниқланади. $e^x \neq 0$ га қисқартирилгандан сўнг

$$\begin{cases} \alpha_{11} + \alpha_{10} + \alpha_{11}x = \alpha_{20} + \alpha_{21}x + \alpha_{30} + \alpha_{31}x, \\ \alpha_{21} + \alpha_{20} + \alpha_{21}x = \alpha_{11}x + \alpha_{10} + \alpha_{20} + \alpha_{21}x - \alpha_{30} - \alpha_{31}x, \\ \alpha_{31} + \alpha_{30} + \alpha_{31}x = \alpha_{20} + \alpha_{21}x + \alpha_{30} + \alpha_{31}x \end{cases}$$

системага эга бўламиз. Бундан чап ва ўнг қисмидаги x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб

$$\begin{cases} \alpha_{11} + \alpha_{10} = \alpha_{20} + \alpha_{30}, \\ \alpha_{11} = \alpha_{21} + \alpha_{31}, \\ \alpha_{21} + \alpha_{20} = \alpha_{10} + \alpha_{20} - \alpha_{30}, \\ \alpha_{21} = \alpha_{11} + \alpha_{21} - \alpha_{31}, \\ \alpha_{31} = \alpha_{21} + \alpha_{31}, \\ \alpha_{31} + \alpha_{30} = \alpha_{20} + \alpha_{30} \end{cases}$$

системани ҳосил қиламиз. Бундан $\alpha_{20} = \alpha_{31} = \alpha_{11}$, $\alpha_{30} = \alpha_{10}$, $\alpha_{20} = 0$ ни топамиз. α_{10} ва α_{11} сонларни ихтиёрий параметр деб олишимиз мумкин. $\alpha_{10} = C_1$ ва $\alpha_{11} = C_2$ деб белгиласак, (3) ечимни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$y_1^{(1,2)} = (C_1 + C_2x)e^x, \quad y_2^{(1,2)} = C_1e^x, \quad y_3^{(1,2)} = (C_1 + C_2x)e^x. \quad (4)$$

$\lambda_3 = 0$ илдиз учун (7.61) формулага асосан

$$y_1^{(3)} = \alpha_1^{(3)}e^{0x} = \alpha_1^{(3)}, \quad y_2^{(3)} = \alpha_2^{(3)}e^{0x} = \alpha_2^{(3)}, \quad y_3^{(3)} = \alpha_3^{(3)}e^{0x} = \alpha_3^{(3)} \quad (5)$$

ечимлар мос келади. $\alpha_1^{(3)}, \alpha_2^{(3)}, \alpha_3^{(3)}$ сонлари (7.62) системадан аниқланади:

$$\begin{cases} \alpha_2^{(3)} + \alpha_3^{(3)} = 0, \\ \alpha_1^{(3)} + \alpha_2^{(3)} - \alpha_3^{(3)} = 0, \\ \alpha_2^{(3)} + \alpha_3^{(3)} = 0. \end{cases}$$

Системанинг ечими: $\alpha_1^{(3)} = 2C_3$, $\alpha_2^{(3)} = -C_3$, $\alpha_3^{(3)} = C_3$.

Демак, $\lambda_3 = 0$ илдиз учун (1) системанинг (5) кўринишдаги ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y_1^{(3)} = 2C_3, \quad y_2^{(3)} = -C_3, \quad y_3^{(3)} = C_3,$$

бунда C_3 — ихтиёрий ўзгармас сон.

Берилган системанинг умумий ечими

$$\begin{cases} y_1 = y_1^{(1,2)} + y_1^{(3)} = (C_1 + C_2 x)e^x + 2C_3, \\ y_2 = y_2^{(1,2)} + y_2^{(3)} = C_1 e^x - C_3, \\ y_3 = y_3^{(1,2)} + y_3^{(3)} = (C_1 + C_2 x)e^x + C_3 \end{cases}$$

кўринишда бўлади.

Агар система бир жинсли бўлмаса, унга мос бир жинсли системанинг (7.63) кўринишдаги умумий ечимини билган ҳолда бу ечимдаги $C_1, C_2, \dots, C_n$ ихтиёрий ўзгармасларни вариациялаш усули билан берилган бир жинсли бўлмаган системанинг умумий ечимини топиш мумкин. Бир жинсли бўлмаган системанинг умумий ечимини ҳар доим (7.63) кўринишда ёзиш мумкинлиги исбот қилинган. Бунда (7.63) даги $C_1, C_2, \dots, C_n$ ихтиёрий ўзгармасларни унга мос $C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x)$ (ҳар бирига мос $C_1, C_2, \dots, C_n$ ихтиёрий ўзгармаслар иштирок этувчи) функциялар билан алмаштириш керак. Бу функцияларни берилган бир жинсли бўлмаган система ёрдамида аниқланади. Унинг учун системага $y_1, y_2, \dots, y_n, y_1', y_2', \dots, y_n'$ ларнинг қийматини қўйиб $C_1'(x), C_2'(x), \dots, C_n'(x)$ ларга нисбатан n та чизиқли алгебраик тенгламалар системасига эга бўламиз. Бу системанинг ечими ҳар доим мавжуд ва у қуйидаги кўринишда бўлади:

$$C_1'(x) = \varphi_1(x), \quad C_2'(x) = \varphi_2(x), \quad \dots, \quad C_n'(x) = \varphi_n(x),$$

бунда $\varphi_i(x)$ ($i = \overline{1, n}$) — маълум функциялар. Бу тенгликларни интеграллаб $C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x)$ функцияларни топамиз:

$$C_i(x) = \int \varphi_i(x) dx + C_i,$$

бунда C_i — ихтиёрий ўзгармас. (7.63) ечимдаги $C_i = \text{const}$ нинг ўрнига $C_i(x)$ аниқланган қийматларни қўйиб бир жинсли бўлмаган тенгламалар системасининг умумий ечимини ҳосил қиламиз. Буни қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

4 - мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y_1' = 4y_1 - 5y_2 - 4x + 1, \\ y_2' = y_1 - 2y_2 + x \end{cases} \quad (1)$$

системанинг $y_1(0) = 1, y_2(0) = 2$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Е ч и ш. Дастлаб бир жинсли бўлган системанинг умумий ечимини топамиз:

$$\begin{cases} y_1' = 4y_1 - 5y_2, \\ y_2' = y_1 - 2y_2. \end{cases} \quad (2)$$

(2) нинг характеристик тенгламаси

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -5 \\ 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \text{бўлиб, у } \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$$

илдиэларга эга. (2) системанинг умумий ечими

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{-x} + 5C_2 e^{3x}, \\ y_2 = C_2 e^{-x} + C_2 e^{3x} \end{cases} \quad (3)$$

кўринишда бўлади. (3) ечимдаги C_1 ва C_2 ўзгармасларни $C_1(x)$ ва $C_2(x)$ нольмалум функциялар деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, (3) даги y_1 ва y_2 лар (1) системанинг ечими деб оламиз. (3) нинг ҳосиласини топамиз:

$$y_1' = C_1'(x)e^{-x} - C_1(x)e^{-x} + 5C_2'(x)e^{3x} + 15C_2e^{3x}$$

$$y_2' = C_1'(x)e^{-x} - C_1(x)e^{-x} + C_2'(x)e^{3x} + 3C_2e^{3x}.$$

(1) системага y_1, y_2, y_1', y_2' қийматларни қўямиз ва ўхшаш ҳадларни ихчамлангандан сўнг

$$\begin{cases} C_1'(x)e^{-x} + 5C_2'(x)e^{3x} = 4x + 1, \\ C_1'(x)e^{-x} + C_2'(x)e^{3x} = x \end{cases}$$

системага эга бўламиз. Бу системанинг ечими:

$$C_1'(x) = \frac{1}{4}(x-1)e^x, \quad C_2'(x) = \frac{1}{4}(3x+1)e^{3x}.$$

$$y_1^{(n)} = F(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n-1)}).$$

Унинг умумий ечими (5-§ ни кўринг) бизга маълум усул ёрдамида аниқланади:

$$y_1 = \phi_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n). \quad (7.70)$$

Охирги ифодани x бўйича $n-1$ марта дифференциаллаб $y_1', y_1'', \dots, y_1^{(n-1)}$ ҳосилаларни топамиз. Бу ҳосилаларни (7.69) системага қўйиб ва (7.70) функция билан биргаликда берилган системанинг умумий ечимини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} y_1 &= \phi_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_2 &= \phi_2(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_3 &= \phi_3(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ &\dots \\ y_n &= \phi_n(x, C_1, C_2, \dots, C_n). \end{aligned} \quad (7.71)$$

Қуйидаги мисолни кўрамиз.

5-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 + y_3 + e^x, \\ y_2' = y_1 + y_2 + y_3 + x, \\ y_3' = 4y_1 - y_2 + 4y_3 \end{cases} \quad (1)$$

системанинг чиқариш усули билан умумий ечимини ва

$$y_1(0) = 0,34, \quad y_2(0) = -0,16, \quad y_3(0) = 0,27 \quad (2)$$

бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимни топинг.

Ечиш. (1) системанинг биринчи тенгласини x бўйича дифференциаллаймиз ва y_1', y_2', y_3' ларнинг ўрнига бу системадаги уларнинг ифодаларини қўямиз.

Натижада

$$\begin{aligned} y_1'' &= 3y_1' - y_2' + y_3' + e^x = 3(3y_1 - y_2 + y_3 + e^x) - \\ &\quad -(y_1 + y_2 + y_3 + x) + 4y_1 - y_2 + 4y_3 + e^x = \\ &= 12y_1 - 5y_2 + 6y_3 + 4e^x + x \end{aligned}$$

ҳосил бўлади. y_1'' ни x бўйича дифференциаллаймиз ва яна y_1', y_2', y_3' ларнинг ўрнига (1) системадаги ифодаларини қўямиз:

$$\begin{aligned} y_1''' &= 12y_1' - 5y_2' + 6y_3' + 4e^x + 1 = 12(3y_1 - y_2 + y_3 + e^x) - \\ &\quad - 5(y_1 + y_2 + y_3 + x) + 6(4y_1 - y_2 + 4y_3) + 4e^x + x = \\ &= 55y_1 - 23y_2 + 31y_3 + 16e^x + 6x. \end{aligned}$$

Демак, бу ҳол учун (7.68) система қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 + y_3 + e^x, \\ y_1'' = 12y_1 - 5y_2 + 6y_3 + 4e^x + x, \\ y_1''' = 55y_1 - 23y_2 + 31y_3 + 16e^x + 6x. \end{cases} \quad (3)$$

Биринчи ва иккинчи тенгламалардан y_2 ва y_3 ларни топамиз:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1'' - 6y_1' + 6y_1 + 2e^x - x, \\ y_3 &= y_1''' - 5y_1'' + 3y_1' + e^x - x. \end{aligned} \quad (4)$$

y_2 ва y_3 нинг қийматларини (3) системадаги учинчи тенгламага қўямиз:

$$\begin{aligned} y_1''' &= 55y_1 - 23(y_1'' - 6y_1' + 6y_1 + 2e^x - x) + 31(y_1''' - 5y_1'' + \\ &\quad + 3y_1' + e^x - x) + 16e^x + 6x = 8y_1''' - 17y_1'' + 10y_1' + e^x - 2x. \end{aligned}$$

Бундан

$$y_1''' - 8y_1'' + 17y_1' - 10y_1 = e^x - 2x \quad (5)$$

кўринишдаги учинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган тенгламага эга бўламиз. Бундай тенгламани ечиш усулини (5-§ га қаранг) биламиз. Тенгламанинг характеристик тенгласини тузамиз:

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10 = 0. \quad (6)$$

Унинг илдиэлари $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$. (5) тенгламанинг мос бир жинсли тенгласининг умумий ечими y_1 қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x}.$$

(5) тенгламанинг ўнг қисми (7.49) ва (7.53) кўринишдаги функциялар йиғиндисидан, яъни $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = 2x$ дан иборат $f_1(x) = e^x$ учун $z = 1$ га тенг, чунки $\lambda_1 = 1$ тўғри келади, шунинг учун $k = 1$, $f_2(x) = -2x$ учун $z = 0$ ва у характеристик тенгламанинг илдизлари ичида йўқ, шунинг учун $k = 0$.

Демак, (5) тенгламанинг хусусий ечими y_1^* ни қуйидаги кўринишда излаймиз:

$$y_1^* = A x e^x + B x + C,$$

бунда A, B, C номаълум сонлар. Бу сонларни топиш учун $y_1^*, y_1^{*'}, y_1^{*''}$ ҳосилаларни топиб, уларни y_1^* билан биргаликда (5) тенгламага қўямиз:

$$y_1^{*'} = A e^x + A x e^x + B, \quad y_1^{*''} = 2A e^x + A x e^x,$$

$$y_1^{*'''} = 3A e^x + A x e^x,$$

$$3A e^x + A x e^x - 8(2A e^x + A x e^x) + 17(A e^x + A x e^x + B) -$$

$$-10(A x e^x + B x + C) = e^x - 2x,$$

$$4A e^x + 17B - 10Bx - 10C = e^x - 2x,$$

$$\left. \begin{aligned} 4A &= 1, \\ -10B &= -2, \\ 17B - 10C &= 0, \end{aligned} \right\}$$

$$\text{бундан } A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{5}, \quad C = \frac{17}{50}.$$

Шундай қилиб,

$$y_1^* = \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50}.$$

(5) тенгламанинг умумий ечими

$$y_1 = \bar{y}_1 + y_1^* = C_1 x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50}$$

функциядан иборат бўлади.

Системанинг умумий ечимини топиш учун $y_1^*, y_1^{*''}$ ҳосилаларни топиб, уларни (4) тенгликка қўямиз:

$$y_1^* = C_1 x + 2C_2 e^{2x} + 5C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50},$$

$$y_1^{*''} = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x} + 25C_3 e^{5x} + \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{4} x e^x,$$

$$y_2 = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x} + 25C_3 e^{5x} + \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{4} x e^x - 6(C_1 e^x +$$

$$+ 2C_2 e^{2x} + 5C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} e^x + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5}) + 6(C_1 e^x +$$

$$+ C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50}) + 2e^x - x =$$

$$= C_1 e^x - 2C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} - e^x + \frac{1}{4} x e^x + \frac{6}{5} x + \frac{21}{25},$$

$$y_3 = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x} + 25C_3 e^{5x} + \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{4} x e^x -$$

$$-5(C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} + 5C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5}) + 3(C_1 e^x +$$

$$+ C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50}) + e^x - x =$$

$$= -C_1 e^x - 3C_2 e^{2x} + 3C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} e^x - \frac{1}{4} x e^x - \frac{2}{5} x + \frac{1}{50}.$$

Демак, (1) системанинг ечими:

$$y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{5} x + \frac{17}{50},$$

$$y_2 = C_1 e^x - 2C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x} - e^x + \frac{1}{4} x e^x + \frac{6}{5} x + \frac{21}{25},$$

$$y_3 = -C_1 e^x - 3C_2 e^{2x} + 3C_3 e^{5x} + \frac{1}{4} e^x - \frac{1}{4} x e^x - \frac{2}{5} x + \frac{1}{50}.$$

Системанинг хусусий ечимини топиш учун (2) бошланғич шартлардан фойдаланиб қуйидаги системани ҳосил қиламиз:

$$\frac{17}{50} = C_1 + C_2 + C_3 + \frac{17}{50},$$

$$-\frac{4}{25} = C_1 - 2C_2 + C_3 - 1 + \frac{21}{25},$$

$$\frac{27}{100} = -C_1 - 3C_2 + 3C_3 + \frac{1}{4} + \frac{1}{50},$$

булардан $C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 0$ ларни топамиз.

Изланаётган хусусий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{4}xe^x + \frac{1}{5}x + \frac{17}{50}, \\ y_2 = \frac{1}{4}xe^x - e^x + \frac{6}{5}x + \frac{21}{25}, \\ y_3 = -\frac{1}{4}xe^x + \frac{1}{4}e^x - \frac{2}{5}x + \frac{1}{50}. \end{cases}$$

Машқлар

Қуйидаги дифференциал тенгламалар системасининг умумий ечимини топинг:

$$360. \begin{cases} y_1' = -7y_1 + y_2, \\ y_2' = -2y_1 - 5y_2. \end{cases} \quad 361. \begin{cases} y_1' = y_1 - 3y_2, \\ y_2' = 3y_1 + y_2. \end{cases}$$

$$362. \begin{cases} y_1' = -5y_1 + 2y_2 + e^x, \\ y_2' = y_1 + 6y_2 + e^{-2x}. \end{cases} \quad 363. \begin{cases} y_1' = 3y_1 - 2y_2 + x, \\ y_2' = 3y_1 - 4y_2. \end{cases}$$

$$364. \begin{cases} y_1' = y_1 - y_2, \\ y_2' = y_1 + y_2 + e^x. \end{cases}$$

$$365. \begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 - \cos x, \\ y_2' = -2y_1 - y_2 + \sin x + \cos x. \end{cases}$$

$$366. \begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + y_3, \\ y_2' = y_1 + y_2 - y_3, \\ y_3' = 2y_1 - y_2. \end{cases} \quad 367. \begin{cases} y_1' = 5y_1 + 2y_2 - 3y_3, \\ y_2' = 4y_1 + 5y_2 - 4y_3, \\ y_3' = 6y_1 + 4y_2 - 4y_3. \end{cases}$$

Қуйидаги дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечинг:

$$369. \begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = y_3, \\ y_3' = y_1, \end{cases} \quad y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = 1.$$

$$370. \begin{cases} y_1' = y_2 + y_3, \\ y_2' = y_1 + y_3, \\ y_3' = y_1 + y_2, \end{cases} \quad y_1(0) = -1, \quad y_2(0) = 1, \quad y_3(0) = 0.$$

8-§. Биринчи мустақил уй иши

Мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда бешта мисол бўлиб, уларнинг шартни қуйидагича.

1-, 2-, 3-, 5-мисолларда: берилган дифференциал тенгламанинг умумий ечимини (умумий интегрални) топиш керак.

4-мисолда: дифференциал тенгламанинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини (хусусий интегрални) топиш керак.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини (умумий интегрални) топинг.

$$1. (xy^2 + x)dx + (y - x^2y)dy = 0.$$

Е ч и ш. Берилган тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$y(1 - x^2)dy = -x(y^2 + 1)dx.$$

Бу тенглама ўзгарувчилари ажраладиган тенглама. Ўзгарувчиларни ажратамыз:

$$\frac{ydy}{1+y^2} = \frac{-x dx}{1-x^2}.$$

Охириги тенгламанинг иккала қисмини интеграллаймиз:

$$\int \frac{ydy}{1+y^2} = \int \frac{x dx}{1-x^2}, \quad \frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \frac{1}{2} \ln|x^2-1| + \frac{1}{2} \ln C,$$

$$y^2 + 1 = C|x^2 - 1|, \quad y^2 = C|x^2 - 1| - 1.$$

Демак, берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = \pm \sqrt{C|x^2 - 1| - 1}$$

функциялардан иборат бўлади.

$$2. \sec^2 x \operatorname{tg} y dx + \sec^2 y \operatorname{tg} x dy = 0.$$

Е ч и ш . Берилган тенглама ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенглама. Ўзгарувчиларни ажратамиз ва уларни интеграллаймиз:

$$\frac{\sec^2 y dy}{\operatorname{tg} y} = -\frac{\sec^2 x dx}{\operatorname{tg} x}, \quad \int \frac{\sec^2 y dy}{\operatorname{tg} y} = -\int \frac{\sec^2 x dx}{\operatorname{tg} x},$$

$$\int \frac{d(\operatorname{tg} y)}{\operatorname{tg} y} = -\int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}, \quad \ln |\operatorname{tg} y| = -\ln |\operatorname{tg} x| + \ln C,$$

$$\operatorname{tg} y = \frac{C}{\operatorname{tg} x}, \quad \operatorname{tg} y \cdot \operatorname{tg} x = C,$$

яъни дифференциал тенгламанинг умумий интегрални ҳосил қилдик.

$$3. \quad y - x \frac{dy}{dx} = x + y \frac{dy}{dx}.$$

Е ч и ш . Берилган тенгламадан $\frac{dy}{dx}$ ни топамиз:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x+y}.$$

Бу тенглама биринчи тартибли бир жинсли тенгламадан иборат. Уни $y = x \cdot u(x)$ алмаштириш ёрдамида ечамиз:

$$y' = u'x + u, \quad u'x + u = \frac{ux-x}{x+ux}, \quad u'x + u = \frac{u-1}{1+u},$$

$$u'x = \frac{u-1}{1+u} - u = \frac{-u^2-1}{u+1}, \quad x \frac{du}{dx} = -\frac{u^2+1}{u+1}.$$

Ўзгарувчилари ажраладиган тенглама ҳосил қилдик, уни ечамиз:

$$\frac{u+1}{u^2+1} du = -\frac{dx}{x}, \quad \int \frac{u+1}{u^2+1} du = -\int \frac{dx}{x},$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{2udu}{u^2+1} + \int \frac{du}{u^2+1} = -\ln|x| + \ln|C|,$$

$$\frac{1}{2} \ln|u^2+1| + \operatorname{arctg} u = \ln \left| \frac{C}{x} \right|, \quad \operatorname{arctg} u = \ln \left| \frac{C}{x\sqrt{u^2+1}} \right|,$$

$$\operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{x^2+y^2}} \right|,$$

яъни берилган тенгламанинг умумий интегрални топдик.

4. Ушбу

$$dy - e^{-x} dx + y dx - x dy = xy dx$$

дифференциал тенгламанинг $y(0) = \ln 5$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Е ч и ш . Тенгламада қуйидаги алмаштиришларни ба-
жариб ҳосилани топамиз:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy+e^{-x}-y}{1-x}, \quad \frac{dy}{dx} + \frac{1-x}{1-x} y = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

$\frac{dy}{dx} + y = \frac{e^{-x}}{1-x}$ тенглама биринчи тартибли чизиқли тенглама бўлгани учун ечимни $y = u(x) \cdot v(x)$ алмаштириш ёрдамида топамиз:

$$y' = u'v + uv', \quad u'v + uv' + uv = \frac{e^{-x}}{1-x},$$

$$u'v + u \left(\frac{dv}{dx} + v \right) = \frac{e^{-x}}{1-x}. \quad (1)$$

$\frac{dv}{dx} + v = 0$ шартдан фойдаланиб, $v(x)$ функцияни то-
памиз:

$$\frac{dv}{dx} = -v, \quad \frac{dv}{v} = -dx, \quad \int \frac{dv}{v} = -\int dx$$

$$\ln|v| = -x, \quad v = e^{-x}.$$

$v(x)$ учун топилган ифодани (1) тенгламага қўямиз:

$$\frac{du}{dx} e^{-x} = \frac{e^{-x}}{1-x}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{1-x},$$

$$du = \frac{dx}{1-x}, \quad \int du = \int \frac{dx}{1-x}, \quad u = -\ln|1-x| + \ln C, \quad u = \ln \left| \frac{C}{1-x} \right|.$$

У ҳолда

$$y = uv = e^{-x} \ln \left| \frac{C}{1-x} \right|$$

функция берилган тенгламанинг умумий ечими бўлади.
Бошланғич шартдан фойдаланиб ўзгармас C ни топамиз:

$$y(0) = \ln C = \ln 5, \quad C = 5.$$

Берилган тенгламанинг хусусий ечими

$$y = e^{-x} \ln \frac{5}{|1-x|}$$

функциядан иборат бўлади.

5. Ушбу

$$(1+x^2) \frac{dy}{dx} = xy + x^2 y^2$$

дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Тенгламанинг турини аниқлаш учун алмаштиришлар бажариб,

$$\frac{dy}{dx} - \frac{xy}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} y^2$$

куринишдаги тенгламага эга бўламиз. Бу тенглама Бернулли тенгламаси бўлгани учун уни $y = u(x) \cdot v(x)$ алмаштириш ёрдамида ечамиз:

$$y' = u'v + uv', \quad u'v + uv' - \frac{xy}{1+x^2} uv = \frac{x^2}{1+x^2} u^2 v^2,$$

$$u'v + u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{xv}{1+x^2} \right) = \frac{x^2 u^2 v^2}{1+x^2}. \quad (1)$$

$\frac{dv}{dx} - \frac{xv}{1+x^2} = 0$ шартдан фойдаланиб $v(x)$ функцияни топамиз:

$$\frac{dv}{dx} = \frac{xv}{1+x^2}, \quad \frac{dv}{v} = \frac{xdx}{1+x^2}, \quad \int \frac{dv}{v} = \int \frac{xdx}{1+x^2}$$

$$\ln|v| = \frac{1}{2} \ln(1+x^2), \quad v = \sqrt{1+x^2}.$$

$v(x)$ учун аниқланган ифодани (1) тенгламага қўямиз:

$$\frac{du}{dx} \sqrt{1+x^2} = \frac{x^2 u^2 (1+x^2)}{1+x^2}, \quad \frac{du}{u^2} = \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$\int \frac{du}{u^2} = \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u},$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}} \left| \begin{array}{l} u_1(x) = x, \quad du_1 = dx \\ dv_1 = \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}}, \quad v_1 = \sqrt{1+x^2} \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned} &= x\sqrt{1+x^2} - \int \sqrt{1+x^2} dx = x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{1+x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}} = \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}} - 2C. \end{aligned}$$

Охирги тенгламадан қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$2 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}} = x\sqrt{1+x^2} - \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - 2C,$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - C.$$

Демак,

$$-\frac{1}{u} = \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - C,$$

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} + C,$$

$$u = \left(\frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} + C \right)^{-1}.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = \frac{\sqrt{1+x^2}}{\frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{1+x^2}| - \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} + C}$$

формула билан аниқланади.

1-вариант

$$1. e^{x+3y} dy = x dx.$$

$$2. y' + y + y^2 = 0.$$

$$3. y^2 + x^2 y' = xy y'.$$

$$4. y' - y = e^x, y(0) = 1.$$

$$5. xy' + 2y + x^5 y^3 e^x = 0.$$

2-вариант

$$1. \sin y \cos x dy = \cos y \sin x dx.$$

$$2. y^2 \ln x dx - (y-1)xdy = 0.$$

$$3. xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}.$$

$$4. xy' + y + e^{-x^2} = 0, y(1) = \frac{1}{2e}.$$

$$5. y' x^3 \sin y = xy' - 2y.$$

3-вариант

$$1. y' = (2y+1)\operatorname{tg} x.$$

$$2. (x+y^2)dy + ydx - y^2 dx = 0.$$

$$3. xy' = y - xe^x.$$

$$4. \cos y dx = (x + 2 \cos y) \sin y dy, y(0) = \frac{\pi}{4}.$$

$$5. (2x^2 y \ln y - x)y' = y.$$

4-вариант

$$1. (\sin(x+y) + \sin(x-y))dx + \frac{dy}{\cos y} = 0.$$

$$2. y' + 2y - y^2 = 0.$$

$$3. xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x}.$$

$$4. x^2 y' + xy + 1 = 0, y(1) = 0.$$

$$5. 2y' - \frac{x}{y} = \frac{xy}{x^2-1}.$$

5-вариант

$$1. (1+e^x)yy' = e^x.$$

$$2. (x^2+x)ydx + (y^2+1)dy = 0.$$

$$3. xy' = y \cos \ln \frac{y}{x}.$$

$$4. yx' + x = 4y^3 + 3y^2, y(2) = 1.$$

$$5. xy'' - 2x^2 \sqrt{y} = 4y.$$

6-вариант

$$1. \sin x \operatorname{tg} y dx - \frac{dy}{\sin x} = 0.$$

$$2. (xy^3 + x)dx + (x^2 y^2 - y^2)dy = 0.$$

$$3. (y + \sqrt{xy})dx = xdy.$$

$$4. (2xy + y)dy = ydx + 4 \ln y dy, y(0) = 1.$$

$$5. xy^2 y' = x^2 + y^3.$$

7-вариант

$$1. 3e^x \sin y dx + (1 - e^x) \cos y dy = 0.$$

$$2. (1 + y^2)dx - (y + yx^2)dy = 0.$$

$$3. xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y.$$

$$4. y' = \frac{y}{3x^2 - y^2}, y(0) = 1.$$

$$5. (x+1)(y'+y^2) = -y.$$

8-вариант

$$1. y' = \frac{e^{2x}}{\ln y}.$$

$$2. y' = 2xy + x.$$

$$3. y = x(y - \sqrt[4]{e^y}).$$

$$4. (1 - 2xy)y' = y(y-1), y(0) = 1.$$

$$5. y' x + y = -xy^2.$$

9-вариант

$$1. 3^{x^2+y} dy + x dx = 0.$$

$$2. y - xy' = 3(1 + x^2 y').$$

3. $y' = \frac{x}{y} - 1$.
4. $x(y' - y) = e^x$, $y(1) = 0$.
5. $y' - xy = -y^3 e^{-x^2}$.

10-вариант

1. $(\cos(x - 2y) + \cos(x + 2y))y' = \sec x$.
2. $2xyy' = 1 - x^2$.
3. $y'x + x + y = 0$.
4. $y = x(y' - x \cos x)$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.
5. $xy' - 2\sqrt{x^3} \cdot y = y$.

11-вариант

1. $y' = e^{x^2} x(1 + y^2)$.
2. $(x^2 - 1)y' - xy = 0$.
3. $ydx + (2\sqrt{xy} - x)dy = 0$.
4. $(xy' - 1) \ln x = 2y$, $y(e) = 0$.
5. $y' + xy = x^3 y^3$.

12-вариант

1. $\operatorname{ctg} x \cos^2 y dx + \sin^2 x \operatorname{tg} y dy = 0$.
2. $(y^2 x + y^2)dy + xdx = 0$.
3. $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$.
4. $(2e^y - x)y' = 1$, $y(0) = 0$.
5. $y' = \frac{x}{y} e^{2x} + y$.

13-вариант

1. $y' \sin x = y \cos x + 2 \cos x$.
2. $(1 + x^3)y^3 dx - (y^2 - 1)x^3 dy = 0$.
3. $(4x^2 + 3xy + y^2)dx + (4y^2 + 3xy + x^2)dy = 0$.

4. $xy' + (x + 1)y = 3x^2 e^{-x}$, $y(1) = 0$.
5. $yx' + x = -yx^2$.

14-вариант

1. $1 + (1 + y')e^y = 0$.
2. $xy' - y = y^2$.
3. $(x - y)ydx - x^2 dy = 0$.
4. $(x + y^2)dy = ydx$, $y(0) = 1$.
5. $x(x - 1)y' + y^3 = xy$.

15-вариант

1. $y' \operatorname{ctg} x + y = 2$.
2. $\sqrt{y^2 + 1} dx = xy dy$.
3. $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$.
4. $(\sin^2 y + x \operatorname{ctg} y)y' = 1$, $y(0) = \frac{\pi}{2}$.
5. $2x^3 yy' + 3x^2 y^2 + 1 = 0$.

16-вариант

1. $\frac{e^{-x^2}}{x} dy + \frac{1}{\cos^2 y} dx$.
2. $y' - xy^2 = 2xy$.
3. $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$.
4. $(x + 1)y' + y = x^3 + x^2$, $y(0) = 0$.
5. $\frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{y} - 2x\right) dy$.

17-вариант

1. $e^x \sin y dx + \operatorname{tg} y dy = 0$.
2. $2x^2 yy' + y^2 = 2$.
3. $(2\sqrt{xy} - y)dx + xdy = 0$.

$$4. xy' - 2y + x^2 = 0, y(1) = 0.$$

$$5. y' = x\sqrt[3]{y} = 3y.$$

18-вариант

$$1. (1 + e^{3y})xdx = e^{3y}dy.$$

$$2. y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}.$$

$$3. xy' + y\left(\ln \frac{y}{x} - 1\right) = 0.$$

$$4. xy' + y = \sin x, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

$$5. xy' + y = y^2 \ln x.$$

19-вариант

$$1. (\sin(2x + y) - \sin(2x - y))dx = \frac{dy}{\sin y}.$$

$$2. y'\sqrt{1+y^2} = \frac{x^2}{y}.$$

$$3. (x^2 + y^2)dx + 2xydy = 0.$$

$$4. (x^2 - 1)y' - xy = x^3 - x, y(\sqrt{2}) = 1.$$

$$5. xdx = \left(\frac{x^2}{y} - y^3\right)dy.$$

20-вариант

$$1. \cos ydx = 2\sqrt{1+x^2}dy + \cos y \cdot \sqrt{1+x^2}dy.$$

$$2. (y+1)y' = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} + xy.$$

$$3. (y^2 - 2xy)dx - x^2dy = 0.$$

$$4. (1 - x^2)y' + xy = 1, y(0) = 1.$$

$$5. y' + 2xy = 2x^3y^3.$$

21-вариант

$$1. y'\sqrt{1-x^2} - \cos^2 y = 0.$$

$$2. (1+x^2)y' + y\sqrt{1+x^2} = xy.$$

$$3. (x+2y)dx + xdy = 0.$$

$$4. y' \operatorname{ctg} x - y = 2 \cos^2 x \operatorname{ctg} x, y(0) = 0.$$

$$5. y' + y = \frac{x}{y^2}.$$

22-вариант

$$1. e^x \operatorname{tg} y dx = (1 - e^x) \operatorname{sech}^2 y dy.$$

$$2. xy y'' = \frac{1+x^2}{1-y^2}.$$

$$3. (2x - y)dx + (x + y)dy = 0.$$

$$4. x^2 y' = 2xy + 3, y(1) = -1.$$

$$5. y' - y \operatorname{tg} x + y^2 \cos x = 0.$$

23-вариант

$$1. y' + \sin(x+y) = \sin(x-y).$$

$$2. (xy - x)^2 dy + y(1-x)dx = 0.$$

$$3. 2x^3 y' = y(2x^2 - y^2).$$

$$4. y' + 2xy = xe^{-x^2}, y(0) = 0.$$

$$5. y' + \frac{2y}{x} = \frac{2\sqrt{y}}{\cos^2 x}.$$

24-вариант

$$1. \cos^3 y \cdot y' - \cos(2x+y) = \cos(2x-y).$$

$$2. (x^2 - y)' = x^2 y - y + x^2 - 1.$$

$$3. y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}.$$

$$4. y' - 3x^2 y - x^2 e^{x^3} = 0, y(0) = 0.$$

$$5. y' - y + y^2 \cos x = 0.$$

25-вариант

$$1. 3x^2 - a^2 = \frac{y'y}{x}.$$

$$2. \sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dy = 0.$$

3. $x^2 y' = y(x + y)$.
4. $xy' + y = \ln x + 1$, $y(1) = 0$.
5. $y' = x\sqrt{y} + \frac{xy}{x^2 - 1}$.

9-§. Иккинчи мустақил уй иши

Мустақил уй ишининг ҳар бир вариантида бешта мисол бўлиб, уларнинг шартни қуйидагича.

1-мисолда: берилган дифференциал тенгламанинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топиш ва ҳосил қилинган $y = \varphi(x)$ функциянинг $x = x_0$ даги қийматини 0,001 гача аниқлик билан ҳисоблаш керак.

2-мисолда: тартибини пасайтириш ёрдамида дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топиш керак.

3-мисолда: тартибини пасайтириш мумкин бўлган дифференциал тенгламанинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топиш керак.

4-мисолда: берилган дифференциал тенгламани интеграллаш керак.

5-мисол: шартни вариантда берилган.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамиз.

1. Ушбу

$$y''(x+2)^5 = 1$$

дифференциал тенгламанинг $y(-1) = \frac{1}{12}$, $y'(-1) = -\frac{1}{4}$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топиш ва топилган ечимнинг $x = -3$ даги қийматини 0,001 гача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. Берилган тенгламанинг умумий ечимини топамиз (5-§ даги I тур тенгламага қаранг):

$$y'' = \frac{1}{(x+2)^5}, \quad y' = \int \frac{dx}{(x+2)^5} = -\frac{1}{4(x+2)^4} + C_1,$$

$$y = \int \left(-\frac{1}{4(x+2)^4} + C_1 \right) dx = \frac{1}{12(x+2)^3} + C_1 x + C_2.$$

396

Бошланғич шартдан фойдаланиб, C_1 ва C_2 ларнинг қийматини аниқлаймиз:

$$y(-1) = \frac{1}{12} - C_1 + C_2 = \frac{1}{12}, \quad C_2 - C_1 = 0,$$

$$y'(-1) = -\frac{1}{4} + C_1 = -\frac{1}{4}, \quad C_1 = 0, \quad C_2 = 0.$$

Берилган тенгламанинг бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечими

$$y = \frac{1}{12(x+2)^3}$$

қўринишда бўлади. Энди $y(x)$ функциянинг $x = -3$ даги қийматини ҳисоблаймиз:

$$y(-3) = \frac{1}{12(-3+2)^3} = -\frac{1}{12} = -0,08.$$

2. Ушбу тартибини пасайтириш мумкин бўлган

$$y''(e^x + 1) + y' = 0$$

дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенглама II тур тенгламадан иборат (5-§ ва 2-мисолга қаранг). Шунинг учун $y' = z(x)$ алмаштиришни бажарамиз. У ҳолда $y'' = \frac{dz}{dx}$ ва

$$\frac{dz}{dx}(e^x + 1) + z = 0, \quad \frac{dz}{dx}(e^x + 1) = -z,$$

$$\frac{dz}{z} = -\frac{dx}{e^x + 1}, \quad \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dx}{e^x + 1}.$$

Ўнг қисмдаги интегралда $e^x + 1 = t$ алмаштириш ёрдамида қуйидагига эга бўламиз:

$$\ln|z| = \ln(e^x + 1) - \ln e^x + \ln C_1.$$

Охирги ифодани потенцирлаб

$$z = C_1 \frac{e^x + 1}{e^x}$$

ни топамиз. $z = y' = \frac{dy}{dx}$ ни эътиборга олиб, берилган тенгламанинг умумий ечимини топамиз:

$$\frac{dy}{dx} = C_1 \frac{e^x + 1}{e^x}, \quad y = C_1 \int \frac{e^x + 1}{e^x} dx = C_1(x - e^{-x}) + C_2.$$

397

3. Ушбу тартибини пасайтириш мумкин бўлган

$$y^3 y'' = -1$$

дифференциал тенгламанинг $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Е ч и ш . Берилган тенглама III турга тегишли (5-§ ва 4-мисолга қаранг). Шунинг учун тенгламанинг тартибини $y' = P(y)$ алмаштириш ёрдамида пасайтирамиз. У ҳолда $y'' = P \frac{dP}{dy}$.

$$y^3 P \frac{dP}{dy} = -1, \quad PdP = -\frac{dy}{y^3}.$$

$$\int PdP = -\int \frac{dy}{y^3}, \quad \frac{P^2}{2} = \frac{1}{2y^2} + C_1,$$

$$P^2 = \frac{1}{y^2} + 2C_1, \quad P = \pm \sqrt{\frac{1}{y^2} + 2C_1},$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{1+2C_1 y^2}}{y}, \quad dx = \pm \frac{y dy}{\sqrt{1+2C_1 y^2}},$$

$$x = \pm \int \frac{y dy}{\sqrt{1+2C_1 y^2}} + C_2 = \pm \frac{1}{4C_1} \int (1+2C_1 y^2)^{-\frac{1}{2}} d(1+2C_1 y^2),$$

$$x = \pm \frac{1}{2C_1} \sqrt{1+2C_1 y^2} + C_2,$$

яъни берилган тенгламанинг умумий ечимига эга бўлдик. Бошланғич шартлардан фойдаланиб, C_1 ва C_2 нинг қийматларини топамиз:

$$1 = \pm \frac{1}{2C_1} \sqrt{1+2C_1} + C_2,$$

$$0 = \pm \sqrt{1+2C_1} + C_2,$$

булардан $1+2C_1 = 0$, $C_1 = -\frac{1}{2}$, $C_2 = 1$.

Демак, изланаётган ечим

$$x = \pm \sqrt{1-y^2} + 1$$

қўринишда бўлади. Бу ечим $(x-1)^2 + y^2 = 1$ айлананинг ярмини (чап ёки унг қисмини) ифодалайди.

4. Ушбу

$$\left(\frac{1}{x} - y^3 + 4\right) dx + \left(-\frac{1}{y} - 3xy^2\right) dy = 0$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш . Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$P(x, y) = \frac{1}{x} - y^3 + 4, \quad Q(x, y) = -\frac{1}{y} - 3xy^2$$

((7.22) тенгламага қаранг). У ҳолда

$$\frac{dP}{dy} = -3y^2, \quad \frac{dQ}{dx} = -3y^2.$$

$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx}$ бўлгани учун берилган тенглама тўлиқ дифференциалли тенглама бўлади. Унинг умумий интегралли (7.24) формула ёрдамида топилади:

$$\int_{x_0}^x \left(\frac{1}{x} - y^3 + 4\right) dx + \int_{y_0}^y \left(-\frac{1}{y} - 3x_0 y^2\right) dy = C_0,$$

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{x} - \int_{x_0}^x y^3 dx + 4 \int_{x_0}^x dx - \int_{y_0}^y \frac{dy}{y} - 3x_0 \int_{y_0}^y y^2 dy = C_0,$$

$$\ln|x| - y^3 x + 4x - \ln|y| - 3x_0 \frac{y^3}{3} \Big|_{y_0}^y = C_0,$$

$$\ln|x| - \ln|x_0| - xy^3 + x_0 y_0^3 + 4x - 4x_0 -$$

$$- \ln|y| + \ln|y_0| - x_0 y^3 + x_0 y_0^3 = C_0,$$

$$\ln \left| \frac{x}{y} \right| - xy^3 + 4x = C,$$

бунда $C = C_0 + \ln \left| \frac{x_0}{y_0} \right| + 4x_0 - x_0 - x_0 y_0^3$.

5. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтаси $M(x; y)$ дан ўтказилган уринма, координата ўқлари ва уриниш нуқта-сининг ординатаси билан чегараланган трапецияларнинг

юзи ўзгармас миқдор 3 га тенглиги маълум бўлса (69-чизма), $A(2;2)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгласини ёзинг.

Е ч и ш . Трапециянинг юзи:

$$S_{DMCO} = \frac{|MC| + |DO|}{2} \cdot |OC|.$$

$$|MC| = y, |DO| = \pm |DB| + |BO| = \pm |DB| \cdot |MC| = \pm |DB| + y.$$

$$|OC| = x, \pm |DB| = -|BM| \operatorname{tg} \alpha = -|BM| y' = -xy',$$

бунда, агар $y' = \operatorname{tg} \alpha < 0$ бўлса, $|DB|$ нинг олдидаги ишора «+», агар $y' = \operatorname{tg} \alpha > 0$ бўлса, «-» ишора олинади (69-чизма). Шунинг учун иккала ҳолда ҳам $|DO| = -xy' + y$. Бу қийматларни ўрнига қўйиб, соддалаштирамиз;

$$S_{DMCO} = \frac{y - xy' + y}{2} \cdot x = 3, -\frac{1}{2} x^2 y' + xy = 3,$$

$$-x^2 y' + 2xy = 6, y' - \frac{2}{x} y = -\frac{6}{x^2}, (x \neq 0).$$

Натижада биринчи тартибли чизиқли тенгламани ҳосил қилдик. Уни ечамиз:

$$y = uv, y' = u'v + uv', u'v + uv' - \frac{2uv}{x} = -\frac{6}{x^2},$$

$$u'v + u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{2v}{x} \right) = -\frac{6}{x^2}, \quad (1)$$

$$\frac{dv}{dx} - \frac{2v}{x} = 0, \frac{dv}{v} = \frac{2dx}{x},$$


$$\int \frac{dv}{v} = 2 \int \frac{dx}{x}, \ln |v| = 2 \ln |x|, v = x^2.$$

(1) тенгламага $v = x^2$ ни қўйиб u ни топамиз:

$$u'x^2 = -\frac{6}{x^2}, u' = -\frac{6}{x^4}, u = -6 \int \frac{dx}{x^4} = \frac{2}{x^3} + C.$$

У ҳолда (1) тенгламанинг умумий ечими

$$y = uv = \left(\frac{2}{x^3} + C \right) x^2 = \frac{2}{x} + Cx^2.$$



69-чизма.

функциядан иборат бўлади. Масала шартдаги эгри чизиқнинг $A(2;2)$ нуқтадан ўтиш шартдан фойдаланиб, C нинг қийматини топамиз:

$$2 = \frac{2}{2} + C \cdot 2^2, C = \frac{1}{4}.$$

Изланаётган эгри чизиқ тенгласи

$$y = \frac{2}{x} + \frac{x^2}{4}, (0 < x \leq x_0 = \sqrt[3]{16})$$

қўринишда бўлади. У 69-чизмада тасвирланган бўлиб, $x_1 = \sqrt[3]{4}$ да минимум нуқтасига эга бўлади.

1-вариант

$$1. y'' = \frac{1}{1+x^2}, y(0) = 0, y'(0) = 0, x_0 = 1.$$

$$2. xy'' - y' = x^2 e^x.$$

$$3. 2yy'' = y'^2, y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

$$4. \frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2} dx + \frac{e^y}{1+x^2} dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффиценти шу нуқта ординатасининг учлантирилганига тенглиги маълум бўлса, $A(0;2)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

2-вариант

1. $xy''' = 2$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y'(1) = y''(1) = 0$, $x_0 = 2$.

2. $y'' x \ln x = 2y'$.

3. $yy'' - y'^2 = y^4$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

4. $\frac{2x}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0$.

5. Эгри чизиқ $(2; \frac{1}{2})$ нуқта орқали ўтади. Бу эгри чизиқнинг ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасидан уринма ўтказилган бўлиб, унинг Ox ўқ билан кесишиш нуқтасининг абсциссаси уриниш нуқтасининг абсциссасидан икки марта катта. Эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

3-вариант

1. $y''' = e^{2x}$, $y(0) = \frac{9}{8}$, $y'(0) = \frac{1}{4}$, $y''(0) = -\frac{1}{2}$, $x_0 = \frac{1}{2}$.

2. $x^2 y'' + xy' = 1$.

3. $y'' = -\frac{1}{2y^3}$, $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.

4. $\left(1 - e^{\frac{x}{y}}\right) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффиценти уриниш нуқтаси радиус-векторининг бурчак коэффиценти квадратига тенглиги маълум бўлса, $A(2;1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

4-вариант

1. $y''' = \cos^2 x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -\frac{1}{8}$, $y''(0) = 0$, $x = \pi$.

2. $y'' x \ln x = y'$.

3. $y'' = 1 - y'^2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

4. $x(2x^2 + y^2)dx + y(x^2 + 2y^2)dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасининг абсциссасига тенглиги маълум бўлса, $A(1;0)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

5-вариант

1. $y'' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$, $x_0 = 1$.

2. $xy'' = y'$.

3. $y''^2 = y'$, $y(0) = \frac{2}{3}$, $y'(0) = 1$.

4. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right) dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффиценти шу нуқта ординатасидан етти марта катта эканлиги маълум бўлса, $A(0;5)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

6-вариант

1. $y'' = \frac{1}{\sin^2 2x}$, $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, $x_0 = \frac{5}{4}\pi$.

2. $y'' = y' + x$.

3. $2yy'' - y'^2 = 1$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.

4. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right) dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x,y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасидан координаталар бошигача бўлган масофага тенглиги маълум бўлса, $A(0;1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

7-вариант

1. $y'' = x + \sin x$, $y(0) = -3$, $y'(0) = 0$.

2. $xy'' = y' + x^2$.

3. $y'' = 2 - y$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.

4. $\left(3x^2 \operatorname{tg} y - \frac{2y^3}{x^2}\right) dx + \left(x^3 \sec^2 y + 4y^3 + \frac{3y^2}{x^2}\right) dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси абсциссасининг квадратиға тенглиги маълум бўлса, $A(1; -1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

8-вариант

1. $y'' = \operatorname{arctg} x$, $y(0) = y'(0) = 0$.

2. $xy'' = y' \ln \left(\frac{y'}{x}\right)$.

3. $y'' = \frac{1}{y^3}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

4. $\left(2x + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y}\right) dx = \frac{x^2 + y^2}{xy^2} dy$.

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини уриниш нуқтаси радиус-векторининг бурчак коэффициентидан уч марта катталиги маълум бўлса, $A(-8; -2)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

9-вариант

1. $y'' = \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$, $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = 0$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

2. $xy'' + y' = \ln x$.

3. $yy'' - 2y'^2 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

4. $\left(\frac{\sin 2x}{y} + x\right) dx + \left(y - \frac{\sin^2 x}{y^2}\right) dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси шу нуқтадан координаталар бошигача бўлган масофаға тенглиги маълум бўлса, $A(0; -8)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

10-вариант

1. $y''' = e^{\frac{x}{2}} + 1$, $y(0) = 8$, $y'(0) = 5$, $y''(0) = 2$, $x_0 = 2$.

2. $y'' \operatorname{tg} x = y' + 1$.

3. $y'' = y' + y'^2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

4. $(3x^2 - 2x - y)dx + (2y - x + 3y^2)dy = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини шу нуқта ординатасининг иккиланганиға тенглиги маълум бўлса, $A(-1; 3)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

11-вариант

1. $y'' = \frac{x}{e^{2x}}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -\frac{1}{4}$, $x_0 = -\frac{1}{2}$.

2. $y'' + 2xy'^2 = 0$.

3. $y'' + \frac{2}{1-y} y'^2 = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

4. $\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{xdy - ydx}{x^2} = 0$.

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг уриниш нуқтасига координаталар бошидан туширилган перпендикулярнинг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасига тенглиги маълум бўлса, $A(2; 3)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

12-вариант

1. $y'' = \sin^2 3x$, $y(0) = -\frac{\pi^2}{16}$, $y'(0) = 0$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$.

2. $2xy' y'' = y'^2 + 1$.

$$3. y''(1+y) = 5y'^2, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

$$4. (3x^2y + y^3)dx + (x^3 + 3xy^2)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасининг координаталари йиғиндисининг ярмига тенглиги маълум бўлса, $A(4; 10)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

13-вариант

$$1. y''' = x \sin x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$2. y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1).$$

$$3. y''(2y+3) - 2y'^2 = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3.$$

$$4. y(x^2 + y^2 + a^2)dx + x(x^2 + y^2 - a^2)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси абсциссасининг квадратига тенглиги маълум бўлса, $A(-2; 5)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

14-вариант

$$1. y'''\sin^4 x = \sin 2x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad x_0 = \frac{5\pi}{2}.$$

$$2. y''' + y'' \operatorname{tg} x = \sec x.$$

$$3. 4y''^2 = 1 + y'^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$4. \left(\sin y + y \sin x + \frac{1}{x}\right)dx + \left(x \cos y - \cos x + \frac{1}{y}\right)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг Ox ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасининг абсциссасидан уч марта катта эканлиги маълум бўлса, $A(1; 1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

15-вариант

$$1. y'' = \cos x + e^{-x}, \quad y(0) = -e^{-\pi}, \quad y'(0) = 1, \quad x_0 = \pi.$$

$$2. y'' - 2y' \operatorname{ctg} x = \sin^3 x.$$

$$3. 2y'^2 = (y-1)y'', \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2.$$

$$4. (2x - y + 1)dx + (2y - x - 1)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти шу нуқта ординатасидан олти марта катта эканлиги маълум бўлса, $A(-2; 4)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

16-вариант

$$1. y'' = \sin^3 x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{7}{9}, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad x_0 = 2, 5\pi.$$

$$2. y'' + 4y' = 2x^2.$$

$$3. 1 + y'^2 = yy', \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$4. (3x^2 - y \cos xy + y)dx + (x - x \cos xy)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти уриниш нуқтаси радиус-векторининг бурчак коэффициентида тўққиз марта катталиги маълум бўлса, $A(-6; 4)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

17-вариант

$$1. y''' = \sqrt{x} - \sin 2x, \quad y(0) = -\frac{1}{8}, \quad y'(0) = \frac{1}{8} \cos 2, \quad y''(0) = \frac{1}{2}, \quad x_0 = 1.$$

$$2. xy'' - y' = 2x^2 e^x.$$

$$3. y'' + yy'^3 = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

$$4. \left(12x^3 - e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y}\right)dx + \left(16y + \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}\right)dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг уриниш нуқтасига координаталар бошидан туширилган перпендикулярнинг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасига тенглиги маълум бўлса, $A(4; -3)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

18-вариант

$$1. y'' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}}, y(0) = 0, y'(0) = 1, x_0 = 4\pi.$$

$$2. x(y'' + 1) + y' = 0.$$

$$3. y y'' - y'^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

$$4. \left(\frac{y}{2\sqrt{xy}} + 2xy \sin x^2 y + 4 \right) dx + \left(\frac{x}{2\sqrt{xy}} + x^2 \sin x^2 y \right) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси координаталари йиғиндисининг ярмига тенглиги маълум бўлса, $A(9; -4)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

19-вариант

$$1. y'' = 2 \sin x \cos^2 x, y(0) = -\frac{5}{9}, y'(0) = -\frac{2}{3}, x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$2. y'' + 4y' = \cos 2x.$$

$$3. y y'' - y'^2 = y^2 \ln y, y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

$$4. y \cdot 3^y \ln 3 dx + (x \cdot 3^y \ln 3 - 3) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси абсциссасининг квадратига тенглиги маълум бўлса, $A(3; -2)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

20-вариант

$$1. y'' = 2 \sin^2 x \cdot \cos x, y(0) = \frac{1}{9}, y'(0) = 1, x_0 = \pi.$$

$$2. y'' + y' = \sin x.$$

$$3. y(1 - \ln y) y'' + (1 + \ln y) y'^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

$$4. \left(\frac{1}{x-y} + 3x^2 y^7 \right) dx + \left(7x^3 y^6 - \frac{1}{x-y} \right) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти шу нуқта ординатасидан беш марта катта эканлиги маълум бўлса, $A(-2; 1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

21-вариант

$$1. y'' = 2 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x, y(0) = 0, y'(0) = 1, x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$2. x^2 y'' = y'^2.$$

$$3. y''(1 + y) = y'^2 + y', y(0) = 2, y'(0) = 2.$$

$$4. \left(\frac{2y}{x^2} + y \cos xy \right) dx + \left(\frac{1}{x^2} + x \cos xy \right) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси координаталари йиғиндисининг тўртдан бирига тенглиги маълум бўлса, $A(16; 0)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

22-вариант

$$1. y'' = 2 \cos x \sin^2 x - \cos^3 x, y(0) = \frac{2}{3}, y'(0) = 2, x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$2. 2xy'' y' = y'^2 - 4.$$

$$3. y'' = \frac{y'}{y}, y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

$$4. \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2 y^2}} - 2x \right) dx + \frac{xdy}{\sqrt{1-x^2 y^2}} = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтаси координаталари йиғиндисининг ярмига тенглиги маълум бўлса, $A(1; -7)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

23-вариант

$$1. y'' = x - \ln x, y(1) = -\frac{5}{12}, y'(1) = \frac{3}{2}, x_0 = 2.$$

$$2. y''' x \ln x = y''.$$

$$3. y y'' + y'^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

$$4. (5x^4 y^4 + 28x^6) dx + (4x^5 y^3 - 3y^2) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг уриниш нуқтасига координаталар бошидан туширилган перпендикулярнинг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасига тенглиги маълум бўлса, $A(-4; 1)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

24-вариант

$$1. y'' = \frac{1}{x^2}, y(1) = 3, y'(1) = 1, x_0 = 2.$$

$$2. y'' \operatorname{ctg} x + y' = 2.$$

$$3. y'' = \frac{1}{\sqrt{y}}, y(0) = y'(0) = 0.$$

$$4. (2xe^{x^2+y^2} + 2) dx + (2ye^{x^2+y^2} - 3) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг ординаталар ўқидан ажратган кесмаси уриниш нуқтасининг абсциссаси квадратига тенглиги маълум бўлса, $A(2; 8)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

25-вариант

$$1. y''' = \cos 4x, y(0) = 2, y'(0) = \frac{15}{16}, x_0 = \pi.$$

$$2. (1 + x^2)y'' = 2xy.$$

$$3. y y'' - 2y y' \ln y = y'^2, y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

$$4. (3y^3 \cos 3x + 7) dx + (3y^2 \sin 3x - 2y) dy = 0.$$

5. Агар ихтиёрий $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти шу нуқта ординатасидан тўрт марта катта эканлиги маълум бўлса, $A(3; -2)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

10-§. Учинчи мустақил уй иши

Бу мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда бешта мисол бўлиб, уларнинг шarti қуйидагича.

1-мисолда: ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлган дифференциал тенгламаларнинг умумий ечимини топиш керак.

2- ва 3-мисолларда: ўзгармас коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламаларнинг умумий ечимини топиш керак.

4-мисолда: дифференциал тенгламанинг берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топиш керак.

5-мисолда: $f(x)$ функциянинг кўринишига қараб берилган чизиқли бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламанинг хусусий ечими y^* нинг кўринишини ёзинг.

Қуйида вариант мисолларини ечиш намунасини келтирамыз.

1. Ушбу

$$a) 4y'' - 11y' + 6y = 0;$$

$$б) 4y'' - 4y' + y = 0;$$

$$в) y'' - 2y' + 37y = 0$$

дифференциал тенгламаларнинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Ҳар бир дифференциал тенглама учун характеристик тенглама тузамиз ва уни ечамиз. Ҳосил қилинган характеристик тенгламанинг илдизларининг кўринишига қараб (7.47 формула ва 6-§ даги 5-мисолга қаранг) дифференциал тенгламанинг умумий ечимини ёзамиз.

а) $4\lambda^2 - 11\lambda + 6 = 0$, илдизлари $\lambda_1 = \frac{3}{4}$, $\lambda_2 = 2$ ҳақиқий ва ҳар хил, шунинг учун тенгламанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = C_1 e^{\frac{3}{4}x} + C_2 e^{2x};$$

б) $4\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$, илдизлари $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ ҳақиқий ва бир-бирига тенг, демак тенгламанинг умумий ечими:

$$y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}} (C_1 + C_2 x);$$

в) $\lambda^2 - 2\lambda + 37 = 0$, илдизлари $\lambda_{1,2} = 1 \pm 6i$ — қўшма комплекс сон, шунинг учун тенгламанинг умумий ечими:

$$y = e^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x).$$

2. Ушбу

$$y'' - 3y' - 4y = 6xe^{-x}$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Бир жинсли тенгламанинг характеристик тенгламасини тузамиз:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0,$$

унинг илдизлари $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$. Демак, бир жинсли тенгламанинг умумий ечими

$$\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$$

формула билан аниқланади.

Берилган тенгламанинг ўнг томонида турган $f(x) = 6xe^{-x}$ функциянинг кўринишига қараб ((7.49) формулага қаранг) унинг хусусий ечимини ёзамиз:

$$y^* = (Ax + B)e^{-x} \cdot x = (Ax^2 + Bx)e^{-x}.$$

Бунда $(Ax^2 + B)e^{-x}$ ифодани $z = a + ib = -1$ характеристик тенгламанинг илдизи бўлгани учун x га кўпайтирилди. Энди A ва B номаълум коэффициентларни аниқлаймиз. Унинг учун:

$$y^{*'} = (2Ax + B)e^{-x} - (Ax^2 + Bx)e^{-x},$$

$$y^{*''} = 2Ae^{-x} + (Ax^2 + Bx)e^{-x} - 2(2Ax + B)e^{-x}.$$

y^* , $y^{*'}$, $y^{*''}$ ларнинг аниқланган ифодаларини берилган тенгламага қўямиз ва иккала қисмини e^{-x} га бўламиз. Сўнгра x^2 , x ва x^0 олдидаги коэффициентларни тенглаймиз. Натижада A ва B ларни аниқлаш мумкин бўлган системага эга бўламиз:

$$\begin{aligned} 2A + Ax^2 + Bx - 4Ax - 2B - 6Ax - \\ - 3B + 3Ax^2 + 3Bx - 4Ax^2 - 4Bx = 6x, \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x^2 & A + 3A - 4A = 0, \\ x & B - 4A - 6A + 3B - 4B = 6, \\ x^0 & 2A - 2B - 3B = 0, \end{cases}$$

$$\text{бундан } A = -\frac{3}{5}, B = -\frac{6}{25}.$$

У ҳолда $y^* = -\left(\frac{3}{5}x^2 + \frac{6}{25}x\right)e^{-x}$ бўлади ва берилган бир жинсли бўлмаган тенгламанинг умумий ечими қуйидагича бўлади:

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x} - \left(\frac{3}{5}x^2 + \frac{6}{25}x\right)e^{-x}.$$

3. Ушбу

$$y'' + y' = 5x + \cos 2x$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Бир жинсли тенгламанинг характеристик тенгламасини тузамиз:

$$\lambda^2 + \lambda = 0,$$

унинг илдизлари $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$. Демак, унинг умумий ечими

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-x}$$

кўринишда бўлади.

Тенгламанинг ўнг қисмидаги $f(x) = 5x + \cos 2x$ функция $f_1(x) = 5x$ ва $f_2(x) = \cos 2x$ функцияларнинг йиғиндисидан иборат. Унга мос иккита хусусий ечим мавжуд бўлиб, улар қуйидаги кўринишда изланади:

$$y_1^* = Ax^2 + Bx,$$

$$y_2^* = A_1 \cos 2x + B_1 \sin 2x,$$

яъни $y^* = y_1^* + y_2^*$. Унинг ҳосилаларини топамиз:

$$y_1^{*'} = 2Ax + B - 2A_1 \sin 2x + 2B_1 \cos 2x,$$

$$y_1^{*''} = 2A - 4A_1 \sin 2x - 4B_1 \cos 2x.$$

y'' ва y'''' ифодаларни берилган тенгламага қўямиз ва A, B, A_1, B_1 коэффициентларни аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} 2A - 4A_1 \cos 2x - 4B_1 \sin 2x + 2Ax + B - \\ - 2A_1 \sin 2x + 2B_1 \cos 2x = 5x + \cos 2x, \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2A = 5, & \cos 2x \{-4A_1 + 2B_1 = 1, & 10B_1 = 1, \\ 2A + B = 0, & \sin 2x \{-2A_1 - 4B_1 = 0 & A_1 = -2B_1 \} \end{cases}$$

$$\text{бундан } A = \frac{5}{2}, B = -5, A_1 = -\frac{1}{5}, B_1 = -\frac{1}{10}.$$

Шундай қилиб, берилган тенгламанинг хусусий ечими:

$$y^* = \frac{5}{2}x^2 - 5x - \frac{1}{5}\cos 2x + \frac{1}{10}\sin 2x,$$

унинг умумий ечими эса

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{5}{2}x^2 - 5x - \frac{1}{5}\cos 2x + \frac{1}{10}\sin 2x$$

қўринишда бўлади.

4. Ушбу

$$y'' + 16y = (34x + 13)e^{-x}$$

дифференциал тенгламанинг $y(0) = -1, y'(0) = 5$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Бир жинсли тенгламанинг $\lambda^2 + 16 = 0$ характеристик тенгламаси $\lambda_{1,2} = \pm 4i$ мавҳум илдизга эга. Унга мос бир жинсли дифференциал тенгламанинг умумий ечими

$$\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$$

формула билан аниқланади, унинг хусусий ечими

$$y^* = (Ax + B)e^{-x}$$

қўринишда бўлади. y'' ва y'''' ларни топамиз:

$$y'' = Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x},$$

$$y'''' = -2Ae^{-x} + (Ax + B)e^{-x}.$$

Берилган тенгламага y'' ва y'''' ифодаларни қўйиб қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$-2A + Ax + B + 16Ax + 16B = 34x + 13,$$

бундан $A = 2, B = 1$. У ҳолда

$$y^* = (2x + 1)e^{-x}$$

бўлади ва берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + (2x + 1)e^{-x}$$

қўринишда бўлади. C_1 ва C_2 нинг қийматларини топиш учун $y(0) = -1, y'(0) = 5$ бошланғич шартлардан фойдаланиб қуйидаги системани тузамиз:

$$\begin{cases} y(0) = -1 = C_1 + 1, \\ y'(0) = 5 = 4C_2 + 2 - 1, \end{cases}$$

бу ердан $C_1 = -2, C_2 = 1$. Умумий ечимга C_1 ва C_2 ларнинг қийматини қўйиб, берилган тенгламанинг хусусий ечимини топамиз:

$$y = \sin 4x - 2 \cos 4x + (2x + 1)e^{-x}.$$

5. Агар а) $f(x) = (5 - x)e^{3x}$; б) $f(x) = x \sin 2x$ бўлса, $y'' - 9y = f(x)$ чизиқли бир жинсли бўлмаган дифференциал тенгламанинг хусусий ечими y^* ни аниқланг ва қўринишини ёзинг.

Ечиш. Характеристик тенгламанинг илдизларини топамиз:

$$\lambda^2 - 9 = 0, \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 3.$$

а) $f(x) = (5 - x)e^{3x}$ бўлгани учун хусусий ечим

$$y^* = (Ax + B)e^{3x} \cdot x = (Ax^2 + Bx)e^{3x}$$

қўринишда бўлади. Бунда $z = a + ib = 3$ ва $k = 1$ бўлгани учун x га қўпайтирилди.

б) $f(x) = \sin 2x$ бўлгани учун

$$y^* = (A_1 x + B_1) \cos 2x + (A_2 x + B_2) \sin 2x$$

қўринишда бўлади.

1-вариант

1. а) $y'' - 4y = 0$; б) $y'' + 2y' + 17y = 0$; в) $y'' - y' - 12y = 0$.
2. $y'' - 6y' + 10y = 51e^x$.
3. $y'' - 2y' = (4x + 4)e^{2x}$.
4. $y'' + 6y = (\cos 4x - 8\sin 4x)e^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 5$.
5. $3y'' - 10y' + 3y = f(x)$; а) $f(x) = e^{3x}$; б) $f(x) = 2\cos 3x - \sin 3x$.

2-вариант

1. а) $y'' + y' - 6y = 0$; б) $y'' + 9y' = 0$; в) $y'' - 4y' + 20y = 0$.
2. $y'' + y = 2\cos x - (4x + 4)\sin x$.
3. $y'' + 2y' + y = 4x^3 + 24x^2 + 22x - 4$.
4. $y'' - 4y' + 20y = 16xe^{2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' - 3y' + 2y = f(x)$; а) $f(x) = x + 2e^x$; б) $f(x) = 3\cos 4x$.

3-вариант

1. а) $y'' - 49y = 0$; б) $y'' - 4y' + 5y = 0$; в) $y'' + 2y - 3y = 0$.
2. $y'' + 6y' + 10y = 74e^{3x}$.
3. $y'' - 4y' = 8 - 16x$.
4. $y'' - 12y' + 36y = 32\cos 2x + 24\sin 2x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 4$.
5. $y'' - 4y' + 4y = f(x)$; а) $f(x) = \sin 2x + 2e^x$; б) $f(x) = x^2 - 4$.

4-вариант

1. а) $y'' + 7y' = 0$; б) $y'' - 5y' + 4y = 0$; в) $y'' + 16y = 0$.
2. $y'' - 3y' + 2y = 3\cos x + 19\sin x$.
3. $y'' - 2y' + y = 4e^x$.
4. $y'' + y = x^3 - 4x^2 + 7x - 10$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$.
5. $y'' - y' + y = f(x)$; а) $f(x) = e^x \cos x$; б) $f(x) = 7x + 2$.

5-вариант

1. а) $y'' - 6y' + 8y = 0$; б) $y'' + 4y' + 5y = 0$; в) $y'' + 5y' = 0$.
2. $y'' + 6y' + 9y = (48x + 8)e^x$.
3. $y'' - 8y' + 20y = 16(\sin 2x - \cos 2x)$.
4. $y'' - y = (14 - 16x)e^{-x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$.
5. $y'' - 3y' = f(x)$; а) $f(x) = 2x^2 - 5x$; б) $f(x) = e^{2x} \sin 2x$.

6-вариант

1. а) $4y'' - 8y' + 3y = 0$; б) $y'' - 3y' = 0$; в) $y'' - 2y' + 10y = 0$.
2. $y'' + 5y' = 72e^{2x}$.
3. $y'' - 6y' + 13y = 34e^{-3x} \sin 2x$.
4. $y'' + 8y' + 16y = 16x^2 - 16x + 66$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 3y - 4y = f(x)$; а) $f(x) = 3xe^{-4x}$; б) $f(x) = x \sin x$.

7-вариант

1. а) $y'' + 4y' + 20 = 0$; б) $y'' - 3y' - 10y = 0$; в) $y'' - 16y = 0$.
2. $y'' - 5y' - 6y = 3\cos x + 19\sin x$.
3. $y'' + 2y' - 3y = (12x^2 + 6x - 4)e^x$.
4. $y'' + 10y' + 34y = -9e^{-5x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 6$.
5. $y'' + 36y = f(x)$; а) $f(x) = 4xe^{-x}$; б) $f(x) = 2\sin 6x$.

8-вариант

1. а) $9y'' + 6y' + y = 0$; б) $y'' - 4y' - 21y = 0$; в) $y'' + y = 0$.
2. $y'' - 8y' + 12y = 36x^4 - 96x^3 + 24x^2 + 16x - 2$.
3. $y'' + 4y' + 4y = 6e^{-2x}$.
4. $y'' - 6y' + 25y = (32x - 12)\sin x - 36x \cos 3x$.
5. $y'' - 6y' + 9y = f(x)$; а) $f(x) = (x - 2)e^{3x}$; б) $f(x) = 4\cos x$.

9-вариант

1. а) $2y'' + 3y' + y = 0$; б) $y'' + 4y' + 8y = 0$; в) $y'' - 6y' + 9y = 0$.
2. $y'' + 8y' + 25y = 18e^{5x}$.
3. $y'' + 3y' = 10 - 6x$.
4. $y'' + 25y = e^x(\cos 5x - 10\sin 5x)$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -4$.
5. $4y'' - 5y' + y = f(x)$; а) $f(x) = (4x + 2)e^x$; б) $f(x) = e^x \sin 3x$.

10-вариант

1. а) $y'' - 10y' + 21y = 0$; б) $y'' - 2y' + 2y = 0$; в) $y'' + 4y' = 0$.
2. $y'' - 9y' + 20y = 126e^{-2x}$.
3. $y'' + 10y' + 25y = 40 + 52x - 240x^2 - 200x^3$.
4. $y'' + 2y' + 5y = -8e^{2x} \sin 2x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 6$.
5. $4y'' + 7y' - 2y = f(x)$; а) $f(x) = 3e^{2x}$; б) $f(x) = (x - 1)\cos 2x$.

11-вариант

1. а) $y'' + 6y' = 0$; б) $y'' + 10y' + 29y = 0$; в) $y'' - 8y' + 7y = 0$.
2. $y'' + 36y' = 63 + 66x - 36x^3$.
3. $y'' + 4y' + 20y = 4\cos 4x - 52\sin 4x$.
4. $y'' - 10y' + 25y = e^{5x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - y' - 6y = f(x)$; а) $f(x) = 2e^{3x}$; б) $f(x) = 9\cos x - \sin x$.

12-вариант

1. а) $y'' + 25y = 0$; б) $y'' + 6y' + 9y = 0$; в) $y'' + 2y' + 2y = 0$.
2. $y'' + y' = -4\cos x - 2\sin x$.
3. $y'' + 4y' + 5y = 5x^2 - 32x + 5$.
4. $y'' + y' - 12y = (16x + 22)e^{4x}$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 5$.
5. $y'' - 16y = f(x)$; а) $f(x) = -3e^{4x}$; б) $f(x) = \cos x - 4\sin x$.

13-вариант

1. а) $y'' - 3y' = 0$; б) $y'' - 7y' - 8y = 0$; в) $y'' + 4y' + 13y = 0$.
2. $y'' + 2y' - 24y = 6\cos 3x - 33\sin 3x$.
3. $y'' + 2y' + y = (12x - 10)e^{-x}$.
4. $y'' - 2y' + 5y = 5x^2 + 6x - 12$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' - y' = f(x)$; а) $f(x) = (x - 2)e^{4x}$; б) $f(x) = 3\cos 4x$.

14-вариант

1. а) $y'' - 3y' - 4y = 0$; б) $y'' + 6y' + 13y = 0$; в) $y'' + 2y' = 0$.
2. $y'' + 6y' + 13y = -75\sin 2x$.
3. $y'' - 4y = (-24x - 10)e^{2x}$.
4. $y'' + 8y' + 16y = 16x^3 + 24x^2 - 10x + 8$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.
5. $y'' - 2y' + 2y = f(x)$; а) $f(x) = (2x - 3)e^{4x}$; б) $f(x) = e^{4x}\sin x$.

15-вариант

1. а) $2y'' + 25y' = 0$; б) $y'' - 10y' + 16y = 0$; в) $y'' - 8y' + 16y = 0$.
2. $y'' + 5y' = 39\cos 3x - 105\sin 3x$.
3. $y'' + 6y' + 9y = 72e^{3x}$.
4. $y'' - 2y' + 37y = 36e^{4x}\cos 6x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 6$.
5. $5y'' - 6y' + y = f(x)$; а) $f(x) = x^2e^x$; б) $f(x) = \cos x - \sin x$.

16-вариант

1. а) $y'' - 3y' - 18y = 0$; б) $y'' - 6y' = 0$; в) $y'' + 2y' + 5y = 0$.
2. $y'' - 4y' + 29y = 104\sin 5x$.
3. $y'' + 16y = 80e^{2x}$.
4. $y'' - 8y' = 16 + 48x^2 - 128x^3$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 14$.
5. $5y'' + 9y' - 2y = f(x)$; а) $f(x) = x^3 - 2x$; б) $f(x) = 2\sin 2x - 3\cos 2x$.

17-вариант

1. а) $y'' - 6y' + 13y = 0$; б) $y'' - 2y' - 15y = 0$; в) $y'' - 8y' = 0$.
2. $y'' - 4y' + 5y = (24\sin x + 8\cos x)e^{2x}$.
3. $y'' + 4y' = 15e^x$.
4. $y'' + 12y' + 36y = 72x^3 - 18$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - 2y' - 15y = f(x)$; а) $f(x) = 4xe^{3x}$; б) $f(x) = x\sin 5x$.

18-вариант

1. а) $y'' + 2y' + y = 0$; б) $y'' + 6y' + 25y = 0$; в) $y'' - 4y' = 0$.
2. $y'' + 16y' = 8\cos 4x$.
3. $y'' + 2y' + y = (18x + 8)e^x$.
4. $y'' + 3y' = (40x + 58)e^{2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' - 3y' = f(x)$; а) $f(x) = 2x^3 - 4x$; б) $f(x) = 2e^{3x}\cos x$.

19-вариант

1. а) $y'' + 10y' = 0$; б) $y'' - 6y' + 8y = 0$; в) $4y'' + 4y' + y = 0$.
2. $y'' + 9y = 9x^4 + 12x^2 - 17$.
3. $y'' - 14y' + 49y = 144\sin 7x$.
4. $y'' - 9y' + 18y = 26\cos x - 8\sin x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' - 7y' + 12y = f(x)$; а) $f(x) = xe^{3x} + 2e^x$; б) $f(x) = 3x\sin 2x$.

20-вариант

1. а) $y'' + 5y = 0$; б) $9y'' - 6y' + y = 0$; в) $y'' + 6y' + 8y = 0$.
2. $y'' - 12y' + 40y = 2e^{6x}$.
3. $y'' + y' - 2y = 9\cos x - 7\sin x$.
4. $y'' + 8y' = 18x + 60x^2 - 32x^3$, $y(0) = 5$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' + 9y' = f(x)$; а) $f(x) = x^2 + 4x - 3$; б) $f(x) = xe^{2x}\sin x$.

21-вариант

1. а) $y'' + 6y' + 10y = 0$; б) $y'' - 4y' + 4y = 0$; в) $y'' - 5y' + 4y = 0$.
2. $y'' + 4y' = e^{2x}(24\cos 2x + 2\sin 2x)$.
3. $y'' + 9y = 10e^{3x}$.
4. $y'' - 3y' + 2y = -\sin x - 7\cos x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 7$.
5. $y'' - 4y' + 5y = f(x)$; а) $f(x) = -2xe^{-x}$; б) $f(x) = x\cos 2x - \sin 2x$.

22-вариант

1. а) $y'' - y = 0$; б) $4y'' + 8y' - 5y = 0$; в) $y'' - 6y' + 10y = 0$.
2. $y'' + 2y' + y = 6e^{-x}$.
3. $4y'' - 4y' + y = -25\cos x$.
4. $y'' + 2y' = 6x^2 + 2x + 1$.
5. $y'' + 3y' + 2y = f(x)$; а) $f(x) = (3x - 7)e^{-x}$; б) $f(x) = \cos x - 3\sin x$.

23-вариант

1. а) $y'' + 8y' + 25y = 0$; б) $y'' + 9y' = 0$; в) $9y'' + 3y' - 2y = 0$.
2. $y'' + 2y' + 37y = 37x^2 - 33x + 74$.
3. $3y'' - 5y' - 2y = 6\cos 2x + 38\sin 2x$.
4. $y'' + 16y = 32e^{4x}$.
5. $y'' - 8y' + 16y = f(x)$; а) $f(x) = 2xe^{4x}$; б) $f(x) = \cos 4x + 2\sin 4x$.

24-вариант

1. а) $6y'' + 7y' - 3y = 0$; б) $y'' + 16y = 0$; в) $4y'' - 4y' + y = 0$.
2. $6y'' - y' - y = 3e^{2x}$.
3. $y'' + 4y' + 29y = 26e^{-x}$.
4. $y'' + 5y' + 6y = 52\sin x$, $y(0) = -2$, $y'(0) = -2$.
5. $y'' + y' - 2y = f(x)$; а) $f(x) = (2x - 1)e^{-x}$; б) $f(x) = 3x\cos 2x$.

25-вариант

1. а) $9y'' - 6y' + y = 0$; б) $y'' + 12y' + 37y = 0$; в) $y'' - 2y' = 0$.
2. $2y'' + 7y' + 3y = 222\sin 3x$.

3. $4y'' + 3y' - y = 11\cos x - 7\sin x$.
4. $y'' - 4y' = 8e^{2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -8$.
5. $y'' + 3y' - 4y = f(x)$; а) $f(x) = 6xe^{-x}$; б) $f(x) = x^2\sin 2x$.

11-§. Тўртинчи мустақил уй иши

Мустақил уй ишининг ҳар бир вариантыда тўртта мисол бўлиб уларнинг шартин куйидагича:

1-мисолда: берилган чизиқли бир жинсли дифференциал тенгламанинг хусусий ечимини топиш керак.

2-мисолда: берилган дифференциал тенгламалар системасини икки усул билан ечиш керак:

а) юқори тартибли дифференциал тенглама кўринишига келтириб;

б) характеристик тенглама тузиш ёрдамида.

3-мисолда: дифференциал тенгламани ихтиёрий ўзгармасларни вариациялаш усули билан ечиш керак.

4-масала шартин вариантда берилган.

Куйида вариант мисолларининг ечиш намунасини келтирамиз.

1. Ушбу

$$y^{IV} - y = 0$$

чизиқли бир жинсли бўлган дифференциал тенгламанинг $y(0) = 5$, $y'(0) = 3$, $y''(0) = y'''(0) = 0$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топиш.

Ечиш. Тенгламанинг характеристик тенгламасини тузамиз ва уни ечамиз:

$$\lambda^4 - 1 = 0, (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + 1) = 0, \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_{3,4} = \pm i.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

кўринишда бўлади. y' , y'' , y''' ҳосилаларни топамиз:

$$y' = -C_1 e^{-x} + C_2 e^x - C_3 \sin x + C_4 \cos x,$$

$$y'' = C_1 e^{-x} + C_2 e^x - C_3 \cos x - C_4 \sin x,$$

$$y''' = -C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 \sin x - C_4 \cos x.$$

C_1, C_2, C_3, C_4 ларнинг қийматларини аниқлаш учун бошланғич шартдан фойдаланиб, қуйидаги системани тузамиз ва уни ечамиз:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 5, \\ -C_1 + C_2 + C_4 = 3, \\ C_1 + C_2 - C_3 = 0, \\ -C_1 + C_2 - C_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2C_1 + 2C_2 = 5, \\ -2C_1 + 2C_2 = 3, \end{cases}$$

бундан $C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = 2, C_3 = \frac{5}{2}, C_4 = \frac{3}{2}$.

Берилган тенгламанинг хусусий ечими

$$y = \frac{1}{2}e^{-x} + 2e^x + \frac{5}{2}\cos x + \frac{3}{2}\sin x$$

кўринишда бўлади.

2. Ушбу

$$\begin{cases} x' = -7x + y, & x = x(t), & x' = \frac{dx}{dt}, \\ y' = -2x - 5y, & y = y(t), & y' = \frac{dy}{dt} \end{cases}$$

дифференциал тенгламалар системасини икки усул билан ечинг:

а) юқори тартибли дифференциал тенглама кўринишига келтириб;

б) характеристик тенглама тузиш ёрдамида.

Е ч и ш. а) Берилган системанинг биринчи тенгламасини x бўйича дифференциаллаймиз:

$$x'' = -7x' + y'.$$

Энди y' ўрнига иккинчи тенгламадаги ифодасини қўямиз:

$$x'' = -7x' - 2x - 5y.$$

Бу тенгламадаги y ўрнига $y = x' + 7x$ ни қўямиз. Натижада $x(t)$ номаълум функцияга нисбатан иккинчи тартибли дифференциал тенгламани ҳосил қиламиз:

$$x'' = -7x' - 2x - 5(x' + 7x), \quad x'' + 12x' + 37x = 0.$$

Охирги тенгламани бизга маълум бўлган усул (7-§ га қаранг) билан ечамиз:

$$\lambda^2 + 12\lambda + 37 = 0, \quad \lambda_{1,2} = -6 \pm \sqrt{36 - 37} = -6 \pm i,$$

$$x = e^{-6t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t).$$

Бунинг ҳосиласини топамиз:

$$x' = -6e^{-6t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^{-6t}(-C_1 \sin t + C_2 \cos t).$$

$y = x' + 7x$ тенгламага x ва x' нинг қийматларини қўямиз:

$$y' = -6e^{-6t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + 6e^{-6t}(-C_1 \sin t + C_2 \cos t) + 7e^{-6t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t).$$

Демак, изланаётган ечим

$$x = e^{-6t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t),$$

$$y = e^{-6t}(C_1(\cos t - \sin t) + C_2(\cos t + \sin t))$$

функциялардан иборат бўлади.

б) Системанинг характеристик тенгламасини тузамиз ва уни ечамиз:

$$\begin{vmatrix} -7-\lambda & 1 \\ -2 & -5-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (7+\lambda)(5+\lambda) + 2 = 0,$$

$$\lambda^2 + 12\lambda + 37 = 0, \quad \lambda_{1,2} = -6 \pm i.$$

$\lambda_1 = -6 + i$ учун (7-§ даги 2-мисолга қаранг) қуйидаги системани ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} (-7+6-i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (-5+6-i)\beta = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(1+i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (-1-i)\beta = 0. \end{cases}$$

$\alpha = 1$ деб, $\beta = 1 + i$ ни топамиз. У ҳолда берилган тенгламанинг биринчи хусусий ечими

$$x_1 = e^{(-6+i)t}, \quad y_1 = (1+i)e^{(-6+i)t}$$

бўлади.

$\lambda_2 = -6 - i$ учун система

$$\begin{cases} (-7 + 6 + i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (-5 + 6 - i)\beta = 0, \\ (-1 + i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (1 + i)\beta = 0 \end{cases}$$

қўринишда бўлади. $\alpha = 1$ деб, $\beta = 1 - i$ ни топамиз, натижада берилган тенгламанинг иккинчи хусусий ечими

$$x_2 = e^{(-6-i)t}, \quad y_2 = (1-i)e^{(-6-i)t}$$

ни топамиз.

Қуйидаги

$$\bar{x}_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \bar{x}_2 = \frac{x_1 - x_2}{2i},$$

$$\bar{y}_1 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad \bar{y}_2 = \frac{y_1 - y_2}{2i}$$

формула ёрдамида $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{y}_1$ ва $\bar{y}_2$ фундаментал ечимлар системасини топамиз. Унинг учун Эйлер формуласи

$$e^{(\alpha \pm \beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t \pm i \sin \beta t)$$

дан фойдаланиб

$$\bar{x}_1 = e^{-6t} \cos t, \quad \bar{x}_2 = e^{-6t} \sin t,$$

$$\bar{y}_1 = e^{-6t} (\cos t - \sin t), \quad \bar{y}_2 = e^{-6t} (\cos t + \sin t)$$

ларни топамиз.

Берилган системанинг умумий ечими

$$x = C_1 \bar{x}_1 + C_2 \bar{x}_2, \quad y = C_1 \bar{y}_1 + C_2 \bar{y}_2$$

қўринишда бўлади, яъни

$$x = e^{-6t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t),$$

$$y = e^{-6t} (C_1 (\cos t - \sin t) + C_2 (\cos t + \sin t)).$$

3. Ушбу

$$y'' - y = \frac{2e^x}{e^x - 1}$$

дифференциал тенгламани ихтиёрий ўзгармасни вариациялаш усули билан ечинг.

Ечиш. Берилган тенгламага мос бир жинсли тенгламани ечамиз:

$$y'' - y = 0, \quad \lambda^2 - 1 = 0, \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 1.$$

Бир жинсли тенгламанинг умумий ечими:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x.$$

C_1 ва C_2 ларни x га боғлиқ функция деб ҳисоблаймиз, яъни

$$y = C_1(x) e^{-x} + C_2(x) e^x.$$

$C_1(x)$ ва $C_2(x)$ ларни ((7.38) системага қаранг)

$$\begin{cases} C_1'(x) e^{-x} + C_2'(x) e^x = 0, \\ C_1'(x) y_1' + C_2'(x) y_2' = f(x) \end{cases}$$

системадан аниқлаймиз, берилган тенглама учун:

$$\begin{cases} C_1'(x) e^{-x} + C_2'(x) e^x = 0, \\ C_1'(x) e^{-x} + C_2'(x) e^x = \frac{2e^x}{e^x - 1}. \end{cases}$$

Бундан $C_1'(x)$ ва $C_2'(x)$ ни, сўнгра $C_1(x)$, $C_2(x)$ ларни топамиз:

$$2C_2'(x) e^x = \frac{2e^x}{e^x - 1}, \quad C_2'(x) = \frac{1}{e^x - 1}$$

$$2C_2(x) = \int \frac{dx}{e^x - 1} \left| \begin{matrix} t = e^x, & x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t(t-1)} = \int \frac{dt}{t-1} - \int \frac{dt}{t} =$$

$$= \ln |t-1| - \ln |t| + C_2 = \ln \left| \frac{t-1}{t} \right| + C_2 = \ln \left| \frac{e^x - 1}{e^x} \right| + C_2,$$

$$C_1'(x) = -C_2'(x) e^{2x} = -\frac{e^{2x}}{e^x - 1},$$

$$C_1(x) = -\int \frac{e^{2x}}{e^x - 1} dx \left| \begin{matrix} t = e^x, & dt = e^x dx \\ x = \ln t \end{matrix} \right| =$$

$$= -\int \frac{t dt}{t-1} = -\int \frac{t-1+1}{t-1} dt = -t - \ln |t-1| + C_1 = -e^x - \ln |e^x - 1| + C_1.$$

Демак, (7.37) формулага асосан берилган тенгламанинг умумий ечими қуйидагича бўлади:

$$y = (-e^{-x} - \ln|e^x - 1| + C_1)e^{-x} + \left(\ln\left|\frac{e^x - 1}{e^x}\right| + C_2\right)e^x = \\ = C_1e^{-x} + C_2e^x + e^x \ln\left|\frac{e^x - 1}{e^x}\right| - e^{-x} \ln|e^x - 1| - 1.$$

4. $P(1;2)$ нуқтадан ўтувчи ва қуйидаги хоссага эга булган эгри чизик тенгламасини ёзинг: эгри чизик ихтиёрий нуқтаси $M(x,y)$ нинг радиус-вектори ва бу нуқтада ўтказилган уринма ҳамда абсциссалар ўқи билан чегараланган учбурчакнинг юзи 2 га тенг (70-чизма).


Е чи ш . 70-чизмадан: $|OA| = |OB| + |AB| = x + |AB|$. Учбурчак BMA дан:

$$\frac{|BA|}{y} = \operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{ctg}\alpha, \quad |BA| = -y \operatorname{ctg}\alpha,$$

$$|BA| = -\frac{y}{\operatorname{tg}\alpha} = -\frac{y}{\frac{dy}{dx}} = -y \frac{dx}{dy}, \quad |OA| = |OB| + |BA| = x - y \frac{dx}{dy}.$$

Масала шартига кўра:

$$S_{OMA} = 0,5 \cdot |OA| \cdot |MB| = 2.$$



70-чизма.

Бунга $|OA|$ ва $|MB|$ ларнинг қийматларини қўйсак, қуйидаги

$$\frac{1}{2} \left(x - y \frac{dx}{dy} \right) \cdot y = 2, \quad xy - y^2 \frac{dx}{dy} = 4, \quad y^2 \frac{dx}{dy} = xy - 4.$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -\frac{4}{y^2}$$

тенгламага, яъни $x = x(y)$ функцияга нисбатан биринчи тартибли чизикли дифференциал тенгламага эга бўламиз. Уни $x = uv$ алмаштириш ёрдамида ечамиз:

$$u'v + uv' - \frac{uv}{y} = -\frac{4}{y^2}, \quad u'v + u \left(\frac{dv}{dy} - \frac{v}{y} \right) = -\frac{4}{y^2},$$

$$\frac{dv}{dy} - \frac{v}{y} = 0, \quad \frac{dv}{v} = \frac{dy}{y}, \quad \int \frac{dv}{v} = \int \frac{dy}{y}, \quad \ln|v| = \ln|y|, \quad v = y,$$

$$\frac{du}{dy} \cdot y = -\frac{4}{y^2}, \quad du = -\frac{4dy}{y^3}, \quad u = \frac{2}{y^2} + C,$$

$$x = \left(\frac{2}{y^2} + C \right) y = Cy + \frac{2}{y}.$$

Изланаётган эгри чизик $P(1;2)$ нуқтадан ўтади, шунинг учун $1 = 2C + 1$, $C = 0$. Демак, унинг тенгламаси $x = \frac{2}{y}$ ёки $xy = 2$, яъни бу эгри чизик гиперболодир.

1-вариант

$$1. \quad y''' - y' = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 4.$$

$$2. \quad \begin{cases} x' = -2x + y, \\ y' = -3x + 2y. \end{cases}$$

$$3. \quad y'' + 2y' + y = xe^x + \frac{1}{xe^x}.$$

4. Агар эгри чизикнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг уриниш нуқтаси билан координаталар боши орасидаги масофа уриниш нуқтасининг абсциссасига тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизикнинг тенгламасини ёзинг.

2-вариант

$$1. \quad y^{IV} + 2y''' - 2y' - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 8.$$

$$2. \begin{cases} x' = 6x - y, \\ y' = 3x + 2y. \end{cases}$$

$$3. y'' + 2y' + 2y = \frac{e^{-x}}{\cos x}.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринма, уриниш нуқтасидан абсциссалар ўқиға туширилган перпендикуляр ва абсциссалар ўқи билан чегераланган учбурчакнинг катетлари йиғиндиси ўзгармас миқдор a га тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

3-вариант

$$1. y''' + y'' - 5y' + 3y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = -14.$$

$$2. \begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = -6x - 3y. \end{cases}$$

$$3. y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\sin^2 x}.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг Ox ўқидан ажратган кесмасининг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасидан икки марта кичик бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

4-вариант

$$1. y''' + y'' = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = -1.$$

$$2. \begin{cases} x' = y, \\ y' = x. \end{cases}$$

$$3. y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \operatorname{ctg} x.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринма ва нормалнинг Ox ўқидан ажратган кесмаси $2l$ га тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

5-вариант

$$1. y''' - 5y'' + 8y' - 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 0.$$

$$2. \begin{cases} x' = -x - 2y, \\ y' = 3x + 4y. \end{cases}$$

$$3. y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\sin x}.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг Ox ўқидан ажратган кесмасининг узунлиги уриниш нуқтаси абсциссасининг $\frac{2}{3}$ қисмига тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

6-вариант

$$1. y''' + 3y'' + 2y' = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 2.$$

$$2. \begin{cases} x' = -2y, \\ y' = y. \end{cases}$$

$$3. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2}.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг Ox ўқидан ажратган кесмасининг узунлиги уриниш нуқтаси абсциссасининг кубига тенглиги маълум бўлса, $A(2;4)$ нуқтадан ўтувчи шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

7-вариант

$$1. y''' + 3y'' + 3y' + y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 0, y''(0) = 1.$$

$$2. \begin{cases} x' = 4x + 2y, \\ y' = 4x + 6y. \end{cases}$$

$$3. y'' + y = \operatorname{tg} x.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг Oy ўқидан ажратган кесмасининг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасидан уч марта катталиги маълум бўлса, $A(1;5)$ нуқтадан ўтувчи шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

8-вариант

$$1. y''' - 2y'' + 9y' - 18y = 0, y(0) = -2.5, y'(0) = 0, y''(0) = 0.$$

$$2. \begin{cases} x' = 8x - 3y, \\ y' = 2x + y. \end{cases}$$

3. $y'' + 4y = \operatorname{ctg} 2x$.

4. $A(1; 2)$ нуқтадан ўтувчи ва қуйидаги хоссага эга бўлган эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг: ихтиёрий нуқтаси ординатасининг шу нуқта абсциссасига нисбати изланаётган эгри чизиқнинг шу нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентига пропорционал ва пропорционаллик коэффициенти 3 га тенг.

9-вариант

1. $y''' + 9y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 9$, $y''(0) = -18$.

2. $\begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = x + 3y. \end{cases}$

3. $y'' + y = \operatorname{ctg} x$.

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринманинг уриниш нуқтасидан Ox ўқи билан кесишган нуқтаси орасидаги масофа уриниш нуқтасидан координаталар бошигача бўлган масофага тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

10-вариант

1. $y''' - 13y'' + 12y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 133$.

2. $\begin{cases} x' = 2x + 3y, \\ y' = 5x + 4y. \end{cases}$

3. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$.

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринма, координата ўқлари ва уриниш нуқтасидан абсциссалар ўқиға туширилган перпендикуляр билан чегараланган трапециянинг юзи ўзгармас миқдор $3a^2$ га тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

11-вариант

1. $y''' - 5y'' + 4y' = 0$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 2$, $y'''(0) = 0$.

2. $\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 3x + 6y. \end{cases}$

3. $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$.

4. Агар эгри чизиқ ихтиёрий нуқтаси уринмасининг бурчак коэффициенти уриниш нуқтаси ординатасининг квадратиға тенглиги маълум бўлса, $A(2; -1)$ нуқтадан ўтувчи шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг. Пропорционаллик коэффициенти 6 га тенг.

12-вариант

1. $y''' - 10y'' + 9y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 8$, $y'''(0) = 24$.

2. $\begin{cases} x' = 5x + 4y, \\ y' = 4x + 5y. \end{cases}$

3. $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$.

4. $M(x; y)$ нуқтасида ўтказилган нормал Oy ўқидан узунлиги $\frac{x}{y}$ га тенг кесма ажратувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

13-вариант

1. $y''' - y'' + y' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$.

2. $\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y. \end{cases}$

3. $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$.

4. Уринманинг Oy ўқидан ажратган кесмасининг узунлиги уриниш нуқтаси абсциссасининг квадратиға тенг бўлган эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

14-вариант

1. $y''' - 3y'' - 3y' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 4$.

2. $\begin{cases} x' = x + 4y, \\ y' = x + y. \end{cases}$

3. $y'' + 4y = \frac{1}{\sin 2x}$.

4. $M(x, y)$ нуқтасидан ўтказилган нормал Oy ўқидан узунлиги $\frac{y^2}{8}$ га тенг кесма ажратувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

15-вариант

- $y'''' - y'' + 4y' - 4y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 0, y''(0) = -6.$
- $\begin{cases} x' = 3x - 2y, \\ y' = 2x + 8y. \end{cases}$
- $y'' + 4y = \operatorname{tg} 2x.$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасидан координата ўқларига параллел (бу ўқлар билан кесишгунга қадар) тўғри чизиқлар ўтказилса, у ҳолда ҳосил бўлган тўғри тўртбурчакларнинг юзи эгри чизиқ билан икки қисмга бўлинади, қайсики бирини юзи иккинчисиникидан икки марта катта бўлиш хоссасига эга бўлган эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

16-вариант

- $y'''' - 2y'' + y' = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 1, y'''(0) = 2.$
- $\begin{cases} x' = x + 4y, \\ y' = 2x + 3y. \end{cases}$
- $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x}.$

4. $M(x, y)$ нуқтасида ўтказилган нормал Oy ўқини $\frac{y}{2}$ га тенг кесмада кесувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

17-вариант

- $y'''' - y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 0, y'''(0) = -4.$
- $\begin{cases} x' = 7x + 3y, \\ y' = x + 5y. \end{cases}$
- $y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^2}.$

4. Эгри чизиқнинг ҳар бир нуқтасида ўтказилган уринма абсциссаси уриниш нуқтасининг абсциссасини икки

бараварига тенг бўлган нуқтада $y = 1$ тўғри чизиқ билан кесишади. Шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

18-вариант

- $y'''' - 16y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 0, y'''(0) = -8.$
- $\begin{cases} x' = 4x - y, \\ y' = -x + 4y. \end{cases}$
- $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}\sqrt{x+1}.$

4. Ҳамма уринмалари координаталар бошидан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

19-вариант

- $y'''' + y'' - 4y' - 4 = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 12.$
- $\begin{cases} x' = 2x + 8y, \\ y' = x + 4y. \end{cases}$
- $y'' + y = -\operatorname{ctg} 2x.$

4. Эгри чизиққа ўтказилган уринмаларнинг Oy ўқи билан уриниш нуқтаси орасидаги кесманинг узунлиги ўзгармас 2 га тенг бўлган ва $A(2; 0)$ нуқтадан ўтувчи эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

20-вариант

- $y'''' + 2y'' + 9y' + 18y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -3, y''(0) = -9.$
- $\begin{cases} x' = 5x + 8y, \\ y' = 3x + 3y. \end{cases}$
- $y'' - y' = e^{2x} - \cos e^x.$

4. Агар Oy ўқи, эгри чизиққа ўтказилган ихтиёрий уринма ва уриниш нуқтасининг радиус-вектори билан чегараланган учбурчак тенг ёнли бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

21-вариант

- $y'''' - y'' + 9y''' = 0, y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0, y''''(0) = 27.$

$$2. \begin{cases} x' = -5x + 2y, \\ y' = x - 6y. \end{cases}$$

$$3. y'' - y' = e^{2x} \sin e^x.$$

4. Эгри чизиқнинг бирор нуқтасида ўтказилган нормалнинг ординаталар ўқи ва эгри чизиқ билан кесишиш нуқтаси орасидаги кесмаси шу нуқта билан координаталар боши орасидаги кесмага тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

22-вариант

$$1. y''' + 2y'' + y' = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2, y''(0) = -3.$$

$$2. \begin{cases} x' = 6x + 3y, \\ y' = -8x - 5y. \end{cases}$$

$$3. y'' + y = \operatorname{tg}^2 x.$$

4. Агар эгри чизиққа ўтказилган уринманинг координата ўқлари орасидаги кесмасини уриниш нуқтаси тенгиккига бўлиши маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

23-вариант

$$1. y''' - y'' - y' + y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 0, y''(0) = 1.$$

$$2. \begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = 8x + y. \end{cases}$$

$$3. y'' + y = \frac{2}{\sin^2 x}.$$

4. Агар координаталар бошидан уринмага туширилган перпендикулярнинг узунлиги уриниш нуқтасининг абсциссасига тенг бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

24-вариант

$$1. y'' + 5y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 4, y''(0) = -1, y'''(0) = -16.$$

$$2. \begin{cases} x' = x - 5y, \\ y' = -x - 3y. \end{cases}$$

$$3. y'' + 2y' + 5y = \frac{e^{-x}}{\sin 2x}.$$

4. Агар эгри чизиққа ўтказилган уринманинг бурчак коэффиценти уриниш нуқтаси ординатасининг учланганлигига тенглиги маълум бўлса, $A(0; -2)$ нуқтадан ўтувчи шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

25-вариант

$$1. y'' + 10y' + 9y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 3, y''(0) = -9, y'''(0) = -27.$$

$$2. \begin{cases} x' = 4x - 8y, \\ y' = -8x + 4y. \end{cases}$$

$$3. y'' + 9y = \frac{1}{\cos 3x}.$$

4. Агар эгри чизиқнинг ихтиёрий нуқтасида ўтказилган уринма, уриниш нуқтасидан абсциссалар ўқиға туширилган перпендикуляр ва Ox ўқи билан чегараланган учбурчакнинг юзи ўзгармас миқдор b^2 га тенглиги маълум бўлса, шу эгри чизиқнинг тенгламасини ёзинг.

VIII боб

1-§. Олий математика татбиқига дори масалалар


1. Функция ҳақида тушунча.

Энг содда функцияларни текшириш

1.1. Радиуси R ва маркази координаталар бошида бўлган айлана бўйича моддий нуқта v тезлик билан соат стрелкаси йўналишга қарама-қарши йўналишда текис ҳаракатланмоқда. Бошланғич пайтда бу нуқтанинг абсциссаси a ($|a| \leq R$) га тенг, ординатаси эса мусбат. Бу нуқта абсциссасининг тебраниш тенгламасини тузинг. Бошланғич вақт қандай бўлганида бу абсциссанинг модули энг катта бўлади?

Ечиш. Маълумки, нуқта ҳаракатининг тезлиги қуйидаги формула билан топилади:

$$\omega = \frac{v}{R}.$$



71-чизма.

бунда ω — a нуқтанинг бурчак тезлиги, v — унинг илгариланма ҳаракат тезлиги.

Масала шarti ва 71-чизмага кўра:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t = \arccos \frac{a}{R} + \frac{v}{R} t.$$

Энди куйидагиларни топамиз:


а) M нуқтанинг абсцисаси t нинг функцияси $x(t)$ бўлиб, унинг тебраниш тенгламаси:

$$\begin{aligned} x(t) &= R \cos \varphi(t) = R \cos \left(\frac{v}{R} t + \arccos \frac{a}{R} \right) = \\ &= R \left[\frac{a}{R} \cos \frac{v}{R} t - \sqrt{1 - \frac{a^2}{R^2}} \sin \frac{v}{R} t \right] = a \cos \frac{v}{R} t - \sqrt{R^2 - a^2} \sin \frac{v}{R} t. \end{aligned}$$

б) $\max |x(t)| = R$ шартдан $\varphi(t) = \pi$, яъни $\arccos \frac{a}{R} + \frac{v}{R} t = \pi$ келиб чиқади; бу ердан изланаётган вақт t ни топамиз:

$$t_{\max} = \frac{\pi - \arccos \frac{a}{R}}{\frac{v}{R}} = \frac{R}{v} \arccos \left(-\frac{a}{R} \right).$$

1.2. Кривошип-шатун механизми схемасини қараймиз (72-чизма). Маховикнинг радиуси R , шатун узунлиги a га тенг. Маховик секундига n марта айланиб, соат стрелкаси йўналиши бўйича бир текис ҳаракат қилади (айланади). Шатун ва кривошип $t = 0$ да бир тўғри чизиқни ҳосил қилади (чап "тинч" ҳолатда), A нуқта (крейцкопф ёки ползун) O нуқта (координаталар боши)да бўлади. A нуқта (крей-



72-чизма.

скопф) x кўчишининг t вақтга боғлиқлигини текширинг. $x(t)$ функциянинг максимуми тўғрисида нима дейиш мумкин? Минимуми тўғрисида-чи? Натижаларни чизмадан яққол кўриниб турадиган хулосалар билан таққосланг.

Е ч и ш. $x = x_1 + x_2$; $\varphi = \omega \cdot t = 2\pi n t$;

$$x_1 = R - R \cos \varphi = R(1 - \cos 2\pi n t);$$

$$x_2 = a - a \cos \psi = a - a \sqrt{1 - \sin^2 \psi} = a - a \sqrt{1 - \left(\frac{R \sin \varphi}{a} \right)^2};$$

$$x(t) = R(1 - \cos 2\pi n t) + a - \sqrt{a^2 - R^2 \sin^2 2\pi n t}.$$

$x(t)$ функция ифодасидаги биринчи ва иккинчи қўшилувчилар бир хил нуқталарда $t_{\max} = \frac{1}{2n}$ максимумга эришадилар;

$x(t_{\max}) = R(1 + 1) + a - \sqrt{a^2 - 0} = 2R$ да эса a нуқта "тинч" ҳолатда бўлади. Ҳудди шундай хулосани $x(t)$ функциянинг минимуми учун ҳам чиқариш мумкин.

1.3. I ток қаршиликлари r_1 ва r_2 бўлган иккита тармоққа қандай тақсимланганда вақт бирлигида ўтказгичнинг қизишига сарф бўлган энергия миқдори ($Q = I^2 R$) энг кичик бўлади? Токнинг аслида тақсимланиши билан таққосланг (73-чизма).

Е ч и ш. r_1 қаршиликдан ўтувчи ток i бўлсин, у ҳолда r_2 дан ўтадиган ток $I - i$ га тенг бўлади. Энергиянинг қизишга сарф бўлган умумий йўқотилиши $Q = i^2 r_1 + (I - i)^2 r_2$ га тенг.

$Q(i)$ функциянинг максимумини топиш масаласини ечамиз:

$$Q = i^2 r_1 + (I - i)^2 r_2 \rightarrow \min, \quad i \in (-\infty; +\infty),$$

$$Q = (r_1 + r_2) i^2 - 2I r_2 i + I^2 r_2 = (r_1 + r_2) \left(i^2 - \frac{2I r_2}{r_1 + r_2} i + \frac{I^2 r_2}{r_1 + r_2} \right) =$$



73-чизма.

$$\begin{aligned}
 &= (r_1 + r_2) \left[\left(i - \frac{l r_2}{r_1 + r_2} \right)^2 - \frac{l^2 r_2^2}{(r_1 + r_2)^2} + \frac{l^2 r_2}{r_1 + r_2} \right] = \\
 &= (r_1 + r_2) \left(i - \frac{l r_2}{r_1 + r_2} \right)^2 + \frac{\eta l^2}{r_1 + r_2} \rightarrow \min.
 \end{aligned}$$

Буллардан

$$i_1 = i = \frac{I r_2}{r_1 + r_2},$$

$$i_2 = I - i = \frac{I r_1}{r_1 + r_2}$$

тенгликка эга буламиз, яъни $\frac{\eta}{i_2} = \frac{\eta}{\eta}$ — тоқлар тармоқлар қаршилиқларига тескари пропорционал тақсимлангандир.

Токларнинг аслида тақсимланиши эса қуйидагичадир:

$$U = IR, \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}, \quad \text{яъни} \quad U = I \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2},$$

бундан эса юқоридаги натижани ҳосил қиламиз:

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= \frac{U}{R_1} = \frac{I r_2}{r_1 + r_2}, \\ i_2 &= \frac{U}{R_2} = \frac{I r_1}{r_1 + r_2}. \end{aligned} \right\}$$

1.4. Занжирдаги ток бир хил частотали иккита ўзгаришчан ток генераторидан ҳосил қилинади. Улардаги ток миқдорлари $i_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ ва $i_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$ формулалар билан аниқланади. Бу токлар йиғиндисини топинг.

Мос ҳолда A_1 ва A_2 узунликларга эга булган $\vec{A}_1$ ва $\vec{A}_2$ векторларни горизонтал ўққа φ_1 ва φ_2 бурчаклар остида ўтадиган қилиб ясаас, $\vec{A}_1$ ва $\vec{A}_2$ векторларни қўшиб, A узунлидаги ва ўққа φ бурчак остида огган A векторни ҳосил қилишимизни кўрсатинг (74-чизма); бунда A ва φ лар

$$A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega t + \varphi_2) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

ЙИГИДИНИНГ МОС ҲОЛДА АМПЛИТУДАСИ ВА БОШЛАНГИЧ ФАЗАСИ.

Е чи ш. $\omega t + \varphi_1 = \gamma$ деб белгиларимиз, у ҳолда $\omega t + \varphi_2 = \gamma - \varphi_1 + \varphi_2 = \varphi_2 - \varphi_1 + \gamma = \alpha + \gamma$, бу ерда $\alpha = \varphi_2 - \varphi_1$ (74-чизмага қаранг).

Қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega t + \varphi_2) &= A_1 \sin \gamma + A_2 \sin(\alpha + \gamma) = \\ &= A_1 \sin \gamma + A_2 \sin \alpha \cos \gamma + A_2 \cos \alpha \sin \gamma = \\ &= (A_1 + A_2 \cos \alpha) \sin \gamma + A_2 \sin \alpha \cos \gamma. \end{aligned}$$

Куйидаги белгилашларни киритамиз:

$$A_1 + A_2 \cos \alpha = B, \quad A_2 \sin \alpha = C.$$

Натижада:

$$\begin{aligned} B^2 + C^2 &= A_1^2 + 2A_1A_2 \cos \alpha + A_2^2 \cos^2 \alpha + A_2^2 \sin^2 \alpha = \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \alpha = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \beta = A^2. \end{aligned}$$

74-чизмага кўра:

$$\frac{A_1 + A_2 \cos \alpha}{A} = \cos \delta, \quad \frac{A_2 \sin \alpha}{A} = \sin \delta.$$


У холда

$$A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega t + \varphi_2) = A(\cos \delta \sin \gamma + \sin \delta \cos \gamma) = \\ = A \sin(\gamma + \delta) = A \sin(\omega t + \varphi_1 + \varphi - \varphi_1) = A \sin(\omega t + \varphi).$$

Векторларнинг хоссалари ва уларнинг проекцияларидан фойдаланиб, бу натижани осонроқ йўл билан ҳосил қилишимиз ҳам мумкин эди.

**1.5. Параллел уланган иккита узгарувчан ток генера-
тори**

$$i_1 = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_1 \right), \quad i_2 = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_2 \right)$$



74-чизма.

тоқлар беради. Шу тоқларнинг умумий йиғиндисини топинг. Йиғинди тоқнинг 0 га тенг бўлиши ва энг катта қийматга (абсолют қиймати бўйича) эга бўлиш вақтларини топинг (1.4-масалага қаранг).

Ечиш. Масала шартига кўра $A_1 = A_2 = A$ бўлгани учун $\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$. Йиғинди ток I ни $I = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$ деб ёзиш мумкин.

Бу ерда

$$A = \sqrt{2A^2 + 2A^2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = \sqrt{2}A\sqrt{1 - \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}.$$

1) Йиғинди ток қуйидаги ҳолларда 0 га тенг бўлади:

$$\frac{2\pi}{T}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = k\pi, \text{ яъни } t = \frac{T}{2\pi}\left(k\pi - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right),$$

$$t = \frac{T}{2}\left(k - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2\pi}\right), k \in \mathbb{Z}.$$

2) Йиғинди ток қуйидаги ҳолда модули бўйича энг катта бўлади:

$$\frac{2\pi}{T}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \pi k + \frac{\pi}{2}, \text{ яъни } t = \frac{T}{2\pi}\left(k\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right),$$

$$t = \frac{T}{2}\left(k + \frac{1}{2} - \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2\pi}\right), k \in \mathbb{Z}.$$

1.6. $y_1 = 4,0 \sin(t + 0,64)$ ва $y_2 = 3,0 \sin(t - 0,71)$ тўлқинларнинг интерференциясини тавсифланг, яъни йиғинди тебранишларнинг амплитудаси ва бошланғич фазасини топинг (1.4-масалага қаранг).

Ечиш. Амплитуда:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = \\ &= \sqrt{16 + 9 + 2 \cdot 4 \cdot 3 \cos(0,71 + 0,64)} = \\ &= \sqrt{25 + 24 \cos(1,35)} \approx 5,5. \end{aligned}$$

Бошланғич фаза: $\varphi = \delta + \varphi_1$,

$$\sin \varphi = \sin \delta \cos \varphi_1 + \sin \varphi_1 \cos \delta =$$

$$= \frac{1}{A} [A_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \cos \varphi_1 + \sin \varphi_1 (A_1 + A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1))] =$$

$$= \frac{1}{A} [A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2];$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{5,5} [3 \sin(-0,71) + 4 \sin 0,64] = 0,062;$$

бу ердан $\varphi = 0,06$.

2. Функциялар графигини чизиш

2.1. Импульслар генератори пайдо қиладиган қуйидаги кучланиш осциллограммаларини формула орқали ёзинг (75-чизмага қаранг)

Жавоблар:

а) $u(t) = \frac{A}{h}(t - \tau), \tau \leq t \leq \tau + h$, даври $T = h$;

б) $u(t) = \begin{cases} A, & \tau \leq t \leq \tau + h, \\ 0, & \tau + h \leq t \leq \tau + 2h, \end{cases} T = 2h$;

в) $u(t) = \frac{A-a}{h}|t - \tau| - a, \tau - h \leq t \leq \tau + h, T = 2h$;

г) $u(t) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \sin \frac{2\pi}{T}(x+c)$;






д) $u(t) = \begin{cases} a(1 - e^{-v(t-t_0)}), & \text{бу ерда } v = \frac{\ln|1 - \frac{Y}{a}|}{\tau - t_0}, t \geq t_0, \\ 0, & t \leq t_0. \end{cases}$

2.2. Стержен узунлигига σ (бирор бирлик юзга таъсир этувчи куч) куч таъсир этса, у чузилади ва бу чузилиш узунлиги Гук қонуни бўйича аниқланади:

$$l = l_0 \left(1 + \frac{\sigma}{E}\right), \text{ бу ерда } E \text{ — Юнг модули.}$$

l ни σ нинг функцияси деб бу функциянинг графигини ясанг. Аргументнинг қандай қийматларида $l = l(\sigma)$ тўғри чизиқ узунлиқнинг кучланишига бевосита боғлиқлигини акс эттиради?

Жавоб. $0 \leq \sigma \leq \sigma_{\max}$, бу ерда $\sigma = \sigma_{\max}$ бўлганда стерженнинг пластик деформацияси (узилиши) бошланади.



2.3—2.7 масалаларни ечишда куйидагилар талаб қилинади:

- текширилаётган катталиқ (миқдор) нинг ўлчамини текшириш;
- аргументнинг қандай қийматларида берилган функция аниқ физик боғланишни акс эттиришини кўрсатиш;
- функциянинг графигини ясаш;

г) графикдан фойдаланиб берилган боғланишни текшириш; куйилган саволларга жавоб бериш.

2.3. Актив (омик) қаршиликсиз тебраниш контуридаги электр тебранишлари В.Томсон формуласи билан берилади: $T = 2\pi\sqrt{LC}$, бу ерда L — индуктивлик, C — сифим. T ни C нинг функцияси деб графигини ясанг.

2.4. Иккита параллел актив (омик) қаршиликлардан иборат занжир бўлагининг қаршилиги $R = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ га тенг. R ни r_2 нинг функцияси деб (яъни r_1 ни ўзгармас деб ҳисоблаб) графигини ясанг. Бу графикнинг горизонтал асимптотаси борлигини физик нуқтаи назардан талқин этинг.

Жавоб. r_2 чексиз ортганда R қаршилик r_1 га яқинлашади, буни r_2 қаршиликдан иборат занжир бўлагининг узилиши каби талқин этиш мумкин.

2.5. Ер сиртидан h баландликдаги массаси m га тенг жисмнинг Ерга тортилиш кучи (яъни жисмнинг оғирлиги) Ньютон қонуни бўйича, шунингдек, массалари M ва m бўлган сферик-симметрик жисмлар, бу жисмлар марказларига жойлашган M ва m нуқтавий массалар каби тортишади, деган теоремага кўра $P = f \frac{Mm}{(R+h)^2}$ га тенг.

Бу ерда M ва R мос ҳолда Ернинг массаси ва радиуси, $f = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{кг}^2}$ — гравитацион доимий. P ни h нинг функцияси деб графигини ясанг.

2.6. 1 моль (1 грамм молекула) газнинг изотермик жарёнда бажарган иши $A = RT \ln \frac{v_2}{v_1}$ га тенг, бу ерда v_1 — газнинг бошланғич ва v_2 — охири (натيجавий) ҳажмлари.

T — температура (Кельвин бўйича);

R — универсал газ доимийси ($R = 2 \text{ кал/град моль}$).

A ни v нинг функцияси деб графигини ясанг.

2.7 Ҳаво босими P нинг баландлик h га боғлиқ ҳолда ўзгариши

$$P = P_0 e^{-\frac{\gamma P_0 h}{kT}}$$

барометрик формула билан ифодаланади, бу ерда P_0 ва γ_0 лар $h = 0$ баландликдаги мос ҳолда босим ва солиштирма оғирлик.

T — температура (Кельвин бўйича);

k — Больцман доимийси ($k = 1,4 \cdot 10^{-16} \text{ эрг/град}$);

$T = \text{const}$ бўлганда p ни h нинг функцияси деб графигини ясанг.

Бу функция монотонлигининг физикавий талқини қандай?

$T = \text{const}$ шартнинг физикавий талқини қандай?

2.8. $I = I_0 \sin(\omega t + \varphi)$ синусоидал ток:

а) битта ярим даврли $I = \max(0, I_0 \sin(\omega t + \varphi))$ тўғриланишда;

б) иккита ярим даврли $I = |I_0 \sin(\omega t + \varphi)|$ тўғриланишда ўзгарадиган токнинг графигини ясанг.

Бу ҳолларда ўзгарувчан токнинг энг кичик даври қандай?

2.9. Қаршиликка етиб келадиган синусоидал токнинг қуввати ("оний қувват" деб ҳам аталади)

$$W = U_0 I_0 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

га тенг. W ни t нинг функцияси деб графигини ясанг. Қувватнинг чўққилари такрорланиш частотаси f қандай?

Жавоб: $f = \frac{\omega}{\pi}$.

2.10. R қаршилик, L индуктивлик ва ЭЮК манбаи кетма-кет уланган занжир туташтирилганда (бошланғич ток йўқ: $I(t_0) = 0$) қуйидаги ток вужудга келади:

$$I = \frac{E}{R} \left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} \right], \quad t \geq t_0.$$

I ни t нинг функцияси деб графигини ясанг. Бу ҳолда горизонтал асимптотанинг мавжудлигига қандай физикавий талқин бериш мумкин? R қаршилик катталиги ўзгарганда график кўриниши қандай ўзгаради? L ўзгарганда-чи? E ўзгарганда-чи?

Жавоб. Асимптотанинг мавжудлиги вақт ортиши билан ток ўзининг барқарорлашган $I_{\infty} = \frac{E}{R}$ қийматига яқинлаша бориб, деярли доимий (ўзгармас) бўлиб қолиши билан талқин қилинади. Занжирнинг I_{∞} эса актив (омик) қаршилигидан аниқланади.

2.11. f частотали бирор асбобнинг кўрсатишлари x ва $x + h$ оралиқларида ётади. Кичик h ларда бу частота қуйидагиларга тенг бўлади:

а) $f = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ h Гаусснинг нормал қонуни (параметрлари m, σ бўлган);

б) $f = \frac{h}{\pi[1+(x-m)^2]}$ (Коши қонуни).

f ни x нинг функцияси деб графигини ясанг. Бу ҳолларда асбобларнинг энг тез-тез учрайдиган кўрсатишлари қандай? m параметрнинг қийматлари ўзгарганда графикларнинг кўриниши қандай ўзгаради?

2.12. Сўнувчи $I(t) = I_0 e^{-kt} \cos(\omega t + \varphi)$ (ω — частота, φ — бошланғич фаза, k — сўниш декременти) токнинг графигини ясанг. Токнинг сўнишини $|I(t)| \leq 0,05 I_0$ ҳолда амалий жиҳатдан рўй берган деб, $k = 1$, $\omega = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ҳол учун T нинг қайси қийматидан бошлаб тақрибан сўниш рўй беришини баҳоланг.

Ечиш. $e^{-T} \leq 0,05$ дан: $T \geq \ln 20 \approx 3$. Амалий жиҳатдан $T = 3$ деб олиш мумкин.

2.13. Актив қаршилик бўлмаган занжир манбадан қабул қилгичга бериладиган қувват максимуми (вақт бўйича)

$$W = \frac{E^2}{2z_0[1+\cos(\varphi-\varphi_0)]}$$

ифола билан аниқланади, бу ерда $E, z_0, \varphi, \varphi_0$ — занжирнинг турли характеристикалари (E — ЭЮК; z_0 — бу ҳолда манба қаршилиги; φ ва φ_0 — мос ҳолда манба ва нагрузка қаршиликларининг аргументлари).

W ни φ нинг функцияси деб графигини ясанг.

Нагрузка ва манба қаршиликлари аргументлари тенг бўлганда бериладиган қувват максимуми энг кичик бўлишини кўрсатинг. Бу аргументлар орасида қандай муносабат бўлганда бу максимум энг катта бўлади?

Бу натижалар қандай талқин этилади?

Кўрсатма. $W(\varphi_{\max}) = W_{\max} = \infty$, бу ерда $\varphi_{\max} - \varphi_0 = \pi$. Ҳар иккала ҳулоса ($W_{\min}$ ва $W_{\max}$ га нисбатан) актив (омик) қаршилик йўқ деган фараз орқали тушунтирилади. Масалан, бу ҳолда (манба ва нагрузка қаршиликларининг аргументлари тенглигини ҳисобга олиб) бўлганда (қаршиликлар қарама-қарши фазада бўлганда) занжирнинг умумий қаршилиги 0 га тенг бўлади, берилаётган қувват чексиз бўлади.

2.14. Бирор (Ван-дер-Поль системасида) механик система тебранишларининг амплитудаси ўзгариш қонуни қуйидагича ифодаланади:

$$\rho = \frac{2}{\sqrt{1 + Ce^{-\mu t}}},$$

бу ерда C — бошланғич шартларга боғлиқ бўлган ўзгармас; μ — система параметри. ρ ни t нинг функцияси деб графигини ясанг.

2.15. Стержен ўқи билан φ бурчак ташкил этувчи ва r масофада стержен йўналишдаги магнит майдонининг кучланганлиги $H = \frac{mI}{\mu r^2} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \varphi}$ га тенг, бу ерда

m — магнит массаси;

I — стерженнинг ўзунлиги ($I < r$);

μ — муҳитнинг магнит синдирувчанлиги.

H ни φ нинг $(-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$ функцияси деб графигини ясанг.

2.16. Адиабатик жараёнда газнинг p босими ва T температураси орасидаги боғланиш $p T^{\frac{\chi}{1-\chi}} = C (= \text{const})$ тенглик билан берилади, бу ерда $\chi > 1$ — адиабата кўрсаткичи.

p ни T нинг функцияси деб графигини ясанг. $\chi > 1$ нинг турли қийматларига мос келувчи графиклар ўзаро қандай жойлашган?

2.17. Ўзгарувчан ток занжиридаги ток ва кучланиш орасидаги фаза сурилиши қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R},$$

бу ерда R — занжирнинг актив (омик) қаршилиги; L — индуктивлик; C — сигим, ω — бурчак частотаси.

φ ни:





а) L нинг функцияси деб;

в) C нинг функцияси деб;

с) ω нинг функцияси деб графигини ясанг.

Учала функциянинг монотонлигини изоҳлаб беринг.

2.18. Синус-кучланиш ўзгартиргичининг (киришдаги кучланиш u бўлганда чиқишда $V = \sin u$ кучланиш ҳосил қилади) киришига 2π даврга эга бўлган даврий кучланиш



76-чизма.

берилган. Бу кучланиш $-\pi \leq t \leq \pi$ да $u(t) = t^2$ га тенг. V ни t нинг функцияси деб графигини ясанг.

2.19. Косинус-кучланиш ўзгартиргичининг ($V = \cos u$) киришига $u = 0,5 \sin(2t + 1)$ кучланиш берилган. Чиқиш кучланиши $V = V(t)$ нинг графигини ясанг.

2.20. Ўзгартиргич-квадратор ($V = 2u^2$) киришига $u = 2(1 - e^{-t})$ кучланиш берилган. $V(t)$ нинг графигини ясанг.

2.21. Агар $F(u)$ ва $f(t)$ функциялар 76-чизмадаги графиклар билан берилган бўлса, у ҳолда кучланиш ўзгартиргичнинг ($V = F(u)$) киришига $u = f(t)$ кучланиш берилганда унинг чиқишдаги кучланиш графигини ясанг.

3. Лимитлар


3.1. 77-чизмадаги учта чизма тасвирланган занжир (r_1 , r_2 ва ҳ.к. қаршиликлардан тузилган занжир) нинг умумий қаршилиги R ни топинг.

R нинг қиймати:

а) r_2 қаршилик чексиз кичиклашганда;

б) r_2 қаршилик чексиз катталашганда нимага интилишини топинг.

Жавобларни физик жиҳатдан аниқ бўлган хулосалар билан таққосланг.



Е чи ш .

- 1) $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{R}$, бу ердан $R = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$; а) 0; б) r_1 (2.4-масала билан таққосланг);
- 2) $\frac{1}{r_1 + r_2} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{R}$, бу ердан $R = \frac{(r_1 + r_2)r_3}{r_1 + r_2 + r_3}$; а) $\frac{r_1 r_3}{r_1 + r_2}$; б) r_3 ;
- 3) $\frac{r_1 r_3}{r_1 + r_2} + r_3 = R$; а) r_3 ; б) $r_1 + r_3$.

3.2. Массаси m га тенг моддий нуқта иккита қарама-қарши йўналган ўзгарувчан $F_1 = k\sqrt{4+t^2}$ ва $F_2 = k\sqrt{1+t^2}$ кучлар таъсирида ҳаракат қилади. Вақт ўзгариши билан ҳаракат текис ҳаракатга яқин бўла боришини, яъни бу нуқтанинг тезланиши нолга чексиз яқинлашиб боришини исбот қилинг.

Е чи ш .

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|F_1 - F_2|}{m} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{k\sqrt{4+t^2} - k\sqrt{1+t^2}}{m} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{4+t^2} + \sqrt{1+t^2}} = 0.$$

3.3. Трубинанинг ишчи гилдираклари ҳаракати $\ln y = -k^2 x^2 + \ln y_0$ тенглама билан ифодаланadi, бу ерда y — айланиш ўқидан x масофада гилдирак қалинлиги; $x=0$ да $y = y_0$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{y_0}$ ни топинг.

Е чи ш . $\ln y = -k^2 x^2 + \ln y_0$ дан:

$$\frac{y}{y_0} = e^{-k^2 x^2} \text{ ва } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{y_0} = 0.$$

3.4. Ярим чексиз ($0 \leq x < +\infty$) қувур бўйлаб газ концентрацияси (зичлиги) нинг вақт ўтиши билан ($0 < t < +\infty$) тақсимланиши (бунда вақтнинг бошланғич ($t=0$) пайтида бутун газ массаси M қувур қирқими (кесим юзининг бирлиги) $x=0$ да тўпланган бўлса)

$$c(x, t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}$$

қўринишда бўлади, бу ерда x — қирқимгача масофа; D — диффузия коэффициенти.

Куйидаги ҳолларнинг ҳар бирида бу концентрация қандай қийматга яқинлашишини топинг:

- а) t вақтнинг жуда кичик ва чексиз ўсган қийматларида қувурнинг исталган нуқтасида;
- б) $x \rightarrow \infty$ да вақтнинг исталган пайтида. Олинган натижаларни тушунтириб беринг;

$$\text{Жавоб: а) } \lim_{t \rightarrow 0} c(x, t) = 0; \lim_{t \rightarrow +\infty} c(x, t) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ \infty, & x = 0. \end{cases}$$

Биринчи тенглик газ қувур бўйлаб тарқалгани сабабли концентрация пасайишини билдиради; иккинчиси — бошланғич пайтда қувурнинг кесилган қирқим (торец) жойида газ йўқлигини билдиради; $c(0, +0) = \infty$ тенглик $x=0$ қирқимда жойлашганда «нуқтавий» M массаси борлиги тўғрисидаги фаразга мос келади.

б) $\lim_{x \rightarrow \infty} c(x, t) = 0$ ($t \neq 0$) вақтнинг исталган пайтида узоклашган сари газ концентрацияси камайиб боришини билдиради.

3.5. Бирор кимёвий жараён шундай утаётган бўлсинки, бунда оралиқлар кетма-кетлиги $[it, (i+1)t]$, $i = 0, 1, 2, \dots$ даги ҳар қайси t вақт оралиғи давомида модда кўпайиш миқдори (кичик t ларда) бу оралиқ бошида бўлган модда миқдорига ва оралиқ катталигига пропорционал бўлсин. Вақтнинг бошланғич пайтида модда миқдори Q_0 бўлсин деб фараз қилиб, t вақт (оралиғи) ўтгандан сўнг модда миқ-

дори $Q_1^{(n)}$ ни топинг, бунда модда миқдори ўсиши t вақт оралигининг ҳар бир n -қисмида $\tau = \frac{t}{n}$ содир бўлади деб олинг. $Q = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_1^{(n)}$ ни топинг.

Ечиш. $T = \tau$ да: $Q_1 = Q_0 + kQ_0\tau = Q_0(1 + k\tau) = Q_0\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right)$, бу ерда k — пропорционаллик коэффициенти.

Худди шундай, $T = 2\tau$ да: $Q_2 = Q_1\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right) = Q_0\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right)^2$;

$T = 3\tau$ да: $Q_3 = Q_2\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right) = Q_0\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right)^3$ ва ҳ.к.

$T = n\tau = t$ да: $Q_n = Q_{n-1}\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right) = Q_0\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right)^n$;

$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_0\left(1 + \frac{k\tau}{n}\right)^n = Q_0 e^{kt}$ — моддалар кўпайиши қонунига эга бўлди.

3.6. Мамлакат аҳолисининг сони йилига 2% ўсади. 100 йил ичида у тахминан неча баравар ўсади. Жавобни 0,01 гача аниқликда ҳисобланг.

Ечиш. Агар мазкур мамлакатдаги дастлабки жами аҳоли сонини A деб белгиласак, у бир йилдан кейин $A + (A/100) \cdot 2 = (1 + 1/50) \cdot A$ га тенг бўлади. Икки йилдан кейин $A(1 + 1/50)^2$ га тенг бўлади. 100 йилдан сўнг эса $A(1 + 1/50)^{100}$ дан иборат бўлади, яъни $\left[(1 + 1/50)^{50}\right]^2$ марта ўсади. Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ эканини ҳисобга олсак, $(1 + 1/50)^{100} = e^2 = 2,72$ деб ёзишимиз мумкин. Демак, мамлакат аҳолиси 100 йил ичида тахминан $e^2 = 7,39$ марта ўсади.

3.7. Ўзгармас ЭЮК E , индуктивлик L ва R қаршилиқдан иборат занжирда токнинг ўзгариш қонуни занжир уланганда қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} - \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right).$$

бу ерда I_0 — вақтнинг $t = 0$ бошланғич пайтдаги ток кучи;

а) вақт ортиши билан бу ток қандай барқарор қийматга яқинлашишини топинг;


б) $I_0 = 0$ бўлсин. Индуктивлик катта ($L > RT$) бўлганда $0 \leq t \leq T$ вақт оралиғида ток нимага тенг?

Олинган натижаларни изоҳлаб беринг.

Курсатма. $0 \leq t \leq T$ да, яъни индуктивлик катта бўлганда (ёки кичик T ларда) ток тақрибан чизиклидир. Жавоб.

а) $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = \frac{E}{R}$; б) $I(t) \sim \frac{E}{R} \left(1 + \frac{R}{L}t\right) = \frac{E}{L}t$.

3.8. Топографияда r радиусли айлана ёйи ABC нинг $f = |BD|$ қаноти (сегмент баландлиги) узунлигининг бу ёйнинг ярмиси AB, B нинг қаноти $f_1 = |B_1D_1|$ га нисбатини топиш зарурати тугилади (78-чизма). Агар марказий бурчак AOB жуда кичик бўлса, бу нисбатнинг тақрибий қийматини топинг.



Ечиш.

$$f = |BD| = |BO| - |DO| = r - r \cos \frac{\alpha}{2} = r \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right) \sim r \frac{\alpha^2}{8};$$

$$f_1 = |B_1D_1| = |B_1O| - |D_1O| = r - r \cos \frac{\alpha}{4} = r \left(1 - \cos \frac{\alpha}{4}\right) \sim r \frac{\alpha^2}{32};$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f_1}{f} = \frac{r \frac{\alpha^2}{32}}{r \frac{\alpha^2}{8}} = \frac{1}{4}.$$

3.9. Ёруғликнинг синдириш коэффициенти n_1 бўлган муҳитдан синдириш коэффициенти n_2 бўлган муҳитга нормал (яъни иккита муҳит чегарасига тик) тушишда ёруғликнинг синиш коэффициенти (яъни қайтган ёруғлик интенсивлиги I_r нинг тушувчи ёруғлик интенсивлиги I_0 га нисбати) қуйидагига тенг:

$$r = \frac{I_r}{I_0} = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2.$$

Ушбу

а) $n_1 = n_2$,

б) $n_2 < n_1$ ҳоллар учун синиш коэффициенти r учун тақрибий формулаларни топинг.

Е чи ш. а) $r = \frac{1}{4n_1^2} (n_1 - n_2)^2$;

б) $r = \left(\frac{1 - \frac{n_2}{n_1}}{1 + \frac{n_2}{n_1}} \right)^2 = \left(1 - \frac{n_2}{n_1} \right)^2 \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right)^{-2} \approx$
 $\approx \left(1 - \frac{2n_2}{n_1} \right) \left(1 - \frac{2n_2}{n_1} \right) \approx 1 - \frac{4n_2}{n_1}$.

3.10. Индуктивлиги L , конденсатор сѳими C ва қаршилиги R бўлган тебраниш контурида заряд тебранишларининг бошланғич амплитудаси (конденсатор қатламларидаги заряд ўзгаришининг $Q = Q(t)$ функцияси)

$$A_0 = \frac{Q_0}{\sqrt{1 - R^2 C / 4L}}$$

га тенг, бу ерда $Q_0 = Q(0)$ — конденсатор қатламларидаги бошланғич заряд

Индуктивлик жуда катта ($L > CR^2$) бўлганда A_0 нинг тақрибий қийматини топинг.

Жавоб: $A_0 = Q_0 + \frac{Q_0 R^2 C}{8L}$.

3.11. Етарлича узунликка эга l узунликдаги коаксиал кабел индуктивлиги

$$L = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

га тенг (СИ ўлчов бирликларида), бу ерда R_1 ва R_2 — ички ва ташқи цилиндрлар радиуслари,

μ_0 — магнит доимийси;

μ — муҳитнинг нисбий магнит синдирувчанлиги.

Юпқа қатлам, яъни $R_2 = R_1$ бўлган ҳол учун L нинг тақрибий (чизиклаштирилган) қийматини топинг.

Е чи ш.

$$L = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right) \approx \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \cdot \frac{L(R_2 - R_1)}{R_1}$$

3.12. Антенналар назариясида қуйидаги боғланиш (муносабат) учрайди:

$$L = L_0 \frac{\operatorname{tg}(\pi l / \lambda)}{2\pi l / \lambda},$$

бу ерда L — тўлқинни узайтиришда антеннанинг динамик ўзиндукцияси;

L_0 — статик ўзиндукция;

l — антеннанинг иш берувчи узунлиги;

λ — антеннанинг тўлқин узунлиги.

Тўлқин узунлиги λ ортиши билан L ўзиндукция нимага яқинлашишини (интилишини) топинг.

Жавоб: $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} L = \frac{L_0}{2}$.

3.13. Бошқариш системасининг силжиб турадиган ба- жарувчи элементи тезланиши $a = k \frac{f(I_1)}{g(I_2)}$ га тенг, бу ерда I_1 — бу системадаги иккита ғалтакдан биринчисидagi, I_2 — иккинчисидagi ток;

$f(I)$, $g(I)$ — берилган системани характерловчи функциялар. Қуйидаги ҳолларда $t = \tau_1$, $t = \tau_2$ моментлар учун a тезланишнинг қийматини топинг ($k = 1$ деб олинг):

а) $f(I) = 2I$, $g(I) = I$, $I_1 = \sin t$, $I_2 = 2t - 2$, $\tau_1 = 0$, $\tau_2 = 1$;

б) $f(I) = I^2$, $g(I) = 1 + I$, $I_1 = \sin t$, $I_2 = -\cos t$, $\tau_1 = 0$,

$\tau_2 = \frac{\pi}{2}$;

в) $f(I) = I^3$, $g(I) = I$, $I' = t^2 - t$, $I_2 = 4\operatorname{tg}(t - 1) - 4\sin(t - 1)$, $\tau = 1$;

г) $f(I) = \sqrt[3]{1 + I} - 1$, $g(I) = \sqrt[3]{1 + I} - 1$, $I_1 = 2\sin \pi t$, $I_2 = \sin \pi t$, $\tau = 1$;

д) $f(I) = 2I$, $g(I) = \ln I$, $I_1 = 0, 5(e^{2t} - 1)$, $I_2 = 1 + \sin t$, $\tau = 0$;

Кўрсатма.

а) $a(t) = \frac{f(I_1(t))}{g(I_2(t))}$ функция $t = \tau_1$ узлуксиз бўлгани учун:

$$a(\tau_1) = \frac{f(I_1(\tau_1))}{g(I_2(\tau_1))} = \frac{(2\sin \pi t)_{t=0}}{2(t-1)_{t=0}} = 0$$

$$a(\tau_2) = \lim_{t \rightarrow \tau} \frac{f(I_1)}{g(I_2)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(2\sin \pi t)}{2(t-1)} = -\pi;$$

б) 2, 1; в) 0, 5; г) 1, 2; д) 2.

3.14. Лампали генераторлар назариясида генераторнинг ФИК токнинг «кертиш бурчаги» θ орқали қуйидаги формула билан ифодаланиши исбот қилинган:

$$\eta = \frac{20 - \sin 2\theta}{4(\sin \theta - \theta \cos \theta)} \cdot \xi,$$

бу ерда ξ — кучланишларда фойдаланиладиган коэффициент.

«Кертиш бурчаги» чексиз камайганда генераторнинг ФИК кучланишлардан фойдаланиш коэффициентига яқинлашишини кўрсатинг.

Ечиш. Лопиталь қондасидан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \eta &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{20 - \sin 2\theta}{4(\sin \theta - \theta \cos \theta)} \cdot \xi = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2}{4(\cos \theta - \cos \theta + \theta \sin \theta)} \cdot \xi = \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 \theta}{40 \sin \theta} \cdot \xi = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \xi = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta}{1} \cdot \xi = \xi. \end{aligned}$$

Бу натижани, шунингдек, Тейлор формуласидан фойдаланиб топиш ҳам мумкин.

3.15. Қуйидаги $I(t)$ токнинг $t \geq 0$ ҳолларда барқарорлашган қийматини (яъни, вақт ўтиши билан ток чексиз яқинлашиб келадиган қийматни) топинг:

а) $I(t) = 2 + 0,5 \cdot e^{-2t} (\cos 3t - 2 \sin 3t)$;

б) $I(t) = I_0 \frac{t^2 + 2t + 1}{2t^2 + t + 4}$; в) $I(t) = I_0 \frac{2t + \sin t}{4t - \sin t}$;

г) $I(t) = 3t \left(\sqrt{t^2 + 1} - t \right)$; д) $I(t) = I_0 \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{t}} - 1}{\sqrt{1 + \frac{1}{t}} - 1}$;

е) $I(t) = I_0 t \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right)$; ж) $I(t) = I_0 \ln \frac{t+2}{t+1}$.

Жавоб. а) 2; б) $0,5I_0$; в) $0,5I_0$; г) 1,5; д) $1,5I_0$; е) 1; ж) I_0 .

3.16. Электрон лампа (триод)га иккита: мусбат ишорали $u_1(t)$ ва манфий ишорали $u_2(t)$ кучланиш берилди. Қуйидаги ҳолларнинг ҳар бирида вақт ўтиши билан лампанинг очилиши рўй беришида, яъни ишора «минусдан» «плюс»га ўзгарганда триод ток ўтказа бошлашини кўрсатинг:

а) $u_1(t) = u_1^* e^t$, $u_2(t) = u_2^* (1 + \alpha t^2)$; $\alpha > 0$;

б) $u_1(t) = u_1^* t^2$, $u_2(t) = u_2^* \ln(\alpha + t)$; $\alpha > 0$;

в) $u_1(t) = u_1^* e^{\alpha t}$, $\alpha > 0$; $u_2(t) = u_2^* [1 + \beta t \ln(1 + t^2)]$, $\beta > 0$.

Курсатма. $\frac{u_2(t)}{u_1(t)}$ нисбатнинг $t \rightarrow \infty$ даги лимитига Лопиталь қондасини татбиқ қилинг.

3.17. Шакллари доиравий стерженлар ва ҳалқалардан иборат жисмларнинг букилма деформацияларини таҳлил қилишда татбиқ қилинадиган қуйидаги лимитларни топинг:

а) $\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\varphi - \sin \varphi}{1 - \cos \varphi}$;

б) $\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \sin \varphi - \frac{1}{2} \varphi \cos \varphi}{\varphi - \sin \varphi}$;

в) $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{4(1 - \cos \alpha)}$;

г) $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2\alpha - \alpha \cos \alpha - \sin \alpha}{4(\alpha - \sin \alpha)}$;

д) $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha}{4} + \frac{\sin \alpha}{4} - \frac{2}{\alpha} \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \sin^2(\alpha/2)}$.

Курсатма. Лопиталь қондаси ёки Тейлор формуласидан фойдаланинг.

Жавоб. а) 0; б) 1; в) 0; г) 1; д) 0.

4. Функция узлуксизлиги

4.1. а) Агар u кучланиш тушишини (пасайишини) бирор (кичик) ϵ миқдор аниқлигида ҳисоблаш керак бўлса, ўтказгичдаги электр токи I ни (бу ўтказгичнинг маълум қаршилиги R маълум бўлганда) ўлчашда қандай хатога йўл қўйиш мумкин? I ни ҳисоблашнинг етарлича юқори аниқликда ҳисоблашга эришиш мумкинлиги тўғрими?

Агар $R = 2$ (ом) қаршилиқ ва u_0 нинг аниқ қиймати 4(в) га тенглиги маълум бўлса, у ҳолда u кучланиш тушишини ўлчашдаги хатолик $\pm 0,2$ (в) дан ошмаган ҳолда I токни ўлчашдаги хато қандай бўлиши мумкинлигини аниқланг.

б) Юқоридаги саволларга $P = I^2 R$ қувватни $\pm 0,4$ (вт) хатоликка йўл қўйиш билан ўлчаш ҳоли учун жавоб беринг.

Курсатма.

а) $|IR - I_0 R| < \epsilon_R$ (бу ерда $I_0 = \frac{u_0}{R} = 2$ (а)) шартдан $|I - I_0| < \frac{\epsilon_R}{R} = \delta$ ни келтириб чиқарамиз. Шундай қилиб, I

ни δ хатолик билан ўлчашда ϵ ни ўлчашдаги хато ϵ дан катта бўлмайди.

Хусусан, $\epsilon = 0,2$ (в) да $\delta = 0,1$ (а), яъни $I \in (1,9; 2,1)$ (а) бўлади.

6) $\delta = \sqrt{I_0^2 + \frac{\epsilon}{R}} - I_0 \leq \frac{\epsilon}{2I_0 R}$ бўлгани учун $\frac{0,4(am)}{2 \cdot 2(a) \cdot 10m} = 0,1$ (в) токни ўлчашдаги аниқлик 0,4 (вт) дан ортмайди.

4.2. Юзи $S = 100 \text{ см}^2$ бўлган квадрат металл пластинка яшаш талаб қилинади. Пластинка юзи унинг лойиҳадаги юзидан йўл қўйиладиган четланишга эга бўлса, у ҳолда унинг бир хил бўлган узунликдаги томонларига (пластинка юзи учун четланишни сақлайдиган) четланишлар кўрсатиш мумкинлиги тўғрими? Агар пластинка юзига четланишлар: а) $\pm 1 \text{ см}^2$; б) $\pm 0,1 \text{ см}^2$; в) $\pm 0,01 \text{ см}^2$ бўлса, у ҳолда пластинка томонига қўйилган четланишлар қандай?

Жавоб: а) 0,05 см; б) 0,005 см; в) 0,0005 см.

4.3. Юқорида — 2.2; 2.3; 2.4; 2.6-масалаларда қаралган функцияларда аргументларнинг кичик ўзгаришларига бу функциялар қийматларининг кичик ўзгаришлари мос келишини исбот қилинг. Кўрсатилган масалалардаги функцияларнинг бу хоссасининг физикавий талқини қандай?

4.4. 2.7; 2.8; 2.11; 2.17; 2.18-масалаларда қаралган функциялар узлуксизми? Элементар функцияларнинг узлуксизлигини маълум деб ҳисоблаймиз. Бу ҳолларда узлуксизлиқнинг физикавий талқини қандай?

4.5. 2.13-масаладаги $W(\varphi)$ функция $[\varphi_0; \varphi_0 + 2\pi]$ оралиқда чегараланганми? Узлуксизми? Мазкур ҳолда бу хоссалар ўртасидаги боғланишнинг физикавий талқини қандай?

4.6. Конденсаторга диэлектрик киритилади. Конденсаторнинг диэлектриксиз сифими C_0 га тенглиги маълум, диэлектрик тулиқ қаратилгандан сўнг эса сифими C_1 ($C_1 > C_0$) га тенг бўлади. Диэлектрикнинг маълум қисми киритилганда конденсаторнинг сифими $C^* = \frac{C_0 + C_1}{2}$ га тенг бўлишини кўрсатинг.

4.7. Товуш сигнали эфирга Ω_0 элтувчи частота билан тарқатилади, бунда Ω_0 частота ω_0 дан ω_1 гача бўлган диапазонда жойлашиши маълум. Вақт ўтиши билан приёмник частотаси ω қандай ўзгарганда (яъни созлаш қандай бўлганда) узатувчининг частотасини (яъни сигнал) сезиб қилинади?

Жавоб. $\omega = \omega(t)$ функциянинг узлуксизлиги талаб қилинади, бу ерда $t \in [t_0, t_1]$, $\omega(t_0) = \omega_0$, $\omega(t_1) = \omega_1$ (ёки $\omega(t') = \omega_0$, $\omega(t'') = \omega_1$, бу ерда $t', t'' \in [t_0, t_1]$).

4.8. 2.21-масалада қаралган $V(t)$ кучланишни улашлар маълум вақт оралиғида $V(t_1) = 2$ (в), $V(t_2) = 10$ (в) натижаларни берган бўлсин. Кучланишнинг бу вақт оралиғидаги қийматлари тўғрисида нима дейиш мумкин?

Жавоб. Кучланишнинг оралиқ қийматлари 2 (в) дан 10 (в) гача бўлган барча қийматлардан иборат бўлади.

4.9. Тарқатувчи антеннанинг йўналтирилганлик диаграмма характеристикаси, яъни антенна тарқатаётган сигнал ўзгармас бўлган чизиқ $r = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \sin \varphi)}{\cos \varphi}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ тенглик билан берилади. φ аргумент $\pm \frac{\pi}{2}$ га яқинлашганда r нинг қиймати чексиз камайиб кетади, яъни диаграмма нуқта орқали ўтади. Чизиқнинг чексиз кичик функция эканлигини аниқланг.

$$\text{Е ч и ш. } \lim_{\varphi \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} r(\varphi) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \alpha)}{\sin \alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin[\frac{\pi}{2}(1 - \cos \alpha)]}{\alpha} =$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2}(1 - \cos \alpha)}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2} \alpha^2}{\alpha} = 0.$$


Бу натижани Лопиталь қоидадан фойдаланиб топиш ҳам мумкин.

4.10. Эҳтимоллар назариясида ушбу «логарифмик нормал қонун» қаралади:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - m)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$y = f(x)$ эгри чизиқ узлуксиз эканини кўрсатинг, унинг графигини ясанг.

Кўрсатма. $f(x)$ функция учун $r = \ln(x)$ алмаштириш бажариш ёрдамида $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{r \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(r-m)^2} = +0$ га



79-чизма.

эга буламиз ва худди шундай алмаштириш ёрдамида $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +0$ ни топиш мумкин.

4.11. Юқорида 2.1-масалала қаралган осциллограммаларнинг $u(t)$ кучланишларининг сакраш нуқталари (t^*) ва кучланиш сакраши қиймати ($h = u(t^+ - 0) - u(t^- - 0)$) ни топинг.

4.12. Агар K калит τ пайтда (бунда $0 < \tau < T$) уланса, у ҳолда занжирдаги узгармас u_0 кучланиш остида бўлган $I(t)$ (бунда $0 \leq t \leq T$) ток графигини ясанг (79-чизмага қаранг).

Узилиш нуқталари t^* ва сакраш катталиги h ни аниқлаб, $I(t)$ функциянинг узлуксизлигини текширинг.

Жавоб.

$$I(t) = \begin{cases} \frac{u_0}{r_1}, & t \in [0, \tau]; \\ \frac{u_0}{r_1 + r_2}, & t \in [\tau, T]. \end{cases}$$

$$t^* = \tau, \quad h = \frac{u_0 r_2}{r_1(r_1 + r_2)}.$$

4.13. Қуйидаги ҳолларда $u(t)$ ($t > 0$) кучланиш узлуксиз ўзгариб турадиган интервалларни кўрсатинг ва сакраш нуқталари (t^*) ҳамда сакраш катталиги (h) ни аниқланг:

а) $u(t) = u_0 e^{-\omega t} \sin(\omega t + \varphi)$; б) $u(t) = u_0 \arctg \frac{1}{t}$;
 в) $u(t) = u_0 \arctg \frac{1}{t}$; г) $u(t) = \frac{u_0}{1 + e^{\frac{1}{t}}}$.

Жавоб. б) $t^* = 0$, $h = \pi u_0$; г) $t^* = 1$, $h = -u_0$.

4.14. $F(t)$ — юк ортиш чоғида темир йўл платформасига бўлган босим кучини тақрибан ифодаловчи функция бўлсин. Қуйидаги ҳолларда катта тош бўлагининг платформа юзи (поли)га урилиш моментлари t^* ни топинг

а) $F(t) = F_0 \cdot (e^t - 1) + f_0 \cdot \eta(t - \tau)$, $0 \leq t \leq \tau$,

бу ерда $\eta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$ — Хевисайднинг бирлик функцияси.

б) $F(t) = F_0 t + \frac{f_0}{\cos \frac{\pi t}{T}}$, $0 \leq t \leq T$.

Жавоб. а) $t^* = \tau$; б) $t^* = \frac{T}{2}$.

5. Ҳосила

5.1. Тормозланиш пайтида маховик t сек давомиди $\varphi = 3 + 8t - t^2$ бурчакка бурилади. 1) вақтнинг $t = 3$ сек моментиди маховик айланишининг бурчак тезлигини топинг; 2) t моментдаги бурчак тезланишни топинг; 3) маховик тухтайдиган вақт momenti t ни топинг.

Ечиш. 1) ω бурчак тезлик деб, φ бурчакнинг t вақт давомиди ўзгариш тезлигига айтади. Бурчак тезлик бурилиш бурчаги φ дан t вақт бўйича олинган ҳосилага тенг:

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = 8 - 2t.$$

$t = 3$ сек да бурчак тезликни топамиз:

$$\omega_{t=3} = 8 - 2 \cdot 3 = 2 \text{ рад/сек.}$$

2) ϵ бурчак тезланиш ω бурчак тезликдан t вақт бўйича олинган ҳосилага тенг:

$$\epsilon = \frac{d\omega}{dt} = -2 \text{ рад/сек}^2.$$

3) $\omega = 0$ деб, t ни топамиз:

$$8 - 2t = 0, \quad t = 4 \text{ сек.}$$

5.2. Жисм температураси T нинг t вақтга боғлиқ ҳолда ўзгариши $T = 0,2t^2$ тенглама билан берилган. Вақтнинг $t = 10$ сек моментиди бу жисм қандай тезлик билан қизийди?

Ечиш. Жисм қиздирилганда унинг T температураси t вақтга боғлиқ ҳолда ўзгаради, яъни у t вақтнинг функцияси: $T = f(t)$. Жисмнинг қизиш тезлиги T температуранинг t вақт бўйича ҳосиласи $\frac{dT}{dt}$ дан иборатдир:

$$\frac{dT}{dt} = 0,4t; \quad \left(\frac{dT}{dt}\right)_{t=10\text{сек}} = 0,4 \cdot 10 = 4.$$

Вақтнинг $t = 10$ сек momentiда жисм секундида турт градус тезлик билан қизийди.

5.3. Ток кучи I вақт t га боғлиқ ҳолда $I = 0,4t^2$ (I амперларда, t секундларда) қонун бўйича ўзгаради. Саккизинчи секунд охирида ток кучи ўзгаришининг тезлигини топинг.

Ечиш. Ток кучи ўзгаришининг тезлиги I токдан t вақт бўйича олинган ҳосилага тенг:

$$\frac{dI}{dt} = 0,8t; \quad \left(\frac{dI}{dt}\right)_{t=8\text{сек}} = 0,8 \cdot 8 = 6,4 \text{ А/сек.}$$

5.4. I ток кучининг t вақтга боғлиқ ҳолда ўзгариши $I = 2t^2 - 5t$ тенглама билан берилган (I ампер ҳисобида, t секунд ҳисобида). 10-сек охирида ток кучининг ўзгариш тезлигини топинг.

5.5. Тик юқорига отилган жисмнинг кўтарилиш баландлиги $S = \vartheta_0 t - 4,9t^2$ тенгламадан топилади, бу ерда t — жисм s (метр ҳисобида) баландликка эришиши учун кетган вақт (секунд ҳисобида), ϑ_0 — бошланғич тезлик (м/сек). Агар $\vartheta_0 = 100$ м/сек бўлса, жисмнинг $t = 5$ сек моментдаги тезлиги ва тезланишини топинг (ҳавонинг қаршилигини ҳисобга олманг). Неча секунддан сўнг жисм энг юқори нуқтага эришади ва бу ердан қанча масофада рўй беради?

Ечиш.

$$s = 100t - 4,9t^2; \quad v = \frac{ds}{dt} = 100 - 9,8t;$$

$$v_{t=5} = 100 - 9,8 \cdot 5 = 51 \text{ м/сек}; \quad a = \frac{dv}{dt} = -9,8 \text{ м/сек}^2.$$

Жисм энг юқори нуқтага тезлиги нолга тенг бўлганда эришади, шунинг учун $v_0 = 0$ деб, s ни топамиз:

$$s = 100 \cdot 10,2 - 4,9(10,2)^2 = 510 \text{ м.}$$

5.6. Жисм ер сиртидан $v_0 = 50$ м/сек бошланғич тезлик билан юқорига тик отилган: 1) $t = 3$ сек моментдаги кўтарилиш баландлигини; 2) $t = 3$ сек моментдаги тезлик ва тезланишни; 3) жисм кўтарилган энг юқори нуқтани ва бу нуқтага кўтарилиш учун кетган вақтни топинг.

5.7. R радиусли доирага ички чизилган барча тўғри тўртбурчаклар ичидан энг катта юзга эга бўлганини топинг.

Ечиш. Доирага ички чизилган тўғри тўртбурчакнинг диагонали $2R$ га тенг; тўғри тўртбурчакнинг томонларидан бирини x билан белгилаймиз, у ҳолда иккинчи томон $2\sqrt{R^2 - x^2}$ бўлади. Тўғри тўртбурчакнинг юзи ўзгарувчи миқдор ва уни u билан белгилаб,

$$u = x \cdot \sqrt{4R^2 - x^2}, \quad (0 < x < R)$$

ни ҳосил қиламиз.

Бу функцияни биринчи тартибли ҳосила ёрдамида текширамиз:

$$1) \quad u' = x' \cdot \sqrt{4R^2 - x^2} + (\sqrt{4R^2 - x^2})' \cdot x = \sqrt{4R^2 - x^2} -$$

$$= \frac{2x \cdot x}{2\sqrt{4R^2 - x^2}} = \frac{\sqrt{4R^2 - x^2}}{\sqrt{4R^2 - x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{4R^2 - x^2}} = \frac{4R^2 - x^2 - x^2}{\sqrt{4R^2 - x^2}} = \frac{4R^2 - 2x^2}{\sqrt{4R^2 - x^2}};$$

$$2) \quad \frac{4R^2 - x^2 - x^2}{\sqrt{4R^2 - x^2}} = 0, \quad 4R^2 - 2x^2 = 0, \quad x = R\sqrt{2};$$

$$3) \quad y' = \frac{2(2R^2 - x^2)}{\sqrt{4R^2 - x^2}} = \frac{2(2R^2 - x^2)(R\sqrt{2} + x)}{\sqrt{4R^2 - x^2}}; \quad y'_{x=R\sqrt{2}} = (+)(+) = (+);$$


$$y'_{x < R\sqrt{2}} = (-)(+) = (-).$$

Ҳосила ишорасини $(+)$ дан $(-)$ га ўзгартиряпти, демак, функция $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ да максимумга эга.

Тўғри тўртбурчакнинг томонлари $x = R\sqrt{2}$ ва $\sqrt{4R^2 - (R\sqrt{2})^2} = \sqrt{4R^2 - 2R^2} = \sqrt{2R^2} = R\sqrt{2}$ га тенг.

Тўғри тўртбурчакнинг томонлари тенг, демак, доирага ички чизилган тўғри тўртбурчаклар ичида юзи энг катта бўлгани квадратдир.

5.8. R радиусли доирага ички чизилган барча тўғри тўртбурчаклар ичидан энг катта периметрга эга бўлганини топинг.



80-чизма.

5.9. R радиусли ярим доирага энг катта юзга эга бўлган тўғри тўртбурчакни ички чизинг.

Е ч и ш. Тўғри тўртбурчакнинг томонларидан бирини x билан белгилаймиз (80-чизма). Иккинчи томонни x томон ва R радиус орқали Пифагор теоремасига кўра ифодалаймиз:

$$\sqrt{R^2 - x^2}.$$

Томонлари x ва $2\sqrt{R^2 - x^2}$ бўлган тўғри тўртбурчакнинг юзи ўзгарувчи миқдор; уни y билан белгилаб,

$$y = x \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2} = 2x\sqrt{R^2 - x^2}, \quad (0 < x < R)$$

ни ҳосил қиламиз.

Бу функцияни биринчи тартибли ҳосила ёрдамида текширамиз:

$$1) y' = 2 \left[x' \sqrt{R^2 - x^2} + (\sqrt{R^2 - x^2})' x \right] = \\ = 2 \left(\sqrt{R^2 - x^2} + \frac{-2xx'}{2\sqrt{R^2 - x^2}} \right) = 2 \left(\frac{R^2 - x^2 - x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right) = \frac{2(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}};$$

$$2) y' = \frac{2(R^2 - x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 0, \quad R^2 - 2x^2 = 0; \quad x = \frac{R}{\sqrt{2}};$$

$$3) y' = \frac{4 \left(\frac{R^2}{2} - x^2 \right)}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{4 \left(\frac{R}{\sqrt{2}} - x \right) \left(\frac{R}{\sqrt{2}} + x \right)}{\sqrt{R^2 - x^2}}; \quad y'_{x=\frac{R}{\sqrt{2}}} = (+)(+) = (+)$$

$$y'_{x=\frac{d}{\sqrt{2}}} = (-)(+) = (-).$$

Ҳосила ишорасини (+) дан (-) га ўзгартиряпти, демак, функция $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ да максимумга эга.

Тўғри тўртбурчакнинг томонлари $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ ва $2\sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2} = 2\sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = 2\sqrt{\frac{R^2}{2}} = \frac{2R}{\sqrt{2}}$ га тенг.

Тўғри тўртбурчак томонларининг нисбати: $\frac{R}{\sqrt{2}} : \frac{2R}{\sqrt{2}} = 1 : 2$.

5.10. Маълумки, тўсиннинг сиқишга бўлган қаршилиги кесим юзига пропорционал. d диаметрли думалоқ холадан кесим юзи тўғри тўртбурчак бўлган шундай тўсин қирқиб олиш керакки, унинг сиқишга бўлган қаршилиги энг катта бўлсин.

Е ч и ш. Агар тўғри тўртбурчакнинг томонларидан бирини x билан белгиласак, унинг иккинчи томони $\sqrt{d^2 - x^2}$ бўлади. Кесим юзи — ўзгарувчи миқдор: $x\sqrt{d^2 - x^2}$.

Тўсиннинг сиқишга бўлган қаршилигини p билан, ўзгармас бўлган пропорционаллик коэффициентини k билан белгилаб,

$$p = kx\sqrt{d^2 - x^2} \quad (0 < x < d)$$

ни ҳосил қиламиз.

Ҳосил бўлган функцияда $k = 1$ деб оламиз, у ҳолда $p = x\sqrt{d^2 - x^2}$. Бу функцияни биринчи тартибли ҳосила ёрдамида текширамиз:

$$1) p' = x' \sqrt{d^2 - x^2} + (\sqrt{d^2 - x^2})' x = \sqrt{d^2 - x^2} + \frac{(-2x)x'}{2\sqrt{d^2 - x^2}} = \\ = \frac{d^2 - x^2 - x^2}{\sqrt{d^2 - x^2}} = \frac{d^2 - 2x^2}{\sqrt{d^2 - x^2}};$$

$$2) p' = \frac{d^2 - 2x^2}{\sqrt{d^2 - x^2}} = 0, \quad x = \frac{d}{\sqrt{2}};$$

$$3) y' = \frac{2 \left(\frac{d^2}{2} - x^2 \right)}{\sqrt{d^2 - x^2}} = \frac{2 \left(\frac{d}{\sqrt{2}} - x \right) \left(\frac{d}{\sqrt{2}} + x \right)}{\sqrt{d^2 - x^2}}; \quad p'_{x=\frac{d}{\sqrt{2}}} = (+)(+) = (+); \\ p'_{x=\frac{d}{\sqrt{2}}} = (-)(+) = (-).$$

Ҳосила ишорасини (+) дан (-) га ўзгартиряпти, демак, функция $x = \frac{d}{\sqrt{2}}$ да максимумга эга.

$$\text{Тўғри тўртбурчакнинг томонлари } x = \frac{d}{\sqrt{2}} \text{ ва } \sqrt{d^2 - \left(\frac{d}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{d^2 - \frac{d^2}{2}} = \sqrt{\frac{d^2}{2}} = \frac{d}{\sqrt{2}} \text{ га тенг.}$$

Тўсиннинг кесими — томони $\frac{d\sqrt{2}}{2} = 0,707d$ булган квадратдан иборат.

5.11. ON тўғри чизикли катта асосий қатнов йўлидан $AB = b$ масофада завод жойлашган. Шу заводга сув қувурининг тармоғини ўтказиш керак. Агар сув қувури тармоғининг узунлик бирлиги нархи OD , DN ва DB йўналишлар бўйича мос равишда k_1 , k_2 ва k_3 сўмга тенг бўлса, у ҳолда ON катта асосий йўлнинг D нуқтасидан DB тўғри чизикли шундай йўлни ўткази керакки, натижада шу йўлдан заводга ўтказилган сув қувури тармоғининг нархи энг арзон бўлсин (81-чизма).


Е ч и ш . $OD = x$ бирлик узунлик ва $OA = a$, $ON = l$ деб белгилаймиз. У ҳолда сув қувури тармоғининг OD қисми нархи k_1x , DN қисми нархи $k_2(l-x)$, DB қисми нархи эса $k_3 \cdot \sqrt{(a-x)^2 + b^2}$ сўмга тенг бўлади. Умумий нарх

$$k = k_1x + k_2(l-x) + k_3 \cdot \sqrt{(a-x)^2 + b^2}$$

сўмга тенг бўлади. Натижада бир ўзгарувчи функцияни ҳосил қилдик. Унинг экстремумини текшираимиз. Бунинг учун k дан x бўйича биринчи ва иккинчи тартибли ҳосила оламиз:

$$\frac{dk}{dx} = k_1 - k_2 - \frac{k_3(a-x)}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}},$$

$$k_1 - k_2 - \frac{k_3(a-x)}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}} = 0, \quad \frac{a-x}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}} = \frac{k_1 - k_2}{k_3} \quad (1)$$



81-чизма.

464

$$\frac{d^2k}{dx^2} = \frac{k_3 b^2}{\sqrt{[(a-x)^2 + b^2]^3}} > 0$$

булгани учун (1) ни қаноатлантирадиган x нинг қиймати минимум нуқтаси бўлади.

Бу масалани $BDA = \alpha$ бурчакни аниқлаш усули билан ҳам ечиш мумкин.

81-чизмага кўра

$$\cos \alpha = \frac{a-x}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}} \quad (2)$$

ни ҳосил қиламиз. У ҳолда (1) га кўра:

$$\cos \alpha = \frac{k_1 - k_2}{k_3} \quad (3)$$

(бунда $k_1 - k_2 < k_3$ бўлишини талаб қиламиз). Демак, DB — чизик бўйича йўлни (3) тенгликни қаноатлантирадиган α бурчак остида ўтказиш керак экан. Энди x нинг қийматини аниқлаймиз, бунинг учун (2) нинг ҳар иккала томонини квадратга кўтарамиз:

$$\frac{(a-x)^2}{(a-x)^2 + b^2} = \cos^2 \alpha \Rightarrow \frac{(a-x)^2 + b^2}{(a-x)^2} = \sec^2 \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{b^2}{(a-x)^2} = \sec^2 \alpha \Rightarrow \frac{b^2}{(a-x)^2} \tan^2 \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a-x}{b}\right)^2 = \cot^2 \alpha \Rightarrow \frac{a-x}{b} = \cot \alpha \Rightarrow x = a - b \cot \alpha,$$

бу ифодага a , b ва (3) формула ёрдамида аниқланган α нинг қийматини қўйсақ, изланаётган D нуқтанинг абсциссасига эга бўламиз.

6. Аниқмас ва аниқ интеграллар

6.1. Жисмининг тўғри чизикли ҳаракат тезлиги $v = 3t^2 - 2t$ тенглама билан берилган. s йўлнинг тенгламасини топинг.

Е ч и ш . Маълумки, жисмининг тўғри чизикли ҳаракати тезлиги s йўлдан t вақт бўйича олинган ҳосилага тенг: $v = \frac{ds}{dt} = 3t^2 - 2t$, бундан, $ds = (3t^2 - 2t)dt$. Интеграллаймиз:

$$\int ds = \int (3t^2 - 2t) dt, \quad s = t^3 - t^2 + C.$$

6.2. Нуқтанинг тўғри чизиқли ҳаракат тезлиги $v = 3t^2 - 8t + 2$ тенглама билан берилган. Нуқтанинг ҳаракат тенгламасини топинг.

6.3. Жисмнинг тўғри чизиқли ҳаракат тезлиги $v = 3t^2 + 4$ тенглама билан берилган. Агар $t = 2$ сек вақт ичида жисм 20 м ўтган бўлса, s йўлнинг тенгламасини топинг.

Е ч и ш. $v = \frac{ds}{dt} = 3t^2 + 4$, бундан, $ds = (3t^2 + 4)dt$. Интеграллаймиз:

$$\int ds = \int (3t^2 + 4)dt, \quad s = t^3 + 4t + C.$$

Бошланғич шартлардан C ни топамиз: $20 = 2^3 + 4 \cdot 2 + C$, $C = 4$. Жисмнинг ҳаракат тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$s = t^3 + 4t + 4.$$

6.4. Агар жисм ҳаракатнинг бошланғич моментида тинч ҳолатда бўлса, эркин тушаётган жисмнинг ўзгармас g тезланишда ҳаракатланиш қонунини топинг.

Е ч и ш. Маълумки, тўғри чизиқли ҳаракат қилаётган жисмнинг a тезланиши s йўлнинг t вақт бўйича олинган иккинчи тартибли ҳосиласи ёки v тезлиқнинг t вақт бўйича олинган ҳосиласидир: $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$, аммо $a = g$, демак, $\frac{dv}{dt} = g$, бундан $dv = gdt$. Интеграллаймиз:

$$\int dv = \int gdt, \quad v = gt + C_1.$$

Бошланғич шартлар $t = 0$, $v = 0$ га кўра C_1 ни топамиз:

$$0 = g \cdot 0 + C_1, \quad C_1 = 0.$$

Ҳаракат тезлиги тенгламасига эга бўлдик: $v = gt$.

Энди жисмнинг ҳаракат қонунини топамиз: $v = \frac{ds}{dt}$, аммо $v = gt$, демак, $\frac{ds}{dt} = gt$ ёки $ds = gtdt$. Интеграллаймиз:

$$\int ds = \int gtdt, \quad s = \frac{gt^2}{2} + C_2.$$

Бошланғич шартлар $t = 0$, $s = 0$ га кўра C_2 ни топамиз:

$$0 = g \cdot \frac{0^2}{2} + C_2, \quad C_2 = 0.$$

Тушаётган жисмнинг ҳаракат тенгламасига эга бўлдик:

$$s = \frac{gt^2}{2}.$$

6.5. Жисмнинг ҳаракат тезлиги $v = (12t - 3t^2)$ м/сек тенглама билан берилган. Жисмнинг ҳаракат бошлангандан то тўхтагунига қадар босиб ўтган йўлини топинг.

Е ч и ш. Жисмнинг ҳаракат бошланган ва тўхтаган пайтдаги тезлиги нолга тенг. Жисмнинг тўхташ моментини топамиз, бунинг учун тезлиқни нолга тенглаб, тенгламани t га нисбатан ечамиз:

$$12t - 3t^2 = 0, \quad t(4 - t) = 0, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 4 \text{ сек.}$$

$s = \int_0^4 f(t) dt$ формула бўйича s ни ҳисоблаймиз:

$$s = \int_0^4 (12t - 3t^2) dt = (6t^2 - t^3) \Big|_0^4 = 32 \text{ м.}$$

6.6. Икки жисм бир пайтда бир нуқтадан тўғри чизиқ бўйлаб бир хил йўналишда ҳаракатлана бошлади. Биринчи жисм $v = (12t^2 + 2t)$ м/сек тезлиқ билан ҳаракатланди, иккинчиси эса $v = (4t + 5)$ м/сек тезлиқ билан ҳаракатланди. 5 сек.дан кейин улар орасидаги масофа қандай бўлади?

Е ч и ш. Биринчи ва иккинчи жисм ўтган йўлни $s = \int_0^5 f(t) dt$ формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$s_1 = \int_0^5 (12t^2 + 2t) dt = (4t^3 + t^2) \Big|_0^5 = 275 \text{ м,}$$

$$s_2 = \int_0^5 (4t + 5) dt = (2t^2 + 5t) \Big|_0^5 = 75 \text{ м,}$$

$$s_1 - s_2 = 275 - 75 = 200 \text{ м.}$$

6.7. Икки жисм бир пайтда бир нуқтадан тўғри чизиқ бўйлаб бир томонга қараб ҳаракатлана бошлади. Биринчи жисм $v = 3t^2$ м/сек тезлиқ билан ҳаракатланмоқда, иккинчиси эса $v = (6t^2 - 10)$ м/сек тезлиқ билан ҳаракатланмоқда. 10 сек.дан кейин улар орасидаги масофа қандай бўлади?

6.8. Винт пружинанинг x сиқилиши пружинага қуйилган F кучга пропорционал. Агар пружинани 0,01 м сиқиб учун 10 Н куч керак бўлса, пружинани 0,04 м сиқиб учун керак бўладиган F куч бажарган ишни ҳисобланг.

Е чи ш. $F = 10$ Н бўлганда $x = 0,01$ м. $F = kx$ формула бўйича k ни топамиз: $10 = k \cdot 0,01$, бундан $k = 1000$ Н/м. k нинг топилган қийматини $F = kx$ формулага қўйиб, ушбуни ҳосил қиламиз: $F = 1000x$, яъни $f(x) = 1000x$.

Интеграллаш чегараларини 0 дан 0,04 гача олиб, изланаётган ишни ҳисоблаймиз:

$$A = \int_0^{0,04} 1000x dx = 1000 \frac{x^2}{2} \Big|_0^{0,04} = 0,8 \text{ (Ж)}.$$

6.9. 80 Н куч пружинани 0,02 м чўзади. Пружинанинг дастлабки узунлиги 0,15 м. Пружинани 0,2 м гача чўзиш учун қанча иш бажариш керак?

Е чи ш. k ни топамиз: $80 = k \cdot 0,02$, бундан $k = \frac{80}{0,02} = 4000$ (Н/м). k нинг топилган қийматини ўрнига қўйиб, $F = 4000x$ ни ҳосил қиламиз, яъни $f(x) = 4000x$.

Интеграллаш чегараларини 0 дан 0,05 гача олиб изланаётган ишни топамиз:

$$A = \int_0^{0,05} 4000x dx = 4000 \frac{x^2}{2} \Big|_0^{0,05} = 2000 \cdot 0,0025 = 5 \text{ (Ж)}.$$

6.10. Агар жисм $M(4;0)$ нуқтадан Ox ўқ бўйлаб $v = 2t + 3t^2$ тезлик билан ҳаракатлана бошлаган бўлса, жисмнинг ҳаракатланиш тенгламасини тузинг.

Е чи ш. Тўғри чизиқли ҳаракатда тезлик йўлдан вақт бўйича олинган ҳосиллага тенг. Йўлни x билан белгилаб, ушбуга эга бўламиз: $v = \frac{dx}{dt}$, у ҳолда $\frac{dx}{dt} = 2t + 3t^2$ ёки $dx = 2t dt + 3t^2 dt$. Интеграллаб топамиз: $x = t^2 + t^3 + C$. Бошланғич шартлардан C ни топамиз. Масаланинг шартида $t = 0$ бўлганда $x = 4$ бўлиши берилган. Бу қийматларни умумий ечимга қўйиб, $C = 4$ ни топамиз.

Жисмнинг Ox ўқ бўйича тўғри чизиқли ҳаракат тенгламаси

$$x = t^2 + t^3 + 4$$

кўринишда бўлади.

6.11. Суяқликда айланаётган дискнинг бурчак тезлиги ишқаланиш ҳисобига секинлашади. Ишқаланиш бурчак тезликка пропорционал эканлиги аниқланган. 1) агар диск $t = 0$ бўлганда 12 рад/сек тезлик билан айланган

бўлиб, $t = 10$ секда эса унинг тезлиги 8 рад/сек бўлган бўлса, диск $t = 12$ сек моментда қандай тезлик билан айланишини топинг; 2) вақтнинг қайси momentiда унинг 1 рад/сек тезлик билан айланишини топинг.

Е чи ш. 1) Дискнинг айланиш қонунини t вақтнинг функцияси сифатида тузамиз. ω — диск айланишининг бурчак тезлиги бўлсин, у ҳолда диск айланишининг ишқаланиш кучлари таъсири остида секинлашиши $\frac{d\omega}{dt}$ бўлади.

Масаланинг шартига кўра:

$$\frac{d\omega}{dt} = k\omega, \quad (1)$$

бунда k — пропорционаллик коэффициент. Ўзгарувчиларни ажратамиз:

$$\frac{d\omega}{\omega} = k dt. \quad (2)$$

2) (2) тенгламанинг иккала қисмини интеграллаймиз:

$$\int \frac{d\omega}{\omega} = k \int dt, \ln \omega = kt + C, \quad (3)$$

бундан

$$\omega = e^{kt+C}, \omega = e^{kt} e^C,$$

$$\omega = e^{kt} C_1 \text{ ёки } \omega = C_1 e^{kt}. \quad (4)$$

3) $t = 10$ сек ва $\omega = 12$ рад/сек бошланғич шартларда ўзгармас миқдор C_1 ни топамиз. Бу қийматларни (4) тенгламага қўйиб, C_1 ни топамиз:

$$12 = C_1 e^{k \cdot 10}, 12 = C_1.$$

C_1 нинг қийматини (4) тенгламага қўйиб, ушбуни ҳосил қиламиз:

$$\omega = 12e^{kt}. \quad (5)$$

4) Дастлаб берилганлар $t = 10$ сек ва $\omega = 8$ рад/сек га мувофиқ, k нинг сон қийматини топамиз. Бу қийматларни (5) тенгламага қўямиз:

$$8 = 12e^{k \cdot 10},$$

бундан

$$e^{10k} = \frac{2}{3}, 10k \lg e = \lg 2 - \lg 3,$$

$$k = \frac{\lg 2 - \lg 3}{10 \lg e} = -\frac{\lg 3 - \lg 2}{10 \lg e} = -\frac{0,4771 - 0,3010}{10 \cdot 0,4343} = -0,0405.$$

k нинг қийматини (5) тенгламага қўямиз:

$$\omega = 12e^{-0,0405t} \quad (6)$$

5) Дискнинг $t = 120$ сек вақт momentiдаги айланиш тезлигини топамиз. (6) тенгламага $t = 120$ сек қийматни қўямиз:

$$\omega = 12e^{-0,0405 \cdot 120} = 12e^{-4,9} = 0,09 \text{ рад/сек.}$$

6) Диск 1 рад/сек тезлик билан айланадиган вақт momentини топамиз. (6) тенгламага $\omega = 1$ қийматни қўямиз ва t ни топамиз:

$$1 = 12e^{-0,0405t}, \text{ бундан } e^{-0,0405t} = \frac{1}{12};$$

$$-0,0405t \lg e = \lg 1 - \lg 12, \quad t = \frac{\lg 12}{0,0405 \lg e} = 61 \text{ сек.}$$

6.12. Суюқликда айланаётган дискка таъсир қилаётган секинлаштирувчи куч бурчак тезликка пропорционал. Агар диск $t = 0$ бўлганда 20 рад/сек тезлик билан, $t = 8$ да эса 16 рад/сек тезлик билан айланса, дискнинг 2 рад/сек тезлик билан айланадиган вақт momentини топинг.

6.13. Электр эгловчи $+e$ заряд электр майдонида эгловчи $+e$ заряд ҳосил қилиб ҳаракатланади. Кулон қонунига кўра эгловчи иккита зарядлар орасидаги қарма-қарши кучларнинг сонли қиймати


$$F = \frac{e_1 e_2}{r^2}$$

формула билан аниқланади (82-чизма). $+e$ заряддан ўтувчи A ва B нуқталар тўғри чизикда ётади деб, e_1 заряднинг A нуқтадан B нуқтага кўчишдаги ишни аниқланг.

Ечиш. dr га кўчишдаги элементар иш

$$dA = Fdr = \frac{e_1 e}{r^2} dr$$

га тенг. Тўлиқ иш эса



82-чизма.

$$A = \int_1^2 \frac{e_1 e}{r^2} dr = e_1 e \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_1^2 = e_1 e \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{1} \right)$$

$$A = e_1 e \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right)$$

ифода билан аниқланади. Бунда қавс ичидаги ифода потенциаллар айирмаси ёки A ва B нуқталар орасидаги кучланишни ифодалайди.

6.14. Бурчак тезлиги ω бўлган айланувчи валга радиуси R бўлган диск маҳкамланган ва у суюқликка ботирилган. Суюқликка ишқаланиш кучи диск сирти суюқликнинг ρ чизигига, тезлик квадратига ва ишқаланиш юзига тўғри пропорционал деб, вал ўқиға нисбатан ишқаланиш куч momentини аниқланг.

Ечиш. Дискнинг сиртига суюқликнинг ишқаланиш кучи чуқурлашган сари ўзгаради. Шунинг учун дастлаб элементар ишқаланиш кучи dF ни ҳисоблаймиз.

Вал ўқидан узокликда ички радиуси r ва ташқи радиуси $r + dr$ бўлган халқани кўрамиз (83-чизма). Халқанинг юзи

$$\pi(r + dr)^2 - \pi r^2 = 2\pi r dr + \pi dr^2$$

га тенг. Бунда dr га нисбатан dr^2 нинг тартиби юқори бўлган чексиз кичик миқдор бўлгани учун уни ташлаб, халқанинг юзини $2\pi r dr$ га тенг деб олишимиз мумкин. Чизикли тезлик $v = \omega r$ га тенг. Масала шартига кўра унинг квадрати $\omega^2 r^2$ га тенг, суюқлик зичлиги ρ . Шунинг учун пропорционаллик коэффициентини k ва вал ўқидан r масофадаги элементар ишқаланиш кучи dF учун

$$dF = k\rho 2\pi r dr \omega^2 r^2$$

ни ҳосил қиламиз, вал ўқиға нисбатан momentини

$$dm = r dF = (k\rho 2\pi r dr \omega^2 r^2) r,$$

$$dm = 2\pi k\rho \omega^2 r^4 dr.$$



83-чизма.

Бу ифодани 0 дан R гача интегралласак, у ҳолда тулиқ ишқаланиш куч моментини топамиз:

$$m = 2\pi k \rho \omega^2 \int_0^R r^4 dr = 2\pi k \rho \omega^2 \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^R = 2\pi k \rho \omega^2 \cdot \frac{R^5}{5}.$$

Агар дискнинг иккала сиртини назарга олсак, у ҳолда тулиқ ишқаланиш куч momenti

$$M = \frac{4}{5} \pi k \rho \omega^2 R^5$$

ифодага тенг бўлади.

6.15. a см узунликка эга бўлган AB кесмада P нуқта олинган. Томонлари AP ва PB кесмалардан иборат тўғри тўртбурчак юзининг S_m ўрта қийматини топинг.

Е ч и ш. A нуқтани бошланиш нуқтаси деб қабул қиламиз. P нуқта A нуқтадан x масофада ётган бўлсин. У ҳолда $AP = x$, $PB = a - x$ бўлади. Томонлари AP ва PB бўлган тўғри тўртбурчакнинг юзи $x(a-x)$ га тенг. Юзларнинг ўртача қийматини топиш формуласидан фойдаланамиз:

$$S_m = \frac{1}{a} \int_0^a x(a-x) dx = \frac{1}{a} \left(\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{1}{a} \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{a^3}{6} = \frac{a^2}{6}.$$

Демак, $S_m = \frac{a^2}{6} \text{ см}^2$.

7. Дифференциал тенглама

7.1. Температураси 20°C бўлган хонада турган бирор жисмнинг температураси 20 минут ичида 100°C дан 60°C гача совийди. Жисмнинг совиш қонунини ва неча минутдан сўнг у 30°C га совишини топинг.

Е ч и ш. Ньютон қонунига кўра (совиш тезлиги температуралар айирмасига тўғри пропорционал) қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20) \quad \text{ёки} \quad \frac{dT}{T-20} = k dt,$$

$$\text{яъни} \quad \ln(T - 20) = kt + \ln C.$$

Агар $t = 0$ бўлса, $T = 100^\circ\text{C}$ бўлишидан фойдаланиб, $C = 80$ эканлигини аниқлаймиз. Агар $t = 20$ бўлса, у ҳолда $T = 60^\circ\text{C}$ бўлишидан фойдаланиб, k ни топамиз:

$$\ln 40 = 20k + \ln 80, \quad \text{бундан} \quad k = -\frac{\ln 2}{20}.$$

Шундай қилиб, жисмнинг совиш қонунини

$$T - 20 = 80e^{-\frac{\ln 2}{20}t} = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}} \quad \text{ёки} \quad T = 20 + 80\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}}$$

кўринишда бўлади.

$$T = 30^\circ \quad \text{да} \quad 10 = 80\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}} \quad \text{ёки} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{20}} = \frac{1}{8} \quad \text{га эга буламиз.}$$

Бундан эса $\frac{t}{20} = 3 \rightarrow t = 60$ ни ҳосил қиламиз. Демак, жисмнинг температураси 60 минутдан сўнг 30°C бўлади.

7.2. Асосининг диаметри 4 м ва баландлиги 6 м бўлган цилиндр шаклидаги идиш вертикал ҳолатда қўйилган бўлиб, у сув билан тўлдирилган. Идиш тагидан радиуси $r = \frac{1}{12}$ м бўлган доира шаклидаги тешикдан сув чиқиб кетади. Тўла идишдаги сув неча минутдан кейин тулиқ чиқиб кетади?

Е ч и ш. h баландликка эга бўлган идишнинг пастки тешигидан чиқиб кетувчи суюқликнинг $v\left(\frac{m}{c}\right)$ тезлигини аниқловчи Бернулли формуласидан фойдаланамиз:

$$v = \delta\sqrt{2gh},$$

бунда $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ — тортиш кучининг тезланиши, δ — суюқликнинг хоссасига боғлиқ булган ўзгармас коэффициент (сув учун $\delta = 0,6$).

Фараз қиламиз, t соатда идишдаги сувнинг баландлиги h м га, dt вақтда эса dh м га камайган бўлсин. dt чексиз кичик вақт оралиғида чиқиб кетувчи сувнинг ҳажмини икки усул билан аниқлаймиз:

а) dV ҳажмининг баландлиги $|dh|$ ва асоси r ($r = 2$ м) радиусли доирадан иборат бўлган цилиндр қатлам ҳажмидан иборат, яъни

$$dw = \pi r^2 |dh| = -\pi r^2 dh;$$

б) иккинчи томондан бу қатлам ҳажмининг баландлиги vdt (бунда v — суюқликнинг оқиб чиқиш тезлиги) ва

илиш асосидаги тешикдан иборат цилиндр ҳажмига тенг. Агар тешик радиусини ρ ($\rho = \frac{1}{12}$ м) деб олсак, у ҳолда

$$dw = \pi \rho^2 v dt = \pi \rho^2 \delta \sqrt{2gh} dt$$

булади.

а) ва б) иккита бир хил ҳажми билдирувчи ифодалардан қуйидаги

$$-r^2 dh = \delta \rho^2 \sqrt{2gh} dt$$

тенгламага эга бўламиз. Бу тенгламани ўзгарувчиларни ажратиб, сунгра интегралласак,

$$dt = -\frac{r^2}{\delta \rho^2 \sqrt{2g}} \cdot \frac{dh}{\sqrt{h}}; \quad t = C - \frac{2r^2}{\delta \rho^2 \sqrt{2g}} \cdot \sqrt{h}$$

ни ҳосил қиламиз. Масала шартига кўра $t = 0$ да $h = h_0 = 6$ м бўлгани учун ўзгармас C нинг қиймати

$$C = \frac{2r^2}{\delta \rho^2 \sqrt{2g}} \sqrt{h_0}$$

булади.

Шундай қилиб, t ва h орасидаги боғланиш

$$t = \frac{2r^2}{\delta \rho^2 \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h})$$

тенглама билан аниқланили. Бу формулада $h = 0$ деб, сувнинг тулиқ чиқиб кетиш вақти T ни топамиз:

$$T = \frac{2r^2 \sqrt{h_0}}{\delta \rho^2 \sqrt{2g}}$$

Масала шартига берилган қийматлар $r = 2$ м, $h_0 = 6$ м, $\delta = 0,6$ м, $\rho = \frac{1}{12}$ м, $g = 9,8$ м/с² ларни урнига қўйиб, $T \approx 1062$, $C \approx 17,7$ мин эканлигини аниқлаймиз.

7.3. Иккита тўғри доиравий

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{ва} \quad x^2 + z^2 = R^2$$

цилиндрлар билан чегараланган жисмнинг ҳажмини топинг.

Ечиш. Цилиндрлар Ox ўқига перпендикуляр бўлгани учун ва ҳосил бўлган жисмнинг абсциссаси x ($-R < x < R$)

нуқтадан ўтади. 84-чизмада жисмнинг саккиздан бир қисми тасвирланган. Кесим томони $x^2 + y^2 = R^2$ айлананинг ординатасига, яъни $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ га тенг квадратдан иборат. Квадратнинг юзи x нинг функцияси билан иборат бўлиб, у

$$S(x) = y^2 = R^2 - x^2$$

га тенг. Жисмнинг саккиздан бир қисмининг ҳажмини ҳисоблаш учун қуйидаги интегрални ҳисоблаш керак:

$$\frac{V}{8} = \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} R^3.$$

Бундан $V = \frac{16}{3} R^3$ (куб бир.)ни ҳосил қиламиз.

7.4. Қундаланг кесими ўзгармас бўлган ходанинг эгилувчанлиги ва охири нуқтасига тўпланган эркин куч P га эга бўлган ҳолати


$$\frac{d^2 \omega}{dx^2} = -\frac{Px}{Ez} \quad (1)$$

дифференциал тенглама билан ифодаланиши материаллар қаршилигида исботланган, бунда ω — кесим абсциссаси x бўлган ходанинг эгилиши, Ez — хода кесимининг "бурилиш қаттиқлиги" деб аталувчи ўзгармас миқдор. (1) тенгламанинг $\omega(e) = 0$; $\omega'(e) = 0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Берилган дифференциал тенгламани икки марта интеграллаш ёрдамида умумий ечимини топамиз:

$$\frac{d\omega}{dx} = -\frac{P}{Ez} \int x dx = -\frac{P}{Ez} \cdot \frac{x^2}{2} + C_1.$$

$\omega'(e) = 0$ бошланғич шартдан фойдаланиб, C_1 ўзгармас сонни топамиз:



84-чизма.

$$0 = -\frac{P}{Ez} \cdot \frac{e^2}{2} + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{P}{Ez} \cdot \frac{e^2}{2} = \frac{Pe^2}{2Ez}.$$

Шунинг учун:

$$\frac{d\omega}{dx} = -\frac{P}{Ez} \cdot \frac{x^2}{2} + \frac{Pe^2}{2Ez} = -\frac{P}{2Ez} (x^2 - e^2).$$

Буни иккинчи марта интеграллаб,

$$\omega = -\frac{P}{2Ez} \left(\frac{x^3}{3} - e^2 x \right) + C_2$$

ни ҳосил қиламиз.

Биринчи $\omega(e) = 0$ бошланғич шартдан фойдаланиб топамиз:

$$0 = -\frac{P}{2Ez} \left(\frac{e^3}{3} - e^3 \right) + C_2,$$

бундан $C_2 = -\frac{Pe^3}{3Ez}$ ни аниқлаймиз ва натижада

$$\omega = -\frac{P}{2Ez} \left(\frac{x^3}{3} - e^2 x \right) - \frac{Pe^3}{3Ez}$$

ни ҳосил қиламиз.

7.5. Ох ўқи бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилувчи нуқтанинг асосий ҳаракат тенгламаси

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_x$$

кўринишда ёзилади, бунда m — нуқтанинг массаси, F_x — Ох ўқидаги нуқтага таъсир этувчи куч проекцияси.

Бошланғич тезлиги v_0 , бошланғич вақти $t = t_0$ ва унинг координатаси $x = x_0$ га тенглигини билган ҳолда нуқтанинг ҳаракат қонунини топинг.

Е ч и ш. Масала шартдаги таъсир этувчи куч $F_x = mg$ га тенг (g — тортиш кучи тезланиши). У ҳолда берилган тенглама

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = mg \quad \text{ёки} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = g$$

кўринишга келади. Буни бир марта интеграллаймиз:

$$d\left(\frac{dx}{dt}\right) = g dt \Rightarrow \frac{dx}{dt} = gt + C_1.$$

$t = t_0$ да бошланғич тезлик $v = v_0$ га тенглигини эътиборга олиб, C_1 ни топамиз:

$$v_0 = gt_0 + C_1 \Rightarrow C_1 = v_0 - gt_0.$$

Натижада:

$$\frac{dx}{dt} = g(t - t_0) + v_0 \Rightarrow dx = [g(t - t_0) + v_0] dt.$$

Иккинчи марта интеграллаб,

$$x = v_0 t + g \frac{(t - t_0)^2}{2} + C_2$$

ифодага эга бўламиз. $x = x_0$, $t = t_0$ бошланғич шартдан фойдаланиб C_2 ни топамиз:

$$x_0 = v_0 t_0 + C_2 \Rightarrow C_2 = x_0 - v_0 t_0.$$

Натижада

$$x = v_0 t + g \frac{(t - t_0)^2}{2} + x_0 - v_0 t_0$$

ечимга эга бўламиз. $t_0 = 0$ бўлганда нуқта ҳаракат қонунига эга бўламиз:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}.$$

8. Қўн ўзгарувчили функция экстремумини топиш

8.1. Периметри $2p$ га тенг бўлган учбурчакларнинг ичида тенг томонли учбурчакнинг юзи энг катта бўлишини исбот қилинг.

Е ч и ш. Изланаётган учбурчакнинг томонларини мос равишда x , y ва z билан белгилаймиз.

Герон формуласига қўра учбурчакнинг юзи:

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}.$$

Агар $z = 2p - x - y$ га тенглигини эътиборга олсак ва z ўрнига бу қийматни қўйсак, юз формуласи

$$S_{(x,y)} = \sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}$$

икки ўзгарувчили функциядан иборат бўлади.

Бу функциянинг экстремумини текшириш учун уни квадратга кўтарамиз:

$$f(x, y) = S^2 = p(p-x)(p-y)(x+y-p).$$

Биринчи тартибли хусусий ҳосилаларини топамиз:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = p(p-y)(2p-2x-y); \quad \frac{\partial f}{\partial y} = p(p-x)(2p-2y-x).$$

Бу ҳосилаларни нолга тенглаб,

$$\begin{cases} p(p-y)(2p-2x-y) = 0, \\ p(p-x)(2p-2y-x) = 0 \end{cases}$$

системага эга бўламиз ва уни қуйидагича ечамиз:

$$\begin{cases} 1) \ p-y=0, \\ \quad p-x=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2) \ 2p-2x-y=0, \\ \quad 2p-2y-x=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3) \ 2p-2x-y=0, \\ \quad p-x=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 4) \ 2p-2y-x=0, \\ \quad p-y=0 \end{cases}$$

Бу системаларни қаноатлантирувчи

$$(p, p); \left(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p\right); (p, 0); (0, p)$$

стационар нуқталарни топамиз. Бу нуқталардан фақат $M\left(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p\right)$ нуқта масала шартини қаноатлантиради, қолганлари эса қаноатлантирмайди (бунга учбурчакнинг томони ярим периметрига тенг бўла олмаслиги сабаб бўлади).

$M\left(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p\right)$ нуқта экстремумини текшираемиз:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2p(p-y); \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2p(p-x);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = p(2x+2y-3p); \quad A = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_M = -\frac{2}{3}p^2;$$


$$B = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_M = -\frac{1}{3}p^2; \quad C = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_M = -\frac{2}{3}p^2;$$

$$\Delta = AC - B^2 = \left(-\frac{2}{3}p^2\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}p^2\right) - \left(-\frac{1}{3}p^2\right)^2 p^2 =$$

$$= \frac{4}{9}p^4 - \frac{1}{9}p^4 = \frac{1}{3}p^4 > 0;$$

$\Delta > 0$, $A < 0$ бўлгани учун текширилаётган нуқтада функция максимумга эришади. Демак, $x = \frac{2}{3}p$, $y = \frac{2}{3}p$ да функция энг катта қийматга эришади. У ҳолда $z = 2p - x - y = \frac{2}{3}p$ ва $x = y = z$ бўлиб, учбурчак тенг томонли бўлади.

8.2. Каналнинг кундаланг кесими тенг ёнли трапеция шаклида бўлиб, унинг юзи S га тенг. Каналнинг чуқурлиги ва трапеция ён томони асоси билан ташиқил этган бурчак α қандай бўлганда сув тегиб турувчи периметр энг кичик бўлади (85-чизма).



85-чизма.

Ечиш. Сув тегиб турган периметрни z билан белгилеймиз. У ҳолда

$$z = AB + BC + CD.$$

Чизмага кўра

$$h = CD \sin \alpha, \quad CD = \frac{h}{\sin \alpha}, \quad BC = a.$$

У ҳолда $z = a + \frac{2h}{\sin \alpha}$ бўлади. a , h ва α учта ўзгарувчи z функцияга эга бўлди. Масала шартидан фойдаланиб, уни икки ўзгарувчи функцияга келтирамиз. Трапеция юзи

$$S = \frac{BC+AD}{2} h, \quad BC = a, \quad AD = BC + 2ED = a + 2h \cot \alpha$$

$$\text{бўлгани учун: } S = \frac{2a+2h \cot \alpha}{2} h \Rightarrow S = (a + h \cot \alpha)h \Rightarrow$$

$$a = \frac{S}{h} - h \cot \alpha$$

бўлгани учун z қуйидаги кўринишни олади:

$$z = \frac{S}{h} - h \operatorname{ctg} \alpha + \frac{2h}{\sin \alpha},$$

бу эса h ва α га нисбатан икки ўзгарувчи функция. Унинг хусусий ҳосиласини топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial h} = -\frac{S}{h^2} - \operatorname{ctg} \alpha + \frac{2}{\sin \alpha}, \quad \frac{\partial z}{\partial \alpha} = h \cos \alpha \operatorname{ctg}^2 \alpha - \frac{2h \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}.$$

ва қуйидаги иккита тенгламалар системасини ечамиз:

$$\left. \begin{aligned} -\frac{S}{h^2} - \operatorname{ctg} \alpha + \frac{2}{\sin \alpha} &= 0, \\ h \cos \alpha \operatorname{ctg}^2 \alpha - \frac{2h \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} &= 0, \end{aligned} \right\}$$

буни соддалаштирамиз:

$$\left. \begin{aligned} -\frac{S}{h^2} + \frac{2 - \cos \alpha}{\sin \alpha} &= 0, \\ \frac{h(1 - 2 \cos \alpha)}{\sin^2 \alpha} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Иккинчи тенгламадан, $h(1 - 2 \cos \alpha) = 0$ бундан $h = 0$ ёки $1 - 2 \cos \alpha = 0$. Аммо h чуқурлик нол бўла олмайди, шунинг учун $1 - 2 \cos \alpha = 0$ бўлади ва бундан $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ҳосил қиламиз. α нинг бу қийматини биринчи тенгламага қўямиз:

$$-\frac{S}{h^2} + \frac{2 - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 0 \Rightarrow h = \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{3}}.$$

Энди α ва h нинг аниқланган қийматларидан фойдаланиб, иккинчи тартибли ҳосиланинг қийматини аниқлаймиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial h^2} = \frac{2S}{h^3}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial \alpha^2} = 2 \cdot \frac{1 - \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^3 \alpha} \cdot h; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial \alpha \partial h} = \frac{1 - 2 \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}.$$

A , B ва C сонларни топамиз:

$$A = \frac{6}{\sqrt{S} \cdot \sqrt{3}}; \quad B = 0; \quad C = \frac{4}{3} \sqrt{3} \cdot \sqrt{S};$$

$$\Delta = AC - B^2 = \frac{6}{\sqrt{S} \cdot \sqrt{3}} \cdot \frac{4}{3} \sqrt{3} \cdot \sqrt{S} > 0.$$

Демак, h ва α нинг аниқланган қийматларида z функция минимумга эришади ва у

$$z_{\min} = 2\sqrt{S} \cdot \sqrt{3}$$

га тенг бўлади.

2-§. Амалий машғулот дарсида олий математикадан ёзма иш ўтказиш вариантдан намуналар

Маъруза ва амалий машғулот дарсларида талабаларнинг олий математиканинг бирор бўлимларидан олган билимларини аниқлаш ва уни мустаҳкамлаш, шунингдек назорат қилиш мақсадида ёзма иш ўтказилади. Ёзма иш вариантлари қандай тузилиши ва унда нечта мисол ёки масала бўлиши жуда катта аҳамиятга эга. Шунинг учун ёш ўқитувчиларга ёрдам тариқасида қуйида ёзма иш вариантларидан намуналар келтирилди.

1. Биринчи ёзма иш "Лимитлар" бобига бағишланган бўлиб, унга бир соат вақт ажратиш лозим. Бу ёзма иш вариантларида 6 та дан мисол берилган бўлиб, уларнинг лимитларини топиш керак.

1-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 1}{2x^2 - 3x - 5}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{3 - 8x - 3x^2}{x^2 + x - 6}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{2x} + 1 - 3}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + 3x + 1}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1 - \cos 4x}}{\sin^2 3x}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+5} \right)^{3x-2}.$$

2-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x + 1}{x^2 + 2x - 3}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 17x + 35}{x^2 - x - 20}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-x} - 3}{\sqrt{x+4} - 2}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x^3 + 3x + 1}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 6x}{x \operatorname{tg} 2x}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{5-2x}.$$

3-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{2x^2 - x + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{4 - 3x^2 - x}$
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3}-3}{2-\sqrt{x+1}}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{m^3 - 8m + 1}{3m^3 - m + 4}$
- $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 5y}{\arcsin 2y}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x+2} \right)^{2x-4}$

4-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 + 5x + 2}$
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 16x + 1}{3x^2 + 5x - 2}$
- $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + 9} - 3}{\sqrt{4 - n^2} - 2}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 4n + 1}{2n^2 + n - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 3x}{1 - \cos 4x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3x-1} \right)^{1-4x}$

5-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 3}{x^2 - 4}$
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$
- $\lim_{m \rightarrow 4} \frac{5 - \sqrt{m^2 + 9}}{\sqrt{2m+1} - 3}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - 3n - n^2}{2n^2 - n + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin^2 x}{3x \sin x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{3x-4} \right)^{1-6x}$

6-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + x - 3}{3x^2 + x + 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{5x+1} - 4}{x^2 - 9}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 4n^5 + 2}{2n^5 + 3n^3 - n}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 4x}{\sin^2 3x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2+x}{2-x} \right)^{3x+1}$

7-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 3x + 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+3x} - \sqrt{4-3x}}{7x}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - 3n^2 + 1}{2n^2 + 3n - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x \sin 3x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+3} \right)^{2x+3}$

8-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 2x - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 + 10x + 5}{x^2 - 2x - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5x-1} - 3}{x^2 - 2x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^6 - 3x^2 - 2}{2x^6 + 4x + 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\operatorname{tg}^2 5x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x-5} \right)^{x-1}$

9-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 14x + 5}{x^2 - 6x + 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 14x - 5}{2x^2 - 6x - 15}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 14x - 5}{2x^2 - 6x - 20}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^5 - 3x^2 + 1}{3x^5 + 2x + 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{4x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2-4x}{1-4x} \right)^{x+3}$

10-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 13x - 7}{x^2 - 9x + 14}$
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 5x + 6}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{4x+1} - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 5}{3x^4 + 2x^2 - x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{4x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x-3} \right)^{3x}$

11-вариант

- $\lim_{m \rightarrow 3} \frac{3m^2 - 5m - 3}{m^2 - 5m + 6}$
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 9x + 2}{x^2 - 3x - 10}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{\sqrt{2x-1} - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x^2 + 4}{5x^4 - 3x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 5x}{3x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2x-3}{2x-1} \right)^x$

12-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 11x + 5}{x^2 - 7x + 10}$
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^2 + 4x - 1}{x^2 - 6x - 7}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{\sqrt{x+4} - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^5 - 4x^3 + 1}{3x^4 - 2x - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x \operatorname{tg} 2x}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 3)^{\frac{x^2}{x-2}}$

13-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x^2 - 9x - 18}{x^2 - 7x + 6}$
- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{2x^2 + 3x - 9}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x+10} - 4}{x^2 - 4}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x^3 - 2x - 4}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 5x \cdot \operatorname{ctg} 3x$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+5}{4x+1} \right)^{x+3}$

14-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{3x^2 - 17x - 28}{x^2 - 9x + 14}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{3x^2 - 4x - 4}$
- $\lim_{m \rightarrow 3} \frac{9 - m^2}{\sqrt{4m-3} - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^5 - 3x^2 + 1}{4x - x^3 + 4}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{\sin 3x \operatorname{tg} 2x}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)^{\frac{5x}{x-1}}$

15-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 8x - 3}{x^2 - x - 6}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 5}{2x^2 - 7x - 15}$
- $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{\sqrt{2x+1} - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 4x^2 + 2}{6x^3 + 3x - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg}^2 3x \cdot \operatorname{ctg}^2 2x$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-2}{3x+4} \right)^{x-1}$

16-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 6}{2x^2 + x - 6}$
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 2}{x^2 - x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^5 - x^2 + 5}{x^4 - 2x + 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\operatorname{arctg} 3x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1} \right)^x$

17-вариант

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 6}$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 7x - 2}{x^2 - 7x + 10}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-2} - 2}{\sqrt{x+1} - 2}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^3 - 2n + 7}{3n^3 - 4n + 5}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 8x \operatorname{ctg} x$
- $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 8)^{\frac{x+1}{x-3}}$

18-вариант

- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + x - 2}{3x^2 + 4x + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 4x + 3}$
- $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{2x+6}}{x^2 - 5x}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^4 - 2n^3 + 3}{n^4 + 2n}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{1 - \cos 2x}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+3}$

19-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 5x - 7}{3x^2 + x - 2}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{2x} - 2}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} 3x \cdot \operatorname{ctg} 7x$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + x - 4}{2x^2 + x - 3}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7 + 6x + 4}{6x^7 - 3x + 5}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+4}{2x-4} \right)^{x-3}$$

20-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 + 2x - 15}{2x^2 + 7x - 15}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{6x+1} - 5}{\sqrt{x} - 2}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 3x}{\cos x - \cos^3 x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x - 1}{4x - 3x^2 - 1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^5 + 3x^2 - 1}{2x^5 - x + 5}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+1}{5x-1} \right)^{x-4}$$

21-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 + 9x + 4}{x^2 - x - 20}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{\sqrt{x^2 + 25} - 5}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{tg} 2x}{1 - \cos 3x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - x - 2}{x^2 + 2x - 3}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^4 - 5n + 3}{n^4 + 3n - 6}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 3} (3x - 2)^{\frac{x}{x^2 - 1}}$$

22-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 5x + 2}{x^2 - 4x + 3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{2x} - 2 - 4}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin^2 3x}{2x \sin 5x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 3x - 14}{3x^2 - 7x + 2}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^4 - 3x^2 + x}{2x^5 - x^2 + 4}$$

$$6. \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{4+3t}{1+3t} \right)^{t-2}$$

23-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x + 2}{2x^2 + 5x + 2}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt{2}}{\sqrt{2x+3} - 3}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 2x}{1 - \cos 4x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 10x + 8}{2x^2 - 3x - 2}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 4x^2 + 5}{6x^4 + 3x - 10}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 2} (5 - 2x)^{\frac{x^2}{x-2}}$$

24-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 8}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{3+x}}{5x}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \sin^2 3x \cdot \operatorname{ctg}^2 5x$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 5}{x^2 + 5x + 4}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 3n^2 - n^4}{2n + n^2 - 3n^4}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} (7 - 6x)^{\frac{x}{3x-3}}$$

25-вариант

$$1. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 5x + 6}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{5x+5} - 5}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{\operatorname{arctg}^2 2x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 3x - 9}{3x^4 - 5x - 12}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 7x + 4}{6x^3 - 3x^2 + 2}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-4} \right)^x$$

2. Иккинчи ёзма иш "Ҳосила ва унинг тартиби"га доир бўлиб, унга икки соат вақт ажратиш лозим. Бу ёзма иш вариантларида 5 та дан мисол ва 1 та масала берилган. Уларни қуйидагича бажариш керак.

1-2-мисолларда: берилган функциянинг биринчи тартибли ҳосиласини топиш керак.

3-мисолда: берилган функциянинг аргумент x нинг берилган қийматидаги биринчи тартибли ҳосиласининг қийматини ҳисоблаш керак.

4-мисолда: берилган функциянинг иккинчи тартибли (y'') ҳосиласини топиш керак.

5-мисолда: параметрик кўринишда берилган функция-нинг иккинчи тартибли ҳосиласи $\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)$ ни топиш керак. 6-масала шarti вариантда берилган.

1-вариант

$$1. y = \frac{\sqrt{1+\cos^3 x}}{1+\sin 3x}.$$

$$2. y = \frac{e^{-\sqrt{x}}}{1+e^{2x}}.$$

$$3. f(x) = \frac{x}{2x-1}, x = -2.$$

$$4. y = \sqrt[3]{(1-x)^2}.$$

$$5. \begin{cases} x = \arcsin(t^2 - 1), \\ y = \arccos 2t. \end{cases}$$

6. $y = \frac{ax+x^3}{4}$ эгри чизик a нинг қандай қийматида Ox ўқини 45° бурчак остида кесиб ўтади.

2-вариант

$$1. y = \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)^3.$$

$$2. y = e^{-\frac{1}{\cos x}}.$$

$$3. f(x) = \sqrt[3]{x^2}, x = -8.$$

$$4. y = 2^{\lg 2x}.$$

$$5. \begin{cases} x = t^2 + t + 1, \\ y = t^3 + t. \end{cases}$$

6. $xy = 8$ ва $x^2 - y^2 = 12$ гиперболалар тўғри бурчак остида кесишишини кўрсатинг.

3-вариант

$$1. y = \frac{x}{(x+1)^2(x^2+1)^4}.$$

$$2. y = \sqrt[3]{(1+\sin^2 2x)^2}.$$

$$3. f(x) = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x}, x = 0,01.$$

$$4. y = x \cdot e^{\frac{1}{x}}.$$

$$5. \begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\cos^2 t}. \end{cases}$$

6. $x^2 + y^2 = 8$ ва $y^2 = 2x$ эгри чизиклар қандай бурчак остида кесишишини аниқланг.

4-вариант

$$1. y = \sqrt[3]{x+x} \cdot \sqrt[3]{x}.$$

$$2. y = 3^{x \cos^3 x}.$$

$$3. f(x) = x^2 - \frac{1}{2x^2}, x = \pm 2.$$

$$4. y = xe^{-x}.$$

$$5. \begin{cases} x = \frac{2-t}{2+t^2}, \\ y = \frac{t^2}{2+t^2}. \end{cases}$$

6. $y = \frac{1}{x}$ гипербол ва $y = \sqrt{x}$ парабола қандай бурчак остида кесишишини аниқланг.

5-вариант

$$1. y = \sqrt[3]{\frac{1+\sin 3x}{3+2 \sin 3x}}.$$

$$2. y = e^{\sqrt[3]{x} \operatorname{arctg}^2 x}.$$

$$3. f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + x, x = -1.$$

$$4. y = \ln(\ln x).$$

$$5. \begin{cases} x = 2 \cos^3 2t, \\ y = \sin^3 2t. \end{cases}$$

6. $y = x - x^3$ эгри чизик билан $y = 5x$ тўғри чизик кесишиш нуқтасида ташкил этган бурчакни топинг.

6-вариант

$$1. y = \sqrt[3]{x+\sqrt{x}}.$$

$$2. y = \frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x}.$$

$$3. f(x) = e^x \cdot \cos 3x, x = 0.$$

$$4. y = x\sqrt{1+x^2}.$$

$$5. \begin{cases} x = 2t - t^2, \\ y = 3t - t^3. \end{cases}$$

6. $x = t^2, y = t^3$ ярим кубик параболанинг $t = 2$ нуқта-сида ўтказилган уринма ва нормал тенгламасини тузинг.

7-вариант

$$1. y = \frac{3}{\sqrt{x^3+x^2+1}} - 2\sqrt{6x+5}.$$

$$2. y = \cos 2x \sin^2 x.$$

$$3. f(x) = \ln(1+x) + \arcsin \frac{x}{2}, x = 1.$$

$$4. y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

6. $x^2 + y^2 = 5$ ва $y^2 = 4x$ эгри чизиқларнинг кесишиш нуқтасидаги бурчакни топинг.

8-вариант

$$1. y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$2. y = \sin^3 5x \cdot \sin^5 3x.$$

$$3. f(x) = \operatorname{tg}^3 \frac{\pi x}{6}, \quad x = 2.$$

$$4. y = \frac{\ln x}{x}.$$

$$5. \begin{cases} x = 2 \cos^3 t, \\ y = 4 \sin^3 t. \end{cases}$$

6. $y = \frac{x-1}{1+x^2}$ эгри чизиқ абсциссалар ўқини қандай бурчак остида кесиб ўтади?

9-вариант

$$1. y = x \cdot \sqrt{\frac{1+x^2}{1-x^2}}.$$

$$2. f(x) = e^{\cos^2 3x}.$$

$$3. 2y = 1 + xy^3, \quad x = 1, y = 1.$$

$$4. y = x^2 \ln x^3.$$

$$5. \begin{cases} x = \cos t + t \sin t, \\ y = \sin t - t \cos t. \end{cases}$$

6. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 3 = 0$ эгри чизиқнинг Oy ўқи билан кесишган нуқтасида ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

10-вариант

$$1. y = \sqrt{x + \sqrt{x}}.$$

$$2. y = e^{4x} \cos x.$$

$$3. y = (x+y)^3 - 27(x-y), \quad x = 2, y = 1.$$

$$4. y = x^3 e^{5x}.$$

$$5. \begin{cases} x = 2 \cos t - \cos 2t, \\ y = 2 \sin t - \sin 2t. \end{cases}$$

6. $y = 4x - x^3$ эгри чизиқнинг Ox ўқи билан кесишган нуқтасида ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

11-вариант

$$1. y = \sqrt{x^2+1} + \sqrt[3]{x^3+1}.$$

$$2. y = \arcsin(\operatorname{tg} x).$$

$$3. ye^y = e^{x+1}, \quad x = 0, y = 1.$$

$$4. y = (1+x^2)\operatorname{tg} x.$$

$$5. \begin{cases} x = 2t^2 + t, \\ y = \ln t. \end{cases}$$

6. $xy = 4$ гиперболога абсциссалари $x_1 = 1$, $x_2 = -4$ бўлган нуқталарда ўтказилган уринмаларнинг тенгламасини тузинг ва уринмалар орасидаги бурчакни топинг.

12-вариант

$$1. y = \frac{\sqrt{x^2+\sqrt{x}}}{x^3-\sqrt{x}}.$$

$$2. y = e^{\cos x} \sin^2 x.$$

$$3. y^2 = x + \ln \frac{y}{x}, \quad x = 1, y = 1.$$

$$4. y = e^x \cos^4 x.$$

$$5. \begin{cases} x = 3t - t^3, \\ y = 3t^2. \end{cases}$$

6. Моддий нуқта $S = t^3 - 3t^2 + 3t + 5$ қонун бўйича туғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. t вақтнинг қайси momentiда нуқтанинг тезлиги нолга тенг бўлади?

13-вариант

$$1. y = 5\sqrt{x^2+\sqrt{x}+\frac{1}{x}}.$$

$$2. y = \ln \ln \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}.$$

$$3. x = t \ln t, \quad y = \frac{\ln t}{t}, \quad t = 1.$$

$$4. y = e^{-x} \cos x.$$

$$5. \begin{cases} x = 2t - t^3, \\ y = 2t^2. \end{cases}$$

6. Иккита нуқта $S_1 = t^3 - 3t$ ва $S_2 = t^3 - 5t^2 + 17t - 4$ қонун бўйича туғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. Вақтнинг қайси momentiда уларнинг тезлиги ўзаро тенг бўлади?

14-вариант

$$1. y = 1 + \sqrt{\frac{1+x}{x-1}}.$$

$$2. y = \frac{\sin x}{1+\operatorname{tg} y}.$$

$$3. x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad t = \frac{\pi}{2}.$$

$$4. y = \sqrt{x} \cdot e^x.$$

$$5. \begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\cos^2 t}. \end{cases}$$

6. Агар тўғри чизиқли ҳаракат қилаётган нуқтанинг тезлиги $v = t^3 + t^2 - t + t$ тенглама билан берилган бўлса, нуқтанинг $t = 3$ моментдаги тезланишини топинг.

15-вариант

$$1. y = \sqrt{\frac{x^2+1}{3x-2}}.$$

$$2. S = \frac{e^t}{\cos t}.$$

$$3. x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, t = \frac{\pi}{4}.$$

$$4. y = xe^{-x^2}.$$

$$5. \begin{cases} x = \ln t, \\ y = \frac{t+1}{t}. \end{cases}$$

6. Нуқта $S = t^3 - \frac{1}{2}t^2 + 4$ қонун бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. $t = 5$ да нуқтанинг тезлигини топинг.

16-вариант

$$1. y = \sqrt[4]{x^2+3x} - \sqrt[3]{(6x-1)^2}.$$

$$2. y = \frac{1+e^x}{1-e^x}.$$

$$3. y = (1+x^2)\left(5 - \frac{1}{x^2}\right), x = 1, x = 0.$$

$$4. y = \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}.$$

$$5. \begin{cases} x = t^2, \\ y = \frac{t^3}{t-1}. \end{cases}$$

6. Нуқта $S = 3t^3 + t^2 - 4$ қонун бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. $t = 5$ сек моментдаги тезлик ва тезланишни топинг.

17-вариант

$$1. y = \frac{2x}{\sqrt{1+x}} - 4\sqrt{1+x}.$$

$$2. y = \sin^2 3x.$$

$$3. S = \frac{3}{5-t} + \frac{t^2}{5}, t = 0, t = 2.$$

$$4. y = x^3 \ln x.$$

$$5. \begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t. \end{cases}$$

6. Нуқта $S = t^2 - 8t^2 + 4$ қонун бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. Вақтнинг қайси momentiда нуқтанинг тезлиги нолга тенг бўлади?

18-вариант

$$1. y = \sqrt{\frac{1+x^3}{1-x^3}}.$$

$$2. y = \sqrt{1 + \ln^2 x}.$$

$$3. f(x) = x(1 + \sqrt{x^3}), x = 0.$$

$$4. y = xe^{\sin x}.$$

$$5. \begin{cases} x = \sin \frac{t}{2}, \\ y = \cos t. \end{cases}$$

6. Тормозланиш пайтида маховик t сек давомида $\varphi = 3 + 8t - t^2$ бурчакка бурилади. Вақтнинг $t = 5$ сек momentiда маховик айланишининг бурчак тезлигини топинг.

19-вариант

$$1. y = \sqrt{x + \sqrt{x}}.$$

$$2. y = \frac{4 \ln x}{1 - \ln x}.$$

$$3. f(x) = \frac{x}{1-x^2}, x = 2.$$

$$4. y = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right).$$

$$5. \begin{cases} x = \cos at, \\ y = \sin at. \end{cases}$$

6. Тормозланиш пайтида маховик t сек давомида $\varphi = 4 - 8t + t^3$ бурчакка бурилади. Вақтнинг t моментдаги бурчак тезланишини топинг.

20-вариант

$$1. y = \sqrt[3]{3x^2+1} + \sqrt{x^3-4}.$$

$$2. y = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{ctg} x + x.$$

$$3. f(x) = \frac{a-x}{1+x}, x = 1.$$

$$4. y = \operatorname{arctg} x.$$

$$5. \begin{cases} x = e^{2t}, \\ y = \cos t. \end{cases}$$

6. Тормозланиш пайтида маховик t сек давомида $\varphi = t^2 - 8t - 3$ бурчакка бурилади. Маховик тўхтайдиган вақт momenti t ни топинг.

21-вариант

1. $y = x\sqrt{1+x^2}$.

2. $y = \ln \sqrt{\frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}} - x$.

3. $S(t) = \frac{3}{5-t} + \frac{t^2}{5}, t=0, t=2$.

4. $y = \frac{x}{x^2-1}$.

5. $\begin{cases} x = \cos \frac{t}{2}, \\ y = t - \sin t. \end{cases}$

6. Жисм температураси T нинг t вақтга боғлиқ ҳолда ўзгариши $T = 0,4t^2$ тенглама билан берилган. Вақтнинг $t = 10$ сек momentiда бу жисм қандай тезлик билан қизийди?

22-вариант

1. $y = 5\sqrt[3]{4x+3} - \frac{2}{\sqrt{x^3+x+1}}$.

2. $y = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\cos x}}$.

3. $y = e^{\sqrt{\ln x}}, x = e$.

4. $y = x - \operatorname{arctg} x$.

5. $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t, \\ y = 2 \ln \operatorname{ctg} t. \end{cases}$

6. Массаси 5 кг бўлган жисм $S = 3t^2 + t + 4$ қонун бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. Жисмнинг ҳаракат бошлангандан 4 сек ўтгандан кейинги кинетик энергияси $\left(\frac{mv^2}{2}\right)$ ни топинг.

23-вариант

1. $y = 3\sqrt{x^5 + 5x^4} - \frac{5}{x}$.

2. $y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^x})$.

3. $y = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}, x = \frac{\pi}{2}$.

4. $y = \sin x - \frac{1}{3} \cos^3 x$.

5. $\begin{cases} x = \sin t^2 + 1, \\ y = e^{t^2}. \end{cases}$

6. Ток кучи I вақт t га боғлиқ ҳолда $I = 0,4t^2$ қонун бўйича ўзгаради. $t = 8$ секунд охирида ток кучи ўзгаришининг тезлигини топинг.

24-вариант

1. $y = \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}$.

2. $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x^2+1}}$.

3. $f(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1), x=0, x=1$.

4. $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x}$.

5. $\begin{cases} x = 3 \cos^2 t, \\ y = 2 \sin^3 t. \end{cases}$

6. Нуқта $S = 2t^3 - 2t^2 - 4$ қонун бўйича тўғри чизиқли ҳаракат қилмоқда. $t = 2$ секунд охирида нуқтанинг тезла-нишини топинг.

25-вариант

1. $y = x + \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}$.

2. $y = \operatorname{tg}^2(x^3 + 1)$.

3. $f(x) = \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x^2+1}, x=0, x=1$.

4. $y = \ln(x + \sqrt{x})$.

5. $\begin{cases} x = t \cos t, \\ y = at \sin t. \end{cases}$

6. $y = x^3 - 6x + 8$ параболага абсциссаси $x = 4$ бўлган нуқтада ўтказилган нормалнинг тенгламасини тузинг.

3. Учинчи ёзма иш "Аниқмас интеграл" бобига бағишланган бўлиб, унга икки соат вақт ажратилган. Бу ёзма иш вариантларида 6 та дан мисол бўлиб, берилган интегралнинг бошланғич функциясини топиш керак.

1-вариант

1. $\int x^3 \operatorname{arctg} x dx$.

2. $\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^4} dx$.

3. $\int \frac{1-2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$.

4. $\int \frac{2x-1}{5x^2-x+2} dx$.

5. $\int \ln^2 x dx$.

6. $\int \sin 2x \cos 5x dx$.

2-вариант

1. $\int \frac{3x-1}{4x^2-4x+17} dx$.

2. $\int \frac{3x+4}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx$.

3. $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx$.

5. $\int \cos 2x \cos^3 x dx$.

4. $\int \frac{x-1}{x^3+8} dx$.

6. $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}} dx$.

3-вариант

1. $\int \frac{dx}{2 \sin x - 3 \cos x}$.

2. $\int \frac{\sin 2x dx}{3 \sin^3 x + 4}$.

3. $\int \frac{3x-7}{x^3+x^2+4x+4} dx$.

4. $\int \frac{x^2}{9-x^4} dx$.

5. $\int \frac{e^x+1}{e^x-1} dx$.

6. $\int x \cdot 5^x dx$.

4-вариант

1. $\int \frac{x-8}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$.

2. $\int \frac{x^2+\sqrt{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}} dx$.

3. $\int \frac{2x^2-x-1}{x^3-x^2-6x} dx$.

4. $\int \frac{x-\arctg 2x}{1+4x^2} dx$.

5. $\int x^2 e^{3x} dx$.

6. $\int \frac{x+1}{x^3+x+1} dx$.

5-вариант

1. $\int x^3 \cdot 2^x dx$.

2. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

3. $\int e^{-2x} \sin(e^{-2x}) dx$.

4. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$.

5. $\int x^2 \sin x dx$.

6. $\int \frac{1+x^2}{x} dx$.

6-вариант

1. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$.

2. $\int x^2 \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx$.

3. $\int \frac{\sin 4x}{1+\cos 4x} dx$.

4. $\int \frac{2x}{(x+1)(x^2+x+2)} dx$.

5. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^3 x}$.

6. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt{1+x}}$.

7-вариант

1. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$.

2. $\int \sqrt{x} \ln x dx$.

3. $\int \frac{x+1}{4x^2-12x+3} dx$.

4. $\int \frac{dx}{5-4 \sin x}$.

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$.

6. $\int \frac{5x^3-8}{x^3-4x} dx$.

8-вариант

1. $\int \frac{2^{\ln x}}{x\sqrt{1+4^{\ln x}}} dx$.

2. $\int \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt[3]{x}}{6\sqrt[3]{x}} dx$.

3. $\int \frac{x+2}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$.

4. $\int x^2 \cdot 5x^{\frac{x}{2}} dx$.

5. $\int \sin x \sin 3x dx$.

6. $\int \frac{dx}{x^4+2x^3+2x^2}$.

9-вариант

1. $\int \sin 5x \cos x dx$.

2. $\int (1-x) \sin x dx$.

3. $\int \frac{dx}{4x^3-x}$.

4. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{3x+1}}$.

5. $\int (1-\sin 2x)^2 dx$.

6. $\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x} dx$.

10-вариант

1. $\int \frac{x+2}{x^3-2x^2+2x} dx$.

2. $\int \frac{e^{2x}}{e^x-1} dx$.

3. $\int \frac{\sqrt[3]{\arctg^2 x}}{1+x^2} dx$.

4. $\int \sqrt[3]{x^2} \ln x dx$.

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x-x^3+1}}$.

6. $\int \sin 5x \cos 3x dx$.

11-вариант

1. $\int \frac{\sin 5x}{1+\cos^2 5x} dx$.

2. $\int \arctg \sqrt{x} dx$.

$$3. \int \frac{x-4}{\sqrt{x^2-2x+3}} dx.$$

$$5. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}}.$$

$$4. \int \frac{dx}{x^4-16}.$$

$$6. \int \frac{\sin^3 x + 1}{\cos^2 x} dx.$$

12-вариант

$$1. \int \frac{3-2\operatorname{ctg}^2 x}{\cos^2 x} dx.$$

$$3. \int \frac{x dx}{\sin^2 x}.$$

$$5. \int \operatorname{ctg}^4 x dx.$$

$$2. \int \frac{x+2}{\sqrt{4x^2-4x+3}} dx.$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x+\sqrt{x}}}.$$

$$6. \int \frac{x^2+1}{(x-1)^3(x+3)} dx.$$

13-вариант

$$1. \int \frac{3x^3+x^2+5x+1}{x^2+x} dx.$$

$$3. \int \frac{\sqrt[6]{x}}{1+\sqrt{x}} dx.$$

$$5. \int \frac{x dx}{2x^4+5}.$$

$$2. \int \frac{5x-3}{\sqrt{2x^2+8x+1}} dx.$$

$$4. \int \frac{dx}{4\sin x + 3\cos x + 5}.$$

$$6. \int (x+1)e^x dx.$$

14-вариант

$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{x(x-7)}}.$$

$$3. \int \frac{\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2+x^2}}{\sqrt{4-x^4}} dx.$$

$$5. \int \frac{x^4}{x^4-16} dx.$$

$$2. \int (x^2+3)\cos x dx.$$

$$4. \int \frac{x dx}{2x^2+2x+5}.$$

$$6. \int \sin^2 x \cos^4 x dx.$$

15-вариант

$$1. \int \frac{dx}{(1+x^2)(\operatorname{arctg} x - 3)}.$$

$$3. \int \frac{\ln x}{x^3} dx.$$

$$5. \int \frac{\sqrt{2x-3}}{x} dx.$$

$$2. \int \frac{3x+2}{x^2-4x+12} dx.$$

$$4. \int \frac{2-x}{(7-x)^3} dx.$$

$$6. \int (1 + \sin^4 x) dx.$$

16-вариант

$$1. \int \frac{dx}{\cos^2 x(1+\operatorname{tg} x)^3}.$$

$$3. \int e^{2x} \sin 2x dx.$$

$$5. \int \frac{dx}{5-3\cos x}.$$

$$2. \int \frac{x+4}{\sqrt{7+6x-x^2}} dx.$$

$$4. \int \frac{x^2-2x+1}{x^3+2x^2+x} dx.$$

$$6. \int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x+3}/x)} dx.$$

17-вариант

$$1. \int \frac{e^{2x}}{e^{4x}-5} dx.$$

$$3. \int \frac{5x+3}{\sqrt{4x+5-x^2}} dx.$$

$$5. \int \ln(x^2+1) dx.$$

$$2. \int \frac{dx}{x^4-x^2}.$$

$$4. \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}}.$$

$$6. \int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}.$$

18-вариант

$$1. \int (x^2+3)e^{-2x} dx.$$

$$3. \int \frac{dx}{x \ln^3 x}.$$

$$5. \int \frac{x-1}{\sqrt{2x-1}} dx.$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt{3-x-x^2}}.$$

$$4. \int \frac{dx}{x^4-6x^3+9x^2}.$$

$$6. \int \frac{\sin^3 x}{1+\cos x} dx.$$

19-вариант

$$1. \int (x+2) \ln x dx.$$

$$3. \int \frac{2x+3}{x^2-5x+7} dx.$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)\operatorname{arcsin} x}}.$$

$$2. \int \frac{x^2+x+5}{x(x+3)(x-2)} dx.$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+1}.$$

$$6. \int \frac{dx}{\operatorname{tg}^3 3x}.$$

20-вариант

$$1. \int \frac{81^x-3^x}{9^x} dx.$$

$$2. \int \frac{2x+1}{\sqrt{1+6x-3x^2}} dx.$$

$$3. \int \frac{x dx}{\sqrt{2x+1}} \quad 4. \int \sin(\ln x) dx.$$

$$5. \int \frac{x^2-3}{x^4-5x^2+4} dx \quad 6. \int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x}.$$

21-вариант

$$1. \int 2^x \cdot 3^x dx. \quad 2. \int \arcsin x dx.$$

$$3. \int \frac{x+1}{5x^2+2x+1} dx. \quad 4. \int \frac{x+3}{(x+2)(x^2+x+1)} dx.$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x}-\sqrt{1-2x}}. \quad 6. \int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{7+2 \cos x}} dx.$$

22-вариант

$$1. \int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{7+2 \cos x}} dx. \quad 2. \int x \ln(x^2+1) dx.$$

$$3. \int \frac{3x-13}{x^2-4x+8} dx. \quad 4. \int \frac{x^2}{9-x^4} dx.$$

$$5. \int \frac{dx}{\sin x}. \quad 6. \int \frac{x^4+2x-2}{x^4-1} dx.$$

23-вариант

$$1. \int \sqrt{\sin x} \cos^5 x dx. \quad 2. \int \frac{8x-11}{\sqrt{5+2x-x^2}} dx.$$

$$3. \int \frac{x^2}{1-x^4} dx. \quad 4. \int \frac{dx}{x^3+4x-x^3-4}.$$

$$5. \int \frac{\cos x}{1+\sin x} dx. \quad 6. \int (x^2+1) \cdot 3^x dx.$$

24-вариант

$$1. \int \frac{x+(\arccos 3x)^2}{\sqrt{1-9x^2}} dx. \quad 2. \int \frac{5x+3}{3x^2+2x+1} dx.$$

$$3. \int \frac{x}{\cos^2 x} dx. \quad 4. \int \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt[3]{x}+1)}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

$$5. \int \cos 3x \cos x dx. \quad 6. \int \sqrt{4-x^2} dx.$$

25-вариант

$$1. \int \frac{1+\ln x}{x} dx. \quad 2. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

$$3. \int x^3 e^{x^2} dx. \quad 4. \int \frac{3x-1}{x^2-6x+10} dx.$$

$$5. \int \frac{x+2}{x^3-2x^2+2x} dx. \quad 6. \int \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x^5}+\sqrt[3]{x^3}} dx.$$

4. Туртинчи ёзма иш "Дифференциал тенгламалар" бобида бағишланган бўлиб, унга ҳам икки соат вақт ажратилган. Бу ёзма иш вариантларида 5 та дан мисол бўлиб, берилган дифференциал тенгламаларни ечиш керак. 1,2,3,5-мисолларда умумий ечимни, 4-мисолда берилган бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимни топиш керак.

1-вариант

$$1. y' - \frac{y}{x} - \frac{1}{\sin \frac{y}{x}} = 0.$$

$$2. e^{1+x^2} \operatorname{tg} y dx = \frac{e^{2y}}{x-1} dy.$$

$$3. y'' + y' \operatorname{tg} x = \sin 2x.$$

$$4. y'' - y = \cos 2x, y(0) = -\frac{1}{5}, y'(0) = 1.$$

$$5. y'' + 4y = \operatorname{ctg} 2x.$$

2-вариант

$$1. y' = 4 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2.$$

$$2. y' = 2^{x-y}.$$

$$3. y'' = 4 \cos 2x.$$

$$4. y'' - 2y' + 5y = 5x^2 - 4x + 2, y(0) = 0, y'(0) = 2.$$

$$5. y'' - y = \sin x.$$

3-вариант

$$1. (x^2 + y^2) dx - xy dy = 0.$$

$$2. (1 + e^{2x}) y^2 dy = e^x dx.$$

$$3. yy'' + y'^2 = 0.$$

4. $y'' + 3y' - 10y = xe^{-2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - 3y' + 2y = 2^x$.

4-вариант

1. $xy' - y = x^2 \cos x$.
2. $3e^x \operatorname{tg} y dx = (1 + e^x) \sec^2 y dy$.
3. $x^3 y'' + x^2 y' = 1$.
4. $y'' - 2y' = e^x(x^2 + x - 3)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' - 4y' + 5y = \frac{e^{2x}}{\cos x}$.

5-вариант

1. $y' - \frac{3}{x}y = x$.
2. $\frac{y}{x}y' + e^y = 0$.
3. $x^3 y''' = 6$.
4. $y'' - 4y' + 4y = \sin x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 4y = \cos^2 x$.

6-вариант

1. $y' + 2xy = 2xy^3$.
2. $y' + y = e^x \sin x$.
3. $y''' \sin^4 x = \sin 2x$.
4. $y'' - 3y' + 2y = -e^{-2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - 6y' + 9y = \frac{9x^2 + 6x + 2}{x^3(3x - 2)} e^{3x}$.

7-вариант

1. $x^3 y' + x^2 y + x + 1 = 0$.
2. $(x + y)dx + xdy = 0$.
3. $yy'' + 1 = y'^2$.

$$4. y'' + y = \cos 3x, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

$$5. y'' + 2y' + y = 3e^{-x} \sqrt{x+1}.$$

8-вариант

1. $y' + \frac{2y}{x} = \frac{e^{-x^2}}{x}$.
2. $1 + (1 + y')e^y = 0$.
3. $x^2 y''' = y''^2$.
4. $y'' - y = e^{2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' + y' = \operatorname{tg} x$.

9-вариант

1. $y' + 2xy = xe^{-x^2}$.
2. $x \cos \frac{y}{x} (ydx + xdy) = x^2 \sin \frac{y}{x} dx$.
3. $y'^2 + 2yy'' = 0$.
4. $y'' - 4y = 3xe^{-x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x}$.

10-вариант

1. $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$.
2. $y' + \frac{y}{x+1} + x^2 = 0$.
3. $y'' = 2yy'$.
4. $y'' + 4y = \sin x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - y' = \frac{e^{2x}}{e^x - 1}$.

11-вариант

1. $xy' + y = \sin x$.
2. $y^2 dx = (xy - x^2) dy$.
3. $2xy' y'' = y'^2 - 1$.

$$4. y'' - 2y' + 2y = 2x, y(0) = 0, y'(0) = 0.$$

$$5. y'' - 6y' + 9y = 36\sqrt{x}e^{3x}.$$

12-вариант

$$1. xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}.$$

$$2. y' + \frac{1-2x}{x^2} y = 1.$$

$$3. 2yy'' = 1 + y'^2.$$

$$4. 2y'' + y' - y = 2e^x, y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

$$5. y'' + y = \frac{1}{\cos 2x}.$$

13-вариант

$$1. y' - \frac{y}{x} = e^{\frac{x}{y}}.$$

$$2. y' + \frac{4xy}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1}.$$

$$3. y'^2 = y^2 + 1.$$

$$4. y'' - 4y' + 3y = e^{5x}, y(0) = 3, y'(0) = 9.$$

$$5. y'' + 4y = 2 \operatorname{tg} x.$$

14-вариант

$$1. y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}.$$

$$2. xy' = y - xy.$$

$$3. xy'' - y' = x^2 e^x.$$

$$4. y'' + 4y = 5e^x, y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

$$5. y'' - y' = \frac{1}{1+e^x}.$$

15-вариант

$$1. xy' = y + xe^{\frac{y}{x}}.$$

$$2. x + y = xy'.$$

$$3. x(y'' + 1) + y' = 0.$$

$$4. y'' + y = xe^x, y(0) = 0,5, y'(0) = 1.$$

$$5. y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}.$$

16-вариант

$$1. y' + xy = x^3.$$

$$2. y' + \frac{3}{x} y = \frac{2}{x^3}.$$

$$3. xy'' = y' + x^2.$$

$$4. y'' - y = 2(1-x), y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

$$5. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{\sqrt{4-x^2}}.$$

17-вариант

$$1. x \ln \frac{x}{y} dx - y dy = 0.$$

$$2. y' x + y = -xy^2.$$

$$3. y'' + \frac{1}{x} y' = 0.$$

$$4. y'' - y = 9xe^{2x}, y(0) = 0, y'(0) = -5.$$

$$5. y'' + y = \frac{2+\cos^3 x}{\cos^2 x}.$$

18-вариант

$$1. y' \cos x - y \sin x = \sin x.$$

$$2. (x^2 - 2y^2) dx + 2xy dy = 0.$$

$$3. x^2 y'' + y'^2 = 0.$$

$$4. y'' + 6y' + 8y = 3x^2 + 2x + 1, y(0) = \frac{17}{64}, y'(0) = 0.$$

$$5. y'' + y = \frac{1}{\sin x}.$$

19-вариант

$$1. \left(xye^{\frac{x}{y}} + y^3 \right) dx = x^2 e^{\frac{x}{y}} dy.$$

2. $xy' \ln \frac{y}{x} = x + y \ln \frac{y}{x}$.
3. $x^2 y'' = 4$.
4. $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + y = \tan^2 x$.

20-вариант

1. $x^2 y' = 2xy + 3$.
2. $y^2 + x^2 y' = xy y'$.
3. $y'' = \sqrt{1 - y'^2}$.
4. $y'' + 4y = e^{-2x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - 3y' + 2y = 1 + \frac{1}{1+e^x}$.

21-вариант

1. $dy = (y + x^2)dx$.
2. $y = y' \ln y$.
3. $y^3 y'' - 3 = 0$.
4. $y'' - 4y' + 5y = xe^{2x}$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 4y = \frac{1}{\sin^2 x}$.

22-вариант

1. $(x^2 - 1)y' - xy = x^3 - x$.
2. $(x^2 - x^2 y)y' + y^2 + xy^2 = 0$.
3. $xy'' + 2y' = 0$.
4. $y'' - 3y' - 4y = 17 \sin x$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$.

23-вариант

1. $y'' - 2xy = xe^{-x^2}$.
2. $3e^x \tan y dx = (1 - e^x) \sec^2 y dy$.

3. $1 + y'^2 + yy'' = 0$.
4. $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}(3 - 4x)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + y = \frac{1}{\cos^3 x}$.

24-вариант

1. $xy' = 3y - x^4 y^2$.
2. $(1 + y^2)dx - \sqrt{x} dy = 0$.
3. $yy'' = y'^2$.
4. $y'' + 2y' + y = 9e^{2x} + x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
5. $y'' + y = \operatorname{ctg} x$.

25-вариант

1. $y' - y = e^x$.
2. $x + xy + y'(y + xy) = 0$.
3. $y'' = 2 - y$.
4. $y'' + y = \sin 2x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x$.

3-§. Амалий машғулоти дарсларида зарур бўладиган формулалар

Ажойиб лимитлар

- 1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$;
- 2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$;
- 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$;
- 4) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = e^k$;
- 5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$;
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$;
- 7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\alpha x)}{x} = \alpha$;
- 8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$;
- 9) $\lim_{y \rightarrow \infty} y (a^{\frac{1}{y}} - 1) = \ln a$.

(Ҳосила ва интеграл жадвали китобнинг форзацида берилди.)

**Энг олдий функцияларнинг юкори тартибли
ҳосилалар жадвали**

№	Функция	n - тартибли ҳосиласи
1.	$y = x^m$	$y^{(n)} = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)x^{m-n}$
2.	$y = \ln x$	$y^{(n)} = (-1)^{n-1} (n-1)! \cdot \frac{1}{x^n}$
3.	$y = \log_a x$	$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{\ln a} \cdot \frac{1}{x^n}$
4.	$y = e^{kx}$	$y^{(n)} = k^n e^{kx}$
5.	$y = a^x$	$y^{(n)} = (\ln a)^n a^x$
6.	$y = a^{kx}$	$y^{(n)} = (k \ln a)^n a^{kx}$
7.	$y = \sin x$	$y^{(n)} = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$
8.	$y = \cos x$	$y^{(n)} = \cos \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$
9.	$y = \sin kx$	$y^{(n)} = k^n \sin \left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$
10.	$y = \cos kx$	$y^{(n)} = k^n \cos \left(kx + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$
11.	$y = \operatorname{sh} x$	n – жуфт бўлса, $y^{(n)} = \operatorname{sh} x$, n – тоқ бўлса, $y^{(n)} = \operatorname{ch} x$.
12.	$y = \operatorname{ch} x$	n – жуфт бўлса, $y^{(n)} = \operatorname{ch} x$, n – тоқ бўлса, $y^{(n)} = \operatorname{sh} x$.

**Интегралларнинг кўринишига қараб, ўзгарувчиларни
алмаштириш усуллар жадвали**

№	Интеграл	Ўзгарувчини алмаштириш
1.	$\int R \left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+e}} \right) dx$	$t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+e}}$
2.	$\int R \left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+e}}, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+e}}, \dots \right) dx$	$t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+e}}$, бунда $r-n, m, \dots$ сонларга бўлинувчи энг кичик сон.
3.	$\int R \left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c} \right) dx$	Эйлернинг қуйидаги учта алмаштиришлардан бирини ба- жарилади.

1) агар $a > 0$ бўлса,	$t - \sqrt{a}x = \sqrt{ax^2 + bx + c},$
2) агар $c > 0$ бўлса,	$xt + \sqrt{c} = \sqrt{ax^2 + bx + c},$
3) агар квадрат учҳад $ax^2 + bx + c = (x-\alpha)(x-\beta)$	$t(x-\alpha) = \sqrt{ax^2 + bx + c}.$
бўлса,	
4. $\int R \left(x, \sqrt{x^2 + a^2} \right) dx$	$x = atg t$ ёки $x = a \operatorname{ctg} t$
5. $\int R \left(x, \sqrt{x^2 - a^2} \right) dx$	$x = \frac{a}{\sin t}$ ёки $x = \frac{a}{\cos t}$
6. $\int R \left(x, \sqrt{a^2 - x^2} \right) dx$	$x = a \sin t$ ёки $x = a \cos t.$

АДАБИЁТЛАР

1. Бермант Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: Наука, 1985.
2. Бермант Г.Н., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. — М.: Наука, 1969.
3. Богомолов Н.В. Олий математикадан амалий машғулотлар. — Т.: “Ўқитувчи”, 1976.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. — М.: Наука, 1988.
5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. — М.: Высшая школа, 1986, ч. 1, 2.
6. Демидович В.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. — М.: Наука, 1977.
7. Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов. Под ред. Б.П.Демидовича. — М.: Наука, 1978.
8. Зорич В.А. Математический анализ. 1 и 2 т. — М.: Наука, 1981.
9. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Ч. 1. — М.: Наука, 1971, ч. 2 — 1973.
10. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Высшая школа, 1983.
11. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. В 3 т. — М.: Высшая школа, 1988.
12. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике (типовые расчеты). — М.: Высшая школа, 1983.
13. Минорский В. Олий математикадан масалалар тўплами. — Т.: “Ўқитувчи”, 1963.
14. Рябушко и др. Сборник задач индивидуальных заданий по высшей математике. Часть 1, 2. — Минск, Высшая школа, 1991.
15. Сборник задач по курсу высшей математики. Под ред. Г.И.Кривича. — М.: Высшая школа, 1973.

МУНДАРИЖА

Сўз боши 3

I боб. Функциялар. Лимитлар. Функциянинг узлуксизлиги

1-§. Сонли тўпламлар. Функциянинг таърифи ва берилиш усуллари.	5
2-§. Кетма-кетлик ва функциянинг лимити. Энг содда аниқ-масликлари ечиш.	9
3-§. Ажойиб лимитлар.	13
4-§. Чексиз кичик функцияларни таққослаш. Узлуксиз функциялар.	14
5-§. Биринчи мустақил уй иши.	17
6-§. Иккинчи мустақил уй иши.	26

II боб. Бир ўзгарувчи функциясининг дифференциал ҳисоби ва унинг татбиқлари.

1-§. Ҳосила, унинг геометрик ва физик маъноси. Дифференциаллаш қоидалари ва формуллари.	35
2-§. Мураккаб қўрсаткичи ва ошқормас функцияларнинг ҳосилалари.	41
3-§. Юқори тартибли ҳосилалар.	43
4-§. Функциянинг биринчи ва юқори тартибли дифференциали ва унинг татбиқи.	47
5-§. Дифференциалланувчи функциялар ҳақида баъзи теоремалар. Лопиталь қоида.	52
6-§. Функцияларни текшириш ва уларнинг графикларини ясашда ҳосиланинг татбиқи.	56
7-§. Функцияни текширишнинг умумий схемаси ва унинг графигини ясаш.	67
8-§. Максимум ва минимум назариясининг амалий масалаларни ечишга татбиқи.	70
9-§. Биринчи мустақил уй иши.	73
10-§. Иккинчи мустақил уй иши.	90
11-§. Учинчи мустақил уй иши.	101
12-§. Тўртинчи мустақил уй иши.	112

III боб. Комплекс сонлар.

1-§. Комплекс сон ҳақида тушунча. Комплекс сонлар устида асосий амаллар.	124
--	-----

IV боб. Аниқмас интеграл.

1-§. Бошланғич функция ва аниқмас интеграл.	129
2-§. Функцияларни босита интеграллаш.	134
3-§. Квадрат учқал қатнашган функцияларнинг интеграллари.	138
4-§. Ўзгарувчини алмаштириш усули билан интеграллаш.	143
5-§. Бўлаклаб интеграллаш.	148
6-§. Рационал функцияларни интеграллаш.	151
7-§. Баъзи иррационал функцияларни интеграллаш.	156
8-§. Тригонометрик функцияларни интеграллаш.	161
9-§. Биринчи мустақил уй иши.	164
10-§. Иккинчи мустақил уй иши.	178

11-§. Учинчи мустақил уй иши.	190
12-§. Тўртинчи мустақил уй иши.	199

V боб. Аниқ интеграл.

1-§. Аниқ интеграл ҳақида тушунча. Аниқ интегрални ҳисоблаш.	213
2-§. Ҳосмас интеграллар.	221
3-§. Аниқ интегралнинг геометрияга оид масалаларни ечишга татбиқи.	227
4-§. Аниқ интегралнинг физикага оид масалаларни ечишга татбиқи.	238
5-§. Биринчи мустақил уй иши.	244
6-§. Иккинчи мустақил уй иши.	261

VI боб. Бир неча ўзгарувчи функцияларининг дифференциал ҳисоби.

1-§. Бир неча ўзгарувчи функциялар ҳақида тушунча. Хусусий ҳосила.	282
2-§. Функциянинг тўла дифференциали. Мураккаб ва ошқормас функцияларни дифференциаллаш.	288
3-§. Юқори тартибли хусусий ҳосилалар. Сирга ўтказилган уринма ва нормал текисликларнинг тенгламалари.	292
4-§. Икки ўзгарувчи функциянинг экстремуми.	296
5-§. Биринчи мустақил уй иши.	301
6-§. Иккинчи мустақил уй иши.	313

VII боб. Оддий дифференциал тенгламалар.

1-§. Асосий тушунчалар. Биринчи тартибли дифференциал тенгламалар. Изоклин усули.	324
2-§. Ўзгарувчилар ажраладиган ва бир жинсли дифференциал тенгламалар.	330
3-§. Биринчи тартибли чизикли дифференциал тенгламалар. Бернулли тенгламаси.	335
4-§. Тулиқ дифференциал тенглама.	342
5-§. Тартибни пасайтириш мумкин бўлган юқори тартибли дифференциал тенгламалар.	344
6-§. Юқори тартибли чизикли дифференциал тенгламалар.	350
7-§. Дифференциал тенгламалар системаси ҳақида тушунча.	368
8-§. Биринчи мустақил уй иши.	385
9-§. Иккинчи мустақил уй иши.	396
10-§. Учинчи мустақил уй иши.	411
11-§. Тўртинчи мустақил уй иши.	421

VIII боб.

1-§. Олий математика татбиқига доир масалалар.	435
2-§. Амалий машғулот дарсида олий математикадан ёзма иш ўтказиш вариантдан намуналар.	481
3-§. Амалий машғулот дарсарида зарур бўладиган формуллалар.	507
Алабийётлар.	509

22.161.6
Т.24

Тожиёв Ш.И.

Олий математикадан масалалар ечиш. Олий ўқув юр-
лари талабалари учун дарслик. Т.: "Ўзбекистон", 2002.— 512 б.

ББК 22.161.6я73

Таджиев Шукрулла Исмоилович

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШ

Тошкент — "Ўзбекистон" — 2002

Муҳаррир *Я. Алимова*

Бадий муҳаррир *Ҳ. Меҳмонов*

Техник муҳаррир *У. Ким*

Мусахҳиҳ *М. Раҳимбекова*

Компьютерда тайёрловчи *Л. Абкеримова*

Теришга берилди 5.02.02. Босишга рухсат этилди 26.09.02.
Қоғоз формати 84×108¹/₃₂. Шартли босма т. 26,88. Нашр т. 23,79.
Тиражи 2000. Буюртма № 321. Баҳоси шартнома асосида.

«Ўзбекистон» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий, 30,
Нашр № 13-2002.

Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг
Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 700129, Тошкент ш.,
Навоий кўчаси, 30, 700169. Тошкент. У. Юсупов кўчаси, 86 уй.