






Х.Латипов, Ш.Тожиев, Р.Рустамов

АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРА





Х. Р. ЛАТИПОВ, Ш. И. ТОЖИЕВ, Р. РУСТАМОВ


516

А-24

АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРА

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги олий техника ўқув юртлари
талабалари учун ўқув қўлланма сифатида
тавсия этган*

ТОШКЕНТ
«ЎЗБЕКИСТОН»
1995



22.151.5
Л 24

Такризчилар: А. Ҳамидов — ТошДУ профессори, физика-математика фанлари доктори, Н. Абдуллаев — ТошДУ доценти, физика-математика фанлари номзоди, Э. Солиев — ТошДУ доценти, физика-математика фанлари номзоди

Махсус муҳаррир — У. Ф. Носиров, ТошДУ профессори, физика-математика фанлари доктори

Муҳаррир — Х. Алимов

ISBN 5-640-01785-6

1602050000—118

А — 95

М351 (04) 95

© «ЎЗБЕКИСТОН» нашриёти, 1995

СЎЗ БОШИ

Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра курсидан ёзилган мазкур қўлланма олий техника ўқув юртларида кундузги, кечки ва сиртдан таълим олаётган биринчи босқич талабаларига мўжжалланган. Қўлланма олий техника ўқув юртлари учун тасдиқланган «Олий математика» дастури асосида ёзилган.

Қўлланманинг асосий вазифаси аналитик геометрия ва чизиқли алгебра курсига доир назарий материални баён этиш, мавжуд темаларга доир мисол ва масалаларни ечиш усуллари кўрсатишдан иборат.

Математикани техника ихтисосликларига мослаб ўқитиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аналитик геометрия ва чизиқли алгебра курсининг физика, механика, радиотехника, электротехника ва бошқа фанларга татбиқига алоҳида эътибор берилди ва уларга доир мисол ва масалаларни ечиш усуллари кўрсатилди.

Шунингдек, бу курсни яхши ўзлаштирган ва янада чуқурроқ ўзлаштириш истаги бўлган талабалар учун 9- бобда аналитик геометрия ва чизиқли алгебра курсига доир масалалар ечилишлари билан ҳамда мустақил ечиш учун мисол ва масалалар келтирилди.

Қўлланма 9 та боб ва юқори тартибли ажойиб эгри чизиқларга бағишланган иловадан иборат. Қўлланмага муаллифларнинг Абу Райхон Беруний номли Тошкент Давлат техника университетида кўп йиллар давомида ўқиган маърузалари ва амалий машгулот материаллари асос қилиб олинди. Бундан ташқари, мавжуд ўзбек ва рус тилларидаги адабиётлардан ҳам кенг фойдаланилди.

Муаллифлар китоб қўлёзмасини диққат билан ўқиб чиқиб, бир қатор фойдали маслаҳатлар ва тузатишлар берганликлари учун ТошДУ профессори А. Ҳамидов, доцент Н. Абдуллаев, ТошДТУ доценти Э. Солиев, доцент С. Эргашевга, шунингдек 1- олий математика кафедраси ўқитувчиларига ўз миннатдорчиликларини билдирадилар.

Қўлланма ҳақида билдирилган фикр ва мулоҳазаларни миннатдорчилик билан қабул қиламиз.

Муаллифлар

ДЕТЕРМИНАНТЛАР ВА ЧИЗИҚЛИ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАСИ

Бу бобда иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар назариясига онд асосий маълумотлар ва бу детерминантлар билан боғлиқ икки ва уч номаълумли чизиқли тенгламалар системаларини ечиш масалалари қисқача баён қилинади. n -тартибли детерминантларнинг умумий назарияси ва чизиқли тенгламалар системасини Крамер ва Гаусс усуллари билан ечиш кўрсатилади.

1-§. Иккинчи тартибли детерминантлар

Берилган тўртта сондан иборат қуйидаги

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

жадвал 2-тартибли квадрат матрица деб аталади. Бундай матрица иккита сатр ва иккита устунга эга. Бу матрицани тузувчи сонлар иккита индексли, масалан a_{ij} ($i, j=1,2$) ҳарф билан белгиланади. Бу ерда i индекс мазкур сон турган матрицанинг сатр номерини кўрсатса, j индекс эса устун номерини билдиради. $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ сонлар матрицанинг элементлари деб аталади. (1.1) матрицага мос иккинчи тартибли детерминант деб $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ сонга айтилади ва у қуйидагича белгиланади:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1.2)$$

ёки

$$\Delta = \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Бу детерминант иккита a_{11} , a_{12} ва a_{21} , a_{22} сатр элементлари ва иккита a_{11} , a_{21} ва a_{12} , a_{22} устун элементларидан иборат. a_{11} , a_{22} элементларга бош диагональ элементлари, a_{12} , a_{21} лар эса ёрдамчи диагональ элементлари дейилади.

Демак, иккинчи тартибли детерминантни ҳисоблаш учун унинг бош диагонали элементлари кўпайтмасидан ёрдамчи диагонали элементлари кўпайтмасини айириш керак экан.

1-мисол. Куйидаги детерминантлар ҳисоблансин:

$$1. \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, 2. \begin{vmatrix} \cos 2x & -\sin 2x \\ \sin 2x & \cos 2x \end{vmatrix}, 3. \begin{vmatrix} \operatorname{tg} 3\alpha & 1 \\ -1 & \operatorname{ctg} 3\alpha \end{vmatrix}$$

Ечиш. (1.2) формулага кўра ҳисоблаймиз:

$$1. \Delta = \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-5) \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = 5 - 6 = -1.$$

$$2. \Delta = \begin{vmatrix} \cos 2x & -\sin 2x \\ \sin 2x & \cos 2x \end{vmatrix} = \cos 2x \cdot \cos 2x + \sin 2x \cdot \sin 2x = \\ = \cos^2 2x + \sin^2 2x = 1.$$

$$3. \Delta = \begin{vmatrix} \operatorname{tg} 3\alpha & 1 \\ -1 & \operatorname{ctg} 3\alpha \end{vmatrix} = \operatorname{tg} 3\alpha \cdot \operatorname{ctg} 3\alpha - 1 \cdot (-1) = \\ = 1 + 1 = 2.$$

Иккинчи тартибли детерминантни икки номаълумли иккита чизикли тенглама системасининг умумий ечимини топиш натижасида келиб чиқишини кўрсатайлик. Ушбу

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = c_1, \\ a_{21}x + a_{22}y = c_2 \end{cases} \quad (1.3)$$

чизикли тенгламалар системаси берилган бўлсин. (1.3) системанинг тенгламаларидан биринчисининг ҳар иккала қисмини a_{22} га, иккинчисини эса a_{12} га кўпайтириб, ҳосил бўлган тенгликларни ҳадма-ҳад қўшиб куйидаги натижага эга бўламиз:

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x = c_1a_{22} - c_2a_{12}. \quad (1.4)$$

Шунга ўхшаш, биринчи тенгламани — a_{21} га, иккинчи тенгламани эса a_{11} га кўпайтириб, уларни ҳадма-ҳад қўшиб,

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})y = c_2a_{11} - c_1a_{21} \quad (1.5)$$

тенгликни ҳосил қиламиз. (1.4) ва (1.5) тенгликларга (1.2) ни татбиқ этамиз ва қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\Delta = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_x = c_1a_{22} - c_2a_{12} = \begin{vmatrix} c_1 & a_{12} \\ c_2 & a_{22} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_y = c_2a_{11} - c_1a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & c_1 \\ a_{21} & c_2 \end{vmatrix}.$$

Δ_x, Δ_y — ёрдамчи детерминантлар дейилади.

Натижада (1.3) системага эквивалент бўлган ушбу содда чиқиқли тенгламалар системасини олишимиз мумкин:

$$\begin{cases} \Delta \cdot x = \Delta_x, \\ \Delta \cdot y = \Delta_y \end{cases} \quad (1.6)$$

(1.3) ёки (1.6) тенгламалар системаси учун қуйидаги ҳоллардан бири бўлиши мумкин.

1. Агар $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ бўлса, y ҳолда (1.3) система ягона ечимга эга бўлиб, y қуйидагича топилади:

$$x = \frac{c_1a_{22} - c_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}; y = \frac{c_2a_{11} - c_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

ёки

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & a_{12} \\ c_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}; y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & c_1 \\ a_{21} & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}. \quad (1.7)$$

(1.7) формула Крамер формулалари дейилади. (Крамер Г. 31.07.1704—4.01.1752, швейцариялик математик.)

Геометрик нуқтани назардан агар (1.3) система ягона (1.7) ечимга эга бўлса, y ҳолда (1.3) система тенгламалари текисликдаги иккита тўғри чиқиқ тенгламалари бўлиб, улар $(x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta})$ нуқтада ўзаро кесишишини билдиради.

2. Агар $\Delta=0$ бўлиб Δ_x ёки Δ_y ёрдамчи детерминантлардан камида биттаси нолдан фаркли бўлса, у ҳолда (1.3) система ечимга эга эмас ёки берилган система тенгламалари биргаликда эмас дейилади.

Буни қуйидагича кўрсатамиз. $\Delta=0$ дан $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}=0$ келиб чиқади. Бундан $\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} = k$

десак (k — бирор ҳақиқий сон), ундан $a_{11}=ka_{12}$ ва $a_{21}=ka_{22}$ ларни ҳосил қиламиз. Агар уларни (1.3) системага қўйсак:

$$\begin{cases} k(a_{21}x + a_{22}y) = c_1, \\ a_{21}x + a_{22}y = c_2 \end{cases}$$

ни ҳосил қиламиз. $k \neq 0$ деб охириги системани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} a_{21}x + a_{22}y = \frac{c_1}{k}, \\ a_{21}x + a_{22}y = c_2. \end{cases} \quad (1.8)$$

Бундан $\frac{c_1}{k} = c_2$ ёки $\frac{c_1}{k} \neq c_2$ бўлиши мумкин. Агар

$c_1 \neq kc_2$ бўлса, $c_1 \neq c_2 \cdot \frac{a_{11}}{a_{12}}$, яъни $\Delta_y \neq 0$ ёки $c_1 \neq c_2 \times$

$\times \frac{a_{21}}{a_{22}}$, яъни $\Delta_x \neq 0$ бўлади. Бундан эса (1.3) тенглама-

лар системаси ечимга эга эмаслиги келиб чиқади. (1.3) даги ҳар бир тенглама $\Delta=0$ бўлганда (1.8) тенгламалар системасига келади ва у параллел ($c_1 \neq kc_2$) тўғри чизиқларни ифодалайди.

3. Агар $\Delta=\Delta_x=\Delta_y=0$ бўлса, (1.3) системадаги биринчи тенгламанинг коэффициентлари иккинчи тенгламанинг коэффициентларига пропорционал бўлади ва (1.3) система чексиз куп ечимга эга бўлади. $\Delta_x=\Delta_y=0$ бўлса, $c_1=kc_2$ бўлиб (1.8) система

$$\begin{cases} a_{21}x + a_{22}y = c_2, \\ a_{21}x + a_{22}y = c_2 \end{cases}$$

кўринишга келади. Бу система устма-уст тушган икки тўғри чизиқни ифодалайди.

1-мисол. Ушбу системани ечинг:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12, \\ x - 2y = -4. \end{cases}$$

Ечиш. (1.7) формуладан фойдаланиб қуйидаги детерминантларни тузамиз ва уларни ҳисоблаймиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 2 = -8,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 12 & 2 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = -24 + 8 = -16,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -12 - 12 = -24.$$

$\Delta = -8 \neq 0$ бўлгани учун система ягона ечимга эга. Крамер формуласига кўра:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-16}{-8} = 2,$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-24}{-8} = 3.$$

Демак, тўғри чизиқлар xOy текисликда $(2;3)$ нуктада ўзаро кесишар экан.

2-мисол. Ушбу системани ечинг:

$$\begin{cases} 7x + 9y = 17, \\ 14x + 18y = 13. \end{cases}$$

Ечиш. Қуйидаги детерминантларни тузамиз ва уларни ҳисоблаймиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 14 & 18 \end{vmatrix} = 7 \cdot 18 - 9 \cdot 14 = 126 - 126 = 0;$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 17 & 9 \\ 13 & 18 \end{vmatrix} = 189; \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 7 & 17 \\ 14 & 13 \end{vmatrix} = -147;$$

$\Delta = 0$; $\Delta_x = 189 \neq 0$; $\Delta_y = -147 \neq 0$ ёки $\frac{7}{14} = \frac{9}{18} \neq \frac{17}{13}$ бўлгани учун система ечимга эга эмас.

3-мисол. Ушбу системани ечинг:

$$\begin{cases} 2x - 5y = 3, \\ 8x - 20y = 12. \end{cases}$$

Ечиш. Бу система учун:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 8 & -20 \end{vmatrix} = 0; \Delta_x = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 12 & -20 \end{vmatrix} = 0; \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 12 \end{vmatrix} = 0$$

ёки $\frac{2}{8} = \frac{-5}{-20} = \frac{3}{12}$ бўлгани учун система тенгламалари устма-уст тушувчи тўғри чизикларни ифодалайди ва бундан система чексиз кўп ечимга эга эканлиги келиб чиқади.

2-§. Учинчи тартибли детерминантлар ва уларнинг хоссалари

Ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ ёки } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (1.9)$$

кўринишдаги сонли жадвалга учинчи тартибли квадрат матрица дейилади. (1.9) матрицанинг учинчи тартибли детерминанти деб,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

каби белгиланувчи ва сон қиймати иккинчи тартибли детерминант орқали қуйидаги:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \\ &- a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (1.10)$$


тенглик билан аниқланувчи сонга айтилади. (1.10) формуладаги иккинчи тартибли детерминантлар ўрнига (1.2) формуладан фойдаланиб уларнинг қийматларини қўйсак, у ҳолда учинчи тартибли детерминант учун ушбу

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11}) \quad (1.11)$$



хисоблаш формуласини ҳосил қиламиз.

Қулайлик учун детерминантнинг элементларини икки-та индексли битта a_{ij} (бунда $i, j = 1, 2, 3$) ҳарф билан белгилаш қабул қилинган бўлиб, биринчи индекс ҳар доим элемент жойлашган сатр номерини, иккинчи-индекс эса устун номерини кўрсатади. Масалан, a_{31} ёзув бу ҳад учинчи сатрнинг биринчи устуни элементи эканини билдиради. a_{11} , a_{22} , a_{33} элементлар бош диагонал элементлари, a_{13} , a_{22} , a_{31} элементлар эса ёрдамчи диагонал элементлари дейилади.

(1.11) ҳисоблаш формуласининг ўнг томонидаги қўшилувчиларнинг ишораларини ушбу схемадан фойдаланиб аниқлаш қулай (буни учбурчак усули ҳам дейилади):



Учинчи тартибли детерминантни Сарриус қондаси (элементларни кўчириш усули ҳам дейилади) деб аталувчи усул билан ҳам ҳисоблаш мумкин. Бу усулни схема кўринишида қуйидагича ёзиш мумкин:



1-мисол. Қуйидаги учинчи тартибли детерминантларни ҳисобланг:

$$1. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix}; 2. \begin{vmatrix} b & 1 & b \\ -1 & b & 1 \\ b & -1 & b \end{vmatrix}$$

Е чи ш. Берилган детерминантларни юқоридаги схема ва (1.11) формулага кўра ҳисоблаймиз.

$$1. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix} = (2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot 5) - \\ - (30 \cdot 4 + 2 \cdot 5 - (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 2) = \\ = -4 + 15 - (-10 + 2) = 11 + 8 = 19.$$

$$2. \begin{vmatrix} b & 1 & b \\ -1 & b & 1 \\ b & -1 & b \end{vmatrix} = (b \cdot b \cdot b + b + b) - \\ - (b \cdot b \cdot b - b - b) = \\ = b^3 + b + b - b^3 + b + b = 4b.$$

Учинчи тартибли детерминантни ҳисоблашнинг (1.11) формуласидаги алгебраик йиғиндиларнинг ҳар бир ҳади учта элемент кўпайтмасидан иборат бўлиб, бу кўпайтувчиларнинг ҳар бири детерминантнинг турли устун ва турли сатридан олингандир. Масалан, $a_{12}a_{21}a_{33}$ кўпайтманинг биринчи коэффиценти a_{12} 1-устуннинг биринчи сатрига жойлашган сон бўлса, қолган икки коэффицент 2-устун ва 1-сатрдан бошқа ерда жойлашган сони (a_{21} 2-сатр, 1-устун; a_{33} 3-сатр, 3-устун) бўлади. Шундай қилиб, детерминантни ҳисоблаш учун берилган (1.11) формуладан унинг элементларидан бири (масалан, a_{11}) қатнашган кўпайтмалар йиғиндисини олсак, улар 2 та бўлиб, у $a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}$ кўринишда ёзилади. Ундан a_{11} ни қавсдан чиқариб ёзамиз: $a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23})$. Бу ерда қавс ичидаги айирма a_{11} элементнинг тўлдирувчи минори деб аталади ва

$$M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

кўринишда ёзилади. Детерминантнинг исталган элементларининг тўлдирувчи минорларини худди шундай

ёзиш мумкин. Масалан, детерминантнинг a_{22} элементи-
нинг тўлдирувчи минори ушбу кўринишда ёзилади:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Демак, бирор элементнинг минори деб шу элемент турган сатр ва устунни ўчиришдан ҳосил бўлган детерминантга айтилади.

Бирор элементнинг алгебраик тўлдирувчиси деб унинг мусбат ёки манфий ишора билан олинган тўлдирувчи минорига айтилади ва у A_{ij} орқали белгиланади:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}. \quad (1.12)$$

Бу формуладаги M_{ij} минорни аниқлаш усулини келтирамиз. Бунинг учун

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

детерминантни ёзамиз. M_{ij} минорни аниқлаш учун детерминантнинг i -сатридаги ва j -устунидаги барча элементларни ўчиришдан қолган элементларини ёзсак, иккинчи тартибли детерминант ҳосил бўлади ва у биз излаётган M_{ij} минорни беради. Масалан, a_{12} элементнинг минорини топиш учун Δ детерминантнинг 1-сатридаги a_{11} , a_{12} , a_{13} элементлари ҳамда 2-устундаги a_{12} , a_{22} , a_{32} элементларини ўчирсак, ўчирилмай қолган элементлардан ташкил топган M_{12} минорни ҳосил қиламиз:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Бошқа элемент минорлари ҳам шундай топилади. Масалан, M_{31} ни топайлик (Δ детерминантда 1-устун ва 3-сатрни ўчирамиз):

$$M_{31} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

a_{13} элементнинг алгебраик тўлдирувчиси (1.12) формулага кўра қуйидагича ҳисобланади:

$$A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

a_{32} элементнинг алгебраик тўлдирувчиси эса қуйидаги қўринишга эга:

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Бундан фойдаланиб ихтиёрий тартибли детерминантни унинг элементларини мос алгебраик тўлдирувчиларга қўпайтмаларининг йигиндиси қўринишида ифода-лаш мумкин.

Масалан, (1.10) детерминантнинг сатр элементлари учун

$$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13},$$

устун элементлари учун

$$\Delta = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j}$$

тенгликларни ёзиш мумкин (бунда $i, j=1,2,3$).

Аммо, детерминантнинг бирор сатри (устуни) элементларини бошқа сатри (устуни) элементларининг алгебраик тўлдирувчиларига қўпайтмаларининг йигиндиси нолга тенг бўлади.

Масалан, сатрлар учун: $a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0$,
устунлар учун: $a_{12}A_{11} + a_{22}A_{21} + a_{32}A_{31} = 0$.

Булардан биринчисини текшириб кўрамиз:

$$\begin{aligned} a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} &= -a_{11} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \\ &+ a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{13} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\ &= -a_{11}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{12}(a_{11}a_{33} - \\ &- a_{13}a_{31}) - a_{13}(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}) = \\ &= -a_{11}a_{12}a_{33} + a_{11}a_{13}a_{32} + a_{11}a_{12}a_{33} - \\ &- a_{12}a_{13}a_{31} - a_{11}a_{13}a_{32} + a_{12}a_{13}a_{31} = 0. \end{aligned}$$

2-мисол. Куйидаги учинчи тартибли детерминантни 1-устуни элементлари бўйича ёйиб ҳисобланг:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{vmatrix}$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} - \\ &- 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= (-2 + 5) - 2(4 - 5) + 3(2 - 1) = 3 + 2 + 3 = 8. \end{aligned}$$

Энди детерминантларнинг асосий хоссаларини кўриб чиқамиз.

1-хосса. Агар детерминантнинг ҳамма устунларини унинг ҳамма сатрлар билан (ёки аксинча) ўринларини мос равишда алмаштирилса, детерминантнинг қиймати ўзгармайди, яъни

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

2-хосса. Агар детерминантнинг ихтиёрий иккита сатрининг (ёки иккита устуннинг) ўринлари алмаштирилса, детерминантнинг фақат ишораси ўзгаради:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

3-хосса. Агар детерминантнинг иккита сатри (ёки иккита устуни) бир хил элементлардан иборат бўлса, детерминантнинг қиймати нолга тенг бўлади.

4-хосса. Агар детерминантнинг бирор сатр (ёки устун) элементлари битта умумий купайтувчига эга

булса, бу купайтувчини детерминант белгисидан ташкарига чиқариш мумкин:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12} & a_{13} \\ a_{21} & ka_{22} & a_{23} \\ a_{31} & ka_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

5-хосса. Агар детерминантни бирор сатри (устуни) нинг ҳар бир элементи икки қўшилувчининг йигиндисидан иборат бўлса, берилган детерминантни икки детерминантнинг йигиндиси кўринишида ёзиш мумкин. Бунда биринчи қўшилувчи детерминант элементлари берилган детерминант элементларидан иборат, иккинчи қўшилувчи детерминант элементлари эса фақат қўшилувчи сатр (устун) элементлари билан фарқ қилади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + m_1 a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + m_2 a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + m_3 a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & m_1 a_{13} \\ a_{21} & m_2 a_{23} \\ a_{31} & m_3 a_{33} \end{vmatrix}.$$

6-хосса. Агар детерминантнинг бирор сатр (устуни) нинг барча элементлари нолга тенг бўлса, бундай детерминантнинг қиймати нолга тенг бўлади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0.$$

7-хосса. Агар детерминантнинг иккита сатри (ёки иккита устуни) нинг мос элементлари пропорционал бўлса, бу детерминантнинг қиймати нолга тенг бўлади. Масалан:

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \\ 15 & 5 & 11 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 7 \\ 1 & 1 & 9 \\ 5 & 5 & 11 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 = 0.$$

8-хосса. Детерминантнинг бирор сатр (устун) элементларига бошқа сатр (устун) нинг бир хил сояга купайтирилган мос элементларини қўшишдан ҳосил бўлган детерминантнинг қиймати дастлабки детерминант қийматига тенг бўлади. Масалан:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + ka_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ka_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + ka_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

9-хосса. Детерминантнинг бирор сатри (устуни) элементларининг унинг бошқа сатри (устуни) элементлари алгебраик тўлдирувчилари билан купайтмаларининг йигиндиси нолга тенг. Масалан:

$$\begin{aligned} a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} &= 0, \\ a_{12}A_{11} + a_{22}A_{21} + a_{32}A_{31} &= 0. \end{aligned}$$

Детерминантларнинг хоссаларини исботлашни ўқувчининг ўзига ҳавола қиламиз.

3-§. Уч номаълумли учта чизикли тенгламалар системалари

Уч номаълумли учта чизикли тенгламалар системаси берилган бўлсин:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = c_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = c_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = c_3. \end{cases} \quad (1.13)$$

Икки номаълумли иккита чизикли тенгламалар системасининг умумий ечимини топишда номаълумлар олдидаги коэффицентларни тенглаб биринчи тенгламадан иккинчисини айириш натижасида битта номаълумли тенглама ҳосил қилиниб ундан номаълумнинг қиймати топилган эди. Худди шу ишни (1.13) системага татбиқ этсак, натижада (1.13) системага эквивалент куйидаги тенгламалар системасига эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 \cdot \Delta = \Delta_{x_1}, \\ x_2 \cdot \Delta = \Delta_{x_2}, \\ x_3 \cdot \Delta = \Delta_{x_3} \end{cases} \quad (A)$$

бунда

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} c_1 & a_{12} & a_{13} \\ c_2 & a_{22} & a_{23} \\ c_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & c_1 & a_{13} \\ a_{21} & c_2 & a_{23} \\ a_{31} & c_3 & a_{33} \end{vmatrix}; \Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & c_2 \\ a_{31} & a_{32} & c_3 \end{vmatrix}.$$

Номаълумлар олдидаги коэффициентлардан тузилган учинчи тартибли Δ детерминант (1.13) системанинг детерминанти дейилади. Δ_{x_1} , Δ_{x_2} ва Δ_{x_3} детерминантлар ёрдамчи детерминантлар дейилади.

Агар (A) системада $\Delta \neq 0$ бўлса, у ҳолда

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}; x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}; x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta}. \quad (1.14)$$

x_1 , x_2 , x_3 нинг (1.14) формулалар бўйича топилган қийматлари (1.13) системанинг ечимлари бўлишини бевосита текшириб қўриш билан ишонч ҳосил қилиш мумкин. (1.14) тенгликлар Крамер формулалари дейилади.

(1.14) формулаларда қуйидаги ҳоллар содир бўлиши мумкин.

1. $\Delta \neq 0$. Бу ҳолда (1.14) формулалардан система ягона ечимга эга экани келиб чиқади.


1- мисол. Ушбу системани ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 8. \end{cases}$$

Е чи ш. Бу ерда

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -8; \Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 8 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -8;$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = -16; \Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 8 \end{vmatrix} = -24.$$



(1.14) формулалардан қуйидагиларни топамиз:

$$x_1 = \frac{-8}{-8} = 1; x_2 = \frac{-16}{-8} = 2; x_3 = \frac{-24}{-8} = 3.$$

Ж а в о б: (1;2;3)

2. $\Delta=0$ ва $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \Delta_{x_3}$ детерминантлардан камида биттаси нолдан фарқли бўлса, у ҳолда (1.13) система ечимга эга эмас. Аниклик учун $\Delta_{x_1}=\Delta_{x_2}=0$ бўлиб, $\Delta_{x_3} \neq 0$ бўлсин. У ҳолда (1.14) дан:

$$x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} \Rightarrow \Delta \cdot x_3 = \Delta_{x_3}.$$

Аммо, охирги тенгликнинг ўнг томони нолдан фарқли ($\Delta_{x_3} \neq 0$), чап томони эса нолга тенг, бунинг бўлиши мумкин эмас. Демак, ечимга эга эмас.

2- мисол. Ушбу

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 3, \\ 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

тенгламалар системаси ечимга эга эмас, чунки $\Delta=0$ (текшириб кўришни ўқувчининг ўзига ҳавола қиламиз).

3. $\Delta=0$ ва $\Delta_{x_1}=\Delta_{x_2}=\Delta_{x_3}=0$ бўлса, (1.3) система ёки ечимга эга эмас, ёки чексиз кўп ечимга эга бўлади.

3- мисол. Ушбу тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 4, \\ 3x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 3. \end{cases}$$

Е ч и ш. Бу система учун

$$\Delta=0, \Delta_{x_1}=\Delta_{x_2}=\Delta_{x_3}=0.$$

Система ечимга эга эмас, чунки системадаги биринчи ва учинчи тенгламалар биргаликда бўла олмайдилар. Ҳақиқатан ҳам, биринчи тенгламани 3 га кўпайтириб, ундан учинчи тенгламани айирсак, мумкин бўлмаган $0=3$ тенгликка эга бўламиз.

4- мисол. Ушбу

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 6, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

система учун $\Delta = \Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = \Delta_{x_3} = 0$. Системадаги иккинчи тенглама биринчи тенгламани 2 га кўпайтиришдан ҳосил бўлгани учун берилган система ушбу

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

системага тенг кучли ва чексиз кўп ечимлар тўпламига эга. x_3 га ихтиёрий қийматлар бериб x_1 ва x_2 нинг унга мос қийматларини топамиз. Масалан, $x_3 = 1$ да

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4, \\ 3x_1 - x_2 = -3 \end{cases}$$

системани ҳосил қиламиз, уни ечиб $x_1 = -\frac{5}{11}$.

$x_2 = \frac{18}{11}$ ни топамиз. $x_1 = 0$ да $x_2 = 1$, $x_3 = 0$ га эга бўламиз.

4- §. n - тартибли детерминантлар ва уларни ҳисоблаш

Ушбу

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (1.15)$$

n - тартибли квадрат матрица берилган бўлсин (унда сатр ва устунлар сони тенг бўлиб, уларнинг ҳар биридаги сонлар n га бўлсин). Юқорида киритилгани каби (иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар) бу ерда ҳам A матрицага мос келувчи n - тартибли детерминантни киритамиз:

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.16)$$

Бу детерминантда $n=2$ ва $n=3$ бўлган ҳоллар 1—2. §§ ларда кўрилди. Уни ҳисоблаш, амалий татбикига мисоллар келтирилди. $n=1$ бўлганда эса (1.16) детерминант фақат битта элементдан иборат бўлган детерминантдан иборат бўлади. Унинг қиймати шу детерминантнинг элементига тенг бўлади.

Агар a_{ij} (бунда $i, j=1, n$) $\Delta = |A|$ детерминантнинг i -сатр ва j -устунида жойлашган элементи бўлса, M_{ij} билан бу элементнинг тўлдирувчи минорини, яъни (1.16) детерминантда i -сатр ва j -устунни ўчиришдан ҳосил бўлган $(n-1)$ тартибли детерминантни белгилаймиз:

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1, j-1} & a_{1, j+1} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i-1, 1} & \dots & a_{i-1, j-1} & a_{i-1, j+1} & \dots & a_{i-1, n} \\ a_{i+1, 1} & \dots & a_{i+1, j-1} & a_{i+1, j+1} & \dots & a_{i+1, n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n, j-1} & a_{n, j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

a_{ij} элементнинг алгебраик тўлдирувчиси A_{ij} деб

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

ифодани белгилаймиз.

n -тартибли детерминантларни ҳисоблаш формуласи йўқ. Аммо уни сатр (устун) элементлари бўйича ёйиб қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} \quad (1.17)$$

Шундай қилиб, n -тартибли детерминант унинг биринчи сатрининг барча элементларини уларнинг мос алгебраик тўлдирувчиларига кўпайтмалари йиғиндисига тенг. (1.17) ёйилмадаги алгебраик тўлдирувчиларни мусбат ёки манфий ишорали мос минорлар билан алмаштирилса, n -тартибли детерминантни ҳисоблаш

$(n-1)$ -тартибли бир неча детерминантни ҳисоблашга келтирилади.

(1.17) даги ҳар бир $(n-1)$ -тартибли детерминантларни ихтиёрий сатр ёки устун элементларининг уларнинг мос алгебраик тўлдирувчиларига кўпайтмалари йигиндиси кўринишида ёзамиз. Натижада $(n-1)$ -тартибли детерминантни ҳисоблаш $(n-2)$ -тартибли бир неча детерминантни ҳисоблашга келтирилади. Бу жараён учинчи ёки иккинчи тартибли детерминантлар ҳосил бўлгунча кетма-кет бажарилади.

Энди детерминантларни ҳисоблашни осонлаштирадиган бир неча усулни кўрсатамиз. Энг содда ва кўп қўлланиладиган усуллардан бири детерминантларни берилган устуни ёки сатри элементлари бўйича бир марта ёки кўп марта ёйишдир. Бунда ноль элементи кўп бўлган сатр ёки устуни танлаш мақсадга мувофиқдир. Кўпинча, детерминантни бирор сатри (ёки устуни) элементлари бўйича ёйишдан олдин, шу сатр (устун) да кўпроқ ноллар ҳосил қилиш учун олдиндан бирор сатрга (ёки устунга) бошқа сатр (устунлар) нинг чизиқли комбинациялари қўшилади. Детерминантнинг хоссаларидан ҳам фойдаланилади. Буни мисолларда кўрсатамиз.

1-мисол. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Ечиш. Берилган детерминантнинг учинчи сатрини -1 га кўпайтирамиз ва уни биринчи сатрга қўшиб, натижани биринчи сатрга ёзамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Бу детерминантни биринчи сатр элементлари бўйича ёямиз:

$$\Delta = -3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} -$$

$$- 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Ҳосил бўлган учинчи тартибли детерминантнинг биринчи устунини -2 га кўпайтириб, учинчи устунга қўшамиз, сўнгра биринчи сатр элементлари бўйича ёйиб, қуйидагига эга бўламиз:

$$\Delta = -3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 8 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -3 \cdot 3 \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -9(-3 + 16) = -117.$$

Қуйидаги мисол детерминантни иккита детерминантга ажратиб, сўнгра ҳисоблаш усулини намоиш этади.
2- м и с о л. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}.$$

Е ч и ш. Берилган детерминантни ушбу қўринишда ёзиш мумкин:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1+2 & 1 & 1 & 1 \\ 1+0 & 4 & 1 & 1 \\ 1+0 & 1 & 5 & 1 \\ 1+0 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}.$$

Детерминантларнинг 5- хоссаси ва Δ нинг биринчи устуни бўйича чиқиқлилигидан фойдаланамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} \quad (A)$$

Ҳосил бўлган (A) тенгликнинг ўнг қисмидаги детерминантларнинг биринчисининг бош диагонали остидаги элементлар бирга тенг, шунинг учун биринчи сатрни барча қолган сатрлардан айрилса, биринчи детерминант куйидаги кўринишни олади:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Бизга маълумки, бундай детерминантнинг қиймати бош диагоналда турган элементлар кўпайтмасига тенг. Демак,

$$\Delta_1 = 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60.$$

(A) тенгликнинг ўнг қисмидаги иккинчи детерминантни биринчи устун бўйича ёямиз. Натижада, куйидаги кўринишдаги учинчи тартибли детерминантга эга бўламиз:

$$\Delta_2 = 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 107 = 214.$$

Шундай қилиб, $\Delta = 60 + 214 = 274$.

3- м и с о л. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & 3 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Ечиш. Бу детерминантни унинг биринчи устун элементлари бўйича сйиб ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \Delta &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \\ &+ 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= 4 \cdot \left\{ 0 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \right\} - \\ &- 3 \cdot \left\{ 2 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \right\} - \\ &- 5 \cdot \left\{ 2 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \right\} = \\ &= 4 [0 \cdot (-3-0) - 4(-2-0) + 3(-6+6)] - 3 [(2-3) - \\ &- 4 \cdot 1 + 3 \cdot 3] - 3 [2(-3) - (4-9)] - 5 [(2(-6+6) - \\ &- 0 + 4 \cdot 2)] = 32 + 3 - 40 = 35 - 40 = -5 \end{aligned}$$

Демак, $\Delta = -5$.

5- §. *n* номаълумли *n* та чизиқли тенгламалар системалари

n номулумли n та чизиқли тенгламалар системаси қўйидаги кўринишга эга:

[illegible]

Бу ерда a_{ik} сонларга системанинг коэффициентлари, c_i — озод ҳадлар, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — номаълумлар дейилади.

Таъриф. Агар (1.18) системанинг ҳар бир тенгламасидаги $x_1, x_2, \dots, x_n$ номаълумлар ўрнига мос равишда

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ қийматлар қўйилганда системанинг барча тенгламалари айниятга айланса, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ сонлар (1.18) системанинг ечими дейилади.

Системанинг ечими мавжуд бўлиш-бўлмаслиги қуйидаги детерминантга боғлиқдир:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.19)$$

(1.19) детерминант (1.18) системанинг номаълумлари олдидаги коэффициентлардан тузилган. Агар $\Delta \neq 0$ бўлса, система ягона ечимга эга бўлади ва бу ечим

$$x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta} \quad (i = \overline{1, n})$$

формулалар ёрдамида топилади.

Бунда Δ_{x_i} детерминант Δ детерминантнинг биринчи устун элементларини (1.18) тенгламалар системасининг озод ҳадлари билан алмаштиришдан ҳосил қилинади; Δ_{x_2} эса Δ детерминантнинг иккинчи устун элементларини озод ҳадлар билан алмаштиришдан ҳосил бўлади; $\Delta_{x_3} \dots \Delta_{x_n}$ лар ҳам шунга ўхшаш ҳосил қилинади.

(1.18) тенгламалар системасини ечишнинг бундай усули Крамер усули дейилади. Демак, (1.18) системани ечиш учун $(n+1)$ та детерминант тузиш ва ҳисоблаш керак бўлади.

6-§. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечиш

Биз юқорида тенгламалар сони номаълумлар сонига тенг бўлган чизикли тенгламалар системаси билан танишдик ва бундай системанинг детерминанти полдан фарқли бўлса, у ҳолда система ягона ечимга эга бўлишини кўрдик.

Энди ихтиёрий, яъни тенгламалар сони номаълумлар сонига тенг бўлмаган чизикли тенгламалар системасини текширамиз. Бундай система учун ечим ягона бўлмаслиги ёки умуман ечим мавжуд бўлмаслиги ҳам мумкин. Агар чизикли тенгламалар системаси бирорта ҳам ечимга эга бўлмаса, система биргаликда бўлмаган система

Коэффициентлари сонлардан иборат бўлган тенгла-
малар системаси ечимларини топиш учун қулай бўлган
номаълумларни кетма-кет йўқотиш (чиқариш) усули-
ни, яъни Гаусс усулини кўрсатамиз.

[illegible]
$$\left\{ \begin{aligned} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n &= c_1/a_{11}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= c_2, \\ &\dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= c_m. \end{aligned} \right. \quad (1.21)$$
[illegible]

бунда

$$a'_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{il}}; a'_{ik} = a_{ik} - \frac{a_{ik}}{a_{il}} a_{il} \begin{pmatrix} i=2,3,\dots,m, \\ k=2,3,\dots,n \end{pmatrix};$$

$$c'_1 = \frac{c_1}{a_{11}}; c'_i = c_i - \frac{c_1}{a_{11}} a_{i1} \quad (i=2,3,\dots,m).$$

Энди (1.22) системанинг иккинчи тенгламасини a'_{22} коэффициентга бўламиз ва ҳосил бўлган системанинг иккинчи тенгламасини кетма-кет $a'_{32}, \dots, a'_{m2}$ коэффициентларга кўпайтириб учинчи тенгламадан бошлаб навбати билан айирамиз. Натижада (1.22) га тенг кучли система ҳосил бўлади.

Агар бу жараёни давом эттира борсак системанинг чап томонидаги барча коэффициентлари нолга тенг, аммо озод хади эса нолдан фарқли тенгламани ўз ичига олувчи системага эга бўламиз. Бундай система биргаликда бўлмаган система бўлади.

Агар (1.20) система биргаликда бўлса, у ҳолда натижада қуйидаги

[illegible]

системага (бунда $p < n$) ёки

[illegible]

системага эга бўламиз. (1.23) система погонали система, (1.24) система эса учбурчак система деб аталади.

(1.24) система учбурчак бўлган ҳолда сўнгги тенгламадан x_n ни топамиз, сўнг x_n нинг қийматини олдинги тенгламага қўйиб x_{n-1} ни топамиз ва ҳоказо.

Агар (1.20) система (1.23) погонали системага келтирилса, у холда (1.20) система ечимга эга бўлмайди ёки чексиз кўп ечимга эга бўлади.

[illegible]

1-мисол. Қуйдаги системани Гаусс усул билан
ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 22x_4 = -1, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1, \\ x_2 - 10x_3 + 17x_4 = -2, \\ -x_2 + 10x_3 - 17x_4 = 2, \\ -x_2 + 10x_3 - 17x_4 = 2 \end{cases}$$

28

Энди иккинчи тенгламани учинчи ва тўртинчи тенгламаларга қўшиб, натижада қуйидаги системани ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1, \\ x_2 - 10x_3 + 17x_4 = -2, \\ 0 = 0, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Охирги иккита тенглама

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 0$$

қўринишдаги тенглама бўлиб, у номаълумнинг ҳар қандай қийматида ҳам ўринли бўлгани учун уни ташлаб юборамиз.

Иккинчи тенгламани қаноатлантирадиган номаълумнинг қийматини топиш учун x_3 ва x_4 ларги ихтиёрий қийматларни берамиз. Масалан, $x_3 = \alpha$, $x_4 = \beta$ бўлсин, у ҳолда $x_2 = 10\alpha - 17\beta - 2$ бўлади. Бу x_2 , x_3 , x_4 ларнинг қийматларини биринчи тенгламага қўйиб $x_1 = -17\alpha + 29\beta + 5$ ни топамиз. Системанинг ечими

$$\begin{aligned} x_1 &= -17\alpha + 29\beta + 5; \\ x_2 &= 10\alpha - 17\beta - 2; \quad x_3 = \alpha; \quad x_4 = \beta \end{aligned}$$

бўлиб α ва β нинг ихтиёрий қийматларида берилган системанинг ҳамма ечимларини беради.

2-мисол. Қуйидаги чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 7, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$$

Ечиш. Биринчи тенгламанинг барча ҳадларини 2 га қўпайтириб, ундан иккинчи ва учинчи тенгламаларни айирамиз. Натижада қуйидаги қўринишдаги системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 7, \\ -x_2 - 7x_3 = 13, \\ 3x_2 - 8x_3 = 8. \end{cases}$$

Иккинчи ва учинчи тенгламалар фақат x_2 ва x_3 номаълумларга эга. Иккинчи тенгламанинг ҳадларини 3 га кўпайтириб, учинчи тенгламага қўшамиз. Натижада қуйидаги система ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 7, \\ -x_2 - 7x_3 = 13, \\ -x_3 = 13. \end{cases}$$

Учинчи тенгламадан: $x_3 = -13$, буни иккинчи тенгламага қўйиб x_2 номаълумни топамиз:

$$-x_2 - 7 \cdot (-13) = 13,$$

$$x_2 = 78.$$

x_3 ва x_2 номаълумларнинг қийматларини биринчи тенгламага қўйиб x_1 номаълумни топамиз:

$$x_1 + 78 - 3 \cdot (-13) = 7, \quad x_1 = -110.$$

Жавоб: $(-110, 78, -13)$.

7-§. Уч номаълумли бир жинсли чизиқли учта тенглама системаси

Барча озод ҳадлари нолга тенг бўлган чизиқли тенгламалар системасига бир жинсли тенгламалар системаси дейилади ва у қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0. \end{cases} \quad (1.25)$$

(1.25) кўринишдаги ихтиёрий бир жинсли система $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ тривиал ечимга, яъни нол ечимга эга бўлиши мумкин. Энди (1.25) система қандай шартлар бажарилганда нолга тенг бўлмаган ечимга эга бўлишини текширамиз.

1) агар $\Delta \neq 0$ бўлса, (1.25) система фақат нол ёки тривиал ечимга, яъни $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ечимга эга бўлади;

2) агар $\Delta = 0$ бўлса, (1.25) система нолдан фарқли чексиз кўп ечимларга эга бўлади. Буни қуйидагича исбот қиламиз:

а) Δ детерминантнинг алгебраик тўлдирувчиларидан камида биттаси нолдан фаркли деб фараз қиламиз, масалан,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

булсин. (1.25) системанинг дастлабки иккита тенгламасини қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = -a_{13}x_3, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = -a_{23}x_3. \end{cases} \quad (1.26)$$

Бунда x_3 маълум сон деб x_1, x_2 ларни топамиз:

$$A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} -a_{13}x_3 & a_{12} \\ -a_{23}x_3 & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & -a_{13}x_3 \\ a_{21} & -a_{23}x_3 \end{vmatrix} \text{ ларни топамиз.}$$

Булардан

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{A_{33}} = \frac{\begin{vmatrix} -a_{13}x_3 & a_{12} \\ -a_{23}x_3 & a_{22} \end{vmatrix}}{A_{33}} = \frac{A_{31}}{A_{33}} x_3, \quad (1.27)$$

$$x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{A_{33}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_{13}x_3 \\ a_{21} & -a_{23}x_3 \end{vmatrix}}{A_{33}} = \frac{A_{32}}{A_{33}} x_3$$

формулалар билан аниқланувчи ечимларга эга бўламиз.

Агар $k = \frac{x_3}{A_{33}}$ белгилашни киритсак, (1.27) нинг кўриниши қуйидагича бўлади:

$$x_1 = kA_{31}, \quad x_2 = kA_{32}, \quad x_3 = kA_{33},$$

бунда k — ихтиёрий бутун сон. k исталган қийматларни қабул қилгани учун (1.26) система чексиз кўп ечимга эга бўлади.

б) Δ детерминантнинг барча алгебраик тўлдирувчилари нолга тенг бўлса, (1.25) системанинг номаълумла-

$$в) \begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ x + 2y + z = 0, \\ 2x - y + 3z = 0. \end{cases} \quad г) \begin{cases} x - y - z = 0, \\ x + 4y + 2z = 0, \\ 3x + 7y + 3z = 0. \end{cases}$$

6. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс усулидан фойдаланиб ечинг:

$$а) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = 13, \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 12. \end{cases} \quad б) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 9x_3 = 28, \\ 7x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -1, \\ 7x_1 + 9x_2 - 9x_3 = 5. \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15, \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 15, \\ 10x_1 - 11x_2 + 5x_3 = 36. \end{cases} \quad г) \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -6, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -3. \end{cases}$$

$$д) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -5, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -6. \end{cases} \quad е) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 - x_3 = -2, \\ -x_1 + 5x_2 + x_3 = 7, \\ 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 6. \end{cases}$$

7. Детерминантларни ҳисобланг:

$$а) \begin{vmatrix} 8 & 7 & 2 & 0 \\ -8 & 2 & 7 & 10 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}; \quad б) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \end{vmatrix};$$

$$в) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & -5 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 4 \end{vmatrix}; \quad г) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$д) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}; \quad е) \begin{vmatrix} a & b & b & a \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix};$$

$$\text{ж) } \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & y & 0 \\ 1 & 0 & 0 & z \end{vmatrix}; \text{ з) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 1 & -4 \\ 5 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

И Б О Б

МАТРИЦАЛАР АЛГЕБРАСИ

Бу бобда матрица ҳақида тушунча ва улар устидаги чизиқли амаллар, тескари матрицани топиш, чизиқли тенгламаларни матрицавий ёзуви ва уни ечиш усули, матрицанинг ранги ва матрицалар назариясининг татбиқига доир мисол ва масалалар кўрилади.

1-§. Матрица ҳақида тушунча

Детерминантлар ва чизиқли бир нечта номаълумли тенгламалар системаларини ўрганишда биз сонлардан тuzилган қуйидаги жадвалларни қараган эдик:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Бу жадвалларга матрица деб аталади. Матрицани ташкил этувчи $a_{11}, a_{12}, \dots$ сонлар матрицанинг элементлари дейилади.

Агар матрицанинг сатрлари сони устунлари сонига тенг бўлса, бундай матрица квадрат матрица деб аталади. Сатрлари сони устунлари сонига тенг бўлмаган матрица тўғри бурчакли матрица деб аталади. Бундан ташқари матрица баъзан сонлар тўплами $(a_{11}a_{12}a_{13}a_{14})$ кўринишида ҳам берилиши мумкин. Бундай кўринишдаги матрица сатр-матрица,

$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}$ кўринишда бўлса, бундай матрица устун-матрица деб аталади.

Квадрат матрицанинг элементларидан тузилган детерминант бу матрицанинг детерминанти деб аталади.

Одатда матрицани $A, B, C, \dots$ ҳарфлар билан, унинг элементларини $a_{11}, a_{12}, \dots$ кичик ҳарфлар билан белгиланади. Масалан,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ a_{41} \end{pmatrix}$$

$$E = (a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}a_{15}),$$

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$

A ва B — квадрат матрица, C ва D — тўғри бурчакли матрица, P — устун-матрица, E — сатр-матрицалардир.

Бу матрицаларнинг ўлчами қуйидагича аниқланади: A 2×2 ўлчамли (икки сатрли ва икки устунли), B 3×3 ўлчамли квадрат матрицалар, C 3×4 ўлчамли (уч сатрли ва тўрт устунли) тўғри бурчакли, P 4×1 ўлчамли, E эса 1×5 ўлчамли матрицалардир.

Бу матрицаларнинг детерминанти эса қуйидагича ёзилади:

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix};$$

$$|B| = \det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Агар квадрат матрицанинг детерминанти нолдан фарqli бўлса, бундай матрица хос матрица деб аталади. Агар матрицанинг детерминанти нолга тенг бўлса, бундай матрицага хос матрица деб аталади.

Масалан, $A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ матрица хос матрицадир, чун-

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 - 2 \cdot 9 = 18 - 18 = 0,$$

$B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ матрица хосмас матрицадир, чунки

$$|B| = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 7 \cdot 5 - 4 \cdot 3 = 35 - 12 = 23 \neq 0.$$

Агар $m \times n$ ўлчамли A матрицанинг сатр ва устун элементларининг ўринларини алмаштирилса, ҳосил бўлган матрица A га нисбатан транспонирланган матрица дейилади ва A^T , A^* ёки A' билан белгиланади. Транспонирланган матрицанинг тартиби $n \times m$ ўлчамли бўлади.

A квадрат матрица бўлса, у ҳолда A ва A' матрицаларнинг тартиблари бир хил бўлади. Транспонирланган матрица учун қуйидаги хоссалар ўринли:

1. Икки марта транспонирланган матрица дастлабки матрицанинг ўзига тенг, яъни

$$A^{TT} = (A^T)^T = A.$$

2. Транспонирланган кўпайтма матрица учун қуйидаги тенглик ўринли:

$$(AB)^T = A^T B^T.$$

Агар $A = A^T$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда A квадрат матрица симметрик матрица дейилади.

Масалан:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

симметрик матрица, чунки бош диагоналига нисбатан симметрик жойлашган элементлари жуфт-жуфти билан ўзаро тенг.

Агар квадрат матрицанинг ҳамма $i \neq j$ бўлган элементлари нолга тенг, $i = j$ элементлари эса нолдан фарқли бўлса, бундай матрица диагонал матрица дейилади. Масалан:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

матрица диагонал матрицадир.

Агар диагонал матрица A да $a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44}$ бўлса, A матрица скаляр матрица дейилади.

1. Матрицаларнинг тенглиги

Агар A ва B матрицаларнинг сатрлари ва устунлари сони бир хил ҳамда уларнинг мос элементлари тенг бўлса, бундай матрицалар тенг ($A=B$) матрицалар деб аталади. Масалан, агар

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{ бўлиб, } a_{11} = b_{11},$$

$a_{12} = b_{12}, a_{21} = b_{21}, a_{22} = b_{22}$ бўлса, у ҳолда $A=B$ дир.

2. Матрицаларни қўшиш.

Агар бир хил ўлчамли квадрат матрицалар

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

берилган бўлса, у ҳолда уларнинг йигиндиси деб

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

матрицага айтилади. Тўғри бурчакли матрицаларнинг йигиндиси ҳам шунга ўхшаш аниқланади.

1-мисол.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-4 & 1+5 \\ 0+2 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

2-мисол.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 3-1 \\ 2+0 & 1+3 \\ -1+4 & 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Барча элементлари нолга тенг бўлган матрица нол матрица деб аталади ва (0) билан ёки 0 билан белгиланади.

3. Матрицани сонга кўпайтириш.

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ матрицанинг λ сонга кўпайтмаси деб

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{pmatrix}$$

матрицага айтилади.

Учинчи тартибли квадрат матрицалар ва тўғри бурчакли матрицаларни ҳам сонга кўпайтириш худди шундай аниқланади.

Матрицани нолга кўпайтирилганда нол матрица ҳосил бўлади:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Матрицаларни кўпайтириш

Ушбу матрицалар берилган бўлсин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

A матрицанинг B матрицага кўпайтмаси деб элементлари қуйидагича тузилган $C = A \cdot B$ матрицага айтилади:

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

Агар учинчи тартибли

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

матрицалар берилган бўлса, у ҳолда $C = A \cdot B$ матрица қуйидагича тузилади:

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + \\ + a_{13}b_{32} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} \\ + a_{23}b_{32} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} \\ + a_{33}b_{32} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33} \end{pmatrix}$$

Демак, қўпайтма матрицанинг i -сатри, k -устуни кесишган жойда турадиган a_{ik} элементи биринчи A матрицанинг i -сатри ҳар бир мос элементлари жуфт қўпайтмаларининг йиғиндисига тенг экан. Масалан, A матрица ва B матрицалар n -тартибли квадрат матрицалар бўлсин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Бу матрицаларнинг қўпайтмаси C матрица ҳам n -тартибли квадрат матрица бўлади:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Қўпайтма C матрица $C = A \cdot B$ каби ёзилади ва унинг элементлари

$$C_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

формула билан ҳисобланади.

Тўғри бурчакли матрицалар учун кўпайувчи матрицанинг устунлари сони кўпайтувчи матрицанинг сатрлари сонига тенг бўлган ҳолдагина кўпайтириш амалини бажариш мумкинлигини эслатиб ўтамиз.

Агар A матрица $(m \times n)$ ўлчамли, B матрица $(n \times s)$ ўлчамли бўлса, у ҳолда $C = AB$ ($m \times s$) ўлчамли матрица, $C' = B \cdot A$ эса $(s \times m)$ ўлчамли матрица бўлади.

$AB = BA$ тенглик ўринли бўлиши учун фақат $m = n$, яъни A ва B матрицалар квадрат матрица бўлиши керак.

Агар $AB = BA$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда A ва B матрицаларга ўрин алмашадиган (коммутатив) матрицалар дейилади.

3-мисол.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

4-мисол

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Демак, иккита тўртбурчакли матрицани кўпайтириш натижасида кўпайувчи матрица нечта сатрга эга бўлса, шунча сатрга ва кўпайтувчи матрица нечта устунга эга бўлса, шунча устунга эга бўлган матрица ҳосил бўлади.

5-мисол.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

матрицалар берилган. $A \cdot B$ ва $B \cdot A$ матрицаларни топинг.

Ечиш.

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\ -1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & -1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C' = B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) & 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}.$$

Бу мисолдан кўриниб турибдики, иккита матрицанинг кўпайтмаси ўрин алмаштириш қонунига бўйсунмайди, яъни

$$C \neq C', AB \neq BA.$$

Матрицаларни кўпайтириш ушбу

$$A(BC) = (AB)C$$

гуруҳлаш қонунига ва

$$(A+B)C = AC + BC$$

тақсимот қонунига бўйсунганини текшириб кўриш мумкин. Буни ўқувчиларга ҳавола қиламиз.

Бош диагональ элементлари бирлардан ва қолган ҳамма элементлари ноллардан иборат:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

кўринишдаги n -тартибли квадрат матрица n -тартибли бирлик матрица дейилади. Бирлик матрицанинг детерминанти бирга тенг бўлади:

$$|E| = 1.$$

Бир хил тартибли A ва E квадрат матрицаларни ўзаро кўпайтирилганда яна A квадрат матрица ҳосил бўлади, яъни

$$AE = EA = A.$$

Агар A ва B бир хил тартибли квадрат матрицалар бўлиб, уларнинг детерминантлари $|A|$ ва $|B|$ бўлса,

$C=AB$ матрицанинг детерминанти кўпайтирилувчи матрицаларнинг детерминантлари кўпайтмасига тенглигини, яъни

$$|C| = |A| \cdot |B|$$

эканлигини кўрсатиш мумкин.

6- мисол. 5- мисолда

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ бўлса,}$$

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлиши кўрсатилган эди. Бу матрицаларнинг детерминантлари

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -2, \quad |C| = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -10. \end{aligned}$$

Демак,

$$|A| \cdot |B| = |C|.$$

7- мисол. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

бўлса, у ҳолда

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2 & 1-1 \\ 2-2 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

бўлади.

Бу мисолдан кўриниб турибдики, иккита нолдан фаркли матрицанинг кўпайтмаси нол матрицага тенг бўлиб қолиши ҳам мумкин экан.

8- мисол. $f(x) = x^2 - 3x + 5$ кўпхад ва

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

квадрат матрица берилган. $f(A)$ матрицали кўпхадни топиш.

Ечиш. Изланаётган $f(A)$ матрица қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$\begin{aligned} f(1) &= A^2 - 3A + 5 = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 6 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 6 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2-§. Тескари матрица

1-таъриф. A матрица учун $A \cdot B = B \cdot A = E$ тенгликни қаноатлантирувчи B матрица A га тескари матрица дейилади ва $B = A^{-1}$ кўринишда белгиланади.

Теорема. A квадрат матрица тескари матрицага эга бўлиши учун A матрица хосмас матрица бўлиши, яъни унинг детерминанти нолдан фаркли бўлиши зарур ва кифоядир.

Исботи. Зарурийлиги. Фараз қилайлик, A матрица учун A^{-1} тескари матрица мавжуд бўлсин. A матрица хосмас матрица бўлишини, яъни $|A| \neq 0$ эканлигини кўрсатамиз. Агар $|A| = 0$ бўлса, у ҳолда кўпайтманинг детерминанти учун:

$$|A \cdot A^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}| = 0.$$

Аммо $A \cdot A^{-1} = E$ тенгликка асосан бунинг бўлиши мумкин эмас. Демак, $|A| \neq 0$.

Кифоялиги. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (2.1.)$$

хосмас, яъни детерминанти нолдан фаркли бўлган ($|A| \neq 0$) матрица берилган бўлсин.

Бу ҳолда A^{-1} тескари матрица мавжудлигини кўрсатамиз. A^{-1} тескари матрица қуйидагича топилади:

1) A матрицадан унинг ҳар бир a_{ik} элементининг алгебраик тўлдирувчисидан иборат матрицани $\frac{1}{|A|}$ га кўпайтириб, қуйидаги B матрицани тузамиз:

$$B = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix};$$

2) B матрицанинг сатрлари ва устунларининг ўринларини алмаштириб, A^{-1} матрицани тузамиз:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

A^{-1} матрица A матрицага тескари матрица эканлигини кўрсатиш учун, уларни ўзаро кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned} A \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} & a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + \\ a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} & a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + \\ a_{31}A_{11} + a_{32}A_{12} + a_{33}A_{13} & a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + \\ + a_{13}A_{23} & a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} \\ + a_{23}A_{23} & a_{11}A_{31} + a_{22}A_{32} + a_{23}A_{33} \\ + a_{33}A_{23} & a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ҳосил бўлган (2.3) матрицанинг асосий диагоналида турган элементлари A матрицанинг $|A|$ детерминантидан иборат бўлиб, қолган элементлари эса нолга тенгдир.

Уни $\frac{1}{|A|}$ га кўпайтирилса, $A \cdot A^{-1}$ бирлик матрица эканлиги кўриниб турибди. Демак, (2.2) матрица (2.1) матрицага тескари матрица экан.

Тескари матрицани қуйидаги усул билан ҳам топиш мумкин. A матрицага тескари A^{-1} матрицани топиш учун, уни қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (2.4)$$

(2.4) нинг чап томонида A матрица, ўнг томонида эса E бирлик матрица ёзилган. (2.4) даги матрицаларнинг иккаласига бир вақтда A матрицани бирлик E матрицага келтирадиган сатрлар бўйича элементар алмаштиришларни бажарамиз. (Бу элементар алмаштиришларни қуйида мисолда кўрсатамиз.) Натижада (2.4) матрица қуйидаги кўринишга келади:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 1 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & 1 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

(2.5) нинг ўнг томонидаги матрица A га тескари матрицани ифодалайди, яъни $A \cdot B = A \cdot A^{-1} = E$.

Мисол.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари матрицани тузинг.

Ечиш. Бу матрицанинг детерминанти:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -9.$$

$|A| \neq 0$ бўлгани учун A матрица хосмас матрицадир, шунинг учун унга тескари матрица мавжуддир.

Алгебраик тулдирувчиларни ҳисоблаймиз:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3, A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -6, A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2, A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -1, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

В матрицани тузамиз:

$$B = \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ -4 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$$

Бу матрицада сатрлар ва устунларнинг ўринларини алмаштириб, А матрицага тескари

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$$

матрицани ҳосил қиламиз.

Бу мисолни иккинчи усул билан ечиб кўрамиз, унинг учун қуйидаги матрицани тузамиз:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

А матрица ва Е бирлик матрицанинг биринчи устунини -2 га кўпайтириб иккинчи устунга қўшсак, қуйидагига эга бўламиз:

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Учинчи устунни — 3 га ва 4 га кўпайтириб, мос равишда биринчи ва иккинчи устунларга қўшамиз:

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 9 & 2 & 0 & 3 & 4 \end{array} \right)$$

Иккинчи устунни $\frac{2}{3}$ га ва $-\frac{2}{9}$ га кўпайтириб, мос равишда биринчи ва учинчи устунга қўшамиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/3 & -2 & 4/0 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 & 1 & -2/9 \\ 0 & 9 & 0 & -1/3 & 4 & 1/9 \end{array} \right)$$

Иккинчи устунни 9 га бўлиб, иккинчи ва учинчи устунларни алмаштираемиз:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/3 & -2/9 & 4/9 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 & 1/9 & -2/9 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 4/9 & 1/9 \end{array} \right)$$

Натижада A га тескари

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/3 & -2/9 & 4/9 \\ 2/3 & 1/9 & -2/9 \\ -1/3 & 4/9 & 1/9 \end{pmatrix}$$

матрицага эга бўламиз. Бир хил натижага эга бўлдик.

Тескари матрица қуйидаги хоссаларга эга.

1) Тескари матрицанинг детерминанти берилган матрица детерминантининг тескари қийматига тенг, яъни

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A};$$

2) A ва B квадрат матрицалар кўпайтмасининг тескари матрицаси учун

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

тенглик ўринли.

3) Транспонирланган тескари матрица берилган транспонирланган матрицанинг тескарисига тенг, яъни

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1};$$

4) Тескари матрицанинг тескарисы берилган матрицанинг ўзига тенг, яъни

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

Буларнинг исботини ўқувчининг ўзига ҳавола қиламиз.

3-§. Чизикли тенгламалар системасини матрицалар кўринишида ифодалаш

Ушбу тенгламалар системаси берилган бўлсин:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = c_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = c_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = c_3. \end{cases} \quad (2.6)$$

Бу системанинг номаълумлари олдидаги коэффициентлар, номаълумлар ва озод ҳадлардан тузилган қуйидаги матрицаларни қараймиз:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Равшанки,

$$A \cdot X = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{bmatrix}$$

Берилган (2.6) системани матрицаларнинг тенглиги таърифидан фойдаланиб, қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

ёки, қисқача:

$$A \cdot X = C. \quad (2.8)$$

(2.8) — чизикли тенгламалар системасининг матрицали кўриниши дейилади.

(2.8) да X матрицани топиш учун унинг ҳар икки томонини чапдан A^{-1} матрицага кўпайтирамиз:

$$A^{-1}(A \cdot X) = (A^{-1} \cdot A) \cdot X = EX = X$$

булгани учун

$$X = A^{-1} \cdot C$$

ёки

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11}c_1 + a'_{12}c_2 + a'_{13}c_3 \\ a'_{21}c_1 + a'_{22}c_2 + a'_{23}c_3 \\ a'_{31}c_1 + a'_{32}c_2 + a'_{33}c_3 \end{pmatrix}$$

Бундан эса, икки матрицанинг тенглик шартига асосан,

$$\begin{aligned} x_1 &= a'_{11}c_1 + a'_{12}c_2 + a'_{13}c_3, \\ x_2 &= a'_{21}c_1 + a'_{22}c_2 + a'_{23}c_3, \\ x_3 &= a'_{31}c_1 + a'_{32}c_2 + a'_{33}c_3 \end{aligned} \quad (2.9)$$

(2.6) нинг ечимига эга бўламиз.

1- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

тенгламалар системасини матрицавий кўринишда ёзинг ва унинг ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган системанинг матрицаларини ёзамиз:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

У ҳолда системанинг матрицавий кўриниши куйидагича бўлади:

$$A \cdot X = C,$$

A га тескари A^{-1} матрицани топамиз (A^{-1} ни топишни ўқувчига ҳавола қиламиз), у

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & -5 & 6 \\ 18 & 11 & -13 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

кўринишда бўлгани сабабли $A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot C$ ёки $X = A^{-1} \cdot C$ га эга бўламиз, бундан

$$\begin{aligned} X = A^{-1} \cdot C &= \begin{pmatrix} -8 & -5 & 6 \\ 18 & 11 & -13 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -8 \cdot 5 + (-5) \cdot 1 + 6 \cdot 4 \\ 18 \cdot 5 + 11 \cdot 1 + (-13) \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ 49 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Демак, тенгламалар системасининг ечими:

$$x_1 = -21, x_2 = 49, x_3 = 2.$$

4-§. Матрицанинг ранги

Ушбу $m \times n$ ўлчамли A матрица берилган бўлсин:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

(2.10) матрицада ихтиёрый k та устун ва k та сатрни ажратамиз. Ажратилган сатрлар ва устунлар кесишган жойда турган элементлар k -тартибли квадрат матрица

ҳосил қилади. Шу ҳосил қилинган k -тартибли квадрат матрицанинг детерминанти A матрицанинг k -тартибли минори деб аталади.

Масалан, учта сатр ва бешта устунга эга бўлган

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 7 & 2 \\ -2 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 6 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

матрица учун учинчи тартибли минорлардан бири

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & 6 \end{vmatrix}$$

детерминант бўлиб, у матрицанинг биринчи, иккинчи, учинчи сатрларини ва биринчи, иккинчи, учинчи устунларини ажратишдан ҳосил бўлади. Иккинчи тартибли минорлардан бири, масалан, $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}$ детерминант бўла-

ди. Матрица элементларининг ўзларини биринчи тартибли минорлар деб қараш мумкин. Матрицанинг минорларидан баъзилари нолга тенг, баъзилари нолдан фарқли бўлиши мумкин.

Таъриф. Матрицанинг ранги деб унинг нолдан фарқли минорлари тартибларининг энг каттасига айтилади.

Агар матрицанинг ранги r га тенг бўлса, бунинг маъноси A матрицада ҳеч бўлмаганда битта нолдан фарқли r -тартибли минор борлигини, бироқ r дан катта тартибли ҳар қандай минор нолга тенглигини билдиради. A матрицанинг ранги $\text{rang} A$ ёки $r(A)$ кўринишида белгиланади.

Ушбу матрицани қарайлик:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Унинг исталган тўртинчи тартибли минори нолга тенг:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

(битта сатрининг элементлари нолга тенг бўлган детерминант бўлгани учун). Учинчи тартибли минорларидан бири эса нолдан фарқли, масалан,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 40.$$

Демак, берилган матрицанинг ранги 3 га тенг, яъни $r(A)=3$. Матрицанинг рангини аниқлашда, одатда, куп сондаги детерминантларни ҳисоблашга тўғри келади. Бу ишни осонлаштириш учун махсус усуллардан фойдаланилади. Бу усулларни баён қилишдан олдин матрицани элементар алмаштиришлар ҳақида тушунча киритамиз. Куйидаги алмаштиришлар элементар алмаштиришлар ҳисобланади:

1) матрицани транспонирланганда унинг ранги ўзгармайди;

2) матрицада сатр (устун) ларнинг ўрнини алмаштириш унинг рангини ўзгартирмайди;

3) матрица сатри (устуни) нинг барча элементларини нолдан фарқли сонга кўпайтирилса, унинг ранги ўзгармайди;

4) матрицанинг бирор сатри (ёки устуни) ни ихтиёрий сонга кўпайтириб, унинг бошқа сатри (ёки устуни) га қўшилса, унинг ранги ўзгармайди;

5) матрицада нолли сатр (ёки устун)ни чиқариб ташланса, унинг ранги ўзгармайди;

6) матрицада бирор сатрлар (ёки устунлар) элементларининг чизикли комбинациясидан иборат бўлган сатр (ёки устун) ни чиқариб ташланса, матрицанинг ранги ўзгармайди.

Бир-биридан элементар алмаштиришлар натижасида ҳосил қилинган матрицалар эквивалент матрицалар деб аталади. Эквивалент матрицалар бир-бирига тенг эмас, аммо уларнинг ранглари тенг бўлишини исботлаш мумкин.

Юқорида келтирилганлардан матрицаларнинг рангини ҳисоблашда фойдаланилади.

Мисол. Матрицанинг рангини ҳисобланг:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 3 & -1 \\ 5 & 6 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ечиш. Берилган матрицанинг биринчи сатри элементларини 2 га бўлиб, ушбу эквивалент матрицани ҳосил қиламиз:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & 5/2 & -3/2 \\ 3 & 4 & 3 & -1 \\ 5 & 6 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Матрицанинг биринчи сатрини 3 га ва 5 га кўпайтириб мос равишда иккинчи ва учинчи сатрларидан айириб, ушбу матрицани ҳосил қиламиз:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & 5/2 & -3/2 \\ 0 & -1/2 & -9/2 & 7/2 \\ 0 & -3/2 & -27/2 & 21/2 \end{pmatrix}.$$

A_2 матрицанинг учинчи сатрини -3 га бўлиб, иккинчи сатрга қўшамиз:

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & 5/2 & -3/2 \\ 0 & -1/2 & -9/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A_3 матрицада ноллардан иборат сатрни ташлаб,

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & 5/2 & -3/2 \\ 0 & -1/2 & -9/2 & 7/2 \end{pmatrix}$$

матрицани ҳосил қиламиз. A_4 матрицанинг ранги иккига тенглиги равшан. Демак, берилган матрицанинг ранги ҳам иккига тенг, яъни $r(A)=2$.

5-§. Детерминант ва матрицалар назариясининг татбиқлари

Детерминант ва матрицалар назарияси математика, физика, механика, электротехника, радиотехника, қурилишда, кундалик ҳаётимизда ва ҳ.к. ларда кенг қўлланилади. Бу ерда уларнинг татбиқига мисол ва масалалар келтирамиз.

1. Детерминантлар назариясининг аналитик геометрияга татбиқи.

1. Учлари $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ ва $C(x_3; y_3)$ нукталарда бўлган учбурчакни юзи учинчи тартибли детерминант орқали қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \text{mod} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |D|.$$

2) $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ нукталардан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

детерминант шаклида тузилади.

3) Учта тўғри чизик умумий тенгламаси билан берилган бўлсин:

$$\begin{aligned} l_1: A_1x + B_1y + C_1 &= 0, \\ l_2: A_2x + B_2y + C_2 &= 0, \\ l_3: A_3x + B_3y + C_3 &= 0. \end{aligned}$$

Бу тўғри чизикларнинг кесишиш нуқтаси мавжуд бўлиши учун

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

шарт бажарилиши керак.

4) $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ ва $C(x_3; y_3)$ нуқталар бир тўғри чизикда ётиши учун

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

шартнинг бажарилиши зарур ва етарлидир.

5) Тўғри чизикнинг нормал тенгламасини

$$\begin{vmatrix} x & -\sin\alpha \\ y & \cos\alpha \end{vmatrix} = p$$

кўринишда ёзиш мумкин.

6) Учлари $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$, ... $N(x_n; y_n)$ нуқталарда ётувчи кўпбурчакнинг юзи детерминантларнинг йигиндиси шаклида қуйидагича аниқланади:


$$S = \frac{1}{2} \bmod \left\{ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} + \dots + \right. \\ \left. + \dots + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_{n-1} & y_{n-1} & 1 \\ x_n & y_n & 1 \end{vmatrix} \right\}.$$

7) $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$ ва $M_3(x_3; y_3; z_3)$ нуқталардан ўтувчи текислик тенгламаси детерминант шаклида қуйидагича ифодаланади:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

2. Электротехникада тўрт кутбли электр занжирлари мавжуд. Улар турли усулда уланган бўлиб, улардан энг соддаси битта ва бир нечта қаршилиқлар кетма-кет, параллел Г, Т, П ва Х шаклларда уланган ҳолларидир.

Тўрт кутбли деганда одатда электр занжирининг иккита кириш ва иккита чиқиш қисмлари мавжуд бўлган тури тушунилади (1- а, б, в чизма). а) чизмадаги i_1, i_2, I_1, I_2 — кириш ва чиқишдаги кучланиш ва токнинг оний қийматлари бўлсин. Тўрт кутблиларнинг синусоидали ток ва кучланиш билан ишлаётгандаги ҳолатини кўриб чиқайлик.



1- чизма

Агар L_1, L_2, E_1, E_2 тўрт кутблиларнинг кириш ва чиқишдаги ток ва кучланиш амплитудаси бўлса, у ҳолда улар ўзаро қуйидагича чизикли боғланишда бўлади:

$$\begin{cases} E_2 = \alpha_{11}E_1 + \alpha_{12}L_1 \\ L_2 = \alpha_{21}E_1 + \alpha_{22}L_1 \end{cases} \quad (2.11)$$

бунда α_{11} , α_{12} , α_{21} , α_{22} параметрлар тўрт кутблиларнинг тўла ўтказувчанлиги бўлади ва у ўрганилаётган схемадаги ток билан кучланишларни боғлайди.

(2.11) системани матрица кўринишида ҳам ёзиш мумкин:

$$[L] = [\alpha] \cdot [E].$$

Бунда:

$$[L] = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \end{pmatrix}, \quad [\alpha] = \{\alpha_{ij}\}, \quad [E] = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix}.$$

Бу системанинг ечими $[E] = [\alpha]^{-1} [L]$ кўринишда ёзилади, яъни


$$E_1 = \frac{\alpha_{22}}{\Delta} L_1 - \frac{\alpha_{12}}{\Delta} L_2,$$

$$E_2 = -\frac{\alpha_{21}}{\Delta} L_1 + \frac{\alpha_{11}}{\Delta} L_2,$$

бу ерда $\Delta = \det[\alpha]$.

3. Физикадан бизга маълумки, трансформатор иккита чулгамдан иборат (2-чизма). Бу чулгамлар мос равишда $Z_1 = R_1 + j\omega L_1$ ва $Z_2 = R_2 + j\omega L_2$ қаршиликларга эга бўлсин, бунда L_1 ва L_2 — чулгамларнинг индуктивлиги. Трансформатор электромагнит индукция қонунига қўра ишлайди. Шунинг учун бу қонун

$$\mu = j\omega M$$



2-чизма

формула билан аниқланади. У ҳолда кириш ва чиқишдаги кучланишлар, тоқлар ва бошқа параметрлар орасида қуйидагича боғланиш мавжуд:

$$\begin{cases} E_1 = Z_1 I_1 - \mu I_2, \\ E_2 = \mu I_1 - Z_2 I_2. \end{cases} \quad (2.12)$$

Шундай қилиб, трансформатордаги тоқларни ҳисоблаш иккита икки номаълумли тенгламалар системасига келди. Уни детерминант ёки матрицадан фойдаланиб ечилади.

4. Матрицалар назариясидан қурилишга доир айрим масалаларни ечишда фойдаланишга мисол кўрамиз. Бирор қурувчи ташкилот 3 та уй, 5 та болалар боғчаси, 9 та дам олиш уйи қуриш учун мажбурият олган бўлсин. Қурилиш материаллари темир, ёғоч, ойна, бўёқдан иборат. Шунингдек материал материал миқдори ва ишчи кучи ҳар бир қурилишга бирор бирликда қуйидаги матрица кўринишда берилсин:

$$A = \begin{array}{ccccc|l} & \text{Темир} & \text{Ёғоч} & \text{Ойна} & \text{Бўёқ} & \text{Ишчи кучи} \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} & \begin{array}{l} 10 \\ 7 \\ 5 \end{array} & \begin{array}{l} 17 \\ 12 \\ 15 \end{array} & \begin{array}{l} 8 \\ 4 \\ 10 \end{array} & \begin{array}{l} 5 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \begin{array}{l} 11 \\ 8 \\ 9 \end{array} & \begin{array}{l} \text{Уй} \\ \text{Боғча} \\ \text{Дам олиш уйи} \end{array} \end{array}$$

Агар бир бирлик материал: темир 12 сўм, ёғоч 7 сўм, ойна 5 сўм, бўёқ 4 сўм, ишчи кучи 10 сўм бўлса, қуйидагиларни аниқланг (бу нархлар шартли равишда олинганини ва бу улар ҳақиқатдаги нархларга тўғри келмаслигини эслатиб ўтамиз):

1) умумий керак бўлган материаллар миқдори ва ишчи кучи;

2) ҳар бир қурилиш учун ишчи кучи ва материаллар нархи;

3) умумий ишчи кучи ва материаллар нархи.

Ечиш. Қурувчи ташкилот қурадиган 3 та турар уй, 5 та болалар боғчаси, 9 та дам олиш уйини $B = (3 \ 5 \ 9)$ сатр-матрица деб оламиз. Бу қурилишлар учун кетадиган материалларни билиш учун B матрицани A матрицага кўпайтирамиз:

$$B \cdot A = (3 \ 5 \ 9) \cdot \begin{pmatrix} 10 & 17 & 8 & 5 & 11 \\ 7 & 12 & 4 & 3 & 8 \\ 5 & 15 & 10 & 4 & 9 \end{pmatrix} =$$

$$= (3 \cdot 10 + 5 \cdot 7 + 9 \cdot 5; 3 \cdot 17 + 5 \cdot 12 + 9 \cdot 15;$$

$$3 \cdot 8 + 5 \cdot 4 + 9 \cdot 10; 3 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 9 \cdot 4;$$

$$3 \cdot 11 + 5 \cdot 8 + 9 \cdot 9) = (110, 246, 134, 66, 154).$$

Демак, қурувчи ташкилот учун 110 бирлик темир, 246 бирлик ёғоч, 134 бирлик ойна, 66 бирлик бўёқ ва 154 бирлик ишчи кучи зарур экан.

Энди хар бир тур курилиш учун материаллар ва ишчи кучи харажатини билиш учун уларнинг нархларидан тузилган

$$C = \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \\ 5 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$$

устун-матрицани тузиб оламиз.

А матрицани С матрицага кўпайтирамиз:

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 10 & 17 & 8 & 5 & 11 \\ 7 & 12 & 4 & 3 & 8 \\ 5 & 15 & 10 & 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \\ 5 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 10 \cdot 12 + 17 \cdot 7 + 8 \cdot 5 + 5 \cdot 4 + 11 \cdot 10 \\ 7 \cdot 12 + 12 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 4 + 8 \cdot 10 \\ 5 \cdot 12 + 15 \cdot 7 + 10 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 9 \cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 409 \\ 280 \\ 321 \end{pmatrix}$$

(С ни А га кўпайтириш маънога эга эмас).

Демак, турар уй учун 409 сўм, болалар боғчаси учун 280 сўм, дам олиш уйи учун 321 сўм пул туланар экан.

Учинчи саволга жавоб бериш учун куйидаги матрицалар кўпайтмасини топамиз:

$$BAC = (110 \ 246 \ 134 \ 66 \ 154) \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \\ 5 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} = 5516$$

ёки

$$BAC = (3 \ 5 \ 9) \cdot \begin{pmatrix} 409 \\ 280 \\ 321 \end{pmatrix} = 5516.$$

Демак, ҳамма қурилиш 5516 сўмга тушар экан.

Сизга маълумки, уй ёки болалар боғчаси қуриш учун масала шартдаги материаллар етарли эмас. Агар улар учун кетадиган материалларнинг ҳаммаси олинса, у ҳолда масала шартига кўра тузиладиган матрицанинг тартиби катта бўлади. Шунинг учун биз айрим материаллар билан чекландик.

6. Энди кундалик ҳаётимизда учрайдиган қуйидаги иккита масалани кўрамиз.

1-масала. Тўртта харидор (уларни B, C, D, E ҳарфлари билан белгилаймиз) A матрица устунда кўрсатилгандек миқдорда мевалар харид қилишган бўлсин:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} B & C & D & E \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \text{кг олма} \\ \text{кг нок} \\ \text{кг олхўри} \end{matrix}$$

$t = (4 \ 10 \ 6)$ сатрлар бу меваларнинг нархи (шартли сўмларда). t — тўртта бирдан иборат устун-матрица бўлса, tA, At, tAt матрицалар кўпайтмасини топинг ва унинг маъносини тушунтиринг.

Ечиш. t матрицани A га кўпайтирсак:

$$t \cdot A = (4 \ 10 \ 6) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= (4 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 6 \cdot 2; 4 \cdot 1 + 10 \cdot 0 + 6 \cdot 1; 4 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 6 \cdot 3; 4 \cdot 5 + 10 \cdot 3 + 6 \cdot 0) = (30; 10; 50; 50)$$

сатр-матрицага эга бўламиз, бунда $S_1 = 30$ B харидор сотиб олган меваси учун тўлаган пулни билдиради. $S_2 = 10$ эса C харидор, $S_3 = 50$ D харидор, $S_4 = 50$ E харидор тўлаган пулни билдиради. A ни t га кўпайтирамиз:

$$At = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Натижа устун-матрицадан иборат бўлиб, унинг маъноси тўртта харидорнинг 11 кг олма, 6 кг нок, 6 кг олхўри харид қилганини билдиради.

$t \cdot A \cdot l$ кўпайтмани икки хил усул билан ҳисоблаш мумкин:

$$t \cdot A \cdot l = (4 \ 10 \ 6) \cdot \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = 140;$$

$$t \cdot A l = (30 \ 10 \ 50 \ 50) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 140.$$

Иккала ҳолда ҳам бир хил натижага эга бўлдик. Бу натижа тўртгала харидорнинг ҳамма мева учун тўланган пул миқдорини билдиради.

2-масала. Жамоа ҳўжалиги 5 тонна картошка, 6 тонна карам ва 10 тонна сабзи етиштиришни режалаштирган эди. Уни $A = (5 \ 6 \ 10)$ сатр-матрица кўринишда қисқача ёзиб олиш мумкин. Бу маҳсулотларнинг нархи

(шартли минг сўм) $B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$ устун-матрицадан иборат бўлса, ҳўжалик даромадини ҳисобланг.

Ечиш. Жамоа ҳўжалиги даромадини ҳисоблаш учун A сатр-матрицани B устун-матрицага кўпайтирамиз:

$$A \cdot B = (5 \ 6 \ 10) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} = (5 \cdot 6 + 6 \cdot 3 + 10 \cdot 8) = 128.$$

Демак, даромад 128 минг шартли сўмни ташкил қилар экан.

МАШҚЛАР

1. Матрицаларнинг йиғиндисини топинг:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Матрицаларнинг купайтмасини топинг:

$$a) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix};$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$в) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ -6 & -3 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 & 7 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ -3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

3. Агар $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бўлса,
 $C = 2A + 3B$ матрицани топинг.

4. Агар $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ бўлса,
 $C = A - 5B$ матрицани топинг.

5. Агар
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ бўлса,

$C = 2A - 3B$ матрицани топинг.

6. Агар
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ бўлса,

$A + 2C = 3B$ шартдан C матрицани топинг.

7. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \text{ бўлса,}$$

2 $(A+B) \cdot (2B-A)$ ни ҳисобланг.

8. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix} \text{ бўлса,}$$

$3A - (A + 2B) \cdot B$ ни ҳисобланг.

9. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ бўлса,}$$

$C = AB - BA$ матрицани топинг.

10. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ матрица $f(x) = x^2 - 5x + 3$ куп-

ҳаднинг илдизи эканини кўрсатинг.

11. Агар $f(x) = x^2 - 3x + 5$ ва

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ бўлса,}$$

$f(A)$ матрицани топинг.

12. Ушбу матрицаларга тескари матрицани топинг:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}; \text{ б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \text{ г) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -3 & 7 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

13. Қуйидаги тенгламалар системаларини матрицалардан фойдаланиб ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 14, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 9, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 16. \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -5, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ 7x_1 + x_2 - x_3 = 10. \end{cases}$$

$$\text{н) } \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} 5x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 5, \\ 3x_1 - 8x_2 + 3x_3 = -2, \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases}$$

$$\text{д) } \begin{cases} x + 2y + z = 4, \\ 3x - 5y + 3z = 1, \\ 2x + 7y - z = 8. \end{cases} \quad \text{е) } \begin{cases} 5x + 8y - z = -7, \\ x + 2y + 3z = 1, \\ 2x - 3y + 2z = 9. \end{cases}$$

$$\text{ж) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - 5x_4 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 = 2, \\ 8x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2. \end{cases}$$

$$\text{з) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3. \end{cases}$$

14. Ушбу матрицаларнинг рангини икки хил усул билан (элементар алмаштиришлар ва минорлар орқали) топиб, натижа бир хил бўлишини кўрсатинг:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 7 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 5 & -13 & 11 \end{pmatrix}; \quad \text{г) } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

ВЕКТОРЛАР АЛГЕБРАСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

1- §. Вектор ҳақида тушунча

Физика, механика, техниканинг турли соҳаларида ўзларининг сон қийматлари билан тўлиқ аниқланадиган катталиклар учрайди. Бундай катталиклар скаляр микдорлар деб аталади. Масалан, узунлик, юз, ҳажм, масса, жисмнинг температураси ва ҳоказолар скаляр микдор ҳисобланади.

Амалий масалаларга математикани қўллашда, скаляр микдорлардан ташқари фазодаги йўналиши ҳам аниқланишига тўғри келадиган микдорлар учрайди. Йўналиши ва катталиги билан аниқланадиган микдорлар вектор микдорлар деб аталади. Жисмга таъсир этувчи куч, ҳаракатдаги жисмнинг тезлиги, тезланиши, ҳаракат микдори, электр майдонининг кучланганлиги, магнит майдонининг кучланганлиги, оний айланмиш бурчак тезлиги ва ҳоказолар вектор микдорлар ҳисобланади.

Вектор микдорлар векторлар ёрдамида тасвирланади. Вектор деб фазодаги тайин узунликка ва йўналишга эга бўлган кесмага айтилади.

Векторлар кўпинча унинг боши ва охирини билдирувчи иккита ҳарф ёрдамида (масалан $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, ...) ёки биргина (масалан, $\vec{a}$, $\vec{b}$, ...) ҳарф орқали белгиланади.

Векторнинг узунлигига унинг модули деб аталади ва $|\overline{AB}| = |\vec{a}|$ кўринишда белгиланади.

Модули бирга тенг, яъни $|\vec{a}| = 1$ бўлган вектор бирлик вектор, модули нолга тенг $|\vec{a}| = 0$ бўлган вектор нол вектор дейилади. Нол векторнинг йўналиши ҳақида сўз юритилмайди, чунки у аниқланмаган. Нолдан фарқли иккита вектор бир тўғри чизикда ёки параллел тўғри чизикларда ётса, бундай векторлар коллинеар векторлар дейилади ва $\vec{a} \parallel \vec{b}$ кўринишда белгиланади. Битта текисликда ётувчи ёки шу текисликка параллел бўлган векторлар компланар векторлар дейилади.

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар учун:

- а) узунликлари тенг бўлса;
- б) улар коллинеар бўлса;

в) йўналишлари бир хил бўлса, у ҳолда бу векторлар тенг деб олинади: $\vec{a} = \vec{b}$.

Бу таърифдан фойдаланиб, ихтиёрий векторни текисликнинг ёки фазонинг исталган нуқтасига кўчириш мумкин.

Нол вектордан фарқли ҳар қандай $\vec{a}$ вектор учун қарама-қарши вектор мавжуд бўлиб, у $(-\vec{a})$ билан белгиланади. $(-\vec{a})$ вектор $\vec{a}$ векторнинг модулига тенг модулга эга $|\vec{a}| = |-\vec{a}|$, улар коллинеар, аммо қарама-қарши томонга йўналган.

2-§. Векторлар устида амаллар

Векторларни қўшиш ва айириш ҳамда векторларни сонга кўпайтириш амалларини кўрамиз. Бу амаллар чизикли амаллар деб аталади.


1. Векторларни қўшиш. Коллинеар бўлмаган икки $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг йиғиндиси $\vec{c}$ векторни топишни кўрайлик. Бунинг учун $\vec{a}$ векторнинг бошини исталган O нуқтага қўйиб, унинг учини A нуқта деб, бу нуқтадан иккинчи $\vec{b}$ векторни келтириб қўйилса, бу векторнинг учи B нуқтага жойлашади. O ва B нуқталарни бирлаштирсак, боши O ва охири B бўлган $\overline{OB}$ векторни ҳосил қиламиз. Бу вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларининг изланган йиғиндиси $\vec{c}$ вектордан иборат бўлади (3-чизма).

Векторларни қўшиш қоидадан исталган O , A ва B уч нуқта учун


$$\overline{OA} + \overline{AB} = \overline{OB}$$

тенглик ўринли бўлиши келиб чиқади. Охирги тенглик векторларни қўшишнинг учбурчак қоидаси дейилади.

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг бош нуқталарини O нуқтага қўйиб $\vec{a} = \overline{OA}$ ва $\vec{b} = \overline{OD}$ векторларни чизамиз. Улар-



3-чизма



4-чизма.

нинг учлари A ва D нуқталардан $\vec{a}$, $\vec{b}$ векторларга мос равишда параллел AB ва BD тўғри чизиқлар чизсак, улар B нуқтада кесишади.

Боши O , охири B нуқта бўлган вектор курсак, бу вектор изланаётган $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар йигиндиси $\vec{c}$ вектор бўлади (4- чизма), яъни $\vec{a}$, $\vec{b}$ лардан қурилган параллелограмм диагонали бўлади. Векторлар йигиндисини бундай геометрик ясашни одатда параллелограмм қоидаси дейилади.


$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ векторнинг узунлиги (модули)

$$|\vec{c}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos(\vec{a} \wedge \vec{b})} \quad (3.1)$$


формула ёрдамида топилади.

Иккита вектор учун ҳосил қилинган векторларни қўшиш қондасини исталган чекли сондаги қўшилувчи векторлар бўлган ҳол учун ҳам қўллаш мумкин. Бунда асосан векторларни қўшишнинг учбурчак қондасини кетма-кет қўллаш усулидан фойдаланилади. Иштиёрий O нуқтага қўшилувчи векторларнинг биринчиси $\vec{a}$ векторнинг боши қўйилади. Бу векторнинг охирига (A нуқтага) иккинчи $\vec{b}$ векторнинг боши қўйилади. Энди b векторнинг охирига $\vec{c}$ векторнинг боши қўйилади. Бундай жараёни давом эттириб, йигиндида қатнашувчи векторлардан сўнггисининг охирини бошлангич O нуқта билан бирлаштириб, O нуқтани вектор боши ҳисобланса, ҳосил бўлган $\vec{OD}$ вектор берилган векторларнинг йигиндиси бўлади (5- чизма).

Агар бир нечта векторларни қўшишда сўнгги қўшилувчи векторнинг боши O нуқта билан (биринчи қўшилувчи векторнинг боши) устма-уст тушса, бу векторларнинг йигиндиси нол векторга тенг бўлади (6- чизма).



5- чизма



6- чизма

Векторларни қўшиш амали қуйидаги хоссаларга эга:

1) Қўшишнинг *группалаш (ассоциативлик)* хосси.

Исталган $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар учун

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

муносабат ўринли.

Исбот. Векторларни қўшишнинг учбурчак қондасидан (7- чизма):

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB},$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{OB} + \vec{BC} = \vec{OC},$$

$$\vec{b} + \vec{c} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC},$$


$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{OC},$$

бундан $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ экани келиб чиқади.


2) Векторларни қўшишнинг *ўрин алмаштириш (коммутативлик)* хосси. Исталган иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ вектор учун $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ тенглик ўринлидир.

3) Ҳар қандай $\vec{a}$ векторга нол вектор қўшилса $\vec{a}$ вектор ҳосил бўлади, яъни $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.

4) Ҳар қандай $\vec{a}$ вектор учун шундай $\vec{a}'$ вектор мавжудки, унинг учун: $\vec{a} + \vec{a}' = \vec{0}$.



7- чизма



8- чизма

2. Векторларни айириш. Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг айирмаси деб, шундай учинчи $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ векторга айтиладик, унинг айрилувчи $\vec{b}$ вектор билан йигиндиси $\vec{a}$ векторни беради. Демак, таърифга кўра, агар $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ бўлса, у ҳолда $\vec{c} + \vec{b} = \vec{a}$. Икки векторни қўшиш қондасидан айирма векторни ясаш қондаси келиб чиқади (8- чизма). Умумий 0 нуқтадан $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларни қўямиз. Камаювчи $\vec{a}$ ва айирилувчи $\vec{b}$ векторларнинг охириларини туташтирувчи ва айрилувчи вектордан камаювчи векторга томон йўналган $\vec{BA}$ вектор $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ айирма бўлади. Ҳақиқатан ҳам, векторларни қўшиш

қондасига кўра: $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}$ ёки $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$, яъни $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.

Агар умумий 0 нуктадан қўйилган $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан $OABC$ параллелограмм ясалса, у ҳолда параллелограммнинг 0 учидан чиқувчи диагонали билан устма-уст тушадиган $\overrightarrow{OB}$ вектор $\vec{a} + \vec{b}$ йигиндига тенг, иккинчи диагональ билан устма-уст тушадиган $\overrightarrow{CA}$ вектор эса $\vec{a} - \vec{b}$ айирмага тенг бўлади (9-чизма).

3. Векторни сонга кўпайтириш. $\vec{a}$ вектор ва скаляр $\lambda \neq 0$ сон берилган бўлсин. $\vec{a}$ векторнинг λ сонга кўпайтмаси деб қуйидаги шартларни қаноатлантирадиган $\vec{b}$ векторга айтилади:

а) Агар $\lambda > 0$ бўлса, $\vec{b}$ вектор $\vec{a}$ вектор билан бир хил йўналишда ($\vec{a} \neq 0$), акс ҳолда $\lambda < 0$ бўлса, $\vec{b}$ ва $\vec{a}$ векторлар қарама-қарши йўналишда бўлади;

б) $\vec{b}$ векторнинг узунлиги (модули) $|\vec{b}| = |\lambda| |\vec{a}|$ формула билан ҳисобланади.

Масалан, $\frac{1}{2} \vec{a}$ вектор $\vec{a}$ вектор билан бир хил йўналган ва $\vec{a}$ векторнинг узунлигидан икки марта кичик узунликка эга бўлган вектордир.

Векторни сонга кўпайтириш қондасидан қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

1. Ихтиёрий $\vec{a}$ вектор учун: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$;
2. Ихтиёрий $\lambda \in R$ сон учун: $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
3. Ихтиёрий $\vec{a}$ вектор учун: $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$.
4. $\vec{a}$ ва $\lambda \vec{a}$ векторлар коллиансар векторлар бўлади.

Бирор $\vec{a} \neq 0$ векторни ўзининг узунлигига тесқари $\frac{1}{|\vec{a}|}$ сонга кўпайтирилса, шу вектор йўналишидаги бирлик вектор (орт) ҳосил бўлади, яъни

$$\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \vec{a}_0 \quad (|\vec{a}_0| = 1).$$

Теорема. Агар $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\vec{a} \neq 0$) бўлса, у ҳолда шундай λ сон мавжудки,

$$\vec{b} = \lambda \vec{a} \quad (3.2)$$

тенглик ўринли бўлади.

Исбот. $\vec{a} \parallel \vec{b}$ бўлгани учун қуйидаги λ уч ҳолдан бири бўлиши мумкин:

- 1) $\vec{a} \uparrow \vec{b}$ бўлса, $\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \frac{1}{|\vec{b}|} \cdot \vec{b}$ бўлиб, бундан


$\vec{b} = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$ ҳосил бўлади. Бу тенгликдан $\lambda = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ деб олсак, $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ келиб чиқади;

2) $\vec{a} \downarrow \uparrow \vec{b}$ бўлса, $\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = -\frac{1}{|\vec{b}|} \cdot \vec{b}$ бўлиб, бундан


$\vec{b} = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$ ҳосил бўлади. Бу тенгликдан $\lambda = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ деб олсак, $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ келиб чиқади;

3) $\vec{b} = 0$ бўлса, у ҳолда $\vec{b} = 0 \cdot \vec{a}$ бўлиб, бунда $\lambda = 0$ бўлади.

Демак, векторни сонга кўпайтириш қоидадан ва бу теоремадан қуйидаги хулосани чиқариш мумкин: $\vec{a} \parallel \vec{b}$ берилган бўлса, у ҳолда бу векторлар учун $\vec{b} = \lambda \vec{a} (\lambda \in \mathbb{R})$ тенглик ўринли бўлади.



9-чизма



10-чизма

Шундай қилиб, (3.2) муносабат $\vec{a}$, $\vec{b}$ векторлар коллинеарлигининг зарурий ва етарли шартидир.

Векторни сонга кўпайтириш қуйидаги хоссаларга эга:

- а) $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- б) $\lambda \cdot (\beta \cdot \vec{a}) = (\lambda \cdot \beta) \cdot \vec{a}$ (группалаш қонуни);
- в) $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$ (векторларни кўшишга нисбатан тақсимот қонуни).

Бу хоссаларнинг исботини ўқувчининг ўзига қолдирамиз.

1-мисол. ABC учбурчак берилган бўлиб, унинг огирлик маркази O нуқтада бўлса, $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$ эканини исбот қилинг (10-чизма).

Ечиш. Томонлари OA ва OB бўлган векторлардан иборат AOE параллелограмм ясаймиз. Бу параллелограммдан:

$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OE}. \quad (\text{A})$$

О нукта масала шартига кўра учбурчакнинг огирлик маркази бўлгани учун, у медианалар кесишган нуктадан иборат. Шунинг учун $\vec{OD}$ вектор $\vec{CD}$ векторнинг учдан бирини ташкил қилади, яъни $OD = \frac{1}{3} \vec{CD}$. (Б)

10- чизмадан $\vec{OC} = -2\vec{OD}$, $\vec{OD} = \vec{DE}$, $\vec{OC} = \vec{EO}$ (В) (А), (Б) ва (В) лардан:

$$(\vec{OC}) = -(\vec{OA} + \vec{OB}) \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{O}.$$

2- мисол. Иккита (I ва T) тросга 15 кг юк осилган (11- чизма). Агар $\angle ACB = 120^\circ$ бўлса, тросларда ҳосил бўлувчи кучларни аниқланг.

Еч и ш. Масала шартига кўра тросларга осилган 15 кг юк иккита, яъни $\vec{CD}$ ва $\vec{CF}$ кучнинг йиғиндисидан иборатдир. Шунинг учун юк йўналишини диагонал сифатида қараб параллелограмм томонларини топамиз.

Бунинг учун $ECDF$ параллелограммни ясаймиз, чизмадан:

$$\angle FCD = 30^\circ.$$

Параллелограмм томонлари $|\vec{CD}|$ ва $|\vec{CE}|$ ларни топамиз. Тўғри бурчакли $\triangle CFD$ дан:

$$|\vec{CF}| = |\vec{CD}| \cdot \cos 30^\circ \Rightarrow \\ \Rightarrow |\vec{CD}| = \frac{|\vec{CF}|}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}} |\vec{CF}| = \frac{15 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}}{3} = 10\sqrt{3}.$$

Демак, $|\vec{CD}| = 10\sqrt{3}$ кг.


$|\vec{CE}|$ ни топамиз: $\vec{CD} = \vec{EF}$ бўлгани учун

$$|\vec{CE}| = \frac{|\vec{EF}|}{2} = \frac{|\vec{CD}|}{2} = \frac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}.$$


Демак, $|\vec{CE}| = 5\sqrt{3}$ кг.

3-§. Икки вектор орасидаги бурчак

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар берилган бўлсин. Бу векторларнинг бошларини бирор умумий О нуктага келтирамиз ёки $\vec{OA} = \vec{a}$ ва $\vec{OB} = \vec{b}$ векторларни ясаймиз (12- чизма). У ҳолда AOB бурчак ($\vec{a}$ векторни $\vec{b}$ вектор билан устма-уст тушгунча айлантериш лозим бўлган иккита бурчак-



11- чизма



12- чизма


нинг кичиги $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак дейилади ва $(\vec{a} \wedge \vec{b})$ кўринишда ёки $\alpha, \varphi, \psi, \dots$ ҳарфлардан бири орқали белгиланади. Демак, таърифга кўра икки вектор орасидаги бурчак 0° дан 180° гача ораликда бўлади. Бундан кўринадики, бир хил йўналишдаги коллинеар векторлар орасидаги бурчак 0° га, қарама-қарши йўналишдаги векторлар орасидаги бурчак 180° га тенг бўлади. Агар векторлар орасидаги бурчак 90° га тенг бўлса, улар перпендикуляр ёки ортогонал векторлар дейилади ва бу $\vec{a} \perp \vec{b}$ каби белгиланади. l ўқ ва унинг бирлик вектори $\vec{e}$ берилган бўлсин. Ихтиёрий $\vec{a} \neq 0$ векторнинг бирлик вектори $\vec{a}_0$ қуйидагича аниқланади:

$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|},$$


чунки.

$$|\vec{a}_0| = \left| \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right| = \left| \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} \right| = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot |\vec{a}| = 1.$$

$\vec{a} \neq 0$ текисликдаги ихтиёрий вектор бўлсин. $\vec{a}$ вектор билан l ўқ орасидаги бурчак деганда l ўқнинг бирлик вектори $\vec{e}$ билан $\vec{a}$ вектор орасидаги бурчак тушунилади. $\vec{a}$ вектор l ўқ билан φ бурчак ташкил қилади (13- чизма).



13- чизма



14- чизма


4-§. Векторнинг ўқдаги проекцияси

Текисликда ихтиёрий жойлашган бирор l ўқ ва $\vec{a}$ вектор берилган бўлсин. Бу $\vec{a}$ векторнинг боши A ва охири B нинг l ўққа проекциялари мос равишда A_1 ва B_1 нукталар бўлади (14- чизма).

l ўқда A_1 нукта x_1 координатага, B_1 нукта x_2 координатага эга бўлсин. $\vec{a}$ вектор охири ва бошининг l ўқдаги проекциялари координаталарининг айирмаси $x_2 - x_1$ га $\vec{a}$ векторнинг шу ўққа проекцияси деб аталади ва қуйидагича ёзилади:

$$\text{Пр}_l \vec{a} = x_2 - x_1.$$

Агар $\vec{a}$ вектор l ўқ билан ўткир бурчак ташкил этса, у ҳолда $x_2 > x_1$ бўлиб, $x_2 - x_1$ проекция мусбат; агар $\vec{a}$ вектор ва l ўқ орасидаги бурчак ўтмас бўлса, у ҳолда $x_2 < x_1$ бўлиб, $x_2 - x_1$ проекция манфий бўлади (15- а, б чизмалар).




15- чизма

Агар $\vec{a}$ вектор l ўқ билан 90° ли бурчак ташкил этса, у ҳолда $x_2 = x_1$ бўлиб $x_2 - x_1$ проекция нолга тенг бўлади.

1-теорема. $\vec{a}$ векторнинг l ўққа проекцияси $\vec{a}$ вектор модулининг шу вектор билан ўқ орасидаги φ бурчак косинусига кўпайтмасига тенг:

$$\text{Пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi. \quad (3.3)$$



16- чизма

Исбот. $\vec{a}$ векторнинг l ўқдаги проекцияси $x_2 - x_1$ бўлсин. $\vec{a}$ векторни параллел кўчирсак, унинг бу ўқдаги $(x_2 - x_1)$ проекцияси ўзгармас микдор бўлади. Шунинг учун векторнинг боши O билан устма-уст тушадиган ҳолни қараш кифоядир (16- чизма).

Санок бошининг координатаси нолга тенг бўлгани учун

$$\text{Пр}_l \vec{a} = x - 0 = x,$$

бу ерда $x = \vec{a}$ вектор охири проекциясининг координатаси. Косинуснинг таърифига кўра:

$$\cos \varphi = \frac{x}{|\vec{a}|} \Rightarrow x = |\vec{a}| \cos \varphi$$

ёки

$$\text{Пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi.$$

Теорема исбот бўлди.

2-теорема. Икки вектор йигиндисининг l ўқдаги проекцияси қўшилувчи векторларнинг шу ўқдаги проекциялари йигиндисига тенг.

Исбот. $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$ бўлсин (17-чизма).

A , B ва C нуқталарнинг l ўқдаги проекциялари A_1 , B_1 ва C_1 нинг координаталарини x_1 , x_2 ва x_3 билан белгилаймиз. У ҳолда

$$\text{Пр}_l \vec{a} = x_2 - x_1; \text{Пр}_l \vec{b} = x_3 - x_2; \text{Пр}_l \vec{AC} = x_3 - x_1.$$

Бирок $x_3 - x_1 = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2)$ деб ёзиш мумкин бўлгани сабабли:


$$\text{Пр}_l \vec{AC} = \text{Пр}_l \vec{AB} + \text{Пр}_l \vec{BC}.$$

Бу теоремани n та векторлар йигиндиси учун ҳам умумлаштириш мумкин, яъни бир нечта векторлар йигиндисининг бирор l ўқдаги проекцияси векторлар проекцияларининг йигиндисига тенг.

3-теорема. $\vec{a}$ векторни λ сонга кўпайтирилса, унинг l ўқдаги проекцияси ҳам шу λ сонга кўпаяди:

$$\text{Пр}_l(\lambda \vec{a}) = \lambda \text{Пр}_l \vec{a}.$$

Теорема исботини ўқувчиларга қолдираимиз.



Мисол. Узунлиги $|\vec{a}| = 6$ га, l ўқ билан ҳосил қилган бурчаги 60° га тенг бўлган $\vec{a}$ векторнинг l ўқдаги проекциясини топинг.

Ечиш. (3.3.) формулага асосан:

$$\text{Пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi = 6 \cos 60^\circ = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

5-§. Векторларнинг чизиқли боғлиқлиги. Базис векторлар

$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар ҳамда $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ҳақиқий сонлар берилган бўлсин. Улардан ҳосил қилинган $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n$ ифода $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторларнинг $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ коэффицентли чизиқли комбинацияси дейилади. Агар бирор $\vec{a}$ вектор $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторларнинг чизиқли комбинацияси шаклида ифодаланган бўлса, $\vec{a}$ вектор шу векторлар бўйича ёйилган дейилади, яъни қуйидаги тенглик ўринли бўлади:

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n.$$

Агар камида биттаси нолдан фаркли $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ сонлар танлаб олинганда

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = 0 \quad (3.4)$$

тенглик бажарилса, у ҳолда $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар чизиқли боғлиқ дейилади. Агар (3.4) муносабат фақат $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ бўлгандагина ўринли бўлса, у ҳолда $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторлар чизиқли боғланмаган ёки чизиқли эркин деб аталади.

Энди текисликдаги ва фазодаги векторларнинг чизиқли боғлиқлиги ҳақидаги теоремаларни қараймиз.

1-теорема. Текисликдаги ҳар қандай учта $\vec{a}, \vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар чизиқли боғлиқ бўлади.

Исбот. Бу векторлардан бири қолган икки векторнинг чизиқли комбинациясидан иборатлигига ишонч ҳосил қилиш kifoya. Бунда икки ҳол бўлиши мумкин.

1. Берилган векторлар орасида бир жуфти коллинеар бўлсин. У ҳолда $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ ёки $\vec{a} = \lambda \vec{b} + 0 \cdot \vec{c}$ (бунда λ — сон) тенгликни ёза оламиз, яъни $\vec{a}$ вектор $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг чизиқли комбинацияси бўлади.

2. Берилган векторлар орасида ҳеч бир жуфти коллинеар бўлмасин. У ҳолда учала векторни умумий нуқтага келтирамиз (18-чизма). $\vec{a}$ векторни $\vec{b}$ ва

$\vec{c}$ векторларга коллинеар бўлган икки векторнинг йигиндиси кўринишида ифодалаш мумкинлигини кўрсатамиз. Диагонали $\vec{a}$ вектордан, томонлари эса $\vec{OC}$ ва $\vec{OB}$ векторлардан иборат бўлган параллелограмм тузамиз. Векторларни қўшниш қондасига кўра:

$$\vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}. \quad (A)$$

$\vec{OB}$ ва $\vec{OC}$ векторлар мос равишда $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларга коллинеар бўлганлиги учун

$$\vec{OB} = \lambda_1 \vec{b} \text{ ва } \vec{OC} = \lambda_2 \vec{c} \quad (B)$$

тенгликни ёзиш мумкин. (B) ни (A) га қўйсак,

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{b} + \lambda_2 \vec{c}$$


хосил бўлади.

Н а т и ж а. Агар текисликда векторлар сони учтадан ортик бўлса, улар ҳам чизикли боғлиқдир, яъни бу векторлардан бирини қолганларининг чизикли комбинацияси кўринишида ифодалаш мумкин.


2-теорема. Фазодаги ҳар қандай тўртта $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ векторлар чизикли боғлиқдир.

И с б о т. Берилган векторлар умумий бошга эга деб фараз қиламиз. Уларнинг чизикли боғлиқлигини кўрсатиш учун бу векторлардан бири қолганларининг чизикли комбинациясидан иборат эканлигини кўрсатиш етарлидир. Бунда икки ҳол бўлиши мумкин.

1. Берилган тўртта вектор орасида компланар векторлар учлиги мавжуд бўлган ҳолни кўрайлик. Аниқлик учун, масалан, $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар учлиги компланар бўлсин. Бу векторлар бир текисликда ётганлиги учун улардан бирини, масалан, $\vec{a}$ векторни 1-теорема-



18- чизма



19- чизма

га кўра қолган векторларнинг чизиқли комбинацияси кўринишида ифодалаш мумкин: $\vec{a} = \lambda_1 \vec{b} + \lambda_2 \vec{c}$. Тўрттала вектор учун $\vec{a} = \lambda_1 \vec{b} + \lambda_2 \vec{c} + 0 \cdot \vec{d}$ тенгликни ёзиш мумкин, бу эса $\vec{a}$ вектор $\vec{b}$, $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ векторларнинг чизиқли комбинацияси эканлигини билдиради.

2. Берилган векторлар орасида битта ҳам компланар векторлар учлиги йўқ бўлсин. Бу ҳолда $\vec{a}$ векторни мос равишда $\vec{b}$, $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ векторларга коллинеар бўлган учта векторнинг йигиндиси кўринишида ифодалаш мумкин. Диагонали $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ вектордан ва қирралари мос равишда $\vec{b}$, $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ векторларга коллинеар бўлган векторлардан иборат параллелепипед ясаймиз (19- чизма). Векторларни қўшиш қондасига кўра:

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$$

Бирок $\overrightarrow{OB} = \lambda_1 \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \lambda_2 \vec{c}$, $\overrightarrow{OD} = \lambda_3 \vec{d}$. Демак, $\vec{a} = \lambda_1 \vec{b} + \lambda_2 \vec{c} + \lambda_3 \vec{d}$, бу тенглик эса $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ва $\vec{d}$ векторларнинг чизиқли боглиқ эканини билдиради. Бу теоремалардан иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ вектор коллинеар бўлса, улар ўзаро чизиқли боглиқ бўлиши ва аксинча, иккита вектор чизиқли боглиқ бўлса, уларнинг коллинеар бўлиши келиб чиқади. Фазода берилган учта вектор чизиқли боглиқ бўлиши учун уларнинг компланар бўлиши зарур ва етарлидир.

Маълум тартибда олинган $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n$ векторлар системаси чизиқли эркин бўлиб, бошқа ҳар қандай вектор булар орқали чизиқли ифодаланса, $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n$ векторлар системаси базис векторлар дейилади ва

$$B = \{\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n\}$$

кўринишда белгиланади.

Агар базиснинг ҳар бир вектори бирлик вектор бўлиб, улар жуфт-жуфти билан ўзаро перпендикуляр бўлса, бундай базис ортонормаланган базис векторлар дейилади. Базисни ташкил этувчи векторлар сони қаралаётган фазонинг ўлчовини билдиради.

Исталган $\vec{a}$ векторни берилган $B = \{\vec{l}_1, \vec{l}_2\}$ базис векторлари бўйича ёйиш мумкин:

$$\vec{a} = a_1 \vec{l}_1 + a_2 \vec{l}_2,$$

бу ёйилмадаги a_1, a_2 сонлар $\vec{a}$ векторнинг $B = \{\vec{l}_1, \vec{l}_2\}$ базисга нисбатан аффин координаталари ёки

базисдаги компонентлари дейилади. Худди шунга ўхшаш $B = \{\vec{l}_1, \vec{l}_2, \vec{l}_3\}$ базис берилган бўлса, ихтиёрий $\vec{a}$ векторни шу базис бўйича ёйиш мумкин:

$$\vec{a} = a_1 \vec{l}_1 + a_2 \vec{l}_2 + a_3 \vec{l}_3, \quad (3.5)$$

бу ерда $\vec{a}$ векторнинг a_1, a_2, a_3 компонентлари куйидаги геометрик маънога эга: O учдан чикувчи ва қиррали $a_1, \vec{l}_1, a_2 \vec{l}_2, a_3 \vec{l}_3$ векторлардан иборат параллелепипедни қараймиз. $\vec{a}$ вектор бу параллелепипеднинг O учидан чикувчи диагонали бўлиши равшан. Бу ҳолда (3.5) формулани куйидагича ҳам ёзилади:

$$\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}.$$

Агар векторларни бошқа векторларнинг чизиқли комбинацияси билан ифодалаш мумкин бўлса, берилган вектор шу векторлар бўйича ёйилган дейилади. Масалан,

$$\vec{a} = 2\vec{a}_1 + 3\vec{a}_2 - 4\vec{a}_3 + \frac{1}{2}\vec{a}_4 \text{ вектор } \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4 \text{ векторларнинг}$$

чизиқли комбинациясини ифодалайди ва $\vec{a}$ вектор $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ векторлар бўйича ёйилган дейилади.

1- м и с о л. K ва L нуқталар $ABCD$ параллелограмм томонларининг ўрталари бўлсин (20- чизма), $\vec{BC}$ векторни $\vec{m} = \vec{AK}$ ва $\vec{n} = \vec{AL}$ векторлар бўйича ёйинг.

Е ч и ш: $\triangle ABK$ дан $\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{m}$ (A). $\triangle ALD$ дан: $\vec{AD} + \vec{DL} = \vec{n}$. Чизмадан $\vec{AD} = \vec{BC}$; $\vec{DL} = \frac{1}{2}\vec{DC} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ га эга бўламиз. У ҳолда

$$\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{n} \quad (B)$$

(A) дан:


$$\vec{AB} = \vec{m} - \frac{1}{2}\vec{BC} \quad (C)$$

(C), (B) лардан:


$$\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{m} - \frac{1}{4}\vec{BC} = \vec{n}$$

ёки

$$\vec{BC} = \frac{4}{3}\vec{n} - \frac{2}{3}\vec{m}.$$



20- чизма



21- чизма

6- §. Векторнинг йўналтирувчи косинуслари

Фазода бирор вектор координата ўқлари билан мос равишда α , β , γ бурчаклар ташкил этган бўлсин (21- чизма). Бу бурчакларнинг $\cos\alpha$; $\cos\beta$, $\cos\gamma$ косинуслари $\vec{a}$ векторнинг йўналтирувчи косинуслари деб аталади.

$$\vec{a} = a_1\vec{l}_1 + a_2\vec{l}_2 + a_3\vec{l}_3 \quad (3.6)$$

вектор берилган бўлсин, бунда $\vec{l}_1$, $\vec{l}_2$, $\vec{l}_3$ ортонормаланган бирлик векторлар a_1 , a_2 , a_3 сонлар мос равишда $\vec{a}$ векторнинг Ox , Oy на Oz ўқлардаги проекцияси бўлиб (3.3) формулага асосан:

$$a_1 = a_x = \text{Pr}_{Ox}\vec{a} = |\vec{a}|\cos\alpha,$$

$$a_2 = a_y = \text{Pr}_{Oy}\vec{a} = |\vec{a}|\cos\beta,$$

$$a_3 = a_z = \text{Pr}_{Oz}\vec{a} = |\vec{a}|\cos\gamma.$$

Бу ифодалардан фойдаланиб йўналтирувчи косинусларни топамиз:

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}; \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}; \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}.$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \text{ бўлгани учун:}$$

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}; \cos\beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}; \quad (3.7)$$

$$\cos\gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

(3.7) тенгликларнинг ҳар бирини квадратга кўтариб ва уларни қўшиб векторнинг йўналтирувчи косинуслари орасидаги ушбу боғланишга эга бўламиз:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1,$$

яъни исталган векторнинг йўналтирувчи косинуслари квадратларининг йигиндиси бирга тенг.

Мисол. Агар $A(3; 2; 1)$ ва $B(5; 4; 2)$ бўлса, $\overline{AB}$ векторнинг координата ўқлари билан ташкил этган бурчакларининг косинусларини топинг.

Ечиш: $\overline{AB}$ векторнинг Ox , Oy , Oz ўқлардаги проекцияларини топамиз:

$$\text{Pr}_{Ox}\overline{AB} = 5 - 3 = 2; \text{Pr}_{Oy}\overline{AB} = 4 - 2 = 2;$$

$$\text{Pr}_{Oz}\overline{AB} = 2 - 1 = 1.$$

$\overline{AB}$ векторнинг модулини топамиз:

$$|\overline{AB}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = \sqrt{9} = 3.$$

(3.7) муносабатлардан векторнинг йўналтирувчи косинусларини топамиз: $\cos\alpha = \frac{2}{3}$; $\cos\beta = \frac{2}{3}$; $\cos\gamma = \frac{1}{3}$.

7-§. Икки векторнинг коллинеарлик шarti

Узаро коллинеар $\vec{a} = a_x\vec{i}_1 + a_y\vec{i}_2 + a_z\vec{i}_3$ ва $\vec{b} = b_x\vec{i}_1 + b_y\vec{i}_2 + b_z\vec{i}_3$ векторлар берилган бўлсин, демак, улар орасида $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ (бунда λ — бирор сон) муносабат ўринли бўлади. Векторни сонга кўпайтирилганда унинг ўқлардаги проекциялари ҳам мос равишда шу сонга кўпайтирилганлиги учун қуйидаги тенгликларни ёзамиз:

$$a_x = \lambda b_x; a_y = \lambda b_y; a_z = \lambda b_z. \quad (3.8)$$

(3.8) тенглик $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг коллинеарлик шартидир. (3.8) тенгликдан

$$\frac{a_x}{b_x} = \lambda; \frac{a_y}{b_y} = \lambda; \frac{a_z}{b_z} = \lambda$$

тенгликларни ҳосил қиламиз. Бундан:

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}. \quad (3.9)$$

(3.9) формула иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар бўлиши учун уларнинг координата ўқлардаги проекциялари пропорционал бўлиши зарур ва етарли бўлишини билдиради.

Мисол. α ва β ларнинг қандай қийматларида $\vec{a} = 2\vec{l}_1 + \alpha\vec{l}_2 + \vec{l}_3$ ва $\vec{b} = 3\vec{l}_1 - 6\vec{l}_2 + \beta\vec{l}_3$ векторлар коллинсар бўлади?

Ечиш. (3.9) формуладан фойдаланамиз:

$$\frac{2}{3} = \frac{\alpha}{-6} = \frac{1}{\beta}.$$

Бундан:

$$\frac{2}{3} = \frac{\alpha}{-6} \Rightarrow \alpha = -4,$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{3}{2}.$$

Жавоб: $\alpha = -4$; $\beta = \frac{3}{2}$.

8-§. Координаталари билан берилган векторлар устида амаллар

$\vec{a}$, $\vec{b}$ векторлар берилган $B = \{\vec{l}_1, \vec{l}_2, \vec{l}_3\}$ базис векторлари бўйича қуйидаги координаталарга эга бўлсин:

$$\vec{a} = \{a_1; a_2; a_3\} = a_1\vec{l}_1 + a_2\vec{l}_2 + a_3\vec{l}_3;$$

$$\vec{b} = \{b_1; b_2; b_3\} = b_1\vec{l}_1 + b_2\vec{l}_2 + b_3\vec{l}_3.$$

1. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларни қўшишда уларнинг мос координаталари қўшилади. Ҳақиқатан ҳам, $\vec{c} = \{c_1; c_2; c_3\}$.

$$\begin{aligned} \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} &= (a_1\vec{l}_1 + a_2\vec{l}_2 + a_3\vec{l}_3) + (b_1\vec{l}_1 + b_2\vec{l}_2 + b_3\vec{l}_3) = \\ &= (a_1 + b_1)\vec{l}_1 + (a_2 + b_2)\vec{l}_2 + (a_3 + b_3)\vec{l}_3 = \\ &= \{a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3\}. \end{aligned}$$

Демак, $c_1 = a_1 + b_1$; $c_2 = a_2 + b_2$; $c_3 = a_3 + b_3$.

2. $\vec{a}$ вектордан $\vec{b}$ векторни айиришда ҳам векторларнинг мос координаталари айрилади, яъни

$$\begin{aligned} \vec{a} - \vec{b} &= (a_1\vec{l}_1 + a_2\vec{l}_2 + a_3\vec{l}_3) - (b_1\vec{l}_1 + b_2\vec{l}_2 + b_3\vec{l}_3) = \\ &= (a_1 - b_1)\vec{l}_1 + (a_2 - b_2)\vec{l}_2 + (a_3 - b_3)\vec{l}_3 = \\ &= \{a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3\}. \end{aligned}$$

3. Векторни сонга кўпайтиришда унинг барча координаталари шу сонга кўпайтирилади, яъни

$$\begin{aligned} \lambda\vec{a} &= \lambda(a_1\vec{l}_1 + a_2\vec{l}_2 + a_3\vec{l}_3) = \\ &= (\lambda a_1)\vec{l}_1 + (\lambda a_2)\vec{l}_2 + (\lambda a_3)\vec{l}_3 = \\ &= \{\lambda a_1; \lambda a_2; \lambda a_3\}. \end{aligned}$$

Юқорида айтилганлар ихтиёрий сондаги векторлар учун ҳам ўз кучини сақлайди.

Мисол. $\vec{a} = \{2; -1; 3\}$; $\vec{b} = \{2; -1; -3\}$ ва $\vec{c} = \{0; 2; 1\}$ векторлар берилган. а) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$; б) $\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$; в) $5\vec{a}$ векторларнинг координаталарини аниқланг.

Ечиш. а) $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = \{2 - 2 + 0; -1 - (-1) + 2; 3 - (-3) + 1\} = \{0; 2; 7\}$;

$$\begin{aligned} \text{б) } \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} &= \\ &= \left\{ 2 + (-1) \cdot \frac{1}{2}; -1 + \frac{1}{2}(-1); 3 + \frac{1}{2}(-3) \right\} = \\ &= \left\{ \frac{3}{2}; -\frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right\}. \end{aligned}$$

$$\text{в) } 5\vec{a} = \{2 \cdot 5; 5 \cdot (-1); 3 \cdot 5\} = \{10; -5; 15\}.$$


9-§. Векторларнинг скаляр кўпайтмаси ва унинг хоссалари

Векторлар билан бажариладиган содда амалларни (кўшиш, айириш ва сонга кўпайтириш) ва бу амаллар натижасида яна векторлар келиб чиқишини кўрдик. Энди векторлар билан бажарилган амал натижасида скаляр (сон) ҳосил бўлишини кўриб чиқамиз.


Таъриф. Нолга тенг бўлмаган иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг скаляр кўпайтмаси деб кўпайтирилувчи векторлар модулларининг бу векторлар орасидаги φ бурчак косинусига кўпайтмасига тенг сонга айтилади (22-чизма). Скаляр кўпайтма $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ёки $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ шаклда ёзилади. Демак, таърифга кўра:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi. \quad (3.10)$$


Векторлар скаляр кўпайтмасининг физик маъносини тушунтирамиз. M моддий нукта A нуктадан B нуктага томон тўғри чизик бўйлаб ҳаракатланаётган ва l га тенг йўлни босиб ўтган бўлсин. Бунда M моддий нуктага $\vec{F}$ куч таъсир этаётган бўлсин. Бу кучнинг катталиги ва йўналиши ўзгармас бўлиб, бу вектор нуктанинг кўчиш йўналиши билан φ бурчак ташкил қилсин (23-чизма).



22-чизма



23-чизма



24-чизма

Физикадан маълумки, $\vec{F}$ куч таъсирида M моддий нукта A нуктадан B нуктага кўчишида бажариладиган A иши $A = F l \cos \varphi$ формула билан аниқланади. Агар кўчиш вектори $\vec{AB} = \vec{l}$ вектор бўлса, у ҳолда $\vec{F}$ ва $\vec{l}$ векторларнинг скаляр кўпайтмаси таърифга кўра:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{l} = F l \cos \varphi$$

бўлади. Демак, моддий нуктанинг тўғри чизиқли ҳаракатидаги ўзгармас кучнинг бажарган иши куч векторининг кўчиш векторига скаляр кўпайтмасига тенг экан.

Скаляр кўпайтма таърифидаги (3.10) формула $|\vec{b}| \cos \varphi$ кўпайтма $\vec{b}$ векторнинг $\vec{a}$ вектор билан аниқландиган ўққа проекцияси ($\text{Пр}_a \vec{b}$ билан белгиланади), $|\vec{a}| \cos \varphi$ эса $\vec{a}$ векторнинг $\vec{b}$ вектор ўқиға проекцияси бўлгани учун (24- чизма):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

ёки

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{Пр}_a \vec{b} = |\vec{b}| \text{Пр}_b \vec{a} \quad (3.11)$$

тенгликни ҳосил қиламиз.

Демак, икки векторнинг скаляр кўпайтмаси бу векторлардан бирининг модулини иккинчи векторнинг бу векторға проекциясига кўпайтмасига тенг экан.

(3.11) формуладан бир векторнинг иккинчи вектордаги проекциясини ҳисоблаш формуласига эга бўламиз:

$$\text{Пр}_a \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}; \quad \text{Пр}_b \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}. \quad (3.12)$$

Скаляр кўпайтманинг хоссаларини кўриб чиқамиз.

1. Икки векторнинг скаляр кўпайтмаси ўрин алмаштириш хоссасига эга:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

2. Исталган икки векторнинг скаляр кўпайтмаси скаляр кўпайтувчига нисбатан гуруҳлаш хоссасига эга:

$$\lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}).$$

3. Икки векторнинг скаляр кўпайтмаси таксимот хоссасига эга: $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$.

4. Агар икки векторнинг скаляр кўпайтмаси нолға тенг бўлса, у ҳолда кўпайтирилувчи векторлардан бири нолға тенг бўлади ёки улар орасидаги бурчак косинуси нолға тенг бўлади (бу ҳолда бу векторлар ўзаро перпендикуляр бўлади).

5. Векторнинг ўз-ўзига скаляр кўпайтмаси шу вектор узунлигининг квадратига тенг:

$$(\vec{a} \cdot \vec{a}) = |\vec{a}|^2.$$

6. $\vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3$ — Декарт координаталар системасининг координата ўқларидаги бирлик векторлари (ортлари) бўлсин. У ҳолда юқоридаги хоссалардан ушбу тенгликлар келиб чиқади: $(\vec{i}_1 \cdot \vec{i}_1) = |\vec{i}_1|^2 = 1$; $(\vec{i}_2 \cdot \vec{i}_2) = |\vec{i}_2|^2 = 1$; $(\vec{i}_3 \cdot \vec{i}_3) = |\vec{i}_3|^2 = 1$; $(\vec{i}_1 \cdot \vec{i}_2) = (\vec{i}_1 \cdot \vec{i}_3) = (\vec{i}_2 \cdot \vec{i}_3) = 0$.

1-мисол. Агар $|\vec{a}| = \sqrt{2}$; $|\vec{b}| = 3$; $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак $\varphi = 45^\circ$ га тенг бўлса, $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ векторнинг узунлигини ҳисобланг.

Еч и ш. 5- хоссадан фойдаланамиз, яъни $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ векторнинг ҳар икки томонини квадратга кўтарамиз:

$$|\vec{c}|^2 = (2\vec{a} + 3\vec{b})^2 = 4|\vec{a}|^2 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 9|\vec{b}|^2.$$

Берилганларга кўра: $|\vec{a}|^2 = 2$; $|\vec{b}|^2 = 9$;

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi = \sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3.$$

Демак, $|\vec{c}|^2 = 4 \cdot 2 + 12 \cdot 3 + 9 \cdot 9 = 125$ ёки

$$|\vec{c}| = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}.$$

Энди координаталари билан берилган векторларнинг скаляр кўпайтмасини ҳисоблашни кўрамиз. Ортонормаланган $B = \{\vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ базисда $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ ва $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ векторлар координаталари билан берилган бўлсин. У ҳолда $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар учун

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}; \\ \vec{b} &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}\end{aligned}$$

ёйилмаларга эга бўламиз. Скаляр кўпайтманинг хоссаларидан фойдаланиб $\vec{a}$ векторни $\vec{b}$ га скаляр кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = a_x b_x \vec{i} \cdot \vec{i} + \\ &+ a_x b_y \vec{i} \cdot \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \cdot \vec{k} + a_y b_x \vec{j} \cdot \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \cdot \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \cdot \vec{k} + \\ &+ a_z b_x \vec{k} \cdot \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \cdot \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \cdot \vec{k}.\end{aligned}$$

6-хоссага кўра: $|\vec{i}|^2 = 1$; $|\vec{j}|^2 = 1$; $|\vec{k}|^2 = 1$; $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{i} = \vec{k} \cdot \vec{j} = 0$. У ҳолда икки векторнинг скаляр кўпайтмаси учун

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (3.13)$$

формулага эга бўламиз.

Демак, координаталари билан берилган икки векторнинг скаляр кўпайтмасы бу векторлар мос координаталари кўпайтмаларининг йигиндисига тенг.

4-хоссада $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар перпендикуляр бўлиши учун $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ бўлиши кўрсатилган эди. У ҳолда (3.13) формулага асосан икки векторнинг перпендикулярлик шарты куйидагича ёзилади:

$$a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0. \quad (3.14)$$

Демак, икки вектор ўзаро перпендикуляр бўлиши учун уларнинг бир исмли проекцияларининг жуфт-жуфт кўпайтмалари йигиндисы нолга тенг бўлиши зарур ва етарлидир.

Векторларнинг скаляр кўпайтмасы формуласи

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi \text{ дан} \\ \cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad (3.15)$$

тенгликни топамиз. (3.15) формулани куйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$\cos \varphi = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \quad (3.16)$$

(3.15) ва (3.16) формулалар икки вектор орасидаги бурчак косинусини топиш формуласи дейилади.

2-мисол. Агар $|\vec{a}| = 7\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$ ва $\varphi = 45^\circ$ бўлса, $3\vec{a} + \alpha\vec{b}$ ва $\vec{a} - 2\vec{b}$ векторлар α нинг қандай қийматларида ўзаро перпендикуляр бўлади?

Е ч и ш. Берилган векторларнинг скаляр кўпайтмасыни топамиз:

$$\begin{aligned} (3\vec{a} + \alpha\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) &= 3\vec{a}\vec{a} - 6\vec{a}\vec{b} + \alpha\vec{a}\vec{b} - 2\alpha|\vec{b}|^2 = \\ &= 3|\vec{a}|^2 - 6|\vec{a}||\vec{b}|\cos 45^\circ + \alpha|\vec{a}||\vec{b}|\cos 45^\circ - 2\alpha|\vec{b}|^2 = \\ &= 3 \cdot 49 \cdot 2 - 6 \cdot 7\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \alpha \cdot 7 \cdot \sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\alpha \cdot 16 = \\ &= 294 - 168 + 28\alpha - 32\alpha = 126 - 4\alpha. \end{aligned}$$

Икки вектор перпендикуляр бўлиши учун уларнинг скаляр кўпайтмасы нолга тенг бўлиши шартдан топамиз:

$$126 - 4\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 31,5.$$

3-мисол. $\vec{a} = \{0; 7; 1\}$ ва $\vec{b} = \{0; 3; 4\}$ векторлар орасидаги бурчакни топинг.

Е ч и ш. (3.16) формулага асосан:

$$\cos \varphi = \frac{0 \cdot 0 + 7 \cdot 3 + 4 \cdot 1}{\sqrt{7^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{25}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} = 45^\circ.$$

М А Ш Қ Л А Р

1. Куйидаги векторларнинг модулини ҳисобланг:

а) $\vec{a} = \{-2; 3; 6\}$

б) $\vec{b} = \{4; 2; 1\}$

в) $\vec{c} = \{5; 0; 7\}$

г) $\vec{d} = \{0; 6; 5\}$

2. $A(3; 2; 1)$ ва $B(4; 3; 5)$ нукталар берилган. $\vec{AB}$ ва $\vec{BA}$ векторларнинг координаталарини топинг.

3. Охири $(1; -1; 2)$ нуктада бўлган $\vec{a} = \{2; -3; -1\}$ вектор бошининг координаталарини аниқланг.

4. Моддий нуктага иккита $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ куч таъсир қилади. Агар $|\vec{F}_1| = 10H$, $|\vec{F}_2| = 6H$ бўлиб, $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ векторлар орасидаги бурчак 90° бўлса, уларнинг тенг таъсир этувчисини топинг.

5. $ABCD$ тетраэдр берилган: а) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD}$;

б) $\vec{AC} + \vec{CD} + \vec{AB}$

ййгиндиларни топинг.

6. ABC учбурчакда $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AC} = \vec{b}$ ва $\vec{AD} = \vec{c}$ медиана бўлса, $\vec{c}$ векторни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар бўйича, $\vec{b}$ векторни $\vec{a}$ ва $\vec{c}$ векторлар бўйича ёйинг.

7. Узунлиги $|\vec{a}| = \sqrt{5}$ бўлган $\vec{a}$ вектор l ўқ билан 45° ли бурчак ташкил этади. Бу векторнинг l ўқдаги проекциясини топинг.

8. $\vec{a} = \{3; -2; 1\}$, $\vec{b} = \{-1; 1; -2\}$, $\vec{c} = \{2; 1; -3\}$ векторлар берилган. $\vec{d} = \{11; -6; 5\}$ векторнинг $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ базислар бўйича ёйилмасини топинг.

9. $ABCD$ тўғри тўртбурчакда $\vec{DB} = \vec{a}$ ва $\vec{AC} = \vec{b}$ диагоналар ўтказилган. $\vec{BD}$, $\vec{BC}$, $\vec{CB}$ векторларни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг чизикли комбинацияси кўринишда ифодаланг.

10. $\vec{a}$ векторнинг модули $|\vec{a}| = 2$ ва координата ўқлари билан $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ бурчак ташкил этиши маълум бўлса, $\vec{a}$ векторнинг бу ўқлардаги проекциясини топинг.

11. $\vec{a} = \{12; -15; -16\}$ векторнинг йўналтирувчи косинусларини ҳисобланг.

12. Вектор координата ўқлари билан қуйидагича бурчаклар ташкил этиши мумкинми:

1) $\alpha=60^\circ$; $\beta=45^\circ$; $\gamma=120^\circ$;

2) $\alpha=45^\circ$; $\beta=60^\circ$; $\gamma=135^\circ$;

3) $\alpha=90^\circ$; $\beta=60^\circ$; $\gamma=150^\circ$?

13. Агар $|\vec{a}|=3$ ва $\alpha=60^\circ$; $\beta=45^\circ$ бўлса, $\vec{a}$ векторнинг координаталарини аниқланг.

14. Агар $\vec{a}=\{4; -7; 3\}$ ва $\vec{b}=\{-5; 9; \frac{1}{2}\}$ бўлса, $\vec{c}=3\vec{a}+2\vec{b}$ векторнинг координаталарини топинг.

15. Агар $|\vec{a}|=\sqrt{2}$; $|\vec{b}|=3$ ва $(\vec{a} \wedge \vec{b})=45^\circ$ бўлса, $\vec{c}=2\vec{a}+3\vec{b}$ векторнинг модулини ҳисобланг.

16. Агар $|\vec{a}|=7\sqrt{2}$; $|\vec{b}|=4$ ва $(\vec{a} \wedge \vec{b})=60^\circ$ бўлса, $3\vec{a}+\alpha\vec{b}$ ва $\vec{a}-2\vec{b}$ векторлар α нинг қандай қийматларида ўзаро перпендикуляр бўлади?

17. Қуйидаги векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг:

1) $\vec{a}=\{-2; 5\}$ ва $\vec{b}=\{3; -5\}$;

2) $A(-2; 3)$; $B(3; 5)$ ва $C(4; -2)$ бўлса, $(\vec{AB} \cdot \vec{BC})$.

18. Агар $\vec{a}=\{-2; 3\}$; $\vec{b}=\{3; 5\}$; $\vec{c}=\{-2; 8\}$; $\vec{d}=\{3; 1\}$ бўлса, қуйидагиларни ҳисобланг: а) $\vec{a} \cdot \vec{b}$; б) $\vec{a}^2$; в) $\sqrt{\vec{b}^2}$; г) $(\vec{a} + \vec{c})^2$; д) $(2\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - 2\vec{b})$; е) $(2\vec{a} + 3\vec{c})(\vec{b} - 2\vec{c})$.

19. Учлари $A(1; 2; 1)$, $B(3; -1; 7)$, $C(7; 4; -2)$ нукталарда бўлган учбурчакнинг ички бурчакларини топинг.

20. x вектор $\vec{a}=\{6; -8; -7,5\}$ векторга коллинеар ва Oz ўқи билан ўтмас бурчак ташкил этади. Агар $|\vec{x}|=50$ бўлса, $\vec{x}$ векторнинг координаталарини топинг.

IV БОБ

ТЕКИСЛИКДА ВА ФАЗОДА КООРДИНАТАЛАР СИСТЕМАСИ

1-§. Текисликда координаталар системаси

Текисликда бирор O нуктада кесишувчи ўзаро перпендикуляр иккита ўқни оламиз. Бу ўқларнинг ҳар бирида O нуктадан бошлаб бирлик векторларни ажратамиз (25-чизма). Мусбат йўналишлари мос равишда $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторлар билан аниқланувчи иккита ўқдан ташкил топган система текисликда тўғри бурчакли координаталар системаси дейила-

ди ва $R=\{0; \vec{i}, \vec{j}\}$ кўринишда белгиланади. O нукта координаталар боши, $\vec{i}, \vec{j}$ бирлик векторлар эса координата векторлари дейилади. $\vec{i}, \vec{j}$ векторлар ортогонал ва бирлик векторлардир, яъни


$$|\vec{i}|=|\vec{j}|=1; \vec{i} \perp \vec{j}.$$

Ox, Oy ўқлар мос равишда абсциссалар ва ординаталар ўқлари деб аталади.


Текисликда $R=\{0; \vec{i}, \vec{j}\}$ координаталар системаси берилган бўлсин. Шу текисликнинг A нуктаси учун $\vec{OA}$ вектор A нуктанинг радиус-вектори дейилади ва қуйидагича ёзилади (25-чизма):

$$\vec{r} = \vec{OA} = x\vec{i} + y\vec{j}. \quad (4.1)$$

(4.1) даги x, y лар A нуктанинг $R=\{0; \vec{i}, \vec{j}\}$ системадаги координаталари дейилади ва бу $A(x; y)$ кўринишда белгиланади. Бу ерда x сон A нуктанинг абсциссаси, y сон ординатаси дейилади. $R=\{0; \vec{i}, \vec{j}\}$ координаталар системасида бирор $\vec{a} = \vec{AB}$ вектор берилган бўлса (26-чизма), унинг координата ўқларидаги проекциялари a_x ва a_y бу векторнинг координаталари дейилади.



25-чизма



26-чизма

Масалан, агар a векторнинг координаталарини a_x, a_y билан белгиласак, a_x a векторнинг Ox ўқидаги проекцияси бўлиб,

$$a_x = \text{Pr}_{Ox} \vec{a} = |\vec{a}| \cos(\vec{a} \wedge \vec{i})$$

формула бўйича, a_y эса a векторнинг Oy ўқидаги проекцияси бўлиб,

$$a_y = \text{Pr}_{Oy} \vec{a} = |\vec{a}| \cos(\vec{a} \wedge \vec{j})$$

формула бўйича аниқланади. $\vec{a}$ векторни Ox ва Oy ўқлари, яъни $\vec{i}$, $\vec{j}$ базис векторлар бўйича ёямиз. 26- чизмага асосан:

$$\overrightarrow{AC} = a_x \vec{i}; \quad \overrightarrow{CB} = a_y \vec{j}.$$

У ҳолда

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = \{a_x; a_y\} \quad (4.2)$$

$\{a_x; a_y\}$ миқдорлар жуфтлиги $\vec{a}$ векторнинг $\vec{i}$, $\vec{j}$ базислар бўйича ёйилмалари дейилади. (4.2) тенглик ёрдамида базис текисликдаги ҳар қандай векторни иккита ўзаро перпендикуляр векторларга ёйиш мумкин.

Энди $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ вектор-

нинг бош ва охири нуқталари (A ва B) нинг координаталари $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}\}$ координаталар системасида маълум бўлса, у ҳолда $\vec{a}$ векторнинг координаталарини топиш мумкин. $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ нуқталар берилган бўлсин (27- чизма). У ҳолда $\vec{a}$ векторнинг Ox ўқидаги проекцияси A_1B_1 кесмадан иборат бўлиб, унинг узунлиги $x_2 - x_1$ га, Oy ўқидаги проекцияси эса A_2B_2 кесмадан иборат бўлиб, унинг узунлиги $y_2 - y_1$ га тенгдир.


$\overrightarrow{A_1B_1} = (x_2 - x_1)\vec{i}$; $\overrightarrow{A_2B_2} = (y_2 - y_1)\vec{j}$ ва $\vec{a} = \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_2B_2}$ га тенг бўлгани учун

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}. \quad (4.3)$$

Демак, $\vec{a}$ векторнинг координата ўқларидаги проекциялари мос равишда $\{(x_2 - x_1); (y_2 - y_1)\}$ бўлиб, унинг қийматлари шу вектор охири ва бошининг тегишли координаталар айирмасига тенг.

Агар $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ векторнинг A ва B нуқталари координаталари $A(x_1; y_1)$ ва $B(x_2; y_2)$ берилган бўлса, у ҳолда A ва B нуқталар орасидаги масофа ($\vec{a}$ векторнинг узунлиги, модули) ни ушбу формула бўйича топиш мумкин:

$$|\vec{a}| = \rho(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (4.4)$$



27- чизма

1-мисол. Агар $A(2; 3)$, $B(3; 2)$ бўлса, $\overline{AB}$ векторнинг координаталарини топинг.

Ечиш. Шартга кўра: $x_1=2$, $x_2=3$, $y_1=3$, $y_2=2$. $\overline{AB}$ векторнинг $\vec{i}$, $\vec{j}$ базис векторлар бўйича ёйилмаси (4.3) формула орқали топилади:

$$\overline{AB} = \{3-2; 2-3\} = \{1; -1\} = \vec{i} - \vec{j}$$

2-мисол. Берилган $A(4;3)$ нуктадан 5 бирлик масофада Oy ўқида ётган $B(x; y)$ нуктани топинг.

Ечиш. Масала шартига кўра B нукта Oy ўқида ётади. Oy ўқида ётган ҳар бир нуктанинг абсциссаси нолга тенг бўлганлигидан B нукта $(0; y)$ координаталарга эга бўлади. A ва B нукталар орасидаги масофа 5 га тенг бўлгани учун (4.4) формулага асосан:

$$5 = \sqrt{(0-4)^2 + (y-3)^2}$$

тенгламани оламиз. Бу тенгламани

$$25 = 16 + y^2 - 6y + 9$$


кўринишда ёзсак, $y^2 - 6y = 0 \Rightarrow y(y-6) = 0$ ни ҳосил қиламиз. Бундан $y_1=0$; $y_2=6$ топилади. Демак, $A(4; 3)$ нуктадан узоқлиги 5 га тенг бўлиб, Oy ўқида ётувчи нукта иккита бўлиб, улар $B_1(0; 0)$ ва $B_2(0; 6)$.

2-§. Фазода координаталар системаси

Фазода O нукта ва бу нуктада кесишувчи ўзаро перпендикуляр учта Ox , Oy , Oz ўқларни оламиз. Бу ўқларнинг ҳар бир жуфти орқали текислик ўтказамиз. Уларни мос равишда xOy , xOz , yOz деб белгилаймиз (28-а чизма). Бу текисликлар координата текисликлари дейилади.

O нукта ҳар қайси координата ўқини иккига ажратади. Улардан бирини мусбат, иккинчисини манфий деб оламиз. Бу усул билан ҳосил қилинган $Oxyz$ системага фазода тўғри бурчакли (декарт) координаталар системаси дейилади. Одатда Ox , Oy , Oz координата ўқларининг бирлик векторларини мос равишда $\vec{i}$, $\vec{j}$ ва $\vec{k}$ (ёки $\vec{l}_1$, $\vec{l}_2$, $\vec{l}_3$) лар орқали белгиланади. Фазода тўғри бурчакли координаталар системаси символик кўринишда $R = \{0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ ёки $R = \{0, \vec{l}_1, \vec{l}_2, \vec{l}_3\}$ каби белгиланади.

Фазодаги векторнинг координаталари деб унинг координата ўқларидаги проекцияларига айтилади. Масалан, бирор a вектор ўзининг a_x , a_y , a_z координаталари



28- чизма

билан тўғри бурчакли координаталар системасида, яъни $B = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ базис векторларда берилган бўлсин. У ҳолда $\vec{a}$ вектор қуйидагича ёзилади:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} = \{a_x; a_y; a_z\}. \quad (4.5)$$

(4.5) тенглик фазодаги ҳар қандай векторни ўзаро перпендикуляр учта векторга ёйиб ёзиш мумкинлигини билдиради. Умуман фазодаги ҳар қандай векторни учта ўзаро компланар бўлмаган (яъни бир текисликда ётмаган) векторларга ёйиш мумкин.

1- мисол. $\vec{a} = \{4; -6; 2\}$ вектор берилган. Унга коллинеар бўлган $\vec{b} = \{b_x; b_y; 4\}$ векторнинг номаълум координаталарини аниқланг.

Е чи ш. Икки векторнинг коллинеарлик шартига асосан $\vec{b} = \lambda \vec{a} = \lambda(4\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k})$ тенгликни ёзиб оламиз. Векторларнинг тенглигидан $2\lambda = 4$ ни оламиз ва бундан $\lambda = 2$. Бў қийматни ўрнига қўйсак: $\vec{b} = 2(4\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}) = 8\vec{i} - 12\vec{j} + 4\vec{k} = \{8; -12; 4\}$ келиб чиқади.

Фазода A нуктанинг координаталарини қараймиз. $Oxyz$ декарт координаталар системасида ихтиёрий нукта учун $\vec{OA}$ векторнинг координаталарини шу A нуктанинг координаталари деб қараш мумкин.

Одатда A нуктанинг координаталари $A(x_A, y_A, z_A)$ кўринишда ёзилади.

A ва B нукталарнинг координаталари маълум бўлганда $\vec{AB}$ векторнинг координаталари қуйидагича топилади (28- б чизма):

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} = x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k} - x_A \vec{i} - y_A \vec{j} - z_A \vec{k} = \\ &= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}. \end{aligned}$$

Демак, $\overline{AB}$ векторнинг координаталари унинг охири ва бошини билдирувчи нукталарнинг мос координаталари айирмасига тенг:

$$\overline{AB} = \{x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A\} \quad (4.6)$$

A ва B нукталар орасидаги масофа $\overline{AB}$ вектор узунлигига тенг ва у қуйидаги формула билан аниқланади:

$$d = \rho(AB) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}. \quad (4.7)$$

2- мисол. Агар $A(1; 3; 4)$ ва $B(3; 5; 7)$ бўлса, $\overline{AB}$ векторнинг координаталарини топинг.

Ечиш. $\overline{AB} = \{x_{AB}, y_{AB}, z_{AB}\}$ бўлсин. (4.6) формуладан фойдаланамиз:

$$x_{AB} = x_B - x_A = 3 - 1 = 2,$$

$$y_{AB} = y_B - y_A = 5 - 3 = 2,$$

$$z_{AB} = z_B - z_A = 7 - 4 = 3.$$

Демак, $\overline{AB} = \{2; 2; 3\}$.


3- §. Қутб координаталар системаси. Нуктанинг декарт ва қутб координаталари орасидаги боғланиш *

Текисликда бирор O нукта Ol нур ва бу нурда ётувчи $\overline{OA} = \vec{i}$ бирлик векторни оламиз. Агар текисликда олинган Ol нурни Ox ўқ деб олинса ва $\vec{i}$ векторни O нукта атрофида Oy ўқидаги $\vec{j}$ бирлик вектор устига тушириш учун қиска йўл бўйича буриш соат стрелкаси ҳаракатига тескари бўлса, у ҳолда координаталар системаси мусбат ориентацияли, текисликни эса ориентацияланган дейилади.


Ҳосил қилинган геометрик образ қутб координаталар системаси дейилади (29- чизма). У одатда $R = \{0; \vec{i}\}$ кўринишда белгиланади. O нукта қутб боши, Ol нур қутб ўқи дейилади.

* Мазкур темани ёритишда «Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра» (Ф. Ражабов, А. Нурметов, «Ўқитувчи», 1990) китобидан фойдаланилди.

M нуктанинг текисликдаги ҳолати иккита сон: бири $|i|=1$ бирлик кесма ёрдамида ўлчанган $\rho=|OM|$ масофа, иккинчиси OI ва OM нурлар орасидаги $\varphi=(\vec{i}, \vec{OM})$ бурчак билан тўла аниқланади. Агар қутб ўқини $[OM)$ нур устига тушгунга қадар буриш соат стрелкаси йўналишига тескари йўналишда бажарилса, қутб бурчаги деб аталувчи φ бурчак мусбат деб, акс ҳолда, манфий деб ҳисобланади. ρ масофа M нуктанинг қутб радиуси дейилади. Улар умумий ном билан M нуктанинг қутб координаталари дейилади ва $M(\rho, \varphi)$ кўринишда белгиланади. Координаталар боши O нукта учун $\rho=0$ бўлиб, аниқланмаган ҳисобланади. Агар ρ сон $0 \leq \rho \leq \infty$ ва φ бурчак $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ оралиқларда ўзгарса, текисликнинг ҳар бир нуктаси қутб координаталари билан мос келади. Қутб координаталар системасига мусбат йўналтирилган тўғри бурчакли координаталар системаси $R=\{O; \vec{i}; \vec{j}\}$ ни мос қўйиш мумкин. Бунда O нукта (қутб) координаталар боши



29- чизма



30- чизма

бўлиб хизмат қилади. ρ, φ лар M нуктанинг қутб координаталари, x, y лар эса M нуктанинг тўғри бурчакли координаталар системасидаги координаталари бўлсин (30- чизма). Чизмага кўра:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases} \quad (4.8)$$

(4.8) формулалар ёрдамида M нуктанинг қутб координаталари ρ ва φ маълум бўлса, x ва y ларнинг қийматини топиш мумкин.

Агар (4.8) формуладан x ва y нинг қийматлари маълум бўлса, ρ ва φ нинг қийматлари қуйидагича топилади:

$$\begin{cases} x^2 = \rho^2 \cos^2 \varphi \\ y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = \rho^2 \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (4.9)$$

$\rho \neq 0$ деб фарз қилсак:

$$\cos \varphi = \frac{x}{\rho} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \sin \varphi = \frac{y}{\rho} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{ёки } \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}. \quad (4.10)$$

Олинган (4.8), (4.9), (4.10) формулалар декарт ва қутб координаталар системаларини боғловчи формулалардир.

Шуни эслатиб ўтамизки, M нуқтанинг декарт координаталаридан қутб координаталарига ўтишда $\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$ формула қутб бурчагининг бош қийматини

тўла аниқламайди, чунки φ мусбат ёки манфий эканлигини ҳам билиш керак. Бу эса M нуқтанинг қайси чоракда жойлашишига қараб аниқланади. Масалан (4.10) формулада $x=4$, $y=4$ бўлса, $\operatorname{tg} \varphi = 1$ бўлиб, $\varphi = 45^\circ$. Лекин $x=-4$, $y=-4$ бўлганда ҳам $\operatorname{tg} \varphi = 1$ бўлиб, аслида φ эса -225° бўлиши керак, чунки $M(-4; -4)$ нуқта учинчи чоракда жойлашган. Шунинг учун ҳам φ бурчакнинг қиймати ва ишорасини (4.10) формуладаги $\sin \varphi$ ва $\cos \varphi$ га қараб аниқлаш қулайроқ.

Қутб координаталар системасида икки нуқта орасидаги масофа қуйидагича топилади. $M_1(\rho_1, \varphi_1)$ ва $M_2(\rho_2, \varphi_2)$ нуқталар берилган бўлсин. У ҳолда (4.8) формулага кўра:

$$\begin{cases} x_1 = \rho_1 \cos \varphi_1, \\ y_1 = \rho_1 \sin \varphi_1 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} x_2 = \rho_2 \cos \varphi_2, \\ y_2 = \rho_2 \sin \varphi_2 \end{cases}$$

У ҳолда

$$\begin{aligned} d(M_1, M_2) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \\ &= \sqrt{(\rho_2 \cos \varphi_2 - \rho_1 \cos \varphi_1)^2 + (\rho_2 \sin \varphi_2 - \rho_1 \sin \varphi_1)^2} = \\ &= \sqrt{\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1 \rho_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \end{aligned}$$

Демак,

$$d(M_1, M_2) = \sqrt{\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}.$$

Текисликда кутб координаталар системаси берилган бўлсин. Бу системада ρ , φ ёки улардан бирортаси қатнашувчи $f(\rho, \varphi)$ функцияни олайлик. Бу функция текисликда бир қанча эгри чизикларни ифодалашини кўрсатиш мумкин. Масалан, $f(\rho, \varphi) = \rho - 6$ функция билан аниқланган бўлсин. У ҳолда

а) $F_1 = \{M(\rho, \varphi) / \rho - 6\}$ — маркази O кутбда ва радиуси $\rho = 6$ га тенг бўлган айлана;

б) $F_2 = \{M(\rho, \varphi) / \rho - 6 > 0\}$ — маркази O кутбда ва радиуси $\rho = 6$ га тенг бўлган доира ташқарисидаги нукталар тўплами;

в) $F_3 = \{M(\rho, \varphi) / \rho - 6 < 0\}$ — доира ичидаги нукталар тўпламини билдиради ва ҳоказо. $f(\rho, \varphi)$ тенглама F_1 чизикнинг берилган кутб координаталар системасидаги тенгламаси дейилади. Ушбу

$$\rho = a (a - \text{const}) \quad (4.11)$$

тенглама маркази кутбда, радиуси a га тенг бўлган айлананинг тенгламаси бўлади.

Энди кутб айланада ётган ҳолни кўрамиз. Бунда кутб ўқи эса айлана марказидан ўтсин деб фарз қиламиз (31-чизма). Чизмадан куйидагига эга бўламиз:

$$\rho = 2a \cos \varphi \quad (4.12)$$

(4.12) изланаётган айлана тенгламасидир. (4.11) ва (4.12) тенгламалар бир хил радиусли битта айланани ифодалайди, лекин тенгламалари ҳар хил. Биттаси ρ ни ўзида сақласа, иккинчиси эса ρ ва φ ни ҳам ўзида сақлайди.

Демак, айлана кутб координаталар системасига нисбатан жойлашувига кўра ҳар хил кўринишдаги тенгламаларга эга бўлар экан.

1-мисол. Кутб координаталар системасида берилган $A(4; \frac{\pi}{3})$ ва $B(6; -\frac{\pi}{4})$ нукталарнинг декарт координаталар системасидаги координаталарини топинг.

Е ч и ш. а) A нукта учун:

$$A(4; \frac{\pi}{3}); \rho = 4; \varphi = \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

(4.8) формулаларга кўра кутб координаталари ёрдамида берилган нуктанинг декарт координаталари ҳолатини аниқлаймиз:

$$x = 4 \cos 60^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2;$$

$$y = 4 \cdot \sin 60^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

Демак, декарт координаталар системасида: $A(2; 2\sqrt{3})$.

б) $B(6; -\frac{\pi}{4})$ бўлган ҳолда: $\rho = 6; \varphi = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$

.. (4.8) формулаларга кўра тонамиз:

$$x = 6 \cdot \cos(-45^\circ) = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2},$$

$$y = 6 \cdot \sin(-45^\circ) = -6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -3\sqrt{2}.$$


Демак, $B(3\sqrt{2}; -3\sqrt{2})$.

2-мисол. Кутб координаталар системасида берилган $\rho^2 \sin 2\varphi = 2a^2$ чиқиқ тенгламасини декарт координаталар системасида ифодаланг.


Ечиш. $\rho^2 \sin 2\varphi = 2a^2;$

$$2\rho \sin \varphi \cdot \rho \cos \varphi = 2a^2.$$

(4.8) формулага асосан: $x = \rho \cos \varphi; y = \rho \sin \varphi$ бўлгани учун $2xy = 2a^2$ тенгликни оламиз. Бундан эса $xy = a^2$ келиб чиқади.



31- чизма



32- чизма

4-§. Цилиндрик ва сферик координаталар системаси

1. Цилиндрик координаталар системаси қуйидагича киритилади. Фазода бирор Q текислик ва унда бирор O нукта оламиз. Шу O нуктадан чиқувчи ва Q текисликда ётадиган l нур ўтказамиз ва бу нурда унинг

йўналишини аниқловчи $\vec{i}$ бирлик вектор оламиз (яъни Q текисликда кутб координаталар системаси киритилди). Энди шу Q текисликка перпендикуляр ва унинг O нуктасига қўйилган узунлиги бирга тенг $\vec{n}$ нормал векторни оламиз (32-чизма). Агар $\vec{n}$ векторнинг учидан караганда Q текисликдаги шу вектор атрофида буришдаги ҳаракатнинг йўналиши соат стрелкаси ҳаракатига тескари бўлса, буриш бурчаги φ мусбат деб олинади ва натижада Q текисликдаги нукталар ρ масофа ва φ бурчак билан аниқланади. Энди фазодаги ихтиёрий нуктанинг ўрнини аниқлаш учун текисликдаги бу нуктанинг проекцияси ρ ва φ лар билан ҳамда бу нуктадан текисликкача масофани билиш керак бўлади, яъни бу нуктани учта сон билан тулиқ аниқлаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, M нукта фазонинг ихтиёрий нуктаси, M' эса унинг Q текисликдаги проекцияси бўлсин. У ҳолда $\vec{MM'}$ вектор $\vec{n}$ векторга коллинеар бўлади (32-чизма), яъни $\vec{MM'} = h\vec{n}$.

Агар M' нуктанинг Q текисликдаги кутб системасига нисбатан координаталарини ρ , φ десак, у ҳолда сонларнинг тартибланган (ρ, φ, h) учлиги M нуктанинг *цилиндрик координаталари* деб аталади.

Декарт координаталар системасини 32-чизмада кўрсатилгандек қилиб танилаб олинса, M нуктанинг декарт координаталари x, y, z ларни шу нуктанинг цилиндрик координаталари ρ, φ, h лар орқали ифодалаш мумкин:


$$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, z = h. \quad (4.13)$$

2. Сферик координаталар системаси. Цилиндрик координаталар системасини киритганимиздек, O нукта, Q текислик олиб шу текисликда l нур ва Q текисликка перпендикуляр қилиб $\vec{n}$ бирлик вектор қизиб оламиз (33-чизма). M фазонинг ихтиёрий нуктаси, M' эса M нинг Q текисликдаги проекцияси бўлсин. Сонларнинг тартибланган (ρ, φ, θ) учлиги M нуктанинг *сферик координаталари* дейилади, бунда $\rho = |\vec{OM}|$,


φ — $\vec{OM}$ векторнинг Q текисликдаги проекцияси билан Ox ўқ орасидаги бурчак, бу бурчак Ox ўқдан бошлаб соат стрелкаси йўналишига тескари йўналишда ҳисобланади. θ — $\vec{OM}$ вектор билан Q текислик орасидаги бурчак. Шунингдек, $\rho > 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ деб фараз қилмиз, бундан ташқари (xOy) координаталар текислиги-

дан юқорида турган нукталар учун $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ва қуйи ярим фазога тегишли нукталар учун $-\frac{\pi}{2} < \theta \leq 0$ бўлади. Сферик ва декарт координаталарини боғловчи ушбу формулаларни келтириб чиқариш осон (32- чизма):

$$\begin{aligned} x &= |OM'| \cos \varphi = \rho \cos \theta \cos \varphi, \\ y &= |OM'| \sin \varphi = \rho \cos \theta \sin \varphi, \\ z &= |MM'| = \rho \sin \theta. \end{aligned} \quad (4.14)$$



33- чизма



34- чизма

5- §. Декарт координаталарини алмаштириш

Бир қатор геометрик масалаларни ечишда декарт координаталарининг бир системасидан бошқасига ўтишга тўғри келади. Хусусан, битта нуктанинг ҳар хил системалардаги координаталарини боғловчи формулаларни топиш масаласига келамиз. Дастлаб иккита хусусий ҳолни қараймиз.

а) Декарт координаталар системасини параллел қўчириш. Бу ҳолда иккита R ва R' координаталар системалари бир хил координата векторларига ва ҳар хил координаталар бошига эга бўлади:

$$R = \{O; \vec{i}, \vec{j}\}, R' = \{O'; \vec{i}, \vec{j}\}.$$

O' нуктанинг эски системага нисбатан координаталари $(a; b)$ бўлсин (34- чизма). Ихтиёрий M нуктанинг текисликда эски R координаталар системасига нисбатан координаталари $(x; y)$, шу нуктанинг янги R' системага

нисбатан координаталари $(x'; y')$ бўлсин. У ҳолда векторларни қўйиш қондасига кўра (34- чизма):

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M} \quad (4.15)$$

$$\overline{OO'} = a\vec{i} + b\vec{j}, \quad (4.16)$$

$$\overline{OM} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

$$\overline{O'M} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}'.$$

(4.16) ни (4.15) га қўйиб, икки векторнинг тенглик аломатига кўра топамиз:

$$\begin{cases} x = x' + a, \\ y = y' + b. \end{cases} \quad (4.17)$$

(4.17) изланаётган алмаштириш — координаталар системасини параллел кўчириш формуласидир.

Агар қаралаётган M нуқта фазода бўлса, у ҳолда (4.17) формула қуйидагича бўлади:

$$\begin{cases} x = x' + a, \\ y = y' + b, \\ z = z' + c \end{cases} \quad (4.18)$$


Координаталар бошини ўзгартирмасдан координата ўқларини α бурчакка буришда координаталарни алмаштириш. $R = \{0; \vec{i}, \vec{j}\}$ ва $R' = \{0; \vec{i}', \vec{j}'\}$

координаталар системалари умумий бошга эга бўлади. $\vec{i}, \vec{j}$ лар

x ва y ўқларининг ортлари, $\vec{i}', \vec{j}'$ эса x' ва y' ларнинг ортлари, α 0 дан 2π гача ораликдаги бурчак бўлиб, у $\vec{i}$ вектор билан устма-уст тушгунча соат стрелкаси йўналишига тескари йўналишда шу бурчак қадар бурилади. Шунингдек, $\vec{j}$ вектор ҳам α бурчак қадар буриш натижасида $\vec{j}'$ вектор билан устма-уст тушади. Маълумки (35-чизма),

$$\overline{OM} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

$$\overline{OM'} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}'. \quad (A)$$



35- чизма

Янги координата векторларини эски координата векторлари орқали ёзамиз:

$$\begin{aligned}\vec{i}' &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j}, \\ \vec{j}' &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j},\end{aligned}\quad (4.19)$$

Агар R ва R' декарт координаталар системалари бир хил йўналган бўлса, у ҳолда

$$(\vec{i}, \wedge \vec{j}) = 90^\circ + \alpha; (\vec{i}', \wedge \vec{j}) = 90^\circ - \alpha; (\vec{j}, \wedge \vec{j}') = \alpha, \quad (4.20)$$

агар қарама-қарши йўналган бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned}(\vec{i}, \wedge \vec{j}') &= 270^\circ + \alpha; (\vec{i}', \wedge \vec{j}) = \\ &= 90^\circ - \alpha; (\vec{j}, \wedge \vec{j}') = 180^\circ + \alpha\end{aligned}\quad (4.21)$$

бўлади (4.19) тенгликларни навбат билан $\vec{i}$, $\vec{j}$ векторларга скаляр кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned}a_x &= \vec{i}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{i}', \wedge \vec{i}), \quad a_y = \vec{i}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{i}', \wedge \vec{j}), \\ b_x &= \vec{j}' \cdot \vec{i} = \cos(\vec{j}', \wedge \vec{i}), \quad b_y = \vec{j}' \cdot \vec{j} = \cos(\vec{j}', \wedge \vec{j}).\end{aligned}$$

(4.20), (4.21) муносабатларни ҳисобга олсак, R ва R' координаталар системаси бир хил йўналган бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos\alpha; \sin\alpha\}, \quad \vec{j}' = \{-\sin\alpha; \cos\alpha\}$$

кўринишда, агар R ва R' координатлар системаси қарама-қарши йўналган бўлса,

$$\vec{i}' = \{\cos\alpha; -\sin\alpha\}, \quad \vec{j}' = \{-\sin\alpha; \cos\alpha\}$$

кўринишда бўлади. У ҳолда (A) формулалар қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha, \\ y = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha \end{cases} \quad (4.22)$$

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha + y' \sin\alpha, \\ y = x' \sin\alpha - y' \cos\alpha. \end{cases} \quad (4.23)$$

(4.22) ва (4.23) формулаларни бирлаштириб,

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - \varepsilon y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha \end{cases} \quad (4.24)$$

кўринишда ёзиш мумкин, бунда $\varepsilon = \pm 1$ бўлиб, R ва R' лар бир хил йўналган бўлса, $\varepsilon = +1$, қарама-қарши йўналган бўлса, $\varepsilon = -1$ бўлади.

Умумий ҳолда, координаталар бошлари ҳам, ордината векторлари ҳам ҳар хил йўналишда жойлашган бўлса, ихтиёрий M нуктанинг эски системага нисбатан координаталари $(x; y)$ бўлса, u ҳолда (4.17) ва (4.24) тенгламалардан қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - \varepsilon y' \sin \alpha + a, \\ y = x' \sin \alpha + \varepsilon y' \cos \alpha + b. \end{cases} \quad (4.25)$$

1-мисол. Фазода $M(2; 3; 4)$ нукта берилган. Агар ўқларни параллел кўчиришда янги координаталар боши эски системада $(-1; 1; 2)$ координаталарга эга бўлса, шу M нуктанинг янги системадаги координаталарини топинг.

Е ч и ш. (4.18) формулаларга кўра:

$$\begin{cases} x = x' + a, \\ y = y' + b, \\ z = z' + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = x' - 1, \\ 3 = y' + 1, \\ 4 = z' + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = 3, \\ y' = 2, \\ z' = 2 \end{cases}$$

га эга бўламиз. Демак, $M(x'; y'; z') = M(3; 2; 3)$.

2-мисол. Ўқларни $\varphi = \frac{\pi}{4}$ бурчакка бурганда $M(3; 4)$ нуктанинг координаталарини янги x' ва y' координаталари орқали ифодаланг.

Е ч и ш.

$$\cos \varphi = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \sin \varphi = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

бўлгани учун (4.22) формулаларга кўра:

$$\begin{cases} x = x' \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - y' \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y = x' \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + y' \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

ёки

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y'), \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \end{cases}$$


ларни ҳосил қиламиз.

6-§. Кесмани берилган нисбатда бўлиш

AB кесмани берилган $\lambda > 0$ нисбатда бўлиш деганда шу кесмада шундай $C(x; y; z)$ нукта топиш тушуниладики ҳосил бўлган AC ва CB (36-чизма) кесмалар нисбати учун қуйидаги тенгликлар ўринли бўлсин:

$$\frac{AC}{CB} = \lambda \text{ ёки } AC = \lambda \cdot CB.$$

Берилган кесманинг учлари A ва B нукталар мос равишда x_1, y_1, z_1 ва x_2, y_2, z_2 координаталарга эга бўлсин. Изланаётган C нуктанинг x, y, z координаталарини топамиз (36-чизма). $C(x; y, z)$ нуктанинг радиус-векторини $\vec{r}$, A ва B нукталарнинг радиус-векторларини $\vec{r}_1$ ва $\vec{r}_2$ орқали ифодаласак, векторларни қўшиш қондасига кура:



36-чизма

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_1 + AC \Rightarrow AC = \vec{r} - \vec{r}_1, \\ \vec{r} + BC &= \vec{r}_2 \Rightarrow CB = \vec{r}_2 - \vec{r}. \end{aligned}$$

AC ва CB ўзаро чизикли боғлиқ бўлгани учун:

$$AC = \lambda CB$$

ёки

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = \lambda (\vec{r}_2 - \vec{r}).$$

Бундан $\vec{r}$ векторни топамиз:


$$\vec{r} = \frac{\vec{r}_1 + \lambda \vec{r}_2}{1 + \lambda} \quad (4.26)$$

$\vec{r}$, $\vec{r}_1$ ва $\vec{r}_2$ векторларни координаталарига нисбатан ёзамиз:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \\ \vec{r}_1 &= x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}, \\ \vec{r}_2 &= x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}.\end{aligned}$$

Буларни (4.26) га қўямиз ва икки векторнинг тенглигидан фойдаланиб

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}; y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}; z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \quad (4.27)$$



37-чизма

тенгликларни ёзамиз. (4.27) формула AB кесмани берилган нисбатда бўлувчи C нуктанинг координаталарини топиш формуласидир. Агар C нукта AB кесмани тенг иккига бўлса, $\lambda = 1$ бўлиб, (4.26) ва (4.27) формулалар мос равишда қуйидагича ёзилади:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}, \\ x &= \frac{x_1 + x_2}{2}; y = \frac{y_1 + y_2}{2}; z = \frac{z_1 + z_2}{2}.\end{aligned}$$

1-мисол. AB кесманинг охири B (—1; 2; 4) ва уни $\lambda = \frac{1}{2}$ нисбатда бўлувчи C (2; 0; 2) нукта берилган. AB кесманинг A учи координаталарини топиш.

Ечиш. Масала шартига кўра C нукта AB кесмани $\lambda = \frac{AC}{CB} = \frac{1}{2}$ нисбатда бўлади (37-чизма). (4.27) формуладан фойдаланамиз:

$$x_C = \frac{x_A + \lambda x_B}{1 + \lambda}, y_C = \frac{y_A + \lambda y_B}{1 + \lambda}; z_C = \frac{z_A + \lambda z_B}{1 + \lambda}.$$

Бу формулаларга ва B ва C нуқталарнинг координаталарини қўйсак:

$$x_A = x_C(1 + \lambda) - x_B\lambda = 3,5;$$

$$y_A = y_C(1 + \lambda) - \lambda y_B = -1;$$

$$z_A = z_C(1 + \lambda) - \lambda z_B = 1.$$

Ж а в о б: $A(3,5; -1,1)$.

2- м и с о л. $A(4; 4)$ нуқта тўғри чизик бўйлаб ҳаракатланиб $B(-1; 2)$ нуқтага келади. A ва B нуқталардан ўтувчи тўғри чизикнинг Ox ўқ билан кесишиш нуқтасини топинг.

Е ч и ш. A ва B нуқталардан ўтувчи тўғри чизикнинг Ox ўқ билан кесишиш нуқтасини $C(x; 0)$ деб белгилайлик. Бу ҳолда A , B ва C нуқталар бир тўғри чизикда ётади. Масала шартига кўра:

$$x_1 = 4; x_2 = -1; x_C = x;$$

$$y_1 = 4; y_2 = 2; y_C = 0.$$

Бу қийматларни (4.27) формулага қўйиб, λ нинг қийматини аниқлаймиз:

$$y_C = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \Rightarrow 0 = \frac{4 + 2\lambda}{1 + \lambda} \Rightarrow \lambda = -2.$$

λ нинг бу қийматини (4.27) формуланинг биринчисига қўйсак:

$$x = \frac{4 + (-2)(-1)}{1 + (-2)} = \frac{4 + 2}{-1} = -6.$$

Демак, A ва B нуқталардан ўтувчи тўғри чизик Ox ўқини $C(-6; 0)$ нуқтада кеседи.

3- м и с о л. Бир жиқсли стерженнинг оғирлик маркази $C(5; 1)$ нуқтада бўлиб, учларидан бири $A(-1; -3)$ нуқтададир. Иккинчи учининг координаталарини топинг.

Е ч и ш. Агар стерженнинг иккинчи учи $B(x; y)$ нуқтада десак, (4.27) формулага асосан:

$$x_C = \frac{x_A + x_B}{2}; y_C = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Бундан

$$x_B = 2x_C - x_A, y_B = 2y_C - y_A$$

ларни ҳосил қиламиз. Берилган нукталарнинг координаталарини бу формулаларга қўйиб, стерженнинг иккинчи учининг координаталарини топамиз:

$$x_B = 11; y_B = 5.$$

С нуктанинг радиус-вектори учун қуйидаги формуланинг тўғрилиги (4.26) дан келиб чиқади:

$$\vec{r} = \frac{1}{1+\lambda} \vec{r}_1 + \frac{\lambda}{1+\lambda} \vec{r}_2$$

ёки

$$O\vec{C} = \frac{1}{1+\lambda} O\vec{A} + \frac{\lambda}{1+\lambda} O\vec{B}.$$

Берилган кесмани берилган нисбатда бўлишини массалар системасининг огирлик марказини топиш масаласига татбиқини кўриб чиқамиз.

Берилган $A(x_1; y_1; z_1)$ ва $B(x_2; y_2; z_2)$ нукталарга мос равишда m_1 ва m_2 массалар қўйилган бўлсин. Бу массалар системасининг огирлик маркази С нинг координаталарини топиш талаб қилинади. Физикадан маълумки, С нукта АВ кесма ичида ётади ва бу кесмани узунликлари кесма учларига жойлаштирилган массаларга тескари пропорционал қисмларга ажратади, яъни λ сон бу ҳолда мусбат бўлиб $\frac{m_2}{m_1}$ га

тенг. Шунинг учун (4.27) дан А ва В нукталарга жойлаштирилган m_1, m_2 массалар системаси огирлик марказининг координаталари қуйидагича бўлади:

$$x = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}, z = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2}. \quad (4.28)$$

Шунинг учун

$$O\vec{C} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} O\vec{A} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} O\vec{B}.$$

Агар m_1 ва m_2 нол қийматларни бир вақтда қабул қилмайди деб фараз қилсак, яъни массалар системаси B нуқтага жойлаштирилган массага ($m_1 = 0$) ёки A нуқтага жойлаштирилган ($m_2 = 0$) битта массага келтирилса, C огирлик маркази бу ҳолда ё B нуқта билан, ё A нуқта билан устма-уст тушади.

Демак, массаларнинг $\frac{m_2}{m_1}$ нисбати нолдан ∞ гача бўлган

қийматларни кетма-кет қабул қилса, C огирлик маркази AB кесмада A нуқтадан бошлаб B нуқтагача бўлган барча қийматларни қабул қилади.

Энди $A(x_1; y_1; z_1)$, $B(x_2; y_2; z_2)$, $D(x_3; y_3; z_3)$ нуқталар берилган бўлиб, уларга m_1, m_2, m_3 массалар жойлаштирилган ва бунда $m_1 + m_2 + m_3 > 0$ бўлсин. Бу массалар системасининг огирлик марказини топиш формуласини чиқарамиз. Аниқлик учун $m_1 + m_2 > 0$ деб фараз қиламиз. Агар $m_3 = 0$ бўлса, масала A ва B нуқталарга жойлаштирилган массалар система-сига келтирилади ва изланаётган огирлик маркази (4.28) формула билан топилади. Бизни $m_3 > 0$ бўлган ҳол қизиқтиради. Бу масалани икки боскичда ҳал қилиш мумкин. Олдин A ва B нуқталарга жойлаштирилган m_1 ва m_2 массалар огирлик маркази C_1 нинг координаталарини топамиз:

$$\begin{aligned} X_{C_1} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad Y_{C_1} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}, \\ Z_{C_1} &= \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2}. \end{aligned} \quad (4.29)$$

C ва D нуқталарга жойлаштирилган $m_1 + m_2$ ва m_3 массалар системаси учун $\lambda = \frac{m_3}{m_1 + m_2}$ га эга бўламиз.

Шунинг учун (4.29) дан фойдаланиб, (4.27) дан топамиз:

$$X_C = \frac{x_{C_1} + \frac{m_3}{m_1 + m_2} x_3}{1 + \frac{m_3}{m_1 + m_2}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}.$$

Шунга ўхшаш:

$$Y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}, Z_c = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$OC = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + m_3} \overline{OA} + \frac{m_2}{m_1 + m_2 + m_3} \overline{OB} + \frac{m_3}{m_1 + m_2 + m_3} \overline{OD} \quad (4.30)$$


экани келиб чиқади.

(4.30) га кўра агар A, B, D нукталарга $m_1 + m_2 + m_3 > 0$ шартда ҳар хил $m_1 \geq 0, m_2 \geq 0, m_3 \geq 0$ массалар жойлаштирилса, бу массалар системасининг огирлик марказлари тўплами ABD учбурчакдан иборат бўлади.

Агар A, B, D нукталар бир тўғри чизиқда, D нукта AB кесма ичида ётса, у ҳолда қаралаётган огирлик марказларининг тўплами AB кесмадан иборат бўлади.

4-мисол. Икки учи $A(2;0)$ ва $B(6;0)$ нукталарда, учинчи учи биринчи чорак координата бурчагининг биссектрисада ётган учбурчак огирлик маркази геометрик ўринининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Асоси AB кесмадан иборат бўлиб, бир учи биссектрисанинг ихтиёрий нуктасида бўлган учбурчакларни чексиз кўп яшаш мумкин (38-чизма). Биссектрисада ётган ихтиёрий $M(x_1; y_1)$ нуктани олсак, $\triangle ABM$ ни ҳосил қиламиз.



38-чизма

ABM нинг огирлик маркази $N(x; y)$ нукта

бўлсин, M нукта биссектрисада ётгани учун $x_1 = y_1$ бўлади. N нукта учбурчакнинг огирлик маркази бўлгани учун $CN:NM = 1:2$ муносабат ўриналидир. Бундан: $C(4; 0)$. Буларни эътиборга олсак,

$$x = \frac{4 + \frac{1}{2}x_1}{1 + \frac{1}{2}}, y = \frac{0 + \frac{1}{2}y_1}{1 + \frac{1}{2}}$$

ёки


$$\begin{cases} 3x = x_1, \\ 3y = y_1. \end{cases} \quad x_1 = y_1 = 3y \text{ бўлгани учун}$$

$$3x = 8 + 3y \text{ ёки } 3x - 3y - 8 = 0.$$

Демак, изланаётган оғирлик марказининг геометрик ўрни тўғри чизиқдан иборат экан.

7-§. Икки векторнинг вектор кўпайтмаси. Вектор кўпайтманинг хоссалари. Учбурчакнинг юзи

1-т а ў р и ф. Агар компланар бўлмаган учта $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларни умумий O нуқтага келтирилгандан сўнг бу векторлардан бирини иккинчиси билан устма-уст тушгунга қадар (улар орасидаги кичик бурчак бўйича) айлантириш учинчи векторнинг охиридан қаралганда соат стрелкасига қарши йўналишда кўринса, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар учлиги *ўнг учлик* (39-а чизма), айлантириш соат стрелкаси йўналиши бўйича бўлса, *chap учлик* (39-б чизма) дейилади.



39-чизма

2-т а ў р и ф. $\vec{a}$ векторнинг $\vec{b}$ векторга вектор кўпайтмаси деб шундай $\vec{c}$ векторга айтиладики, бу вектор куйидаги шартларни қаноатлантиради:

1) $\vec{c}$ вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга перпендикуляр;

2) $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin(\angle \vec{a}, \vec{b})$;

3) векторларнинг тартибланган $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ учлиги ўнг учлик ташкил этади.

Вектор кўпайтма $[\vec{a} \ \vec{b}]$, $\vec{a} \times \vec{b}$ ёки $\vec{c} = [\vec{a}\vec{b}]$ каби белгиланади.


1- шарт вектор кўпайтма (яъни $\vec{c}$ вектор) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар ётган текисликка перпендикуляр эканлигини билдиради.

2- шарт $\vec{c}$ векторнинг узунлиги томонлари $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлардан иборат параллелограммнинг юзига тенг эканлигини билдиради.

3- шарт $\vec{c}$ векторнинг йўналишини шундай олиш кераклигини билдирадики, $\vec{c}$ вектор учидан қараганда $\vec{a}$ вектордан $\vec{b}$ векторга қараб бурилиши соат стрелкасига қарши йўналишда бўлиши керак (40- чизма).

Вектор кўпайтманинг хос-саларини кўриб чиқамиз.

1. Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар ёки улардан бири нол вектор бўлса, уларнинг вектор кўпайтмаси нолга тенг бўлади.



40- чизма

И с б о т. Ҳақиқатан ҳам, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ бўлса, у ҳолда $[\vec{a}\vec{b}] = 0$. Агар улар параллел бўлса, улар орасидаги бурчак 0 ёки 180° бўлиб, $\sin(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ бўлади ва иккинчи шартга асосан қисликка перпендикуляр, аммо $[\vec{a}\vec{b}]$ кўпайтмада $\vec{a}, \vec{b}$ ўнг $\vec{c}$ вектор кўпайтма нол вектор бўлади.

2. Агар вектор кўпайтма кўпайтувчиларининг ўринларини алмаштирилса, вектор кўпайтманинг ишораси ўзгаради:

$$[\vec{a}\vec{b}] = -[\vec{b}\vec{a}].$$

И с б о т. Ҳақиқатан ҳам, вектор кўпайтма таърифининг 1-ва 2-бандларига асосан $[\vec{a}\vec{b}]$ ва $[\vec{b}\vec{a}]$ векторларнинг узунликлари тенг ва иккаласи ҳам битта текисликка перпендикуляр, аммо $[\vec{a}\vec{b}]$ кўпайтмада $\vec{a}, \vec{b}$ ўнг учликни $[\vec{b}\vec{a}]$ да эса чап учликни ташкил этгани учун $[\vec{a}\vec{b}]$ вектор йўналишига қарама-қарши $[\vec{b}\vec{a}]$ вектор ҳосил қиламиз.

3. Исталган ҳақиқий сон λ учун ушбу муносабатлар ўринли:

$$\lambda[\vec{a}\vec{b}] = [\lambda\vec{a}\vec{b}] = [\vec{a}\lambda\vec{b}].$$

4. Вектор кўпайтма учун тахсимот қонуни ўринлидир:

$$[\vec{a}(\vec{b} + \vec{c})] = [\vec{a}\vec{b}] + [\vec{a}\vec{c}].$$

5. Бирлик векторларнинг вектор кўпайтмалари куйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} [\vec{i} \vec{j}] &= -[\vec{j} \vec{i}] = \vec{k}; [\vec{i} \vec{i}] = 0; \\ [\vec{k} \vec{i}] &= -[\vec{i} \vec{k}] = \vec{j}; [\vec{j} \vec{j}] = 0; \\ [\vec{j} \vec{k}] &= -[\vec{k} \vec{j}] = \vec{i}; [\vec{k} \vec{k}] = 0. \end{aligned}$$

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар координаталари билан берилган, яъни

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \\ \vec{b} &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \end{aligned}$$

бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} [\vec{a} \vec{b}] &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k})(b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (4.31)$$

ёки

$$[\vec{a} \vec{b}] = \left\{ \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right\}. \quad (4.32)$$

Вектор кўпайтма ёрдамида учбурчакнинг юзини ҳисоблаш учун формула чиқариш мумкин. ABC учбурчак учларининг координаталари билан берилган бўлсин:

$$A(x_1; y_1; z_1); B(x_2; y_2; z_2); C(x_3; y_3; z_3).$$

Вектор кўпайтма таърифига кўра (2-шарт), ҳосил бўлган векторнинг модули параллелограммнинг юзига тенг. Унинг ярми эса учбурчакнинг юзини беради:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB} \cdot \vec{AC}]|.$$

Энди вектор кўпайтманинг механикага татбиқи ва унга доир мисол кўрамиз.

а) Куч моменти. Бирор Q қаттиқ жисм берилган бўлсин ва бу жисмнинг битта, масалан O нуктаси кўзголмас қилиб маҳкамланган бўлсин. Агар Q жисмнинг бошқа P нуктасига $\vec{F}$ куч қўйилса, у ҳолда бу куч Q жисмни айлантиради. Натижада айлантирувчи момент ёки куч моменти ҳосил бўлади. Механикадан маълумки, куч моменти ($\vec{m}$ вектор) ушбу формула бўйича топилади:

$$\vec{m} = [\vec{r} \vec{F}], \quad (4.33)$$

бунда $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ P нуктанинг радиус-вектори.

Энди P нуктага иккита $\vec{F}_1$ ва $\vec{F}_2$ куч қўйилган бўлсин ва бу кучларнинг йиғиндиси $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ бўлсин. Агар $\vec{m}$, $\vec{m}_1$, $\vec{m}_2$ мос равишда $\vec{F}$, $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ кучларнинг моментлари бўлса, у ҳолда

$$\vec{m} = \vec{m}_1 + \vec{m}_2$$

бўлади. (4.33) ва охириги формула вектор кўпайтманинг хоссасидан осонгина келиб чиқади:

$$\begin{aligned} \vec{m} &= [\vec{r}; \vec{F}] = [\vec{r}; (\vec{F}_1 + \vec{F}_2)] = \\ &= [\vec{r}; \vec{F}_1] + [\vec{r}; \vec{F}_2] = \vec{m}_1 + \vec{m}_2. \end{aligned}$$

1-мисол. $\vec{F} = \{3; 2; -4\}$ куч $A(2; -1; 1)$ нуктага қўйилган. Бу кучнинг координаталар бошига нисбатан моментини аниқлаш.

Ечиш. Агар $\vec{F}$ вектор A нуктага қўйилган бўлса, $\vec{a}$ вектор O нуктадан A нуктага йўналган, яъни $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ бўлади. $[\vec{a}, \vec{F}]$ вектор кўпайтма эса, $\vec{F}$ кучнинг O нуктага нисбатан куч моментини ифодалайди. Демак, $\vec{a} = \overrightarrow{OA} = \{2; -1; 1\}$,

$$\overrightarrow{OA} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 11\vec{j} + 7\vec{k}.$$

б) Тангенциал ва бурчак тезлик. Бирор P нукта l тўғри чизиқ атрофида узунлик бўйича ўзгармас $\vec{v}(l)$ тангенциал тезлик билан айланма ҳаракат

килаётган бўлсин. Тангенциал тезлик $\vec{v}(t)$ вектордан иборат бўлиб, бу вектор ҳар бир вақт momentiда P нукта траекториясига уринма бўйлаб йўналган ва

$$|\vec{v}(t)| = v_0 = \text{const} > 0. r_0 = |\vec{r}(t)| \sin(\vec{\omega} \wedge \vec{r}(t))$$

P нуктадан l чизиккача бўлган масофа бўлгани учун r_0 мнқдор l вақтга ва O нуктанинг l тўғри чизикдаги ҳолатига боғлиқ бўлмаган мусбат ўзгармас-дир. Энди қуйидаги шартларни қаноатлантирадиган $\vec{\omega}$ векторни қараймиз:

$$1) \quad |\vec{\omega}| = \frac{v_0}{r_0};$$

2) вақтнинг ҳар қандай momentiда $\vec{\omega}$, $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ векторлар ўнг учликни ташкил қилади;

3) ҳар қандай t да $\vec{v}(t)$ вектор $\vec{\omega}$, $\vec{r}(t)$ векторларга перпендикуляр ва

$$[\vec{\omega}, \vec{r}(t)] = |\vec{\omega}| |\vec{r}(t)| \sin(\vec{\omega}, \wedge \vec{r}(t)),$$

$$\vec{r}(t) = \frac{v_0}{r_0} \vec{r}_0 = v_0 = |\vec{v}(t)|$$

бўлгани учун

$$\vec{v}(t) = [\vec{\omega}, \vec{r}(t)]. \quad (4.34)$$

Шундай қилиб, агар ҳаракатланаётган нуктанинг тангенциал тезлиги узунлик бўйича ўзгармас бўлса, нуктанинг l тўғри чизик атрофида айланма ҳаракати l да ётувчи бирор ўзгармас вектор билан тўла ҳарактерланади. $\vec{\omega}$ вектор қаралаётган ҳаракатнинг бурчак тезлиги дейилади.

Агар l ўқ атрофида $\vec{\omega}_1, \dots, \vec{\omega}_n$ бурчак тезликлар билан кетма-кет бир қанча айланма ҳаракатлар бажарилаётган бўлса, у ҳолда натижавий айланма ҳаракат ҳам l ўқ атрофида $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 + \dots + \vec{\omega}_n$ бурчак тезликка эга бўлган айланма ҳаракат бўлади.

Бу (4.34) формуладан келиб чиқади:

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= [\vec{\omega}, \vec{r}(t)] = \left[\left(\sum_{i=1}^n \vec{\omega}_i \right), \vec{r}(t) \right] = \\ &= \sum_{i=1}^n [\vec{\omega}_i, \vec{r}(t)] = \sum_{i=1}^n \vec{v}_i(t). \end{aligned}$$

2-мисол. Учлари $A(3; 0; 5)$, $B(3; -2; 2)$, $C(1; 2; 4)$ нуқталарда бўлган учбурчакнинг юзини топинг.

Ечиш. $\overrightarrow{AB}$ ва $\overrightarrow{AC}$ векторларнинг координаталарини аниқлаймиз:

$$\overrightarrow{AB} = \{3-3; -2-0; 2-5\} = \{0; -2; -3\},$$

$$\overrightarrow{AC} = \{1-3; 2-0; 4-5\} = \{-2; 2; -1\}.$$

$\overrightarrow{AB}$ векторни $\overrightarrow{AC}$ векторга вектор кўпайтирамиз, яъни

$$\begin{aligned} \vec{c} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -2 & -3 \\ -2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 8\vec{i} + 6\vec{j} - 4\vec{k}. \end{aligned}$$

$\vec{c}$ нинг модулини топамиз:

$$|\vec{c}| = |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \sqrt{8^2 + 6^2 + (-4)^2} = \sqrt{116}.$$

Демак,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{c}| = \frac{1}{2} \sqrt{116} = \sqrt{\frac{116}{4}} = \sqrt{29}.$$

8-§. Векторларнинг аралаш кўпайтмаси ва унинг хоссалари. Тетраэдрнинг ҳажми*

Таъриф. $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг аралаш кўпайтмаси деб (векторларнинг кўрсатилган тартибига кўра) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг вектор кўпайтмасига тенг векторни $\vec{c}$ векторга скаляр кўпайтиришдан ҳосил бўлган сонга айтилади.

Аралаш кўпайтма $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$ ёки $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ каби белгиланади. Аралаш кўпайтма қуйидаги геометрик маънога эга. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар бирор 0 нуқтага қўйилган ва компланар бўлмаган ўнг учликни ҳосил қилсин. Қирралари бу векторлардан иборат параллелепипедни ясаймиз. $||\vec{a}, \vec{b}||$ микдор шу параллелепипед асосининг

*«Аналитик геометрия ва қизикли алгебра» (Ф. Рижабов, А. Нурметов. «Ўқитувчи», 1990) китобидан фойдаланилди.

юзини билдиришини кўрамиз. Скаляр кўпайтманинг таърифига кўра:

$$[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = ||\vec{a}, \vec{b}|| \cdot |\vec{c}| \cdot \cos\varphi.$$

бу ерда $\varphi = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})$ бўлиб, $|\vec{c}| \cos\varphi$ микдор $\vec{c}$ векторнинг $[\vec{a}, \vec{b}]$ вектор йўналиши бўйича тўғри чизикдаги проекциясига тенг бўлиб, параллелепипеднинг баландлигидан иборатдир (41- чизма):

$$|\vec{c}| \cos\varphi = h.$$

Шундай қилиб, $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = S_{\text{асос}} \cdot h = V$, бу ерда V параллелепипеднинг ҳажми.


Демак, агар $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар ўнг учлик ҳосил қилса, бу векторларнинг аралаш кўпайтмаси бу векторларга ясалган параллелепипед ҳажмига тенг экан. Агар $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ лар чап учлик ташкил қилса, $[\vec{a}, \vec{b}]$ вектор билан $\vec{c}$ вектор орасидаги φ бурчак $\frac{\pi}{2}$ дан катта бўлиб,

$\cos\varphi \leq 0$ (42- чизма) бўлади. У ҳолда $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -V$.


Демак, параллелепипед ҳажми: $V = ||\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}||$. $R = \{0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k}\}$ координаталар системасида $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ ва $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$ векторлар берилган бўлсин. Бу векторларнинг аралаш кўпайтмасини ҳисоблаш масаласини кўямиз.

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг вектор кўпайтмаси қуйдагича бўлади:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}. \quad (4.35)$$



41- чизма



42- чизма

$[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$ кўпайтмани топамиз, яъни (4.35) векторни $\vec{c}$ векторга скаляр кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} &= c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - c_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} c_x & c_y & c_z \\ b_x & b_y & b_z \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Бу детерминантни куйидаги кўринишда ёзамиз:

$$[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \quad (4.36)$$

Демак, учта векторнинг аралаш кўпайтмаси учинчи тартибли детерминантга тенг бўлиб, бу детерминантнинг биринчи йўл элементлари биринчи вектор координаталаридан, иккинчи йўл элементлари иккинчи вектор координаталаридан, учинчи йўл элементлари эса учинчи вектор координаталаридан иборатдир.

Аралаш кўпайтма хоссаларини кўриб чиқамиз:

$$1. [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = [\vec{b}, \vec{c}] \cdot \vec{a}.$$

Ҳақиқатан ҳам, бу учта векторга қурилган параллелепипед ҳажмларининг абсолют кийматлари тенг.

2. Кўпайтувчиларнинг ўринларини алмаштирсак, аралаш кўпайтманинг ишораси ўзгаради:

$$a) [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = -[\vec{b}, \vec{a}] \cdot \vec{c};$$

$$б) [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = -[\vec{a}, \vec{c}] \cdot \vec{b};$$

$$в) [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = -[\vec{c}, \vec{b}] \cdot \vec{a}.$$

Исботи. а) $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = -[\vec{b}, \vec{a}] \cdot \vec{c}$, чунки $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$.

Қолган тенглиklar ҳам шунга ўхшаш исботланади.

3. Ихтиёрий α скаляр сон ($\alpha \in R$) учун ушбу тенглик ўринлидир. $(\alpha \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \alpha [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$

$$4. a) (\vec{a} + \vec{d})[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{d}[\vec{b}, \vec{c}], \quad б) \vec{a}[\vec{b} + \vec{d}, \vec{c}] = \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{a}[\vec{d}, \vec{c}].$$

Иёботи. Масалан, а) тенгликни кўрсатайлик:

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{d})[\vec{b}, \vec{c}] &= [\vec{a} + \vec{d}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = \\ &= ([\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{d}, \vec{b}]) \cdot \vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} + [\vec{d}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = \\ &= \vec{a}[\vec{b}, \vec{c}] + \vec{d}[\vec{b}, \vec{c}]. \end{aligned}$$

5. Компланар $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларнинг аралаш кўпайтмаси нолга тенг бўлади, чунки бу векторларга қурилган параллелепипед текисликда бўлиб, унинг баландлиги нолга тенг бўлади. Шундай қилиб $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$ бўлса, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар компланар бўлади.

6. Агар $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлардан ихтиёрий икkitаси коллинеар бўлса, уларнинг аралаш кўпайтмаси нолга тенг бўлади (хусусий ҳолда:

$$[\vec{a}, \vec{a}] \cdot \vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{a} = [\vec{b}, \vec{a}] \cdot \vec{a} = 0).$$

6-хоссанинг маъноси шундан иборатки, (4.36) формуладаги учинчи тартибли детерминантнинг икkitасатри ўзаро пропорционал бўлиб қолади.

Аралаш кўпайтма ёрдамида учларининг координаталари билан берилган тетраэдрнинг ҳажмини ҳисоблаш мумкин.

$ABCD$ тетраэдр учларининг координаталари $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$ бўлсин. Маълумки, тетраэдрнинг ҳажми унинг бир учидан чиқувчи қирраларидан (яъни AB , AC ва AD қирраларидан) ясалган параллелепипед ҳажмининг $1/6$ қисмига тенг. Демак,

$$V = \frac{1}{6} |(AB \ AC \ \overline{AD})| \quad (4.37)$$

Бу формулани нуктанинг координаталари орқали ҳам ёзиш мумкин:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} \text{ mod } \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

ёки

$$V_{\text{тет}} = \frac{1}{6} \bmod \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \quad (4.38)$$

1-мисол. Ушбу $A(5; 7; -2)$; $B(3; 1; -1)$, $C(9; 4; -4)$, $D(1; 5; 0)$ нукталар битта текисликда ётишини исбот қилинг.

Ечиш. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$ векторларнинг координаталарини аниқлаймиз:

$$\overline{AB} = (-2; -6; 1),$$

$$\overline{AC} = (4; -3; -2),$$

$$\overline{AD} = (-4; -2; 2).$$

Бу векторларнинг аралаш кўпайтмасини ҳисоблаймиз:

$$(\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD}) = \begin{vmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 4 & -3 & -2 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Демак, $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$ векторлар компланар, демак A , B , C ва D нукталар битта текисликда ётади.

2-мисол. Учлари $A(2; -3; 5)$, $B(0; 2; -1)$; $C(-2; -2; 3)$, $D(3; 2; 4)$ нукталарда ётувчи учбурчакли пирамида (тетраэдр)нинг ҳажмини ҳисобланг.

Ечиш. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$ векторнинг координаталарини топамиз:

$$\overline{AB} = \{-2; 5; -4\}, \overline{AC} = \{-4; 1; -2\}, \overline{AD} = \{1; 5; -1\}.$$

(4.38) формулага кўра:

$$\begin{aligned} V_{\text{пир}} &= \frac{1}{6} |\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD}| = \\ &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 5 & -4 \\ -4 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 6 \text{ куб. бирл.} \end{aligned}$$

9-§. Қўш вектор кўпайтма

Ихтиёрий $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар берилган бўлсин. Булар учун $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ вектор қўш вектор кўпайтма деб аталади. Қўш вектор кўпайтмани топишнинг энг содда қоидасини қуйидаги теорема орқали кўрсатамиз.

1-теорема. Ихтиёрий ўрта $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ вектор учун ушбу

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c})\vec{b} - (\vec{a}, \vec{b})\vec{c} \quad (4.39)$$

тенглик ўринлидир.

Исбот. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ихтиёрий векторлар, яъни

$$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k},$$

$$\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k},$$

$$\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$$

бўлсин. У ҳолда $\vec{b}$ нинг $\vec{c}$ га вектор кўпайтмасы

$$\begin{aligned} \vec{b} \times \vec{c} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \vec{k}. \end{aligned}$$

векторни беради. Энди $\vec{a}$ векторни $\vec{b} \times \vec{c}$ векторга вектор кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \end{vmatrix} = \\ &= [(a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 + a_3b_1c_3 - a_3b_3c_1)\vec{i} + \\ &+ (a_1b_2c_1 - a_1b_1c_2 + a_3b_2c_3 - a_3b_3c_2)\vec{j} + \\ &+ (a_1b_3c_1 - a_1b_1c_3 + a_2b_3c_2 - a_2b_2c_3)\vec{k}] = \\ &= \{b_1(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - c_1(a_1b_1 + a_2b_2 + \\ &+ a_3b_3)\}\vec{i} + \{b_2(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - c_2(a_1b_1 + \\ &+ a_2b_2 + a_3b_3)\}\vec{j} + \{b_3(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - \\ &- c_3(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)\}\vec{k} = (\vec{a}, \vec{c})\vec{b} - (\vec{a}, \vec{b})\vec{c}. \end{aligned}$$

Шу билан теорема исботланди.

2-теорема. Ихтиёрий учта $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ вектор учун ушбу тенглик ўринли:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0. \quad (4.40)$$

Исбот. 1-теоремага кўра:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= (\vec{a}, \vec{c})\vec{b} - (\vec{a}, \vec{b})\vec{c}, \quad \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{b}, \vec{a})\vec{c} - (\vec{b}, \vec{c})\vec{a}, \\ \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) &= (\vec{c}, \vec{b})\vec{a} - (\vec{c}, \vec{a})\vec{b}. \end{aligned}$$

Бу тенгликларни қўшиб ва скаляр кўпайтманинг симметриклигидан фойдалансак, (4.40) тенглик ҳосил бўлади.

Мисол. $\vec{a} = \{3; 2; 1\}$, $\vec{b} = \{-1; 3; 4\}$ ва $\vec{c} = \{4; 5; 0\}$ векторлар берилган бўлсин. Уларнинг қўш вектор кўпайтмасини топиш.

Ечиш. $\vec{b}$ нинг $\vec{c}$ га вектор кўпайтмасини топамиз:

$$\begin{aligned} \vec{d} = \vec{b} \times \vec{c} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \\ + \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \vec{k} &= -20\vec{i} + 16\vec{j} - 17\vec{k} = \{-20; 16; -17\}. \end{aligned}$$

Энди $\vec{a}$ ни $\vec{d}$ га вектор кўпайтирамиз:

$$\begin{aligned} \vec{p} = \vec{a} \times \vec{d} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ -20 & 16 & -17 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 16 & -17 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -20 & -17 \end{vmatrix} \vec{j} + \\ + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -20 & 16 \end{vmatrix} \vec{k} &= -50\vec{i} + 31\vec{j} + 88\vec{k}. \end{aligned}$$

Демак, $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = -50\vec{i} + 31\vec{j} + 88\vec{k} = \{-50; 31; 88\}$.

10-§. Чизикли операторларнинг хос векторлари ва хос қийматлари (сонлари)

Т а ъ р и ф. Агар R^n фазодаги ҳар бир $\vec{x}$ векторга шу фазонинг аниқ $\vec{y} = f\vec{x}$ вектори мос қўйилган бўлса ва у қуйидаги иккита аксиомага бўйсунса, яъни

- 1) $\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in R^n \Rightarrow f(\vec{x}_1 + \vec{x}_2) = f\vec{x}_1 + f\vec{x}_2,$
- 2) $\forall \lambda \in P, \forall \vec{x} \in R^n \Rightarrow f(\lambda \vec{x}) = \lambda f\vec{x},$

у ҳолда f *чизикли оператор* дейилади.

Бунда $\vec{x}_1$ ва $\vec{x}_2$ векторлар R^n фазонинг ихтиёрий векторлари, λ ихтиёрий сон. $\vec{y}$ вектор $\vec{x}$ векторнинг *таъсири* (образи), $\vec{x}$ эса $\vec{y}$ нинг *прообрази* деб аталади.

0 билан белгиланувчи ва R^n фазонинг ҳамма элементларини шу R^n фазонинг нол элементига акслантирувчи оператор қуйидагича ёзилади:

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{0}.$$

Ҳар бир f оператор учун унга қарама-қарши бўлган оператор қуйидагича белгиланади:

$$-f = (-1)f.$$

Барча $f: R^n \Rightarrow R^n$ чизикли операторлар (ўзини ўзига акслантириш) тўплами чизикли фазони ташкил қиладди.

$$A(\vec{x}) = \lambda \vec{x}, \quad (4.40)$$

муносабатни қаноатлантирувчи $\vec{x} \neq 0$ вектор f операторнинг *хос вектори* ва унга мос λ сон эса унинг *хос қиймати* (сони) ёки чизикли операторнинг *характеристик сони* дейилади.

Бундан кўринадики, $\lambda \vec{x}$ векторлар, R^n фазонинг барча нолмас векторлари хос векторларидир.

$\vec{x}$ хос векторни ва λ хос қийматини (сонни) топиш учун зарур бўлган теоремани исботсиз келтирамыз.

Т е о р е м а. f оператор R^n фазодаги чизикли оператор, λ_0 — f операторнинг хос қиймати, $\vec{x}$ эса f нинг λ_0 сонга мос келадиган хос вектори, $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n$ лар R^n фазодаги ихтиёрий базис ва $A = [a_{ij}] (i, j = \overline{1, n})$ матрица f операторнинг шу базисдаги матрицаси бўлса, у ҳолда λ_0 сон

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (4.41)$$

тенгламанинг илдизи,

$$\vec{x} = \alpha_1 \vec{l}_1 + \alpha_2 \vec{l}_2 + \dots + \alpha_n \vec{l}_n \quad (4.42)$$

хос векторнинг компонентлари эса $\vec{l}_1, \vec{l}_2, \dots, \vec{l}_n$ базисда бир жинсли

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda) \alpha_1 + a_{12} \alpha_2 + \dots + a_{1n} \alpha_n = 0, \\ a_{21} \alpha_1 + (a_{22} - \lambda) \alpha_2 + \dots + a_{2n} \alpha_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1} \alpha_1 + a_{n2} \alpha_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda) \alpha_n = 0 \end{cases} \quad (4.43)$$

системанинг ечими бўлади. (4.41) берилган чизикли оператор матричасининг характеристик тенгламаси деб аталади. (4.41) характеристик тенгламадан λ хос қийматлар топилади, сўнггра ҳар бир хос қийматларга мос (4.43) системадан $\vec{x}$ хос векторнинг $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ координаталари топилади.

1-изох. Агар $\vec{x}$ вектор берилган чизикли операторнинг хос вектори бўлса, у ҳолда унга коллинеар бўлган ихтиёрий нолмас вектор ҳам берилган операторнинг λ хос қийматига хос вектори бўлади.

2-изох. Агар барча λ хос қийматлар ҳақиқий сонлар бўлса, у ҳолда уларга мос хос векторлар доимо чизикли эркин бўлади ва уларни янги базис сифатида олиш мумкин. Бу янги базисда A матрица қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

3-изох. Агар A симметрик матрица бўлса, у ҳолда унинг барча хос қийматлари ҳақиқий сонлар бўлади ва хос векторлари эса ўзаро перпендикуляр бўлади.

Мисол. Бирор базисда ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

матрица билан берилган чизикли операторнинг хос қийматларини ва хос векторларини топинг.

Ечиш. А матрица симметрик матрица бўлгани учун унинг барча хос қийматлари хақиқий сонлар бўлади. Уни топиш учун характеристик тенгламани тузамиз:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Бу детерминантни ҳисоблаш қондасига кўра ҳисобласак, λ номаълумга нисбатан учинчи даражали қуйдаги тенгламага эга бўламиз:

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 3\lambda + 10 = 0.$$

Бу тенгламани $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$ ва $\lambda_3 = 5$ қийматлар қаноатлантиришини онсонгина текшириш мумкин. Бу сонлар берилган чизикли операторнинг хос қийматлари бўлади. Энди хос векторларни топамиз. Уларни топиш учун (4.43) тенгламалар системаси

$$\begin{cases} (3-\lambda)\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 + (2-\lambda)\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0, \\ 2\alpha_2 + (1-\lambda)\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (4.44)$$

га $\lambda = \lambda_1$, $\lambda = \lambda_2$ ва $\lambda = \lambda_3$ қийматларни қуйиб, уларга мос α_1 , α_2 ва α_3 қийматларни топамиз.

1) $\lambda = \lambda_1 = 2$ учун (4.44) система ушбу кўринишни олади:

$$\begin{cases} (3-2)\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 + (2-2)\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0, \\ 2\alpha_2 + (1-2)\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

ёки

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0, \\ 2\alpha_1 - \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Бунда α_1 , α_2 ва α_3 ўзгарувчиларнинг биттасига ихтиёрий қиймат бериб, қолганларини топамиз. Масалан $\alpha_1 = 1$ бўлса, $\alpha_2 = -\frac{1}{2}$, $\alpha_3 = -1$ бўлади. $\lambda_1 = 2$ хос қийматга мос хос вектор $\vec{x}'$ ушбу кўринишда бўлади:

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} \text{ ёки } \vec{x}' = \vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j} - \vec{k}.$$

2) $\lambda = \lambda_2 = -1$ хос қиймат учун ҳам юқоридагидек система тузамиз:

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Агар $\alpha_1 = 1$ деб олсак, $\alpha_2 = -2$, $\alpha_3 = 2$ бўлади ва унга хос вектор

$$\vec{x}'' = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ ёки } \vec{x}'' = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

кўринишда бўлади;

3) худди шунга ўхшаш $\lambda = \lambda_3 = 5$ учун

$$\begin{cases} -\alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0, \\ \alpha_2 - 2\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

система ҳосил қиламиз ва бу системани $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 2$, $\alpha_3 = 1$ қийматлар қаноатлантиришини осонгина текшириш мумкин.

$$\text{Демак, } \vec{x}''' = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ёки } \vec{x}''' = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}.$$

A матрица симметрик бўлгани учун аниқланган учала хос вектор ўзаро перпендикуляр эканини текшириш мумкин, яъни $\vec{x}' \cdot \vec{x}'' = 0$, $\vec{x}' \cdot \vec{x}''' = 0$, $\vec{x}'' \cdot \vec{x}''' = 0$.

Бу хос векторларни янги базис сифатида олиш мумкин ва унда A матрица

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

кўринишда бўлади.

МАШҚЛАР

1. Агар $A(4; 3)$ ва $B(1; 2)$ нукталар берилган бўлса, $\overline{AB}$ ва $\overline{BA}$ векторларнинг координаталарини топинг.

2. Агар $\overline{AB} = \{2; -1\}$ ва $A(6; 7)$ бўлса, B нуктанинг координаталарини топинг.

3. Берилган $A(2; 4)$ нуктадан 6 бирлик масофада Oy ўқида ётган $B(x; y)$ нуктани топинг.

4. Агар $A(1; 2; 3)$ ва $B(2; 1; 4)$ бўлса, $\overline{AB}$ ва $\overline{BA}$ векторларнинг координаталарини топинг.

5. Қутб координаталар системасида берилган. $A(6; \frac{\pi}{4})$ ва $B(7; -\frac{\pi}{3})$ нукталарнинг декарт координаталар системасидаги координаталарини топинг.

6. Қутб координаталар системасида берилган $\rho = a \sin 2\varphi$ чизик тенгламасини декарт координаталар системасида ифодаланг.

7. Фазода $M(-2; 3; -4)$ нукта берилган. Агар ўқларни параллел кўчиришда координаталар боши эски системада $(1; -1; -2)$ координаталарга эга бўлса, шу M нуктанинг янги системадаги координаталарини топинг.

8. $M_1(2; 4; -2)$ ва $M_2(-2; 4; -2)$ нукталар берилган. M_1M_2 кесмани $\lambda = 3$ нисбатда бўлувчи S нуктанинг координаталарини топинг.

9. Учлари $A(1; 1; 1)$, $B(5; 1; -2)$, $C(7; 9; 1)$ дан иборат учбурчак берилган. A учидан ўтказилган биссектрисанинг CB томон билан кесишган D нуктасининг координаталарини топинг.

10. Агар $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 3$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$ бўлса, томонлари $\vec{m} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ ва $\vec{n} = \vec{a} + 4\vec{b}$ векторлардан иборат параллелограммнинг юзини ҳисобланг.

11. $\triangle ABC$ нинг томонлари $\vec{AB} = \{-3; -2; 6\}$ ва $\vec{BC} = \{-2; 4; -4\}$ векторлардан иборат. AD баландлигининг узунлигини ҳисобланг.

12. $\vec{F} = \{3; 2; -4\}$ куч $A(2; -1; -1)$ нуқтага қўйилган. Бу кучнинг координаталар бошига нисбатан моменти аниқланг.

13. Агар $|\vec{p}| = 5$; $(\vec{p}, \vec{q}) = \pi/4$ бўлса, томонлари $\vec{p} - 2\vec{q}$ ва $3\vec{p} + 2\vec{q}$ векторлардан иборат учбурчакнинг юзини топинг.

14. Агар учбурчак учларининг координаталари $A(1; -2; 8)$; $B(0; 0; -4)$; $C(6; 2; 0)$ бўлса, $\triangle ABC$ нинг юзини топинг.

15. $\vec{a} = 6\vec{i} + 2\vec{k}$ ва $\vec{b} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ векторлардан ясалган параллелограмм диагоналлариининг узунлигини ва юзини ҳисобланг.

16. $A(5; 7; -2)$, $B(3; 1; -1)$, $C(9; 4; -4)$, $D(1; 5; 0)$ нуқталарнинг битта текисликда ётишини исбот қилинг.

17. $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 7\vec{k}$ векторларнинг компланар эканлигини исбот қилинг.

18. Учлари $A(2; -3; 5)$, $B(0; 2; 1)$, $C(-2; -2; 3)$, $D(3; 2; 4)$ нуқталарда ётувчи учбурчакли пирамида-нинг ҳажмини ҳисобланг.

19. Учбурчакли пирамида учларининг радиус-векторлари берилган. Унинг ҳажмини ва ABC ёгига туширилган баландлигининг узунлигини аниқланг: $\vec{r}_S = \{3; 2; 4\}$, $\vec{r}_A = \{2; -3; 5\}$, $\vec{r}_B = \{0; 2; 1\}$, $\vec{r}_C = \{-2; -2; 3\}$.

20. Тетраэдрнинг ҳажми 5 га тенг. Унинг учта учи $A(2; 1; -1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(2; -1; 3)$ нуқталарда ётади. Агар тўртинчи D учи Oy ўқида ётиши маълум бўлса, D нинг координаталарини топинг.

Қуйидаги матрицалар билан берилган чизиқли операторнинг хос қийматлари ва хос векторларини топинг.

$$21. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$22. A = \begin{pmatrix} 6 & -12 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \\ -4 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

ТЕКИСЛИКДА ТЎҒРИ ЧИЗИҚ ТЕНГЛАМАЛАРИ

1-§. Чизикнинг текисликдаги тенгламаси

Текисликда чизик берилган бўлиши учун унинг нуқталари ҳолатини аниқлаб берувчи бирор қоида маълум бўлиши керак.

Масалан, марказ деб аталувчи нуқтадан баравар узоқликда ётган нуқталарнинг геометрик ўрни айлана дейилади; ёки бирор кесманинг учларидан баравар узоқликда ётувчи нуқталарнинг геометрик ўрни шу кесмага ўтказилган ўрта перпендикуляр бўлади ва ҳоказо.

Тўғри бурчакли декарт координаталар системасида чизикнинг тенгламаси

$$F(x, y) = 0 \quad (5.1)$$


ёки

$$y = f(x), \quad a \leq x \leq b \quad (5.2)$$

кўринишда бўлади. (5.2) функция x аргумент $[a, b]$ кесмада ўзгарганда $f(x)$ функция узлуксиз ўзгаради деб фараз қиламиз. Қўпинча $f(x)$ функцияни бир қийматли функция деб, x ва y ларни эса декарт координаталар текислигидаги бирор M нуқтанинг координаталари деб фараз қилинади. У ҳолда x нинг ҳар бир қиймати учун (5.2) тенгламадан y нинг ягона қиймати аниқланади.

Демак, x нинг ҳар бир қийматига текислиkning (координаталари $x, f(x)$ бўлган) биргина нуқтаси тўғри келади. Агар x узлуксиз ўзгариб турли қийматлар қабул қилса, y ҳолда M нуқта координаталар текислигида бирор нуқталар тўпламини тасвирлайди. Бу нуқталар тўплами эса текисликда бирор чизикни ифодалайди. Агар $f(x)$ функция кўп қийматли бўлса, яъни x нинг ҳар бир қийматига y нинг бир неча $y_1, y_2 \dots y_s$ қийматлари мос келса, y ҳолда x нинг ҳар бир қийматига координаталар текислигида $M_1, M_2, \dots M_s$ нуқталар тўғри келади. Масалан $y = f(x)$ функция икки қийматли бўлсин. Бу ҳолда x нинг ҳар бир x_1 қийматига y нинг $y_1 = f(x_1)$ ва $y_2 = f(x_1)$ қийматлари мос келиб, координаталар текислигида

иккита $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ нукталар аниқланади (43-чизма). x ўзгарувчи $[a, b]$ кесмада узлуксиз ўзгарганда M_1 ва M_2 нукталар ҳам ўринларини узлуксиз ўзгартиради ва бу нукталар чизикни тасвирлайди.



43-чизма

Таъриф. Агар чизик ихтиёрий нуктасининг x ва y координаталари (5.1) тенгламани қаноатлантирса ва аксинча, бу тенгламани қаноатлантирадиган ҳар бир жуфт $(x; y)$ қиймат чизик нуктасини тасвирласа, (5.1) тенглама чизикнинг ошқормас тенгламаси деб аталади.

Аналитик геометрияда асосан иккита масала билан шуғулланилади:

1) чизик нукталарнинг геометрик ўрни сифатида берилган бўлиб, унинг тенгламасини тузиш талаб қилинади;

2) тенглама берилган, унинг графигини ясаш талаб қилинади.

1-мисол. Берилган $A(-2; 4)$ ва $B(3; 6)$ нукталардан бир хил узоқликда жойлашган нукталарнинг геометрик ўрни тенгламасини тузинг.

Ечиш. $C(x; y)$ — A ва B нукталардан баравар узоқликда жойлашган ихтиёрий нукта бўлсин. Масала шартига кўра:

$$|AC| = |BC|. \quad (5.3)$$

Икки нукта орасидаги масофани топиш формуласидан фойдаланиб,

$$|AC| = \sqrt{(x+2)^2 + (y-4)^2},$$

$$|BC| = \sqrt{(x-3)^2 + (y-6)^2}$$

ларни ҳосил қиламиз. Бу ифодаларни (5.3) га қўйиб масала шартини қаноатлантирадиган нукталар геометрик ўрнининг тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x+2)^2 + (y-4)^2} &= \sqrt{(x-3)^2 + (y-6)^2} \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 4 + y^2 - 8y + 16 &= x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + \\ + 36 &\Rightarrow 10x + 4y - 25 = 0.\end{aligned}\quad (5.4)$$

Шундай қилиб, A ва B нуқталардан баравар узоқликда жойлашган ихтиёрий нуқтанинг координаталари (5.4) тенгламани қаноатлантиради ва аксинча, координаталари (5.4) муносабатни қаноатлантирган ҳар қандай нуқта A ва B нуқталардан бир хил узоқликда ётади.

Энди чизиқни (5.1) тенгламасига кўра ясаш масаласини қараймиз. Текисликдаги нуқта ўзининг (x, y) координаталари билан аниқланади. Шунинг учун (5.1) тенгламаларда x га $x_1, x_2, \dots, x_n$ қийматларни берсак,

$$F_1(x_1; y) = 0, F_2(x_2; y) = 0, \dots, F_n(x_n; y) = 0, \quad (5.5)$$

тенгламалар ҳосил бўлади. Бу тенгламалардан y нинг $x_1, x_2, \dots, x_n$ қийматларга мос бўлган $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ қийматларини топамиз, натижада координаталари (5.1) тенгламани қаноатлантирувчи

$$(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_n; y_n) \dots$$

нуқталарга эга бўламиз. Бу нуқталарни координаталар системасида ясаб, уларни бирлаштирсак, (5.1) тенгламани тасвирловчи чизиқ ҳосил бўлади. Бу чизиқ икки ўзгарувчили (5.1) тенгламанинг графиги дейилади.

2-мисол. $y = x^2 + 1$ тенглама тасвирлайдиган чизиқни ясанг.

Ясаш. x га $\dots -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots$ қийматларни берамиз ва y нинг шунга мос қийматларини топамиз. Бу қийматлар учун қуйидаги жадвални тузамиз:


x	$\dots$	-3	-2	-1	0	1	2	3	$\dots$
y	$\dots$	10	5	2	1	2	5	10	$\dots$

Натижада $\dots (-3; 10), (-2; 5), (-1; 2), (0; 1), (1; 2), (2; 5), (3; 10) \dots$ нуқталар ҳосил бўлади. Бу нуқталарни

координаталар системасида жойлаштириб, уларни силлиқ чизиқ билан туташтирсак, $y = x^2 + 1$ функциянинг графиги, яъни парабола ҳосил бўлади (44- чизма). Масалаларни ечишда чизиқнинг $F(x; y) = 0$ тенгламасидан ташқари унинг параметрик тенгламаларидан ҳам фойдаланилади.

Масалан, механика ва техникада моддий нукта ҳаракат траекториясини текширишда t вақтга боғлиқ бўлган

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$$



44- чизма

тенгламалар қаралади.

Бу тенгламалар моддий нуктанинг ҳаракат траекториясини тасвирлайди.

Бу кўринишдаги тенгламага чизиқнинг *параметрик тенгламаси* дейилади. Бу ерда t параметр бўлиб, y вақтни, бурчак, тезлик ва ҳоказо катталикларни ифодалаши мумкин.

3- мисол $A(x; y)$ нуктанинг координаталари ҳаракат пайтида

$$\begin{cases} x = 3t^2 - 1, \\ y = 5t^2 + 6 \end{cases}$$

тенгламалар билан аниқланади (t —вақт). A нукта траекториясининг декарт координаталар системасидаги тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган тенгламалар системаси $A(x; y)$ нукта ҳаракатининг параметрик тенгламасидир. Системадаги биринчи тенгламадан t^2 ни топамиз:

$$t^2 = \frac{x + 1}{3}$$

Буни системадаги иккинчи тенгламага қўйсак:

$$y = 5 \cdot \frac{x + 1}{3} + 6 \text{ ёки } 5x - 3y + 23 = 0.$$


Демак, $A(x; y)$ нукта траекторияси тўғри чизикдан иборат.

2-§. Тўғри чизиқнинг текисликдаги тенгламалари

Декарт координаталар текислигида бирор l тўғри чизиқ берилган бўлсин. Шунингдек, l тўғри чизиқда ётувчи $M_1(x_1; y_1)$ нукта ва l тўғри чизиққа перпендикуляр $\vec{n} = \{A; B\}$ вектор ёки унга параллел $\vec{s} = \{m; n\}$ векторлар берилган бўлса, l тўғри чизиқнинг текисликдаги турли кўринишдаги тенгламаларини келтириб чиқарамиз.

1. Берилган $M_1(x_1; y_1)$ нукта орқали ўтиб, берилган $\vec{n}$ векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламаси

Оху текисликда l тўғри чизиқ берилган бўлсин. Унда ётувчи $M_1(x_1; y_1)$ нукта ва l тўғри чизиққа перпендикуляр бўлган $\vec{n}$ ($l \perp \vec{n}$) вектор оламиз (45-чизма). $\vec{n}$ векторга l тўғри чизиқнинг нормал вектори дейилади.



45-чизма

$M_1(x_1; y_1)$ нукта ва $\vec{n}$ нормал вектор l тўғри чизиқнинг *Оху* текисликдаги ҳолатини тўла аниқлайди. $M(x; y)$ нукта l тўғри чизиқнинг ихтиёрий нуктаси бўлсин, у ҳолда $\vec{M_1M} = \{(x - x_1); (y - y_1)\}$ вектор l тўғри чизиқ устида ётади ва $\vec{M_1M} \perp \vec{n}$ бўлади. Шунинг учун $\vec{n}$ ва $\vec{M_1M}$ векторларнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг:

$$\vec{n} \cdot \vec{M_1M} = 0$$

ёки

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) = 0. \quad (5.6)$$

(5.6) тенглама M_1 нукта орқали ўтиб, $\vec{n}$ векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқнинг тенгламасини ифодалайди.

1-мисол. $M_1(4; -3)$ нукта орқали ўтувчи ва $\vec{n} = \{2; -5\}$ векторга перпендикуляр бўлган тўғри чизиқ тенгламасини тузинг.

Е чи ш. Мисол шартига кўра: $x_1 = 4$; $y_1 = -3$; $A = 2$; $B = -5$. Буларни (5.6) формулага қўйиб изланаётган тўғри чизик тенгламасини топамиз:

$$2(x - 4) + (-5)(y + 3) = 0.$$

Бундан

$$2x - 5y - 23 = 0.$$

2. Тўғри чизикнинг умумий тенгламаси

x ва y координаталарга нисбатан исталган биринчи даражали

$$Ax + By + C = 0 \quad (5.7)$$

кўринишдаги тенглама Oxy текисликда ётувчи тўғри чизикнинг умумий тенгламаси эканлигини кўрсатамиз.

Ҳақиқатан, (5.6) тенгламада A ёки B коэффициентларидан бири нолдан фаркли деб фараз қиламиз (акс ҳолда $A=0$; $B=0$ бўлиб, $C=0$ айниятга эга бўлардик). Масалан $B \neq 0$ бўлсин. У ҳолда (5.7) тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$A(x-0) + B(y + \frac{C}{B}) = 0.$$

(5.7) тенгламага тенг кучли бўлган тенгламага эга бўламиз. Бу тенглама $M_1(0; -\frac{C}{B})$ нуқтадан ўтувчи ва $\vec{n}$ векторга перпендикуляр тўғри чизик тенгламасидир.

Демак, (5.7) тенглама тўғри чизикнинг умумий тенгламаси экан.

Энди, умумий тенгламаси билан берилган тўғри чизикнинг координата ўқларига нисбатан жойлашувини текшираамиз:

а) Агар $C=0$, $A \neq 0$, $B \neq 0$ бўлса, тўғри чизик тенгламаси $Ax + By = 0$ бўлиб, y координаталар бошидан ўтади.

б) Агар $A=0$, $C \neq 0$, $B \neq 0$ бўлса, тўғри чизик тенгламаси $By + C = 0$ бўлиб, y Ox ўқига параллел бўлади.

в) Агар $B=0$, $A \neq 0$, $C \neq 0$ бўлса, тўғри чизик

тенгламаси $Ax + C = 0$ бўлиб, у Oy ўқига параллел бўлади.

г) Агар $C = 0$, $B = 0$, $A \neq 0$ бўлса, тўғри чизик тенгламаси $Ax = 0$ бўлиб, у Oy ўқини ифодалайди.

д) Агар $C = 0$, $A = 0$, $B \neq 0$ бўлса, тўғри чизик тенгламаси $By = 0$ бўлиб, у Ox ўқини ифодалайди.

2-мисол. $4x - 7y + 3 = 0$ тўғри чизикнинг нормал векторини топиш.

Ечиш. Нормал вектор: $\vec{n} = \{A; B\}$. Берилган тўғри чизик тенгламасидан: $A = 4$, $B = -7$. Шунинг учун $\vec{n} = \{4; -7\}$.

3-мисол. $3x + 4y - 18 = 0$ ва $2x - y - 1 = 0$ тўғри чизикларнинг кесилиш нуктаси орқали ўтиб, $x + 2y - 6 = 0$ тўғри чизикка перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламасини тузиш.

Ечиш. Дастлаб икки тўғри чизикнинг кесилиш нуктасини топамиз, бунинг учун кесилиш нуктасининг координаталарини $M_1(x_1, y_1)$ деб оламиз. Ушбу

$$\begin{cases} 3x_1 + 4y_1 - 18 = 0, \\ 2x_1 - y_1 - 1 = 0 \end{cases}$$

системадан $x_1 = 2$; $y_1 = 3$ ларини топамиз. Масала шартидан изланаётган тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори сифатида $x + 2y - 6 = 0$ тўғри чизикнинг нормал вектори $\vec{n} \{1; 2\}$ ни олиш мумкин. У ҳолда изланаётган тўғри чизик тенгламаси (5.6) формулага кўра

$$1. (x - 2) + 2 \cdot (y - 3) = 0 \text{ ёки} \\ x + 2y - 8 = 0$$

кўринишда бўлади.

Таъриф. Тўғри чизикка параллел ёки шу тўғри чизикда ётувчи ҳар қандай $\vec{S} = \{m; n\}$ вектор бу тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори дейилади.

3. Тўғри чизикнинг параметрик тенгламалари l тўғри чизик ва шу тўғри чизикка тегишли $M_0(x_0; y_0)$ нукта ва йўналтирувчи $\vec{S} = \{m; n\}$ вектор билан тўла аниқланади (46-чизма). Бу берилганларга кўра l тўғри чизик тенгламасини чиқарамиз. M_0 нуктадан бошқа l тўғри чизикда ихтиёрин $M(x; y)$ нукта оламиз. У ҳолда M_0M вектор $\vec{S}$ вектор билан коллинеар бўлади. Демак, шундай t сон топиладики,

$$M_0M = t\vec{S} \quad (t \in R) \quad (5.8)$$

бўлади. M, M_0 нукталарнинг радиус-векторларини мос равишда $\vec{r}, \vec{r}_0$ орқали белгиласак:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}, \vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0}$$

бўлиб, M_0M вектор учун $\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$ га эга бўламиз.

(5.8) тенгликдан:


$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{S} \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{S}. \quad (5.9)$$

(5.9) тенглама l тўғри чизиқнинг векторли тенгламаси дейилади. (5.9) тенгламадаги t га турли қийматлар бериб, l тўғри чизиққа тегишли нукталарнинг радиус-векторларини топамиз. (5.9) тенгламадаги l ўзгарувчи параметр деб аталади.

Энди (5.9) ни координаталарда ёзамиз:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}, \vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j},$$

$$\overrightarrow{M_0M} = t\vec{S} = t(m\vec{i} + n\vec{j}) = tm\vec{i} + tn\vec{j}.$$



46- ЧИЗМА

Буларни (5.9) га қўйиб, сўнгра икки векторнинг тенглигига кўра, ушбу тенгламаларга эга бўламиз:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt. \end{cases} \quad (5.10)$$

(5.10) формула l тўғри чизиқнинг параметрик тенгламаси дейилади. Агар l тўғри чизиқ координата ўқларидан бирортасига ҳам параллел бўлмаса

(яъни $m, n \neq 0$ шарт бажарилса), у ҳолда (5.10) дан ушбу

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{x - x_0}{m} \\ t = \frac{y - y_0}{n} \end{cases}$$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} \quad (5.11)$$

тенгламани ҳосил қиламиз.

(5.11) формула тўғри чизикнинг каноник тенгламаси дейилади. Бундан

$$nx - my + (-nx_0 + my_0) = 0 \quad (5.12)$$

ни топамиз. Бу ерда шартга кўра m , n нинг камида биттаси нолдан фаркли, шу сабабли (5.12) биринчи даражали тенгламадир. Бундан эса ҳаф қандай тўғри чизик биринчи даражали тенглама билан ифодаланади деган муҳим хулосага келамиз.

4-мисол. $M(3; 1)$ нукта орқали ўтувчи ва йўналтирувчи вектори $S = \{4; 3\}$ бўлган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартига кўра $x_0 = 3$; $y_0 = 1$; $m = 4$; $n = 3$. Бу кийматларни (5.10) формулага қўйсак,

$$\begin{cases} x = 3 + 4t, \\ y = 1 + 3t \end{cases}$$

тенгламаларга эга бўламиз. Бу тенгламалар биз излаган тўғри чизикнинг параметрик тенгламаларидир.

4. Икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламаси

Бизга маълумки M_1 ва M_2 нукталардан ягона тўғри чизик ўтади. M_1 ва M_2 нукталарнинг координаталари маълум деб фараз қилиб, шу нукталар орқали ўтувчи l тўғри чизик тенгламасини топамиз.

$M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$ нукталар изланаётган l тўғри чизикқа тегишли бўлсин. Шунингдек бу тўғри чизикда $M(x; y)$ ихтиёрий нуктани оламиз. Натижада, бу нукталар ёрдамида тўғри чизикда ўзаро коллинеар бўлган

$$\overline{M_1 M_2} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\} \text{ ва } \overline{M_1 M} = \{x - x_1; y - y_1\}$$

векторларга эга бўламиз. Бу векторлар коллинеар бўлгани учун

$$\overline{M_1 M} = t \overline{M_1 M_2} \quad (5.13)$$

тенглик ўринли бўлади. Бундан, векторларнинг тенглигига асосан, $x - x_1 = t(x_2 - x_1)$ ва $y - y_1 = t(y_2 - y_1)$ га эга бўламиз. Бундан

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \quad (5.14)$$

(5.14) тенглама берилган икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламаси дейилади. Бу тенглама

$x_2 - x_1 \neq 0$ ва $y_2 - y_1 \neq 0$ бўлганда ўринлидир. Агар $y_2 - y_1 = 0$ бўлса, у ҳолда тўғри чизик Ox ўққа параллел бўлиб, $y - y_1 = 0$ ёки $y = y_1$ бўлади. Шунингдек, $x - x_1 = 0$ бўлганда $x = x_1$ бўлиб, бу чизик Oy ўқига параллел тўғри чизик бўлади.

Икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламасини учинчи тартибли детерминант ёрдамида ҳам ёзиш мумкин:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

5-мисол. $ABCD$ тўғри тўртбурчак учларининг координаталари берилган:

$$A(1; 3), B(5; 7), C(7; 5), D(3; 1)$$

AB , AD томонларини ва AC ҳамда DB диагоналлارнинг тенгламасини тузинг.

Е чи ш. а) AB томоннинг тенгламасини тузамиз. (5.14) формулага кўра:

$$\begin{aligned} \frac{x-x_1}{x_2-x_1} &= \frac{y-y_1}{y_2-y_1}, \quad \frac{x-1}{5-1} = \frac{y-3}{7-3} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{x-1}{4} &= \frac{y-3}{4} \Rightarrow x-1 = y-3 \Rightarrow \\ &\Rightarrow x-y+2=0. \end{aligned}$$

б) AD томоннинг тенгламасини тузамиз:

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-3}{1-3} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} \Rightarrow x+y-4=0.$$

в) AC диагоналлнинг тенгламасини тузамиз:

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{7-1} &= \frac{y-3}{5-3} \Rightarrow \frac{x-1}{6} = \frac{y-3}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow x-1 &= 3(y-3) \Rightarrow x-1 = 3y-9 \Rightarrow x-3y+8=0. \end{aligned}$$

г) DB диагоналлнинг тенгламасини тузамиз:

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{5-3} &= \frac{y-1}{7-1} \Rightarrow \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{6} \Rightarrow \\ \Rightarrow 3(x-3) &= y-1 \Rightarrow 3x-9 = y-1 \Rightarrow 3x-y-8=0. \end{aligned}$$

5. Тўғри чизикнинг координата ўқларида ажратган кесмалари бўйича тенгламаси;

l тўғри чизикни аниқловчи M_1 ва M_2 нукталар координата ўқлари Ox ва Oy да ётсин. Аниқлик учун $M_1(a; 0)$ нукта, Ox ўқда $M_2(0; b)$ нукта эса Oy ўқда ётсин (47-чизма). Бу ҳолда (5.14) тенглама қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\frac{x-a}{-a} = \frac{y-0}{b} \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (5.15)$$

(5.15) тенглама тўғри чизикнинг координата ўқларидан ажратган кесмалар бўйича тенгламаси дейилади. a ва b лар тўғри чизикнинг мос равишда Ox ва Oy ўқларида ажратган кесмаларини билдиради.

6. Тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламаси.

Таъриф. $\vec{S}$ вектор $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ базисда m, n

координаталарга эга бўлиб, $m \neq 0$ бўлса, $\frac{n}{m} = k$ сон $\vec{S}$ векторнинг бурчак коэффициенти дейилади.

Агар $\vec{S}$ вектор бирор l тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори ва k сон шу тўғри чизикнинг бурчак коэффициенти бўлса, шу тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламасини келтириб чиқарамиз. l тўғри чизикнинг битта нуктаси ва бурчак коэффициенти текисликда унинг ҳолатини тўла аниқлайди.


Агар l тўғри чизик Oy ўқига параллел бўлса, у ҳолда бундай тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламаси мавжуд эмас. Шунинг учун Oy ўқка параллел бўлмаган l тўғри чизик $M_0(x_0; y_0)$ нуктадан ўтсин ва k бурчак коэффициентига эга бўлсин деб фараз қиламиз. (5.11) дан $m \neq 0$ деб қуйидагига эга бўламиз:

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} \Rightarrow y-y_0 = \frac{n}{m}(x-x_0) \Rightarrow$$

$$y-y_0 = k(x-x_0) \quad (\text{чунки } \frac{n}{m} = k)$$

$$\text{ёки } y = kx + b,$$

$$(5.16)$$



47-чизма

бунда $b = y_0 - kx_0$.

(5.16) тенглама тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламаси дейилади.

Агар l тўғри чизик иккита $M_1(x_1; y_1)$ ва $M_2(x_2; y_2)$ нуқталардан ўтган бўлса, у ҳолда унинг бурчак коэффициенти (5.14) формулага асосан

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (5.17)$$

формула билан аниқланади. (Бу тўғри чизик Oy ўқига параллел бўлмаган ҳол учун тўғри бўлади.)

7. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак
Агар икки тўғри чизик

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ ва } A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

тенгламалари билан берилган бўлса, улар орасидаги бурчак

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{A_1A_2 + B_1B_2}$$

формула билан ҳисобланади. Бу ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

икки тўғри чизикнинг параллеллик шартини,

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

эса икки тўғри чизикнинг перпендикулярлик шартини ифодалайди.

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ ва } A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

тўғри чизиклар орасидаги бурчаклар биссектрисаларининг тенгламалари:

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} = \pm \frac{A_2x + B_2y + C_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

8. Уч нуқтанинг бир тўғри чизикда ётиш шартини

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1}$$

тенглик билан ифодаланади ёки детерминант шаклида эса

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

кўринишда ёзилади.

6-мисол. Тўғри чизик тенгламаси берилган: $(3+\alpha)x - (2\alpha-5)y + 22 = 0$. α нинг қандай қийматида тўғри чизик Ox ўқи билан 45° ли бурчак ҳосил қилади? Шу тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган тенгламани y га нисбатан ечамиз:

$$\begin{aligned} (3+\alpha)x - (2\alpha-5)y + 22 &= 0 \Rightarrow (2\alpha+5)y = (3+\alpha)x + 22 \Rightarrow \\ \Rightarrow y &= \frac{3+\alpha}{2\alpha-5}x + \frac{22}{2\alpha-5}. \end{aligned}$$

Бу тўғри чизикнинг бурчак коэффициенти

$$k = \frac{3+\alpha}{2\alpha-5}$$

га тенг. Маълумки, $\operatorname{tg}\varphi = k$. Масаланинг шартига кўра: $k = \operatorname{tg}45^\circ = 1$.

Бундан:

$$\begin{aligned} 1 = \frac{3+\alpha}{2\alpha-5} &\Rightarrow \begin{cases} 2\alpha-5 = 3+\alpha, \\ \alpha \neq \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha-\alpha = 5+3, \\ \alpha \neq \frac{5}{2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 8, \\ \alpha \neq \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \alpha = 8. \end{aligned}$$

α нинг топилган қийматини ўрнига қўйиб Ox ўқи билан 45° ли бурчак ҳосил қилувчи тўғри чизик тенгламасини топамиз:

$$\begin{aligned} y &= \frac{3+8}{2 \cdot 8-5}x + \frac{22}{2 \cdot 8-5} \Rightarrow y = \frac{11}{11}x + \frac{22}{11} \Rightarrow \\ &\Rightarrow y = x + 2. \end{aligned}$$

Демак, изланаётган тўғри чизик тенгламаси $y = x + 2$ бўлади.

7-мисол. $A(2; 5)$ ва $B(5; -1)$ нукталар орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг ҳамда шу тўғри чизикда ординатаси 2 га тенг бўлган нуктани топинг.

Ечиш. Икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизик формуласидан фойдаланамиз:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ёки

$$6x + 3y - 27 = 0.$$

Бу тўғри чизикда ординатаси 2 га тенг бўлган нуқтанинг координатасини (абсциссасини) топиш учун уч нуқтанинг бир тўғри чизикда ётиш шартидан фойдаланамиз:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \\ x & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2 + 5x + 10 + x - 4 - 25 = 0; \quad x = 3,5.$$

Демак, $6x + 3y - 27 = 0$ тўғри чизикда ординатаси 2 га тенг бўлган нуқта $C(3,5; 2)$ дан иборат.

9. Координаталар бошидан ўтмайдиغان тўғри чизикнинг кутб координаталар системасидаги тенгламасини топиш учун тўғри чизикнинг нормал тенгламасини ёзиб оламиз:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0;$$

x ва y ларнинг ўрнига

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi$$

қийматларни қўямиз:

$$\rho \cos \alpha \cos \varphi + \rho \sin \alpha \sin \varphi - p = 0$$

ёки

$$\rho \cos(\varphi - \alpha) = p.$$

Тўғри чизик координаталар бошидан ўтмаганлиги сабабли p нолдан фаркли бўлади. Охириги тенгликдан φ нинг ҳар қандай қийматида $\cos(\varphi - \alpha) \neq 0$ бўлади. Охириги тенгликни $\cos(\varphi - \alpha)$ га бўлиб, тўғри чизикнинг кутб координаталар системасидаги

$$\rho = \frac{p}{\cos(\varphi - \alpha)}$$


тенгламасига эга бўламиз.

8- мисол. $x = 2$ тўғри чизикнинг кутб координаталар системасидаги тенгламасини топинг.

Е ч и ш. $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ формуланинг биринчиси-
дан фойдаланиб, берилган тўғри чизик тенгламасини
қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\rho \cos \varphi = 2 \text{ ёки } \rho = \frac{2}{\cos \varphi}.$$

Бу берилган тўғри чи-
зик тенгламасидир (48-
чизма). Бунда ρ мусбат
миқдор бўлгани учун φ
бурчак шундай ўзгариши
керакки, $\cos \varphi$ мусбат бў-
лиши керак, яъни I ва IV
чоракларда бўлиши керак.



48- чизма

9- мисол. $A(4; \frac{\pi}{2})$ ва

$B(4; 0)$ нуқталардан ўтув-
чи тўғри чизикнинг қутб координаталар системасидаги
тенгламасини тузинг.

Е ч и ш. Тўғри чизик A ва B нуқталардан ўтгани
учун бу нуқталарнинг координаталари тўғри чизикнинг
 $\rho \cos(\varphi - \alpha) = p$ тенгламасини қаноатлантириши керак,
яъни

$$\begin{cases} \rho = 4 \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 4 \sin \alpha, \\ \rho = 4 \cos(0 - \alpha) = 4 \cos \alpha \end{cases}$$

Бу тенгламалар системасидан p ва α ларни аниқлаймиз.

$$p = 4 \sin \alpha = 4 \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

$\alpha = \frac{\pi}{4}$ ни ўрнига қўйсак:

$$\rho = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}.$$

Демак, изланаётган тўғри чизик тенгламаси:

$$\rho \cos(\varphi - \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}.$$

3-§. Текисликда икки тўғри чизиқнинг ўзаро жойлашуви

Текисликда икки l_1 ва l_2 тўғри чизик

$$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad (5.18)$$

$$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0 \quad (5.19)$$

тенгламалари билан берилган бўлсин.

Бу тўғри чизиқларнинг текисликда ўзаро жойлашувини текшириш учун (5.18) ва (5.19) тенгламаларни биргаликда система қилиб текшириш керак: шу системанинг ечимига кўра l_1 ва l_2 тўғри чизиқлар текисликда қандай жойлашишини айтиш мумкин:

а) l_1 ва l_2 тўғри чизиқлар кесишади. У ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \text{ бўлиб,}$$

система ягона ечимга эга бўлади.

б) l_1 ва l_2 тўғри чизиқлар ўзаро параллел бўлса, у ҳолда $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$ тенглик ўринли бўлади.

в) l_1 ва l_2 тўғри чизиқлар устма-уст тушади. Бу ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

бўлади ёки иккала тенглама бир хил бўлади.

1-мисол. $2x - 3y + 4 = 0$ ва $3x + 2y - 7 = 0$ тўғри чизиқларнинг текисликда ўзаро жойлашишини аниқланг.

Ечиш. Берилган тўғри чизиқларнинг текисликда қандай жойлашишини аниқлаш учун, ушбу

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4 = 0, \\ 3x + 2y - 7 = 0 \end{cases}$$

системани текширамыз. Бунда $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{2}$ нисбат бажарил-

гани учун тўғри чизиқлар кесишади ва бу кесишиш нуқтаси системанинг ечимидир. Системани ечиб, $x=1$, $y=2$ ларни топамиз. Бу топилган қийматлар $M(1; 2)$ кесишиш нуқтасининг координаталари бўлиб, бу нуқта бир вақтнинг ўзида берилган тўғри чизиқларнинг ҳар бирида ётади.

4-§. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак


l_1 ва l_2 тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак деганда, бу тўғри чизикларнинг йўналтирувчи векторлари орасидаги бурчак тушунилади (бунда φ бурчак 0° дан 180° гача ораликда ўзгаради). l_1 ва l_2 тўғри чизиклар куйидаги умумий кўринишдаги тенгламалари билан берилган бўлсин (49- чизма).

$$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0,$$


$$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

$$\vec{S}_1 = \{-B_1; A_1\} \text{ ва } \vec{S}_2 = \{-B_2; A_2\}$$

векторларни мос равишда l_1 ва l_2 тўғри чизикларнинг йўналтирувчи векторлари деб олишимиз мумкин. Чунки l_1 тўғри чизикнинг $\vec{S}_1$ йўналтирувчи вектори унинг $\vec{n}$ нормал векторига перпендикуляр бўлгани учун $\vec{S}_1 \cdot \vec{n}$ скаляр кўпайтма нолга тенг бўлади. l_1 ва l_2 тўғри чизиклар



49- чизма



50- чизма

орасидаги бурчакни йўналтирувчи векторлар орасидаги бурчак деб қараганимиз учун $\vec{S}_1$ ва $\vec{S}_2$ векторлар орасидаги φ бурчакни векторларнинг скаляр кўпайтмаси қондасидан аниқлаймиз:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2}{|\vec{S}_1| |\vec{S}_2|} = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (5.20)$$

Энди l_1 ва l_2 тўғри чизиклар бурчак коэффициентли тенгламалари билан берилган ҳолни кўраемиз:

$$l_1: y = k_1 x + b_1; \quad l_2: y = k_2 x + b_2.$$

Бунда l_1 ва l_2 тўғри чизиклар Oy ўқига параллел эмас деб фараз қиламиз. φ_1 ва φ_2 бурчаклар мос равишда l_1 ва l_2 тўғри чизикларнинг Ox ўқининг мусбат йўналиши билан ташкил қилган бурчаклари бўлсин. 50- чизмадан: $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

Берилган тўғри чизикларнинг бурчак коэффициентлари $k_1 = \operatorname{tg} \varphi_1$, $k_2 = \operatorname{tg} \varphi_2$ эканлиги бизга маълум. Тригонометриядаги маълум формулага кўра:

$$\operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg}(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_1}{1 + \operatorname{tg} \varphi_1 \cdot \operatorname{tg} \varphi_2}.$$

$\operatorname{tg} \varphi_1$, $\operatorname{tg} \varphi_2$ ларнинг ўрнига k_1 , k_2 ларни қўйиб,

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2}, \quad (5.21)$$

$$\operatorname{ctg} \varphi = \frac{1 + k_1 k_2}{k_2 - k_1} \quad (5.22)$$

формулаларни ҳосил қиламиз. (5.21) формула тўғри чизиклар перпендикуляр бўлмаган ҳолда ишлатилади. (5.21) ва (5.22) формулалардан $k_1 = k_2$ тўғри чизикларнинг параллеллик, $k_1 \cdot k_2 = -1$ тўғри чизикларнинг перпендикулярлик шартлари келиб чиқади.

1- м и с о л. $5x + y + 4 = 0$ ва $3x - 2y + 2 = 0$ тўғри чизиклар орасидаги бурчакни топинг.

Е ч и ш. (5.20) формула ёрдамида топамиз:

$$\cos \varphi = \frac{5 \cdot 3 + 1 \cdot (-2)}{\sqrt{5^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{15 - 2}{\sqrt{26} \cdot \sqrt{13}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 45^\circ.$$

2- м и с о л. $2x - 6y + 5 = 0$ ва $2x + 4y - 7 = 0$ тўғри чизиклар орасидаги бурчакни аниқланг.

Е ч и ш. Тўғри чизиклар орасидаги бурчакни φ деб белгилаймиз. Тўғри чизикларнинг берилган тенгламаларини уларнинг бурчак коэффициентли тенгламалари орқали ифодалаб, ҳар бир тўғри чизикнинг бурчак коэффициентини аниқлаймиз:

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}; \quad k_1 = \frac{1}{3},$$


$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}; \quad k_2 = -\frac{1}{2}.$$

(5.21) формула ёрдамида топамиз:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3} \cdot (-\frac{1}{2})} = \frac{-\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = -1. \quad \operatorname{tg} \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

5-§. Нуктадан тўғри чизиккача бўлган масофа

Декарт координаталар системасида l тўғри чизик $Ax + By + C = 0$ тенгламаси билан ва бу чизикда ётмаган $M_0(x_0; y_0)$ нукта берилган бўлсин. M_0 нуктадан l тўғри чизикка перпендикуляр ўтказамиз ва уларнинг кесишган нуктасини $M_1(x_1; y_1)$ билан белгилаймиз (51-чизма). $\overline{M_1M_0}$ векторнинг узунлиги M_0



51-чизма

нуктадан l тўғри чизиккача бўлган масофа дейилади ва уни $d = \rho(M_0; l)$ кўринишда белгиланади. $\vec{n} = \{A; B\}$ вектор l тўғри чизикнинг нормал вектори бўлсин. У ҳолда $\vec{n}$ ва $\overline{M_1M_0}$ векторлар коллинеар, чунки

$\vec{n}$ вектор l тўғри чизикнинг нормали. $\overline{M_1M_0}$ ва $\vec{n}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини топамиз:

$$\overline{M_1M_0} \cdot \vec{n} = |\overline{M_1M_0}| \cdot |\vec{n}| \cos \varphi = \pm \rho(M_0; l). \quad (5.23)$$

Агар $\overline{M_1M_0}$ ва $\vec{n}$ векторлар бир хил йўналишда бўлса, $\varphi = 0^\circ$ бўлиб, $\cos \varphi = 1$ бўлади, агар $\overline{M_1M_0}$ ва $\vec{n}$ векторлар қарама-қарши йўналишда бўлса, $\varphi = 180^\circ$ бўлиб, $\cos \varphi = -1$ бўлади. Буларни ҳисобга олсак, (5.23) формула куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$d = \rho(M_0; l) = \frac{|\overline{M_1M_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}. \quad (5.24)$$

$$\overline{M_1M_0} = \{x_0 - x_1; y_0 - y_1\}$$

ни эътиборга олсак:

$$\begin{aligned} \overline{M_1M_0} \cdot \vec{n} &= A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) = \\ &= Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1). \end{aligned} \quad (5.25)$$

$M_1(x_1; y_1)$ нукта l тўғри чизикка тегишли бўлгани учун $Ax_1 + By_1 + C = 0$ бўлади. Бундан $Ax_1 + By_1 = -C$ ни топамиз ва (5.25) га қўйсак:

$$\overline{M_1 M_0} \cdot \vec{n} = Ax_0 + By_0 + C.$$

Агар $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$ эканини ҳисобга олсак, (5.24) формула қуйидаги кўринишни олади:

$$d = \rho(m_0; l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (5.26)$$

(5.26) формула берилган M_0 нуктадан l тўғри чизик-қача бўлган масофани ҳисоблаш формуласидир.

Мисол. $M_0(4; 7)$ нуктадан $8x + 6y - 4 = 0$ тўғри чизикқача бўлган масофани топинг.

Ечиш. (5.26) формулага кўра топамиз:

$$x_0 = 4, y_0 = 7, A = 8, B = 6, C = -4,$$

$$d = \rho(M_0; l) = \frac{|8 \cdot 4 + 7 \cdot 6 - 4|}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = \frac{70}{10} = 7.$$

6-§. Тўғри чизиклар дастаси

Тўғри чизиклар дастаси икки хил бўлади: кесишувчи тўғри чизиклар дастаси ва параллел тўғри чизиклар дастаси. Агар

$$l_1: Ax + By + C_1 = 0, \quad (5.27)$$

$$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0 \quad (5.28)$$

тенгламалар билан ифодаланувчи тўғри чизиклар бирор нуктада кесишса, у ҳолда бу кесишиш нуктаси орқали ўтувчи тўғри чизиклар кесишувчи тўғри чизиклар дастасини ташкил қилади. Кесишиш нуктаси даста маркази дейилади. Кесишувчи тўғри чизиклар дастасининг маркази орқали ўтувчи тўғри чизик қуйидаги тенглама билан аниқланади:

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0, \quad (5.29)$$

Бу ерда α ва β лар бир вақтда нолга тенг бўлмаган ҳар хил кийматларни қабул қилади. Агар $\alpha \neq 0$ бўлса, (5.29) ни қуйидаги кўринишда ҳам ёзилади:

$$Ax + By + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0.$$

Агар кесишувчи тўғри чизиклар дастаси марказининг координаталари $(x_1; y_1)$ берилган бўлса, у ҳолда даста тенгламаси

$$A_1x_1 + B_1y_1 + C_1 + \lambda(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2) = 0$$

кўринишда ёзилади.

Агар (5.27) ва (5.28) тўғри чизикларнинг йўналиш векторлари параллел ёки устма-уст тушса, у ҳолда шу йўналишдаги тўғри чизиклар параллел тўғри чизиклар дастасини ифодалайди.

Мисол. $x + y - 2 = 0$ ва $3x - 2y - 5 = 0$ тўғри чизиклар берилган бўлсин. Шу тўғри чизиклар дастасига тегишли ва $M(2; 1)$ нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган тўғри чизиклардан ўтувчи тўғри чизиклар дастаси тенгламасини тузамиз:

$$x + y - 2 + \lambda(3x - 2y - 5) = 0. \quad (A)$$

Бу тенгламага M нукта координаталарини қўямиз:

$$2 + 1 - 2 + \lambda(3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 5) = 0, \\ 1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1.$$

Бу қийматни (A) тенгламага қўйиб, изланаётган тўғри чизик тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$x + y - 2 + 3x - 2y - 5 = 0 \Rightarrow 4x - y - 7 = 0.$$

7-§. Тўғри чизикнинг нормал тенгламаси

Декарт координаталар системасида тўғри чизик $Ax + By + C = 0$ тенглама билан берилган бўлсин. Агар бу тўғри чизикнинг нормал вектори $\vec{n} = \{A; B\}$ бирлик вектор бўлса, яъни $A^2 + B^2 = 1$ бўлса, у ҳолда тўғри чизик тенгламаси нормаланган тенглама дейилади.

$Ax + By + C = 0$ тўғри чизик тенгламаси нормаланган бўлмаса, у ҳолда унинг чап қисмини N сонига кўпайтириш керак:

$$AN + BN + CN = 0,$$

бунда N ни шундай танлаб олиш керакки, натижада $\{AN, BN\}$ вектор бирлик вектор бўлсин:

$$(AN)^2 + (BN)^2 = 1 \Rightarrow N = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Шундай қилиб, ҳар бир тўғри чизик учун иккита нормаланган тенгламага эга бўламиз:


$$\pm \frac{Ax + By + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0.$$

N сони нормалловчи кўпайтувчи дейилади, унинг ишораси тенгламадаги озод ҳад C нинг ишорасига тескари бўлади. $\sqrt{A^2 + B^2}$ илдиз $\vec{n}$ нормал векторнинг модули бўлгани учун:

$$N = \pm \frac{1}{|\vec{n}|}.$$

Тўғри чизикнинг нормаланган тенграмаси $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 = 1$) содда геометрик маънога эга, яъни

$$A = \vec{n} \cdot \vec{i} = \cos \alpha, \quad B = \vec{n} \cdot \vec{j} = \cos \beta, \quad |c| = p$$



52-чизма

эканлиги 52-чизмадан кўри-
ниб турибди, бунда α ва β
бурчаклар $\vec{i}$ ва $\vec{j}$ бирлик век-
торлар билан $\vec{n}$ нормал век-
тор орасидаги бурчак косинус-
ларидир. p — координаталар
бошидан тўғри чизикка ту-
ширилган перпендикуляр
(нормал) узунлиги. Агар де-
карт координаталар система-

сига нисбатан тўғри чизик $Ax + By + C = 0$ нормаланган тенглама билан берилган ва $C < 0$ бўлса, у ҳолда A ва B лар Ox ўқининг мусбат йўналишида Op вектори то-
мон α бурчакнинг косинус ва синусларидан иборат бўлади:

$$\vec{n} = \{A; B\} = \{\cos \alpha; \sin \alpha\}.$$

Шундай қилиб, координаталар бошидан ўтмайдиган тўғри чизикнинг нормал тенграмасини

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

кўринишда ёзиш мумкин.

$M_0(x_0; y_0)$ нуқтадан нормаланган тўғри чизиккача бўлган d масофа қуйидагича аниқланади:

$$d = |Ax_0 + By_0 + C|, (A^2 + B^2 = 1)$$

ёки

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p|.$$

1-мисол. $4x - 3y - 10 = 0$ тўғри чизикнинг умумий тенгламасини нормалланган тенглама кўринишга келтиринг.

Ечиш. $A = 4$, $B = -3$, $C = -10$ бўлгани учун, N нормалловчи кўпайтувчи

$$N = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{1}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{5}$$

га тенг бўлади. Берилган тенгламанинг ҳамма хадларини $\frac{1}{5}$ га кўпайтирсак, берилган тўғри чизик тенгламаси ушбу

$$\frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 = 0$$

нормал кўринишга келади.

2-мисол. $x\sqrt{3} + y - 6 = 0$ тўғри чизик учун α оғиш бурчагини координаталар бошидан шу тўғри чизиккача бўлган p кесмани аниқланг.

Ечиш. Берилган тенгламани нормал кўринишга келтирамиз:

$$A = \sqrt{3}, B = 1, C = -6 < 0,$$

$$N = \frac{1}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

Берилган тенгламанинг ҳамма хадларини $N = \frac{1}{2}$ га кўпайтирамиз:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 3 = 0.$$

Бундан $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $p = -3$ ёки $\alpha = 30^\circ$ га эга бўламиз.

МАШҚЛАР

1. $A_1(3; -2)$, $A_2(5; 6)$, $A_3(-3; 4)$, $A_4(2; -2)$, $A_5(2; -1)$, $A_6(4; 3)$ нукталар берилган. Бу нукталардан қайси

бири $x+y=1$ тенглама билан аниқланган чизикда ётишини ва қайси бири ётмаслигини аниқланг.

2. Қуйидаги чизикларнинг чизмасини ясанг:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1) $x-y=0$; | 10) $y^2+xy=0$; |
| 2) $x+y=0$; | 11) $x^2-y^2=0$; |
| 3) $x+2=0$; | 12) $xy=0$; |
| 4) $x-3=0$; | 13) $y^2-16=0$; |
| 5) $y+5=0$; | 14) $x^2-x-12=0$; |
| 6) $y-3=0$; | 15) $y^2-3y+2=0$; |
| 7) $x=0$; | 16) $y^2x-7xy+10x=0$; |
| 8) $y=0$; | 17) $y= x $; |
| 9) $y^2-xy=0$; | 18) $x= y $; |
| | 19) $y+ x =0$; |
| | 20) $x+ y =0$; |
| | 21) $x^2+y^2=25$; |
| | 22) $2x^2+3y^2+5=0$; |
| | 23) $2x^2+y^2+1=0$; |
| | 24) $(x-3)^2+(y+1)^2=9$. |

3. Қуйидаги иккита чизикнинг кесишиш нуктасини топинг:

- 1) $x^2+y^2=16$ ва $x-y=0$;
- 2) $x^2+y^2-8x+4y+16=0$ ва $x+y=0$;
- 3) $x^2+y^2-2x+4y-3=0$ ва $x^2+y^2=25$;
- 4) $x^2+y^2-8x+10y+40=0$ ва $x^2+y^2=4$.

4. Ox ўқидан b масофада ётувчи нукталарнинг геометрик ўрнини тенгламасини чиқаринг.

5. $A(3; 6)$ нуктадан Ox ўқи билан кесишувчи мумкин бўлган нурлар ўтказилган. Уларнинг ўрталарининг геометрик ўрни тенгламасини тузинг.

6. $3x-2y-12=0$ тўғри чизикнинг координата ўқлари билан кесишган нуктасини аниқланг.

7. ABC учбурчак томонларининг тенгламалари берилган: $4x+3y-5=0$, $x-3y+10=0$, $x-2=0$. Учбурчак учларининг координаталарини аниқланг.

8. Параллелограммнинг иккита томонининг тенгламаси $8x+3y+1=0$, $2x+y-1=0$ ва диагоналларида бирининг тенгламаси $3x+2y+3=0$ берилган. Шу параллелограмм учларининг координаталарини аниқланг.

9. Қуйидаги тўғри чизикларнинг бурчак коэффициентини k ни ва Oy ўқини кесувчи b кесмасини аниқланг:

- 1) $5x-y+3=0$;
- 2) $2x+3y-6=0$;

$$3) 5x + 3y + 2 = 0;$$

$$4) 3x + 2y = 0;$$

$$5) y - 3 = 0.$$

10. $2x + 3y + 4 = 0$ тўғри чизик берилган. $M_0(2; 1)$ нуктадан ўтувчи ва 1) берилган тўғри чизикка параллел; 2) берилган тўғри чизикка перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламаси тузинг.

11. $6x - 2y + 5 = 0$ ва $4x + 2y - 7 = 0$ тўғри чизиклар орасидаги бурчакни аниқланг.

12. $5x - 2y - 11 = 0$, $x + 2y + 5 = 0$ ва $x - 2y + 1 = 0$ лар учбурчак томонларининг тенгламалари бўлса, шу учбурчак бурчакларини ва юзини топинг.

13. Тўғри чизиклар орасидаги бурчакни аниқланг:

а) $6x - 3y + 5 = 0$ ва $2x - 6y - 3 = 0$;

б) $\frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 1$ ва $\frac{x}{2} + \frac{y}{18} = 1$;

в) $\frac{x}{3} - \frac{y}{7} = 1$ ва $\frac{x}{7} + \frac{y}{3} = 1$.

14. Oy ўқдан 2 бирлик кесма ажратувчи ва $x - 2y + 3 = 0$ тўғри чизик билан 45° ли бурчак ҳосил қилувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

15. $A(2; 3)$ ва $B(5; 4)$ нукталардан ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг ва бу тўғри чизикнинг координата ўқлари билан кесишиш нукталарини аниқланг.

16. α ва β ларнинг қандай қийматида $(\alpha - 3\beta - 2)x + (2\alpha + 4\beta - 1)y - 3\alpha + \beta - 2 = 0$ тўғри чизик Ox ўқини 3, Oy ўқини 2 масштаб бирлигида кесиб ўтади.

17. Учбурчак учларининг координаталари берилган:

$$A(-4; 0); B(4; 6) \text{ ва } C(-1; -4);$$

а) унинг учала томонининг;

б) C учидан ўтказилган медианасининг;

в) B бурчаги биссектрисасининг;

г) A учидан BC томонига туширилган баландлигининг тенгламасини тузинг.

18. Координаталар бошидан тўғри чизикка туширилган перпендикулярнинг узунлиги $p = 4$. Бу перпендикуляр Ox ўқининг мусбат йўналиши билан $\alpha = 30^\circ$ ли бурчак ҳосил қилади. Тўғри чизикнинг нормал тенгламасини тузинг.

19. $A(3; -4)$ нукта координаталар бошидан тўғри чизикка туширилган перпендикулярнинг асоси. Тўғри чизикнинг нормал тенгламасини тузинг.

20. $A(3; 5)$ нуктадан $3x + 4y - 3 = 0$ тўғри чизикқача бўлган масофани топинг.

21. $5x - 12y - 12 = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлиб, ундан 4 масштаб бирлик узоқликда ётувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

22. $A(5; -1)$ нуктадан ҳамда $2x - 3y + 2 = 0$ ва $y - 4 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасидан ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

23. $4x - 2y + 5 = 0$ ва $3x + 4y + 1 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасидан ўтувчи ҳамда $7x - 3y + 5 = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

24. $3x - y = 0$ ва $x + 4y - 2 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасидан ўтиб, $2x + 7y = 0$ тўғри чизикқа перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

25. $2x + 3y - 12 = 0$ ва $3x + 2y - 12 = 0$ тўғри чизиклар орасидаги бурчаклар биссектрисаларининг тенгламаларини тузинг.

26. Квадратнинг битта учи $A(-1; 1)$ нуктада ётади. Унинг диагоналларида бири $x + 7y - 31 = 0$ тўғри чизик билан устма-уст тушади. Квадратнинг томонларини ва иккинчи диагонали тенгламасини тузинг.

27. Квадратнинг икки қарама-қарши учлари $A(1; 4)$ ва $C(5; 2)$ нукталарда ётади. Қолган иккита учининг координаталарини топинг.

28. Параллелограммнинг икки қўшни томонларининг тенгламалари $x - 2y = 0$; $x - y - 1 = 0$ ва диагоналлари-нинг кесишиш нуктаси $(3; -1)$ бўлса, унинг қолган томонларининг тенгламасини тузинг.

29. $2x - y - 2 = 0$ ва $x + 2y - 11 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасидан ҳамда координаталар бошидан 5 бирлик узоқликдан ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

30. $x - 3y = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлган ҳамда $3x - 2y - 1 = 0$ ва $4x - 5y + 1 = 0$ тўғри чизиклар кесишиб, юзи $\frac{7}{2}$ кв. бирликка тенг бўлган учбурчак

хосил қиладиган тўғри чизикнинг тенгламасини тузинг.

ФАЗОДА ТЕКИСЛИКЛАР ВА ТЎҒРИ ЧИЗИҚЛАР


1-§. Текисликнинг турли тенгламалари

1. Текисликнинг нормал вектори. Берилган нукта орқали ўтувчи текислик тенгламаси

Фазода Q текислик ва унга перпендикуляр бўлган $\vec{n} = \{A; B; C\}$ вектор берилган бўлсин, $\vec{n} \neq 0$ вектор Q текисликнинг нормали дейилади.

Ҳар қандай текислик фазода ўзининг бирор $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктаси ва $\vec{n}$ нормалининг берилиши билан тўла аниқланади.

Берилган нукта орқали ўтувчи ва $\vec{n}$ нормал векторга эга бўлган Q текислик тенгламасини келтириб чиқарамиз. Q текислигида ихтиёрий $M(x; y; z)$ нукта олиб, уни M_0 билан бирлаштириб, $\overline{M_0M}$ векторни ҳосил қиламиз (53-чизма). $Q \perp \vec{n}$ бўлгани учун $\overline{M_0M} \perp \vec{n}$ бўлади.



53-чизма

Уларнинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг бўлади:
 $\overline{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$.

$$\overline{M_0M} = \{x - x_0; y - y_0; z - z_0\}$$

бўлгани учун $\overline{M_0M} \cdot \vec{n} = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$ бўлади. Демак, Q текислик ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуктасининг координаталари

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (6.1)$$

тенгламани қаноатлантиради.

1-мисол. $M_0(1; -2; 3)$ нукта орқали ўтувчи ва $\vec{n} = \{2; 1; 4\}$ векторга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартидан: $x_0 = 1$; $y_0 = -2$; $z_0 = 3$ ва $A = 2$, $B = 1$, $C = 4$. Бу қийматларни (6.1) га қўямиз.

$$2(x-1) + 1(y+2) + 4(z-3) = 0.$$

Изланаётган текислик тенгламаси ушбу кўринишда бўлади:

$$2x + y + 4z - 12 = 0.$$

2. Текисликнинг умумий тенгламаси x, y , ва z ўзгарувчили биринчи даражали

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (6.2)$$

тенглама берилган бўлсин, бунда A, B, C коэффициентларидан камида биттаси нолдан фарқли деб фараз қиламиз. Аниқлик учун $A \neq 0$ деб, (6.2) тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$A\left(x + \frac{D}{A}\right) + B(y-0) + C(z-0) = 0. \quad (6.3)$$

(6.3) тенглама $M_0\left(-\frac{D}{A}; 0; 0\right)$ орқали ўтувчи ва $\vec{n} = \{A; B; C\}$ нормал вектори бўлган текислик тенгламаси бўлгани учун (6.2) ҳам текислик тенгламаси бўлиб, унга текисликнинг умумий тенгламасига кўра унинг координата ўқларига нисбатан жойлашуви тўғрисида фикр юритиш мумкин:

(6.2) текисликнинг умумий тенгламасига кўра унинг координата ўқларига нисбатан жойлашуви тўғрисида фикр юритиш мумкин:

а) агар $D = 0$ бўлса, (6.2) Q текислик координаталар бошидан ўтади;

б) агар $A = 0$ бўлса, (6.2) текислик Ox ўқига параллел, $B = 0$ бўлса, Q текислик Oy ўқига параллел, $C = 0$ бўлса, Q текислик Oz ўқига параллел бўлади.

Худди шунингдек, қуйидаги ҳоллар ҳам бўлиши мумкин:

$$A = 0 \Leftrightarrow Q \parallel (Ox), \quad A = D = 0 \Leftrightarrow Q \supset (Ox);$$

$$B = 0 \Leftrightarrow Q \parallel (Oy), \quad B = D = 0 \Leftrightarrow Q \supset (Oy);$$

$$C = 0 \Leftrightarrow Q \parallel (Oz), \quad C = D = 0 \Leftrightarrow Q \supset (Oz);$$

в) агар $A = B = 0$, $C \neq 0$ бўлса, Q текислик Oxz текисликка параллел бўлади. Хусусий ҳолда

$D=0$ бўлса, (6.2) тенглама $z=0$ дан иборат бўлиб, бу xOy текислик тенгламасидир. Шунга ўхшаш, $x = \frac{D}{A}$

тенглама Oyz текисликка параллел бўлган Q текислиكنинг тенгламасини беради, $x=0$ тенглама эса Oyz текисликини ифодалайди. $y=b$ эса $Q \parallel (Oxz)$ текисликини, $y=0$ эса Oxz текисликини ифодалайди.

3. Текислик ўзининг $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқтаси ва шу текисликка параллел бўлган иккита ноколлинеар $\vec{p} = \{\alpha_1; \beta_1; \gamma_1\}$, $\vec{q} = \{\alpha_2; \beta_2; \gamma_2\}$ векторларнинг берилиши билан тўлиқ аниқланади.

Текисликда ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуқта олиб $\overline{M_0M}$ векторни ҳосил қиламиз. $\overline{M_0M}$ вектор $\vec{p}$, $\vec{q}$ векторлар билан компланар бўлади. Векторлар компланар бўлса, у ҳолда уларнинг координаталаридан тузилган учинчи тартибли детерминант нолга тенг бўлади:

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (6.4)$$

(6.4) тенглама берилган нуқтадан ўтиб, берилган ноколлинеар икки векторга параллел бўлган текислик тенгламаси деб аталади.

2-мисол. $M_0(3; 2; 2)$ нуқтадан ўтиб, $\vec{p} = \{2; 4; 3\}$, $\vec{q} = \{1; 1; 2\}$ векторларга параллел бўлган текислиكنинг умумий тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масала шартига кўра (нуқта координаталари):

$$x_0=3; z_0=2; z_0=2,$$

$$\alpha_1=2; \beta_1=4; \gamma_1=3$$

$$\alpha_2=1; \beta_2=1; \gamma_2=2.$$

Бу қийматларни (6.4) формулага қўйиб, қуйидаги учинчи тартибли детерминантга эга бўламиз:

$$\begin{vmatrix} x-3 & y-2 & z-2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Детерминантни ҳисобласак, текислиكنинг изланган умумий тенгламасига эга бўламиз:

$$5x - y - 2z - 9 = 0.$$

4. Текисликнинг параметрик тенгламаси. Берилган $\overline{M_0M}$, $\vec{p}$, $\vec{q}$ векторлар бир текисликда ётган бўлсин, у ҳолда улар ўзаро чизиқли боғликли бўлади, яъни

$$\overline{M_0M} = t\vec{p} + n\vec{q}, (t, n \in R), \quad (6.5)$$

бу ерда t , n сонлар параметрлардир.

$$\overline{M_0M} = \{x - x_0; y - y_0; z - z_0\},$$

$$\vec{p}t = t\{\alpha_1; \beta_1; \gamma_1\} = \{t\alpha_1; t\beta_1; t\gamma_1\},$$

$$n\vec{q} = n\{\alpha_2; \beta_2; \gamma_2\} = \{n\alpha_2; n\beta_2; n\gamma_2\}$$

бўлгани учун

$$(x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k} = (t\alpha_1 + n\alpha_2)\vec{i} + \\ + (t\beta_1 + n\beta_2)\vec{j} + (t\gamma_1 + n\gamma_2)\vec{k}.$$

бундан

$$x = x_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 n,$$

$$y = y_0 + \beta_1 t + \beta_2 n, \quad (6.6)$$

$$z = z_0 + \gamma_1 t + \gamma_2 n.$$

(6.6) — текисликнинг параметрик тенгламаси деб аталади.

5. Уч нуктадан ўтувчи текислик тенгламаси. Бир текисликда ётган учта нукта текисликнинг вазиятини тўла аниқлайди.

$$M_1(x_1; y_1; z_1), M_2(x_2; y_2; z_2), M_3(x_3; y_3; z_3)$$

нукталар берилган бўлсин. Агар $M_0 = M_1$, $\vec{p} = \overline{M_1M_2}$, $\vec{q} = \overline{M_1M_3}$ деб олсак,

$$\overline{M_1M_2} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1\},$$

$$\overline{M_1M_3} = \{x_3 - x_1; y_3 - y_1; z_3 - z_1\}$$

бўлиб, M_0 нуктадан ўтувчи $\vec{p}$, $\vec{q}$ векторларга параллел бўлган текисликнинг (6.4) тенгламаси қуйидаги кўришни олади:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (6.7)$$

Бу уч нуктадан ўтувчи текислик тенгламасидан иборатдир.

3-мисол. $M_1(1; 2; 3)$, $M_2(-1; 3; 4)$, $M_3(2; 0; 1)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ечиш. (6.7) формулага кўра:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ -1-1 & 3-2 & 4-3 \\ 2-1 & 0-2 & 1-3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

Бундан изланаётган текислик тенгламасига эга бўламиз:

$$y - z + 1 = 0.$$

6. Текисликнинг координата ўқларидан ажратган кесмалари бўйича тенгламаси.

Q текислик координаталар бошидан ўтмасин ва Ox , Oy , Oz ўқларни мос равишда $M_1(a;0;0)$, $M_2(0;b;0)$, $M_3(0;0;c)$ нукталарда кесган бўлсин. Бу ҳолда (6.7) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{vmatrix} x-a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0.$$

Бу детерминантни ҳисоблаймиз:

$$bcx + acy + abz = abc.$$

Тенгликнинг барча ҳадларини abc га бўламиз:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (6.8)$$

(6.8) — текисликнинг координата ўқларидан ажратган кесмалари бўйича тенгламаси дейилади.

4-мисол. $3x + 2y - 5z - 30 = 0$ текисликнинг координата ўқлари билан кесишиш нукталарининг координаталарини топинг.

Ечиш. Берилган текислик тенгламасини (6.8) кўринишга келтирамиз, бунинг учун унинг ҳадларини 30 га бўламиз:

$$\frac{3x}{30} + \frac{2y}{30} - \frac{5z}{30} - 1 = 0$$

$$\frac{x}{10} + \frac{y}{15} - \frac{z}{6} = 1.$$

Демак, текислик Ox ўқини $(10; 0; 0)$, Oy ўқини $(0; 15; 0)$, Oz ўқини $(0; 0; -6)$ нуқталарда кесади.


5-мисол. Тенгламаси $6x + 2y - 3z - 6 = 0$ бўлган текисликни ясанг.

Ечиш. Бунинг учун аввало текисликнинг координата ўқлари билан кесишган нуқталарини тошамиз. Агар текислик тенгламасига $y=0$ ва $z=0$ қийматларни қўйсақ, унинг Ox ўқ билан кесишган нуқтаси топилади, яъни

$$6x + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6 = 0 \Rightarrow x = 1.$$

Шунга ўхшаш, $x=0$, $y=0$ деб $z=2$, $x=0$, $z=0$ деб $y=3$ ни тошамиз. Шундай қилиб берилган текислик $M_1(1; 0; 0)$, $M_2(0; 3; 0)$, $M_3(0; 0; 2)$ нуқталар орқали ўтар экан.

Шу нуқталарни координата ўқларидан топиб, бу нуқталардан ўтадиган текисликни ясаймиз (54-чизма).



54-чизма

Энди текисликнинг масалалар ечишда зарур бўлаган айрим тенгламаларини келтириб ўтамиз.

1. $\vec{r} \cdot \vec{n} + D = 0$ кўринишдаги тенглама текисликнинг вектор шаклдаги тенгламаси дейилади. Бунда $\vec{r}$ вектор текисликдаги ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуқтанинг радиус-вектори, $\vec{n} = \{A; B; C\}$ берилган $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка перпендикуляр бўлган вектор.

2. $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ кўринишдаги тенглама текисликнинг нормал тенгламаси деб аталади. Бунда p — координаталар бошидан текисликка туширилган перпендикулярнинг узунлиги, $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ бу перпендикулярнинг Ox , Oy , Oz координата ўқлари билан ҳосил қилган бурчакларининг косинуслари.

3. $\vec{n}^0 \cdot \vec{r} - p = 0$ кўринишдаги тенглама текисликнинг вектор шаклдаги нормал тенгламаси дейилади. Бунда

$\vec{n}_0 = \{\cos\alpha; \cos\beta; \cos\gamma\}$ берилган текисликка перпендикуляр бирлик вектор.

4. (6.2) умумий тенглamani нормал шаклга келтириш учун унинг ҳамма ҳадларини нормалловчи кўпайтувчи

$$N = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

га кўпайтириш керак. Бу ҳолда

$$\cos\alpha = \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \cos\beta = \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}};$$

$$\cos\gamma = \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \rho = \pm \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

бўлади. Агар $D < 0$ бўлса, ўнг томонда мусбат, $D > 0$ бўлса, манфий ишора олинади.

5. $n(\vec{r} - \vec{r}_1) = 0$ кўринишдаги тенглама берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нукта орқали ўтувчи текисликнинг вектор шаклдаги тенграмаси. Бунда $\vec{r}$ текисликнинг $M(x; y; z)$ нуктасининг радиус-вектори, $\vec{r}_1$ берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуктасининг радиус-вектори.

6. $[(\vec{r} - \vec{r}_1)(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)] \cdot (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) = 0$ кўринишдаги тенглама берилган M_1, M_2, M_3 нукталардан ўтувчи текисликнинг вектор кўринишдаги тенграмаси. Бунда $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ векторлар мос равишда M_1, M_2, M_3 нукталарнинг радиус-векторлари.

7. Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нукта орқали ўтиб, берилган $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка параллел бўлган текислик тенграмаси:

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0.$$

2-§. Икки текислик орасидаги бурчак.


Икки текисликнинг параллеллик ва перпендикулярлик шартлари

Фазода декарт координаталар системасида ўзаро кесишувчи Q_1 ва Q_2 текисликлар қуйидаги тенграмалари билан берилган бўлсин:

$$Q_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (6.9)$$

$$Q_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (6.10)$$

Икки текислик орасидаги бурчак деганда бу текисликлар ташкил қилган қўшни икки ёкли бурчаклардан бирини тушунамиз (55-чизма). Q_1 ва Q_2 текисликлар EF чизик бўйича кесишади. EF устида ихтиёрий A нуктани олиб, ундан ўтувчи ва Q_2



55-чизма

текисликда ўтувчи $AB \perp EF$, Q_1 текисликда ўтувчи $AC \perp EF$ чизикларни ўтказамиз. Шу AB ва AC чизиклар орасидаги бурчак Q_1 ва Q_2 текисликлар орасидаги текис бурчак φ бўлади. Агар $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ векторлар мос равишда Q_1 , Q_2 текисликларнинг нормал векторлари бўлса, у ҳолда бу икки текислик орасидаги бурчак $\vec{n}_1 = \{A_1; B_1; C_1\}$ ва $\vec{n}_2 = \{A_2; B_2; C_2\}$ нормал векторлар орасидаги бурчакка тенг бўлади.

Бизга маълумки, икки вектор орасидаги бурчак қуйидаги формула бўйича топилади:

$$\cos \varphi = \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

ёки

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (6.11)$$

(6.11) формулада $\cos \varphi = 0$ бўлса, у ҳолда иккита текислик ўзаро перпендикуляр бўлади ва бундан

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0 \quad (6.12)$$

га эга бўламиз. (6.12) формула иккита текисликнинг перпендикулярлик шarti бўлади.

Энди Q_1 ва Q_2 текисликлар параллел бўлсин, у ҳолда уларнинг $\vec{n}_1$ ва $\vec{n}_2$ нормал векторлари ҳам параллел бўлади.

Бизга маълумки, параллел векторлар учун $\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$ муносабат ўринлидир. Бундан

$$A_1 = \lambda A_2, B_1 = \lambda B_2, C_1 = \lambda C_2,$$

булардан

$$\lambda = \frac{A_1}{A_2}; \lambda = \frac{B_1}{B_2}; \lambda = \frac{C_1}{C_2}$$

ёки

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad (6.13)$$

тенгликларга эга бўламиз. (6.13) — икки текисликнинг параллелик шartидир.

Мисол. $3x - 5y + 6z - 9 = 0$ ва $5x + 6y + 3z + 10 = 0$ текисликлар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. Биринчи текислик тенгламасидан

$$A_1 = 3; B_1 = -5; C_1 = 6,$$

иккинчи текислик тенгламасидан

$$A_2 = 5, B_2 = 6; C_2 = 3$$

ларни аниқлаб, бу қийматларни (6.11) формулага қўямиз:

$$\cos \varphi = \frac{3 \cdot 5 - 6 \cdot (-5) + 6 \cdot 3}{\sqrt{3^2 + 5^2 + 6^2} \cdot \sqrt{5^2 + 6^2 + 3^2}} = \frac{3}{70}.$$

Бундан $\cos \varphi = \frac{3}{70} \Rightarrow \varphi = \arccos \frac{3}{70}$. Демак, икки текислик орасидаги бурчак $\varphi = \arccos \frac{3}{70}$ га тенг.

3-§. Учта текисликнинг кесишиш нуқтаси.
Нуқтадан текисликкача бўлган масофа

Учта Q_1 , Q_2 , Q_3 текислик тенгламалари билан берилган бўлсин. Бу текисликларнинг кесишиш нуқтасини топиш учун уларнинг тенгламаларидан тузилган қуйидаги уч номаълумли учта чизикли тенглама системасини ечиш керак:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \\ A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0. \end{cases} \quad (6.14)$$

Агар (6.14) системанинг детерминанти

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

бўлса, у ҳолда система ягона ечимга эга, яъни учта текислик битта нуқтада кесишади.

1-мисол. Қуйидаги текисликларнинг кесишиш нуқтасини топинг:

$$2x - 3y + z + 2 = 0, \quad 3x + 4y + 2z - 5 = 0, \quad x + y + 3z + 1 = 0.$$


Ечиш. Бу тенгламалардан қуйидаги системани тузиб, уни ечамиз:

$$\begin{cases} 2x - 3y + z + 2 = 0, \\ 3x + 4y + 2z - 5 = 0, \\ x + y + 3z + 1 = 0. \end{cases}$$

Система ечими $x=1$, $y=1$, $z=-1$.

Демак, текисликлар $M(1; 1; -1)$ нуқтада кесишар экан.

Энди фазода декарт координаталар системасида берилган $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуқта билан $Q: Ax + By + Cz + D = 0$ текислик орасидаги масофани топиш формуласини чиқарамиз. Бунинг



56-чизма

учун M_0 нуктадан текисликка туширилган перпендикулярнинг асосини $M(x_1; y_1; z_1)$ билан белгилаймиз (56- чизма).

$$d = \rho(M, M_0) = \rho(M_0, Q)$$

биз излаётган масофа бўлади. Текислик тенгламасидан бизга маълумки, унинг нормал вектори $\vec{n} = \{A; B; C\}$ га тенг. $\vec{n}$ ва $\overrightarrow{MM_0}$ векторлар ўзаро коллинеар векторлардир. Бу векторларнинг скаляр кўпайтмасини топамиз:

$$\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{n} = |\overrightarrow{MM_0}| |\vec{n}| \cos(\overrightarrow{MM_0}, \vec{n}) = \rho(M_0, Q) \cdot |\vec{n}|,$$

$$d = \rho(M_0, Q) = \frac{|\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}. \quad (6.15)$$

(6.15) формулани координаталарда ифодалаймиз:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{n} &= A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1) = \\ &= Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1). \end{aligned}$$

M нукта берилган текисликда ётгани учун $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$ бўлади ва бундан $Ax_1 + By_1 + Cz_1 = -D$. У ҳолда, скаляр кўпайтманинг қиймати

$$\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{n} = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$$

ва

$$|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

эканини эътиборга олсак, (6.15) формула

$$d = \rho(M_0, Q) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (6.16)$$

кўринишга келади. (6.16) формула берилган нуктадан текисликкача бўлган масофани ҳисоблаш формуласидир.

2- мисол. $M_0(2; 1; 0)$ нуктадан $2x - y + 2z + 3 = 0$ текисликкача бўлган масофани топинг.

Ечиш. Берилишига кўра:

$$x_0 = 2; y_0 = 1; z_0 = 0;$$

$$A = 2; B = -1; C = 2; D = 3.$$

Буларни (6.16) формулага қўямиз, у ҳолда

$$d = \rho(M_0, Q) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Демак, M_0 нуктадан Q текисликкача бўлган масофа $d=2$ бирликка тенг экан.

4-§. Фазода тўғри чизик тенгламасининг берилиш усуллари


1. Тўғри чизикнинг умумий тенгламаси
Тўғри чизик иккита Q_1 ва Q_2 текисликларнинг кесишиш чизиги сифатида берилиши мумкин. Бу текисликларнинг тенгламалари берилган бўлсин:

$$\begin{cases} Q_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ Q_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (6.17)$$

Агар бу текисликлар параллел бўлмаса (яъни уларнинг нормал векторлари коллинеар бўлмаса), у ҳолда (6.17) система тўғри чизикни (иккита текисликнинг кесишиш чизиги) аниқлайди. (6.17) тенглама тўғри чизикнинг умумий тенгламаси дейилади.

2. Тўғри чизикнинг вектор ва параметрик тенгламалари

Тўғри чизик ўзининг $M_0(x_0; y_0; z_0)$ нуктаси (тўғри чизикда ётувчи), йўналтирувчи $\vec{s} = \{m; n; p\}$ векторининг берилиши билан аникланади (57- чизма). l тўғри



чизикнинг ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуктасини олиб, M_0M векторни ҳосил қиламиз. Бу M_0M ва $\vec{s}$ векторлар коллинеар бўлгани учун:

$$\overrightarrow{M_0M} = t\vec{s} \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (6.18)$$

Агар $\overline{OM}_0 = \vec{r}_0$, $\overline{OM} = \vec{r}$ деб олсак ва чизмадан $\overline{M_0M} = \overline{OM} - \overline{OM}_0$ эканлигини ҳисобга олсак, (6.18) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}. \quad (6.19)$$

(6.19) тенглама тўғри чизиқнинг вектор тенгламаси дейилади. M ва M_0 нуқталар радиус-векторларининг

$$\overline{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

$$\overline{OM}_0 = x_0\vec{i} + y_0\vec{j} + z_0\vec{k},$$

$$t\vec{s} = t m\vec{i} + t n\vec{j} + t p\vec{k}$$

қийматларини (6.19) формулага қўямиз ва икки векторнинг тенглик хоссасига кўра

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (6.20)$$

тенгликларни ҳосил қиламиз. (6.20) кўринишдаги тенгламалар системасига тўғри чизиқнинг параметрик тенгламалари дейилади, t ўзгарувчи параметр дейилади.

3. Тўғри чизиқнинг каноник тенгламаси

(6.20) тенгламалар системасидан t параметрини топамиз:

$$t = \frac{x - x_0}{m}, t = \frac{y - y_0}{n}, t = \frac{z - z_0}{p}.$$

Бундан

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}. \quad (6.21)$$

(6.21) тенглама тўғри чизиқнинг каноник тенгламаси дейилади.

Хусусий ҳолда, $\vec{s}$ йўналтирувчи вектор бирлик вектор бўлганда, яъни

$$\vec{s} = \vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\cos\beta + \vec{k}\cos\gamma$$

бўлса, у ҳолда (6.21) тенглама

$$\frac{x - x_0}{\cos\alpha} = \frac{y - y_0}{\cos\beta} = \frac{z - z_0}{\cos\gamma}$$

кўринишга эга бўлади.

Тўғри чизик координаталар ўқидан бирига, масалан, Ox ўққа перпендикуляр бўлсин. У ҳолда $m=0$ бўлиб, (6.20) параметрик тенгламалар қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned}x &= x_0, \\ y &= y_0 + nt, \\ z &= z_0 + pt.\end{aligned}$$

Бундан t параметрни йўқотиб, тўғри чизикнинг қуйидаги кўринишдаги тенгламасига эга бўламиз:

$$\begin{cases} x - x_0 = 0 \\ \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \end{cases}.$$

Бу ҳолда тўғри чизик тенгламасини формал равишда қуйидагича каноник кўринишда ёзишга келишиб оламиз:

$$\frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

Шунга ўхшаш, тўғри чизикнинг

$$\frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{p}$$

каноник тенгламасига $x=x_0$, $y=y_0$ тенгламалар билан берилган тўғри чизик мос келади. Бу тўғри чизик Oz ўққа параллел, хусусан, $\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z}{1}$ тенглама Oz ўқнинг каноник тенгламасидир.

4. Икки нуқтадан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси.

Декарт координаталар системасида $M_0(x_0; y_0; z_0)$ ва $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқталар берилган бўлсин. Бу нуқталардан ўтувчи тўғри чизик тенгламасини топиш учун M_0M_1 векторини чизиб оламиз. Бу вектор $M_0M_1 = \{x_1 - x_0; y_1 - y_0; z_1 - z_0\}$ га тенгдир. Агар тўғри чизикнинг йўналтирувчи векторини $\vec{s} = M_0M_1$ деб олсак, у ҳолда (6.21) формула қуйидаги кўринишни олади:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}. \quad (6.22)$$

(6.22) формула M_0 ва M_1 нукталардан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси дейилади. Бу формулани

$$\begin{cases} x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \\ y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \\ z = z_0 + (z_1 - z_0)t \end{cases} \quad (6.23)$$

кўринишда ҳам ёзиш мумкин. (6.23) — икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизикнинг параметрик кўринишдаги тенгламасидир.

1-мисол. $M_0(3; 4; 1)$ нуктадан ўтган ва йўналтирувчи вектори $\vec{s} = \{1; 2; 3\}$ бўлган тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Мисол шартига кўра:

$$x_0 = 3, y_0 = 4, z_0 = 1, m = 1, n = 2, p = 3.$$

Бу қийматларни (6.21) формулага қўйсақ, изланаётган тўғри чизик тенгламаси ҳосил бўлади:

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-1}{3}.$$

2-мисол. $M_1(-3; 1; 2)$ ва $M_2(8; -2; 5)$ нукталардан ўтувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган икки нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламаси (6.20) га M_1 ва M_2 нукталарнинг координаталарини қўйсақ,

$$\frac{x+3}{8+3} = \frac{y-1}{-2-1} = \frac{z-2}{5-2}$$

ёки

$$\frac{x+3}{11} = \frac{z-1}{-3} = \frac{z-2}{3}$$

тўғри чизик тенгламасига эга бўламиз.

$$\begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0, \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

система билан берилган тўғри чизик тенгламасини каноник шаклга келтиринг.

Ечиш. Берилган кўринишдаги тўғри чизик тенгламасини каноник кўринишга келтириш учун бу тўғри чизикка тегишли бирор нуктани ва $\vec{s}$ йўналтирувчи векторни аниқлаш керак. Берилган тўғри чизикка

тегишли M_0 нуктанинг координаталарини топиш учун координаталаридан ихтиёрий бирини нолга тенглаймиз.

Масалан, $z=0$ бўлсин. У ҳолда берилган тенглама

$$\begin{cases} 2x-3y=9, \\ x-2y=-3 \end{cases}$$

кўринишда бўлади. Бундан $x=27$ ва $y=15$ ларни топамиз. Демак, тўғри чизиқнинг нукталаридан бири $M_0(27; 15; 0)$ экан. Тўғри чизиқнинг йўналтирувчи $\vec{s}$ векторини

$$\vec{n}_1=\{2; -3; -3\} \text{ ва } \vec{n}_2=\{1; -2; 1\}$$

нормал векторларнинг вектор кўпайтмасидан

$$\vec{s}=[\vec{n}_1, \vec{n}_2]$$

ёки

$$m:n:p = \begin{vmatrix} B & C \\ B_1 & C_1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} C & A \\ C_1 & A_1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} A & B \\ A_1 & B_1 \end{vmatrix}$$

пропорциядан аниқлаш мумкин.

Бундан

$$m:n:p = \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-9):(-5):(-1).$$

Демак, тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s}=\{9; 5; 1\}$ ва (6.21) формулага кўра унинг тенгламаси

$$\frac{x-27}{9} = \frac{y-15}{5} = \frac{z}{1}$$

кўринишда бўлади.

4-мисол. Координата ўқлари билан $\alpha=60^\circ$; $\beta=45^\circ$; $\gamma=120^\circ$ бурчаклар ташкил этувчи ва $M_0(-1; 0; 5)$ нуктадан ўтувчи тўғри чизиқнинг каноник ва параметрик тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Изланаётган тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s}$ ни бирлик вектор деб олиш мумкин. Унинг координаталари йўналтирувчи косинусларидан иборат бўлади, яъни

$$\begin{aligned} \vec{s} &= \vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\cos\beta + \vec{k}\cos\gamma = \vec{i}\cos60^\circ + \vec{j}\cos45^\circ + \\ &+ \vec{k}\cos120^\circ = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}. \end{aligned}$$

(6.21) формуладан фойдаланиб тўғри чизикнинг каноник тенгламасини топамиз:

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-0}{\sqrt{2}} = \frac{z-5}{-1}$$

• ёки ҳамма махражини 2 га кўпайтурсак,

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{\sqrt{2}} = \frac{z-5}{-1};$$

топилган нисбатларнинг ҳар бирини t га тенглаб:

$$t = \frac{x+1}{1}, t = \frac{y}{\sqrt{2}}, t = \frac{z-5}{-1}$$

тўғри чизикнинг қуйидаги параметрик тенгламасига эга бўламиз:

$$x = -1 + t; y = \sqrt{2}t; z = 5 - t.$$

5-§. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак.

Тўғри чизикларнинг параллеллик ва перпендикулярлик шартлари

Фазода иккита

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$$

ва

(6.24)

$$\frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

тўғри чизик берилган бўлсин. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак деб бу тўғри чизикларнинг йўналтирувчи векторлари орасидаги бурчакка айтилади.

Биринчи тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s}_1 = \{m_1; n_1; p_1\}$, иккинчи тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s}_2 = \{m_2; n_2; p_2\}$ бўлсин. У ҳолда икки тўғри чизик орасидаги бурчак икки вектор орасидаги бурчак каби

$$\cos \varphi = \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \quad (6.25)$$

формула ёрдамида аниқланади. (6.25) формуладан эса қуйидаги келиб чиқади:

$\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$ бўлса $m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$ бўлиб, тўғри чизиклар перпендикуляр бўлади. $\vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2$ бўлса, $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$ бўлиб, тўғри чизиклар параллел бўлади.

1-мисол. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+5}{3}$ ва $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{1}$ тўғри чизиклар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. Берилган тўғри чизикларнинг мос йўналтирувчи векторлари

$$\vec{s}_1 = \{-1; 2; 3\} \text{ ва } \vec{s}_2 = \{2; 3; 1\}$$

бўлгани учун (6.25) формулага кўра

$$\cos \varphi = \frac{-1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 3^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ.$$

2-мисол. $M_1(4; 1; 2)$ нукта орқали ўтувчи

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{4} \text{ ва } \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{2}$$

тўғри чизикларга перпендикуляр тўғри чизик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган M_1 нукта орқали ўтувчи тўғри чизик тенгламасини ёзамиз:

$$\frac{x-4}{m} = \frac{y-1}{n} = \frac{z-2}{p}$$

Бу тўғри чизикнинг $\vec{s} = \{m; n; p\}$ йўналтирувчи вектори сифатида берилган тўғри чизикларнинг

$$\vec{s}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} \text{ ва } \vec{s}_2 = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

йўналтирувчи векторларига перпендикуляр бўлган векторни олиш мумкин. Шунинг учун $\vec{s}$ векторни $\vec{s}_1$ ва $\vec{s}_2$ векторларнинг вектор кўпайтмаси деб оламиз:

$$\vec{S} = [\vec{S}_1, \vec{S}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 8\vec{j} - 5\vec{k}.$$

Бундан: $m = -2$, $n = 8$, $p = -5$. Бу кийматларни ўрнига қўйиб изланаётган тўғри чизик тенгламасига эга бўламиз:

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-2}{-5}.$$

6-§. Фазода тўғри чизик ва текислик

Фазода

$$l: \frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}$$

тўғри чизик ва

$$Q: Ax + By + Cz + D = 0 \quad (6.26)$$

текислик берилган бўлсин. l тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s} = \{m; n; p\}$, Q текисликни нормал вектори эса $\vec{n} = \{A; B; C\}$ бўлади.

Қандай шарт бажарилганда l тўғри чизик билан Q текислик ўзаро параллел ва перпендикуляр бўлишини кўрсатамиз.

а) Агар l тўғри чизикнинг $\vec{s}$ йўналтирувчи вектори ва Q текисликнинг $\vec{n}$ нормал вектори коллинеар бўлса, у ҳолда $l \perp Q$ бўлади, яъни $\vec{n} = t\vec{s}$ бўлиб, бундан

$$A = mt, B = nt, C = pt$$

ёки

$$\frac{A}{m} = t, \frac{B}{n} = t, \frac{C}{p} = t,$$

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$$

келиб чиқади.

б) Агар $\vec{s}$ ва $\vec{n}$ векторлар ўзаро перпендикуляр бўлса, у ҳолда $l \parallel Q$ бўлади ва $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$ (скаляр кўпайтма) бўлиб, бундан

$$Am + Bn + pC = 0$$

га эга бўламиз.

Энди l тўғри чизик билан Q текисликнинг кесишиш нуқтаси координаталарини топишни кўрайлик. l тўғри чизикнинг параметрик тенгламаларини ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} x = x_1 + mt, \\ y = y_1 + nt, \\ z = z_1 + pt. \end{cases} \quad (6.27)$$

t параметрнинг ҳар бир қийматига тўғри чизиқнинг битта нуқтаси мос келади.

(6.27) даги x , y , z ларнинг қийматларини (6.26) га қўйсақ, t параметрнинг қийматини топиш мумкин бўлган тенглама ҳосил бўлади:

$$(Am + Bn + Cp)t + (Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D) = 0. \quad (6.28)$$

Бу тенгламани текширамыз. Бунда қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

1) l тўғри чизиқ ва Q текислик параллел бўлмасин. У ҳолда текисликнинг нормали $\vec{n} = \{A; B; C\}$ ва тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s} = \{m; n; p\}$ ўзаро перпендикуляр бўлмайди ва уларнинг скаляр кўпайтмаси $\vec{s} \cdot \vec{n} \neq 0$ ёки $Am + Bn + Cp \neq 0$ бўлади. Бу ҳолда l тўғри чизиқ Q текислик билан кесишади ва (6.28) дан t ни топиш мумкин:

$$t = - \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{Am + Bn + Cp}. \quad (6.29)$$

Топилган t ни (6.26) га қўйиб, кесишиш нуқтасининг координаталари топилади.

2) Агар

$$\begin{aligned} Am + Bn + Cp &= 0, \\ Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D &\neq 0 \end{aligned}$$

бўлса, $l \cap Q = \emptyset$ бўлади.

3) Агар

$$\begin{aligned} Am + Bn + Cp &= 0 \\ Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D &= 0 \end{aligned}$$

бўлса, $l \subset Q$ бўлади, бу ҳолда тўғри чизиқ Q текисликда ётади.

Тўғри чизиқ билан текислик орасидаги бурчак деб тўғри чизиқ билан унинг шу текисликдаги ортогонал проекцияси орасидаги бурчакка айтилади. Тўғри чизиқ билан Q текислик орасидаги бурчак

$$\sin \alpha = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad (6.30)$$

формула ёрдамида топилади.

- Энди текислик ва тўғри чизикка доир машқлар бажаришда зарур бўладиган тенгламаларни келтириб ўтамиз.

1. Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нукта орқали ўтиб, берилган

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

тўғри чизикка параллел бўлган тўғри чизик тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}. \quad (6.31)$$

2. Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нукта орқали ўтиб, берилган $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликка перпендикуляр бўлган тўғри чизик тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{A} = \frac{y-y_1}{B} = \frac{z-z_1}{C}. \quad (6.32)$$

3. $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ тўғри чизик билан $Ax + By + Cz + D = 0$ текислик орасидаги бурчак:

$$\sin \varphi = \pm \frac{Am + Bn + Cp}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}. \quad (6.33)$$

4. Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуктадан ва берилган

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

тўғри чизикдан ўтган текислик тенгламаси:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_0-x_1 & y_0-y_1 & z_0-z_1 \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0.$$

5. $\frac{x-x_0}{m_1} = \frac{y-y_0}{n_1} = \frac{z-z_0}{p_1}$ ва $\frac{x-x_0}{m_2} = \frac{y-y_0}{n_2} = \frac{z-z_0}{p_2}$

тўғри чизикларнинг бир текисликда ётиш шarti:

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$6. \quad \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \quad \text{тўғри чизиқнинг}$$

$Ax + By + Cz + D = 0$ текисликда ётиш шarti:

$$\begin{cases} Am + Bn + Cp = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 = 0. \end{cases}$$

7. Берилган $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуктадан ўтиб,

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

тўғри чизиққа перпендикуляр бўлган текислик тенгламаси:

$$m(x-x_1) + n(y-y_1) + p(z-z_0) = 0. \quad (6.34)$$

1-мисол. $M_0(2; -3; 4)$ нукта орқали ўтиб

$$\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{4} \quad \text{ва} \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{3}$$

тўғри чизиқларга параллел текислик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган M_0 нукта орқали ўтувчи текисликлар тенгламасини ёзиб оламиз:

$$A(x-2) + B(y+3) + C(z-4) = 0.$$

Изланаётган текислик шартга кўра берилган икки тўғри чизиққа параллел бўлгани учун унинг $\vec{n} = \{A; B; C\}$ нормал вектори берилган тўғри чизиқларнинг $s_1 = \{2; 3; 4\}$ ва $s_2 = \{2; 1; 3\}$ йўналтирувчи векторларига перпендикуляр бўлиши керак. Шунинг учун

$$\vec{n} = [\vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}.$$

Бундан $A=5$; $B=2$; $C=-4$. Топилган қийматларни юқоридаги тенгламага қўйиб, изланаётган

$$5(x-2) + 2(y+3) - 4(z-4) = 0 \quad \text{ёки}$$

$$5x - 2y - 4z + 12 = 0 \quad \text{тенгламани ҳосил қиламиз.}$$

2-мисол.

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-5}{2}$$

тўғри чизик ва $2x + 3y + 2z + 2 = 0$ текислик орасидаги бурчакни ва уларнинг кесишиш нуқтасининг координаталарини топинг.

Ечиш. Тўғри чизик ва текислик орасидаги бурчак

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

формула ёрдамида аникланади. Бу формулага $A=2$, $B=3$, $C=2$, $m=2$, $n=3$, $p=2$ ларни қўйиб топамиз:

$$\sin \varphi = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2} \sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{17}{17} = 1.$$

Демак,

$$\sin \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 90^\circ = \frac{\pi}{2}.$$

Энди тўғри чизик ва текисликнинг кесишиш нуқтасининг координаталарини топамиз, бунинг учун тўғри чизик тенгламасини параметрик кўринишда ёзиб оламиз:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-5}{2} = t,$$

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -1 + 3t, \\ z = 5 + 2t. \end{cases}$$

Буни текислик тенгламасига қўйиб, t ни топамиз:

$$2(1 + 2t) + 3(-1 + 3t) + 2(5 + 2t) + 2 = 0 \Rightarrow t = -\frac{11}{17}.$$

t нинг бу қийматини тўғри чизикнинг параметрик тенгламаларига қўйсақ:

$$x = 1 + 2 \cdot \left(-\frac{11}{17}\right) = -\frac{5}{17},$$

$$y = -1 + 3 \cdot \left(-\frac{11}{17}\right) = -\frac{50}{17},$$

$$z = 5 + 2 \cdot \left(-\frac{11}{17}\right) = \frac{63}{17}.$$

Демак, тўғри чизик ва текислик $M \left(-\frac{5}{17}; \frac{50}{17}; \frac{63}{17} \right)$ нуктада кесишар экан.

7-§. Текисликлар боғлами (дастаси)

Берилган l тўғри чизик орқали ўтувчи текисликлар тўпламига текисликлар боғлами (дастаси), l тўғри чизикқа эса боғлам ўқи дейилади.

Боғлам ўқи l қуйидаги тенгламалар билан берилган бўлсин:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (6.35)$$

(6.35) тенгламалар системасининг иккинчи тенгламасини ўзгармас λ сонга ($\lambda \in R$) кўпайтирамиз ва биринчи тенгламага қўшамиз:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0. \quad (6.36)$$

(6.36) тенглама x, y, z ларга нисбатан биринчи тартибли, демак λ нинг ихтиёрий сонли қийматида бирор текисликни аниқлайди. (6.36) тенглама (6.35) тенгламанинг натижаси бўлгани учун, (6.35) тенгламани қаноатлантирадиган нуктанинг координаталари (6.36) тенгламани ҳам қаноатлантиради.

Демак, λ нинг ихтиёрий сонли қийматида (6.36) тенглама (6.35) тўғри чизик орқали ўтувчи текислик тенгламасини беради. (6.35) тенглама билан берилган l ўқли текисликлар боғламининг

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

текисликдан ташқари ҳар қандай текисликларини (6.36) кўринишда ифодалаш мумкин, акс ҳолда λ нинг қийматини топиш мумкин бўлмай қолади.

(6.36) тенглама текисликлар боғламининг тенгламаси дейилади.

Мисол.

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{5}$$

тўғри чизик орқали ўтувчи ва $3x + 3y - z + 1 = 0$ текисликка перпендикуляр текислик тенгламасини топинг.

Е ч и ш. Берилган тўғри чизикнинг *Оху* ва *Оуз* текислик-
даги проекциялардан иборат тўғри чизик тенгламала-
рини ёзиб оламиз:

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{-2}, \quad \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{5}$$

ёки

$$2x + 3y + 7 = 0 \text{ ва } 5y - 2z + 5 = 0$$

текисликларнинг кесишмаси деб оламиз. Булардан
фойдаланиб текисликлар боғламининг тенгламасини
тузамиз:

$$2x + 3y + 7 + \lambda(5y - 2z + 5) = 0$$

ёки

$$2x - (3 + 5\lambda)y - 2\lambda z + (7 + 5\lambda) = 0. \quad (A)$$

Бу текислик масала шартига кўра берилган текисликка
перпендикуляр бўлиш шартидан фойдаланамиз.

(А) текислик берилган текисликка перпендикуляр
бўлгани учун уларнинг нормал векторлари

$$\vec{n}_1 = 2\vec{i} + (3 + 5\lambda)\vec{j} - 2\lambda\vec{k} \text{ ва } \vec{n}_2 = 3\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$$

нинг скаляр кўпайтмаси нолга тенг бўлиши керак:

$$3 \cdot 2 + 3(3 + 5\lambda) - 2\lambda = 0.$$

Бу тенгламани ечиб $\lambda = -\frac{15}{17}$ ни топамиз. λ нинг қийма-
тини боғлам тенгламасига қўйиб, масала шартини
қаноатлантирувчи қуйидаги текислик тенгламасини
хосил қиламиз:

$$2x + 3y + 7 - \frac{15}{17}(5y - 2z + 5) = 0$$

ёки

$$17x - 12y + 15z + 22 = 0$$

М А Ш Қ Л А Р

1. $2x + 5y + 3z - 15 = 0$ текисликни ясанг.
2. $M_1(2; 1; -1)$ нуктадан ўтувчи ва нормали $\vec{n} = \{3; -2; 1\}$ бўлган текислик тенгламасини тузинг.
3. Координаталар бошидан ўтувчи ва нормали $\vec{n} = \{4; 5; -3\}$ бўлган текислик тенгламасини тузинг.

4. $M_1(4; 3; 2)$ ва $M_2(3; 6; 8)$ нукталар берилган. M_1 нуктадан ўтиб M_1M_2 векторга перпендикуляр бўлган текислик тенгламасини тузинг.

5. $M(4; 3; 5)$ нукта координаталар бошидан текисликка туширилган перпендикулярнинг асоси. Шу текислик тенгламасини тузинг.

6. $M_1(3; 4; -5)$ нуктадан ўтувчи ҳамда $\vec{r}_1 = \{1; -2; 1\}$ ва $\vec{r}_2 = \{3; 1; -1\}$ векторларга параллел бўлган текислик тенгламасини тузинг.

7. $M_1(2; 0; 2)$, $M_2(4; -1; -1)$ ва $M_3(3; -1; 2)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

8. Қуйидаги жуфт текисликларнинг ўзаро параллел эканлигини аниқланг:

$$1) 2x - 3y + 5z + 3 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x - 3y + 5z - 7 = 0;$$

$$2) 2x + y + 2z - 1 = 0 \quad \text{ва} \quad 4x + 2y - 4z + 5 = 0;$$

$$3) 2x - 6z - 7 = 0 \quad \text{ва} \quad x - 3z + 2 = 0.$$

9. Қуйидаги жуфт текисликларнинг ўзаро перпендикуляр эканлигини аниқланг:

$$1) x + 9y - 3z + 2 = 0 \quad \text{ва} \quad 3x - y - 2z - 5 = 0;$$

$$2) x - y - z + 5 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x + 3y - z - 3 = 0;$$

$$3) x + 2z - 3 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x - 5y + z = 0.$$

10. a ва b нинг қандай қийматларида қуйидаги жуфт текисликлар ўзаро параллел ва перпендикуляр бўлишини аниқланг:

$$1) 2x + ay + 3z - 5 = 0 \quad \text{ва} \quad bx - 6y - 6z + 2 = 0;$$

$$2) 3x - y + az - 9 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x + by + 2z - 3 = 0;$$

$$3) 3x - 5y + az - 3 = 0 \quad \text{ва} \quad x + 3y - 2z + 5 = 0;$$

$$4) 5x + y - 3z - 3 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x + ay - 3z + 1 = 0.$$

11. Қуйидаги жуфт текисликлар орасидаги бурчакни топинг:

$$1) x + y - 1 = 0 \quad \text{ва} \quad 2x - y + \sqrt{3}z + 1 = 0;$$

$$2) x - y\sqrt{2} + z - 1 = 0 \quad \text{ва} \quad x + y\sqrt{2} - z + 3 = 0;$$

$$3) x + 2y + 2z - 3 = 0 \quad \text{ва} \quad 16x + 12y - 15z - 1 = 0;$$

$$4) 6x + 3y - 2z = 0 \quad \text{ва} \quad 3x + 2y + 6z - 12 = 0.$$

12. Қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи текисликлар тенгламасини тузинг:

1) $M_1(3; -3; 2)$ нуктадан ўтиб Oxy текисликка параллел;

2) $M_2(4; -2; 1)$ нуктадан ўтиб Oxz текисликка параллел;

3) $M_3(-1; 2; -5)$ нуктадан ўтиб Oyz текисликка параллел бўлган.

13. Қуйидаги текисликларнинг тенгламаларини нормал кўринишга келтиринг:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1) $3x - 6y + 2z + 14 = 0;$ | 2) $2x - 2y + z - 18 = 0;$ |
| 3) $3x - 6y + 2z + 21 = 0;$ | 4) $4x - 6y - 12z - 11 = 0;$ |
| 5) $6x - 3y + 2z + 35 = 0;$ | 6) $3x - 4z - 15 = 0;$ |
| 7) $5y - 12z + 26 = 0;$ | 8) $3x - 4y - 1 = 0.$ |

14. Қуйидаги жуфт параллел текисликлар орасидаги масофани ҳисобланг:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) $6x - 18y - 9z - 28 = 0;$ | 2) $30x - 32y + 24z - 75 = 0;$ |
| $4x - 12y - 6z - 7 = 0;$ | $15x - 16y + 12z - 25 = 0;$ |
| 3) $x - 2y - 2z - 6 = 0;$ | 4) $4x - 6y + 12z + 21 = 0;$ |
| $x - 2y - 2z - 12 = 0;$ | $2x - 3y + 6z - 14 = 0;$ |
| 5) $4x - 2y + 4z - 21 = 0;$ | 6) $16x + 12y - 15z + 50 = 0;$ |
| $2x - y + 2z + 9 = 0;$ | $16x + 12y - 15z + 25 = 0.$ |

15. $M_1(1; 5; 3)$ ва $M_2(2; 3; -1)$ нукталардан ўтиб $3x - y + 3z + 15 = 0$ текисликка перпендикуляр бўлган текислик тенгламасини тузинг.

16. $M_1(3; 2; 1)$ нуктадан ўтиб, $x - y + z - 7 = 0$ ва $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ текисликларга перпендикуляр бўлган текислик тенгламасини тузинг.

17. $\vec{n} = \{4; 3; 12\}$ векторга перпендикуляр бўлиб, координаталар бошидан $\rho = 3$ бирлик масофада ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

18. Ўзаро параллел $2x + 3y - 4z - 3 = 0$ ва $4x + 6y - 8z - 1 = 0$ текисликлар берилган. Бу текисликларга параллел бўлиб уларнинг ўртасида ётувчи текислик тенгламасини тузинг.

19. Параллелепипед учта ёгининг тенгламалари берилган:

$$\begin{aligned} x - 3y + 4z - 12 &= 0; \\ y + 2z - 5 &= 0 \text{ ва } x + 4 = 0. \end{aligned}$$

Учларидан биттаси $A(4; -3; 2)$ нуктада ётса, y ҳолда қолган учта ёгининг тенгламаларини тузинг.

$$20. \begin{cases} x + 3y + 3z - 6 = 0, \\ 3x + 3y + 4z - 10 = 0 \end{cases} \text{ тўғри чизиқни ясанг.}$$

$$21. \begin{cases} 2x + y - z - 3 = 0, \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

тўғри чизиқнинг координата текисликлари билан кесилиш нуктасини топинг.

$$22. \begin{cases} 5x - y - 2z - 3 = 0, \\ 3x - 2y - 5z + 2 = 0 \end{cases}$$

тўғри чизикдан ўтувчи ва $x + 19y - 7z - 11 = 0$ текислик-
ка перпендикуляр бўлган текислик тенгламасини тузинг.

$$23. \begin{cases} 2x - 3y - z - 9 = 0, \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

тўғри чизик тенгламасини каноник шаклга келтиринг.

24. $M_1(-3; 0; 2)$ нуктадан ўтиб:

1) $\vec{a} = \{2; -3; 5\}$ векторга;

2) $\frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-1}$ тўғри чизикка;

3) Ox ўқка; 4) Oy ўқка; 5) Oz ўқка параллел
бўлган тўғри чизикнинг каноник тенгламасини тузинг.

25. $M_1(1; -1; -3)$ нуктадан ўтиб:

1) $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ векторга;

2) $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{0}$ тўғри чизикка;

3) $x = 3t - 1$, $y = -2t + 3$, $z = 5t + 2$ тўғри чизикка
параллел бўлган тўғри чизикнинг параметрик тенглама-
сини тузинг.

26. Берилган икки нуктадан ўтувчи тўғри чизикнинг
параметрик тенгламасини тузинг:

1) $(3; -1; 2)$ ва $(2; 1; 1)$;

2) $(1; 1; -2)$ ва $(3; -1; 0)$

3) $(0; 1; -2)$ ва $(0; 0; 1)$;

4) $(4; 3; 2)$ ва $(1; -2; 5)$.

27. Қуйидаги тўғри чизиклар билан текисликларнинг
кесишиш нуктасини топинг:

1) $\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{5}$, $3x + 2y + z - 1 = 0$;

2) $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{6}$, $2x - y + z - 13 = 0$;

3) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-2}$, $2x + y - 2z + 5 = 0$;

4) $\frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{2}$, $x + 2y - 2z + 6 = 0$.

28. $M_0(2; -2; -2)$ нуктадан ўтиб,

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{4}$$

тўғри чизикка перпендикуляр бўлган текислик тенгла-
масини тузинг.

29. B ва D нинг қандай қийматларида $x = 3 + 4t$,
 $y = 1 - 4t$, $z = -3 + t$ тўғри чизик $2x + By - 4z + D = 0$
текисликда ётади?

30. m ва C нинг қандай қийматларида

$$\frac{x-2}{m} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-3}$$

тўғри чизик $3x - 2y + Cz + 1 = 0$ текисликка перпендикуляр бўлади?

7-БОБ

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛАР

Текисликда тўғри бурчакли Декарт координаталар системасида ҳар қандай биринчи тартибли, икки ўзгарувчили тенглама, яъни $Ax + By + C = 0$ тенглама тўғри чизик тенгламаси эканлигини кўрган эдик.

Энди тенгламалар иккинчи тартибли икки ўзгарувчили бўлган ҳолни ўрганамиз. Бундай тенгламалар билан фойдаланувчи $M(x; y)$ нукталар тўплами иккинчи тартибли чизиклар дейилади.

Иккинчи тартибли чизикнинг умумий тенгламаси қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \quad (7.1)$$

бу ерда A, B, C, D, E, F коэффициентлар ҳақиқий сонлардир, бундан ташқари A, B, C лардан камида биттаси нолдан фаркли бўлиши керак.

1-§. Айлана

Декарт координаталар системасида маркази $O_1(a; b)$ нуктада ётувчи ва R радиусли айлана берилган бўлсин. Бу айлана тенгламасини келтириб чиқарамиз. Айлана текисликдаги берилган $O_1(a; b)$ нуктадан R узоқликда ётган $M(x; y)$ нукталар тўплами бўлишидан фойдаланамиз (58-чизма). $M(x; y)$ — айлананинг ихтиёрий нуктаси бўлсин, у ҳолда O_1M кесманинг узунлиги $O_1M = R$ га тенг бўлади. Икки нукта орасидаги масофани топиш формуласига кўра:

$$O_1M = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

$$\text{ёки } (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2. \quad (7.2)$$


(7.2) тенглама маркази $O_1(a; b)$ нуктада ва радиуси R га тенг айлананинг каноник тенгламаси дейилади. Хусусий ҳолда $O_1(0; 0)$ бўлса, айлана тенгламаси

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (7.3)$$

кўринишни олади. Ушбу

$$\begin{cases} x = R \cos t, \\ y = R \sin t \end{cases} \quad t \in [0; 2\pi] \quad (7.4)$$

тенгламалар системаси айлананинг параметрик тенгламаси дейилади.



Энди (7.1) кўринишдаги тенглама айлана тенгламасидан иборат бўлиши учун коэффициентлар қандай шартларга бўйсунishi кераклигини кўрсатамиз.

1) (7.1) тенгламадаги x ; y координаталар кўпайтмаси xy ли ҳад олдидаги коэффициент $B=0$ бўлиши керак;

2) x^2 ва y^2 лар олдидаги коэффициентлар ўзаро тенг, яъни $A=C$ (хусусий ҳолда $A=C=1$) бўлиши керак. У ҳолда (7.1) тенглама куйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned} x^2 + 2Dx + D^2 + y^2 + 2Ey + E^2 + F - D^2 - E^2 &= 0 \\ (x+D)^2 + (y+E)^2 &= D^2 + E^2 - F. \end{aligned} \quad (7.5)$$

(7.5) тенглама маркази $O_1(-D; -E)$ нуктада, радиуси $R = \sqrt{D^2 + E^2 - F}$ га тенг айланани аниқлайди. Бу ерда $D^2 + E^2 - F > 0$ шарт бажарилиши керак. Агар $D^2 + E^2 - F = 0$ бўлса, у ҳолда (7.5) тенглама $(x+D)^2 + (y+E)^2 = 0$ кўринишни олади ва бу тенгламани ягона $O_1(-D; -E)$ нуктанинг координаталари қаноатлантиради; $D^2 + E^2 - F < 0$ бўлса, бу ҳолда (7.5) тенглама бирор чизиқни аниқламайди, чунки бу тенгламанинг ўнг томони манфий, чап томони эса барча $(x; y)$ лар учун мусбат микдор бўлади.

Координаталар текислигида иккита айлананинг ўзаро жойлашишини текшираамиз. Айланаларнинг радиуслари R_1 ва R_2 , уларнинг марказлари орасидаги масофа

k бўлсин. Агар айланалар марказларини $O(0; 0)$ ва $O_1(k; 0)$ нуктада деб ҳисобласак, айланалар қуйидаги тенгламалар билан ифодаланади:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= R_1^2 \\ (x-k)^2 + y^2 &= R_2^2. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Бу айланаларнинг кесишишини аниқлаш учун (7.6) тенгламаларни система қилиб ечамиз. Биринчи тенгламадан $x = \pm \sqrt{R_1^2 - y^2}$ ни топиб уни иккинчи тенгламага қўйиб, ундан

$$y = \pm \frac{1}{2k} \times$$

$$\times \sqrt{(R_1 + R_2 + k)(R_1 - R_2 + k)(R_1 + R_2 - k)(R_2 - R_1 + k)} \quad (7.7)$$

ни топамиз. (7.7) формуладан кўринадики, агар $R_1 + k > R_2$, $R_1 + R_2 > k$ ва $R_2 + k > R_1$ бўлса, y ҳолда илдиз остидаги ифода мусбат бўлиб, (7.7) система иккита ечимга эга бўлади ва айланалар иккита нуктада кесишади. Агар илдиз остидаги кўпайтувчилардан бирортаси нолга тенг бўлса, y ҳолда (7.6) система битта ечимга эга бўлиб, айланалар ўзаро уринадилар. Агар илдиз остидаги кўпайтувчилардан биттаси манфий бўлиб қолганлари мусбат бўлса, y ҳолда (7.6) система ечимга эга бўлмайди, яъни айланалар кесишмайди.

Демак, агар R_1 , R_2 , k сонлардан бири қолган иккитасининг йигиндисидан кичик бўлса, айланалар иккита нуктада кесишади; агар улардан бири қолган иккитасининг йигиндисига тенг бўлса, айланалар уринадилар; агар сонлардан бири қолган иккитасининг йигиндисидан катта бўлса, айланалар кесишмайди.

1-мисол. $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 20 = 0$ айлана берилган. Айлана марказининг координаталарини ва радиусини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламани

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

қурунишга келтирамыз. Бунинг учун уни қуйидаги қурунишда ёзиб оламиз:

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 - 20 - 1 - 4 = 0 \Rightarrow$$

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) - 25 = 0 \Rightarrow$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$$

ёки

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5^2.$$

Бундан $a = -1$, $b = 2$, $O_1(-1; 2)$ ва $R = 5$ эканлиги келиб чиқади.

2-мисол. $x^2 + y^2 = 3$ ва $x^2 + y^2 - 6x + 4 = 0$ айланаларнинг кесишиш нуқтасини топинг.

Ечиш. Иккинчи айлани тенгламасини каноник кўринишга келтирамиз:

$$\begin{aligned}x^2 - 6x + y^2 + 4 &= 0, \\x^2 - 6x + 9 + y^2 - 9 + 4 &= 0, \\(x-3)^2 + y^2 &= 5. \\x^2 + y^2 = 3 \text{ ва } (x-3)^2 + y^2 &= 5\end{aligned}$$

тенгламалардан $R_1 = \sqrt{3}$, $R_2 = \sqrt{5}$, $k = 3$ бўлгани учун, бу қийматларни (7.7) формулага қўямиз ва ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}y &= \pm \frac{1}{6} \times \\&\times \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{5} + 3)(\sqrt{3} + \sqrt{5} - 3)(\sqrt{3} + 3 - \sqrt{5})(\sqrt{5} + 3 - \sqrt{3})} = \\&= \pm \frac{\sqrt{59}}{6}.\end{aligned}$$

Бу натижани қуйидагича ҳам топиш мумкин: Биринчи тенгламадан y^2 ни топиб, иккинчи тенгламага қўямиз:

$$\begin{aligned}y^2 &= 3 - x^2, (x-3)^2 + 3 - x^2 = 5 \Rightarrow \\x^2 - 6x + 9 + 3 - x^2 &= 5 \Rightarrow -6x = -7 \Rightarrow x = \frac{7}{6}, \\y^2 &= 3 - x^2 = 3 - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = 3 - \frac{49}{36} = \frac{108 - 49}{36} = \frac{59}{36}, \\y &= \pm \frac{\sqrt{59}}{6}.\end{aligned}$$

Демак, айланалар $M_1\left(\frac{7}{6}; \frac{\sqrt{59}}{6}\right)$ ва $M_2\left(\frac{7}{6}; -\frac{\sqrt{59}}{6}\right)$ нуқталарда кесишади.

3-мисол. Кривошип-шатунли механизмнинг шатун қисмидаги D нуқтанинг траекторияси тенгламасини тузинг (59-чизма).

Ечиш. D нуқтанинг шатунга нисбатан координаталарини $[a(AF), b(FD)]$ танлаб олинган координаталар системасига нисбатан $(x; y)$ деб олайлик. Ҳаракат давомида ўзгармайдиган A ва D нуқталар орасидаги масофани d билан белгилаймиз. $OAFD$ синиқ чизиқнинг координата ўқлардаги проекциялари

$$y = ND = r \sin \varphi - a \sin \psi + b \cos \psi$$

Бунда φ ва ψ ўзгарувчи параметрлардир. Бу тенгламалардан параметрларни чиқариш учун уни куйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} x - r \cos \varphi = a \cos \psi + b \sin \psi, \\ y - r \sin \varphi = b \cos \psi - a \sin \psi. \end{cases}$$

Бу системанинг ҳар бир тенгламасининг ҳар икки томонини квадратга кўтариб, сўнгра қўшиб, ўхшаш ҳадларини ихчамласак,

$$x^2 + y^2 + r^2 - 2rx\cos\varphi - 2ry\sin\varphi = a^2 + b^2$$


га эга буламиз. $\triangle ACD$ дан $d^2 = a^2 + b^2$ ва $|\sin \varphi| \leq 1$; $|\cos \varphi| \leq 1$ тенгсизликлардан (тенглик бажарилган деб) охири тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$x^2 + y^2 + r^2 - 2rx - 2ry = d^2$$

 $\bar{e}ки$

$$(x-r)^2 + (y-r)^2 = d^2 + r^2.$$

Бу эса маркази $(r; r)$ нуктада, радиуси $R = \sqrt{d^2 + r^2}$ бўлган айланадан иборатдир.



2-§. Эллипс

1-таъриф. Текисликнинг ихтиёрий нуктасидан фокуслар деб аталувчи берилган иккита F_1 ва F_2 нуктасигача бўлган масофалар йигиндиси ўзгармас микдор ($2a$) га тенг бўлган барча нукталарнинг геометрик ўрни эллипс деб аталади.

Эллипс тенгламасини келтириб чиқариш учун координаталар системасини қуйидагича оламиз. Берилган F_1 ва F_2 нукталарни туташтирувчи тўғри чизикни абсциссалар ўқи деб қабул қиламиз, координаталар бошини эса берилган нукталарнинг ўртасида оламиз. F_1 , F_2 фокуслар орасидаги масофани $2c$ билан белгилаймиз. У ҳолда F_1 , F_2 нукталарнинг координаталари $F_1(c; 0)$ ва $F_2(-c; 0)$ бўлади (60-чизма). Таърифга кўра $2a > 2c$ ёки $a > c$. Эллипснинг ихтиёрий нуктасини $M(x; y)$ билан белгилаймиз ва M нуктани F_1 ва F_2 фокуслар билан бирлаштирамиз. F_1M ва F_2M кесмаларга эллипснинг фокал радиуслари дейилади ва мос равишда r_1 , r_2 билан белгиланади, яъни $r_1 = \rho(F_1, M)$ ва $r_2 = \rho(F_2, M)$. Шундай қилиб, эллипснинг таърифига кўра:

$$r_1 + r_2 = 2a \quad (7.8)$$

ёки

$$\rho(F_1, M) + \rho(F_2, M) = 2a.$$

Икки нукта орасидаги масофани топиш формуласига кўра:


$$\rho(F_1, M) = \sqrt{(x-c)^2 + y^2},$$

$$\rho(F_2, M) = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}.$$

Буларни (7.8) тенгликка қўйсак,

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

ни ҳосил қиламиз.



60-чизма

Бу тенгламанинг биринчи ҳадини ўнг томонга ўтказиб ҳосил бўлган тенгламанинг иккала томонини квадратга кўтарамиз:

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2,$$

бундан

$$2cx = 4a^2 - 2cx - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

ёки

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx.$$

Кейинги тенгламанинг ҳар иккала томонини квадратга кўтарамиз:

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2.$$

Бу тенглама соддалаштирилгандан кейин қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Тенгламанинг иккала қисмини $a^2(a^2 - c^2)$ га бўламиз. $a > c$ бўлгани учун $b^2 = a^2 - c^2$ деб белгилаш киритсак,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (7.9)$$

ни ҳосил қиламиз. (7.9) тенглама эллипснинг каноник тенграмаси дейилади.

Эллипснинг каноник тенграмасига кўра унинг шаклини текширамиз.

(7.9) тенглама билан аниқланган эллипс координата ўқларига нисбатан симметрикдир. Агар $(x; y)$ эллипснинг бирор нуқтаси бўлса, яъни x, y сонлар (7.9) тенгламани қаноатлантирса, y ҳолда (7.9) тенгламада x, y ўзгарувчиларнинг фақат квадратлари қатнашгани учун бу тенгламани

$$(x; y), (-x; y), (x; -y), (-x; -y)$$

нуқталарнинг координаталари қаноатлантиради (61-чизма). Шунинг учун координата ўқлари эллипснинг симметрия ўқларидир. Симметрия ўқларининг кесишган нуқтаси $O(0; 0)$ эллипснинг маркази дейилади, фокуслар ётган Ox ўқ унинг фокал ўқи дейилади.


Эллипснинг координата ўқлари билан кесишган нукталарини топамиз. Эллипснинг Ox ўқи билан кесишган нукталарини топиш учун ушбу тенгламалар системасини ечамиз.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \pm a.$$

Демак, эллипс Ox ўқини $A_1(a; 0)$ ва $A_2(-a; 0)$ нукталарда кесади. Худди шунингдек:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow y = \pm b.$$

Бу эса эллипс Oy ўқи билан $B(0; b)$ $B_1(0; -b)$ нукталарда кесишишини билдиради. Эллипснинг координата ўқлари билан кесишган A_1, A_2, B_1, B_2 нукталарига унинг *ўқлари* дейилади (61- чизма).



61- чизма

$[AA_1]$ кесманинг узунлиги $2a$ га тенг бўлиб, бу кесма эллипснинг катта ўқи, $[OA]$ (узунлиги a бўлган) кесма эса катта ярим ўқи дейилади.

$[BB_1]$ кесманинг узунлиги $2b$ га тенг бўлиб, бу кесма эллипснинг кичик ўқи, $[OB]$ (узунлиги b бўлган) кесма кичик ярим ўқи дейилади.

Эллипснинг ўқлари координата ўқларига параллел

бўлиб, симметрия маркази бирор $M_0(x_0; y_0)$ нуктада бўлса, у ҳолда унинг тенгламаси

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

кўринишда бўлади.

(7.1) тенгламада

$$B=0, D=0, E=0, F=-1$$

бўлса, бу тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

кўринишни олиб, эллипс тенгламасига айланади. Агар эллипснинг $M_1(x_1; y_1)$ нуктасига уринма ўтказилса, уринма тенгламаси

$$\frac{x \cdot x_1}{a^2} + \frac{y \cdot y_1}{b^2} = 1$$

кўринишда бўлади.

2- т а ʼ р и ф. Эллипснинг фокуслари орасидаги масофанинг катта ўқининг узунлигига нисбати эллипснинг эксцентриситети дейилади ва қуйидагича белгиланади:

$$\epsilon = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a} < 1, \quad (7.10)$$

бунда $c < a$, $0 < \epsilon < 1$. Эллипснинг шаклини унинг эксцентриситети ёрдамида текшириш қулай.

$$b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

ни эътиборга олсак, (7.10) ни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\epsilon^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{1 - \epsilon^2}.$$

$\epsilon \Rightarrow 1$ да $\frac{b}{a} \Rightarrow 0$ бўлиб, b кичиклашади ва эллипс Ox ўққа томон сиқилиб боради, аксинча $\epsilon \Rightarrow 0$ бўлса, $\frac{b}{a} \Rightarrow 1 \Rightarrow b = a$ бўлиб, эллипс айланага яқинлаша боради.

Хусусий ҳолда $a = b$ бўлса, у айланадан иборат бўлади.

3- т а ʼ р и ф. Эллипснинг катта ўқига перпендикуляр ва марказидан $\frac{a}{\epsilon}$ масофада унга симметрик ўтган

иккита тўғри чизик эллипснинг *директрисалари* дейилади. Таърифига кўра директрисалар $d_1: x - \frac{a}{e} = 0$;

$d_2: x + \frac{a}{e} = 0$ тенгламаларга эга бўлади. Баъзан буларни мос равишда чап ва ўнг директрисалар деб ҳам аталади. $e < 1$ бўлгани учун $\frac{a}{e} > a$ бўлади.

Эллипснинг ихтиёрий $M(x; y)$ нуктасидан фокусгача бўлган (r_1 ёки r_2) масофанинг шу $M(x; y)$ нуктадан директрисагача (d_1 ёки d_2) бўлган масофага нисбати эллипснинг эксцентриситетига тенг, яъни

$$\frac{r_1}{d_1} = e \text{ ёки } \frac{r_2}{d_2} = e.$$

Эллипснинг фокал радиуслари. Эллипснинг каноник тенгламасини топиш жараёнида $r_1 = \rho(F_1; M)$ ва $r_2 = \rho(F_2; M)$ ларга фокал радиуслар дейилган эди ва улар мос равишда

$$r_1 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \text{ ва } r_2 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \quad (7.11)$$

га тенг эди. Агар

$$y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2}), \quad c^2 = a^2 - b^2$$

ва $a^2 = b^2 + c^2$ тенгликларни эътиборга олсак, (7.11) тенгликларни ушбу кўринишда ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} r_1 &= \sqrt{(\frac{c}{a}x - a)^2} = |\frac{c}{a}x - a| = |a - \frac{c}{a}x|, \\ r_2 &= \sqrt{(\frac{c}{a}x + a)^2} = |\frac{c}{a}x + a| = |a + \frac{c}{a}x|. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Бизга маълумки, $0 < \frac{c}{a} < 1$ бўлгани учун $a - \frac{c}{a}x > 0$ ва $a + \frac{c}{a}x > 0$. Буларни эътиборга олсак, (7.12) тенгликлар ушбу кўринишни олади:

$$r_1 = a - \frac{c}{a}x; \quad r_2 = a + \frac{c}{a}x.$$

$\frac{c}{a} = e$ эканини ҳисобга олсак, бу формула куйидаги кўринишни олади:

$$r_1 = a - ex; r_2 = a + ex. \quad (7.13)$$

Булар эллипснинг фокал радиусларидир.

Эллипснинг параметрик тенгламаси. $M(x; y)$ эллипснинг ихтиёрий нуктаси бўлсин. Бу нуктанинг координаталари

$$x = a \cos \varphi, y = b \sin \varphi$$

га тенг бўлишини кўрсатамиз. Унинг учун бу тенгликлардан

$$\frac{x}{a} = \cos \varphi, \quad \frac{y}{b} = \sin \varphi$$

тенгликларни ҳосил қиламиз. Буларнинг ҳар иккала томонини квадратга кўтарамиз ва ҳадлаб қўшамиз:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Бу эса эллипснинг каноник тенгламаси бўлгани учун

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi \end{cases}$$

тенгламалар системаси ҳам эллипснинг тенгламаси бўлиб, унга эллипснинг параметрик тенгламаси дейилади.

1-мисол. $M(0; 4)$ нукта оркали ўтувчи фокуслари орасидаги масофа 6 га тенг бўлган эллипснинг каноник тенгламасини тузинг.

Ечиш. Шартга кўра $M(0; 4)$ нукта эллипсга тегишлидир, шунинг учун (7.9) формуладан

$$\frac{16}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 16$$

ни топамиз.

a^2 параметрни топиш учун, мисол шартидаги $2c = 6$ дан $c = 3$ ва $b^2 = a^2 - c^2$ муносабатдан фойдалана оламиз, яъни

$$16 = a^2 - 9 \Rightarrow a^2 = 25.$$

Демак,

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

2- м и с о л. Агар $x = \pm 8$ тўғри чизиқлар катта ўқи 12 га тенг бўлган эллипснинг директрисалари бўлса, шу эллипснинг тенгламасини тузинг.

Е ч и ш. Шартга кўра $2a = 12 \Rightarrow a = 6$, яъни $\pm \frac{a}{e} = \pm 8$, бундан $\frac{a}{e} = 8$, аммо $e = \frac{c}{a}$, у ҳолда

$$\frac{a^2}{c} = 8 \Rightarrow c = \frac{a^2}{8} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}.$$

Эллипс учун:

$$b^2 = a^2 - c^2 = 36 - \frac{81}{4} = \frac{63}{4}.$$

Демак, эллипснинг изланаётган тенгламаси:

$$\frac{x^2}{36} + \frac{4y^2}{63} = 1$$

кўринишда бўлади.

3- м и с о л. Нукта бир вақтда иккита ўзаро перпендикуляр

$$\begin{cases} x = 9\sin\omega t, \\ y = 4\cos\omega t \end{cases}$$

тебранишларда қатнашади. Шу нуктанинг траекториясини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламалар системаси ҳаракат қилаётган нуктанинг параметрик тенгламасидир. Бу системадан t параметрни чиқарамиз. Унинг учун системани қуйидаги кўринишда ёзиб, сўнгра ҳар икки томонини квадратга кўтариб қўшамиз, натижада


$$\begin{cases} \frac{x}{9} = \sin\omega t, \\ \frac{y}{4} = \cos\omega t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{81} = \sin^2\omega t, \\ \frac{y^2}{16} = \cos^2\omega t \end{cases}$$

тенгламага эга бўламиз. Бу тенглама маркази координаталар бошида, катта ярим ўқи 9, кичик ярим ўқи 4 бўлган эллипсдир. Демак, ҳаракатдаги нуктанинг траекторияси эллипсдан иборат экан.

4- м и с о л. Координаталар боши атрофида узунлиги $OA = l_1$ стержень ω бурчак тезлиги билан айланади. А нукта атрофида эса узунлиги $AB = l_2$ бўлган иккинчи стержень ω бурчак тезлик билан айланади.

Иккала стержень бошлангич моментда Ox ўқ билан устма-уст тушганлигини ҳамда A нукта O ва B нукталар орасида ётишини билган ҳолда B нукта траекториясининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Ҳаракат бошлангандан кейин бирор t вақтда l_1 стержень абсциссалар ўқиға ωt бурчак остида, l_2 стержень ҳам ωt бурчак остида огишган бўлади. Натижада 62-чизмада $OABD$ синиқ чизикқа эга бўламиз. Бу синиқ чизикнинг координата ўқлари-



62-чизма

даги проекциясини аниқлаймиз. Проекциялар назариясидан бизга маълумки,

$$\text{пр}_{Ox}(OABD) = \text{пр}_{Ox}OA + \text{пр}_{Ox}AB + \text{пр}_{Ox}BD = \text{пр}_{Ox}OD$$

га тенг. Чизмадан $\text{пр}_{Ox}OA = l_1 \cos \omega t$;

$$\text{пр}_{Ox}AB = l_2 \cos(-\omega t) = l_2 \cos \omega t;$$

$$\text{пр}_{Ox}BD = y \cos 90^\circ = 0; \text{пр}_{Ox}OD = x \cos 0^\circ = x.$$

Буларни ўрнига қўйсак:

$$l_1 \cos \omega t + l_2 \cos \omega t = x$$

ёки

$$\frac{x}{l_1 + l_2} = \cos \omega t.$$

Худди юқоридагидек синиқ чизикнинг Oy ўқидаги проекциясини топамиз:

$$\frac{y}{l_1 - l_2} = \sin \omega t.$$

Демак,

$$\begin{cases} \frac{x}{l_1 + l_2} = \cos \omega t, \\ \frac{y}{l_1 - l_2} = \sin \omega t \end{cases}$$

Бу тенгламалар системаси B нукта траекториясининг тенгламасидир (бунда t параметр). Ундан t параметрни чиқарамиз:


$$\frac{x^2}{(l_1 + l_2)^2} + \frac{y^2}{(l_1 - l_2)^2} = 1.$$

Демак, B нуктанинг траекторияси ярим ўқлари $l_1 + l_2$ ва $l_1 - l_2$ дан иборат эллипсдир.

Агар $l_1 > l_2$ бўлса, B нукта соат стрелкасига қарши ҳаракатланиб, эллипс чизади. Агар $l_1 = l_2$ бўлса, OA стержень бир марта тўла айланганда нукта Ox ўқ бўйлаб $2(l_1 + l_2)$ узунликдаги кесмани икки марта чизади. Агар $l_1 < l_2$ бўлса, B нукта эллипс бўйлаб тескари йўналишда силжийди.

5-мисол. OA кривошип O нукта атрофида ўзгармас тезлик билан айланади. OA кривошип билан AB шатуннинг узунликлари ўзаро тенг, яъни $OA = AB = 60$ см. Шатуннинг ўртасида ётувчи $M(x, y)$ нукта траекториясининг тенгламасини тузинг (63-чизма).

Ечиш. Координаталар системасини 63-чизмада кўрсатилгандек оламиз. AB шатун Ox ўққа Q жисм



63- чизма

ёрдамида шундай маҳкамланганки у OA кривошип O нукта атрофида айланганда Q жисм Ox ўқи бўйича сирпаниб ҳаракат қилади. OA кривошипнинг Ox ўқининг мусбат йўналиши билан ҳосил қилган бурчагини φ деймиз.

$\triangle OAC$ дан:

$$OC = OA \cos \varphi.$$

$$\triangle NMB \text{ дан: } y = BM \sin \varphi, \quad BN = BM \cos \varphi.$$

$$\triangle ACB \text{ дан: } BC = AB \cos \varphi.$$

$$CN = AB \cos \varphi - NB = AB \cos \varphi - BM \cos \varphi;$$

$$OC + CN = x = AB \cos \varphi - BM \cos \varphi + OA \cos \varphi.$$

Буларга $OA = AB = 60$ см қийматларни қўйсак:

$$x = 90 \cos \varphi$$

$$y = 30 \sin \varphi$$

Бу система ҳаракатдаги $M(x; y)$ нукта траекториясининг параметрик тенгламасидир (бунда φ параметр). Нуктанинг траекторияси қандай чизикдан иборат эканлигини аниқлаш учун системадан φ параметрни чиқарамиз:

$$\begin{cases} \frac{x}{90} = \cos \varphi, \\ \frac{y}{30} = \sin \varphi. \end{cases}$$

Бунинг ҳар икки томонини квадратга кўтариб қўшамиз:

$$\frac{x^2}{90^2} + \frac{y^2}{30^2} = 1.$$

Демак, M нуктанинг траекторияси эллипсдан иборат экан.

3-§. Гипербола

Таъриф. Текисликнинг ихтиёрий нуктасидан фокуслар деб аталувчи берилган икки F_1 ва F_2 нуктагача бўлган масофалар айирмасининг абсолют қиймати ўзгармас микдор ($2a$ га тенг) бўлган $M(x; y)$ нукталарнинг геометрик ўрни *гипербола* дейилади.

Гипербола таърифидаги берилган ўзгармас кесма узунлигини $2a (a > 0)$ билан, фокуслар орасидаги масофани $2c (c > 0)$ билан белгилаймиз. Бунда $2a < 2c \Rightarrow a < c$.

Гиперболадаги M нуқтанинг F_1, F_2 ларгача масофалари унинг *фокал радиуслари* дейилади ва r_1, r_2 билан белгиланади. Гиперболанинг таърифига биноан:

$$|r_1 - r_2| = 2a \quad (7.15)$$

ёки

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a.$$

Илдизлардан қутулгандан кейин қуйидаги тенгламага эга бўламиз (илдизларни йўқотиш, ихчамлаш, содда-лаштириш ҳам эллипс ҳолидагидек бажарилади):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1. \quad (7.16)$$

$c^2 - a^2$ миқдор ҳар доим мусбат бўлгани учун уни b^2 билан белгилаймиз: $b^2 = c^2 - a^2$, у ҳолда (7.16) тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (7.17)$$

кўринишни олади. (7.17) тенглама гиперболанинг кано-ник тенгламаси дейилади.

Агар фокуслари ординаталар ўқида ётса, у ҳолда гиперболанинг тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:


$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1. \quad (7.18)$$

Гипербола шакли. Гиперболанинг (7.17) тенгламасига асосланиб унинг шаклини аниқлаймиз. Эллипс тенгламаси устида олиб борилган муҳокама-ларни такрорлаб, гиперболанинг координаталар боши, координата ўқларига нисбатан симметриклигини аниқ-лаймиз.

Гипербола Ox ўқини $A_1(a; 0)$ ва $A_2(-a; 0)$ нуқта-ларда кесиб ўтади (64-чизма). Гипербола Oy ўқи билан кесишмайди. Ҳақиқатан ҳам, (7.17) тенгламага $x=0$ ни қўйсак, $y^2 = -b^2$ бўлиб, бу ифода ҳақиқий сонлар соҳасида ўришли бўлмайди. A_1, A_2 нуқталар гиперболанинг *учлари*, улар орасидаги $2a$ узунликка тенг кесма эса унинг ҳақиқий ўқи дейилади.

Oy ўқидаги B_1 дан B_2 гача бўлган $2b$ узунликдаги кесма гиперболанинг *мавҳум ўқи* дейилади.

Агар $M(x; y)$ нуқта гиперболада ётса, унинг



64- чизма

тенгласидан $|x| \geq a$ эканини кўрамиз. Бундан $|x| = \pm a$ тўғри чизиқлар билан чегараланган $-a < x < a$ соҳада гиперболанинг нуқталари мавжуд эмаслиги келиб чиқади. (7.17) тенгламани y га нисбатан ечамиз:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}. \quad (7.19)$$

(7.19) тенгламадаги x ўзгарувчи a дан $+\infty$ гача ортганда ва $-a$ дан $-\infty$ гача камайганда, y ординаталар ўқи бўйлаб 0 дан $+\infty$ гача ўсиши кўриниб турибди (64- чизма). Демак, гипербола икки қисмдан иборат бўлиб, улар гиперболанинг тармоқлари дейилади.

Гиперболанинг бир (ўнг) тармоғи $x \geq a$ ярим-текисликда, иккинчи (чап) тармоғи $x \leq -a$ ярим-текисликда жойлашган.

Агар гиперболанинг ўқлари координата ўқларига параллел бўлиб, маркази бирор $M_0(x_0; y_0)$ нуқтада бўлса, унинг тенгламаси

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

кўринишда бўлади.

Агар (7.1) тенгламада $A = \frac{1}{a^2}$, $B = 0$, $C = -\frac{1}{b^2}$,

$$D = 0, E = 0, F = -1$$

бўлса, у тенглама $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ кўринишни олиб, гипербола тенгламасига айланади.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ ва } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

гиперболалар қўшма гиперболалар дейлади.

Гипербола асимптоталари. Гиперболанинг шаклини яна ҳам аниқроқ тасаввур қилишда асимптота чизиги катта аҳамиятга эга.

Т а ъ р и ф. Агар $M(x; y)$ нукта Γ эгри чизик бўйлаб ҳаракатланиб борганда бу нуктадан l тўғри чизиккача масофа нолга яқинлашса, l тўғри чизик Γ чизикнинг асимптотаси дейлади. $y = \frac{b}{a}x$ ва $y = -\frac{b}{a}x$ тўғри чизик-

лар (7.17) гиперболанинг асимптоталари эканини кўрсатамиз. $x \geq a$ да гиперболанинг биринчи чоракдаги қисмини аниқлайдиган

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} \quad (7.20)$$

тенглама билан

$$Y = \frac{b}{a}x \quad (7.21)$$

тенгламани солишти-
ра-
миз. (7.21) тўғри
чизик координаталар
бошидан ўтади ва
унинг бурчак коэффи-
циенти $k = \frac{b}{a}$ га тенг.

65-чизмада бу тўғри
чизикнинг биринчи чо-
ракдаги қисми
тасвирланган бўлиб,
унда $|OA| = a$, $|AB| =$


$= b$. Гипербола ва (7.21) тўғри чизикда бир хил абсциссали $M(x; y)$, $N(x; Y)$ нукталарни қараймиз. Бу икки нуктанинг мос ординаталари:

$$y = + \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}, \quad Y = \frac{b}{a}x$$

бўлади.

MN кесманинг узунлигини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} MN &= Y - y = \frac{b}{a}(x - \sqrt{x^2 - a^2}) = \\ &= \frac{b}{a} \cdot \frac{(x - \sqrt{x^2 - a^2})(x + \sqrt{x^2 - a^2})}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}. \end{aligned}$$



65-чизма

Демак,

$$Y - y = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - y^2}}. \quad (7.22)$$

(7.22) ифоданинг $x \rightarrow +\infty$ га интилгандаги лимитини текширамиз:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (Y - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}.$$

Бу ифоданинг махражи чексиз ортиб боровчи икки мусбат қушилувчининг йингидисидан иборат бўлиб, сурати эса ўзгармас $a \cdot b$ микдордир, шунинг учун

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = 0.$$

Демак, гиперболадаги M нукта гипербола бўйича ҳаракатланиб, унинг учидан старлича узоқлашса, M нуктадан (7.21) тўғри чизиккача бўлган масофа полга интилади.

Шундай қилиб, гипербола учун (7.21) тўғри чизик асимптота бўлади. Гиперболанинг тенгламаси координата ўқларига симметрик бўлишидан $y = -\frac{b}{a}x$ тўғри чизик ҳам гиперболанинг асимптотаси бўлиши келиб чиқади.

Тенг томонли гипербола. Ярим ўқлари тенг ($a=b$) бўлган гипербола *тенг томонли* деб аталади. Агар $a=b$ бўлса, (7.17) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ ёки } x^2 - y^2 = a^2 \quad (7.23)$$

Тенг томонли гипербола асимптоталарининг тенгламалари $y = \pm x$ бўлиб, улар орасидаги бурчак 90° га тенг бўлади. Уларнинг бири Ox ўқи билан 45° ли, иккинчиси 135° ли бурчак ташкил қилади.

Энди тенг томонли гипербола (7.23) тенгламасини координата ўқларини буриш ёрдамида ихчам $xu = a$ кўринишга келтиришни кўрсатамиз. Унинг учун координата ўқларини 45° га бурсак, Ox ўқ $y = -x$ асимптота билан, Oy ўқ эса $y = x$ асимптота билан устма-уст тушиб, асимптоталар янги координата ўқлари бўлиб қолади. (7.23) тенгламага

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned}$$

алмаштириш формулаларини гатбик этамиз, бунда $\alpha = -45^\circ$

$$(x' \cos 45^\circ + y' \sin 45^\circ)^2 - (x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ)^2 = a^2,$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} x' + \frac{\sqrt{2}}{2} y'\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} y' - \frac{\sqrt{2}}{2} x'\right)^2 = a^2,$$

$$\frac{1}{2}(x'^2 + 2x'y' + y'^2) - (y'^2 - 2x'y' + x'^2) = a^2,$$

$$2x'y' = a^2 \Rightarrow x'y' = \frac{a^2}{2}.$$

Энди x' ва y' ларни x , y лар орқали, $\frac{a^2}{2}$ ни эса бирор c орқали белгиласак, ўрта мактаб курсида ўрганилган $x \cdot y = c$ гиперболанинг тенгламаси ҳосил бўлади.

Гипербола эксцентриситети. Гиперболанинг фокуслари орасидаги масофанинг ҳақиқий ўқининг узунлигига нисбати гиперболанинг эксцентриситети дейилади ва уни e ҳарфи билан белгиланади:

$$e = \frac{2c}{2a} = \frac{c}{a}.$$

Гиперболада $c > a$ бўлгани учун $e > 1$ бўлади.

Эксцентриситет гиперболла шаклини аниқлашда муҳим роль ўйнайди. $e = \frac{c}{a} \Rightarrow c = a \cdot e$, буни $b^2 = c^2 - a^2$ га қўйсак, $b^2 = a^2(e^2 - 1)$ ёки $\frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1}$ бўлиб, e эксцентриситет қанчалик кичик, яъни $e \rightarrow 1$ бўлса, $\frac{b}{a}$ шунчалик кичик, яъни $\frac{b}{a} \rightarrow 0$ бўлиши кўринади (бунда $a = \text{const}$ деб қаралади) ва гипербола ўзининг ҳақиқий ўқига сиқилган бўлади, аксинча e катталашиб борса, $\frac{b}{a}$ ҳам катталашиб, гипербола тармоқлари кенгайиб боради.

Гиперболанинг фокал радиуслари. (7.17) гиперболанинг ихтиёрий $M(x; y)$ нуктасининг фокал радиуслари $x > 0$ бўлганда

$$r_1 = \frac{c}{a}x - a \text{ ва } r_2 = \frac{c}{a}x + a$$

формулалар билан ва $x < 0$ бўлганда эса

$$r_1 = a - \frac{c}{a}x \text{ ва } r_2 = -a - \frac{c}{a}x$$

формулалар билан аниқланади. Агар $\frac{c}{a} = \epsilon$ эканини эътиборга олсак, у ҳолда

$$x > 0 \text{ бўлганда, } r_1 = \epsilon x - a, \quad r_2 = \epsilon x + a \quad (7.24)$$

$$x < 0 \text{ бўлганда, } r_1 = a - \epsilon x, \quad r_2 = -a - \epsilon x \quad (7.25)$$


формулаларга эга бўламиз.

Гиперболанинг директрисалари. Гиперболанинг берилган F фокусига мос директрисаси деб унинг фокал ўқига перпендикуляр ва марказидан F фокуси ётган томонда $\frac{a}{\epsilon}$ масофада турувчи тўғри чи-
зиққа айтилади. Бу тўғри чизиклар Oy ўқига параллел ва ундан $\pm \frac{a}{\epsilon}$ масофада ётади.

Директриса-
ларни d_1, d_2 билан белгилаймиз ҳамда уларни F_1, F_2 фокусларга мос директрисалар деб атаймиз (66-чизма). $F_1(c; 0), F_2(-c; 0)$ фокусларга мос директрисаларнинг тенгламалари

$$d_1: x - \frac{a}{\epsilon} = 0, \quad (7.26)$$

$$d_2: x + \frac{a}{\epsilon} = 0$$



66-чизма

бўлади.

Гипербола эксцентриситети $\epsilon > 1$ бўлгани учун $\frac{a}{\epsilon} < a$ бўлади. Демак, директриса гиперболани кесмас экан.

Гипербола текисликдаги шундай нукталар тўпламики, бу нукталарнинг ҳар биридан фокусгача бўлган масофаларнинг ўша нуктадан шу фокусга мос директрисагача бўлган масофага нисбати ўзгармас миқдор бўлиб, у унинг эксцентриситети ϵ га тенг, яъни (66-чизма):

$$\frac{r_1}{d_1} = \varepsilon, \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon. \quad (7.27)$$

Гиперболани ясаш. (7.17) тенглама билан берилган гиперболани ясашни қарайлик. Тенгламадан фойдаланиб $A_1(a; 0)$, $A_2(-a; 0)$ учларини ва $b^2 = c^2 - a^2$ муносабатдан фойдаланиб $F_1(c; 0)$, $F_2(-c; 0)$ фокусларни топамиз. F_1 фокусни марказ қилиб ихтиёрий r_1 радиусли $S(F_1; r_1)$ айлана, F_2 фокусни марказ қилиб $r_2 = r_1 + 2a$ радиусли $S(F_2; r_2)$ айлана чизамиз. Бу икки айлананинг кесишган нуқталари гиперболада ётади, чунки бу нуқталар учун

$$|r_2 - r_1| = |r_1 + 2a - r_1| = 2a.$$

Марказларнинг ўринлари алмаштирилса, гиперболанинг яна икки нуқтаси ҳосил бўлади. Демак, r_1 нинг ҳар бир янги қиймати бўйича гиперболанинг тўртта нуқтасини ясаш мумкин. Шу усулда етарлича нуқталарни ясаб, уларни туташтирсак, гипербола ҳосил бўлади.

1-мисол. Гиперболанинг $F_1(20; 0)$ $F_2(-20; 0)$ фокусларини ва унга тегишли $A(24; 6\sqrt{5})$ нуқтасини билган ҳолда унинг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Гиперболанинг фокал радиуслари формуласидан фойдаланамиз, яъни

$$r_1 = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}, r_2 = \sqrt{(x + c)^2 + y^2},$$

$$r_1 = \sqrt{4^2 + 36 \cdot 5} = \sqrt{196} = 14,$$

$$r_2 = \sqrt{44^2 + 36 \cdot 5} = \sqrt{2116} = 46.$$

Гиперболани таърифига кўра:

$$|r_1 - r_2| = 2a \text{ ёки } |46 - 14| = 2a,$$

$$2a = 32 \Rightarrow a = 16.$$

Гипербола учун:

$$b^2 = c^2 - a^2 = 20^2 - 16^2 = 144.$$

Демак,

$$\frac{x^2}{256} - \frac{y^2}{144} = 1$$

гипербола тенгламасига эга бўламиз.

2-м и с о л. $xy = 4$ гипербола тенгламасини каноник кўринишга келтириш.

Е чи ш. Координаталар бошини кўзгатмаган ҳолда координата ўқларини $\alpha = +45^\circ$ бурчакка бурамиз, яъни ушбу формуладан фойдаланамиз:

$$\begin{cases} x = x' \cos 45^\circ - y' \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y'), \\ y = x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y'). \end{cases}$$

x, y нинг бу қийматларини берилган тенгламага қўямиз:

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') = 4.$$

Бу тенгламани соддалаштирсак,

$$x'^2 - y'^2 = 8$$

кўринишдаги тенг томонли гиперболанинг каноник тенгламасига эга бўламиз.

3-м и с о л. Директрисалари $x = \pm 4\sqrt{2}$ тенгламалар билан берилган ва асимптоталари орасидаги бурчак 90° бўлган гиперболанинг тенгламасини тузинг.

Е чи ш. Масала шартидан, яъни асимптоталарнинг ўзаро перпендикулярлигидан гипербола тенг томонли эканлиги келиб чиқади, у $x^2 - y^2 = a^2$ тенглама билан ифодаланади. Бундан $a = b$. Гиперболанинг директрисалари $x = \pm \frac{a}{e}$ тенгламалар билан ифодаланади. Масала

шартига кўра $\frac{a}{e} = 4\sqrt{2}$, $e = \frac{c}{a}$ ни ҳисобга олсак,

$$\frac{a^2}{e^2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow a^2 = 4\sqrt{2}c, b^2 = c^2 - a^2 \text{ тенгликдан}$$

$a^2 = c^2 - a^2 \Rightarrow 2a^2 = c^2 \Rightarrow a^2 = \frac{1}{2}c^2$ бўлгани учун $a^2 =$
 $= 4\sqrt{2}c \Rightarrow \frac{1}{2}c^2 = 4\sqrt{2}c \Rightarrow c = 8\sqrt{2}$ га эга бўламиз.
 У ҳолда $a^2 = 4\sqrt{2}c = 4\sqrt{2} \cdot 8\sqrt{2} = 64$. Демак, гипер-
 боланинг тенгламаси:

$$x^2 - y^2 = 64$$

4-§. Парабола

Таъриф. *Парабола* деб текисликнинг фокус деб аталувчи берилган F нуктасидан ва директриса деб аталувчи берилган тўғри чизикдан баравар узоқлашган барча нукталарнинг геометрик ўрнига айтилади (фокус директрисада ётмайди деб фараз қилинади).

Фокусдан директрисагача бўлган масофани p орқали белгилаймиз. p катталиқ параболанинг параметри дейилади. Парабола тенгламасини унинг таърифидан фойдаланиб келтириб чиқарамиз. Бунинг учун абсциссалар ўқини шундай жойлаштирамизки, у директрисага перпендикуляр бўлиб, фокус орқали ўтсин ва директрисадан фокусга қараб мусбат йўналишга эга бўлсин (67-чизма). Абсциссалар ўқининг d тўғри чизик билан кесилган нуктаси A бўлсин. Ординаталар ўқини $[AF]$ кесманинг ўртасидан ўтказамиз. Бу ҳолда директриса $x = -\frac{p}{2}$ тенгламага, F фокус эса $(\frac{p}{2}; 0)$ ко-

ординаталарга эга бўлади. Параболанинг $M(x; y)$ нуктасини оламиз. M нукта парабола чизигида ётиши учун (парабола таърифига кўра) ушбу тенглик ўринли бўлиши керак:

$$\rho(K, M) = \rho(M, F). \quad (7.28)$$

(7.28) тенгликни координаталарда ифодаalayмиз. Икки нукта орасидаги масофани топиш формуласига кўра:

$$\rho(K, M) = \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|,$$

$$\rho(M, F) = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

Буларни (7.28) га қўямиз:

$$\sqrt{\left(x + \frac{\rho}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(x - \frac{\rho}{2}\right)^2 + y^2}.$$


Бу тенгликнинг ҳар иккала томонини квадратга кўтарсак,

$$\left(x + \frac{\rho}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{\rho}{2}\right)^2 + y^2$$


ни ҳосил қиламиз. Қавсларни очиб соддалаштирсак, натижада

$$\begin{aligned} x^2 - \rho x + \frac{\rho^2}{4} + y^2 &= x^2 + \rho x + \frac{\rho^2}{4}, \\ y^2 &= 2\rho x \end{aligned} \quad (7.29)$$

тенглама ҳосил бўлади. (7.29) тенгламага парабола-нинг каноник тенгламаси дейилади.



67- чизма



68- чизма

$M(x, y)$ нуктанинг фокал радиуси $r = x + \frac{\rho}{2}$, парабола-нинг эксцентриситети: $d = r$, $\varepsilon = \frac{r}{d} = 1$ бўлгани учун, $\varepsilon = 1$ бўлади.

Парабола-нинг учи $A(x_0, y_0)$ нуктада бўлиб, унинг симметрия ўқи координата ўқларидан бирига параллел бўлса, унинг тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0) \text{ ёки } (x - x_0)^2 = 2p(y - y_0).$$

Парабола шакли. (7.29) тенгламаси бўйича параболанинг шаклини текширамиз. $y^2 \geq 0$ ва $p > 0$ бўлгани учун (7.29) тенгламада $x \geq 0$ бўлиши керак. Бу эса $p > 0$ бўлганда парабола ординаталар ўқидан ўнг томонда жойлашганини билдиради. Тенгламада y фақат жуфт даражада катнашгани учун абсциссалар ўқи парабола учун симметрия ўқи бўлади.

Агар $x = 0$ бўлса, $y = 0$ бўлиб, парабола координаталар бошидан ўтади. Координаталар боши эса параболанинг учи дейилади. (7.29) тенгламадан кўринадики, x ортиб бориши билан y ҳам ортиб боради. Демак, юқоридаги хоссаларга кўра параболанинг шаклини 68-чизмадагидек тасаввур қилиш мумкин.

Парабола координаталар системасида қандай жойлашинишига кўра унинг тенгламаси мос равишда

$$y^2 = 2px, y^2 = -2px, x^2 = 2py, x^2 = -2py$$

кўринишларда берилади. Охирги икки ҳолда параболанинг симметрия ўқи ординаталар ўқидан иборат бўлади.

Параболани ясаш. Парабола $y^2 = 2px$ тенглама билан берилган бўлсин. Дастлаб параболанинг фокусини ва директрисасини ясаймиз. Бунинг учун Ox ўқда координаталар бошидан ўнгга ва чапга $\frac{p}{2}$ га тенг

$[OF]$ ва $[OA]$ кесмаларни оламиз. A нуқта орқали Ox ўққа перпендикуляр қилиб d тўғри чизикни ўтказамиз. F нуқта параболанинг фокуси, d эса директрисаси бўлади (68-чизма).

Парабола учидан бошлаб параболанинг симметрия ўқига перпендикуляр ва ҳар бири олдингисидан $\frac{p}{2}$ масофада турувчи тўғри чизикларни ўтказамиз.

Ўтказилган тўғри чизикларнинг ҳар биридан директрисагача бўлган масофани радиус қилиб F марказли айлана чизамиз. Бу айлана тегишли тўғри чизикни икки нуктада кесади. Бу нукталар изланаётган парабола чизигининг нукталари бўлади. Кейинги директрисага параллел чизикдан директрисагача масофани радиус қилиб олиб, F фокусни эса марказ қилиб яна айлана ёйини чизсак, у олинган чизикни икки нуктада кесади,

бундай парабола нуқталарини қуриш жараёнини узлуксиз кўп маротаба бажарсак, параболанинг нуқталар тўпламига эга бўламиз. Директрисага параллел чизиклар сони қанча кўп бўлса, топилган парабола нуқталари шунча ўзаро яқин бўлиб, параболани чизиш аниқ ва осон бўлади.

$y = ax^2 + bx + c$ тенглама билан берилган парабола. $y = ax^2 + bx + c$ тенглама парабола эканлини кўрсатамиз. Унинг учун тенгламанинг ўнг томонидан тўла квадрат ажратамиз:

$$\begin{aligned} y &= a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c = \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}. \end{aligned}$$

Бундан

$$y - \frac{4ac - b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2. \quad (7.30)$$

Декарт координаталар бошини $O'\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ нуқтага

$$\begin{cases} x = x' - \frac{b}{2a}, \\ y = y' + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{cases}$$

формула бўйича координата ўқларини параллел кўчирामиз. Янги координаталар системасида (7.30) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$y' = ax'^2 \text{ ёки } x'^2 = \frac{1}{a}y'.$$

Агар $p = \frac{1}{2|a|}$ деб белгилаш киритсак,

$$x'^2 = 2py' \quad (7.31)$$

тенгламага эга бўламиз. (7.31) тенглама симметрия ўқи ($O'y'$) ўқ ва учи $O'(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ нуктада бўлган параболадан иборатдир.

1-мисол. $x - 2 = 0$ тўғри чизик ва $F(6; 0)$ нуктадан бир хил узокликда жойлашган нукталар геометрик ўрнининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. $M(x; y)$ — биз излаётган геометрик ўрнининг ихтиёрий нуктаси бўлсин. Икки нукта орасидаги масофа формуласига кўра:

$$|MF| = \sqrt{(x-6)^2 + y^2}.$$

Масала шартига кўра: $x - 2 = 0$ тўғри чизик $M(x; y)$ нуктадан

$$|MF| = |x - 2|$$

масофада бўлади. Шунга кўра

$$\sqrt{(x-6)^2 + y^2} = |x-2|$$

ёки

$$(x-6)^2 + y^2 = x^2 - 4x + 4 \Rightarrow y^2 = 8x + 32.$$

Бу эса Ox ўқига нисбатан симметрик бўлган парабола тенгламасидир.

2-мисол. $y^2 = 4x$ параболада фокал радиусининг узунлиги 20 бўлган нуктани топинг.

Ечиш. Изланаётган $M(x; y)$ нукта учун $\rho(F, M) = 20$,

$$y^2 = 4x \Rightarrow 2p = 4 \Rightarrow p = 2,$$

у ҳолда

$$F(1; 0), 20 = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + 4x}$$

ёки

$$400 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 399 = 0, \\ x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1+399} = -1 \pm 20; x_1 = 19, x_2 = -21.$$

$x_2 = -21$ илдиз масала шартини қаноатлантирмайди.
 $x_1 = 19$ ни $y^2 = 4x$ га қўйиб y ни топамиз:

$$y^2 = 4 \cdot 19 \Rightarrow y_1 = +2\sqrt{19}, y_2 = -2\sqrt{19}.$$

Демак, изланаётган нукта:

$$M_1(19; 2\sqrt{19}) \text{ ва } M_2(19; -2\sqrt{19}).$$

3-мисол. Автомобиль фонарининг кесими парабола шаклида бўлиб, унинг диаметри 20 см, чуқурлиги 10 см. Парабола фокусининг координаталарини топинг.


Ечиш. F фокусдан параболанинг учигача бўлган масофани топиш учун парабола тенгламасини тузамиз. Координаталар системасини шундай танлаб оламизки, фонарнинг симметрия ўқи Ox ўқ билан, учи эса координаталар боши билан устма-уст тушсин (69-чизма).

Бу ҳолда парабола тенгламаси $y^2 = 2px$ кўринишда бўлишини биламиз. A ва B нукталар параболга тегишли бўлгани учун ва масала шартига кўра нукталарнинг координаталари мос равишда $A(10; 10)$ ва $B(10; -10)$ га тенг.


Бу нукталарнинг координаталарини $y^2 = 2px$ тенгламага қўйсак:

$$10^2 = 2p \cdot 10$$

бўлиб, бундан $p = 5$ га эга бўламиз. Демак, параболанинг фокуси $F(\frac{5}{2}; 0)$ нуктада бўлади.



69-чизма



70-чизма

4-мисол. Oy ўқдан ва $F(3; 0)$ нуқтадан баравар узоқликда ётувчи нуқталар геометрик ўрнининг тенгламасини тузинг.

Ечиш. $M(x; y)$ нуқта масала шартини қаноатлантирсин. N нуқта Oy ўқда ётсин, y ҳолда масала шартига қўра:

$$MF = MN.$$

Икки нуқта орасидаги масофани топиш формуласига асосан:

$$\begin{aligned} MF &= \sqrt{(x-3)^2 + y^2}, \\ MN &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-y)^2} = x. \end{aligned}$$

Буларни ўрнига қўйсак,

$$\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = x \text{ ёки } y^2 = 6x - 9.$$

Демак, изланаётган геометрик ўрин фокуси $F(3; 0)$ нуқтада бўлган ҳамда Ox ўққа нисбатан симметрик бўлган параболадир.

5-мисол. Шар тарнов бўйлаб ҳаракатланади ва v тезликка эришиб тарновнинг уринмаси горизонтал йўналишга эга бўлган нуқтада ундан чиқиб кетади. Шарнинг бундан кейинги ҳаракат траекториясини аниқланг (70-чизма).

Ечиш. Шар Oy ўқ бўйлаб ҳаракат қилганда унинг t соатда босган йўли $y = vt$ бўлади.

Лекин шар оғирлик кучининг таъсирида Ox ўқ бўйлаб ҳам ҳаракат қилади. Шарнинг Ox ўқ бўйлаб босган йўли:

$$x = \frac{gt^2}{2}$$

(бу ерда $g = 9,8$ м/сек² — эркин тушиш тезланиши). Булардан

$$\begin{cases} x = \frac{gt^2}{2}, \\ y = v \cdot t. \end{cases}$$

$$\frac{r}{d} = \frac{\rho(F, M)}{\rho(d, M)} = \varepsilon, \\ \frac{\rho(F, M_0)}{\rho(d, M_0)} = \varepsilon \Rightarrow \rho(d, M_0) = \frac{\rho(F, M_0)}{\varepsilon} = \frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (7.32)$$

Агар $\varphi > \frac{\pi}{2}$ бўлса:

$$\rho(d, M) = \rho(d, M_0) - r \cos(180^\circ - \varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon} + r \cos \varphi.$$

Агар $\varphi < \frac{\pi}{2}$ бўлса:

$$\rho(d, M) = \rho(d, M_0) + \rho(F, M) = \frac{\rho}{\varepsilon} + r \cos \varphi$$

Демак, иккала ҳолда ҳам

$$\rho(d, M) = \frac{\rho}{\varepsilon} + r \cos \varphi.$$

$\rho(d, M)$ нинг қийматини (7.32) га қўйсак,
 $\frac{r}{\frac{\rho}{\varepsilon} + r \cos \varphi} = \varepsilon$ тенгликка эга бўламиз. Бундан

$$r = \frac{\rho}{1 - \varepsilon \cos \varphi}. \quad (7.33)$$

(7.33) тенглама берилган чизиқнинг қутб координаталаридаги тенграмаси дейилади. Бу (7.33) тенгламада:

а) $\varepsilon < 1$ бўлса, у эллипсни аниқлайди ва φ бу ҳолда $0 \leq \varphi < \pi$ ораликдаги барча қийматларни қабул қилади;

б) $\varepsilon = 1$ бўлса, у параболани аниқлайди ва φ бу ҳолда $0 < \varphi < \pi$ ораликдаги барча қийматларни қабул қилади;

в) $\varepsilon > 1$ бўлса, у гиперболани аниқлайди. Бу ҳолда φ қайси ораликда ўзгариши қуйидагича аниқланади. $2\varphi_0$ — асимптоталар орасидаги тармоқ жойлашган бурчак бўлсин, у ҳолда

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{c^2 - a^2}{a^2}} = \sqrt{e^2 - 1} \quad \text{ёки} \quad \frac{\sin^2 \varphi_0}{\cos^2 \varphi_0} = e^2 - 1 \Rightarrow$$

$$e^2 \cos^2 \varphi = 1 \quad \text{ёки} \quad \cos^2 \varphi_0 = \frac{1}{e^2}, \quad \varphi_0 < \frac{\pi}{2} \quad \text{бўлганидан}$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{1}{e}.$$

(7.33) тенгламада $r > 0$ учун $1 - e \cos \varphi > 0$ ёки $\cos \varphi < \frac{1}{e} = \cos \varphi_0$ бўлиши керак. Бундан гиперболанинг

қаралаётган тармогидаги нуқталар учун $\varphi_0 < \varphi < 2\pi - \varphi_0$ тенгсизликлар бажарилади. (7.33) тенгламадаги p сон фокал параметр дейилади. Парабола учун бу фокал параметр унинг каноник тенгламасидаги p дан иборат. Эллипс ва гипербола учун p нинг маъноси, уларнинг мос равишда ярим ўқлари орқали қуйидагича ифодаланади. (F M_0) тўғри чизик эллипс (гипербола) нинг фокал ўқига перпендикуляр бўлгани учун M_0 , F нуқталар бир хил абсциссага эга. $M_0(x_0; y_0)$ бўлса, $x_0 = -c$ (гиперболада $x_0 = +c$). M_0 нуқта эллипс (гипербола)га тегишли бўлгани учун

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \quad \left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \right) \quad \text{ва} \quad p = \rho(M_0, F) = |y_0|$$

ни ҳисобга олсак, $\frac{c^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1 \Rightarrow$

$$p^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) = b^2 \cdot \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{b^4}{a^2} \Rightarrow$$

$$p = \frac{b^2}{a}.$$

Демак, эллипс ва гиперболада фокал параметр $p = \frac{b^2}{a}$ га тенг.

1-мисол. $r = \frac{15}{12 - 13 \cos \varphi}$ чизикнинг декарт координаталар системасидаги каноник тенгламасини ёзинг.

Ечиш. Берилган тенгламани (7.33) $\left(r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi} \right)$

кўринишга келтирамиз. Унинг учун унғ томоннинг сурат ва махражини 12 га бўламиз:

$$r = \frac{15}{12 - 13 \cos \varphi} = \frac{\frac{15}{12}}{1 - \frac{13}{12} \cos \varphi} = \frac{\frac{5}{4}}{1 - \frac{13}{12} \cos \varphi}.$$

Буни (7.33) билан таққослаб, $\varepsilon = \frac{13}{12} > 1$ бўлгани учун эгри чизиқ гипербола деган хулосага келамиз.

Унинг каноник тенгламасини ёзамиз. Тенгламадан $p = \frac{5}{4}$, лекин $p = \frac{b^2}{a}$ эди, бундан

$$\frac{b^2}{a} = \frac{5}{4} \Rightarrow b^2 = \frac{5}{4} a \cdot \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{13}{12} \Rightarrow c = \frac{13}{12} a.$$

b , c нинг бу қийматларини $b^2 = c^2 - a^2$ тенгликка қўйиб a ни топамиз:

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} a &= \frac{169}{144} a^2 - a^2 \Rightarrow a = \frac{36}{5}, \\ b^2 &= \frac{5}{4} a = \frac{5}{4} \cdot \frac{36}{5} = 9. \end{aligned}$$

Демак, берилган гиперболанинг каноник тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{36}{5}\right)^2} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

6-§. Иккинчи тартибли чизиқнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш

Бирор тўғри бурчакли декарт координаталар система-сида координаталари

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (7.34)$$

тенгламани қаноатлантирувчи нуқталар тўплами иккинчи тартибли чизиқ деб аталиши бизга маълум. Бунда

a_{ij} коэффициентлар хақиқий сонлардан иборат бўлиб, a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентларнинг ҳеч бўлмаганда биттаси нолдан фарқли бўлади.

Иккинчи тартибли чизиклар назариясининг асосий масалаларидан бири унинг умумий тенгламасини кано-
ник кўринишга келтиришдир. Иккинчи тартибли чизик
тенгламасини соддалаштиришни қўйдагича бажара-
миз.

Агар иккинчи тартибли чизик бирор R тўғри бурчакли
координаталар системасида (7.34) тенглама билан
берилган бўлса, у ҳолда бу координаталар системасини
буриш ёрдамида R' тўғри бурчакли координаталар
системасига ўтиш мумкин. Бу системада (7.34) чизик
тенгламасидаги ўзгарувчилар кўпайтмаси, яъни xu ни
сақланмайди (бу босқич $a_{22} \neq 0$ бўлган ҳолда ҳам
қўлланилади). Бунинг учун

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases} \quad (7.35)$$

ўтиш формуласидан фойдаланамиз. (7.35) ни (7.34) га
қўйсақ ва ўхшаш ҳадларини ихчамласак, (7.34) тенг-
лама R' координаталар системасида қуйидаги кўри-
нишни олади:

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a'_{00} = 0, \quad (2.36)$$

бу ерда

$$\begin{aligned} a'_{11} &= a_{11} \cos^2 \alpha + 2a_{12} \cos \alpha \sin \alpha + a_{22} \sin^2 \alpha, \\ a'_{12} &= -a_{11} \sin \alpha \cos \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha - a_{12} \sin^2 \alpha + a_{22} \sin \alpha \cos \alpha \\ a'_{22} &= a_{11} \sin^2 \alpha - 2a_{12} \sin \alpha \cos \alpha + a_{22} \cos^2 \alpha, \\ a'_{10} &= a_{11} \cos \alpha + a_{20} \sin \alpha, \\ a'_{20} &= -a_{10} \sin \alpha + a_{20} \cos \alpha, \\ a'_{00} &= a_{00} \end{aligned} \quad (7.37)$$

(7.37) белгилашлардан кўринадики, (7.36) тенгламада-
ги a'_{11} , a'_{12} , a'_{22} коэффициентлар (7.34) тенгламадаги
 a_{11} , a_{12} , a_{22} коэффициентларга ва α бурчакка
боғлиқ, шунинг билан бирга a'_{11} , a'_{12} , a'_{22} ларнинг камида
бири нолдан фарқли бўлиши керак.

α бурчакнинг ихтиёрийлигидан фойдаланиб, уни шундай танлаб оламизки, натижада (7.36) тенгламадаги a'_{12} коэффициент нолга тенг бўлсин:

$$\begin{aligned} a'_{12} &= -a_{11}\sin\alpha\cos\alpha + a_{12}\cos^2\alpha - a_{12}\sin^2\alpha + a_{22}\sin\alpha\cos\alpha = \\ &= -(a_{11}\cos\alpha + a_{12}\sin\alpha)\sin\alpha + (a_{12}\cos\alpha + a_{22}\sin\alpha)\cos\alpha = 0 \end{aligned}$$

ёки

$$\frac{a_{11}\cos\alpha + a_{12}\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{a_{12}\cos\alpha + a_{22}\sin\alpha}{\sin\alpha} \quad (7.38)$$

Бу нисбатни бирор λ га тенглаб, уни қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)\cos\alpha + a_{12}\sin\alpha = 0 \\ a_{12}\cos\alpha + (a_{22} - \lambda)\sin\alpha = 0. \end{cases} \quad (7.39)$$

(7.39) система бир жинсли бўлгани учун, унинг детерминанти нолга тенг, яъни

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Бундан

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{12} - a_{12}^2) = 0. \quad (7.40)$$

Бизга маълумки, (7.40) бажарилгандагина система нолдан фаркли ечимга эга бўлади. (7.40) тенглама (7.34) чизиқнинг характеристик тенгламаси дейилади. (7.40) тенгламанинг дискриминанти:

$$D = (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{12} - a_{12}^2) = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 > 0$$

бўлгани учун (7.40) тенгламанинг иккита λ_1 ва λ_2 илдизлари турли ва ҳақиқийдир.

(7.38) тенгликдан:

$$a_{11}\cos\alpha + a_{12}\sin\alpha = -\lambda\cos\alpha, \quad (7.41)$$

$$a_{12}\cos\alpha + a_{22}\sin\alpha = \lambda\sin\alpha.$$

Буларнинг ҳар бирини $\cos\alpha \neq 0$ га бўлиб (агар $\cos\alpha = 0$ бўлса, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ бўлиб, $a_{12} = 0$ бўлади),

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\lambda - a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{11}}{\lambda - a_{22}} \quad (7.42)$$

ни ҳосил қиламиз. (7.42) муносабатга навбат билан λ_1 ва λ_2 илдишларни қўямиз.

$$\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}}; \operatorname{tg}\alpha_2 = \frac{\lambda_2 - a_{11}}{a_{22}}. \quad (7.43)$$

(7.43) формуладан фойдаланиб $\alpha = \alpha_1$ бурчакни аниқлаб, R координаталар системасини шу α_1 бурчакка буриш билан янги R' координаталар системасига ўтиш мумкинки, бу системада (7.34) тенглама соддалашиб, қуйидаги кўринишни олади:

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a'_{00} = 0. \quad (7.44)$$

Агар (7.34) тенгламада $a_{10} = a_{20} = 0$ бўлса, у ҳолда $a'_{10} = a'_{20} = 0$ бўлиб, (7.44) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a_{00} = 0. \quad (7.45)$$

Шундай қилиб, координаталар системасини буриш ёрдамида (7.34) тенгламани (7.44) кўринишдаги тенгламага келтирдик. Энди (7.44) кўринишдаги тенгламани янада соддалаштириш учун, координаталар бошини кўчириш формуласидан фойдаланамиз.

Иккинчи тартибли чизиқнинг тенгламаси (7.44) кўринишда бўлсин ва (7.40) характеристик тенгламанинг илдишлари λ_1 ва λ_2 эса бир вақтда нолга тенг бўлмасин. Қуйидаги уч ҳол бўлиши мумкин:

$$а) \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0 \Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0.$$

Бу ҳолда (7.45) тенгламада қуйидагича шакл алмаштириш бажарамиз:

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{a'_{10}}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + a''_{00} = 0,$$

бу ерда

$$a''_{00} = a'_{00} - \frac{a'^2_{10}}{\lambda_1} - \frac{a'^2_{20}}{\lambda_2}$$

деб белгилаймиз. Энди

$$\begin{cases} x' = X + \left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1}\right) \\ y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2}\right) \end{cases}$$

алмаштиришни бажарамиз; у холда янги координаталар системаси, яъни R'' да эгри чизик куйидаги тенгламага эга бўлади:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + a''_{00} = 0, \quad (7.46)$$

бу ерда $O'\left(-\frac{a'_{10}}{\lambda_1}, -\frac{a'_{20}}{\lambda_2}\right)$. Агар $a''_{00} \neq 0$ бўлса, (7.46)

ни каноник кўринишда ёзиш мумкин:

$$\frac{x^2}{-a''_{00}/\lambda_1} + \frac{y^2}{-a''_{00}/\lambda_2} = 1. \quad (A)$$

Агар $a'_{00} = 0$ бўлса, (7.46) ни куйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 0. \quad (B)$$

Шундай қилиб, R координаталар системасида (7.34) тенглама билан берилган иккинчи тартибли чиқиқнинг характеристик тенгламаси илдизлари λ_1 ва λ_2 нолга тенг бўлмаса, $y(A)$ ва (7.46) формулаларга кўра 219-бетдаги жадвалда ифодаланган чизиклардан бирортасини ифодалайди.

б) $\lambda_1 = 0$, ($\lambda_2 \neq 0$), $a'_{10} \neq 0$.

Бу холда (7.44) тенгламани куйидагича ёзиш мумкин:

$$\lambda_2 \left(y' + \frac{a'_{20}}{\lambda_2}\right)^2 + 2a'_{10} \left(x' - \frac{a'_{20} \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}}\right) = 0.$$

№	λ_1	λ_2	a''_{10}	Каноник тенгламаси	Чизиқнинг номи
1	+	+	-	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Эллипс
	-	-	+		
2	+	+	+	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$	Мавҳум эллипс
	-	-	-		
3	+	+	0	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	Нуқта (кесишувчи мавҳум тўғри чизиқлар жуфти)
	-	-	0		
4	+	-	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	Гипербола
	-	+	$\neq 0$		
5	+	-	0	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	Кесишувчи тўғри чизиқлар жуфти
	-	+	0		

Бу тенгламага қуйидаги координата алмаштириш формуласи

$$x' = X + \frac{a_{20}^2 \cdot \frac{1}{\lambda_2} - a'_{00}}{2a'_{10}}; \quad y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

ни қўлласак,

$$\lambda_2 Y^2 + 2a'_{10} X = 0 \Rightarrow Y^2 = -2 \cdot \frac{a'_{10}}{\lambda_2} X \quad (7.47)$$

кўринишдаги парабола тенгламасига эга бўламиз. Агар

$\lambda_1 \neq 0$, $\lambda_2 = 0$, $a'_{20} \neq 0$ бўлса, у ҳолда

(7.44) тенгламанинг кўриниши

$$X^2 = -2 \cdot \frac{a'_{20}}{\lambda_1} Y$$

булиб, бу ҳам парабола тенгламасидир. Демак, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 \neq 0$, $a'_{10} \neq 0$ бўлса (ёки $\lambda_1 \neq 0$, $\lambda_2 = 0$, $a'_{20} \neq 0$ бўлса), у ҳолда (7.44) тенглама параболани ифодалар экан.

в) $\lambda_1 = 0$, $a'_{10} = 0$ ёки $\lambda_2 = 0$, $a'_{20} = 0$ бўлсин.

Бу ҳолда (7.44) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\lambda_2 \left(y + \frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)^2 + a''_{00} - \frac{a_{20}^2}{\lambda_2} = 0.$$

Агар $a'_{00} - \frac{a_{20}^2}{\lambda_2} = a''_{00}$ деб белгилаб

$$x' = X, y' = Y + \left(-\frac{a'_{20}}{\lambda_2} \right)$$

координаталарни алмаштириш формуласини татбиқ этсак, (7.44) тенглама R'' координаталар системасида

$$Y^2 + \frac{a''_{00}}{\lambda_2} = 0 \quad (7.48)$$

кўринишга эга бўлади. (7.48) формулада қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин. Агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} < 0$ бўлса, $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = -a^2$ деб белгилаб, (7.48) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$Y^2 - a^2 = 0 \Rightarrow Y - a = 0; Y + a = 0. \quad (7.49)$$

Агар $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} > 0$, яъни $\frac{a''_{00}}{\lambda_2} = a^2$ бўлса, у ҳолда

$$Y^2 + a^2 = 0 \Rightarrow Y + ai = 0; Y - ai = 0$$

бўлади. Бу ҳолда чизик мавҳум параллел тўғри чизиклар жуфтини ифодалайди.

Агар $a''_{00} = 0$ бўлса, $Y^2 = 0 \Rightarrow Y = 0$ бўлади ва бу ҳолда тенглама устма-уст тушган тўғри чизиклар жуфтини ифодалайди.

Шундай қилиб (7.34) тенглама қуйидаги 9 та чизикдан биттасини ифодалайди: 1) Эллипс; 2) Гипербола; 3) Парабола; 4) Кесишувчи тўғри чизиклар жуфти; 5) Ҳар хил параллел тўғри чизиклар жуфти; 6) Устма-уст тушувчи тўғри чизиклар жуфти; 7) Мавҳум эллипс; 8) Мавҳум кесишувчи тўғри чизиклар жуфти; 9) Мавҳум параллел тўғри чизиклар жуфти.

1-мисол. Ушбу иккинчи тартибли эгри чизикнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтиринг: .

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$$

Ечиш. 1) характеристик тенгламани тузиб, унинг илдизларини аниқлаймиз:

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 \\ 4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0; \lambda_1 = 9; \lambda_2 = 1;$$

2) координаталар системасини буриш керак бўлган бурчакни топамиз:

$$\sin \alpha_1 = \frac{\lg \alpha_1}{\sqrt{1 + \lg^2 \alpha_1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}; \cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \lg^2 \alpha_1}} = \frac{1}{\sqrt{2}};$$

3) a'_{10} ва a'_{20} коэффициентларни аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} a'_{10} &= a_{10} \cos \alpha_1 + a_{20} \sin \alpha_1 = \\ &= -9 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + (-9) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{18}{\sqrt{2}} = -9\sqrt{2}. \\ a'_{20} &= -a_{10} \sin \alpha_1 + a_{20} \cos \alpha_1 = \\ &= -(-9) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + (-9) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{9}{\sqrt{2}} + \frac{9}{\sqrt{2}} = 0. \end{aligned}$$

4) топилганлардан фойдаланиб, янги координаталар системасига нисбатан куйидаги чизик тенгламасини тузамиз:

$$9x'^2 + y'^2 - 18\sqrt{2}x' + 9 = 0$$


ёки

$$x^2 + \frac{y^2}{9} - 2\sqrt{2}x + 1 = 0.$$

x' қатнашган ҳадлардан тўлиқ квадрат ажратиб, уни куйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$\frac{(x' - \sqrt{2})^2}{1} + \frac{y'^2}{9} = 1 \quad \text{ёки} \quad \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Бу тенглама маркази $O_1(\sqrt{2}; 0)$ нуқтага жойлашган ва ярим ўқлари $a = 1$, $b = 3$ дан иборат эллипс тенгламасидир (72-чизма).



2-мисол. Ушбу $4x^2 - 4xy + y^2 - 2x - 14y + 7 = 0$ чизик тенгламасини каноник кўринишга келтиринг, чизмасини ясанг.

Ечиш. Бу ерда $a_{11} = 4$, $a_{12} = -2$, $a_{22} = 1$, $a_{10} = -1$, $a_{20} = -7$, $a_{00} = 7$.

1) характеристик тенгламани тузиб, унинг илдизларини аниқлаймиз:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda = 0; \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$$

ва олдинги мисолдагига ўхшаш давом эттирамиз:

$$2) \operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} = \frac{-4}{-2} = 2,$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}; \cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}};$$

$$3) a'_{10} = a_{10} \cos \alpha_1 + a_{20} \sin \alpha_1 = -3\sqrt{5},$$

$$a'_{20} = -a_{10} \sin \alpha_1 + a_{20} \cos \alpha_1 = -\sqrt{5};$$

$$4) 5y'^2 - 6\sqrt{5}x' - 2\sqrt{5}y' + 7 = 0;$$


$$5) 5\left(y' - \frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 6\sqrt{5}\left(x' - \frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 0;$$

$$6) x' = X + \frac{\sqrt{5}}{5}; y' = Y + \frac{\sqrt{5}}{5}$$

алмаштириш бажарамиз:

$$5Y^2 - 6\sqrt{5}X = 0 \Rightarrow Y^2 = \frac{6\sqrt{5}}{5}X.$$

Бу тенглама параболани ифодалайди (73- чизма).



73- чизма

МАШҚЛАР

1. Куйидаги айланаларнинг маркази координаталарини ва радиусини аниқланг:

а) $2x^2 + 2y^2 - 3x + 4y + 2 = 0$;

б) $x^2 + y^2 - 4x + 14y + 54 = 0$;

в) $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$;

г) $x^2 + y^2 + 10x - 4y + 29 = 0$;

д) $x^2 + y^2 + 3x - 7y - \frac{3}{2} = 0$;

е) $x^2 + y^2 + 3x - y = 0$.

2. $A(6; -4)$ нукта берилган. Диаметри OA кесмадан иборат айлана тенгламасини тузинг.

3. Куйидаги айланаларни ясанг:

а) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 21 = 0$;

б) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$;

в) $x^2 + y^2 - 8x = 0$;

г) $x^2 + y^2 + 4y = 0$.

4. Берилган $A(-4; 0)$; $B(1; 5)$ ва $C(4; -4)$ нукталардан ўтувчи айлана марказининг координаталари ҳамда радиусини топинг.

5. Айлана диаметрининг учлари $A(-3; 2)$ ва $B(1; 4)$ бўлса, шу айлана тенгламасини тузинг.

6. $A(4; 4)$ нуктадан ва $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 0$ айлана билан $y = -x$ тўғри чизикнинг кесишган нукталаридан ўтувчи айлана тенгламасини топинг.

7. Радиуси $R = 1$ бўлган айлана $A(2; 1)$ нукта орқали ўтади ва $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 19 = 0$ айланасига уринади. Айлана тенгламасини тузинг.

8. Координаталар бошидан ва $x^2 + y^2 = a^2$ айлананинг $x + y + a = 0$ тўғри чизик билан кесишган нукталаридан ўтувчи айлана тенгламасини тузинг.

9. $A(1; -3)$ ва $B(-1; 1)$ нукталардан ўтиб, маркази $2x - y + 1 = 0$ тўғри чизикда ётган айлана тенгламасини тузинг.

10. Учбурчак томонларининг тенгламалари $9x - 2y - 41 = 0$, $7x + 4y + 7 = 0$, $x - 3y + 1 = 0$ бўлса, шу учбурчакка ташқи чизилган айлана тенгламасини тузинг.

11. Эллипснинг кичик ярим ўқи $b = 12$, эксцентриситети $e = 0,5$. Эллипснинг тенгламасини тузинг ҳамда фокуслари орасидаги масофани топинг.

12. $A(4; 1)$ ва $B(\frac{5\sqrt{5}}{3}; -2)$ нукталардан ўтувчи эллипс тенгламасини тузинг.

13. Куйидагиларни билган ҳолда эллипс тенгламасини тузинг:

а) ярим ўқлари мос равишда 4 ва 2 га тенг;

б) фокуслари орасидаги масофа 6 га, катта ярим ўқи 5 га тенг;

в) кичик ярим ўқи 3 га, эксцентриситети $\frac{\sqrt{2}}{2}$ га тенг;

г) ярим ўқларининг йигиндиси 8 га ва фокуслар орасидаги масофа 8 га тенг;

д) директрисаси $x = \pm 12$ тенглама билан аниқланган ва эксцентриситети $\frac{1}{3}$ га тенг.

14. Агар эллипснинг директрисалари орасидаги масофа фокуслари орасидаги масофадан тўрт марта катта бўлса, унинг эксцентриситетини топинг.

15. Директрисалари $x = \pm 8$ ва кичик ўқи 8 га тенг бўлган эллипснинг тенгламасини тузинг ва эксцентриситетини топинг.

16. $x^2 + y^2 = 4$ айланадаги ҳар бир нуктанинг абсциссаси икки баробар орттирилган. Ҳосил бўлган эгри чизиқни аниқланг.

17. Эллипс абсциссалар ўқида $A(7; 0)$ нуктада ва ординаталар ўқида $B(0; 4)$ нуктада уринади. Агар эллипснинг ўқлари координата ўқларига параллел бўлса, унинг тенгламасини тузинг.

18. Эллипс Ox ўқини $A(3; 0)$ ва $B(7; 0)$ нукталарда кесади ва Oy ўқига $C(0; 3)$ нуктада уринади. Агар эллипснинг ўқлари координата ўқларига параллел бўлса, унинг тенгламасини тузинг.

19. Гиперболанинг $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ тенгламаси берилган. Гиперболанинг эксцентриситетини, фокуслари ва учларининг координаталарини, асимптоталирининг тенгламаларини, ихтиёрий нуктасининг фокал радиусларини ва директрисаларининг тенгламаларини аниқланг.

20. $2x^2 - 4y^2 = 18$ гипербола тенгламаси берилган. Гиперболанинг фокуслари, асимптоталари, эксцентриситетини аниқланг ва уни ясанг.

21. Учлари $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ эллипснинг фокусларида, фокуслари эса унинг учларида бўлган гиперболанинг қаноник тенгламасини ёзинг.

22. Фокуслари тенг томонли $x^2 - y^2 = 8$ гипербола-нинг фокуслари билан устма-уст тушган ҳамда $A(4; 6)$ нуқтадан ўтган эллипс тенгламасини тузинг.

23. Гипербола координата ўқларига нисбатан симметрик бўлиб, $A(6; -2\sqrt{2})$ нуқтадан ўтади, мавҳум ярим ўқи $b = 2$ га тенг. Унинг каноник тенгламасини тузинг ва $B(6; -2\sqrt{2})$ нуқтадан фокусларигача бўлган масофаларни топинг.

24. Гипербола асимптоталарининг тенгламалари $4y - 3x = 0$ ва $3x - 4y = 0$ бўлиб, фокуслари орасидаги масофа 10 га тенг. Унинг каноник тенгламасини тузинг.

25. $x^2 + y^2 + 6x = 0$ айлана ва $x - y = 0$ тўғри чизиқнинг кесишган нукталаридан ўтиб, Oy ўққа нисбатан симметрик бўлган парабола ва унинг директрисаси тенгламаларини тузинг. Айлана, тўғри чизиқ ва параболани ясанг.

26. Горизонтга нисбатан ўткир бурчак остида отилган тош парабола ёйини чизиб, бошлангич жойидан 32 метр узоққа тушади. Тошнинг 24 метр баландликка кўтарилганлигини билган ҳолда унинг траекторияси тенгламасини тузинг.

27. Фавворадан отилиб чиқаётган сув оқими параболаси $p = 0,1$ бўлган парабола шаклини олади. Сувнинг отилиб чиқаётган жойдан 2 м узоқликка тушаётганлиги маълум бўлса, отилиб чиқаётган сувнинг баландлигини топинг.

28. Иккинчи тартибли эгри чизиқларнинг қутб тенгламалари берилган:

$$a) r = \frac{1}{2 - 2\cos\varphi}; \quad б) r = \frac{1}{2 - \sqrt{3}\cos\varphi};$$

$$в) r = \frac{1}{2 - \sqrt{5}\cos\varphi}.$$

Уларнинг декарт координаталари системасидаги тенгламаларини тузинг.

29. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$ эллипснинг қутб координатасидаги тенгламасини тузинг.

30. $r = \frac{3\sqrt{2}}{2 - \cos\varphi}$ эллипснинг ярим ўқларининг узунлигини ва фокуслари орасидаги масофани, эксцентриситети ва директрисаларининг тенгламасини топинг.

31. Координата ўқларини параллел кўчирганда $A(4; 1)$ нукта янги $A(3; -1)$ координаталарга эга бўлади. Эски ва янги координаталар системаларини ҳамда A нуктани ясанг.

32. Координата ўқларининг йўналишини маълум бир ўткир бурчакка бурганда $A(1; 4)$ нуктанинг янги системадаги абсциссаси 4 га тенг. Ўша буриш бурчагини топинг, янги ва эски системани ҳамда A нуктани ясанг.

33. Қуйидаги иккинчи тартибли эгри чизикларнинг тенгламаларини энг содда (каноник) кўринишга келтиринг ва бу эгри чизикларни ясанг:

а) $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$;

б) $32x^2 + 52xy - 7y^2 + 180 = 0$;

в) $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$;

г) $3x^2 - 4xy - 2x + 4y^2 - 5 = 0$;

д) $16x^2 - 2xy + 9y^2 + 25x - 50y + 50 = 0$.

е) $9x^2 + 24xy + 16y^2 + 50x - 100y + 25 = 0$.

8-БОБ

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ СИРТЛАР

1-§. Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси

Бизга маълумки, $F(x; y) = 0$ тенглама текисликда бирор тугри чизикни аниқлайди, яъни Oxy текисликдаги координаталари x ва y бўлган барча нукталар тўплами бу тенгламани қаноатлантиради. Шунингдек, фазода ҳам

$$F(x, y, z) = 0 \quad (8.1)$$

тенглама $Oxyz$ да бирор сиртни, яъни координаталари x , y ва z бўлган ва (8.1) тенгламани қаноатлантирадиган нукталар тўпламини аниқлайди. (8.1) тенглама сиртнинг тенгламаси, x , y , z лар эса унинг ўзгарувчи координаталари дейилади.

Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0, \quad (8.2)$$

бу тенгламадаги a_{11} , a_{22} , a_{33} , a_{12} , a_{13} , a_{23} коэффициентларнинг камида биттаси нолдан фарқли бўлиши керак. Айрим ҳолларда сирт тенгламаси билан эмас, балки у ёки бу хоссага эга бўлган нукталарнинг

геометрик ўрни билан берилиши мумкин. Бу ҳолда сиртнинг геометрик хоссаларидан фойдаланиб унинг тенгламаси тузилади.

Масалан, берилган $O(a; b; c)$ нуқтадан R масофада ётувчи барча нуқталарнинг геометрик ўрни шар сирти (сфера) бўлади. Бу бобда оддий кўринишдаги тенгламалари иккинчи даражали икки ўзгарувчили бўлган сиртларнинг баъзилари билан танишамиз.

2-§. Сферик сирт

Сферанинг *Охуз* тўғри бурчакли декарт координаталар системасидаги тенгламасини тузамиз.

Маркази $O'(a; b; c)$ нуқтада ва радиуси R бўлган сфера берилган бўлсин. Агар $M(x; y; z)$ нуқта сферанинг ихтиёрий нуқтаси бўлса, у ҳолда $O'(a; b; c)$ ва $M(x; y; z)$ нуқталар орасидаги масофани топиш формуласидан фойдалансак, сфера тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2. \quad (8.3)$$

(8.3) — маркази $O'(a; b; c)$ нуқтада ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенгламаси дейилади. Агар (8.3) да $a=b=c=0$ бўлса, маркази координаталар бошида ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенгламасига эга бўламиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (8.4)$$

(8.3) ни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 0. \quad (8.5)$$

Сфера тенгламаси иккинчи тартибли сирт эканини кўрсатамиз. Унинг учун сиртнинг (8.2) тенгламасида

$$a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0 \text{ ва } a_{11} = a_{22} = a_{33}$$

деб олинса, (8.2) нинг кўриниши қуйидагича бўлади:

$$a_{11}x^2 + a_{11}y^2 + a_{11}z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0. \quad (8.6)$$

Ҳосил бўлган (8.6) тенглама сферанинг тенгламаси эканини текшираамиз. Бунинг учун $a_{11} \neq 0$ деб (8.6) нинг ҳамма ҳадларини a_{11} га бўламиз ва қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$A = \frac{2a_{14}}{a_{11}}, B = \frac{2a_{24}}{a_{11}}, C = \frac{2a_{34}}{a_{11}}, D = \frac{a_{44}}{a_{11}}.$$

Натижада

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

кўринишдаги тенгламага эга бўламиз. Охирги тенгламани ушбу кўринишда ёзиб оламиз:

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(A^2 + B^2 + C^2 - 4D)$$

ёки

$$\begin{aligned} &\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \\ &= \left(\frac{1}{2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}\right)^2. \end{aligned} \quad (8.7)$$

(8.7) тенгламадан кўринадики, $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$ бўлганда (8.6) тенглама маънога эга бўлади. Демак,

$$A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$$

бўлса, (8.7) тенглама маркази $\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}; -\frac{C}{2}\right)$ нук-

тада ва радиуси $R = \frac{1}{2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}$ бўлган

сферани ифодалайди. Агар $A^2 + B^2 + C^2 - 4D = 0$ бўлса, (8.7) тенглама

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = 0$$

кўринишда бўлиб, у фақат битта $\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}; -\frac{C}{2}\right)$ нуктани ифодалайди.

Мисол. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 8z + 4 = 0$ сферанинг маркази ва радиусини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани (8.3) кўринишга келтирамиз. Бунинг учун тенгламадаги x, y, z лар қатнашган ҳадларни олиб, уларни тўла квадратга келтирамиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 8z + 4 = 0,$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 - 4 + 4 - 1 - 16 = 0 \Rightarrow$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 17$$

ёки

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = (\sqrt{17})^2.$$

Демак, сферанинг маркази $(2; -1; -4)$ нуктада бўлиб, радиуси $R = \sqrt{17}$ га тенг экан.

3-§. Цилиндрик сирт


Бирор Π текисликда ётувчи L чизиқнинг ҳар бир нуктасидан ўтувчи ва берилган l тўғри чизикка параллел бўлган барча тўғри чизиклардан ташкил топган сирт цилиндрик сирт дейилади. Бунда L чизик цилиндрик сиртнинг йўналтирувчиси, l тўғри чизикка параллел ва L чизикни кесувчи чизиклар унинг ясовчиси дейилади (74-чизма).

Йўналтирувчилари координата текисликларидан бирида ётувчи ясовчилари эса шу текисликка перпендикуляр бўлиб координаталар ўқиға параллел бўлган цилиндрик сиртларни қўрамиз.


Оху текисликда тенгламаси

$$F(x, y) = 0 \quad (8.8)$$

бўлган L чизик ва ясовчилари Oz ўққа параллел бўлган цилиндрик сирт ясаймиз (75-чизма).



74-чизма



75-чизма

(8.8) тенглама $Oxyz$ координаталар системасида цилиндрик сирт тенгламаси эканини кўрсатамиз.

$M(x, y, z)$ — цилиндрик сиртнинг ихтиёрий тайинланган нуктаси бўлсин. M нукта орқали ўтувчи ясовчи-

нинг L йўналтирувчиси билан кесишган нуқтасини N деб белгилаймиз.

N нуқта M нуқтанинг Oxy текислигидаги проекциясидир. Шунинг учун M ва N нуқталар битта x абсцисса ва битта y ординатага эга. N нуқта L чизикда ётгани учун, у эгри чизикнинг (8.8) тенгламасини қаноатлантиради.

Демак, бу тенгламани $M(x; y; z)$ нуқтанинг координатлари ҳам қаноатлантиради. $Oxyz$ фазода L йўналтирувчи куйдаги иккита тенглама системаси билан аниқланади:

$$\begin{cases} F(x; y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

Худди шунга ўхшаш

$$\begin{cases} F(x; z) = 0, \\ y = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(y; z) = 0, \\ x = 0 \end{cases}$$

тенгламалар цилиндрик сиртларнинг L йўналтирувчи чизикларини мос равишда Oxz ва Oyz текисликдаги ҳолатини аниқлашини кўрсатиш мумкин.

Цилиндрик сиртларга мисоллар кўрамиз.


1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ тенглама билан аниқланадаган

цилиндрик сирт эллиптик цилиндр дейилади (76-чизма). Унинг ясовчилари Oz ўққа параллел, ярим ўқлари a ва b бўлган Oxy текисликда ётган эллипс эса унинг йўналтирувчисиدير. Агар $a=b$ бўлса, унинг йўналтирувчиси айлана бўлади, сирт эса тўғри доиравий цилиндр бўлади. Унинг тенгламаси:


$$x^2 + y^2 = a^2.$$

2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ тенглама билан аниқланадиган ци-

линдрик сирт гипербolik цилиндр дейилади (77-чизма). Бу сиртнинг ясовчилари Oy ўққа параллел, йўналтирувчиси эса Oxz текисликда жойлашган гиперболодан иборатдир.




76- чизма



77- чизма

4- §. Конус сирт

Бирор Q текисликда L иккинчи тартибли чизик ва бу текисликка тегишли бўлмаган M_0 нуқта берилган бўлсин (78- чизма).



78- чизма

Таъриф. Фазодаги M_0 нуқтадан ўтиб, L ни кесиб ўтувчи барча тўғри чизиклар тўплами иккинчи тартибли конус сирт (ёки конус) деб аталади. M_0 нуқта конус учи, L чизик конус йўналтирувчиси, конусни ҳосил қилувчи тўғри чизиклар эса унинг ясовчилари деб аталади.

Конус ясовчилари бўлган тўғри чизиклар маркази конус учида бўлган тўғри чизиклар боғламига тегишли бўлади. Энди конус тенгламасини келтириб чиқарайлик. Q текислик ва ундаги L чизик Oxy текислигида ётган бўлсин. $M_0(x_0; y_0; z_0)$ эса Oxy текислигида ётмаган ихтиёрий нукта бўлсин. Конуснинг ихтиёрий $M(x; y; z)$ нуктасини олайлик, у ҳолда M_0M тўғри чизик конуснинг ясовчиси бўлиб, L чизик билан $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуктада кесишади. M_0 , M_1 ва M нукталар бир тўғри чизикда ётгани учун

$$\overline{M_0M_1} = \lambda \overline{M_0M}$$

тенглик ўринли. Бу тенгликдан:

$$\begin{aligned} x_1 - x_0 &= \lambda(x - x_0), & x_1 &= x_0 + \lambda(x - x_0), \\ y_1 - y_0 &= \lambda(y - y_0), & \text{ёки } y_1 &= y_0 + \lambda(y - y_0), \\ z_0 - z &= \lambda(z - z_0) & z_0 + \lambda(z - z_0) &= 0. \end{aligned}$$

Сўнгги тенгликдан λ ни топиб, олдинги икки тенгликка кўямиз:

$$x_1 = x_0 + \frac{x - x_0}{z_0 - z} \cdot z_0; \quad y_1 = y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} \cdot z_0. \quad (8.9)$$

$$M_1 \in L \Rightarrow F(x_1; y_1) = 0$$

ёки

$$F\left(x_0 + \frac{x - x_0}{z_0 - z} \cdot z_0; y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} \cdot z_0\right) = 0. \quad (8.10)$$

(8.10) ифода конус тенгламаси дейилади. Иккинчи тартибли конуснинг декарт координаталар системасидаги энг содда тенгламаси

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} &= 0; \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} &= 0; \\ -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} &= 0 \end{aligned} \quad (8.11)$$

кўринишларда бўлади.

Тенгламаси (8.11) кўринишда бўлган конусни текисликлар билан кесилса, кесимда қандай иккинчи тартибли чизиклар ҳосил бўлишини аниқлаймиз.

1. Конусни $z=h(h>0)$ текислик билан кессак, кесимда

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} \text{ ёки } \frac{x^2}{\left(\frac{ah}{c}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{bh}{c}\right)^2} = 1$$

эллипс ҳосил бўлади.

2. Конусни $y=h(h>0)$ текислик билан кессак, кесимда

$$-\frac{x^2}{\left(\frac{ah}{b}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(\frac{ch}{b}\right)^2} = 1$$

гипербола ҳосил бўлади.

3. Конусни $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = h(h>0)$ текислик билан кессак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = h \end{cases}$$

системанинг ечими бўлган $y^2 = -b^2h\left(2\cdot\frac{x}{a} - h\right)$ парабола ҳосил бўлади.

4. Конусни $y=0$ текислик билан кессак, кесимда $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ тенглама билан аниқланувчи кесишувчи иккита тўғри чизик ҳосил бўлади. Шунингдек, $x=0$ текислик билан кессак, кесимда $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ тенглама билан аниқланувчи кесишувчи иккита тўғри чизик ҳосил бўлади.

5. Конусни $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0$ текислик билан кессак, кесимда устма-уст тушган иккита $\frac{y^2}{b^2} = 0$ ёки $y^2 = 0$ тўғри чизик ҳосил бўлади.

Мисол. Йўналтирувчиси Oxy текисликдаги $x^2 - 4y^2 = 1$ гиперболадан иборат, учи $(1; -2; 1)$ нуқтада бўлган конус теигламасини тузинг.

Е чи ш. Масала шартига кўра

$$L: F(x; y) = x^2 - 4y^2 - 1 = 0; x_0 = 1; y_0 = -2, z_0 = 1.$$

(8.9) формулага асосан x ни

$$\frac{x-1}{1-z} + 1 = \frac{x-z}{1-z} \text{ билан, } y \text{ ни } \frac{y+2}{1-z} - 2 = \frac{y+2z}{1-z}$$

билан алмаштирсак, (8.10) формула қуйидаги кўринишни олади:

$$\left(\frac{x-z}{1-z}\right)^2 - 4\left(\frac{y+2z}{1-z}\right)^2 - 1 = 0.$$

Бу тенгламани соддалаштирсак, изланаётган конус тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$x^2 - 4y^2 - 16z^2 - 2xz - 16yz + 2z - 1 = 0.$$

5-§. Айланма сиртлар

Q текисликда бирор L чизик ва l тўғри чизик берилган бўлсин.

Таъриф. L чизикнинг l тўғри чизик атрофида айланишидан ҳосил бўлган Φ фигура айланма сирт деб аталади. Бунда L айланма сиртнинг меридиани, l айланиш ўқи деб аталади.

Равшанки, L чизикнинг ҳар бир нуқтаси l атрофида айланишида бирор айланани ҳосил қилиб, бу айлананинг маркази тўғри чизикда бўлади. Айланма сиртнинг тенгламасини келтириб чиқарамиз.

Декарт координаталар системасини шундай танлаб оламизки, бунда $Q = (Oyz)$ текислик, $l = (Oz)$ ўқ ҳамда

$$L: F(x; z) = 0$$

бўлсин.

L чизикнинг (Oz) ўқ атрофида айланишдан 79-чизмадагидек Φ сирт ҳосил бўлган бўлсин. $M(x; y; z)$ шу сиртга тегишли ихтиёрий нуқта бўлсин. M нуқтадан Oz ўқка перпендикуляр ўтказсак, кесимда маркази $O_1 \in (Oz)$ нуқтада бўлган бирор айлана ҳосил қилинадики, у айлана L чизик билан $M_1(O; y_1; z_1)$ нуқтада кесишсин. У ҳолда O_1 нинг координаталари $(0; 0; z)$ бўлади. Кесим айланадан иборат бўлгани учун:

$$\rho(O, M) = \rho(O_1, M_1). \quad (8.12)$$

Бу масофалар икки нуқта орасидаги масофани топиш формуласига кўра қуйидагича бўлади:

$$\rho(O, M) = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-z)^2} = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\rho(O_1, M) = \sqrt{(0-0)^2 + (y_1-0)^2 + (z-z)^2} = \sqrt{y_1^2} = |y_1|.$$

Бу қийматларни (8.12) тенгликка қўямиз:

$$|y_1| = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow y_1 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$M_1 \in L$ бўлгани учун:

$$F(\pm \sqrt{x^2 + y^2}; z) = 0. \quad (8.13)$$

(8.13) тенглама L чизиқни Oz ўқ атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган айланма сиртнинг тенгламасидир.

Агар L чизиқни мос равишда Ox ва Oy ўқлар атрофида айлантирсак, ҳосил бўлган сиртларнинг тенгламалари мос равишда

$$F(x; \pm \sqrt{y^2 + z^2}) = 0 \text{ ва}$$

$$F(y; \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0 \quad (8.14)$$

бўлади.

1-мисол. Oyz текисликда жойлашган

а) $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ эллипс; б) $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ гипербола; в)

$y^2 = 2pz$ параболаларнинг Oz ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўладиган айланма сиртларнинг тенгламаларини тузинг.

Ечиш. (8.13) формулага асосан:


а) эллипсни Oz ўқ атрофида айлантисак,

$$\frac{(\sqrt{x^2 + y^2})^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ ёки } \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

сирт ҳосил бўлиб, айланма эллипсоид деб аталади.

б) гиперболани Oz ўқ атрофида айлантирсак,

$$\frac{(\sqrt{x^2 + y^2})^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ ёки } \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



79 чизма

сирт ҳосил бўлиб, у айланма гиперболоид деб аталади;
в) параболани Oz ўқ атрофида айлантурсак,

$$(\pm \sqrt{x^2 + y^2})^2 = 2pz \text{ ёки } x^2 + y^2 = 2pz$$

сирт ҳосил бўлиб, у айланма параболоид деб аталади.

2- мисол. $y = x$ тўғри чизиқнинг Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган айланма сирт тенгламасини тузинг.

Ечиш. $y = x$ тўғри чизиқ тенгламасида y ни $\pm \sqrt{y^2 + z^2}$ билан алмаштирамиз:

$$x = \pm \sqrt{y^2 + z^2} \text{ ёки } x^2 - y^2 - z^2 = 0,$$

бу — изланаётган айланма сирт тенгламаси бўлиб, у доиравий конус сиртдан иборатдир.

6- §. Эллипсоид

Таъриф. Фазодаги декарт координаталар системасида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.15)$$

тенгламани қаноатлантирувчи барча нукталар тўпламидан ҳосил бўлган сирт эллипсоид деб аталади, бунда a, b, c сонлар унинг ярим ўқлари дейилади.

(8.15) тенглама билан берилган эллипсоиднинг шаклини ва баъзи геометрик хоссаларини аниқлайлиқ.

1. (8.15) тенглама иккинчи тартибли алгебраик тенглама бўлгани учун эллипсоид иккинчи тартибли сиртдир.

2. (8.15) тенгламага эътибор берсак, учта мусб a, b, c соннинг йигиндиси бирга тенгдир, бундан

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1; \frac{y^2}{b^2} \leq 1; \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

ёки

$$x^2 \leq a^2; y^2 \leq b^2; z^2 \leq c^2,$$

булардан:

$$-a \leq x \leq a; -b \leq y \leq b; -c \leq z \leq c. \quad (8.16)$$

Эллипсоид чегараланган сирт бўлиб, қирралари $2a$, $2c$, $2b$ тўғри бурчакли параллелепипед ичига жойлашган фигурадан иборатдир.

3. (8.15) ва (8.16) формулалардан кўриниб турибдики, агар қўшилувчилардан бирортаси бирга тенг бўлса, қолган иккитаси нол бўлиши керак. Масалан, $x^2 = a^2$ бўлганда $y^2 = 0$, $z^2 = 0$ бўлиб, $x = \pm a$, $y = 0$, $z = 0$ ва эллипсоид (Ox) ўқини $A_1(a; 0; 0)$, $A_2(-a; 0; 0)$ нуқталарда кесиб ўтади.

Худди шунга ўхшаш, бу эллипсоид Oy ўқини $B_1(0; b; 0)$, $B_2(0; -b; 0)$ нуқталарда Oz ўқини $C_1(0; 0; c)$, $C_2(0; 0; -c)$ нуқталарда кесиб ўтади.

Бу нуқталарга эллипсоиднинг учлари деб аталади.

4. Эллипсоидни координата текисликлари билан кесилганда кесимда ҳосил бўладиган чизиқларни аниқлаймиз:

а) эллипсоидни Oxy текислик билан кесайлик. Бу ҳолда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

яъни Oxy текислидаги эллипс ҳосил бўлади;

б) Oxz ($y = 0$) текислик билан кессак:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

эллипс ҳосил бўлади;

в) Oyz ($x = 0$) текислик билан кессак:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

эллипс ҳосил бўлади.

5. Эллипсоидни координата текисликларига параллел текисликлар билан кесилганда кесимда ҳосил бўладиган чизиқларни аниқлаймиз.

Эллипсоидни Oxy текисликка параллел бўлган $z = h$ текислик билан кессак, тенгламаси

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$$

бўлган эгри чизик ҳосил бўлади. Бу ерда уч ҳол бўлиши мумкин:

а) $-c < h < c$ бўлса, $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$ бўлиб,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$$

тенгламага эга бўламиз, бу эса маркази $(0; 0; h)$ нуктада ва $z = h$ текисликда ётувчи эллипсдан иборатдир;

б) $h = c$ ёки $h = -c$ бўлса, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ бўлиб, бу шарт фақатгина $x = 0, y = 0$ бўлгандагина бажарилади, демак, $z = c$ текислик бу ҳолда эллипсоид билан $(0; 0; c)$ нуктада, $z = -c$ текислик эса $(0; 0; -c)$ нуктада кесишади. Бу текисликлар эллипсоидга шу нукталарда мос равишда уринма текислик бўладилар;

в) $h > c$ ёки $h < -c$ бўлса, у ҳолда $1 - \frac{h^2}{c^2} < 0$ бўлиб, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$ нинг ўнг томонида манфий сон

ҳосил бўлади, чап томони эса доимо мусбат, демак $z > c$ ёки $z < -c$ текисликлар эллипсоид билан кесишмайди.

Эллипсоидни бошқа координата текисликларига параллел $x = h, y = h$ текисликлар билан кесилса, ҳосил бўлган кесимларни юқоридаги каби аниқлаш мумкин, биз уни ўқувчига ҳавола қиламиз.

6. Агар $M_1(x; y; z)$ нукта эллипсоидга тегишли бўлса, $M_2(-x; -y; -z)$ нукта ҳам унга тегишли бўлади, бундан кўринадики, эллипсоид координаталар бошига нисбатан симметрик жойлашган. Бу маълумотлар эллипсоиднинг кўринишини 80-чизмадагидек чизишга ёрдам беради. Хусусий ҳолда $a = b \neq c$ бўлса, $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ айланма эллипсоид ҳосил бўлади.

Агар $a = b = c$ бўлса, $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ бўлиб, маркази координаталар бошида ва радиуси a га тенг сфера ҳосил

бўлади, $a \neq b \neq c$ шартда эллипсоид уч ўқли дейилади.

Мисол. Ўқлари декарт координата ўқларида жойлашган ва $M(1; 0; 3)$ нуктадан ўтиб, Oxy текислик билан $\frac{x^2}{19} + \frac{y^2}{4} = 1$ эллипс бўйича кесишувчи эллипсоид тенгламасини тузинг.

Ечиш. Изланаётган тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$


кўринишда бўлиб, a, b, c ларни топиш кифоя. Масала шартига кўра $z=0$ да $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипс ҳосил бўлади, уни берилган $\frac{x^2}{19} + \frac{y^2}{4} = 1$ эллипс билан солиштириб, $a^2=19, b^2=4$ ларни топамиз.

$M(1; 0; 3)$ нукта изланаётган текисликка тегишли бўлгани учун


$$\frac{1}{19} + \frac{0}{4} + \frac{9}{c^2} = 1 \Rightarrow c^2 = \frac{19}{2}.$$

Демак, изланаётган тенглама қуйидагича бўлади:

$$\frac{x^2}{19} + \frac{y^2}{4} + \frac{2z^2}{19} = 1.$$



80- чизма



81- чизма

7-§. Гиперболоидлар

Гиперболоидлар икки хил бўлади. Агар гиперболани мавҳум ўқи атрофида айлантурсак, ҳосил бўлган сирт бир паллали айланма гиперболоид деб аталади ва бу сиртнинг тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.17)$$

кўринишда ёзилади. Агар гиперболани ҳақиқий ўқ атрофида айлантурсак, ҳосил бўлган сирт *икки паллали* айланма гиперболоид деб аталади ва бу сиртнинг тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.18)$$

кўринишда ёзилади.

Бир паллали гиперболоид. (8.17) тенглама билан берилган бир паллали гиперболоиднинг шаклини ва баъзи геометрик хоссаларини аниқлайлик (81-чизма).

1. (8.17) тенгламадан бир паллали гиперболоиднинг иккинчи тартибли сирт эканлигини кўрамиз.

2. Бир паллали гиперболоиднинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталарини аниқлаймиз:

а) (Ox) ўқ ($y=0, z=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y=0, \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x = \pm a.$$

Демак, бир паллали гиперболоид Ox ўқини $A_1(a; 0; 0)$, $A_2(-a; 0; 0)$ нуқталарда кесади.

б) (Oy) ўқ ($x=0, z=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x=0, \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y = \pm b.$$

Демак, бир паллали гиперболоид Oy ўқини $B_1(0; b; 0)$, $B_2(0; -b; 0)$ нуқталарда кесади.

в) (Oz) ўқ ($x=0; y=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x=0, \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow -\frac{z^2}{c^2} = 1 \Rightarrow z^2 = -c^2.$$

Бу тенглик ҳақиқий сонлар соҳасида ўринли эмас. Шунинг учун бир паллали гиперboloид Oz ўқи билан кесишмайди ва Oz ўқ гиперboloиднинг *мавҳум ўқи* деб аталади. A_1, A_2, B_1, B_2 нуқталар бир паллали гиперboloиднинг *учлари* дейилади.

3. Бир паллали гиперboloидни координата текисликлари билан кесилганда ҳосил бўладиган кесимни аниқлайлик.

а) бир паллали гиперboloидни Oxy текислик билан кессак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

эллипс ҳосил бўлади;

б) Oxz текислик билан кессак, кесимда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

гипербола ҳосил бўлади;

в) Oyz текислик билан кессак:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

яъни кесим гипербола бўлади.

4. Бир паллали гиперboloидни координата текисликларига параллел текисликлар билан кессак, ҳосил бўлган кесимлар ё гипербола, ёки эллипс бўлади.

а) Oxy текисликка параллел $z=h$ текислик билан кессак:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \text{ яъни}$$

кесим — эллипс. Бунда $|h|$ сон катталашган сари эллипснинг ярим ўқлари катталашиб, фақат $h=0$ бўлганда эллипс энг кичик ярим ўкли бўлади;

б) *Оуз* текисликка параллел $x=h$ текислик билан кессак:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = h \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2}. \quad (A)$$

h нинг қийматларига кўра (A) тенгламада қуйидаги ҳоллар юз бериши мумкин:

1) агар $h=a$ бўлса, (A) тенглама қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \Rightarrow \frac{y}{b} - \frac{z}{c} = 0, \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0,$$

яъни кесим $(0; 0)$ нуқтада кесишуви иккита тўғри чизиқдан иборат бўлади;

2) агар $-a < h < a$ бўлса, $1 - \frac{h^2}{a^2} > 0$ бўлиб, (A) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)} - \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right)} = 1,$$

яъни кесим — мавҳум ўқи *Oz* га параллел бўлган гиперболодан иборат;

3) агар $|h| > a$ бўлса, $1 - \frac{h^2}{a^2} < 0$ бўлиб, (A) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$-\frac{y^2}{b^2 \left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(\frac{h^2}{a^2} - 1\right)} = 1,$$

яъни кесим — мавҳум ўқи Ox ўққа параллел бўлган гиперболадан иборат. Худди шу ҳоллар гиперболоидни $y=h$ текислик билан кесганда ҳам содир бўлади.

5. Агар $M_1(x_1; y_1; z_1)$ нуқта гиперболоидга тегишли бўлса, $M_2(-x_1; -y_1; -z_1)$ ҳам гиперболоидга тегишли бўлади. Бундан бир паллали гиперболоид нуқталари координаталар бошига ва координата текисликларига нисбатан симметрик эканлиги келиб чиқади.

Шу маълумотларга асосан бир паллали гиперболоидни қизиш мумкин (81-чизма).

Хусусий ҳолда, $a=b$ бўлса, (8.17) тенглама $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ га келтирилади, бу эса бир паллали айланма гиперболоидни аниқлайди.

Қуйидаги

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.19)$$

ёки

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.20)$$

тенгламалар ҳам бир паллали гиперболоид бўлиб, улар мавҳум ўқлари билангина фарқ қилади. (8.19) да Oy мавҳум ўқ, (8.20) да Ox мавҳум ўқдир.

Икки паллали гиперболоид. (8.18) тенглама бўйича бу сиртнинг шаклини ва баъзи геометрик хоссаларини аниқлайлик.

1. Икки паллали гиперболоид иккинчи тартибли сиртдир.

2. Икки паллали гиперболоид координаталар бошига ва координата текисликларига нисбатан симметрик жойлашган.

3. Икки паллали гиперболоид фақатгина Ox ўқ билан $A_1(a; 0; 0)$, $A_2(-a; 0; 0)$ нуқталарда кесишиб, бошқа координата ўқлари билан кесишмайди, демак, Oy , Oz мавҳум ўқлардир. Бундан эса, икки паллали гиперболоид икки қисмдан иборат бўлиб, улар Oyz текисликка нисбатан симметрик жойлашганлиги келиб чиқади (82-чизма).

4. (8.18) тенгламани Oyz текисликка параллел $x=h$ текислик билан кессак,

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = h \end{cases} \Rightarrow -\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{a^2} \Rightarrow$$

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{a^2} - 1 \quad (A)$$

бўлиб, бунда қуйидаги икки ҳол бўлиши мумкин:

а) $|h| > 0 \Rightarrow \frac{h^2}{a^2} - 1 > 0$ бўлиб, (A) тенглама

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{a^2} - 1$$

кўринишни олиб, кесим эллипсни аниқлайди;

б) $h = a$ да кесим фақат битта $A_1(a; 0; 0)$ ёки $A_2(-a; 0; 0)$ нуқтадан иборат бўлади.

Икки паллали гиперболоиднинг бошқа координата текисликлари ва бу текисликларга параллел текисликлар билан кесимлари ҳам гиперболада иборат. Умуман, юқоридаги бир паллали гиперболоид тенгламасини текширишдаги барча мулоҳазалар икки паллали гиперболоидга ҳам тегишлидир.

Хусусий ҳолда, $b = c$ бўлса, (8.18) тенглама

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

кўринишини олади ва у

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$


гиперболанинг ($y = 0$ текисликда) Ox ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлади. Агар (8.18) тенглама

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.21)$$


ёки

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8.22)$$

кўринишда бўлса, у ҳолда булар ҳам икки паллали гиперболоид бўлиб, (8.21) тенглама учун Ox , Oy ўқлар; (8.22) тенглама учун Ox , Oz ўқлар мавҳум ўқлар бўлади.



82- чизма



83- чизма

Мисол. Декарт координаталар системасида $M_1 (0; 0; 4)$ ва $M_2 (0; 0; -4)$ нуқталар берилган. Фазада шундай нуқталар тўплами топилсинки, уларнинг ҳар биридан M_1, M_2 нуқталаргача бўлган масофалар айирмасининг абсолют қиймати 6 га тенг бўлсин.

Е чи ш. Фараз қилайлик, $M(x; y; z)$ масала шартини қаноатлантирадиган нуқта бўлсин, яъни

$$| \rho(M_1, M) - \rho(M_2, M) | = 6.$$

Бу тенгликни координаталарда ёзамиз:

$$| \sqrt{x^2 + y^2 + (z-4)^2} - \sqrt{x^2 + y^2 + (z+4)^2} | = 6$$

ёки

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z-4)^2} = \pm 6 + \sqrt{x^2 + y^2 + (z+4)^2}.$$

Кейинги тенгликнинг ҳар иккала қисмини квадратга кўтарамиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8z + 16 =$$

$$= 36 + x^2 + y^2 + z^2 + 8z + 16 \pm 12 \sqrt{x^2 + y^2 + (z+4)^2}$$

ёки

$$\pm 3 \sqrt{x^2 + y^2 + (z+4)^2} = 4z + 9.$$

Яна бир марта квадратга кўтариб соддалаштирамиз:

$$-\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{7} + \frac{z^2}{9} = 1.$$

Ҳосил бўлган тенглама икки паллали гиперболоидни аниқлайди.

8-§. Параболоидлар

Декарт координаталар системасида Oz ўқиға симметрик параболоа берилган бўлсин. Унинг Oz ўк атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт *эллиптик параболоид* деб аталади ва у

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, (p > 0, q > 0) \quad (8.23)$$

тенглама билан ифодаланади. Параболанинг Ox ўк атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт *гиперболик параболоид* деб аталади ва у

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, (p > 0, q > 0) \quad (8.24)$$

тенглама билан ифодаланади. Бу сиртларни ўрганамиз.

1. **Эллиптик параболоид.** Эллиптик параболоиднинг шаклини ва унинг баъзи геометрик хоссаларини (8.23) тенгламани текшириш орқали аниқлаймиз (83- чизма).

1. Эллиптик параболоид иккинчи тартибли сирт бўлиб, бу сирт координаталар бошидан ўтади.

2. Эллиптик параболоиднинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталарини аниқлаймиз.

а) Ox ўк ($y=0, z=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ y=0, \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{p} = 0 \Rightarrow x=0.$$

Демак, изланаётган нуқта: $O(0; 0; 0)$;

б) Oy ўк ($x=0, z=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ x=0, \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{q} = 0 \Rightarrow y=0.$$

Демак, изланаётган нуқта: $O(0; 0; 0)$;

в) Oz ўк ($x=0, y=0$) билан кесишиш нуқтаси:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ x=0, \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow 2z=0 \Rightarrow z=0.$$

Изланаётган нукта: $O(0; 0; 0)$. Демак, эллиптик параболоид координата ўқлари билан фақат координаталар бошидагина кесишади.

3. Эллиптик сиртни координата текисликлари ва уларга параллел текисликлар билан кесилганда ҳосил бўладиган кесимни аниқлаймиз.

а) Oxy текислиги билан кесишиш чизиги

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ z=0, \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 0,$$

яъни $(0; 0)$ нукта бўлади;

б) Oxz текислиги билан кесишиш чизиги

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{p} = 2z \Rightarrow x^2 = 2pz, \text{ яъни}$$

симметрия ўқи Oz бўлган параболодан иборат;

в) Oyz текислиги билан кесишиш чизиги ҳам параболодан ($y^2 = 2qz$) иборат;

г) $z=h$ текислиги билан кесишиш чизигини аниқлаймиз:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \\ z=h \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h. \quad (A)$$

(A) тенглама учун қуйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

1) $h=0$ бўлса, $z=0$ бўлиб, юқоридаги а) ҳол такрорланади;

2) $h<0$ бўлса, $p>0$, $q>0$ бўлиб, (A) тенглама ўринли бўлмайди (мавҳум чизиққа эга бўламиз);

3) $h>0$ бўлса, (A) тенглама

$$\frac{x^2}{2ph} + \frac{y^2}{2qh} = 1$$

кўринишни олади ва бу тенглама $z=h$ текисликдаги эллипсни беради.

Бундан ташқари $x=h$ ва $y=h$ текисликлар билан кесишиш чизиги параболодан иборат бўлади.

4. x, y ўзгарувчилар (8.23) тенгламада жуфт даражада қатнашганлиги учун эллиптик параболоид Oxz, Oyz текисликларга нисбатан симметрик жойлашади. Бу текисликларнинг кесишишидан ҳосил бўлган Oz тўғри чизик эллиптик параболоиднинг ўқи деб аталади. Эллиптик параболоид 83- чизмада тасвирланган. Хусусий ҳолда $p=q$ бўлса, (8.23) тенглама $x^2+y^2=2pz$ кўринишда бўлиб, y айланма параболоиддан иборат бўлади.

Ўқлари Ox ёки Oy дан иборат эллиптик параболоидлар мос равишда

$$\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{q} = 2x \text{ ёки } \frac{x^2}{p} + \frac{z^2}{q} = 2y$$

тенгламалар билан ифодаланади.

11. **Гиперболик параболоид.** (8.24) тенгламаси бўйича гиперболик параболоиднинг шаклини ва баъзи геометрик хоссаларини аниқлайлик.

1. Гиперболик параболоид иккинчи тартибли сирт бўлиб координаталар бошидан ўтади.

2. Координата ўқлари билан фақат координаталар бошида кесишади.

3. а) Бу сирт Oxy текислик билан кесилганда кесимда иккита кесишувчи тўғри чизик ҳосил бўлади;

б) Oxz текислик билан кесилганда эса кесимда симметрия ўқи Oz бўлган $x^2=2pz$ парабола ҳосил бўлади;


в) Oyz текислик билан кесилганда кесимда симметрия ўқи Oz дан иборат $y^2=2qz$ парабола ҳосил бўлади.

4. $z=h$ текислик билан кесилганда кесимда:

а) $h>0$ шартда $\frac{x^2}{2ph} - \frac{y^2}{2qh} = 1$ гипербола;

б) $h<0$ шартда $-\frac{x^2}{2ph} + \frac{y^2}{2qh} = 1$ гипербола

ҳосил бўлади. $x=h, y=h$ текисликлар билан кесилганда кесимда ҳар доим парабола ҳосил бўлади. Шу маълумотларга асосланиб гиперболик параболоидни 84- чизмадагидек сирт кўринишда тасаввур қилиш



84- чизма

мумкин, баъзан бу сирт-
ни «эгарсимон» сирт
деб ҳам юритилади.

Мисол. $x^2 - y^2 =$
 $= 12z$ тенглама билан
берилган сиртнинг
шаклини аниқланг.

Ечиш. Берилган
сирт тенгламасини

$$\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{6} = 2z$$

кўринишда ёзиб ола-
миз. Демак, берилган тенглама айланма гиперболоид
параболоидни тасвирлайди.

МАШҚЛАР

1. Қуйидаги сфераларнинг маркази ва радиусини
аниқланг:

- а) $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$;
- б) $x^2 + y^2 + z^2 - 3x + 5y - 4z = 0$;
- в) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 2z - 18 = 0$;
- г) $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 6z = 0$;
- д) $x^2 + y^2 + z^2 + 20z = 0$;
- е) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6z = 0$.

2. Қуйидаги тенгламалар қандай сиртларни тасвир-
лайди:

- а) $25x^2 + 3y^2 - 15z^2 - 75 = 0$;
- б) $4x^2 + 25y^2 + 10z^2 - 100 = 0$;
- в) $4x^2 + y^2 - 8z = 0$;
- г) $4x^2 + 6z^2 - 24 = 0$;
- д) $z^2 + 2z - 4x + 1 = 0$;
- е) $9y^2 - 16z^2 + 64z - 18y - 199 = 0$;
- ж) $2x^2 - y^2 - z^2 = 0$;
- з) $3x^2 + 4y^2 - 12z^2 = 0$.

3. А (3; -1; 2) нукта қуйидаги тенгламаси билан
берилган сфераларнинг сиртида, ичида ёки ташқариси-
да ётишини аниқланг:

- а) $(x+4)^2 + (y-1)^2 + (z+12)^2 = 625$;
- б) $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 4$;
- в) $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-6)^2 = 25$;

$$г) x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 6y - 4z + 22 = 0;$$

$$д) x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 3y - z - 3 = 0.$$

4. Қуйидаги

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 28, \\ 4x + y - z - 9 = 0 \end{cases}$$

айланадан ва $A(7; -3; 1)$ нуктадан ўтувчи сферик сиртнинг тенгламасини тузинг. Унинг маркази координаталарини ва радиусини аниқланг.

5. Ушбу

$$\frac{x+5}{3} = \frac{y+11}{5} = \frac{z-9}{-4}$$

тўғри чизиқ билан $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 10z - 19 = 0$ сферанинг кесишиш нуктасини топинг.

6. Oxz текисликдан 3 бирлик узокликда ва $A(1; 3; -2)$ нуктадан 4 бирлик узокликда жойлашган нукталарнинг геометрик ўрни тенгламасини тузинг.

7. $x = z$ тўғри чизиқнинг Oz ўк атрофида айланишдан ҳосил бўлган айланма сиртнинг тенгламасини тузинг.

8. Қуйидаги тенглама қандай сиртни тасвирлайди:

$$3x^2 + 3y^2 + 81z^2 - 324 = 0?$$

9. Ушбу $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{25} = 1$ эллипсоиднинг

$$z = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; x = 0, y = 0$$

текисликлар билан кесишишдан ҳосил бўлган кесимларни топинг.

10. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{6} = 1$ эллипсоиднинг $A(2; 3; 5)$ нуктасига ўтказилган уринма текислик тенгламасини тузинг.

11. $x^2 + 2y^2 + 20y - z^2 + 34 = 0$ тенглама билан берилган сиртнинг шаклини аниқланг.

12. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$ бир паллали гиперболоидга

$A(-3; 2; 4)$ нуктада уринувчи текислик тенгламасини тузинг.

13. Ушбу

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = a \end{cases}$$

айланадан ва $A(a;a;a)$ нуқтадан ўтувчи сферик сиртнинг тенгламасини ёзинг.

14. $4x - 3y + 7z - 20 = 0$ ва $x=0$, $y=0$, $z=0$ текисликлардан ҳосил бўлган тетраэдрнинг ичига чизилган сферик сиртнинг тенгламасини ёзинг.

15. Ушбу $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{15} - \frac{z^2}{20} = 1$ тенглама қандай сиртнинг аниқлайди? Унинг $z=2$ текислик билан кесишишидан қандай чизиқ ҳосил бўлади?

16. Қуйидаги сиртлар билан тўғри чизиқларнинг кесишиш нуқтасини топинг:

а) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{9} = 1$ ва $\frac{x-3}{3} = \frac{y-4}{-6} = \frac{z+2}{4}$;

б) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1$ ва $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-2}{4}$;

в) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = z$ ва $\frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-3}{2}$;

г) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = z$ ва $\frac{x-2}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$.

17. Ушбу $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = -1$ икки паллали гиперболоидни координата текисликларига параллел текисликлар билан кесилганда ҳосил бўладиган кесимларни текширинг.

18. $x^2 - y^2 = 12z$ тенглама билан берилган сиртнинг шаклини ва бу сиртнинг координата текисликлари билан кесилганда ҳосил бўладиган кесимларни аниқланг.

19. m нинг қандай қийматида $x + mz - 1 = 0$ текислик $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ икки паллали гиперболоидни кесганда кесимда: а) эллипс; б) гипербола ҳосил бўлишини аниқланг.

20. m нинг қандай қийматида $x + my - 2 = 0$ текислик $\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{3} = y$ эллиптик параболоидни кесганда кесимда: а) эллипс; б) парабола ҳосил бўлишини аниқланг.

АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРАГА ДОИР МАСАЛАЛАР ЕЧИШ

Мазкур бобда юқорида баён қилинган дастур материаллини мустаҳкамлаш учун ечишга доир мисол ва масалалар келтирилган. Қўш масалалар ечилишлари билан берилган. Масалаларнинг кўпчилиги бир неча йил давомида Тошкент Давлат олий техника дорилфунунида ва бошқа техника институтларида олий математикадан ўтказиб келинаётган олимпиада вариантларидаги масала ва мисоллардан бўлиб, талабадан чуқур билим ва маълум тайёргарлик талаб этади.

1. Қўйдаги детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & n+1 \\ 0 & 2 & 0 & \dots & n+2 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot & \cdot \\ 2n & 0 & 0 & \dots & 0 & n \end{vmatrix}$$

бунда n — жуфт сон.

Ечиш. Агар $k=1,2,\dots,\frac{n}{2}$ қийматлари учун дастлаб k ва $(n-k)$ сатрларнинг, сўнгра k ва $(n-k)$ устунларнинг ўринларини мос равишда алмаштирсак, бизга маълумки, бундай алмаштиришдан детерминант қиймати ўзгармайди. Аммо диагоналида квадрат матрицалардан иборат блок-диагоналли кўринишдаги матрицага айланади. Бундай матрица детерминанти иккинчи тартибли матрицаларнинг детерминантлари кўпайтмасига тенг ва у

$$\begin{vmatrix} k & n+k \\ 2n-k+1 & n-k+1 \end{vmatrix}$$

кўринишдаги матрицадан иборат. Бундай кўринишдаги ҳар қандай матрица k га боглиқ бўлмайди ва у $-n(2n+1)$ га тенг. Демак, берилган детерминант

$$[-n(2n+1)]^2$$

га тенг.

2. Нолга тенг бўлмаган n - тартибли A детерминантнинг элементлари ± 1 сонлардан иборат бўлса, $n \geq 3$ учун

$$|A| \leq (n-1) \cdot (n-1)!$$

тенгсизлик ўринли эканини исбот қилинг.

Исбот. Масала шартига кўра $|A| \neq 0$ бўлгани учун, $n=3$ бўлганда ихтиёрий детерминантни унинг элементларининг абсолют қийматини ўзгартирмаган ҳолда сатр ва устунларининг ўринларини алмаштириб, сўнгра сатрларини -1 га кўпайтириб,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \text{ ёки } \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

кўринишлардан бирига келтириш мумкин.

Демак, $n=3$ учун $|A| \leq 4 = (3-1)(3-1)!$ тенгсизлик ўринли. Фараз қилайлик, $(n-1)$ -тартибли ҳамма детерминантлар учун юқоридаги тенгсизлик ўринли бўлсин. Энди n -тартибли детерминант учун ҳам тенгсизлик тўғрилигини кўрсатамиз. Унинг учун, элементлари ± 1 бўлган A детерминантни ихтиёрий сатри бўйича ёямиз:

$$|A| = |\pm M_{i1} \pm M_{i2} \pm \dots \pm M_{in}| \leq |M_{i1}| +$$

$$+ |M_{i2}| + \dots + |M_{in}| \leq n(n-2)(n-2)!$$

$$n(n-2) < (n-1)^2$$

ни эътиборга олсак,

$$|A| \leq (n-1)(n-1)^2$$

келиб чиқади. Тенгсизлик исбот бўлди.

3. $n \geq 3$ ва $c_{11} \neq 0$ бўлса,

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{vmatrix} = \frac{1}{c_{11}^{n-2}} \times$$

$$\times \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{13} \\ c_{21} & c_{23} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{2n} \end{vmatrix} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{n1} & c_{n2} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{13} \\ c_{n1} & c_{n3} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{1n} \\ c_{n1} & c_{nn} \end{vmatrix} \end{vmatrix}$$

тенглик ўринли эканини исбот қилинг.

Исбот. Детерминантнинг i -сатрини $\frac{c_{11}}{c_{11}}$ га қўпайтириб, ундан биринчи сатрини айирсак, натижада қуйидаги детерминантга эга бўламиз, яъни

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} - c_{12} \cdot \frac{c_{21}}{c_{11}} & \dots & c_{2n} - c_{1n} \cdot \frac{c_{21}}{c_{11}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & c_{n2} - c_{12} \cdot \frac{c_{n1}}{c_{11}} & \dots & c_{nn} - c_{1n} \cdot \frac{c_{n1}}{c_{11}} \end{vmatrix}$$

Бу детерминантнинг биринчи устун элементлари бўйича ёйилмасини ёзамиз:

$$\begin{aligned} & c_{11} \cdot \begin{vmatrix} c_{22} - c_{12} \cdot \frac{c_{21}}{c_{11}} & \dots & c_{2n} - c_{1n} \cdot \frac{c_{21}}{c_{11}} \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{n2} - c_{12} \cdot \frac{c_{n1}}{c_{11}} & \dots & c_{nn} - c_{1n} \cdot \frac{c_{n1}}{c_{11}} \end{vmatrix} = \\ & = \frac{c_{11}}{c_{11}^{n-2}} \begin{vmatrix} c_{22}c_{11} - c_{12}c_{21} & \dots & c_{2n}c_{11} - c_{1n}c_{21} \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{n2}c_{11} - c_{12}c_{n1} & \dots & c_{nn}c_{11} - c_{1n}c_{n1} \end{vmatrix} = \\ & = \frac{1}{c_{11}^{n-2}} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{2n} \end{vmatrix} \\ \dots & \dots & \dots \\ \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{n1} & c_{n2} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} c_{11} & c_{1n} \\ c_{n1} & c_{nn} \end{vmatrix} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Демак, тенглик ўринли экан.

4. Ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \leq \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} \times \\ \times \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} \cdot \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2}$$

тенгсизлик ўринли эканини исбот қилинг.

Исбот. $a_k = \{a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}\}$ (бунда $k=1,3$) векторларни қараймиз. Бу векторлар учун қуйидаги тенгсизликни ёзиш мумкин:

$$(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) \leq |\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2| \cdot |\vec{a}_3|.$$

Тенгсизликнинг чап томони $\vec{a}_k$ векторларнинг аралаш кўпайтмасидан, ўнг томони эса уларнинг узунликлари кўпайтмасидан иборат. Бизга маълумки, параллелепипеднинг ҳажми унинг қирраларининг кўпайтмасидан (аралаш кўпайтмадан) катта эмас. Шунинг учун юқоридаги тенгсизлик ўринлидир.

5. Учинчи тартибли A квадрат матрицанинг детерминанти 16 га, ҳар бир устундаги элементлар йиғиндиси 4 га, бош диагоналдаги элементлар йиғиндиси 8 га тенг. A матрицанинг барча хос сонларини топинг.

Ечиш. Масала шартидан $A = 4E$ (бунда E — учинчи тартибли бирлик квадрат матрица) матрицанинг ҳар бир устуни элементлари йиғиндиси нолга тенглиги келиб чиқади.

Демак, $A \times 4E$ матрицанинг сатрлари орасида чизикли боғланиш мавжуд, шунинг учун қуйидаги тенглик ўринли бўлади:

$$\det(A - 4E) = 0.$$

Бундан, 4 сони A матрицанинг хос сони эканлиги келиб чиқади. Қолган икки хос сонни λ_1 ва λ_2 деб белгисак, у ҳолда масала шартига кўра қуйидаги тенгликларни ёзиш мумкин:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + 4 = 8 \text{ ва } 4\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 16.$$

Булардан $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ экани келиб чиқади.

6. A ва B лар n -тартибли ҳақиқий элементли квадрат матрицалар бўлсин. Агар A ва B матрицалар коммутатив (яъни $AB=BA$) бўлса,

$$\det(A^2 + B^2) \geq 0$$

тенгсизлик ўринли эканлигини исбот қилинг. Коммутатив хоссага эга бўлмаган матрицалар учун $\det(A^2 + B^2) < 0$ бўлишига мисол келтиринг.

Ечиш. Агар $AB = BA$ бўлса, $A^2 + B^2$ йигиндини $A^2 + B^2 = (A + iB)(A - iB)$ кўринишда ёзиш мумкин (бунда $i^2 = -1$). $z = \det(A + iB)$ бўлсин, у ҳолда детерминантни ҳисоблаш қондасига кўра: $\det(A - iB) = \bar{z}$. Демак,

$$\begin{aligned} \det(A^2 + B^2) &= \det(A + iB) \cdot \det(A - iB) = \\ &= z \cdot \bar{z} = |z|^2 > 0. \end{aligned}$$

Энди $AB \neq BA$ бўлганда $\det(A^2 + B^2) < 0$ бўлишини қуйидаги мисолда кўрсатамиз.

Мисол.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлсин, у ҳолда

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

булади.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}; B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлиб,

$$A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 16 = -12 < 0.$$

7. J_n — ҳамма элементлари бирга тенг бўлган n -тартибли квадрат матрица. Агар E n -тартибли бирлик квадрат матрица бўлса, у ҳолда

$$(E - J_n)^{-1} = E - \frac{1}{n-1} J_n$$

тенглик ўринли эканлигини исбот қилинг (бу ерда $(E - J_n)^{-1}$ матрица $(E - J_n)$ матрицага тескари матрица).

Исбот. Берилган тенглик тўғри деб, унинг иккала қисмини $(E - J_n)$ га кўпайтирамиз. Тескари матрицанинг таърифига кўра

$$\left(E - \frac{1}{n-1} J_n\right)(E - J_n) = E$$

булади ва қавсларни очиб чиксак,

$$E - J_n - \frac{1}{n-1} J_n + \frac{1}{n-1} J_n^2 = E \text{ ёки } J_n^2 = nJ_n$$

ни ҳосил қиламиз. Бу тенгликнинг ўринли эканини кўрсатамиз:

$$\begin{aligned} J_n^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} n & n & \dots & n \\ n & n & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \dots & n \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = nJ_n \end{aligned}$$

Демак, $J_n^2 = nJ_n$ ўринли бўлгани учун берилган тенглик ҳам ўринли бўлади.

8. A ва B — иккинчи тартибли квадрат матрицалар бўлсин. A матрицанинг хос сонлари 1 ва 3, B матрицанинг хос сонлари эса 2 ва 4 га тенглиги маълум. $A+B$ матрицанинг хос сонлари 5 ва 6 дан иборат бўлиши мумкинми? 1 ва 9 дан-чи? Мисол келтиринг ёки мумкин эмаслигини исбот қилинг.

Ҳа. $A+B$ матрицанинг хос сонлари A ва B матрицаларнинг хос сонлари йнгиндисига тенг бўлгани учун $A+B$ нинг хос сонлари $1+3+2+4=10$. Энди $5+6 \neq 10$ бўлгани учун 5 ва 6 сонлари $A+B$ нинг хос сонлари бўлмайди.

1 ва 9 сонлари $A+B$ нинг хос сонлари бўлишини кўрсатамиз:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ b & 4 \end{pmatrix}$$

бўлсин. У ҳолда a ва b сонларни шундай танлаш керакки,

$$\det(A+B)=1\cdot 9=9$$

бўлсин (бу ҳолда детерминантнинг қиймати матрицанинг хос сонлари кўпайтмасига тенг). Масалан, $a=3$, $b=4$ қийматларни олсак,

$$\det(A+B)=\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}=21-12=9$$

бўлади. Демак, 1 ва 9 сонлари $A+B$ нинг хос сонлари бўлади.

9. A ва B матрицалар

$$A^2=A, B^2=B \text{ ва } AB=BA$$

шартларни қаноатлантиради.

$\det(A-B)$ фақат учта $-1, 0, 1$ қийматлардан бирини қабул қилишини исбот қилинг.

Е ч и ш. $(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2=A-2AB+B$.
 $(A-B)^3=(A-B)(A-2AB+B)=A^2-2A^2B+AB-Ba+2BAB-B^2=A-2AB+AB-AB+2AB-B=A-B$,
 яъни $(A-B)^3=A-B$, шунинг учун $\det(A-B)^3=[\det(A-B)]^3=\det(A-B)$.

$x^3=x$ тенглама $-1, 0, 1$ ечимларга эга бўлгани учун $\det(A-B)$ ҳам фақат $-1, 0, 1$ қийматларни қабул қилади.

10. A — элементлари комплекс сонлардан иборат n -тартибли квадрат матрица, яъни $A=B+iC$ бўлсин, бу ерда B ва C — элементлари ҳақиқий сонлардан иборат матрицалар.

Элементлари B ва C матрицалардан тузилган $2n$ -тартибли $\bar{A}$ матрица тузамиз:

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} B & -C \\ C & B \end{bmatrix}.$$

$\det \bar{A}=|\det A|^2$ эканлигини исботланг.

И с б о т. $\bar{A}$ матрицанинг k -устунини i га кўпайтириб, $(n+k)$ устунга қўшамиз (бунда $k=1, 2, \dots, n$). У ҳолда қуйидаги матрицага эга бўламиз:

$$\begin{bmatrix} B & iB-C \\ C & B+iC \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} B & iA \\ C & A \end{bmatrix}.$$

Бу ҳосил бўлган матрицанинг $(n+k)$ сатрини i га кўпайтирамиз ва уни k -сатрдан айирамиз. Натижада

$$\begin{pmatrix} B-iC & O \\ C & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A} & O \\ C & A \end{pmatrix}$$

матрицага эга бўламиз. Бунда $\bar{A}$ — элементлари A матрицанинг мос элементларига қўшма комплекс сон бўлган матрицалардир. Демак,

$$\det \bar{A} = \det \bar{A} \cdot \det A = \det A \cdot \det A = |\det A|^2.$$

11. Квадрат матрицанинг элементлари ўзгарувчи z нинг комплекс сонли кўпхадларидан иборат. Ихтиёрий комплекс сон учун $A(z)$ матрица $A^{-1}(z)$ тескари матрицага эга. $A^{-1}(z)$ матрицанинг элементлари ҳам ўзгарувчи z комплекс сонли кўпхадлардан иборат бўлишини исбот килинг.

Исбот. $\det A(z)$ ўзгарувчи z га нисбатан кўпхад бўлиб, у ҳеч вақт нолга тенг бўлмайди. Алгебранинг асосий теоремасига кўра, ҳар қандай n -даражали кўпхад n та илдизга эга бўлади. Демак,

$$\det A(z) = \text{const.}$$

$A(z)$ матрицанинг барча алгебраик тўлдирувчилари ҳам z га боглиқ кўпхадлардан иборат бўлгани учун $A^{-1}(z)$ матрицанинг элементлари z га боглиқ кўпхадлардан иборат бўлади.

12. Қандай матрицалар учун AB ва BA кўпайтма маънога эга ва қачон $AB=BA$ тенглик ўринли бўлади?

Ечиш. A матрица $(m \times n)$ ўлчамли, B матрица $(s \times t)$ ўлчамли бўлсин. Агар $n=s$ бўлса, AB кўпайтма; $t=m$ бўлганда BA кўпайтма маънога эга бўлади, яъни иккита матрицани ўзаро кўпайтириш мумкин.

Агар A ва B матрицалар бир хил ўлчамли квадрат матрицалар бўлсагина, $AB=BA$ тенглик ўринли бўлади.

13. Агар X учинчи тартибли квадрат матрица бўлса,

$$X^2 + 4X = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 8 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

матрицали тенглама ечимга эга бўладими?

Ечиш. Матрицали тенгламанинг иккала қисмига $4E$ ни қўшамиз. Натижада

$$(X + 2E)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 8 \\ 0 & 10 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

кўринишдаги матрицали тенгламага эга бўламиз. Бу матрицали тенглама чап қисмининг детерминанти

$$\det(X + 2E)^2 = |\det(X + 2E)|^2 \geq 0$$

булиб, унг қисмининг детерминанти эса — 40 га тенг
булгани учун берилган матрицали тенглама счимга эга
эмас.

14. Ушбу

[illegible]

система берилган бўлсин. Агар ҳамма i, j лар учун a_{ij} — бутун сонлар бўлса, у ҳолда система ягона $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ ечимга эга бўлишини исбот қилинг.

И с б о т. Системанинг детерминанти:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{2} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{2} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \frac{1}{2} \end{vmatrix} = P\left(\frac{1}{2}\right),$$

бунда

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

$$P(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \dots + b_n,$$

бу ерда b_i — бутун сон. Агар $P(\frac{1}{2})$ нолга тенг бўлса,
у холда

$$(-1)^n \cdot \frac{1}{2^n} + b_1 \frac{1}{2^{n-1}} + \dots + b_n = 0.$$

Тенгликнинг ҳамма ҳадларини 2^n га кўпайтирамиз:

$$(-1)^n + 2b_1 + \dots + 2^n b_n = (-1)^n + 2N = 0,$$

бунинг бўлиши мумкин эмас, чунки N бутун сон. Шунинг учун $D \neq 0$ бўлиб, система $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ ягона ечимга эга бўлади.

$$15. \text{ Ушбу } \begin{cases} x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 1, \\ -x_1 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 1, \\ -x_1 - x_2 + x_4 + \dots + x_{n-1} + x_n = 1, \\ \dots \dots \dots \\ -x_1 - x_2 - x_3 - \dots - x_{n-1} = 1 \end{cases}$$

система n қандай натурал сон бўлганда ечимга эга бўлади.

Е ч и ш. Биринчи тенгламадан иккинчисини, иккинчидан учинчисини ва ҳоказо айирсак,

$$x_1 + x_2 = 0; \quad x_2 + x_3 = 0, \quad \dots, \quad x_{n-1} + x_n = 0$$

тенгламаларни ҳосил қиламиз. Бундан

$$x_1 = -x_2 = x_3 = \dots = (-1)^{n-1} - x_n.$$

У ҳолда биринчи тенгламадан n жуфт бўлганда $x_n = 1$, n тоқ бўлганда, $0 = 1$ ларни ҳосил қиламиз. Шундай қилиб, n жуфт бўлганда система $x_k = (-1)^k$ ечимга эга бўлади, n тоқ бўлганда ечимга эга бўлмайди.

$$16. \text{ Агар } P_k(x) = a_{k_1} + a_{k_2}x + a_{k_3}x^2 + \dots + a_{k_n}x^{n-1}$$

(бунда $k=1, 2, 3, \dots, n$) кўпхадлар умумий илдизга эга бўлса, $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ матрицанинг детерминанти нолга тенглигини исбот қилинг.

И с б о т. Фараз қилайлик, $\det A \neq 0$ бўлсин, у ҳолда умумий илдиз $x_0 \neq 0$ бўлади, акс ҳолда $a_{k_1} = 0$ бўлиб, A матрицанинг биринчи устуни факат ноллардан иборат бўлади ва, демак, $\det A = 0$. Шунинг учун $\det A$ ни $1 \cdot x_0 \cdot x_0^2 \cdot x_0^3 \dots x_0^{n-1}$ га кўпайтириш ёки бўлиш мумкин:

$$\det A = \frac{1}{1 \cdot x_0 \cdot x_0^2 \cdot x_0^3 \dots x_0^{n-1}} \times$$

$$\times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}x_0 & a_{13}x_0^2 & \dots & a_{1n}x_0^{n-1} \\ a_{21} & a_{22}x_0 & a_{23}x_0^2 & \dots & a_{2n}x_0^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2}x_0 & a_{n3}x_0^2 & \dots & a_{nn}x_0^{n-1} \end{vmatrix}$$

Детерминантнинг хоссасига кўра ихтиёрий устунни қолган барча устунлар йигиндиси билан алмаштирганда детерминантнинг қиймати ўзгармайди. x_0 — умумий илдиз бўлгани учун устунлар йигиндисидан иборат устун ноллардан иборат бўлади. Бу эса $\det A \neq 0$ деган фарздан келиб чиқди. Демак, $\det A = 0$.

17. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ — квадрат матрица бўлсин, бунда $a, b,$

c — ҳақиқий сонлар. Бу сонларни шундай танланган-ки, A ни n -даражага (n — натурал сон) кўтарилганда у

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ кўринишга келсин.

Е ч и ш. A квадрат матрицани n -даражага кўтарсак, $A^n = \begin{pmatrix} a^n & * \\ 0 & c^n \end{pmatrix}$ ни ҳосил қиламиз. Агар $*$ нинг ўрнида 0 бўлса, у ҳолда $a = \pm 1$ ва $c = \pm 1$ ни олиш мумкин.

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бўлса, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & nb \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ва бундан $b = 0$ келиб чиқади.

б) $A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бўлса,

$A^n = (-1)^n \begin{pmatrix} 1 & -nb \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ва бундан $b = 0$ келиб чиқади.

в) $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ёки $A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бўлса,

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлади. Демак,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

кўринишлардан бири бўлади.

18. $\vec{x} \times (\vec{a} \times \vec{x}) + \vec{b} \times \vec{x} = 0$ вектор тенглама берилган бўлсин. Ихтиёрий $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар учун вектор тенглама нолдан фаркли ечимга эга бўлишини исбот қилинг.

Исбот. Агар $\vec{a} = \vec{b} = 0$ бўлса, у ҳолда булар берилган вектор тенгламани қаноатлантиради. Агар $\vec{a} = 0, \vec{b} \neq 0$ бўлса, $\vec{x} = \vec{b}; \vec{a} \neq 0, \vec{b} = 0$ бўлса, $\vec{x} = \vec{a}$ деб олиш мумкин. Агар $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$ бўлса, у ҳолда берилган тенгламага тенг кучли қуйидаги тенгламани ёзамиз:

$$\vec{x} \times (\vec{a} \times \vec{x} - \vec{b}) = 0.$$

Бу тенглик эса ўз навбатида $\vec{x}$ ва $(\vec{a} \times \vec{x} - \vec{b})$ векторларнинг коллинеарлигини билдиради. Уни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\lambda \vec{x} = \vec{a} \times \vec{x} - \vec{b}.$$

Агар бу тенглама нолдан фаркли ечимга эга бўлса, берилган тенглама ҳам нолдан фаркли ечимга эга бўлади.

$\lambda \vec{x} - \vec{a} \times \vec{x} = -\vec{b}$ вектор тенглама учта уч номаълумли биринчи даражала тенгламалар системасига тенг кучли. Бу системанинг детерминанти λ га нисбатан учинчи даражали кўпхад бўлиб, у λ нинг бирор қийматида нолдан фаркли ягона ечимга эга бўлади.

19. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар берилган. $|\vec{x}| = \rho$ бўлган ва $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг бурчак биссектрисаси бўйича йўналган $\vec{x}$ векторни тузинг.

Е чи ш. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга мос равишда коллинеар бўлган $\vec{a}_0$ ва $\vec{b}_0$ бирлик векторларни оламиз. Бизга маълумки,


$$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad \vec{b}_0 = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

$\vec{c}_0 = \vec{a}_0 + \vec{b}_0$ вектор томонлари $\vec{a}_0$ ва $\vec{b}_0$ векторлардан иборат ромбнинг диагонали бўлгани учун у φ бурчакнинг биссектрисаси бўйича йўналгандир (85-чизма). Демак, $\vec{x} = \lambda \vec{c}_0$ ва $|\vec{x}| = \rho$ ни эътиборга олиб, $|\lambda| = \frac{\rho}{|\vec{c}_0|}$ ни


хосил қиламиз. $\lambda = \frac{\rho}{|\vec{c}_0|}$ деб, $\vec{x}$ вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар

ташкил этган ички бурчак биссектрисаси бўйича йўналгани учун:

$$\vec{x} = \frac{\rho}{|\vec{a}_0 + \vec{b}_0|} (\vec{a}_0 + \vec{b}_0) = \frac{\rho}{\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|} + \frac{|\vec{b}|}{|\vec{b}|}} \cdot \left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right).$$



85- чизма



86- чизма

20. Битта текисликда ётмаган учта $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ вектор бирор нуктадан ўтказилган. Бу векторларнинг учидан ўтказилган текисликка $\vec{r} = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}$ вектор перпендикуляр эканлигини исбот қилинг.

Исбот. $\vec{r}$ векторни $\vec{a} - \vec{b}$ ва $\vec{a} - \vec{c}$ векторларга перпендикуляр эканлигини исботлаш етарлидир, яъни (86- чизма): $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{r} = \vec{a}(\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a}(\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a}(\vec{c} \times \vec{a}) - \vec{b}(\vec{a} \times \vec{b}) - \vec{b}(\vec{b} \times \vec{c}) - \vec{b}(\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a}(\vec{b} \times \vec{c}) - \vec{b}(\vec{c} \times \vec{a})$, бундан $\vec{a}(\vec{a} \times \vec{b}) = 0$; $\vec{a}(\vec{c} \times \vec{a}) = 0$; $\vec{b}(\vec{a} \times \vec{b}) = 0$; $\vec{b}(\vec{b} \times \vec{c}) = 0$.

Аммо

$$\vec{a}(\vec{b} \times \vec{c}) - \vec{b}(\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a}(\vec{b} \times \vec{c}) - (\vec{b} \times \vec{c})\vec{a} = 0.$$

$(\vec{a} - \vec{c}) \cdot \vec{r} = 0$ эканлиги ҳам худди шундай исбот қилинади.

21. $OABC$ тетраэдр $O\vec{A} = \vec{a}$, $O\vec{B} = \vec{b}$, $O\vec{C} = \vec{c}$ векторлардан тузилган. OC ва AB қирралари орасидаги энг қиска масофа бўлган кесманинг узунлигини аниқланг.


Ечиш. 87- чизмада кўрсатилганидек, тетраэдрни параллелепипед билан тўлдирамиз. У ҳолда OC ва AB қирралари орасидаги энг қиска масофа $|MN|$ кесма бўлиб, у асоси ODD_1C бўлган параллелепипеднинг баландлигидан иборат. Демак,

$$V_{\text{пар}} = |MN| \cdot S_{ODD_1C} \Rightarrow |MN| = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{ODD_1C}}.$$

Аммо

$$V_{\text{пар}} = |\vec{OA} \vec{OD} \vec{OC}| = |\vec{OA} \times (\vec{b} - \vec{a}) \vec{c}| = |(\vec{a} \times \vec{b})\vec{c} - (\vec{a} \times \vec{a})\vec{c}| = |\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}|.$$

$$S_{ODD_1C} = |\vec{OC} \times \vec{OD}| = |\vec{c} \times (\vec{b} - \vec{a})| = |(\vec{a} - \vec{b}) \times \vec{c}|.$$



87- чизма

Шундай қилиб, энг қисқа масофа:

$$|MN| = \frac{|\vec{a}\vec{b}\vec{c}|}{|(\vec{a}-\vec{b}) \times \vec{c}|}.$$

Худди шунингдек, BC ва OA , AC ва OB орасидаги масофалар мос равишда

$$\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}|}{|(\vec{b}-\vec{c}) \times \vec{a}|} \text{ ва } \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c}|}{|(\vec{c}-\vec{a}) \times \vec{b}|} \text{ каби}$$

бўлади.

22. Айланада бешта нукта берилган. Учта нуктанинг массалари марказидан қолган икки нуктадан ўтувчи тўғри чизикка перпендикуляр туширилган. Шундай усул билан ўтказилган 10 та перпендикуляр чизиклар битта нуктада кесишишини исбот қилинг.

Исбот. Аниқлик учун иккита M_1 ва M_2 нуктани танлаб оламиз (88- чизма). У ҳолда перпендикуляр тўғри чизик $\frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)$ вектордан иборат бўлиб,

$$\frac{1}{3}(\vec{r}_3 + \vec{r}_4 + \vec{r}_5)$$


вектор ўтган O нуктадан ўтади. Шунинг учун

$\frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)$ вектордан иборат тўғри чизик

$\frac{1}{3}(\vec{r}_3 + \vec{r}_4 + \vec{r}_5) + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) = \frac{1}{3}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 + \vec{r}_4 + \vec{r}_5)$ радиус-вектор ўтган нуқтадан ҳам ўтади. Охирги ифодада барча векторлар тенг имкониятли бўлгани учун, ихтиёрий икки нуқта танлаб олинганда ҳам перпендикуляр чизик битта O нуқтада кесишади.



88- чизма



89- чизма

23. Ихтиёрий учбурчакнинг α , β , γ бурчаклари учун $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{2}$ тенгсизлик ўринли эканлигини исбот қилинг.

И с б о т. Учбурчакка r радиусли ички айлана чизамиз ва айлананинг маркази билан унинг уриниш нуқталарини бирлаштирувчи векторлар ўтказамиз (89- чизма). У ҳолда

$$\alpha + \alpha' = \beta + \beta' = \gamma + \gamma' = \pi.$$

Икки векторнинг скаляр кўпайтмаси таърифига кўра:

$$\begin{aligned} & (\vec{OK} + \vec{OI} + \vec{OM})(\vec{OK} + \vec{OI} + \vec{OM}) = \\ & = |\vec{OK}|^2 + |\vec{OI}|^2 + |\vec{OM}|^2 + 2(\vec{OK} \cdot \vec{OI}) + 2(\vec{OI} \cdot \vec{OM}) + \\ & + 2(\vec{OK} \cdot \vec{OM}) = 3r^2 + 2r^2(\cos \alpha' + \cos \beta' + \cos \gamma') \geq 0. \\ & \cos \alpha' + \cos \beta' + \cos \gamma' \geq -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Аммо $\alpha' = \pi - \alpha$; $\beta' = \pi - \beta$, $\gamma' = \pi - \gamma$. Ўрнига қўйсак, талаб қилинаётган тенгсизлик келиб чиқади:

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{2}.$$

24. $A(2; 0; 1)$ нукта ва $x=t-1$, $y=3t+4$, $z=-4t$ тўғри чизик орқали ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ечиш. Берилган тўғри чизик устида t параметрининг иккита, масалан $t=0$ ва $t=1$ қийматларига мос келувчи иккита B ва C нукталар оламиз:

$$B(-1; 4; 0); C(0; 7; -4).$$

Энди $A(2; 0; 1); B(-1; 4; 0); C(0; 7; -4)$ нукталар орқали ўтувчи текислик тенгламасини тузамиз.

$$\begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ x_C-x_A & y_C-y_A & z_C-z_A \end{vmatrix} = 0;$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -2 & 7 & -5 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\begin{vmatrix} 4-1 \\ 7-5 \end{vmatrix} (x-2) - \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} y + \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} (z-1) = 0.$$

$$\begin{aligned} -13(x-2) - 13y - 13(z-1) &= 0, \\ x+y+z-3 &= 0. \end{aligned}$$

25. Дала ўрмон билан тўғри чизик бўйлаб чегарадош. Ўрмондан $2a$ масофада далада куён турибди. Куён билан ўрмон ўртасида (a масофада) эса бўри турибди. Агар куён бўридан қочиб ўрмонга тўғри чизик бўйлаб югурса ва унинг тезлиги бўриникидан икки марта катта бўлса, куённинг хавфсизлик маршрути катталиги қайси микдордан кичик бўла олмаслигини топинг.

Ечиш. Далада ихтиёрий $M(x; y)$ нукта танлаб оламиз (90-чизма). Бу нукта қуйидаги хоссага эга бўлиши керак. M дан бўрининг дастлабки ҳолатигача бўлган масофа M дан куённинг дастлабки ҳолатигача бўлган масофанинг ярмидан катта бўлмаган нукталар тўплами бўлиши керак. Агар координаталар системасини 90-чизмада кўрсатилгандек қилиб танлаб олинса, у ҳолда M нуктанинг координаталарини

$$\sqrt{x^2 + (y-a)^2} \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + (y-2a)^2}$$

тенгсизлик ёрдамида ифодалаш мумкин ёки

$$x^2 + y^2 - 2ay + a^2 \leq \frac{1}{4}.$$

Буни соддалаштирсак,

$$3x^2 + 3y^2 - 4ay \leq 0$$

ни ҳосил қиламиз. Тўла квадрат ажратамиз ва 3 га бўламиз, у ҳолда

$$x^2 + (y - \frac{2}{3}a)^2 \leq \frac{4}{9}a^2$$



га эга бўламиз. Бу тенгсизлик маркази $(0; \frac{2}{3}a)$ нуктада, радиуси $\frac{2}{3}a$ га тенг доирадан иборатдир. Хавфсизлик чизиги юқорида келтириб чиқарилган доирага уриниш чизигининг узунлигига тенг. Доира марказидан уриниш нуктасига радиус ўтказамиз. Натижада тўғри бурчакли учбурчак ҳосил бўлади. Унинг гипотенузаси

$$2a - \frac{2}{3}a = \frac{4}{3}a$$

га, катети (радиус) $\frac{2}{3}a$ га тенг. Бу эса учбурчакнинг юқоридаги бурчаги 30° га тенглигини билдиради.

Бундан куённинг хавфсизлик маршрути $\frac{4\sqrt{3}}{3}a$ микдордан кичик бўлмаслиги келиб чиқади.

26. Турли томонли учбурчакнинг ҳар бир учидан фокуслари қолган икки учда жойлашган гиперболалар тармоқлари ўтказилган. Бу гиперболалар учбурчак ичида умумий нуктага эга бўлишини исбот қилинг (91- чизма).



91- чизма

И с б о т. Учбурчакнинг бирор учидан ўтказилган гипербола тармогининг бир қисм ёйи шу учбурчак ичида ётишини исбот қиламиз. Гиперболанинг тармоги кавариқ эгри чизик бўлгани учун, бу ёй унинг ватари ва гиперболага учбурчак учидан ўтказилган уринма ҳосил қилган бурчак ичида ётади. Гиперболанинг оптик хоссасига кўра (бир фокусдан тарқалаётган ёруғлик нурлари гиперболадан кўзгули акслангандан кейин, бошқа фокусдан тарқалаётгандек кўринади) гипербола учбурчакнинг бурчак биссектрисаси бўлади. Қарама-қарши томон симметрия ўқи бўлгани учун, танланган гипербола тармоги уни фақат битта нуктада кесиб ўтади. Бу нукта фокуслар орасида ётади. Демак, ёй биссектриса, ватар ва томон ҳосил қилган учбурчак ичида ётади. Бундан эса ихтиёрий икки гипербола учбурчак ичида умумий O нуктага эгаллиги келиб чиқади. Энди учинчи гипербола ҳам шу O нуктадан ўтишини исбот қиламиз.

S_A, S_B, S_C — O нуктадан мос учларгача бўлган масофалар; a, b, c мос учларининг қаршисида ётган томонларнинг узунликлари бўлсин. У ҳолда

$$S_A - S_C = c - a; S_B - S_C = c - b,$$

$$\begin{aligned} S_A - S_B &= (S_A - S_C) - (S_B - S_C) = \\ &= (c - a) - (c - b) = b - a. \end{aligned}$$

Бу эса учинчи гипербола ҳам O нукта орқали ўтишини билдиради. Тасдиқ исбот бўлди.

27. $y^2 = -4ax$ парабола учларидан бу параболага ўтказилган уринмаларга туширилган перпендикулярлар асосларининг геометрик ўрни тенгламасини топинг.

Е ч и ш. Параболанинг $(x_0; y_0)$ нуктасига ўтказилган уринма l_1 нинг тенгламаси $4ax + 2yy_0 - y_0^2 = 0$ кўринишда бўлади. l_1 уринмага $(0; 0)$ нуктадан туширилган l_2 перпендикулярнинг тенгламаси эса $y_0x - 2ay = 0$ кўринишда бўлади. l_1 ва l_2 тўғри чизикларнинг кесишиш нуктаси $(x; y)$ нинг координаталарини қуйидаги системадан топамиз:

$$\begin{cases} 4ax + 2yy_0 - y_0^2 = 0, \\ y_0x - 2ay = 0 \end{cases}$$

ёки


$$\begin{cases} y = \frac{y_0^2}{2(y_0^2 + 4a^2)}, \\ x = \frac{ay_0^2}{y_0^2 + 4a^2}. \end{cases}$$

Бундан y_0 параметрни йўқотиб, изланаётган нукталарнинг геометрик ўрни тенгламасига эга бўламиз, яъни $xy^2 + x^3 - ay^2 = 0$.

28. Асоси $z = \pm c$ текислигида, маркази Oz ўқида ётувчи ва радиуси $2a$ га тенг бўлган доиравий цилиндрнинг устки асосини α бурчакка буришдан ҳосил бўлган сиртнинг тенгламасини тузинг.

Е чи ш. AB — берилган сиртнинг устидаги чизик бўлсин. Бу сиртда ихтиёрий $M(x; y; z)$ нукта оламиз (92- чизма). AB нинг тенгламасини ёзамиз:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}. \quad (A)$$



92- чизма

92- чизмадан:

$$\begin{cases} x_A = 2a \cos t, y_A = 2a \sin t, z_A = -c \\ x_B = 2a \cos(t + \alpha), y_B = 2a \sin(t + \alpha), z_B = c. \end{cases} \quad (B)$$

(B) ни (A) га қўямиз:

$$\frac{x - 2a \cos t}{2a \cos(t + \alpha) - 2a \cos t} = \frac{y - 2a \sin t}{2a \sin(t + \alpha) - 2a \sin t} = \frac{z + c}{2c}.$$

Биринчи касрни иккинчи каср билан, сўнгра учинчи каср билан тенглаб, $\cos t$ ва $\sin t$ қатнашган ҳадларни гуруҳлаб қуйидагига эга бўламиз:

$$\begin{cases} [2ac + a(z+c)(\cos\alpha - 1)]\cos t - (z+c)a\sin\alpha\sin t = xc, \\ a(z+c)\sin\alpha\cos t + [2ac + a(z+c)(\cos\alpha - 1)]\sin t = yc. \end{cases}$$

Ҳосил бўлган системанинг икки томонини квадратга кўтариб, тенгламаларни қўшамиз:

$$a^2[2c + (z+c)(\cos\alpha - 1)]^2 + a^2(z+c)^2\sin^2\alpha = (x^2 + y^2)c^2.$$

ёки

$$4c^2 + 4c(z+c)(\cos\alpha - 1) + (z+c)^2\cos^2\alpha - 2(z+c)^2\cos\alpha + \\ + (z+c)^2 + (z+c)^2\sin^2\alpha = \frac{x^2 + y^2}{a^2} \cdot c^2,$$

$$4c^2 + 4c(z+c)(\cos\alpha - 1) + 2(z+c)^2(1 - \cos\alpha) = \frac{x^2 + y^2}{a^2} \cdot c^2.$$

Кавсларни очиб соддалаштирамиз:

$$2c^2\cos\alpha + 2c^2 + 2z^2 + 2z^2\cos\alpha = \frac{x^2 + y^2}{a^2} \cdot c^2$$

$$4c^2\cos^2\frac{\alpha}{2} + 4z^2\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{x^2 + y^2}{a^2} \cdot c^2$$

$$\frac{x^2 + y^2}{4a^2\cos^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{z^2}{c^2\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}} = 1.$$

Бу — бир паллали гиперболоиднинг тенграмасидир.

Хусусий ҳолда $\alpha = 90^\circ$ бўлса,

$$\frac{x^2 + y^2}{2a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

29. $x=1$ да энг катта қиймати 6 га, $x=3$ да энг кичик қиймати 2 га тенг бўлган ва даражаси энг кичик бўлган $f(x)$ кўпхадни топинг.

Е ч и ш. $f'(1)=f'(3)=0$ бўлгани учун $f'(x)$ кўпхаднинг даражаси $n \geq 2$ бўлади. У ҳолда $f(x)$ нинг

даражаси 3 дан кичик бўлмайди. $f'(x) = A(x-1)(x-3) = A(x^2 - 4x + 3)$ ва масала шартига кўра:

$$f''(x)_{x=1} < 0 \text{ ва } f''(x)_{x=3} > 0 \text{ да } A > 0.$$

$$f(x) = A\left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right) + B,$$

бундан

$$f(1) = \frac{4}{3}A + B = 6 \text{ ва } f(3) = B = 2.$$

Демак, $B = 2$, $A = 3$. Натижада изланаётган

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

кўпхадга эга бўламиз.

30. Ҳар қандай нолга тенг бўлмаган мусбат коэффициентли кўпхад жуфт функция бўлса, у ҳолда унинг графиги $]-\infty; +\infty[$ да каварик ва фақат битта экстремум нуктасига эга бўлишини исбот қилинг.

$$\text{И с б о т. } P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0,$$

$$a_i > 0 \text{ ва } P(x) = P(-x)$$

бўлсин, у ҳолда

$$g(x) = P(x) - P(-x) = 0,$$

яъни $a_{2i+1} = 0$ ва $P(x)$ да x нинг фақат жуфт $n = 2m$ даражалари бўлади. У ҳолда

$$P'(x) = 2ma_{2m}x^{2m-1} + \dots + 2a_2x = 0,$$

$$x = 0 \text{ да}$$

$$P''(x) = 2m(2m-1)a_{2m}x^{2m-2} + \dots + 2a_2 > 0,$$

бундан $P(x)$ нинг графиги каварик эканлиги ва $x=0$ нуктада ягона экстремумга эга эканлиги келиб чиқади.

31. Бирорта ҳам бутун коэффициентли $P(x)$ кўпхадлар учун $P(7) = 5$; $P(15) = 9$ тенгликлар бажарилмаслигини исбот қилинг.

И с б о т. Тескарисини фараз қиламиз, яъни бутун коэффициентли $P(x)$ кўпхад мавжуд ва

$$P(7) = a_0 7^n + a_1 7^{n-1} + \dots + a_n = 5,$$

$$P(15) = a_0 15^n + a_1 15^{n-1} + \dots + a_n = 9$$

бўлсин. Иккинчи тенгликдан биринчисини айирамиз:

$$a_0(15^n - 7^n) + a_1(15^{n-1} - 7^{n-1}) + \dots + a_{n-1}(15 - 7) = 4.$$

Бу тенглиkning чап қисмидаги ҳамма қўшилувчилардаги қавслар $15 - 7 = 8$ га бўлинади, аммо ўнг томондаги сон эса 8 га бўлинмайди. Бу эса фаразимизни нотўғри эканлигини билдиради.

32. Бешта бутун қийматлар олувчи нуқталарда 5 га тенг қийматни қабул қилувчи $P(x)$ — бутун сонли кўпхад берилган бўлсин. У ҳолда $P(x)$ кўпхад бутун илдизга эга бўлмаслигини исбот қилинг.

И с б о т. $P(x) = 5 + (x - x_1) + \dots + (x - x_5)g(x)$ бўлсин, бунда $x_1, x_2, \dots, x_5$ бутун қийматли нуқта. Тескарисини фараз қилайлик, яъни бутун сон учун $P(x_0) = 0$ бўлсин, у ҳолда

$$(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_5)g(x_0) = -5$$

бўлиб, $(x_0 - x_1), \dots, (x_0 - x_5)$ сонлар ҳар хил ҳақиқий сонлар ва улар (-5) га бўлинади. Иккинчи томондан эса -5 сони 4 та ҳар хил бутун $1; -1; 5$ ва -5 бўлувчиларга эга. Бу эса қарама-қаршиликка олиб келди. Демак, $P(x)$ кўпхад бутун илдизга эга эмас.

33. $P(x)$ кўпхаднинг даражаси n бўлиб, $P(a) \geq 0$;

$$P'(a) \geq 0, \dots, P^{(n-1)}(a) \geq 0, P^{(n)}(a) \geq 0$$

бўлса, $P(x) = 0$ тенгламанинг ҳақиқий илдизи a дан катта бўла олмаслигини исбот қилинг.

И с б о т. $x = a$ учун Тейлор формуласидан фойдаланиб, $P(x)$ кўпхадни қуйидаги кўринишда ёзиб оламиз:

$$P(x) = P(a) + P'(a)(x - a) + \dots + \frac{P^{(i)}(a)(x - a)^i}{i!} + \dots$$

$x > a$ бўлганда масала шартига асосан $P^{(i)}(a)$ мусбатлигига кўра $P(x) > 0$ тенгсизликка эга бўламиз. Бу эса $P(x) = 0$ нинг a дан катта илдизи йўқлигини билдиради.

34. Агар ҳақиқий коэффициентли

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

кўпхаднинг ҳамма илдизлари ҳақиқий бўлса, у ҳолда унинг кетма-кет ҳосилалари

$$P'(x), P''(x), P'''(x), \dots, P^{(n-1)}(x)$$

ҳам ($a_0 \neq 0$) ҳақиқий илдизларга эга бўлишини исбот қилинг.

Исбот. $P'(x)$ кўпхаднинг илдизлари ҳақиқий эканлигини исбот қилиш етарлидир.

$$\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_s$$

лар $P(x)$ нинг илдизлари, $k_1, k_2, \dots, k_s$ лар эса уларнинг карралари ($k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$) бўлсин. Агар $k_i > 1$ бўлса, у ҳолда α_i илдиз k_{i-1} каррали $P'(x)$ нинг илдизи бўлади. Бундай илдизлар, яъни $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ сонлар $(k_1 - 1) + \dots + (k_s - 1) = n - s$ га тенгдир. Шунингдек $P'(x)$ кўпхад β_i ҳақиқий илдизга эга бўлади, бунда

$$\alpha_i < \beta_i < \alpha_{i+1} (i = 1, 2, \dots, (s-1)).$$

β_i илдизлар сони $s-1$ дан кам бўлмаслиги керак, чунки

$$(n-s) + (s-1) = n-1$$

бўлиб, $P'(x)$ бошқа илдизга эга бўлмайди ва улар ҳақиқий бўлади.

Мустақил ечиш учун масалалар

1. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} c_n^0 & c_n^1 & \dots & c_n^k \\ c_{n+1}^0 & c_{n+1}^1 & \dots & c_{n+1}^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n+k}^0 & c_{n+k}^1 & \dots & c_{n+k}^k \end{vmatrix},$$

бунда $c_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $n \in N$, $k \in N$, $k \leq n$.

2. Учинчи тартибли детерминантнинг элементлари қандай бўлишидан қатъи назар унинг ёйилмасидаги ҳамма ҳадлари мусбат бўлмаслигини исбот қилинг.

3. Агар α, β, γ лар $x^3 + px + q = 0$ тенгламанинг ечимлари бўлса, у ҳолда қуйидаги детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \\ \beta & \gamma & \alpha \end{vmatrix}.$$

4. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$ бўлса, A^{100} ни топинг.

5. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{200}$ матрицани ҳисобланг.

6. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{100}$ матрицани ҳисобланг.

7. A $m \times n$ ўлчовли квадрат матрица бўлиб, унинг кўриниши қуйидагича:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a \end{pmatrix}$$

$m < n$ бўлганда A матрицанинг биринчи сатр элементлари йигиндисини топинг.

8. Ушбу

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари матрицани топинг.

9. A 2×2 ўлчовли квадрат матрица бўлиб, унинг хос сонлари

$$|\lambda_1| < 1, |\lambda_2| < 1$$

шартни қаноатлантирса, у ҳолда

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^4$$

тенглик ўринли эканини исбот қилинг.

10. A ва B $n \times n$ ўлчовли квадрат матрицалар, E эса бирлик матрица бўлсин. Агар $E - AB$ матрица тескари

матрицага эга бўлса, у ҳолда $E - BA$ матрица ҳам тескари матрицага эга бўлишини исбот қилинг.

11. $n \times n$ ўлчовли A квадрат матрица қуйидагича берилган:

$$\begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 \cdot x_2 & \dots & x_1 x_n \\ x_2 x_1 & x_2^2 & \dots & x_2 x_n \\ x_3 x_1 & x_3 x_2 & \dots & x_3 x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n x_1 & x_n x_2 & \dots & x_n^2 \end{pmatrix}$$

$(A + E)$ матрица учун тескари матрица мавжудлигини исбот қилинг, (E — бирлик матрица) $(A + E)^{-1}$ матрицани ҳисобланг.

12. Шундай иккинчи тартибли квадрат матрицаларни топингки, уларнинг квадратлари ноль-матрицага тенг бўлсин.

13. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

матрица берилган бўлсин. $B^2 = A$ тенгликни қаноатлантирувчи учинчи тартибли B квадрат матрица мавжуд эмаслигини исбот қилинг.

14. A квадрат матрица учун

$$I^A = E + A + \frac{A^2}{2!} + \dots + \frac{A^n}{n!} + \dots$$

ёйилма ўринли бўлса, у ҳолда I^B ни топинг. Бу ерда

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad t \in]-\infty; +\infty[.$$

15. $n \times n$ ўлчовли A квадрат матрица берилган бўлсин. Шундай $n \times n$ ўлчовли B матрица мавжудки, унинг учун $ABA = A$ тенглик ўринли эканлигини исбот қилинг.

16. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ва } Y(0) = B$$

бўлса, у ҳолда

$$Y(t) = AY(t) - Y(t)A$$

тенгламадан $Y(t)$ матрицани топинг.

17. A n -тартибли квадрат матрица бўлиб, λ сон A матрицанинг хос сонлари айирмаси қўринишида ифодаланиши мумкин бўлсин.

$$Ax - xA = \lambda x$$

тенглама нолдан фарқли (умумий ҳолда комплекс) ечимга эга эканлигини исбот қилинг.

18. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ матрица}$$

$$x^2 - (a+d)x + (ad-bc)E = 0$$

тенгламани қаноатлантиришини исбот қилинг. Бунда

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

19. $A = (a_{ij})$ матрица $(n-1) \times n$ ўлчамли. $a_i (i=1, 2, \dots, (n-1))$ орқали A матрицанинг i вектор сатриини, $D_j (j=1, 2, \dots, (n-1))$ орқали A матрицанинг ij -устуниини ўчиришдан ҳосил бўлган матрицанинг детерминантини, D орқали $D = (D_1, -D_2, \dots, (-1)^{n-1} D_n)$ вектор-сатрни белгилаймиз. Барча $i=1, 2, \dots, n$ лар учун (D, a_i) скаляр кўпайтма нолга тенг бўлишини исбот қилинг.

20. Иккита $((\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{b}) \times \vec{b}$ ва $\vec{a} \times \vec{b}$ векторлар коллинеар эканлигини исбот қилинг.

21. ABC учбурчакда $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AC} = \vec{b}$. Шу учбурчакнинг BC томонига туширилган баландлик векторни топинг.

22. A, B, C, D нукталар фазода ёки текисликда қандай жойлашишларидан қатъи назар,

$$\vec{BC} \cdot \vec{AD} + \vec{CA} \cdot \vec{BD} + \vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$$

тенглик ўринли эканлигини исбот қилинг.

23. Уч ўлчовли фазода ҳамма $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ жуфт векторларни кўрсатингки, улар учун

$$\begin{cases} (\vec{a}\vec{x}) = |\vec{b}|, \\ [\vec{a}\vec{x}] = \vec{b} \end{cases}$$

система ечимга эга бўлсин ва бу ечимни топинг (бунда $(\vec{a}\vec{x})$ — скаляр кўпайтма, $[\vec{a}\vec{x}]$ — вектор кўпайтма).

24. α нинг қандай қийматларида $\vec{p} = \alpha\vec{a} + 5\vec{b}$ ва $q = 3\vec{a} - \vec{b}$ векторлар коллинеар бўлади.

25. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ уч ўлчовли фазода берилган векторлар бўлса, улар учун

$$\left| \begin{pmatrix} (\vec{a}\vec{c}) & (\vec{a}\vec{d}) \\ (\vec{b}\vec{c}) & (\vec{b}\vec{d}) \end{pmatrix} \right| = (|\vec{a}\vec{b}| |\vec{c}\vec{d}|)$$

тенглик ўринли эканини исбот қилинг (бунда $(\vec{a}\vec{c})$ — скаляр кўпайтма, $[\vec{a}\vec{b}]$ — вектор кўпайтма).

26. Агар $[AA_1]$, $[BB_1]$, $[CC_1]$ лар ABC учбурчакнинг биссектрисалари бўлиб, улар учун

$$\vec{AA}_1 + \vec{BB}_1 + \vec{CC}_1 = \vec{0}$$

бўлса, бу учбурчак мунтазам учбурчак бўлишини исбот қилинг.

27. Ушбу $\begin{cases} \vec{a} \times x + \vec{b} \times y = \vec{c}, \\ \vec{b} \times x - \vec{a} \times y = \vec{d} \end{cases}$ система учун қандай

зарурий ва етарли шартлар бажарилганда, у ечимга эга бўлади? Бу системанинг ҳамма ечимларини топинг. Бунда x , y — номаълумлар, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ — берилган векторлар ва $\vec{a}^2 + \vec{b}^2 \neq 0$.

28. $SABC$ тетраэдрнинг ҳар бир киррасидан ва унга қарама-қарши киррасининг ўртасидан текисликлар ўтказилган. Бу текисликлар умумий нуқтага эга бўлишини исбот қилинг. Бу умумий нуқтани K билан белгилаб $S\vec{K}$ векторни

$$S\vec{A} = \vec{a}, S\vec{B} = \vec{b}, S\vec{C} = \vec{c}$$

векторлар орқали ифодаланг.

29. $O\vec{A}$, $O\vec{B}$ ва $O\vec{C}$ векторлар қуйидаги тенгликни қаноатлантиради:

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OA} = 0;$$

а) $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ва $\overrightarrow{OC}$ векторлар компланар эканлигини;

б) A , B , C нукталар битта тўғри чизикда ётишини исбот қилинг.

30. Учбурчакнинг томонлари қуйидаги

$$a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

тенглама билан берилган тўғри чизиклар устида ётади. Агар S учбурчакнинг юзи, R учбурчакка ташқи чизилган айлана радиуси ва

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

бўлса, $S = |\Delta| \cdot R$ тенглик ўринли эканлигини исбот қилинг.

31. Учбурчакнинг томонлари қуйидаги

$$a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

тенглама билан берилган тўғри чизиклар устида ётади. Агар

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

ва $\Delta_i = c_i$ элементнинг алгебраик тўлдирувчиси бўлса, ушбу

$$S = \frac{\Delta^2}{2|\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3|}$$


ифода учбурчак юзи эканлигини исбот қилинг.

32. 93- чизмада икки тўғри чизикли йўл ва доираси-мон кўл тасвирланган. Кўл бўйига йўлларга иложи борица яқин жойга дам олиш уйи қуриш керак. Дам олиш уйидан йўлларгача бўлган масофалар йигиндиси энг кичик бўлиши учун уни кўлнинг қайси ёнига қуриш керак.

33. Ҳар қандай силлиқ ёпик қавариқ K эгри чизикда A ва B нукталарни шундай танлаб олиш мумкинки, улар K ни тенг узунликда иккита ёйга бўлади.

AB ватар K эгри чизик билан чегараланган юзни тенг иккига бўлишини исбот қилинг.

34. Узлуксиз ёпиқ қаварик эгри чизик ичидаги нуқтадан ватарлар ўтказилган. Агар ватар энг кичик



93- чизма

юзли сегмент кесса, берилган нуқта ватарнинг ўртасида жойлашганлигини исбот қилинг.

35. Агар r ва R бирор учбурчакка ички ва ташқи чизилган айланаларнинг радиуслари, d айланалар марказлари орасидаги масофа бўлса,

$$d^2 = R^2 - 2Rr$$

тенглик тўғри эканлигини исбот қилинг.

36. Агар $A_1, A_2, \dots, A_n$ нуқталар бирлик айлана ичига чизилган n бурчакли мунтазам кўпбурчакнинг учлари бўлса, қуйидаги йиғиндини топинг:

$$|A_1A_2|^2 + |A_1A_3|^2 + \dots + |A_1A_n|^2.$$

37. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ эллипсга $(4; -1)$ нуқтадан ўтказилган уринма тенгламасини тузинг.

38. Ҳаракатсиз эллипс устида унга тенг эллипс сирпанмасдан шундай силжиб бормоқдаки, уларнинг ихтиёрий ҳолатида ҳам эллипслар умумий уринмага нисбатан симметрик бўлса, эллипснинг фокус нуқталари қандай эгри чизиклар чизади?

39. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипсда шундай $(x_0; y_0)$ нуқта

топингки, шу нуктадан утказилган уринма ва координа-
та ўқлари билан чегараланган учбурчакнинг юзи энг
кичик бўлсин.

40. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ эллипс билан $2x + y = 5$ тўғри чизик

орасидаги энг қисқа масофани топинг.

41. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ эллипснинг $y = \frac{9}{32}x^2$ парабола билан

чегараланган пастки қисмининг юзини топинг.

42. A нукта $xy = 4$ гиперболода, B нукта эса $x^2 + 4y^2 = 4$ эллипсда ётади. A ва B нукталар орасидаги
масофа бирдан кичик бўлмаслигини исбот қилинг.

43. $4x^2 + y^2 = 5$ эллипс берилган. Шу эллипсга $x = 1$,
 $y = -1$ ва $x = y = -1$ нукталарда уринувчи парабола
тенгламасини тузинг.

44. $(4; 0)$ нуктадан $y^2 - 2x = 0$ эгри чизикқача
бўлган масофани топинг.

45. $y = x^2$ парабола билан $x - y - 2 = 0$ тўғри чизик
орасидаги энг қисқа масофани топинг.

46. $y = \frac{1}{10}x^2$ парабола билан $(0; 4)$ ва $(0; 6)$ нукта-
лар орасидаги энг қисқа масофани топинг.

47. $y = \frac{1}{x}$ гиперболанинг биринчи чоракдаги тармоғи
устида радиуси $R = 1$ тенг бўлган айланани юмалатамиз.
Бу айлана маркази чизган чизик қандайдир гиперболо-
нинг тармоғи бўладими?

48. AB кесмада $2n$ та нукта кесма ўртасига нисбатан
симметрик жойлаштирилган. Улар ичидан n та нукта
ихтиёрий усулда танлаб олиниб қизил рангга, қолган
нукталар эса кўк рангга бўялган. Қизил нукталардан
 A нуктагача бўлган масофалар йигиндиси кўк нукта-
лардан B нуктагача бўлган масофалар йигиндисиغا
тенглигини исбот қилинг.

49. R радиусли шар берилган. Шу шар ичига ҳажми
энг катта бўлган тўғри доиравий цилиндр қандай
чизилади?

50. Ярим шарнинг огирлик маркази координаталарини
топинг.

51. Ихтиёрий $n \geq 3$ тоқ даражали кўпҳад ҳеч

бўлмаганда битта бурилиш нуқтасига эга бўлишини исбот қилинг.

52. Ушбу

$$P(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

кўпхад каррали илдизга эга бўлмаслигини исбот қилинг.

53. Агар $P(x)$ мусбат коэффициентли $(n-1)$ - даражали кўпхад бўлса, у ҳолда $x^n = P(x)$ тенглама фақат битта мусбат илдизга эга бўлишини исбот қилинг.

54. Агар $P_1(x), P_2(x), \dots, P_r(x)$ мос равишда $n_1, n_2, \dots, n_r$ даражали кўпхадлар бўлиб

$$n_1 + n_2 + \dots + n_r < \frac{n(n-1)}{2}$$

бўлса, бу кўпхадлар ўзаро чизиқли боғлиқ бўлишини исбот қилинг.


55. Ушбу

$$\begin{cases} (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \end{cases}$$

система биргаликда эканлигини текширинг ва унинг ечимини топинг.

АЖОЙИБ ЭГРИ ЧИЗИҚЛАР

1. Циклоидали эгри чизиклар. а) Ox ўқи бўйлаб сирпанмай гилдираб боровчи r радиусли айлананинг ихтиёрий M нуқтаси чизган эгри чизик циклоида дейилади. Циклоида теигламасини келтириб чиқарамиз (94- чизма).



94- чизма

$M(x; y)$ нуқта циклоиданинг ихтиёрий нуқтаси бўлсин. S айлана маркази бўлсин. SM ва SH радиуслар орасидаги бурчакни t параметр деб оламиз.

Чизмадан:

$$\begin{aligned} x &= OM_1 = OH - M_1H = rt - r \sin t = r(t - \sin t), \\ y &= OM_2 = r - r \cos t = r(1 - \cos t). \end{aligned}$$

Демак,

$$\begin{cases} x = r(t - \sin t), \\ y = r(1 - \cos t). \end{cases} \quad (1)$$

(1) — циклоиданинг *параметрик* тенгламаси дейилади. Бундан фойдаланиб циклоиданинг тўғри бурчакли декарт координаталар системасидаги тенгламасини чиқариш мумкин. Бунинг учун (1) системадаги иккинчи тенгламадан

$$r \cos t = r - y \Rightarrow \cos t = \frac{r-y}{r},$$

$$t = \arccos \frac{r-y}{r},$$

$$\sin t = \sqrt{1 - \cos^2 t} = \sqrt{1 - \left(\frac{r-y}{r}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{1 - \frac{r^2 - 2ry + y^2}{r^2}} = \frac{1}{r} \sqrt{2ry - y^2}$$


ларни толиб, биринчи тенгламага қўйиш кифоя:

$$x = r \arccos \frac{r-y}{r} - \sqrt{2ry - y^2};$$

б) ўзгармас R радиусли айланга ташки уриниб, унинг устида сирпанмасдан гилдирайдиган r радиусли айлананинг ихтиёрий M нуктаси чизадиган текис эгри чизик *эпициклоида* дейилади (95- чизма).

Эпициклоида тенгламасини келтириб чиқарамиз. Унинг учун R радиусли айлананинг маркази O ни координаталар боши қилиб, у орқали ўтувчи ўзаро перпендикуляр тўғри чизикларни координата ўқлари қилиб оламиз (96- чизма).

Бу ҳолатда M нуктанинг чизган чизиги B нуктасидан бошланган бўлсин. MO, K бурчакни α деб ва айлана радиуслари нисбатини




95- чизма

$$m = \frac{r}{R} \Rightarrow r = mR$$

деб белгилаймиз.

M нукта чизган эгри чизикнинг узунлиги:

$$KM = BM \text{ ёки } R \cdot \angle KOB = r\alpha.$$



96-чизма

Бундан

$$\angle KOB = \frac{r}{R} \cdot \alpha = m\alpha.$$

M нуктанинг координаталари x ва y бўлсин. У ҳолда шаклдан:

$$\begin{aligned} x &= OP = OD + ME; \quad y = MP = O_1D - O_1E \\ OD &= OO_1 \cos m\alpha = (OK + O_1K) \cos m\alpha = (R + r) \cos m\alpha; \\ ME &= O_1M \sin(\angle MO_1E) = r \sin(\alpha - \angle O_1D) = \\ &= r \sin(\alpha - (\frac{\pi}{2} - m\alpha)) = -r \cos(\alpha + m\alpha); \\ O_1D &= OO_1 \sin m\alpha = (R + r) \sin m\alpha; \\ O_1E &= O_1M \cos(\angle MO_1E) = r \cos(\alpha - \angle O_1D) = \\ &= r \cos(\alpha - (\frac{\pi}{2} - m\alpha)) = r \cos((\alpha + m\alpha) - \frac{\pi}{2}) = \\ &= r \sin(\alpha + m\alpha); \quad r = mR. \end{aligned}$$

Бу қийматларни ўрнига қўйсақ, қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x = (R + mR)\cos\alpha - mR\cos(\alpha + m\alpha); \\ y = (R + mR)\sin\alpha - mR\sin(\alpha + m\alpha). \end{cases} \quad (2)$$


(2) тенглама эпициклоиданинг параметрик тенгламаси дейилади. Эпициклоида гилдирайдиган айлана радиуси (r) кўзгалмас айлана радиусидан (R) неча марта катта бўлишига қараб (2) тенглама турли хилда бўлади.

Хусусий ҳолда, $R=r$ ва $m=1$ бўлганда, (2) тенглама қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{cases} x = 2r\cos\alpha - r\cos 2\alpha, \\ y = 2r\sin\alpha - r\sin 2\alpha. \end{cases} \quad (3)$$

(3) тенглама билан ифодаланган эгри чизик *кардиоида* деб аталади.

в) бирор кўзгалмас R радиусли айлана бўйлаб ичкаридан сирпанмай, гилдираб боровчи r радиусли



97- чизма

айланадаги ихтиёрий M нукта чизган эгри чизик *гипоциклоида* дейилади (97- чизма). Унинг тенгламасини қуйидагича чиқарамиз. Унинг учун M нуктанинг x , y координаталарини топамиз:

$$\begin{aligned}x &= OP = OD + DP = (R-r)\cos mt + r\sin(\widehat{MO_1E}); \\y &= PM = O_1D - O_1E = (R-r)\sin mt - r\cos(\widehat{MO_1E}).\end{aligned}$$

$$\sin(\widehat{MO_1E}) = \sin(\pi - t - (\frac{\pi}{2} - mt)) = \cos(t - mt).$$

$\cos(\widehat{MO_1E}) = \sin(t - mt)$ булгани учун:

$$\begin{cases}x = (R - mR)\cos mt + mR\cos(t - mt), \\y = (R - mR)\sin mt - mR\sin(t - mt).\end{cases} \quad (4)$$

(4) система гипоциклоиданинг параметрик тенгламаси дейилади.

2. Декарт япроғи. Тўғри бурчакли декарт координаталар системасида

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0 \quad (5)$$

учинчи даражали алгебраик тенглама билан аниқланадиган эгри чизик *Декарт япроғи* дейилади, бунда $a \neq 0$ ўзгармас.

(5) тенгламани параметрик кўринишда ҳам ёзиш мумкин. Бунинг учун $y = tx$ алмаштириш бажариб, (5) дан x ни топамиз:

$$x^3 + t^3x^3 - 3axtx = 0 \Rightarrow x^3(1 + t^3) - 3atx^2 = 0$$

$$x(1 + t^3) = 3at \Rightarrow x = \frac{3at}{1 + t^3}.$$

x нинг топилган қийматини $y = tx$ га қўямиз:

$$\begin{cases}x = \frac{3at}{1 + t^3}, \\y = \frac{3at^2}{1 + t^3}.\end{cases} \quad (6)$$

(6) система декарт япроғининг параметрик тенгламаси дейилади. Кутб координаталар системасида декарт япроғининг тенгламасини ҳосил қилиш учун:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi$$

алмаштириш бажарамиз:

$$\rho^3 \cos^3 \varphi + \rho^3 \sin^3 \varphi - 3\rho^2 \cos \varphi \sin \varphi = 0 \Rightarrow$$


$$\rho^3 (\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi) - 3\rho^2 \cos \varphi \sin \varphi = 0.$$

Демак,

$$\rho = \frac{3a \cos \varphi \sin \varphi}{\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi}.$$

(5) тенгламани $x=0$, $y=0$ координаталар қаноатлантиради. Бу декарт япроғи координаталар бошидан ўтишини билдиради. Декарт япроғи $y=x$ тўғри чизикка нисбатан симметрикдир. Ҳақиқатан, (5) тенгламада x ва y ўзгарувчиларнинг ўрнини алмаштирсак, дастлабки тенглама ҳосил бўлади. $y=-x-a$ чизик декарт япроғининг асимптотасидир.

Чизик биринчи чоракда илмоқ ҳосил қилиб, сўнгра унинг тармоқлари асимптотага чексизликда яқинлашади (бунда координаталар боши тугун нуқта бўлади (98- чизма).




98- чизма

3. Циссоида. Диаметри $OA=2a$ бўлган айлана берилган ва унинг A нуқтасига уринма ўтказилган бўлсин (99- чизма). Айлананинг O нуқтасидан OB нурини ўтказамиз ва унинг айлана билан кесишган нуқтасини C билан белгилаймиз. Шу нурга $|OM_1|=|BC|$ кесмани қўямиз. O нуқтадан иккинчи нурини ўтказамиз ва юқоридаги каби M_2 нуқтани ҳосил қиламиз. Шундай усул билан исталганча M_1 , M_2

нукталарни яшаш мумкин. Бу нукталарни бирлаштиришдан ҳосил бўлган эгри чизик *циссоида* дейилади.

Циссоида тенгламасини кутб координаталарида келтириб чиқарамиз. Унинг учун O нуктани кутб боши,



99-чизма

OA нурни кутб ўқи деб оламиз. 99-чизмадан $|OM| = \rho$, $\angle AOM = \varphi$, у ҳолда M нуктанинг кутб координаталари ρ , φ лардан иборат бўлади. Уларни тонамиз:

$$\rho = |OM| = |OB| - |OC|, \quad |OB| = \frac{2a}{\cos \varphi};$$

$|OC| = 2a \cos \varphi$ га тенглигидан:

$$\rho = \frac{2a}{\cos \varphi} - 2a \cos \varphi = 2a \cdot \frac{1 - \cos^2 \varphi}{\cos \varphi}$$

ёки

$$\rho = \frac{2a \sin^2 \varphi}{\cos \varphi}. \quad (7)$$

(7) тенглама циссоиданинг кутб координаталаридаги тенгламаси дейилади.

Энди циссоиданинг декарт координаталар системасидаги тенгламасини чиқарамиз. Бизга маълумки:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Бу қийматларни (7) га қўйиб соддалаштирсак, қуйидаги тенгламага эга бўламиз:

$$y^2 = \frac{x^3}{2a-x}. \quad (8)$$

(8) тенглама циссоиданинг тўғри бурчакли декарт координаталаридаги тенгласидир. У учинчи тартибли алгебраик тенгламадир.

Параметрик тенгласини ёзиш учун


$$x = \rho \cos \varphi \text{ ва } y = \rho \sin \varphi$$

формулаларга ρ нинг қийматини қўямиз:

$$\begin{cases} x = 2a \sin^2 \varphi, \\ y = \frac{2a \sin^3 \varphi}{\cos \varphi}. \end{cases}$$

бунда φ — параметр.

4. Строфоида. А нукта ва бу нуктадан ўтмайдиган l тўғри чизик берилган бўлсин (100-чизма). Ах тўғри чизикни l тўғри чизикка перпендикуляр қилиб ўтказамиз ва уларнинг кесишиш нуктасини C билан белгилаймиз. АС кесмаи a деб оламиз. А нукта атрофида айланувчи нурни оламиз ва унинг берилган l тўғри чизик билан кесишиш нуктасини B деб белгилаймиз. B нуктадан $|BC| = |BM_1| = |BM_2|$ кесмаларни қўямиз.



Демак, А нуктадан ўтказилган битта нурга чизмада кўрсатилгандек мос равишда M_1, M_2 жуфт нукталар тўғри келади. Бундай M_1, M_2 нукталар тўплами *строфоида* деб аталади. Бунда M_1, M_2 нукталар қовушма нукталар дейилади. Етарлича шундай нукталарни ясаб, уларни бирлаштирсак строфондани ҳосил қиламиз.

Строфонда тенгласини чиқарамиз. А нуктани кутб боши, АС нурни кутб ўқи деб оламиз. Нурнинг

кутб ўқи билан ташиқил этган бурчагини φ деб белгилаймиз. У холда M_1 нукта (ρ_1, φ) кутб координаталарга эга бўлади, бунда $\rho_1 = |AM_1|$, M_2 нукта эса (ρ_2, φ) координаталарга эга, бунда $\rho_2 = |AM_2|$. Чизмадан кўриниб турибдики:

$\rho_1 = |AB| + |BM_1|$; $\rho_2 = |AB| - |BM_2|$, $|BM_1| = |BC|$
 бўлгани учун

ёки $\rho_1 = |AB| + |BC|$; $\rho_2 = |AB| - |BC|$

$$\rho = AB \pm BC. \quad (9)$$

$$|AB| = \frac{a}{\cos \varphi}, \quad |BC| = a \operatorname{tg} \varphi.$$

Бу қийматларни (9) га қўйсак:

$$\rho = \frac{a}{\cos \varphi} \pm a \operatorname{tg} \varphi = a \left(\frac{1}{\cos \varphi} \pm \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \right), \quad (10)$$

$$\rho = \frac{a(1 \pm \sin \varphi)}{\cos \varphi}$$

(10) тенглама строфоиданинг кутб координаталардаги тенгламасидир.

Энди строфоиданинг параметрик тенгламасини чиқариш учун

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi$$

тенгламаларга (10) дан ρ ни қийматини қўямиз:

$$\begin{cases} x = 1 \pm \sin \varphi, \\ y = \frac{(1 \pm \sin \varphi) \sin \varphi}{\cos \varphi} \end{cases} \quad (11)$$

Строфоиданинг тугри бурчакли декарт координаталардаги тенгламасини ёзамиз. Унинг учун

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

тенгликларни (10) га қўямиз:

$$y^2 = \frac{(x-a)^2 x}{2a-x}. \quad (12)$$

(12) тенглама декарт координаталарига нисбатан учинчи даражали тенглама — шунинг учун строфоида учинчи тартибли чизиқдир.

(12) ни y га нисбатан ечсак:

$$y = \pm(x-a) \sqrt{\frac{x}{2a-x}}. \quad (13)$$

(13) тенглама $x \geq 0$, $x < 2a$ бўлганда маънога эга бўлади. Бундан кўринадики, строфонда иккита тармокка эгадир (хар бири плус ёки минус ишоралари билан аниқланади).

Агар $x \rightarrow 2a$ га интилса, y ҳолда y нинг қиймати чексиз ортади, яъни $x=2a$ тўғри чизикка яқинлашади. Шунинг учун $x=2a$ тўғри чизик строфонданинг асимптотаси бўлади. $C(a; 0)$ нуктада строфонда тармоқлари кесишади ва бу нукта *туғунли нукта* деб аталади.


5. Бернулли лемнискатаси. Хар бир нуктасидан берилган икки $F_1(-a; 0)$ ва $F_2(a; 0)$ фокуслар деб аталувчи нукталаргача бўлган масофалар кўпайтмаси ўзгармас a^2 сонига тенг бўлган текис эгри чизик *Бернулли лемнискатаси* дейилади (101-чизма).

Лемниската таърифига кўра, F_1 ва F_2 нукталар берилган. У ҳолда уларнинг орасидаги масофа

$$|F_1F_2| = 2a \text{ ёки } a = \frac{1}{2}|F_1F_2| \text{ бўлади.}$$

Бернулли лемнискатаси тенгламасини тўғри бурчакли декарт координаталарда келтириб чиқарамиз. Координаталар бошини F_1F_2 кесманинг ўртасида қилиб F_1F_2 нукталардан ўтувчи тўғри чизикни абсциссалар ўқи деб, унга перпендикуляр бўлган ва O нуктадан ўтувчи тўғри чизикни ординаталар ўқи деб оламиз.

$M(x; y)$ нукта изланаётган чизик устидаги ихтиёрий нукта бўлсин. У ҳолда, таърифга кўра:



101-чизма

$$|F_1M| \cdot |F_2M| = a^2. \quad (14)$$

Текисликдаги икки нукта орасидаги масофани топиш формуласига кўра:

$$|F_1M| = \sqrt{(x+a)^2 + y^2},$$

$$|F_2M| = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}.$$

Бу ифодаларни (14) га қўйиб, сўнгга соддалаштирсак,

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \quad (15)$$

Бернулли лемнискатаси тенгламасига эга бўламиз. (15) тенгламадан Бернулли лемнискатаси тўртинчи тартибли алгебраик тенгламадан иборат эканлиги келиб чиқади.

Лемниската тенгламасини қутб координаталарида ифодалаш учун $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ ифодаларни (15) га қўйиб соддалаштирсак,

$$\rho^2 = 2a^2(2\cos^2\varphi - 1)$$

ёки $b = a\sqrt{2}$ белгилаш киритсак,

$$\rho^2 = b^2(2\cos^2\varphi - 1) \quad (16)$$

тенгламани ҳосил қиламиз. (16) тенглама ёрдамида Бернулли лемнискатаси нукталарини яшаш мумкин.

(16) тенгламани гипотенузаси $b\sqrt{2}\cos\varphi$ ва бирор катети b га тенг бўлган тўғри бурчакли учбурчакларнинг иккинчи катети узунлиги қаноатлантиришини кўрсатамиз.

Ҳақиқатан, агар тўғри бурчакли учбурчакнинг катетлари x , y , гипотенузаси z бўлса, у ҳолда $x^2 + y^2 = z^2$ тенглик ўринли. Бу ҳолда

$$x = \rho, y = b, z = b\sqrt{2}\cos\varphi$$

деб, ўрнига қўйсак,

$$\rho^2 + b^2 = 2b^2\cos^2\varphi \Rightarrow$$

$$\rho^2 = 2b^2\cos^2\varphi - b^2 \Rightarrow$$

$$\rho^2 = b^2(2\cos^2\varphi - 1)$$

(16) тенгламага эга бўламиз.

6. Астроида. АС — диагонали ўзгармас ва иккита томони ўзаро перпендикуляр бўлган тўғри чизик устида

ётувчи тўғри тўртбурчак берилган бўлсин (102-чизма).

Бундай тўғри тўртбурчакларнинг B учидан AC диагоналига туширилган перпендикулярларнинг асосларидаги нукталарни бирлаштиришдан ҳосил бўлган эгри чизик *астроида* дейилади.

Декарт координаталар системасида астроиданинг тенгламасини келтириб чиқарамиз. Координата ўқлари деб


бу иккита перпендикуляр бўлган томонларни оламиз (102-чизма). $|AC| = a$ бўлсин. У ҳолда $|OA|^2 + |OC|^2 = a^2$. B учидан AC диагоналига перпендикуляр туширамиз ва унинг асосини $M(x; y)$ деймиз. $\angle BCA = t$, $\angle MBA = t$ га тенг. M нуктанинг координаталари x, y ни t бурчак орқали ифодалаймиз:

$$\begin{aligned} x = OP &= |CM| \cos t = (|CB| \cos t) \cos t = |CB| \cos^2 t = \\ &= (|CA| \cos t) \cos^2 t = |CA| \cos^3 t = a \cos^3 t; \\ y = OQ &= PM = |MA| \sin t = (|AB| \sin t) \sin t = \\ &= |AB| \sin^2 t = (|AC| \sin t) \sin^2 t = \\ &= |AC| \sin^3 t = a \sin^3 t. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\begin{cases} x = a \cos^3 t; \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ астроиданинг параметрик тенгламаси бўлиб, ундан t параметрни июкотсак, унинг тўғри бурчакли декарт координаталаридаги тенгламасига эга бўламиз:

$$\begin{cases} x^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}} \cos t, \\ y^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}} \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \cos^2 t \\ y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \sin^2 t \end{cases} \Rightarrow x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}.$$


7. **Архимед спирали.** Тўғри чизик бўйича текис ҳаракатланувчи ва бир вақтнинг ўзига тайин нукта



102-чизма

атрофида текис айланувчи бирор M нуктанинг траекторияси *Архимед спирали* дейилади.

Демак, Архимед спиралининг таърифига кўра нуктанинг траекториясида бир вақтда иккита текис ҳаракат иштирок этиб, ундан бири тўғри чизик бўйлаб, иккинчиси эса айлана бўйлаб ҳаракатдан иборат экан.



103- чизма

M нукта ON тўғри чизик бўйлаб ҳаракат қилади, O нукта атрофида эса текис айланма ҳаракат қилади.

O нуктани кутб боши, Ol ни кутб ўқи деб оламиз (103- чизма). M нуктанинг дастлабки координаталарини ρ , φ деб белгилаймиз, бунда $\rho = |OM|$, φ — OM кутб-радиусининг кутб ўқи Ol билан ташкил этган бурчаги. M нуктанинг ON тўғри чизик бўйича босиб ўтган йўли a кутб бурчаги φ нинг ўсишига тўғри пропорционалдир. Шунинг учун

$$\rho = a\varphi, \quad (17)$$

бунда a — пропорционаллик коэффициентини. (17) тенглама Архимед спиралининг кутб координаталаридаги тенгламаси дейилади. Унинг декарт координаталар системасидаги тенгламаси эса қуйидагича:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = a \cdot \arctg \frac{y}{x}.$$

Агар ҳар бир ўрам орасидаги масофани d деб белгиласак, у ҳолда

$$d = a(\varphi + 2\pi) - a\varphi = 2a\pi.$$

Бундан кўриниб турибдики, ўрамлар орасидаги масофа ўзгармасдир.

8. Логарифмик спираль. Тенгламаси кутб координаталар системасида $\rho = ae^{k\varphi}$ (бунда a ихтиёрий сон,


Логарифмическая спираль

харакатланаётган М
нуқтанинг қутб боши-
дан узоқлиги нурнинг

нуқтанинг кутб боши-
дан узоқлигининг логарифмининг нурнинг бури-

(18) формуланинг хусу

радиус-векторлар спирал
кесиб ўтади (104- чизма).
логарифмик спиралга ўхш



104- чизма

АДАБИЁТ

1. Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии. М., «Наука», 1968.
2. Атанасян Л. С. Геометрии I к. М., «Просвещение», 1973.
3. Атанасян Л. С. Сборник задач по аналитической геометрии М., «Просвещение», 1968.
4. Бакельман И. Я. Аналитик геометрия ва чизикли алгебра. Тошкент, «Ўқитувчи», 1978.
5. Болгов В. А., Демидович Б. П. ва бошк. Линейная алгебра и основы математического анализа. М., «Наука» 1981.
6. Борович З. И. Определители и матрицы. М., «Наука», 1988.
7. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. М., «Наука», 1980.
8. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. М. Прямые и кривые. М., «Наука», 1978.
9. Гусак А. А., Гусак Г. И. Линии и поверхности. Минск, «Высшая школа», 1985.
10. Данко П. Е. ва бошк. Высшая математика в упражнениях и задачах. М., I к. «Высшая школа», 1986 г.
11. Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии. М., «Наука», 1975.
12. Зайцев И. А. Высшая математика. М., «Высшая школа», 1991.
13. Зельдович Я. Б., Яглом И. М. Высшая математика для начинающих физиков и техников. М., «Наука», 1982.
14. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. М., «Наука», 1981 г.
15. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии. М., «Наука», 1982.
16. Кручкович Г. И. ва бошк. Сборник задач по курсу высшей математики. М., «Высшая школа», 1980.

17. Постников М. М. Аналитическая геометрия. М., «Наука», 1979.

18. Ражабов Ф., Нурметов А. Аналитик геометрия ва чизикли алгебра. Тошкент, «Ўқитувчи», 1990.

19. Рахимов А. Умумий электротехника. Тошкент, «Ўқитувчи», 1981.

20. Савелов А. А. Плоские кривые. М., «Физматгиз», 1960.

21. Садовничий В. А., Подколзин А. С. Задачи студенческих олимпиад по математике. М., «Наука», 1978.

22. Пышкевич Р. И., Феденко А. С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Минск, «Высшая школа», 1976.

23. Шнейдер В. Е. ва бошқ. Олий математика киска курси. Тошкент, «Ўқитувчи», 1985.

24. Шодиев Т. Аналитик геометрияда қўлланма. Тошкент, «Ўқитувчи», 1973.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
I б о б. ДЕТЕРМИНАНТЛАР ВА ЧИЗИҚЛИ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАЛАРИ	4
1-§. Иккинчи тартибли детерминантлар	4
2-§. Учинчи тартибли детерминантлар ва уларнинг хоссалари	9
3-§. Уч номаълумли учта чизикли тенгламалар системалари	16
4-§. n -тартибли детерминантлар ва уларни ҳисоблаш	19
5-§. n номаълумли n та чизикли тенгламалар системалари	24
6-§. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечиш	25
7-§. Уч номаълумли бир жинсли, чизикли учта тенглама системаси	30
<i>Машқлар</i>	33
II б о б. МАТРИЦАЛАР АЛГЕБРАСИ	35
1-§. Матрица ҳақида тушунча	35
2-§. Тескари матрица	44
3-§. Чизикли тенгламалар системасини матрицалар кўринишида ифодалаш	49
4-§. Матрица ранги	51
5-§. Детерминант ва матрицалар назариясининг татбиқлари	55
<i>Машқлар</i>	62
III б о б. ВЕКТОРЛАР АЛГЕБРАСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ	66
1-§. Вектор ҳақида тушунча	66
2-§. Векторлар устида амаллар	67
3-§. Икки вектор орасидаги бурчак	72

4-§. Векторнинг ўқдаги проекцияси	74
5-§. Векторларнинг чизикли боғлиқлиги. Базис векторлар	76
6-§. Векторнинг йўналтирувчи косинуслари	80
7-§. Икки векторнинг коллинеарлик шarti	81
8-§. Координаталари билан берилган векторлар устида амаллар	82
9-§. Векторларнинг скаляр кўпайтмаси ва унинг хоссалари	83
<i>Машқлар</i>	87

IV 606. ТЕКИСЛИКДА ВА ФАЗОДА КООРДИНАТАЛАР СИСТЕМАСИ 88

1-§. Текисликда координаталар системаси	88
2-§. Фазода координаталар системаси	91
3-§. Кутб координаталар системаси. Нуктанинг декарт ва кутб координаталари орасидаги боғланиш	93
4-§. Цилиндрик ва сферик координаталар системаси	97
5-§. Декарт координаталарни алмаштириш	99
6-§. Кесмани берилган нисбатда бўлиш	103
7-§. Икки векторнинг вектор кўпайтмаси. Вектор кўпайтманинг хоссалари. Учбурчакнинг юзи	109
8-§. Векторларнинг аралаш кўпайтмаси ва унинг хоссалари. Тетраэдрнинг ҳажми	114
9-§. Кўш вектор кўпайтма	119
10-§. Чизикли операторларнинг хос векторлари ва хос кийматлари (сонлари)	121
<i>Машқлар</i>	125

V 606. ТЕКИСЛИКДА ТҒҒРИ ЧИЗИК ТЕНГЛАМАЛАРИ 127

1-§. Чизикнинг текисликдаги тенгламаси	127
2-§. Тўғри чизикнинг текисликдаги тенгламалари	131
3-§. Текисликда икки тўғри чизикнинг ўзаро жойлашуви	142
4-§. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак	143
5-§. Нуктадан тўғри чизиккача бўлган масофа	145
6-§. Тўғри чизиклар дастаси	146
7-§. Тўғри чизикнинг нормал тенгламаси	147
<i>Машқлар</i>	149

VI 606. ФАЗОДА ТЕКИСЛИКЛАР ВА ТҒҒРИ ЧИЗИКЛАР 153

1-§. Текисликнинг турли тенгламалари	153
2-§. Икки текислик орасидаги бурчак. Икки текисликнинг параллеллик ва перпендикулярлик шартлари	159
3-§. Учта текисликнинг кесишиш нуктаси. Нуктадан текисликкача бўлган масофа	162

4- §. Фазода тўғри чизик тенгламасининг берилиш усул-лари	164
5- §. Икки тўғри чизик орасидаги бурчак. Тўғри чизиклар-нинг параллеллик ва перпендикулярлик шартлари	169
6- §. Фазода тўғри чизик ва текислик	171
7- §. Текисликлар боғлами (дастаси)	176
<i>Машқлар</i>	177
VII боб. ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИКЛАР	181
1- §. Айлана	181
2- §. Эллипс	186
3- §. Гипербола	195
4- §. Парабола	204
5- §. Иккинчи тартибли чизикларнинг кутб координата-лардаги тенгламалари	211
6- §. Иккинчи тартибли чизикнинг умумий тенгламасини каноник кўринишга келтириш	214
<i>Машқлар</i>	224
VIII боб. ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ СИРТЛАР	227
1- §. Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси	227
2- §. Сферик сирт	228
3- §. Цилиндрик сирт	230
4- §. Конус сирт	232
5- §. Айланма сиртлар	235
6- §. Эллипсоид	237
7- §. Гиперболоидлар	241
8- §. Параболоидлар	247
<i>Машқлар</i>	250
IX боб. АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИКЛИ АЛГЕБРАГА ДОИР МАСАЛАЛАР ЕЧИШ	253
Илова. Ажойиб эгри чизиклар	284
Адабиёт	298

Латинов Х. Р., Тожиев Ш. И., Рустамов Р.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
И ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

На узбекском языке

Издательство «Ўзбекистон» — 1995.

Кичик муҳаррир *Ш. Соибназарова*
Бадий муҳаррир *Ж. Гулова*
Техник муҳаррир *А. Горшкова*
Мусаххих *У. Абдуқодирова*

Теришга берилди 07.02.95. Босишга рухсат этилди 24.08.95. Бичими
84×108¹/₃₂ «Таймс» гарнитурда офсет босма усулида босилди.
Шартли бос. т. 15,96. Нашр бос. т. 13,85. Тиражи 4000. Буюртма № 632.
Баҳоси шартнома асосида.

«Ўзбекистон» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30.
Нашр № 194—94.

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот кўмитасининг ижарадаги
Тошкент матбаа комбинатида босилди. 700129, Тошкент, Навоий
кўчаси, 30.

Латипов Х. Р. ва бошқ.

Л 24 Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра: Олий ўқув юртлари учун дарслик/Х. Р. Латипов, Ш. И. Тожиев, Р. Рустамов.— Т.: Ўзбекистон, 1995.— 304 б.

1.1,2 Автордош.

ISBN 5-640-01785-6

Қўлланма олий техника ўқув юртлари учун тасдиқланган «Олий математика» дастури асосида ёзилган. Унда «Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра» курси материали техника ихтисосликларига мослаб баён қилинган. Математиканинг физика, механика, радиотехника, электротехникага татбиқлари-га алоҳида эътибор берилган.

Олий техника ўқув юртларининг кундузги, кечки ҳамда сиртки бўлимларида таълим олаётган биринчи босқич талаба-ларига мўлжалланган.

22.151.5я73 + 22.143я73

№ 610—95

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Республикасининг
Тавлат кутубхонаси

1602050000 — 118

М351 (04) 95

А

95

