


БЖ

А. БОЙДЕДАЕВ

КЛАССИК СТАТИСТИК ФИЗИКА

КЛАССИК СТАТИСТИК ФИЗИКА

А. БОЙДЕДАЕВ



б-72

А. БОЙДЕДАЕВ

КЛАССИК СТАТИСТИК ФИЗИКА

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги педагогика институтлари
ва университетларнинг физика мутахассислиги бўйича
таҳсил олаётган талабалари учун ўқув қўлланма
сифатида тавсия этган*

БИБЛИОТЕКА
Бух. ТИП и ЛП
№ 4 2751

Тақризчилар: А.А. АБДУМАЛИКОВ
Р. МАМАТҚУЛОВ

Муҳаррир Ю. МУЗАФФАРХУЖАЕВ

Бойдедаев А.

Классик статистик физика.

Олий ўқув юртлари талабалари учун қўлланма. —
Т.: "Ўзбекистон", 2003, — 352 б.

ISBN 5-640-02708-8

Китобда статистик физика ва статистик термодинамика асослари илмий ва услубий жиҳатдан узига хос тарзда баён қилинган ҳамда уларнинг муайян қолларга татбиқи келтирилган. Тақсирот функцияларининг услубий жиҳатдан янгича баён қилинши янги термодинамик муносабатлар олинишига ҳамда мувозанатли статистик физика ва термодинамиканинг баъзи жиддий масалаларини (масалан, термодинамиканинг иккинчи ва учинчи қонунларини) янги-ча ва қўлай баён этишга имкон беради.

Китоб педагогика институтлари ва университетларнинг физика мутахассислиги буйича таҳсил олаётган юқори курслар талабаларига муҳалланган. Китобдан шунингдек барча олий ўқув юртларининг табиий фанлар буйича таҳсил олувчи талабалари ҳам фойдаланишлари мумкин.

ББК 22.317

Б 1604010100-44 2003
М351(04)2001

Аҳмаджон Бойдедаев

КЛАССИК СТАТИСТИК ФИЗИКА

Башини муҳаррир У. Слимҳон
Техник муҳаррир Т. Харишанова
Мусаҳҳиҳ Н. Умарова
Компьютерда тайёрловчи Ф. Тўшмешова

Теришга берилди 12.04.02. Босишга рухсат этилди 16.04.03. Қогоз бичими 84 x 108/16.
Офсет босма усулида босилди. Шартли б.т. 18,48. Нашр т. 14,55. Нусхаси 1000.
Буюртма №330 Баҳоси шартнома асосида.

"Ўзбекистон" нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий, 30.
Нашр № 197—2001.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг
Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи.
700129, Тошкент, Навоий, 30//700169.
Тошкент. У. Юсупова кўчаси, 16

© "Ўзбекистон" нашриёти, 2003 й.

СУЗ БОШИ

Бу китоб Тошкент Давлат педагогика институтида физика ихтисоси бўйича таҳсил олувчи талабалар учун ўқилган статистик физика ва термодинамика курси ҳамда семинар материаллари асосида ёзилди. Мазкур китобда статистик физика ва термодинамика асосларини етарли даражада содда баён этишга ҳаракат қилинди ва бу фанларни мустаҳкам эгаллашга кўмак бермоқ учун мисоллар ва масалалар (ечимлари билан) келтирилди.

Ушбу қўлланманинг асосий мақсади шу фаннинг асосларининг, қонун-қоидаларининг талабалар томонидан мукамал эгалланишига қаратилган.

Физика асосий фанлар ичида етакчи уринни эгаллайди. Статистик физика эса физиканинг асосий бўлимларидан биридир. Аммо уни асослашда бир қанча қийинчилик ва ноаниқликлар мавжуд. Шу сабабли, табиийки, статистик физика курсини баён этиш илмий ва услубий жиҳатдан мураккабдир.

Биз статистик физика асосини классик ва квант физиканинг асосий ғояларига таяниб ҳамда математик статистикадан бевосита фойдаланиб, ўзига хос янги усулда баён этишга ҳаракат қилдик.

Мазкур китоб "Классик статистик физика" ва "Квант статистик физика" деб номланган икки қисмдан иборат. Биринчи қисмда (I, III—VIII боблар) мувозанатли статистик физика асослари, мувозанатли термодинамиканинг асосий муносабатлари баён этилган. Иккинчи қисм "Квант статистик физика" квант тизим (система)ларининг мувозанатли ҳолатлари, уларнинг Бозе-Эйнштейн ва Ферми-Дирак тақсимотлари асосида тавсифланиши мувозанатли ҳолатни урганишдан номувозанатли ҳолатни урганишга ўтишда муҳим босқич ҳисобланалиган флуктуация назарияси баён этилган.

Китобнинг II боби эҳтимоллар назариясининг баъзи асосий тушунчаларига бағишланган.

микдорий муносабатларини аниқлаш (топиш) учун микро-
физика. Макроскопик тизимнинг статистик қонуниятларини
ни урганишда микрофизиканинг классик механика қону-
нларидан сони қанча асосини қонуниятлардан фойдаланишга
шига қараб, статистик физика *классик статистик физика*
ёки *квант статистик физика* дейилади.

Агар макроскопик тизим термодинамик мувозанат ҳола-
тида бўлса, бундай тизимнинг статистик қонунилари ва
ундаги микдорий муносабатларни мувозанатли статистик
физика урганади. Бунда, қупинча, "мувозанатли" деган сўз
тушириб қолдирилади. Агар тизим номувозанат ҳолатда
бўлса, бундай тизимнинг статистик хоссаларини номуво-
занатли статистик физика урганади.

Статистик физика асосида олинган ўртача катталиқ-
лар (моментлар), уларнинг ўзгаришлари, қонунилари мак-
роскопик физикадаги (термодинамика, гидродинамика,
газодинамика ва шу қабиллардаги) параметрлар, улар-
нинг ўзгаришлари, қонуниларига мос келади. Шу маънода
статистик физиканинг вазифаси макроскопик физика ва
унинг қонунилари молекуляр атомистик тасаввурлардан
келиб чиқиб асослашдан ҳам иборат.

Статистик физика бир томондан классик механика ва
квант механиканинг услубларига таянса-да, иккинчи то-
мондан, унинг математик услубларининг асосида эҳти-
молликлар назарияси ётади.

Шундай қилиб, статистик физика назарий физиканинг
бир бўлими бўлиб, у модданинг хоссаларини ҳар томон-
лама ва чуқур ўрганишда, ундаги физик ҳодисаларни тад-
қиқ этишда жуда зарурдир.

1.1-§. ТИЗИМ ВА УНИНГ ҲОЛАТИ

Макроскопик тизимлар ташқи тизимлар билан муноса-
батига қараб уч турга бўлинади. Агар қаралаётган тизим та-
шқи тизимлар (муҳит) билан ҳеч қандай алоқада бўлмаса,
яъни улар билан иссиқлик (энергия) ҳам, зарралар (масса)
ҳам алмашмаса, уни *яккаланган тизим дейилади*. Демак,
яккаланган тизимнинг энергияси ва зарралар сони ўзгар-
майди, улар доимий бўлади. Агар тизим ташқи тизимлар
билан иссиқлик контактида бўлиб, унинг энергияси ўзга-

риши мумкин бўлса-ю, аммо зарралари сони (массаси) до-
 тизим ташқи тизимлар билан энергия ва масса алмашиши-
 ни тўғрисида унинг энергияси ва массаси (зарралар сони)
 тизимнинг макроскопик (термодинамик) ҳолати шу тизимни
 аниқловчи (таърифловчи) термодинамик параметрларнинг
 қийматлари билан аниқланади. Агар тизим термодинамик
 мувозанатда бўлса, таърифга кўра унинг термодинамик па-
 раметрларининг, масалан, температура, босим, зичлик, кон-
 центрацияларнинг қийматлари ўзгармайди. Бу мувозанат
 ҳолатда макроскопик тизимни аниқловчи параметрлар сони,
 яъни тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари сони
 фазалар қоида-сига биноан аниқланади: *Эркинлик да-
 ражалари сони N тизимни ташкил этган компонентлар сони
 n га 2 ни қўшиб, тизимнинг фазалар сони r ни айтириб таш-
 ланганига тенг:*

$$N = n + 2 - r.$$

1. Тизимнинг макроскопик (термодинамик) параметрлари.
 Тизимнинг мувозанатли макроскопик ҳолатини аниқловчи
 параметрлар икки турли: аддитив ва интенсив характерли
 бўлади. Масалан, тизимнинг зарралари сони N , ҳажми V
 (тизимнинг қисмлари орасидаги ўзаро таъсир эътиборга олин-
 маганда) энергияси E , энтропияси S аддитив катталиклар-
 дир, яъни тизимнинг катталиги (масалан, N ва U) тизим
 қисмларининг ушандай катталикларининг йиғиндисига тенг.
 Масалан, $N = N_1 + N_2$, $V = V_1 + V_2$; N_1 , N_2 ва V_1 , V_2 тизим
 қисмларининг зарралари сонлари ва ҳажмларидир.

Тизимнинг параметрлари интенсив характерга эга бўли-
 ши мумкин. Масалан, тизимнинг температураси T , боси-
 ми P , зичлиги ρ интенсив параметрлардир, яъни тизим-
 нинг қисмларига тегишли параметрлар унинг ушандай па-
 раметрларига тенг.

Масалан, $T_1 = T_2 = T$; $\rho_1 = \rho_2 = \rho$.

2. Релаксация. Тизим бирор таъсир ёки таъсирлар сабабли
 номувозанатли ҳолатга келган бўлса, бу таъсирлар тўхтаган-
 дан кейин тизим маълум τ вақт ўтиши билан ўзининг термо-
 динамик мувозанат ҳолатига келади. Бу жараён *релаксация*
ҳодисаси дейилади ва τ вақт *релаксация вақти* дейилади.

ТИЗИМНИНГ РАВВАСИНИ ВАҚТИ τ ДАН КИЧИК БУЎМАСА, ЯЪНИ


$$\delta t \geq \tau \quad (1)$$

шарт бажарилса, бундай жараён (ўзгариш)да тизим ҳар доим термодинамик мувозанатли ҳолатга келиб улгуради. Бу ҳолда, яъни (1) шарт бажарилганда мувозанатли ҳолат учун киририлган параметрларни киритиш мумкин бўлади. Бундай жараёнлар *мувозанатли* ва *қайтувчан жараёнлар* дейилади.

Масалан, цилиндр поршени остида газ мувозанат ҳолатда бўлсин (1.1-расм). Поршен жуда секин юқорига кутарилсинки, унга таъсир қилаётган ташқи босим p_1 билан газнинг поршенга босими, яъни ички босим p_2 доимо тенг бўлиши, бинобарин, газ мувозанат ҳолатда бўлиши таъминлансин. Бу ҳолда тизим (газ) 1 ҳолатдан 2 ҳолатга қандай мувозанатли кетма-кет ҳолатлардан ўтиб борган бўлса, тизим уша кетма-кет мувозанатли ҳолатлар орқали 2 ҳолатдан 1 ҳолатга қайтади, бундай жараён *қайтувчан (квазистатик)* жараён дейилади. Жараён қайтувчан бўлиши учун у секин содир бўлиши ва $\delta t \geq \tau$ шарт бажарилиши зарур.

Тизимнинг ҳолати шундай тез ўзгартирилсаки, бундаги ўзгариш учун кетган δt вақт релаксация вақти τ дан кичик бўлса, яъни

$$\delta t < \tau \quad (2)$$



1.1-расм.

шарт бажарилса, бундай жараёнлар (номувозанатли) *қайтмас жараёнлар* дейилади.

Юқоридаги мисолда (1.1-расмга қаранг) газни 1 ҳолатдан 2 ҳолатга тез ўзгартирилганда $\delta t < \tau$ шарт бажарилса, поршень кутарилиши чоғида цилиндрдаги газ кенгая боради ва унда ҳар хил газ оқимлари, яъни уюрмалар ва бошқа мураккаб жараёнлар содир бўлиши мумкин. Табиийки, газ 1 ҳолатдан 2 ҳолатга ўтишидаги қатор кетма-кет ҳолатлардан 2 ҳолатдан 1 ҳолатга

ўша кетма-кет ҳолатлар орқали ўтиши асло мумкин эмас. IIIv сабабли, бундай жараёнлар қайтмас жараёнлар дейила-

сим P поршенга курсатилаётган ташқи босим P дан кичик бўлади.

(қайтмас) жараёндаги газ босими P_H мувозанатли (қайтувчан) жараёнлардаги газ босими P_M дан кичик, яъни $P_H < P_M$ бўлади. Демак, муайян ташиқи шароитда қайтар ва қайтмас жараёнлар билан газ ҳажмининг dV га кенгайиши газнинг номувозанатли қайтмас жараёндаги бажарган иши $\delta A_H = P_H dV$ унинг мувозанатли қайтувчан жараёндаги бажарган иши $\delta A_M = P_M dV$ дан катта бўла олмайди (Карно теоремаси), яъни:

$$\delta A_H \leq \delta A_M. \quad (3)$$

Локал мувозанатли ҳолатлар. Тизим номувозанатли ҳолатда бўлиб, унда жараёнлар етарли даражада секин кечаётган бўлса, тизимнинг ҳар бир нуқтасида ва вақт моментида мувозанатли макроскопик ҳолат тушунчасини киритиш мумкин бўлса, бундай ҳолларда локал макроскопик параметрлар киритилади ва уларни *фазо* ва *вақт функциялари* деб қаралади, масалан $T(\vec{r}, t), \rho(\vec{r}, t)$. Бундай масалаларни умумий ҳолда номувозанатли термодинамика (хусусий ҳолларда гидродинамика, газодинамика ва бошқалар) услублари билан тадқиқ этилади. Номувозанатли термодинамика тадқиқ қиладиган тезликли жараёнлар босқичи *гидродинамика босқичи* дейилади.

Макроскопик тизимда жараёнлар етарли даражада те кечаётган бўлса, у ҳолда макроскопик ҳолат тушунчасини киритиш жуда қийин ёки умуман бундай тушунчани киритиш имкони йўқ бўлади. Бундай ҳолларни молекуляр-кинетик назария (кинетик босқичда), умумий ҳолда (динамика босқич) микроскопик назария (классик механика, квант механика) тадқиқ қилади. Шундай қилиб, динамик, кинетик, гидродинамик, мувозанатли жараёнлар ва тўла мувозанатли ҳолат босқичларида тизимни тавсифлаш даражалари қисқариб боради, корреляциялар сусайиб боради.

Жараёнларнинг секин ва тезлиги тушунчаларини аниқлаш масаласи, яъни қайси ҳолларда динамик услубни, қай

си ҳолларда молекуляр-кинетик услубни ёки номувозанатли термодинамик услубни қўллаш мумкинлиги масаласини ҳал қилишга машҳур олимлар Н.Н. Боголюбов, И. Пригожин катта ҳисса қўшдилар [1, 2]. Номувозанатли термодинамика ва молекуляр-кинетикага тегишли ҳоллар билан кейинроқ танишамиз.

1.3-§. ТИЗИМНИНГ ДИНАМИК МИКРОСКОПИК ҲОЛАТЛАРИ

Тизимнинг ҳар бир зарраси классик механикада умумлашган координаталар ва умумлашган импульслар билан аниқланади, квант механикасида эса (координаталар ёки импульслар ёки бошқа динамик катталикларга боғлиқ бўлган) тўлқин функция билан аниқланади.

Тизимни ташкил этган зарраларнинг умумлашган координаталари ва импульслари ёки тўлқин функциялари маълум бўлса, тизимнинг ҳолати аниқланган бўлади. Бундай усул билан аниқланган тизим ҳолатини *динамик микроскопик ҳолат* деб атаймиз.

Тизим зарраларининг ҳаракатлари, тўқнашишлари туфайли уларнинг координаталари ва импульслари ўзгаради. Демак, бундай динамик микроҳолат вақт ўтиши билан ҳатто тизим термодинамик мувозанатда бўлганда ҳам ўзгаради.

Умумлашган координаталар ва умумлашган импульслар куп ўлчовли фазонинг координата ўқлари деб қаралса, бундай куп ўлчовли фазода ҳар бир нуқта тизимнинг динамик микроҳолатини ифодалайди. Бундай фазо тизимнинг *фазавий фазоси*, динамик микроҳолатни ифодалайдиган нуқта эса *фазавий нуқта* дейилади. Маълумки, фазавий нуқта вақт ўтиши билан ўзгаради, фазавий фазода у фазавий траектория чизади.

Қаралаётган термодинамик мувозанатли тизимнинг ҳар бир заррасининг динамик ҳолатларини тавсифлайдиган ҳаракат тенгламаси, механика қонунларига асосан, вақтга нисбатан инвариантдир. Демак, мувозанатли тизимнинг динамик микроҳолатлари ва буларни геометрик тавсифлайдиган фазавий нуқталар тенг кучли бўлиб, улар бир-бирларига нисбатан афзалликларга ҳамда устунликларга эга эмас.

Шундай қилиб, динамик микроҳолат ва унга мос динамик параметрлар (катталиклар) вақт ўтиши билан ўзгара-

ди, мувозанатдаги макроҳолат ва уни аниқлайдиган макропараметрлар эса ўзгармайди. Ўзгарувчи микроҳолатлар асосида ўзгармас макроҳолат, ўзгарувчи динамик катталиклар асосида эса макроскопик параметрлар қандай келиб чиқадиган, деган савол туғилади.

Энди биз микроҳолатлар билан макроҳолат орасидаги муносабатга, микроҳолатлардан қандай қилиб макроҳолат келиб чиқади, деган масалаларга тўхталамиз.

1.4-§. ТИЗИМНИНГ ДИНАМИК ПАРАМЕТРИ ВА УНИНГ ҚИЙМАТЛАРИ

Мувозанатдаги тизимнинг вақт ўтиши туфайли ҳосил булган барча динамик микроҳолатлари бир-бирига эквивалент (тенг кучли) бўлишига қарамасдан ички ва ташқи таъсирлар туфайли тизимнинг ихтиёрий физик катталик (параметр) $L(t)$ нинг қийматларидан баъзилари кўпроқ вақт, баъзилари эса камроқ вақт кузатилади. Фараз қилайлик, L физик катталик

$$L_1, L_2, \dots, L_n, \dots$$

дискрет қийматларни қабул қилсин, бунда $N \rightarrow \infty$ кузатишлар ўтказилганда L_i қиймат n_i марта кузатилган бўлсин, яъни L_i қиймат n_i та динамик микроҳолатларда қайд этилган бўлсин. Бошқача айтганда, динамик катталик L нинг бирор қийматига мос келган микроҳолатлар қанча кўп бўлса, шу қийматга мос микроҳолатлар тўпламида тизим шунча узоқ (кўп) вақт бўлади ва, демак, L нинг қиймати кўп марта кузатилади. Бу эса тизим баъзи ҳолатларда кўпроқ, баъзи ҳолатларда камроқ вақт бўлади, демакдир.

Кузатишлар сони N га, динамик микроҳолатлар сони N_i га тенг бўлганда L_i қийматга мос келган динамик микроҳолатлар сони (тўлам элементлари сони) n_i ни L_i қиймати-нинг *айниш карраси* ҳам дейилади. Яккаланган тизимда табиийки,

$$L_1 = L_2 = \dots = L = \text{const}$$

бўлади. Демак, бу ҳолда айнаш карраси N_i га тенг бўлади. Умуман мувозанатли тизимнинг бу L параметри қийматлари ўзгармайди ва демак, барча динамик ҳолатларда параметрнинг қийматлари ўзаро тенг бўлгани учун N марта кузатилганда барчасида битта бир хил қиймат олинади. L — бу

сақланувчи параметр (масалан, эгнергия E). Умумий ҳолда динамик микроҳолатлар тенг кучли (бир-бирига эквивалент) бўлса-да, аммо физик катталикининг қийматларига мос динамик ҳолатлар тўпламлари бир-биридан фарқ қилади.

1.5-§. ДИНАМИК КАТТАЛИКЛАРНИ ВАҚТ БЎЙИЧА ЎРТАЧАЛАШ

Агар тизим термодинамик мувозанатда бўлса, уни аниқлайдиган макроскопик параметрлар, таърифга биноан, ўзгармайди. Лекин шу тизимнинг динамик микроҳолати ўзгаради. Динамик микроҳолат вақт бўйича ўзгариши ҳамда ташқи таъсир туфайли тизимнинг ихтиёрий динамик катталиги L (масалан, энергия, импульс, импульс моменти ёки бошқа катталиклар) ўзгаради ва умумий ҳолда у ҳар хил қийматлар қабул қилади.

Тизимни $t \rightarrow \infty$ вақт давомида кузатилса, у барча динамик микроҳолатларда бўлади. (Бундай тизимни *эргодик тизим* дейилади).

Фараз қилайлик, L катталик

$$L_1, L_2, \dots, L_N \quad (4)$$

қийматларни қабул қилсин. $L(t)$ катталикини $N(N \rightarrow \infty)$ марта кузатайлик. Бу ҳолда динамик катталик $L(t)$ нинг ўртача қиймати қуйидагича аниқланади:

$$\bar{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i, \quad N \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Агар N та тажриба ўтказилганда (4) қийматлар мос равишда

$$n_1, n_2, \dots, n_i, \dots$$

марта келиб чиққан бўлса, ўртача $\bar{L}$

$$\bar{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i, \quad n_i, L_i, \quad N \rightarrow \infty \quad (6)$$

йиғинди билан аниқланади. Ҳар бир тажриба ўтказиш вақтини Δt га тенг деб фараз қилсак, у ҳолда умумий кузатиш вақти $t = N\Delta t$ га, n_i та кузатиш вақтини Δt_i га тенг дейилса, динамик катталикининг вақт бўйича ўртачаси (6)ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\bar{L} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^N L_i \Delta t_i, \quad t \rightarrow \infty. \quad (7)$$

Тизимнинг динамик микроҳолати вақт бўйича узлуксиз ўзгарса, унга мос бўлган L катталиқнинг қиймати ҳам узлуксиз ўзгаради. L , $L + dL$ ораликдаги $L(t)$ нинг қийматларига мос келган вақтни $dt_L = \Delta t dn_L$ билан белгиласак, динамик катталиқнинг вақт бўйича ўртачаси (6) ва (7)ни

$$\overline{L}_t = \frac{1}{N} \int_0^N L_n dn_L, \quad (8)$$

$$\overline{L}_t = \frac{1}{t} \int_0^t L(t) dt \quad (9)$$

кўринишларда ёзиш мумкин.

Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, $t \rightarrow \infty$ да ўртача катталиқ $\overline{L}_t$ тажриба (кузатиш) бошланган вақтга боғлиқ эмас, яъни тизим термодинамик мувозанатда бўлганда $\overline{L}_t$ вақтга боғлиқ эмас. Бу эса макроҳолат ва тизимдаги флуктуацияларнинг вақтга боғлиқ эмаслигини кўрсатади.

Маълумки, мувозанат ҳолатда тизимнинг тажрибада кузатиладиган макроскопик катталиклари (масалан, температура, босим, зичлик ва бошқалар) ўзгармайди. Тажрибадан олинган бу катталикларни $\overline{L}_t$ га тенг деб қабул қилинади, бошқача айтганда, $\overline{L}_t$ макроскопик физикадаги катталиқнинг ўзидир.

Амалда динамик катталикларни вақт бўйича ўртачалаш мумкин эмас. Ҳақиқатан ҳам, динамик микроҳолатни ва, демак, динамик катталиқ $L(t)$ ни t моментда аниқлаш учун тизимни ташкил этган ҳамма зарраларининг ҳолатини билиш зарур. Ҳар бир зарра s эркинлик даражасига эга бўлса, N та заррадан иборат тизимнинг динамик микроҳолатини аниқлаш учун квант механикасида Ns та иккинчи даражали дифференциал тенгламалар тизимини, классик механикада $2Ns$ та биринчи тартибли каноник дифференциал тенгламалар тизимини ечиш зарур. Табiiйки, динамик микроҳолатни аниқ билиш (интеграл доимийларини аниқлаш) учун яна $2Ns$ та қўшимча (чегаравий, бошланғич) шартлар берилиши керак. Масалан, бирлик ҳажмдаги газда 10^{20} донa бир атомли зарра бўлсин. Классик механикада ҳар бир зарранинг ҳолатини аниқлаш учун учта иккинчи тартибли дифференциал тенглама (Ньютоннинг иккинчи қонунига асо-

сан ҳаракат тенгламалари) ёки олтита биринчи тартибли дифференциал тенглама (Гамильтон каноник тенгламалари) ечилиши зарур. Демак, бирлик ҳажмдаги газнинг динамик микроҳолатини аниқлаш учун $6 \cdot 10^{20}$ та биринчи тартибли дифференциал тенгламалар тизими

$$\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}; \quad \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad i = \overline{1, 3N} \quad (10)$$

ни ечиш зарур; бунда H — тизим гамильтониани; p_i, q_i — умумлашган импульслар ва умумлашган координаталар. Бундан ташқари, тизим зарраларининг ҳолатини аниқ билиш учун $6 \cdot 10^{20}$ та интеграл доимийларни аниқлаш зарур. Бунинг учун $6 \cdot 10^{20}$ та қўшимча (бошланғич, чегаравий) шартлар берилиши керак. Бундай катта сондаги тенгламалар тизимини секундига 10 млрд, ҳатто 100 млрд. операция бажарадиган ЭХМ ҳам удалай олмайди.

Агар тизим номувозанат ҳолатда бўлса, унга тегишли динамик катталикини ўртачалаш масаласи мураккаблашади.

Шундай қилиб, макроскопик параметрларни микрофизика (классик механика ёки квант механикаси) асосида аниқлашда боши берк кўчага кириб қолингандай. Аммо статистик физикада бу масалани ҳал этиш йўли топилди.

1.6-§. СТАТИСТИК МИКРОҲОЛАТ. СТАТИСТИК АНСАМБЛЬ

Статистик физикада статистик ансамбль тушунчаси киритилади (уни биринчи марта америкалик олим В. Гиббс киритган). Бу тушунчага биноан, тизим билан термодинамик жиҳатдан айнан бир хил бўлган, аммо динамик жиҳатдан (тизим зарраларининг ҳолатлари жиҳатдан) фарқли бўлган жуда кўп тизимлар тўплами (ансамбли) тасаввур этилади. Бу тизимлар биз қараётган реал тизимнинг копиялари (нусхалари) деб қаралади.

Гиббснинг бу фундаментал тушунчаси — статистик ансамбль ва унинг элементларини яққолроқ тушуниш учун қуйидаги оддий мисолларни қарайлик.

Маълум идиш ичида битта зарра ҳаракатда бўлсин. Ўзининг ҳаракати ва идиш девори билан тўқнашишлари тўфайли зарранинг динамик ҳолати вақт бўйича ўзгаради.

а) Фараз қилайлик, зарра идиш девори билан қайиш-қоқ (эластик) тўқнашсин, яъни энергия алмашилиши со-

дир бўлмасин. Бу ҳолда зарранинг импульси p ва координати q ўзгариши туфайли динамик микроҳолат ўзгаради, аммо зарранинг энергияси ўзгармайди. Бундай динамик микроҳолатлар тўпламига энергияси бир хил бўлган, вақт бўйича ўзгармайдиган, аммо ҳар хил қийматли тасодифий катталар p , q билан аниқланадиган статистик микроҳолатлар постулат сифатида мослаштирилади. Қаралаётган зарранинг копиялари (нусхалари) ана шу статистик микроҳолатларда турибди деб қаралади ва бу копиялар (нусхалар)ни *зарранинг статистик ансамбли* деб аталади.

Шундай қилиб, битта реал зарра ўрнида чексиз куп зарралар тасаввур этилиб, улар вақт бўйича доимий деб қаралади; статистик ансамбль элементлари — бу ҳар хил динамик микроҳолатлардаги зарранинг нусхалари. Энди бундай микроҳолатларни ва, демак, ансамбль элементларини тасодифий деб қаралиб, унинг содир бўлиш эҳтимолликларни ҳақидаги масалани ечиш лозим бўлади. Динамик микроҳолатлар тенг кучли (эквивалент) бўлгани ва уларнинг ҳар бирига постулат сифатида статистик микроҳолат мослаштирилгани туфайли бу статистик микроҳолат тенг кучли, яъни тенг эҳтимоллидир. Бу статистик микроҳолатларнинг энергияси қийматлари бир хил. Бир хил энергияли ҳолатларга бир хил эҳтимоллик мос келади.

Эркин зарра энергияси $E = p^2/2m$ доимий (ўзгармайди). Статистик физикада яккаланган (яъни энергияси ўзгармайдиган) тизимнинг микроҳолатлари тенг (текис) эҳтимолли деб, постулат сифатида қабул қилинади¹.

б) Зарра идиш девори билан тўқнашганда энергия алмашилиши содир бўлиши мумкин бўлсин. Бу ҳолда зарра идиш девори билан контактда бўлгани, идиш эса ташқи тизимлар билан контактда бўлгани сабабли, унинг энергияси $(0, \infty)$ оралиқда ўзгаради. Демак, микроҳолатлар зарра энергияси E нинг $(0, \infty)$ оралиқдаги қийматларига мос ёки p^2 нинг $(0, \infty)$ даги қийматларига мос равишда ўзгаради. Энергия E (ёки p ва q)ни тасодифий катталик деб қараб, ҳар бир динамик микроҳолатга статистик ансамбль элементи мослаштирилади.

¹ Динамик (механик) нуқтан назардан тенг кучли (эквивалент) ҳолатларга эга бўлган заррани статистик ансамбль билан алмаштиришда статистик физикадаги микроҳолатларнинг текис, тенг эҳтимоллиги ҳам ўз аксини топади.

Шундай қилиб, битта зарранинг вақт бўйича ўзгариши туфайли ҳосил бўлган динамик микроҳолатлар тўплами ўрнига шундай зарраларнинг вақт бўйича ўзгармайдиган статистик микроҳолатлари тўплами — статистик ансамбль мослаштирилади ва бундай ҳар бир заррани ва унга мос микроҳолатни тасодифий катталиқ деб қаралади. Қуйидаги асосий постулатни қабул қиламиз: *статистик микроҳолатлар тенг эҳтимолли*¹. Демак, статистик ансамбль элементлари ҳам тенг эҳтимолли. Бу постулат асосида статистик физиканинг асосини баён этишнинг, тақсимот функцияларини исбот қилишнинг янги имконияти туғилади.

Фараз қилайлик, идишдаги N та заррадан иборат газ идиш девори билан энергия алмаштириши мумкин бўлсин. Газ зарраларининг ҳаракатлари туфайли газнинг динамик микроҳолатлари вақт бўйича ўзгаради. Тизимнинг энергияси E умумий ҳолда $(0, \infty)$ оралиқда ўзгаради.

Умумий ҳолда ҳар хил энергияли динамик микроҳолатларнинг ҳар бирига, Гиббс ғоясига биноан, статистик микроҳолат мослаштирилади. Тизимнинг умумлашган координатлари $q_1, q_2, \dots, q_r, \dots$ ва умумлашган импульслари $p_1, p_2, \dots, p_r, \dots$ ни вақт бўйича ўзгармайдиган тасодифий катталиқлар билан алмаштирилади. Ҳар бир статистик микроҳолат шу тасодифий катталиқларнинг қийматлари орқали аниқланади.

Шундай қилиб, тизимнинг вақт ўзгариши туфайли содир бўладиган динамик микроҳолатларининг тўпламига шу тизимнинг вақт бўйича ўзгармайдиган микроҳолатлари тўплами — статистик микроҳолатлар тўплами, (таъриф бўйича) мослаштирилади. Статистик микроҳолатлардаги тизим нусхаларининг тўпламини *тизимнинг статистик ансамбли* дейилади.

Демак, мувозанатли статистик физикада (статистик ансамбль тушунчасига асосан) тизимнинг динамик микроҳолатлари тўпламига вақт бўйича ўзгармайдган қаралаётган динамик тизим нусхалари тўплами мослаштирилади. Бу мослаштиришнинг фундаментал аҳамияти шундаки, динамик катталиқ қийматлари тўплами статистик ансамбль тушунчаси асосида тасодифий катталиқ қийматлари тўплами би-

¹ Ҳозиргача статистик физикада бундай постулат фақат яккаланган тизим учун уринли деб қабул қилинган эди.

лан алмаштирилади. Статистик физикада ҳар иккала қийматлар тўпламлари, бир-бирига айнан тенг деб қабул қилинади. Бу тенглик эса эргodik теореманинг маъносини ташкил этади.

1.7-§. МИКРОҲОЛАТЛАР БЎЙИЧА ЎРТАЧАЛАШ

Фараз қилайлик, L тасодифий катталиқ

$$L_1, L_2, \dots, L_r, \dots \quad (11)$$

қийматларни қабул қилиши мумкин бўлсин. Агар N марта тажриба ўтказилганда L тасодифий катталиқнинг (11) қийматлари мос равишда

$$n_1, n_2, \dots, n_r, \dots$$

мартга келиб чиққан бўлса, ўртача қиймат

$$\bar{L}_N = \frac{1}{N}(n_1 L_1 + n_2 L_2 + \dots + n_r L_r + \dots) = \frac{1}{N} \sum_i n_i L_i, \quad \sum_i n_i = N \quad (12)$$

тенглик асосида топилади; бунда n_i катталиқ L нинг L_i қиймати келиб чиқиши сони.

$$W_i = \frac{n_i}{N}, \quad i = 1, 2, 3, \dots \quad (13)$$

белгилашни киритиб (12)ни

$$\bar{L}_N = \sum_i W_i L_i \quad (14)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Ҳар бир ўлчаш Δt вақт давом этган бўлса, $n_i = \Delta t_i / \Delta t$ каби ёзиш мумкин. Бу ҳолда (13) нисбатни

$$W_i = \frac{\Delta t_i}{t}, \quad t = N \Delta t \rightarrow \infty \quad (15)$$

кўринишда ёзиш мумкин. $W_i = n_i / N$ нисбат ноль билан бир орасида ўзгаради. $N \rightarrow \infty$ бўлганда, агар $W_i = n_i / N$ нисбат аниқ бир қийматга (лимитга) интилса, уни L тасодифий катталиқнинг L_i қиймат қабул қилиши эҳтимоли деб қабул қилинади¹.

Бу ҳолда, (13) ёки (15) га асосан, агар тасодифий катталиқ L нинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари

¹ Эҳтимоллик ва унга тегишли баъзи тушунчалар эҳтимоллар II бобда келтирилади.

$L_1, L_2, \dots, L_r, \dots$ нинг эҳтимолликлари $W_1, W_2, \dots, W_r, \dots$ берилган бўлса, уларни мос равишда купайтириб, сўнг йиғиб ўртача қийматни (моментни) (14) тенглик асосида топилади. Шундай қилиб, статистик физикадаги асосий масаланинг ечилиши эҳтимоллар тақсимооти $W_1, W_2, \dots, W_r, \dots$ нинг берилишига боғлиқ бўлиб қолди.

Агар тасодифий катталиқ L узлуксиз ўзгарса, у ҳолда L катталиқнинг $L, L + dL$ оралиқда бўлиш эҳтимоллигини $dW(L)$ билан белгиласак, (14) ифода ўрнига қуйидагини ёзилади:

$$\bar{L}_N = \int_{(L)} L dW(L) \quad (16)$$

ёки

$$dW(L) = \frac{\partial W(L)}{\partial L} dL = f(L) dL,$$

тенгликдан фойдалансак:

$$\bar{L}_N = \int_{(L)} L f(L) dL, \quad (17)$$

бунда

$$f(L) = \frac{\partial W(L)}{\partial L} \quad (18)$$

эҳтимоллиқлар зичлиги. Физикада (18)ни эҳтимоллиқлар тақсимот функцияси дейилади. Демак, бу ҳолда ўртача арифметик қиймат $\bar{L}_N$ ни топиш учун эҳтимоллар зичлиги $f(L)$ ни билиш зарур.

Эҳтимоллиқлар учун қуйидаги нормалаш шартини ўринли: узлукли (дискрет) ҳол учун:

$$\sum_i W_i = 1, \quad (19)$$

узлуксиз ҳол учун:

$$\bar{L}_N = \int_{(L)} dW(L) = \int_{(L)} f(L) dL = 1. \quad (20)$$

Эргодик теорема: вақт бўйича олинган ўртача $\bar{L}$, билан тасодифий қийматлар тўплами бўйича олинган ўртача ўзаро тенг, яъни

$$\bar{L}_t = \bar{L}_N. \quad (21)$$

Демак, макроскопик параметрни аниқлаш учун эҳтимоллиқлар тақсимооти $W_1, W_2, \dots, W_r, \dots$ ёки эҳтимоллиқлар

зичилиги $f(L)$ ни аниқлаш — статистик физиканинг марказий масаласи эканлиги аён бўлади. Эргодик теоремага асосан вақт бўйича ўртачалаш микроҳолатлар бўйича ўртачалаш билан алмаштирилади. Номувозанат ҳолатни бу теорема асосида қарашда жиддий қийинчиликка дуч келишади, чунки макроскопик параметрлар (бундай тушунчаларни киритиш мумкин бўлган ҳолларда) вақтга боғлиқ. Шу сабабли вақтга боғлиқ микроҳолатлар ва, демак, вақтга боғлиқ тасодифий катталиклар киритилади; сунгра уларнинг қийматларининг эҳтимоллари асосида аниқланган ўртача қийматни тажрибадан олинган физик катталikka айнан тенглаштирилади.

1.8-§. МИКРОҲОЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ЭХТИМОЛЛИКЛАРИ

Статистик ансамбль назарияси ва тақсимот функцияларини қатъий асослаш ҳозиргача ечилмаган муаммодир (қ. масалан, [5] 27-бет). Бунинг асосий сабабларидан бири, бизнингча, динамик ва статистик микроҳолатлар, статистик ансамбл ва унинг элементлари ва микроҳолатлар бора-сидаги тушунчаларни талқин этишда ноаниқликлар борлиги туфайлидир. Биз қуйида шу тушунчаларга тўхталамиз.

Мувозанатдаги тизимнинг динамик микроҳолатлари шарт-шароит ўзгармаганда тенг кучли ҳолатларнинг бири иккинчисидан афзаллиги ёки камчилиги йўқ деб айтган эдик. Динамик ҳолатлар динамик тенгламалар асосида аниқланади, бу тенгламалар эса вақт алмашинишига нисбатан инвариантдир, шунинг учун ҳатто улар қайтувчан эканлигини ҳам айтган эдик. Ана шу динамик микроҳолатларга таъриф асосида мослаштирилган статистик микроҳолатлар тенг эҳтимолли ёки узлуксиз ҳолда текис тақсимотга эга. Ҳозирда фақат яққаланган тизимнинг микроҳолатларини тенг эҳтимолли ёки текис тақсимотга эга деб, асосий постулат сифатида қабул қилинади. Биз эса постулат сифатида мувозанатдаги тизимларнинг статистик микроҳолатлари тенг эҳтимолли ёки текис тақсимланган деб қабул қиламиз. Бу асосий постулатга асосан, статистик ансамбль элементларининг эҳтимоллари ҳам тенг эҳтимолли ёки текис тақсимланган. Бошқача айтганда, ўз маъноларига кўра, динамик микроҳолатлар тўплами статистик микроҳолатар тўплами ва статистик ансамбль элементлари тўплами эквивалент тўпламлардир.

Биз юқорида L физик катталикининг қабул қилиши мумкин бўлган L_i қийматлари ва уларнинг W_i эҳтимоллари ($i = 1, 2, \dots$) умумий ҳолда ҳар хил дедик. N марта тажрибалар ўтказилганда L_i қиймат n_i марта келиб чиқади, асб фараз этилди.

Ана шу L_i қийматга мос тизимнинг i -микроҳолати мавжуд дейилса, бундай микроҳолатлар эҳтимолликлари, табиийки умумий ҳолда ҳар хил бўлиши лозим. Асосий постулатга асосан, статистик микроҳолатнинг эҳтимоллиги $1/N$ билан аниқланади. Аммо N марта ўлчанганда n_i марта статистик микроҳолатнинг келиб чиқиши L_i қийматнинг эҳтимоллигини аниқлайди, яъни L_i нинг келиб чиқиш эҳтимолли $W_i = n_i/N$ нисбатни аниқлайди. Биз тизимнинг L_i га мос W_i эҳтимолли микроҳолати тушунчасини киритамиз. Умумий ҳолда $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$ лар ҳар хил бўлгани учун микроҳолатлар ҳам ҳар хил бўлади. i -микроҳолатнинг эҳтимоллиги $W_i = n_i(1/N)$ — бу эҳтимолликларни қўшиш теоремасига асосан, n_i та статистик микроҳолатдан ихтиёрий бирортасининг келиб чиқиш эҳтимоллигидир. Асосий постулатга асосан статистик микроҳолатнинг эҳтимоллиги $(1/N)$ га тенг. Шундан кўринадики, микроҳолатлардаги статистик микроҳолатлар сони n_i микроҳолатни аниқлашда жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Бу n_i ни i -микроҳолатнинг **термодинамик эҳтимоллиги** дейилади. Бу ерда шуни таъкидлаймизки, тажрибалар сони ёки кузатишлар сони N , дискрет ҳол бўлганда, статистик ҳолатлар сони яъни ансамбль элементлари сони N_i га қаррали бўлиши талаб этилади. Акс ҳолда қаралаётган тизимнинг микроҳолатлари тўплами қаралаётган тизимнинг макроҳолатини тавсифлаб беролмай қолади. Демак,

$$N = kN_A$$

шарт бажарилиши талаб этилади. Бунда $k = 1, 2, 3, \dots$; N_A — статистик микроҳолатлар (ансамбль элементлари) сони.

Энди шу $L_1, L_2, \dots, L_i, \dots$ қийматлар эҳтимолларига мослаштирилган микроҳолатлар эҳтимолликлари $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$ тақсимотини аниқлайлик.

1.9-§. МИКРОҲОЛАТЛАР ЭҲТИМОЛЛИКЛАРИ ТАҚСИМОТИ

Ҳозирги замон статистик физикасида ташқи тизимлар билан иссиқлик (энергия) контактида бўлган тизимнинг

микроҳолатларидаги энергия қийматлари Гиббснинг каноник тақсимооти билан тавсифланади. Аммо буни асослаш учун мавжуд усулларда яққалган тизимнинг микроҳолатларининг тенг тақсимланиши ёки текис тақсимланиши ҳақидаги асосий постулатдан ташқари бир қанча шартлар ҳам бажарилиши талаб этилади. Шу сабабли, машҳур олим Р. Кубо статистик физиканинг асосланишида кўпгина ноаниқликлар мавжуд деганда, Д.Н. Зубарев эса ансамбль назариясини яратиш ҳамда эҳтимолликлар тақсимооти функциясини асослаш мураккаб муаммо бўлиб, ҳатто бу муаммони қандай даражада ҳал қилиш мумкинлиги ҳам ноаниқ эканлигини айтганда тўла ҳақлидирлар. Чунки бугунда ансамбллар назариясининг ҳамда тақсимоот функцияларининг асосланишини назарий-мантиқий жиҳатдан мукамал деб бўлмайди. Шу сабабли ҳам статистик физиканинг асосларини баён этишда бир қатор муаммолар мавжуддир.


Энди юқорида келтирилган асосий тушунчаларга таяниб, шу муаммолар устида тўхталамиз.

Ташқи муҳит билан энергетик контактда бўлган тизимнинг статистик микроҳолатлари ва уларга мос энергияси (бу тасодикий катталиқ)нинг қийматлари эҳтимолликлари асосий постулатга асосан узлуксиз ҳолда текис тақсимланган ёки дискрет ҳолда тенг эҳтимолли бўлади. Энергиянинг қийматларини

$$E_1 \leq E_2 \leq \dots \leq E_{i-1} \leq E_i \leq \dots$$

тартибда белгилайлик; бунда энергиянинг қиймати E_i га тенг бўлишлиги, шу вақтнинг ўзига унинг E_1, E_2 га, ... E_i ... қийматларга тенг эмаслигини тақозо этади. Энергиянинг бундай қийматлари эҳтимолликлари текис тақсимланган (тенг эҳтимолли) бўлмай, улар (O, E) энергия оралиғи узунлигининг қийматлари эҳтимолликлари билан аниқланади. Юқоридаги L нинг қийматлари (11) ни оралиқ узунлигининг қийматлари деб тушуниш керак. Статистик физика асосини баён этишга аниқлик киритиладиган бундай муҳим фикрни ҳар доим назарда тутмоқ лозим.

Энергиянинг қийматлари узлуксиз бўлсин. Бу ҳолда энергия қиймати (O, E) оралиқда бўлмасин; $E, E + dE$ да бўлиши эҳтимоли, яъни "вектор" E нинг қиймати $E, E + dE$ да бўлиш эҳтимоли $dW(E)$ ни аниқлайлик. Бу $dW(E)$ мураккаб воқеа эҳтимолидир: E "Вектор"нинг учи $E, E + dE$ да бўлиш



1.2-расм.

эҳтимоли текис тақсимланиши ҳақидаги постулатга асосан E , $E + dE$ оралиқдаги статистик микроҳолатлар сони $dn(E)$ га мутаносиб. Энергия қийматининг $(0, E)$ оралиқда бўлмаслик эҳтимолини $P(E)$ билан бел-

гиласак, изланаётган эҳтимолликни

$$dW(E) = \frac{1}{Z} P(E) dn(E) \quad (22)$$

қуринишда ёзиш мумкин. Бунда Z — нормалаш шартидан топилади.

$P(E)$ ни аниқлайлик. Бунинг учун $(0, E)$ ни dE оралиқлар йигиндисидан иборат деб қарайлик (1.2-расм).

Асосий постулатга биноан, $(0, E)$ оралиқда энергия қийматининг бўлиш эҳтимоли E га мутаносиб ёки βE га тенг. dE оралиқдаги статистик микроҳолатда бўлиш эҳтимоллиги эса dE га мутаносиб ёки βdE га тенг ("масштаб" параметри β аниқланиши лозим). dE даги шу статистик микроҳолатларда E нинг қиймати булмаслиги эҳтимоли эса

$$(1 - \beta dE) \quad (23)$$

билан аниқланади. Агар $(0, E)$ оралиқни n та тенг dE ларга бўлсак, бу оралиқлардан барчасида E нинг қиймати булмаслиги (яъни улардаги статистик микроҳолатларда булмаслиги бир-бирига боғлиқ булмаган n та воқеанинг бир вақтда содир бўлиши) шу (23) эҳтимоллар кўпайтмасига тенг, яъни:

$$P(E) = (1 - \beta dE)^n$$

$E = ndE$ да n ни чексизликка интилтириб, энергия қийматининг $(0, E)$ оралиқдаги статистик микроҳолатларда булмаслик эҳтимоли $P(E)$ ни топамиз:

$$P(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\beta E}{n}\right)^n = e^{-\beta E}. \quad (25)$$

Бу ерда шуни яна таъкидлаймизки, статистик микроҳолатлар ва статистик ансамбль элементлари (тизим нусхалари) бир-бирига боғлиқ эмас.

Демак, изланаётган энергия қийматлари эҳтимолликлар тақсимооти

$$dW(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} d\eta(E) \quad (26)$$

ифода билан аниқланади. Бунда

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} \quad (27)$$

бир микроҳолатга туғри келган эҳтимолликлар зичлиги. Шунинг учун дискрет қийматлар бўлган ҳолда

$$W_i = f(E_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i} \quad (28)$$

ифода ёзилади. Буларда номаълум параметр Z ни нормалаш шarti

$$\int_E dW(E) = \frac{1}{Z} \int_0^\infty e^{-\beta E} d\eta(E) = 1$$

ёки

$$\sum_i W_i = \frac{1}{Z} \sum_i e^{-\beta E_i} = 1$$

ифодалардан

$$Z = \int_0^\infty e^{-\beta E} d\eta(E) \quad (29)$$

ёки

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (30)$$

эканлигини аниқлаймиз. Бу ерда йиғинди (ёки интеграл) микроҳолатлар сони билан аниқланади. Z — статистик интеграл (йиғинди) дейилади.

Текис тақсимотга мисол келтирайлик.

Мисол. Ядро емирилиши. Ҳар бир радиоактив ядро вақт бўйича емирилиши эҳтимоллиги *a priori* текис (тенг) тақсимот деб қабул қилинади. Бу ҳолда ядронинг $(0, t)$ вақтда емирилмасдан dt вақтда емирилиши мураккаб воқеадир: бу воқеанинг эҳтимоллиги $dW(t)$ вақт dt да ядронинг емирилиш эҳтимоли, текис тақсимотга асосан, dt ёки λdt билан ҳамда $(0, t)$ вақт оралиғида емирилмаслик эҳтимоли $P(t)$ билан аниқланади, яъни

$$dW(t) = P(t)\lambda dt. \quad (1)$$

ёки

$$\frac{\ln M}{N} = -\sum_i \frac{n_i}{N} \ln W_i = -\sum_i W_i \ln W_i \geq 0. \quad (36)$$

(36) ифода ҳар бир статистик элементга тугри келган уртача статистик катталиқдир. $M = e^{+J}$ белгилашни киритайлик ($J \geq 0$). Бу ҳолда

$$J = \ln M = -\sum_i n_i \ln W_i \quad (37)$$

$J \geq 0$ — информация миқдори дейилади. Ҳар бир элементга тугри келган уртача информацияни аниқлаш учун J ни N га бўлиб, Гиббснинг энтропия ифодаси — Шеннон формуласини оламиз:

$$S = J / N = -\sum_i \frac{n_i}{N} \ln W_i = -\sum_i W_i \ln W_i \quad (38)$$

ёки

$$S = -\sum_i W_i \ln W_i = \sum_i W_i \ln(1 / W_i) = \sum_i s_i W_i, \quad (39)$$

бунда

$$s_i = \ln(1 / W_i) \quad (40)$$

ифода **микроҳолатнинг энтропияси** деб аталади. Умумий қоидага кура:


$$S = \langle s \rangle \quad (41)$$

тизимнинг энтропияси (информация назариясида **информацион энтропия**) дейилади. (39) ифодада $\sum_i W_i \ln W_i$ даги ҳар бир ҳад — $W_i \ln W_i \geq 0$ бўлгани учун энтропия $S > 0$ бўлади (1.3-расм). Микроҳолат энтропияси $s_i = \ln(1 / W_i)$ микроҳолат эҳтимоллиги W_i ортиши билан монотон камайиб боровчи катталиқдир (1.3-расм).

s_i нинг ҳолатлар бўйича уртачаси термодинамикадаги $S \geq 0$ энтропиядан иборат. Яккаланган тизим учун энергия ўзгармайди ва микроҳолатлар эҳтимолликлари ҳам ўзаро тенг бўлади. Бу ҳолда $S = s$ тенглик ўринли бўлади.

Фараз қилайлик, микроҳолат эҳтимоллиги $W = 1$, яъни микроҳолат битта бўлсин. Бу ҳолда $S = s = 0$ тенглик ўринли бўлади, яъни тизимнинг энтропияси нолга тенг бўлади.

Микроҳолат битта бўлганда, юқорида айтилганларга кура, динамик микроҳолат ҳам битта бўлади; у тизимдаги зарралар ҳаракати бир-бирига нисбатан содир бўлмайди (тизим тўлалигича ҳаракатланиши мумкин, лекин бу ҳаракат механик ҳаракат бўлиб, статистик физика бундай ҳаракатларни тадқиқ қилмайди). Акс ҳолда зарралар ҳаракати тўфайли динамик микроҳолатлар ва, демак, статистик ансамбль элементлари ва бундан эса микроҳолат ташкил топган бўлур эди. Зарраларни ҳаракатда бўлмаган тизимнинг ҳолати (асосий ҳолатдаги ҳаракати бундан мустасно) бу тўла тартиблилик ҳолатидир. Демак, *тўла тартиблилик ҳолатида тизим энтропияси S нолга тенг*. Бу ифода *Пернст теоремаси дейилади*. Бир-бирига нисбатан зарралар ҳаракати юзага келса, тизимнинг температураси T нолдан фарқли бўлади ва тўла тартиблилик бузилади, тартибсизлик (хаотизация) юзага келади. Бу ҳолда $W < 1$ бўлади ва, демак, $S = \ln 1/W$ ортади (W камайиши билан), учуман тизим энтропияси S ҳам ортади (1.3-расм). Бошқача айтганда, тизимнинг энтропияси S (шунингдек микроҳолат энтропияси s , ҳам) тартибсизлик даражасини тавсифлайдиган катталиқдир.



1.3-расм.

Агар яккаланган тизимда тартиблиликлар (масалан, оқимлар ва бошқалар) бўлса, маълум вақт ўтиши билан тартибсизликларга ўтадилар ва тизимда термодинамик мувозанат ҳосил бўлади; бошқача айтганда, энг юқори даражадаги тартибсизлик ҳолати юзага келади; бу ҳолда унинг энтропияси энг катта (максимал) қийматни қабул қилади.

Энтропия S ифодаси (39) дан кўринадики, унинг ҳар бир ҳади $W \ln 1/W$ максимум қийматдан ўтади. $W \ln 1/W$ ҳаднинг максимум қийматини топиш учун ундан ҳосила олиб, нолга тенглаштирилади, яъни $\partial (W \ln 1/W) / \partial W = 0$ дан $W_{\max} = e^{-1} \approx 0,37$ ни топамиз. Демак, $(W \ln 1/W)_{\max} = 0,37$ (1.3-расм).

1.11.8 ЭНТРОПИЯНИНГ ХОССАЛАРИ

Энтропия S учун Шеннон (Гиббс) формуласи

$$S = - \sum_i p_i \ln p_i = - \sum_i \frac{n_i}{N} \ln \frac{n_i}{N},$$

бунда микроскопик ҳолат энтропияси

$$s_i = \ln 1 / W_i.$$

Тизимнинг энтропияси S қуйидаги хоссаларга эга:

1. Энтропия S манфий бўлмаган ҳақиқий катталиқ. Энтропия ифодаси (39) да $W_i \geq 0$ ва $S_i \geq 0$ бўлгани учун энтропия S нинг манфий эмаслиги, яъни $S \geq 0$ эканлиги келиб чиқади.

2. Агар тизимнинг микроҳолатлари тенг эҳтимолли (те-кис тақсимланган) бўлса, яъни

$$W_1 = W_2 = \dots = W_i = \dots = W$$

бўлса, унинг энтропияси $S(W)$ максимум қиймат қабул қилади.

Микроҳолат эҳтимоллиги $W_i = n_i/N$ ни эътиборга олиб, информация ифодасини

$$J = - \sum_i n_i \ln W_i = N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i \quad (42)$$

кўринишда ёзайлик; бунда $\sum_i n_i = N = kN_A$; N_A — статистик микроҳолатлар (статистик ансамбль элементлари) сони; $k = 1, 2, 3, \dots$

а) Микроҳолатлар тенг эҳтимолли ҳолда $n_i = 1$ бўлади (статистик микроҳолатлар тенг эҳтимолли). Бу ҳолда информация $J(W)$, $n_i = 1$ эканлигидан $\ln n_i = 0$ бўлгани учун,

$$J(W) = N \ln N \quad (43)$$

ифода билан аниқланади, энтропия $S(W)$ эса

$$S(W) = \ln N \quad (44)$$

бўлади.

б) Тенг эҳтимолли бўлмаган барча ихтиёрий ҳолларда $n_i > 1$ бўлгани учун $\ln n_i > 0$ бўлади ва, демак, (42) да йи-гиндининг ҳар бир ҳади $n_i \ln n_i > 0$ бўлгани учун бу ҳолдаги информация

$$J(W_1, W_2, \dots, W_i, \dots) = J(W) < J(W) \quad (45)$$

булади. (43) ва (44) ифодалардан, $S = J/N$ ни назарда ту-
 ҳисиб, таърифи (43) ва (44) асосида энтропиянинг таърифи
 қуйидагича бўлади, яъни:

3. Тизимнинг қисмлари бир-бирига боғлиқ бўлмаса, улар-
 нинг энтропиялари йиғиндиси тизим энтропиясига тенг,
 яъни энтропия аддитив катталиқ. Тизим икки қисмдан иборат
 бўлсин. Бирининг микроҳолатлари $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$ билан,
 иккинчисининг микроҳолатлари $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$ билан аниқ-
 ланган бўлсин. Умумий ҳолда бу икки микроҳолатлар тўплам-
 лари бир-бирига боғлиқ бўлиши мумкин, яъни i микроҳо-
 латнинг келиб чиқиши эҳтимоллиги W_i ва $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$
 микроҳолатлар берилганда j микроҳолатнинг келиб чиқи-
 ши эҳтимоллиги $P_j(W)$ биргаликда

$$W_i P_j(W)$$

эҳтимолликлар кўпайтмаси билан аниқланади: $P_j(W)$ ни
шартли эҳтимоллик деб аталади (қ. II боб). Бундай тизим-
 нинг энтропияси $S(W, P)$ ни

$$\begin{aligned} S(W, P) &= - \sum_i \sum_j W_i P_j(W) \ln(W_i P_j(W)) = \\ &= - \sum_i \sum_j W_i P_j(W) [\ln W_i + \ln P_j(W)] = \\ &= - \sum_i W_i \ln W_i \sum_j P_j(W) - \sum_i W_i \sum_j P_j(W) \ln P_j(W) = \\ &= - \sum_i W_i \ln W_i - \sum_j P_j(W) \ln P_j(W) = S(W) + S_w(P) \end{aligned}$$

кўринишда ёзиш мумкин. Демак,

$$S(W, P) = S_w(P) + S(W) \quad (47)$$

$S(W)$ — $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$ эҳтимолликлар микроҳолатларга
 эга бўлган тизим қисмининг энтропияси; $S_w(P)$ — бирин-
 чи қисм микроҳолатлари берилганда $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$ эҳтимол-
 ликлари микроҳолатларга эга қисмининг энтропияси. $S_w(P)$
 ни шартли энтропия дейилади: (47) ни олишда нормалаш
 шартлари

$$\sum_i W_i = 1, \quad \sum_j P_j(W) = 1$$

назарда тутилди. Агар тизимнинг қисмлари бир-бирига боғлиқ бўлмаса, уларнинг микроҳолатлари ҳам бир-бирига боғлиқ бўлмайди ва, демак,

$$P_i(W) = P_i \quad (48)$$

бўлади. (48) ни эътиборга олсак,

$$S_{\text{м}}(P) = S(P) \quad (49)$$

тенглик уринли бўлади. Бу ҳолда (47) ифода

$$S(W, P) = S(W) + S(P) \quad (50)$$

аддитив кўринишни олади.


Тизим бирор таъсир ёки таъсирлар сабабли номувозанат ҳолатга келган бўлса, бу таъсирлар тўхтаганда (олинганда) тизим мувозанат ҳолатга келади, бунда тизимнинг энтропияси S ортиб боради, яъни $dS > 0$ бўлади. Бу масалани адабиётда ҳар хил усуллар билан ечишга интилинган.

Бир-бирига нисбатан зарралар ҳаракати бўлмаганда янги динамик микроҳолат содир бўлмайди ва, демак, битта статистик микроҳолат бўлганлиги учун микроҳолат муқаррар воқеа бўлади; унинг эҳтимоли $W = 1$ бўлиб, энтропияси эса $S = 0$ бўлишини биз юқорида айтдик.

Энди жараёнлар туфайли энтропиянинг ортишига батафсилроқ тўхтаймиз. Энтропия ифодаси:

$$S = \sum_i s_i W_i = \sum_i s_i \quad (51)$$

дан кўринадик, энтропиянинг ҳар бир ҳади $W_i S_i$ (бу катталикларни расмда кўрсатиш мақсадида узлуксиз ўзгаради, деб қараймиз) нинг ортиши билан чизиқли монотон ортадиган W_i ва логарифмик монотон камаядиган $S_i = \ln 1/W_i$ кўпайтувчилардан иборат (1.4-расм). Бошқача айтганда, энтропия S нинг ҳар бир ҳади $W_i S_i = W_i / W_i$ максимумдан ўтади. Максимумга




1.4-расм.

$$\frac{\partial}{\partial W} (W \ln W) = \ln W_m + 1 = 0$$

шартдан W нинг $W = 1/e \approx 0,37$ қийматида эришилади (1.5-расм).

Таҳлил қилиш осон бўлиши учун микроҳолатлар сони 2 та, уларнинг эҳтимолликлари мос равишда W_1, W_2 га тенг бўлсин. Нормалаш шarti $W_1 + W_2 = 1$ да $W_1 = W, W_2 = 1 - W$ белгилашни киритиб, бундай тизимнинг энтропиясини



1.5-расм.


$$S = -W \ln W - (1 - W) \ln(1 - W) = s_1 + s_2 \quad (52)$$

қуринишда ёзамиз. 1.6-расмда қўринадики, 2 та микроҳолатли тизимнинг энтропияси S максимум қийматдан утади. Бошқача айтганда, W нинг маълум оралигида W ортиши билан S ортиб боради. Шунингдек, W нинг бошқа муайян оралиқда камайиши билан ҳам S ортиб боради (1.6-расмга қаранг). Ҳар икки ҳолни тушунтирайлик. Умумий ҳолда $W_1, W_2, \dots, W_i, \dots$ микроҳолатлар мавжуд. Фараз қилайлик $W_1 = 1$ яъни тизим битта микроҳолатда муқаррар бўлсин. Бу ҳолда $S = 0$ бўлади. Бу ҳолни биз юқорида таҳлил қилган эдик ва унинг Нернст теоремасидан иборат эканлигини айтган эдик. Фараз қилайлик, $W_1 = 0$ бўлсин (аниқроғи $W_1 \rightarrow 0$, яъни эҳтимоллиги жуда кичик бўлган микроҳолат бўлсин). Бу ҳолда тизимнинг энтропияси $S \rightarrow 0$ бўлади. Демак, тизим микроҳолати эҳтимолликларининг ўзгариши (яъни микроҳолатларнинг сони ва эркинлик даражалари сонлари ўзгариши) сабабли унинг энтропияси S максимум қийматдан утади (1.6-расм). $W_1 \rightarrow 0$ бўлганда, $S \rightarrow 0$ бўлишини таҳлил этайлик.

Дискрет ҳол. Квазистатик (мувозанатдаги) жараёنни қурайлик:

$$S = -\sum_i W_i \ln W_i = \sum_i s_i W_i$$

бунда $W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}$, демак $s_i = \ln 1/W_i = +\beta E_i + \ln Z$, W_i — ортувчи функция, s_i — камаювчи функция. Микроҳолат




1.6-расм.

эҳтимоллиги W нинг ортиши билан унинг энтропияси камаяди ва, демак, шу микроҳолат энергияси E ҳам камаяди. Бошқача айтганда тизим юқори энергияли, лекин кичик эҳтимолли микроҳолатда бўлса, у кичик энергияли, лекин катта эҳтимолли микроҳолатга ўтади. Бунда тизимнинг энтропияси S ўз ифодасидаги W нинг ортиши

ҳисобига ортади. Тизимнинг бу микроҳолатларида ажралган энергия эҳтимоллиги катта бўлган микроҳолатларнинг энергиясини оширишга ва хаотизация даражасининг кучайишига сарф бўлади. Шундай қилиб, микроҳолатлар эҳтимолликлари ортиши ва камайиши билан боғлиқ икки хил рақобатлашадиган жараёнлар содир бўлиши мумкин. Ҳар иккала жараёнда ҳам тизимнинг энтропияси ортади ва максимум қиймат қабул қилишга интилади. Эҳтимоли кичик микроҳолатлардан эҳтимоли катта микроҳолатларга ўтиш, механикадаги тизимнинг катта энергияли беқарор ҳолатдан кичик энергияли барқарор (турғун) ҳолатга ўтишига мос келади. (1.7-расмда энтропия S нинг чап қисмида унинг ортиб бориши). Тизимда катта эҳтимолли микроҳолатлардан кичик эҳтимолли микроҳолатларга ўтишлар эса статистик физикадаги тартиб даражаси юқори ҳолатдан тартиб даражаси паст бўлган ҳолатга ўтишлар, яъни тартибсизлик даражаси катта бўлган ҳолга ўтишлар (тартиблиликдан тартибсизликка ўтиш хаотикланиш) мос келади (1.7-расмда энтропия S нинг ўнг қисмидаги ортиб бориши). Тизимда бундай рақобатлашадиган ўтишларнинг тенглашуви микроҳолатларнинг $W_{\text{м}}$ қийматида содир бўлади (1.7-расмда энтропия S максимумга эришади ва битта қиймат $S_{\text{мак}}$ ни қабул қилади), бу эса термодинамик мувозанат ҳолатдир.

Мисол учун яккаланган тизим узининг мувозанат ҳолатидан бирор сабабга кура (масалан, флуктуация туфайли) номувозанат ҳолатига ўтган бўлсин. Бу ҳолда эҳтимолликлари кичик, энергиялари катта бўлган микроҳолатларга




1.7-расм.

утишни ҳамда эҳтимоллиги катта, лекин хаотикланиш даражаси кичик (тартиблилик даражаси юқори) ва энергияси кичик ҳолатларга утишларни тушунмоқ лозим. Бу икки хил утишларга 1.7-расмда эҳтимоллик W нинг икки W_1 ва W_2 қийматлари тўғри келади; уларга эса энтропиянинг битта S қиймати мос келади (1.7-расм).

Умуман тизимнинг икки ҳолатига энтропиянинг бир қиймати мос келиши, яъни энтропия ҳолат эҳтимоллигининг бир қийматли функцияси бўлмай, икки қийматли функцияси эканлигини кўрсатади. Бу эса статистик физикадаги қабул қилинган энтропия ҳолатнинг бир қийматли функцияси дейилган тезисга аниқлик киритилишини тақозо этади.

М и с о л. Хонага қиздирилган жисм киритилди. Уй ҳавоси ва жисмни яккаланган тизим деб ҳисоблаб, ундаги жараёнларни таҳлил этайлик. Иссиқлик ютилиши ҳисобига ҳавода хаотиклашиш кучаяди, бунда микроҳолатлар сони ортиши мумкин; уларнинг эҳтимолликлари камаяди, аммо микроҳолат энтропияси S_i ортади ва умуман тизим ҳавоси қисмининг энтропияси S ортади (1.7-расм, унг қанот).

Тизимнинг бир қисми бўйича жисм юқори энергетик сатҳдан қуйи энергетик сатҳларга ўтади, микроҳолатларнинг эҳтимолликлари ортади; S_i камайса-да W_i нинг ортиши ҳисобига, умумий энтропия S ортади (1.7-расм, чап қанот). Умуман айтганда, тизимнинг (уй ҳавоси ва қизиган жисм) энтропияси $S = \sum W_i S_i$ ортади [1.7-расмда ҳар иккала




1.6-расм.

эҳтимоллиги W нинг ортиши билан унинг энтропияси камаяди ва, демак, шу микроҳолат энергияси E ҳам камаяди. Бошқача аниқланиб, тизим юқори энергияли, лекин кичик эҳтимолли микроҳолатда бўлса, у кичик энергияли, лекин катта эҳтимолли микроҳолатга ўтади. Бунда тизимнинг энтропияси S ўз ифодасидаги W нинг ортиши

ҳисобига ортади. Тизимнинг бу микроҳолатларида ажралган энергия эҳтимоллиги катта бўлган микроҳолатларнинг энергиясини оширишга ва хаотизация даражасининг кучайишига сарф бўлади. Шундай қилиб, микроҳолатлар эҳтимолликлари ортиши ва камайиши билан боғлиқ икки хил рақобатлашадиган жараёнлар содир бўлиши мумкин. Ҳар иккала жараёнда ҳам тизимнинг энтропияси ортади ва максимум қиймат қабул қилишга интилади. Эҳтимоли кичик микроҳолатлардан эҳтимоли катта микроҳолатларга ўтиш, механикадаги тизимнинг катта энергияли беқарор ҳолатдан кичик энергияли барқарор (турғун) ҳолатга ўтишига мисал келади. (1.7-расмда энтропия S нинг чап қисмида унинг ортиб бориши). Тизимда катта эҳтимолли микроҳолатлардан кичик эҳтимолли микроҳолатларга ўтишлар эса статистик физикадаги тартиб даражаси юқори ҳолатдан тартиб даражаси паст бўлган ҳолатга ўтишлар, яъни тартибсизлик даражаси катта бўлган ҳолатга ўтишлар (тартиблиликдан тартибсизликка ўтиш хаотикланиш) мисал келади (1.7-расмда энтропия S нинг ўнг қисмидаги ортиб бориши). Тизимда бундай рақобатлашадиган ўтишларнинг тенглашуви микроҳолатларнинг W қийматида содир бўлади (1.7-расмда энтропия S максимумга эришади ва битта қиймат $S_{\max}$ ни қабул қилади), бу эса термодинамик мувозанат ҳолатдир.

Мисол учун яккаланган тизим узининг мувозанат ҳолатидан бирор сабабга кура (масалан, флуктуация туфайли) номувозанат ҳолатига ўтган бўлсин. Бу ҳолда эҳтимолликлар кичик, энергиялари катта бўлган микроҳолатларга



1.7-расм.

утишни ҳамда эҳтимоллиги катта, лекин хаотикланиш даражаси кичик (тартиблилик даражаси юқори) ва энергияси кичик ҳолатларга ўтишларни тушунмоқ лозим. Бу икки хил ўтишларга 1.7-расмда эҳтимоллик W нинг икки W_1 ва W_2 қийматлари тўғри келади; уларга эса энтропиянинг битта S қиймати мос келади (1.7-расм).

Умуман тизимнинг икки ҳолатига энтропиянинг бир қиймати мос келиши, яъни энтропия ҳолат эҳтимоллигининг бир қийматли функцияси бўлмай, икки қийматли функцияси эканлигини кўрсатади. Бу эса статистик физикадаги қабул қилинган энтропия ҳолатнинг бир қийматли функцияси дейилган тезисга аниқлик киритилишини тақозо этади.

М и с о л. Хонага қиздирилган жисм киритилди. Уй ҳавоси ва жисмни яккаланган тизим деб ҳисоблаб, ундаги жараёнларни таҳлил этайлик. Иссиқлик ютилиши ҳисобига ҳавода хаотиклашиш кучаяди, бунда микроҳолатлар сони ортиши мумкин; уларнинг эҳтимолликлари камаяди, аммо микроҳолат энтропияси S_1 ортади ва умуман тизим ҳавоси қисмининг энтропияси S ортади (1.7-расм, унг қанот).

Тизимнинг бир қисми бўйича жисм юқори энергетик сатҳдан қуйи энергетик сатҳларга ўтади, микроҳолатларнинг эҳтимолликлари ортади; S_1 камайса-да W_1 нинг ортиши ҳисобига, умумий энтропия S ортади (1.7-расм, чап қанот). Умуман айтганда, тизимнинг (уй ҳавоси ва қизиган жисм) энтропияси $S = \sum W_i S_i$ ортади [1.7-расмда ҳар иккала

(чап ва унғ) қанот], яъни $dS_{\text{жисм}} + dS_{\text{ҳаво}} = dS > 0$. Бу мисолни термодинамикада қўйилагича тушунтириш мумкин. Мувозанатда бўлган классик тизимлар иссиқлик контактга келтирилганда, уларнинг энтропияларининг узгаришлари Карно-Клаузиус теоремасига асосан (термодинамиканинг 2-қонуни):

$$dS(\text{ҳаво}) = \frac{dQ_{\text{х}}}{T_{\text{х}}}, \quad dS(\text{жисм}) = \frac{dQ_{\text{ж}}}{T_{\text{ж}}}$$

ифодалар билан аниқланади, буларда

$$dQ_{\text{х}} > 0, \quad dQ_{\text{ж}} < 0, \quad dQ_{\text{х}} = |dQ_{\text{ж}}|.$$

Масаланинг шартига асосан $T_{\text{ж}} > T_{\text{х}}$. Буларга асосан $dS(\text{ҳаво}) > |dS(\text{жисм})|$. Демак, тизим (жисм + ҳаво)да қайтмас жараёнлар туфайли унинг энтропияси ортиши, яъни

$$dS(\text{ҳаво}) - |dS(\text{жисм})| = dS > 0$$

муносабат, содир бўлади.

Шундай қилиб, қўйидаги хулосага келамиз: адабиётлардаги Больцман формуласи $S = \ln W$ да W ни тизим ҳолатининг эҳтимоли деб қараб, тизим кичик эҳтимолли ҳолатлардан катта эҳтимолли ҳолатларга ўтади, деб тушунтирилиши бир ёқлама, умуман айтганда ноаниқдир.

Юқорида танишилган умумий тушунчаларни мисоллар ва масалалар воситасида қарайлик.

МИСОЛЛАР ВА МАСАЛАЛАР

1. Макроскопик ҳолат. Макроскопик тизимнинг макроскопик ҳолати уни аниқлайдиган макроскопик параметрлар, масалан, температура, зичлик ва бошқалар қийматларининг берилиши билан аниқланади. Тизимни аниқлайдиган макроскопик параметрлар сони шу тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари сонидир. Гиббснинг фазалар қондасига асосан, тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари сони N_T шу тизимнинг компонентлари n ва фазалар сони r га боғлиқ.

Агар тизим термодинамик мувозанатда бўлса, унинг термодинамик эркинлик даражалари сони N_T қўйилагича аниқланади:

$$N_T = 2 + n - r.$$

Тизимнинг макроскопик ҳолати шу N_T параметрнинг қийматлари билан аниқланади.

2. Термодинамик мувозанатдаги ҳолат. Агар тизим номувозанат термодинамик ҳолатда бўлса, яъни температура, зарралар сони зичлиги ва шу кабилар тизимнинг турли қисмларида турли қийматлар қабул қилса (ташқаридан тизимга таъсир бўлмаса), у релаксация жараёнлари туфайли маълум вақтдан кейин ўз-ўзидан термодинамик мувозанат ҳолатга келади. Термодинамик мувозанат ҳолатда тизимни аниқлайдиган макроскопик параметрлар қийматлари ўзгармайди.



1.8-расм

3. Тизимнинг ўз-ўзидан термодинамик мувозанатга келишига релаксация жараёни дейилади, мувозанатга келиш вақти τ эса *релаксация вақти* дейилади.

4. Масалан, идишда (1.8-расм) N та заррадан иборат газ бўлсин. Идиш ҳажми фикран тенг икки қисмдан иборат бўлиб, унинг бирида n_1 та, иккинчисида n_2 та зарра бўлсин. Аёнки,

$$N = n_1 + n_2.$$

Тизим (газ) термодинамик мувозанат ҳолатда бўлса, тажриба кўрсатадики, зарралар зичлиги $\rho = N/V$ бир хил бўлади. Бу эса термодинамик мувозанат ҳолатдир. Бунда, одатда идишнинг ҳар икки қисмида зарралар сони тахминан тенг бўлади, яъни $n_1 \approx n_2$. Аммо муайян ҳолда зарраларнинг, масалан, бир қисмидаги сони $N/2$ дан яъни зарраларнинг тенг тақсимланишидан четланиши (фарқланиши) мумкин; яъни тизим термодинамик мувозанат ҳолатдан четлашиши мумкин. Зарралар сонининг бундай тенг тақсимланишдан четлашишига *зарралар сонининг (зичлигининг) флукутацияси* дейилади.

Олдий мулоҳаза шунга олиб келадикки, хатто зарраларнинг ҳаммаси ҳам идишнинг I қисмида бўлиб қолиши учун бирор бир принципиал тўсқинлик йўқ. Демак, яккаланган тизим, ҳеч қандай ташқи таъсирсиз, ўзининг мувозанат ҳолатидан четлашиши мумкин. Бундан хулоса шуки, яккаланган тизим термодинамик мувозанатда бўлса ва унга ҳеч қандай ташқи таъсир бўлмаса, у ҳар қанча узоқ вақт ўтса-да ўша



1.9-расм

мувозанат ҳолатда қолаверади, деган термодинамиканинг қатъий ҳулосаси бажарилмайди. Иккинчи томондан, термодинамиканинг ҳулосалари тажрибанинг натижаларига асосланган.

Ҳуш, бу статистик физикада ва термодинамикада айтилганларнинг маъносидаги фарқни қандай тушуниш керак? Мисоллар орқали буни тушунтирамиз.

1. Идишда иккита a ва b зарра бўлсин. Бунда идишнинг 1 ва 2 қисмларида зарраларнинг жойлашиш усуллари сони тўртта бўлади (қаранг 1.9-расм).

Идишнинг 1 ва 2 қисмларида зарраларнинг тенг тақсимланиши қолган ҳолларнинг ҳар бирига нисбатан 2 марта ортиқ. Бошқача айтганда, зарраларнинг ҳажм бўйича тенг тақсимланиши (яъни "мувозанати") катта эҳтимолга эга.

Ҳолатлар (ячейкалар, катаклар) сонини Z , зарралар сонини N билан белгилаб Z ҳолатларда N та зарранинг жойлашиш усуллари сони — конфигурацияларнинг сонини аниқлайлик.

Тизим (зарралар) иккита ҳолатда (катакда) бўлиши мумкин, дейлик. Агар тизим битта заррадан иборат бўлса, ҳолатлар бўйича $2^1 = 2$ усул билан жойлашади. Зарралар сони $N = 2$ та бўлса, юқорида кўрганимиздек, $2^2 = 4$ та усул билан. $N = 3$ бўлса, $2^3 = 8$ та усул билан, $N = 4$ бўлса, $2^4 = 16$ та усул билан жойлашади (1.1-жадвалга қаранг, зарралар a, b, c, d билан белгиланган). Умумий ҳолда N та зарранинг Z та ячейкада (катакларда) жойлашиш усуллари сони Z^N га тенг. Тизимнинг макроҳолатини ҳосил қилиши мумкин бўлган усуллар сонини (мисолда $\frac{N!}{n_1! n_2!} = 1, 4, 6, 4, 1$ ни) **термодинамик эҳтимоллик** дейилади.

$N = 4$, $Z = 2$ бўлган ҳолни таҳлил этайлик. Агар идиш тенг икки қисмдан иборат бўлса, идеал зарранинг идишнинг бир қисмида бўлиши (ёки бўлмаслиги) эҳтимол $(1/2)$ га тенг бўлади. 4 та зарранинг бир "статистик микроҳолат" да бўлиш эҳтимоли зарралар эҳтимолликларининг кўпайтмасига тенг, яъни $(1/2)^4 = 1/16$. Масалан, 12-статистик мик-

1.1-жадвал

№	1 ҳолат	2 ҳолат	$C(n)$	W_n	$W_n \times 100\%$	Микро-ҳолатлар
1	abcd	—	1	1/6	6,25	I
2	abc	d	4	1/4	25	II
3	abd	c				
4	acd	b				
5	bcd	a				
6	ab	cd	6	3/8	37,5	III
7	ac	bd				
8	ad	bc				
9	cd	ab				
10	bd	ac				
11	bc	ad				
12	a	bcd	4	1/4	25	IV
13	b	acd				
14	c	abd				
15	d	abc				
16	—	abcd	1	1/16	6,25	V

роҳолатнинг эҳтимоли $(1/2) \cdot (1/2)^3 = 1/16$. V эҳтимоллик ҳам асосий постулатга асосан $1/16$ га тенг. Бундай "статистик микроҳолатлар" қаралаётган мисолимизда 16 та (1.1-жадвал).

Физик катталикининг ҳар хил қийматларига мос келади-ган "микроҳолатлар" сони 5 та. Ҳар бир "микроҳолат" нечта "статистик микроҳолат" дан ташкил топгани ҳам 1.1-жадвалда кўрсатилган. Масалан, III "микроҳолат" 6 та "статистик микроҳолат" дан ташкил топган. Бу ҳар бир микроҳолатга туғри келган усуллар сони — "статистик ҳолатлар" сонини $C(n)$ билан белгилайлик. У ҳолда ҳар бир микроҳолатнинг эҳтимоли, яъни n зарраларнинг идишнинг бир қисмида бўлиш эҳтимоли W_n катаклар сони $Z = 2$ бўлганда қуйидагича аниқланади:

$$W_n = C(n)P_n = C(n)/2^N. \quad (1)$$

P_n — статистик микроҳолатнинг эҳтимоллиги; $P_n = 1/2^N$. $C(n)$ ни *микроҳолатнинг термодинамик эҳтимоллиги* дейилади.

Курилайтган мисолда $Z = 2$, $N = 4$ бўлганлиги учун микроҳолатларнинг эҳтимолликлари ва термодинамик эҳтимолликлари қуйидагича:

$$\begin{aligned}
 C(4) &= C(0) = 1, & W_4 &= W_0 = 1/16, \\
 C(3) &= C(1) = 4, & W_3 &= W_1 = 1/4, \\
 C(2) &= 6, & W_2 &= 3/8.
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

N та микрозаррарнинг микроҳолатига туғри келган усуллар сони статистик микроҳолатлар сони (термодинамик эҳтимоллик) қуйидагича аниқланади:

$$C(n) = C(N - n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} \tag{3}$$

Бунда $Z = 2$ қабул қилинган ва идишнинг бир қисмида n та, иккинчи қисмида $N - n$ та зарра жойлашган деб ҳисобланган. i -микроҳолатдаги статистик микроҳолатлар сони $C(n)$ ни

$$C_i(n) = N! \cdot G_i(n_1, n_2)$$

қурилишида ёзайлик, бунда

$$G_i(n_1, n_2) = G_i(n, N - n) = \frac{1}{n_1!} \frac{1}{n_2!} = G_i(n_1) G_i(n_2)$$

ёки ҳолатлар (катакчалар) сони куп, масалан, Z та бўлганда

$$G_i(n_1, n_2, \dots, n_k, \dots) = G_i(n_1) G_i(n_2) \dots G_i(n_k) = \prod_{k=1}^Z G_i(n_k)$$

ифодани ёзиш мумкин. Бу ҳолда микроҳолат эҳтимоллиги

$$W_i = \frac{N!}{Z^N} G_i = N! PG_i$$

ифода билан аниқланади. G_i шу i -микроҳолатнинг *статистик вазни*ни аниқлайди. Юқоридагилардан қўринадик, микроҳолат эҳтимоллиги W_i статистик микроҳолатлар сони $M G_i$ ёки статистик вазнини характерловчи катталиқ G_i билан тизимнинг микроҳолати аниқланиши мумкин; берилган тизим учун зарралар сони N ва катаклар сони Z доимийдир.

Қаралган мисолдан қўринадик, энг катта эҳтимолликка эга бўлган микроҳолат — зарраларнинг тенг тақсимланган ҳолидир (1.1-жадвалда III ҳолат).

Зарралар сони жуда катта бўлганда, масалан, $N = 10^{19}$ та бўлганда, энг катта эҳтимолли тенг тақсимланган ҳолатдаги тизимни характерловчи макроскопик параметрлар деярли ўзгармайди. Бу энг катта эҳтимолли микроҳолат — му-

возанатдаги термодинамик ҳолатдир. Булардан кўринадики, статистик физикада тизимнинг микроҳолати тушунчаси термодинамик ҳолат тушунчасига нисбатан кенгроқ маънода ишлатилади. Жумладан, термодинамикадаги мувозанат ҳолат, қатъиян узгармас деб қаралгани ҳолда, статистик физикада бу ҳолат катта эҳтимолли ҳолат деб қаралиб, кичик эҳтимолли микроҳолатлар (1.1 жадвалда I, II, IV, V ҳоллар) ҳам содир бўлиши мумкин деб қаралади. Масалан, юқоридаги мисолда ҳамма (4 та) зарраларнинг биринчи қисмда тупланиб қолиши 16 тадан 1 тасида, тенг тақсимланиш эса 6 тасида рўй беради. Зарралар сони 10 та бўлганда, уларнинг идишнинг ярмида тупланиб қолиши $2^{10} = 1024$ тадан битта ҳолда содир бўлади; тенг тақсимланиши эса 252 тасида учрайди. Зарралар сони 100 та бўлганда уларнинг идишнинг ярмида тупланиб қолиши 2^{100} тадан биттасида учрайди. Демак, N таргли даражада катта бўлганда, уларнинг идишнинг ярмида тупланиб қолиш эҳтимоллиги $1/2^N$ га тенгдир, бу эса нолга яқиндир.

Шундай қилиб, статистик физика нуқтаи назаридан тизимнинг энг катта эҳтимолли тенг тақсимланиши ҳолатидан (термодинамик мувозанат ҳолатидан) катта оғиш ниҳоятда кичик эҳтимолликка эга, аммо кичик оғиш амалда сезиларли эҳтимолли ҳолдир. Статистик физикада тизимнинг термодинамик мувозанат ҳолатидан (қатъий айтилганда, тизимнинг макроскопик параметрлари ўртача қиймат қабул қилган ҳолдан) четланиши флуктуация ҳодисасидир. Мисолдаги W_I , W_{II} , W_{IV} , W_V эҳтимолли ҳолатлар флуктуациялар туфайли содир бўлиши мумкин бўлган ҳолатлардир. Булардан равшанки, катта флуктуациялар кичик эҳтимолли, кичик флуктуациялар катта эҳтимолли бўлади-лар.

Мувозанатдаги ҳол учун айтилганидек, термодинамикада тизимнинг номувозанат ҳолати, ташқи таъсир бўлмаганда, мувозанат томонга ўзгаради, деб қатъий айтилса, статистик физикада мувозанатга келиш жараёни (яъни релаксация жараёни) катта эҳтимолли жараёндир деб қаралади.

Мисоллар қарашда давом этайлик. Мисол: $Z = 3$, $N = 2$ бўлсин. Статистик ҳолатлар сони $Z^N = 3^2 = 9$ та (қаранг: 1.2-жадвал). Тизим зарраларини квант механика асосида қаралса, айнанлик тамойилини ҳисобга олиш керак. Бу ҳолда

1.2-жадвал

№	1 ҳолат	2 ҳолат	3 ҳолат
1	ab	—	—
2	—	ab	—
3	—	—	ab
4	a	b	—
5	a	—	b
6	—	a	b
7	b	a	—
8	b	—	a
9	—	b	a

статистик микроҳолатлар сони юқоридаги классик ҳолдаги статистик микроҳолатлар сонидан фарқ қилади. Ҳақиқатан ҳам, айнанлик тамойили ҳисобга олинса, 4 ва 7, 5 ва 8, 6 ва 9 ҳолатлар бир-биридан фарқланмайди. Бу ҳолда "статистик микроҳолатлар" сони $f(N, Z)$ қуйидагича аниқланади:

$$f(N, Z) = \frac{(N+Z-1)!}{N!(Z-1)!} = 6. \quad (4)$$

1.3-жадвал

№	1 ҳолат	2 ҳолат	3 ҳолат	4 ҳолат
1	ab	—	—	—
2	—	ab	—	—
3	—	—	ab	—
4	—	—	—	ab
5	a	b	—	—
6	a	—	b	—
7	a	—	—	b
8	—	a	b	—
9	—	a	—	b
10	—	—	a	b
11	b	a	—	—
12	b	—	a	—
13	b	—	—	a
14	—	b	a	—
15	—	b	—	a
16	—	—	b	a

Агар (Паули тамойилига биноан) бир катакда (ҳолатда) биттадан ортиқ зарра бўла олмаслиги талаб этилса, "статистик микроҳолатлар" сони 3 га тенг бўлади, яъни:

$$f(N, Z) = \frac{N!}{Z!(Z-N)!} = 3. \quad (5)$$

Қуйида $Z = 4$, $N = 2(a, b)$ мисолни қарайлик (1.3-жадвал). Бу мисолда классик статистик микроҳолатлар сони (2 та a, b зарранинг 4 та катакда жойлашиш усуллари сони) $Z^N = 4^2 = 16$ та. Квант механикасида айнанлик тамойилига асосан 5 ва 11; 6 ва 12; 7 ва 13; 8 ва 14; 9 ва 15; 10 ва 16 ҳолатларни бир хил деб ҳисобламоқ керак. Бу ҳолда "статистик микроҳолатлар" сони

$$f(N, Z) = \frac{(N+Z-1)!}{N!(Z-1)!} = 10$$

Агар зарраларнинг Паули тамойилига бўйсиниши талаб этилса, у ҳолда 1, 2, 3, 4 ҳоллар мавжуд эмас. Бу ҳолда иккита зарранинг 4 та катакда жойлашиш усуллари сони ("статистик микроҳолатлар" сони)

$$f(N, Z) = \frac{Z!}{N!(Z-N)!} = 6$$

ифода билан аниқланади.

Идишнинг бир қисмида n та зарра, иккинчи қисмида $N-n$ та зарра жойлашиш эҳтимоли, яъни бундай микроҳолатнинг эҳтимоли $W_n(1)$ ва (3) га асосан қуйидагича аниқланади:

$$W_n = \frac{N!}{2^N} \frac{1}{n!(N-n)!} \quad (6)$$

1.1-жадвалдан кўринадики, энг катта эҳтимолли микроҳолат — бу зарраларнинг текис тақсимланиши, идиш ҳажмининг қисмлари бўйича тенг тақсимланишидир (мисолда 2 та зарра бир қисмида, 2 та зарра иккинчи қисмида). Ҳақиқатан ҳам, зарраларнинг текис тақсимланишида, яъни $n = N/2$ бўлганда, микроҳолатлар эҳтимоллигининг ифодаси W_n максимум қийматга эришади. Бошқа қолган микроҳолатлар (конфигурациялар) бўлиши мумкин, лекин уларнинг эҳтимолликлари нисбатан кичик. Шундай қилиб, қаралаётган мисолдан кўриниб турибдики, тизимнинг мувозанат

ҳолатдан (тенг тақсимотдан) катта четланиши кичик эҳтимолли, яъни

$$W_0, W_1 \ll W_2$$

бўлади. Юқоридаги мисолдан кўринадики, иккита ҳолнинг бирида тизим зарралари идишнинг ярмида йиғилиб қолиши мумкин. Агар N катта бўлса, бундай ҳолнинг содир бўлиши ниҳоятда кичик эҳтимолли воқеадир. Масалан, агар зарралар сони $N = 80$ бўлса, конфигурациялар сони $2^{80} = 10^{24}$ бўлади. Бу эса, агар тизимни 10^{24} сек кузатилса, 1 секунд вақт давомида 80 та зарранинг ҳаммаси идишнинг ярмида йиғилиб қолишини кўриш мумкин. Оламнинг ёши тахминан 10^{10} сек га тенг. Демак, Олам (Коинот) ёшидан миллион марта ортиқ вақт кузатилса, 80 та заррадан иборат тизим (газ) идишнинг ярмида 1 сек тўпланиб қолиши мумкин. Агар N етарли даражада катта бўлса, тизим зарраларининг ҳаммаси идишнинг ярмида бўлиб қолиши фантастик даражада кичик эҳтимолли воқеадир. Шундай қилиб, катта флуктуациялар яъни $n \gg N/2$ ёки $n \ll N/2$ ҳоллар амалда кузатилмайди. Аммо, мувозанат ҳолатидан кичик четланишлар етарли даражада тез-тез учраб туриши мумкин.

Юқоридаги мисолнинг таҳлилидан қуйидаги хулосаларга келамиз:

1. Зарраларнинг текис тақсимланиши, термодинамика нуқтаи назаридан мувозанат ҳолатдир. Демак, мувозанат ҳолат тизимнинг бўлиши мумкин бўлган микроҳолатларидан энг катта эҳтимоллигидир.

2. Тизимда кичик эҳтимолли ҳолатларнинг реализацияси, яъни тизимнинг мувозанат ҳолатдан четланиши — бу флуктуация ҳодисасидир.

Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, тизимнинг мувозанатдан кичик четланиши катта эҳтимолликка, катта четланиши эса нисбатан кичик эҳтимолликка эга.

3. (3) ифодадан кўринадики, N та заррадан иборат тизим микроҳолатининг эҳтимоллиги конфигурациялар сони

$$C(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

га боғлиқ. Бу ерда шуни таъкидлаймизки, берилган зарралардан иборат тизим микроҳолатининг эҳтимоллиги ўзгарувчан

$$G(n) = \frac{1}{n(N-n)!} \quad (7)$$

катталика боғлиқ. Бошқача айтганда, микроҳолатларнинг фарқи статистик вазнини характерловчи катталик $G(n)$ нинг ҳар хил қийматларига боғлиқ.

4. Агар тизим бирор сабабга кўра (ташқи таъсир, флуктуациялар туфайли) номувозанат ҳолатда бўлса, у катта эҳтимоллик билан ўзининг мувозанат ҳолатига яқинлашади. Бу ҳодисани релаксация (флуктуация сабабли бўлган бўлса, унинг "сўниши") дейилади.

5. Юқоридаги мисоллардан кўрдикки, микроҳолат эҳтимоллиги қуйидагича аниқланади:

$$W_i = \frac{1}{N!} C_i$$

1.1-мисол. Микроҳолатлар тенг эҳтимолли бўлсин, яъни

$$w_1 = w_2 = \dots = w_i = \dots = \frac{n}{N} \quad (8)$$

бунда $N = kN_A$, $k = 1, 2, 3, \dots, n$; N_A — статистик микроҳолатлар (ансамбль элементлари) сони; N — кузатишлар (тажрибалар) сони. Бу ҳолда тизимнинг эҳтимоллиги $W = \prod_i W_i^{n_i}$ ни аниқланг, таҳлил этинг.

Ечиш: $W = \prod_i W_i^{n_i} = \left(\frac{n}{N}\right)^N$. $N = \sum_i n_i$, $N = kN_A$ ни назарда тутиб, W эҳтимоллик учун

$$W = \frac{1}{N!} = \left(\frac{1}{N_A}\right)^N \quad (9)$$

ифодани оламиз; бунда $\frac{1}{N_A} = \frac{1}{\sum_i i_i}$ бир статистик микроҳолатнинг эҳтимоллиги, $(1/N_A)^N$ эса N та элементнинг бирдан келиб чиқиш эҳтимоллиги; агар $k = 1$ бўлса, статистик ансамблнинг эҳтимоллиги W билан аниқланади; $N_A^k A$ эса N_A та элементларнинг N_A ҳолатларда (микроҳолатларда) жойлашиш усуллари сони.

1.2-мисол. N зарранинг m та катакда $n_1, n_2, \dots, n_m$ тадан жойлаштириш усуллари сони:

$$C = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_m!} \quad (9)$$

эканлигини кўрсатинг.

Е ч и ш: Классик статистикада микроҳолат фақат зарралар сони билан аниқланади. N та заррадан $N!$ та ўрин алмаштиришлар ҳосил қилиш мумкин. Бунда микроҳолат ўзгармайди. Аммо биринчи катакда (ячейкада) n_1 , иккинчи катакда n_2 та в.ҳ. зарра жойлашган бўлса, биринчи катакдаги n_1 та зарралар алмашилишида, 2-катакдаги n_2 та зарраларнинг ўзаро ўрин алмашилишидан микроҳолатлар ўзгармайди; катакдаги зарраларнинг ўрин алмашилишидан микроҳолатлар ўзгармайди. Демак, микроҳолатлар ўзгармас сонлар кўпайтмаси

$$n_1!, n_2!, \dots, n_m!$$

дан иборат. Катаклардаги зарраларнинг катаклар орасидаги ўрин алмашилишлари сонини C билан белгиласак, бу сон C ни $n_1!, n_2!, \dots, n_m!$ га кўпайтиришдан умумий ўрин алмаштиришлар сони M келиб чиқади, яъни,

$$N! = C n_1! n_2! \dots n_m!$$

ёки бундан

$$C = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$$

изланаётган статистик микроҳолатлар сони C топилади.

1.3-масала. Бир-биридан фарқланмайдиган (айнан бир хил бўлган) N та зарраларнинг Z катаклар бўйича тақсимланиш (жойлашиш) усуллари сонини аниқланг.

Е ч и ш: Фараз қилайлик, 1-катакда n_1 та, 2-катакда n_2 та, в.ҳ.к. Z -катакда n_Z та зарра жойлашган бўлсин. Индуктив усул билан аниқлайлик. $Z = 1$ да 1 хил усул билан $C = 1$ жойлашади; $Z = 2$ ҳолда зарраларнинг ўзаро ўрин алмаштиришлари янги микроҳолатга олиб келмайди, яъни $N!$ алмаштиришлар янги микроҳолат ҳосил қилмайди; Энди умумий ўрин алмаштиришлар сонини топайлик: катаклар сони $Z = 2$ бўлганда ўрин алмашинувчи элементлар сони биттага ортади: 0, 1, 2, 3, ..., N та бўлади; демак, ўрин алмашилишлар сони $[N + (Z - 1)]!$ та бўлади.

Демак, бу ҳолда микроҳолатлар сони

$$C = \frac{[N + (Z - 1)]!}{N!}$$

ифода билан аниқланади; $Z = 3$ да бўлган ҳолда ўрин алмашилишлар $N!$ янги микроҳолатларга олиб бормади (аввалги

ҳолдагидай); $Z = 3$ бўлганда умумий элементлар сони 2 тага ортади, яъни

$$0, 0, 1, 2, \dots, N$$

бўлади, ёки ($Z - 1 = 2$) бўлганда $N + (Z - 1)$ та элемент бўлади. Демак, умумий ўрин алмашилишлар сони $(N + Z - 1)!$ дан иборат бўлади; аммо $Z = 3$ да 2 та ячейкадаги 0,0 элементларнинг ўрин алмашилишлари, равшанки, янги натижа бермайди. Демак, олинган натижа $(N + Z - 1)!/M!$ ни, яна $2! = (Z - 1)!$ га, яъни 0 (ноль) элементлар ўрин алмашилиши сонига бўлиш зарур. Ниҳоят изланаётган натижани оламиз:

$$C = \frac{(N+Z-1)!}{N!(Z-1)!} \quad (11)$$

$Z = 4$, $Z = 5$ в.ҳ. ҳолларда ҳам (11) микроҳолатлар сони олинишига осонгина ишонч ҳосил қилиш мумкин. $Z = 2$, $N = 4$ ҳолда ва $Z = 4$, $N = 2$ ҳолда асосий матнда 5 та ва 10 та микроҳолатлар олинган эди. Ҳақиқатан ҳам.

$$C = \frac{(4+2-1)!}{4!(2-1)!} = \frac{5!}{4!1!} = 5,$$

$$C = \frac{(2+4-1)!}{2!(4-1)!} = \frac{5!}{2!3!} = 10.$$

1.4-масала. $Z > n$ шарт бажарилганда, бир-биридан фарқланмайдиган (айнан бир хил) N та микрозарранинг ячейкалар (катаклар, ҳолатлар) бўйича тақсимланиш сони C аниқлансин; бунда ҳар бир ячейкада биттадан ортиқ микрозарра бўла олмасин деб ҳисоблансин, яъни микрозарралар Паули тамойилига бўйсунсин.

Еч и ш: Фараз қилайлик, Z та катакда мос равишда $n_1, n_2, \dots, n_z$ зарралар жойлашган бўлсин, яъни

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & z \\ \hline n_1 & n_2 & \dots n_z \\ \hline \end{array}$$

$n_1, n_2, \dots, n_1, \dots, n_z$; $Z > N$ бўлганда ва $n_i = 0, 1$ шарт бажарилганда умумий ўрин алмаштиришлар сони $Z!$ га тенг, бунда зарралар айнанлик (бир хиллик) тамойилига бўйсунгани учун $N!$ ўрин алмаштиришлар янги натижа, янги микроҳолатлар бермайди; Демак,

$$Z!/N!.$$

Аммо $Z > 0$ бўлганда $Z - N$ та ячейкадаги "0" элементлар урин алмаштиришлари ҳам янги натижа, янги микроҳолатларга олиб келмайди; лемак $Z!$ ни яна $(Z - N)!$ га ҳам бўлиш зарур. Бу ҳолда изланаётган усуллар сони

$$C = \frac{Z!}{N!(Z-N)!} \quad (12)$$

ифода билан аниқланади. $Z = 4$, $N = 2$ ҳол учун 6 та микроҳолат олинган эди. Ҳақиқатан ҳам (12) дан

$$C = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

аввалги натижа 6 келиб чиқади.

II БОБ

ЭХТИМОЛЛИКЛАР НАЗАРИЯСИДАН МАЪЛУМОТ

2.1-§. КИРИШ. АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАР

Гиббснинг статистик ансамбль усулида микроҳолатлар эҳтимолликлари тақсимотини аниқлаш статистик физика усулининг асосидир. Шу сабабли бу бобда эҳтимоллар назариясининг бизга зарур бўлган асосий тушунчалари, теоремалари, тақсимотлари ва эҳтимоллар зичликлари устида қисқача тўхталамиз.

Эҳтимоллар назариясининг муҳим тушунчаси — тасодифий катталикдир. Бу (катталик) миқдор берилган шартда ўзининг имконияти бўлган қийматларидан бирини маълум эҳтимол билан қабул қилади. Масалан, агар тасодифий миқдор чекли ёки чексиз кетма-кет ҳар хил $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, дискрет қийматлар қабул қилса, унинг учун эҳтимоллар тақсимои қонуни шу қийматларга мос

$$P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$$

эҳтимолликларни кўрсатиш билан берилади. Агар тасодифий миқдор узлуксиз қийматларни қабул қилса, бу ҳолда эҳтимоллар тақсимои қонуни ҳар бир x , $x + dx$ оралиқ учун эҳтимоллик

$$dW_i(x) \quad x \leq \xi < x + dx$$

кўрсатилиши билан берилади. Агар бу ҳолда оралиқ чекли (a, b) бўлса, $W_i(a, b)$ эҳтимоллик қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$W_{\pm}(a, b) = \int_{ax \pm b} dW_{\pm}(x) \quad (1)$$

ёки

$$W_{\pm}(a, b) = \int_a^b f(x) dx,$$

бунда:

$$dW(x) = \frac{\partial W}{\partial x} dx = f(x) dx, \quad f(x) = \frac{\partial W(x)}{\partial x} \quad (2)$$

$f(x)$ — эҳтимолликлар зичлиги (бир ўлчамли ҳол учун); физик адабиётда бу функция тақсимот функцияси деб юрилади. Математикада тақсимот функцияси атамаси $W_{\pm}(a, b)$ эҳтимоллик учун ишлатилади. Физика ва математика адабиётларидаги бу тушунчалар ҳар хиллиги англашилмовчиликка олиб бормаслиги керак.

1-м и с ол. Чизиқли гармоник осцилляторнинг энергияси

$$\epsilon_n = \frac{h}{2\pi} \omega (n + 1/2), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

қийматларни қабул қилади.

Статистик физикада бундай осцилляторлар ансамблида осцилляторнинг $n = 0, 1, 2, \dots$ ларга мос энергия қийматларини қабул қилиши эҳтимоллар тақсимои функцияси билан берилади.

2-м и с ол. Макротизимни кўрайлик. Классик механика қонунларига асосан вақт ўтиши билан макротизим кетма-кет микроҳолатларда бўлади. Бу микроҳолатлар тўплами динамик характерга эга. Гиббс ансамбли (тўплами)ни ташкил этган тизимнинг микроҳолатлари статистик характерга эга. Гиббс ансамблига мос келган катталиқ (миқдор), масалан, L , тасодифий (миқдор) катталиқдир. Микроҳолатларга L нинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлари

$$L_1, L_2, \dots, L_n$$

мос келади (дискрет ҳол учун). Эҳтимолликлар тақсимои қонунига асосан бу қийматларга мос эҳтимолликлар

$$P(L_1), P(L_2), \dots, P(L_n)$$

ҳам берилиши лозим.

Бу ерда шуни таъкидлаймизки, микроҳолатларнинг вақт бўйича туплами билан микроҳолатларнинг Гиббс бўйича туплами априори бир-бирига тенг деб қабул қилинади. Бу эса эргодик теореманинг маъносини ташкил этади. Бунда Гиббснинг даҳоси — тизим гамильтони E ни тасодифий катталикка келтиришидадир.

Тасодифий воқеа. Берилган шароитда тасодифий миқдорнинг қабул қилиши мумкин бўлган қийматлардан бирининг содир бўлиши (ёки бўлмаслиги) *тасодифий воқеа* деб аталади. Демак, ҳар бир элементар воқеага ўзига мос эҳтимоллик туғри келади. Тасодифий воқеалар элементар ёки бир неча элементар воқеалардан иборат мураккаб бўлиши мумкин. Эҳтимоллик тушунчасидан фойдаланишда аниқлик учун математикадаги унинг таърифини Колмагоров бўйича келтирамиз. Бунинг учун тасодифий катталиكنинг кетма-кет қийматларини ёзайлик:

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

Бу қийматларнинг содир бўлиши элементар воқеалар

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$$

бўлсин.

1. Ҳар бир элементар воқеа A_n га, унинг эҳтимоллиги деб аталувчи манфий бўлмаган ҳақиқий $P(A_n)$ сон мос келади (аксиома).

2. Агар воқеа албатта содир бўлса, у ишончли (муқаррар) воқеа бўлади. Масалан, имконияти бўлган қийматлар-

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

дан ихтиёрий бирининг (содир бўлиши), яъни

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$$

воқеалардан бирининг содир бўлиши — бу муқаррар (ишончли) воқеадир. Муқаррар (ишончли) воқеанинг эҳтимоллиги бирга тенг, яъни:


$$P(\text{ихтиёрий } A_n) = 1.$$

3. Агар A ва B бирга мавжуд бўла олмайдиган воқеалар бўлса (A ва B тупламлар кесишмаса) унда A ёки B воқеалардан бирининг содир бўлиши эҳтимоллиги $P(A + B)$ ёки $P(A \cup B)$ қурилишда ёзилади ва қуйидагича аниқланади:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

4. Мумкин бўлмаган воқеанинг эҳтимоллиги нолга тенг, яъни:

$$P(\bar{A}) = 0.$$



2.1-расм.

5. A , ёки B , ёхуд бир вақтда A ва B воқеанинг содир бўлиши эҳтимоллиги $P(A \cup B)$ куйидагича аниқланади (2.1-расмга қаранг):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

6. Бир вақтда бўлмайдиган A ва B воқеалардан бирининг содир бўлиш эҳтимоллиги $P(A + B)$ куйидагича аниқланади:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

Бирга мавжуд бўла олмайдиган, A ва B воқеаларнинг бир вақтда содир бўлиш эҳтимоллиги $P(A \cap B) = 0$ (яъни A ва B тўпламлар кесишмайди) (2.2-расмга қаранг)

Бу ҳолда

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

ёки умумий воқеалардан A_1 нинг, ёки A_2 нинг, ..., A_n нинг (бошқача айтганда, шу воқеалардан ихтиёрий бирининг) содир бўлиш эҳтимоллиги P куйидаги эҳтимолликларнинг йиғиндисига билан аниқланади (эҳтимолликларни қўшиш теоремаси):

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n) &= \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \end{aligned} \quad (3)$$

Имконияти бўлган воқеалардан ихтиёрий бирининг содир бўлиши — бу муқаррар (ишончли) воқеа. Бундай муқаррар воқеанинг эҳтимоллиги таърифга кўра бирга тенг. Бу ҳолда эҳтимолликларни қўшиш теоремаси (3)

$$P = \sum_{k=1}^n P(A_k) = 1 \quad (4)$$

кўринишни олади.

7. A воқеа содир бўлганда B воқеанинг шартли эҳтимоллиги $P_A(B)$, таърифга кўра, куйидагича аниқланади:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$



2.2-расм.

ёки бундан

$$P(A \cap B) = P_A(B) P(A)$$

ёки

$$P(A \cap B) = P_B(A) P(B).$$

Агар A ва B бир-бирига боғлиқ бўлмаган воқеалар бўлса, юқоридагилардан:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

экани келиб чиқади ёки, умумий ҳолда, воқеалар $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ дан A_1 нинг ҳам, A_2 нинг ҳам, $\dots, A_n$ нинг ҳам биргаликда содир бўлиш эҳтимоллиги қуйидаги эҳтимолликларнинг купайтмаси билан аниқланади (эҳтимолликларни купайтириш теоремаси):

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots A_{n-1} \cap A_n) = P(A_1) P(A_2) \dots P(A_n) \quad (5)$$

Шартли эҳтимолликлар таърифидан

$$P_A(B) P(A) = P(B) P_B(A) \quad (6)$$

тенглик келиб чиқади.

Фараз қилайлик, $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ биргаликда бўлиши мумкин бўлмаган воқеалар бўлсин. У ҳолда (6) дан

$$P_B(A_i) = P(A_i) \frac{P_A(B)}{P(B)} \quad (7)$$

тенгликни ёзамиз. B воқеанинг тўла эҳтимоли шартли эҳтимолликлар орқали қуйидагича аниқланади:

$$P(B) = P(A_1)P_A(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_i)P_{A_i}(B) + \dots \quad (8)$$

(8) ни эътиборга олиб, (7) ни қуйидагича ёзамиз:

$$P_B(A_i) = P(A_i) \frac{P_A(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(B)} \quad (9)$$

Бу *Бейес формуласи*дир.

Умуман тасодифий ҳодисалар фазо нуқталарига ва вақтга боғлиқ бўлган тасодифий функциялар билан тавсифланади. Бу тасодифий функцияларнинг (ёки катталикларнинг) қийматлари кетма-кет дискрет қийматлардан ёки узлуксиз қийматлардан иборат бўлиши мумкин. Биз ана шу икки турга тегишли тасодифий катталикларни (функцияларни) алоҳида-алоҳида қарашга киришамиз.

2.2-§. ДИСКРЕТ ТАҚСИМОТЛАР

Тасодикий ξ катталиқ дискрет (узлукли)

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

қийматларни қабул қилсин. Бу ҳолда эҳтимолликлар тақсимоти қонунига асосан бу қийматларга мос эҳтимолликлар ҳам берилади. Хусусий ҳолни қарайлик. Тасодикий катталиқ фақат иккита қийматни қабул қилсин, яъни фақат 2 хил воқеа содир бўлсин. Бу ҳолда эҳтимолликлар тақсимоти қонунига асосан P_1 ва P_2 берилади ва эҳтимолликлар таърифидан:

$$P_1 + P_2 = 1. \quad (10)$$

2.2.1. БЕРНУЛЛИ ТАЖРИБАЛАРИ

Фараз қилайлик, тажриба фақат икки имкониятли натижага эга бўлсин ва буларнинг эҳтимолликлари бир-бирига боғлиқ бўлмаган қайта тажрибалар ўтказилганда ўзгармай қолсин. Бундай тажрибаларни илк бор Яков Бернулли (1654—1705) ўтказган.

Одатда бу икки натижа-воқеанинг эҳтимолларини p ва q билан белгиланади; p га мос воқеани муваффақият (омад) ва q га мосини эса муваффақиятсизлик деб атайдилар. Бу воқеаларни қулайлик учун M ва N билан белгилайлик.

Аёнки, бу ҳолда

$$p + q = 1.$$

Бернулли тажрибаси n марта ўтказилсин. У ҳолда имконияти бўлган воқеалар сони 2^n га тенг бўлади.

Бунда

$$МНМНН...ММН$$

кетма-кет воқеалар эҳтимоллиги $P(МНМНН...ММН)$ тажрибалар бир-бирига боғлиқ бўлмагани учун бу кетма-кет воқеалар эҳтимолликларининг кўпайтмасига тенг, яъни

$$P(МНМНН...ММН) = pqrqq...ppq$$

2.2.2. БИНОМИАЛ ТАҚСИМОТ

Бернулли тажрибаларида M воқеанинг k марта кетма-кет содир бўлиш эҳтимоллиги P^k га, шунда N воқеанинг $n - k$ марта содир бўлиш эҳтимоллиги q^{n-k} га; ҳар иккала воқеанинг содир бўлиш эҳтимоллиги эса юқоридаги эҳтимолликларнинг кўпайтмаси $p^k q^{n-k}$ га тенг.

Кўпинча бизни n марта ўтказилган Бернулли тажриба-
сида k марта муваффақият ва, демак, $n - k$ марта муваффа-
қиятсизлик қизиқтириб, воқеаларнинг маълум кетма-кет-
лиги қизиқтирмайди. Бу ҳолда n та элементдан k тадан неч-
та усулда ҳар хил танлаб олишни билиш лозим. Бу эса
 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ га тенг. Демак, бизни қизиқтираётган воқеа-
нинг эҳтимоллиги $W(k; n, p)$ эҳтимолликларни қўшиш тео-
ремасига асосан аниқланади:

$$W(k; n, p) = \sum_{\substack{\text{ҳамма} \\ \text{усуллар}}} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \frac{n! p^k q^{n-k}}{k!(n-k)!} \quad (11)$$

p эҳтимолликни доимий деб қабул қилайлик; n марта ўтка-
зилган тажрибадаги муваффақиятлар сонини S_n билан бел-
гилайлик. У ҳолда $W(k; n, p) = P(S_n = k)$ яъни бунда S_n —
дискрет қийматлар қабул қилувчи тасодифий катталиқ, $W(k;$
 $n, p)$ эса шу қийматлар эҳтимоллари тақсимотини кўрса-
тувчи функциядир. Шу $W(k; n, p)$ функция *биномиаль тақ-*
симот дейилади, чунки $(p + q)^n$ нинг бином ёйилмасидаги
 k -ҳадини $W(k; n, p)$ функция аниқлайди, яъни:

$$W(0; n, p) + W(1; n, p) + \dots + W(n; n, p) = (p + q)^n = 1.$$

Охирги тенглик эҳтимолликлар таърифи ($p + q = 1$) асо-
сида ёзилди. Биномиал тақсимот ифодаси $W(k; n, p)$ дан кўри-
надики,

$$\frac{W(k; n, p)}{W(k-1; n, p)} = \frac{(n-k+1)p}{kq} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{kq} \quad (12)$$

Бундан, агар $k < (n+1)p$ бўлса, (12) нисбат 1 дан кат-
та, демак, $W(k; n, p)$ эҳтимоллик аввалгисидан катта, агар
 $k > (n+1)p$ бўлса, у эҳтимоллик аввалгисидан кичик бўлади.
Шундай қилиб, k нолдан n гача ўзгарганда $W(k; n, p)$ эҳти-
моллик олдин монотон ортиб бориб, сўнгра монотон кама-
яди. Агар $(n+1)p = m$ бутун сон бўлса, $k = m$ бўлганда $W(k;$
 $n, p)$ эҳтимоллик максимумга эришади. Бу $W(m; n, p)$ ни
максимал эҳтимоллик дейилади, m ни эса муваффақиятлар-
нинг *энг катта эҳтимолли* сони дейилади. Агар $np \gg 1$
бўлса, $m = np$ бўлишини кўрсатиш мумкин.

Бизни одатда кўпинча муваффақиятлар сони камида r
бўлиши эҳтимоли, яъни

$$P(S_n \geq r) = \sum_{v=0}^n W(r+v; n, p),$$

булиш қизиқтиради, бунда $v > n - r$ ҳолда бу қаторнинг ҳамма ҳадлари нолга тенг.

Ўртача қийматлар $\bar{k}, \bar{k}^2, \bar{k}^3$ ва дисперсия (флуктуация) $\sigma^2 = \bar{k}^2 - \bar{k}^2$ ни аниқлаймиз. / тартибли момент $\bar{k}^l$ ни аниқлаймиз. Таърифга асосан:

$$\begin{aligned} \bar{k}^l &= \sum_k k^l W(k; n, p) = \sum_k k^l C_n^k p^k q^{n-k} = \\ &= p \frac{\partial}{\partial p} p \frac{\partial}{\partial p} \dots \sum_k C_n^k p^k q^{n-k} = \left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^l (p+q)^n \end{aligned} \quad (13)$$

Хусусан, бундан қуйидагини топамиз:

$$\bar{k} = p \frac{\partial}{\partial p} (p+q)^n = np(p+q)^{n-1} = np, \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \bar{k}^2 &= p \frac{\partial}{\partial p} p \frac{\partial}{\partial p} (p+q)^n = p \frac{\partial}{\partial p} np(p+q)^{n-1} = \\ &= np(p+q)^{n-1} + np^2(n-1)(p+q)^{n-2} = np[1 + p(n-1)]. \end{aligned} \quad (15)$$

(14) ва (15) га биноан дисперсия (флуктуация) ни аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} \sigma_k^2 &= \bar{k}^2 - \bar{k}^2 = np[1 + p(n-1)] - n^2 p^2 = np(1-p) = npq; \\ \sigma_k^2 &= npq. \end{aligned} \quad (16)$$

Юқоридагилардан кўринадики, $np \gg 1$ бўлганда,

$$\bar{k} = m$$

бўлади. (7) дан кўринадики, n ортиши билан флуктуация σ_k^2 ортади; аммо n ортиши билан нисбий флуктуация $\sigma_k / \bar{k} = \sqrt{q/np}$ камаяди.

Биномиал тақсимотнинг қўлланишига иккита оддий мисол келтирамиз.

1. Қутидаги шарлар масаласи.

Қутида оқ ва қора шарлар бор. Қутидан оқ шар олиниши (муваффақият, омад) эҳтимоли p , қора шарнинг олиниши (муваффақиятсизлик) эҳтимоли $q = 1 - p$ бўлсин. Қутидан ҳар гал олинган шарни қутига қайтариб солиб, шарларни

апараштирилади (Шу усул билан ҳар галдаги қутидан шар олишни бир-бирига боғлиқ бўлмаган тажрибалар деб қарашга келтирилади). Бу Бернулли тажрибасидир.

Бернулли тажрибаси n марта утказилганда k мартасида оқ шар чиқиши (омад) эҳтимоли биномиал тақсимот $W(k; n, p)$ билан аниқланади.

2. V ҳажмли идишда бир-бирига боғлиқ бўлмаган n та молекула (идеал газ) бор. V ҳажмнинг v қисмида молекуланинг бўлиш эҳтимоллиги p бўлсин. V ҳажмда k та ($k \leq n$) молекуланинг бўлиб қолиш эҳтимоллиги биномиал тақсимот $W(k; n, p)$ билан аниқланади.

2.2.3. ПУАССОН ТАҚСИМОТИ

Амалий масалаларни қараганда Бернулли тажрибасидаги n нисбатан катта, p эса нисбатан кичик бўлади; уларнинг купайтмаси $\lambda = np$, $k = 0$ учун

$$W(0; n, p) = (1 - p)^n = (1 - \lambda/n)^n.$$

Бундан $n \rightarrow \infty$ бўлганда

$$W(0; n, p) \Rightarrow e^{-\lambda} \quad (17)$$

ифодани оламиз.

Шунингдек, $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, аммо $\lambda = np$ чекли бўлганда нисбат

$$\frac{W(k, n, p)}{W(k-1; n, p)} = \frac{np - (k-1)p}{kq} \rightarrow \frac{\lambda}{k}$$

бўлади. Бу нисбатдан (индукция асосида):

$$W(1; n, p) = \lambda W(0; n, p) \rightarrow \lambda e^{-\lambda}$$

$$W(2; n, p) = \frac{1}{2} \lambda W(1; n, p) \rightarrow \frac{1}{2} \lambda^2 e^{-\lambda}$$

.....

$$W(k; n, p) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

ёки

$$W(k; \lambda) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (18)$$

Бу (18) Пуассон тақсимоти дир. Кўриниб турибдики, $k = 0, 1, 2, \dots$, ларда (18) ни қўшиш $e^{-\lambda}$ учун Тейлор қаторининг $e^{-\lambda}$ га купайтмасига тенг. Демак, берилган λ учун $W(k, \lambda)$ эҳтимолликларнинг йиғиндиси бирга тенг, яъни:

$$\sum_{k=0}^{\infty} W(k; \lambda) = 1. \quad (19)$$

Вақт бўйича кетма-кет содир бўладиган тасодифий воқеаларни, масалан, радиоактив емирилиш, телефон станциясида "чақириш" ("вызов")ларни курайлик. Бунинг учун n оралиқчаларга бўлинган бирлик вақт оралиғини олайлик. Бунда ҳар бир оралиқчада содир бўлиши мумкин бўлган бир ёки бир неча воқеа эҳтимоли P_n ни узгармас деб қарайлик. Бу масалада ҳар бир вақт оралиқчаси воқеа билан ё банд, ё бўш бўлади. Оралиқчалар бир-бирига боғлиқ эмаслигидан бу Бернулли тажрибасига келади: k оралиқчанинг бандлиги эҳтимоли

$$W(k; n, p)$$

билан аниқланади. Бунда оралиқда бирорта ҳам тасодифий воқеа (бирорта ҳам ядро емирилиши) бўлмаслиги, ҳар бир оралиқчада ҳам бу воқеа содир бўлмаслигидан иборат. Бу воқеа эса $q^n = (1 - p)^n$ эҳтимоликка эга ва бундан $n \rightarrow \infty$ ва $np = \lambda$ чекли бўлганда лимитга ўтиб,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - p_n)^n = e^{-\lambda} \quad (20)$$

ифодани оламиз. k оралиқчаларнинг бандлиги эҳтимолиги эса $W(k, \lambda)$, яъни Пуассон тақсимоти билан берилади.

Амалий масалаларда бирлик вақт оралиғини ихтиёрий вақт оралиғи t билан алмаштирилса, табиийки, λ ни λt билан алмаштириш лозим. У ҳолда Пуассон тақсимоти

$$W(k; \lambda t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad (21)$$

кўринишда бўлади.

Биз юқорида тасодифий воқеаларнинг вақт ўқи t бўйича тақсимотини кўрдик. Лекин шу воқеалар тақсимотини юза ҳажм (ёки фазовий ҳажм) бўйича куриш ҳам мумкин. Бунда вақт оралиғи урнига юза ёки ҳажм оралиғи бўлади.

2.2.4. полиномиал тақсимот

Биномиал тақсимотни қуйидагича умумлаштириш мумкин. Ҳар бир тажрибада тасодифий катталиқнинг $E_1, E_2, \dots, E_r$ қийматлари содир бўлиши мумкин бўлсин ва E_i га P_i ($i = 1, 2, \dots, r$) эҳтимолик мос келсин. Умумий ҳолда

$$P_1 + P_2 + \dots + P_r = 1.$$

n марта тажриба ўтказилганда, k_1 марта E_1 , k_2 марта E_2 ва x_k ларнинг келиб чиқиши (воқеаларнинг содир бўлиши) эҳтимоллиги

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} \quad (22)$$

булади, бунда

$$k_1 + k_2 + \dots + k_r = n.$$

(22)ни **полиномиал тақсимот** дейилади, чунки у $(P_1 + P_2 + \dots + P_r)^n$ полиномнинг ёйилмасидаги умумий ҳади билан бир хилдир.

2.3-§. УЗЛУКСИЗ ТАҚСИМОТ ФУНКЦИЯЛАРИ

2.3.1. ЭҲТИМОЛЛИКЛАР ЗИЧЛИГИ

Ўқдаги (бир ўлчовли фазодаги) эҳтимолликлар зичлиги $f(x)$ деб

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \quad (23)$$

функцияни айтилади:

Ҳар бир эҳтимоллик зичлигига F тақсимот функцияси мослаштирилади:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy. \quad (24)$$

Бу $F(x)$ функция 0 ва 1 орасида ўзгарадиган монотон функциядир. Агар $f(x)$ функция $a \leq x \leq b$ оралиқда мавжуд бўлиб, бу оралиқдан ташқарида нолга тенг бўлса, $F(x)$ шу $a \leq x \leq b$ оралиқда мавжуд бўлади, ундан ташқарида нолга тенг бўлади. (a, b) оралиққа

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \quad (25)$$

эҳтимоллик мос келади.

Кўп ўлчовли ҳол учун ҳам эҳтимолликлар зичлиги юқоридагига ўхшаш киритилади ва қуйидагича аниқланади:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2, \dots, dx_n = 1. \quad (26)$$

Икки ўлчовли фазода эҳтимолликлар зичлиги $f(x)g(y)$ нинг берилиши қуйидаги интеграл билан аниқланади:

$$P(A) = \int \int_{(A)} f(x)g(y) dx dy. \quad (27)$$

Муҳим хусусий ҳолни кўрайлик:

$$S = X + Y$$

Фараз қилайлик, $x + y \leq s$, $g(y) = G'(y)$ эканлигини назарда тутиб, (27)ни бундай ёзамиз:

$$P(x + y \leq s) = \int_{-\infty}^{\infty} G(s - x)f(x)dx \quad (28)$$

ёки, осонгина кўринадики,

$$P(x + y \leq s) = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)F(s - y)dy. \quad (29)$$

(28) ва (29) ифодалардан $X + Y$ нинг зичлиги қуйидагича аниқланади:

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(s - x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)F(s - y)dy \quad (30)$$

(30) тенгликни умумий ҳолда қуйидагича белгиланади:

$$f * g = \int_{-\infty}^{\infty} f(s - y)g(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(s - x)dx. \quad (31)$$

2.3.2. ЎРТАЧА ҚИЙМАТ. МОМЕНТЛАР

Тасодикий катталик эҳтимолликлари тақсимотининг муҳим хусусиятларидан бири — бу ўртача қиймат (математик кутилма)дир. Фараз қилайлик, x тасодикий катталикнинг қийматлари $x_1, x_2, \dots, x_r, \dots$ ва унинг эҳтимолликлари $P_1, P_2, \dots, P_r, \dots$ бўлсин. Бу ҳолда x нинг ўртача қиймати

$$\langle x \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i P_i \quad (32)$$

яқинлашувчи қатор билан аниқланади. Агар x нинг қийматлари узлуксиз бўлса, у ҳолда ўртача қиймат

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \quad (33)$$

яқинлашувчи интеграл билан аниқланади.

$F(x)$ тасодикий катталик x нинг тақсимот функцияси бўлсин. У ҳолда x нинг k тартибли моменти

$$\langle x^k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF(x) \quad (34)$$

интеграл ифода билан аниқланади. Бунда, агар x нинг дискрет қийматлари $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$ мос равишда $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$ эҳтимолликларга эга бўлса, k тартибли момент

$$\langle x^k \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k P_i \quad (35)$$

қатор билан аниқланади; агар x тасодикий катталик $f(x)$ тақсимот зичлигига эга бўлса, k тартибли момент

$$\langle x^k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx \quad (36)$$

интеграл билан аниқланади (бунда $k \geq 0$). Тартибда марказий момент $\langle x - \langle x \rangle \rangle^k$ каби аниқланади; бунда $k = 2$ бўлса, $\langle x - \langle x \rangle \rangle^2$ ни x нинг флукутацияси (дисперсияси) дейилади.

Кетма-кет тартибли моментларнинг берилиши асосида эҳтимолликларни аниқлаш масаласи моментлар муаммоси деб аталади.

2.3.3. ЭКСПОНЕНЦИАЛ ЗИЧЛИК

Ихтиёрий, муайян $a > 0$ учун

$$f(x) = e^{-ax}, F(x) = 1 - e^{-ax}; x \geq 0 \quad (37)$$

ва $x < 0$ булганда $f(x) = F(x) = 0$ бўлса, $f(x)$ функция *экспоненциал функция* дейилади.

2.3.4. НОРМАЛ ТАҚСИМОТ

Агар эҳтимолликлар зичлиги

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp[-(x - \langle x \rangle)^2 / 2\sigma^2] \quad (38)$$

қуринишга эга бўлса, тасодикий катталик x нинг эҳтимолликлар тақсимооти *нормал тақсимот* дейилади. Бунда σ^2 — тасодикий катталик x нинг флукутацияси (дисперсияси).

Бу ерда шуни айтиш лозимки, маълум шартлар бажарилганда, биномиал тақсимот нормал тақсимотга ўтади.

2.3.5. ТЕКИС ТАҚСИМОТ

Агар зичлик (a, b) оралиқда доимий ва $1/(b - a)$ га тенг бўлса, тасодикий катталик (a, b) оралиқда *текис тақсимланган* дейилади. Бу ҳолда эҳтимолликлар тақсимооти

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (39)$$

(0, 1) да аниқланган бўлади; бунда $a \leq x \leq b$.

2.3.6. ТАСОДИФИЙ ВЕКТОР

Фазодаги тасодифий вектор деб, тасодифий йўналишда ўтказилган, узунлиги тасодифий катталиқ (миқдор) бўлиб, йўналишга боғлиқ бўлмаган векторни тушунилади.

Тасодифий векторнинг эҳтимоллий хоссасини текшириш учун уни бирор ўққа, масалан, Ox ўққа проекциясининг эҳтимоллий хоссаларини текшириш етарли. Бунинг учун векторнинг узунлиги қийматлари тақсимооти V билан унинг проекцияси қийматлари тақсимооти орасидаги боғланишни билиш керак. Берилган йўналишдаги бирлиқ векторнинг Ox ўққа проекцияси x бўлсин. У ҳолда $L_x = xL$, (0, 1) оралиқда текис тақсимланган ва L га боғлиқ эмас. $X = x$ бўлганда $Lx \leq t$ воқеа фақат $L \leq t/x$ бўлгандагина содир бўлиши мумкин. Шунинг учун

$$F(t) = \int_0^1 V\left(\frac{t}{x}\right) dx, \quad t > 0. \quad (40)$$

Бундан тегишли зичликларни дифференциаллаб қуйидагини оламиз:

$$f(t) = \int_0^1 V\left(\frac{t}{x}\right) \frac{dx}{x} = \int_{t'}^1 V(y) \frac{dy}{y}, \quad (41)$$

Бундан ҳосила олсак:

$$-f'(t) = V(t). \quad (42)$$

Шундай қилиб, тасодифий векторларнинг тасодифий узунлиги билан унинг тасодифий проекцияси орасида боғланиш аниқланди. (41) муносабатдан V маълум бўлса, f ни топиш учун, (42) муносабатдан эса f маълум бўлса V ни топиш учун фойдаланиш мумкин.

Фараз қилайлик, тасодифий проекция катталиқ (миқдор) қийматлари нормал тақсимоот билан аниқлансин:

$$f(t) = 2\eta(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-t^2/2}.$$

У ҳолда тасодифий вектор узунлиги қийматлари эҳтимоллари зичлиги V (42) асосида қуйидагича аниқланади:

$$V(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} t^2 e^{-t^2/2}, \quad t > 0. \quad (43)$$

Бу Максвелл тезликлар тақсимоти қонунидир.

2.3.7. ГАММА-ЗИЧЛИК

Гамма-функция

$$\Gamma(\nu) = \int_0^{\infty} x^{\nu-1} e^{-x} dx \quad (44)$$

интеграл ифода билан аниқланади, бунда $\nu = 0, 1, 2 \dots$ бутун сонлар учун $\Gamma(\nu + 1) = \nu!$ Умумий ҳолда эса, ν миқдор $(0, \infty)$ оралиқда ўзгарганда, (44)ни бўлаклаб интеграллаш орқали аниқланади: $\Gamma(\nu + 1) = \nu \Gamma(\nu) \int_{\beta, \nu}(x)$ гамма-зичлик

$$\int_{\beta, \nu}(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \beta^{\nu} x^{\nu-1} e^{-\beta x} dx \quad (45)$$

формула билан аниқланади.

Гамма-зичликлар йиғиштирма операциясига нисбатан ёпиқ, яъни:

$$\int_{\beta, \nu} * \int_{\beta, \nu} = \int_{\beta, \nu+\nu}, \quad \mu > 0, \quad \nu > 0, \quad (46)$$

2.3.8. ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИЯЛАР

Т а ъ р и ф. Тасодифий катталик (миқдор) эҳтимоллик-лари зичлиги $f(x)$ га эга бўлсин. Бу ҳолда ҳақиқий катталик (миқдор) учун $f(x)$ зичликнинг характеристик функцияси $\varphi(\xi)$ қуйидагича аниқланади:

$$\varphi(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi x} f(x) dx \quad (47)$$

ёки

$$\varphi(\xi) = \langle e^{i\xi x} \rangle. \quad (48)$$

Равшанки, умумий ҳолда

$$\varphi(\xi) = u(\xi) + i v(\xi) \quad (49)$$

М а с а л а. Гамма-тақсимотнинг характеристик функцияси $\varphi(\xi)$ ни аниқланг.

Е чи ш.

$$\begin{aligned}\varphi(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi x} f_{\beta^y}(x) dx = \frac{\beta^y}{\Gamma(y)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi x} x^{y-1} e^{-\beta x} dx = \\ &= \frac{\beta^y}{\Gamma(y)} \int_{-\infty}^{\infty} x^{y-1} e^{-\beta \left(1 - \frac{i\xi}{\beta}\right) x} dx = \frac{\beta^y}{(1 - i\xi/\beta)^y \Gamma(y)} \int_{-\infty}^{\infty} x^{y-1} e^{-\beta x} dx = \frac{1}{(1 - i\xi/\beta)^y}.\end{aligned}$$

2.3.9. КЎП АРГУМЕНТЛИ ТАҚСИМОТ ФУНКЦИЯЛАР

Бир нечта тасодифий катталиклар $x_1, x_2, x_3, \dots$ га боғлиқ воқеанинг эҳтимолликлари $dW(x_1, x_2, \dots)$ қуйидагича ёзилиши мумкин:

$$\left. \begin{aligned}dW(x_1, x_2) &= f(x_1, x_2) dx_1 dx_2; \\ dW(x_1, x_2, x_3) &= f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3; \\ &\dots\dots\dots \\ dW(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n.\end{aligned} \right\} \quad (50)$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ тасодифий катталикларга боғлиқ мураккаб тасодифий катталик $L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ нинг ўртача қиймати (моменти)

$$\langle L \rangle = \int_{(x_1, \dots, x_n)} L(x_1, x_2, \dots, x_n) f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad (51)$$

ифода билан аниқланади.

Фараз қилайлик, тасодифий катталик уч улчовли (яъни учта x, y, z тасодифий катталикларга боғлиқ) бўлсин. У ҳолда:

$$dW(x, y, z) = f(x, y, z) dx dy dz. \quad (52)$$

Фазонинг маълум қисмида аниқланган тақсимот функцияси $W(x, y, z)$ ни топиш учун (52) ни $dx dy dz$ "куб"лар бўйича интеграллаш зарур, яъни:

$$W(x, y, z) = \int \int \int_{(V)} f(x, y, z) dx dy dz. \quad (53)$$

(52) ифодада Декарт координаталар тизимидан сферик координаталар тизимига ўтайлик. У ҳолда:

$$\begin{aligned}dW(x, y, z) &= dW(r, \theta, \varphi) = f(x, y, z) dx dy dz = \\ &= f(r, \theta, \varphi) |J| d\theta d\varphi dr = f(r, \theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi r^2 dr.\end{aligned}$$

Бу ифодани бурчаклар бўйича интеграллаб, чиққан ифодани $dW(r)$ билан белгилайлик:

$$\begin{aligned} \int_{(\theta, \varphi)} \int dW(r, \theta, \varphi) &= dW(r) = r^2 dr \int_{(\theta, \varphi)} f(r, \theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \\ &= \varphi(r) 4\pi r^2 dr = \varphi(r) dV = \psi(r) dr. \end{aligned} \quad (54)$$

Бунда $dV = 4\pi r^2 dr$ радиуслари r ва $r + dr$ бўлган икки сферик сирт орасидаги элементар ҳажм.

Умумий ҳолда кўп аргументли тақсимот функциясини ёки тасодифий катталиқ моментини топишда фазони $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$ "гиперкуб" ларга бўлиб, шулар бўйича интеграллаб аниқланади (бундай усул каноник тақсимот функциядан фойдаланганда учрайди, кейинги бобда буни кўрамиз) ёки фазони гипersфералар ёрдамида $dW_n = c n r^{n-1} dr$ элементар ҳажмларга бўлиб, шу ҳажмлар (ёки радиус қийматлари) бўйича интеграллаб аниқланади (бу ҳол микроҳолатларнинг энергиянинг қийматлари бўйича аниқланиши билан боғлиқ масалалар қаралганда учрайди).

III БОБ МУВОЗАНАТДАГИ ТИЗИМ МИКРОҲОЛАТЛАРИ ТАҚСИМОТИ

3.1-§. КИРИШ

Маълумки, тақсимот функцияси ёки зичлик оператори учун Лиувилль ва Нейман тенгламалари мавжуд. Агар тизим термодинамик мувозанатда ёки стационар ҳолатда бўлса, бу тенгламаларни гамильтониан $H(p, q)$ нинг ихтиёрий функцияси $f(H)$ қаноатлантиради. Демак, стационар ёки мувозанат ҳолатни тавсифлайдиган тақсимот функциясини ихтиёрий $f(H)$ функциялардан танлаб олиш учун албатта тизимнинг ҳолатига тегишли, қўшимча маълумот зарур.

Мувозанатдаги ҳолатнинг тақсимот функциясини аниқлаш учун аввал Гиббс (1901), кейин Толмен (1938) термодинамик мувозанатдаги яккаланган тизим микроҳолатлари тенг эҳтимолликларга эга, дейилган фаразни айтадилар.

Табииyki, тизимнинг ташқи муҳит билан боғланиш характерига қараб, аниқланиши лозим бўлган тақсимот функциялари ҳам ҳар хил бўлади. Масалан, яккаланган тизим, яъни ташқи муҳит билан ўзаро таъсирда бўлмаган ва, де-

мак, энергияси ва зарралар сони доимий бўлган тизим ҳолати учун *микрoкaнoник тақсимoт* деб аталувчи тақсимoт *функцияси* киритилади.

Реал ҳолларда тизим ташқи муҳит билан ўзарo таъсирда бўлади, яъни уни мутлақo яккалaш мумкин эмас. Агар қарaлaётган тизим ташқи муҳит билан фақат энергия алмaшинa олсa, яъни у ёпиқ бўлсa (бундaй тизимни адабиётдa купинчa ташқи муҳит (термостат) билан иссиқлик контактидаги тизим деб аталади), бундaй тизимнинг микрoҳoлатлари кaнoник тақсимoт функцияси oрқaли aниқлaнaди.

Агар тизим ташқи муҳит билaп ҳам энергия, ҳам мoддa (зарралар) алмaшинa олсa, уни очик тизим деб аталади, бундaй тизимнинг микрoҳoлати кaттa кaнoник тақсимoт функцияси билан тaвcифлaнaди.

Биринчи мaртa В. Гиббс статистик ансамбль aсoсидa тақсимoт функциясини aниқлaди. Бундa мувoзaнaтдaги ҳoлат тақсимoт функцияси фақат тизим ҳарaкaти интегрaллари — гaмилътaниaн, импульс ва импульс мoмeнтларигaгинa бoғлиқ бўлиши мумкин.

Бирoқ тақсимoт функцияси, жумлaдaн, Гиббcнинг кaнoник тақcимoти, мaтeмaтик нуқтaн нaзaрдaн қaтъий исбoт қилинмaгaн. (Мaсaлaн, Айзeншниц [7], Зубaрeв [5] вa бoшқaларгa қaрaнг). Мaшхуp япoн физиги Р. Кубo статистик физикa aсoсидaги қийинчиликлaр ҳaқиdа:

"Аниқ фaнлар oрaсидa физикa eтaкчи уринни eгaллaйди, статистик мeхaникa эcа унинг aсoсий бўлимларидaн бири. Энди биз, статистик мeхaникa aсoсларидa бир қaнчa нoaниқликлaр бoр, деб aйтcак, бу ўқувчини ҳaйpoн қилaди вa тaaжжублaнтирaди. Лeкин, aҳвoл ҳaқиқaтaн ҳам шундaй" дeгaн фикрини aйтгaн эди [4].

Мaълумки, статистик физикa усули билaн ҳисoблaнгaн қиймaтлар тaжрибaдa кузaтилaдигaн рeaл кaттaликлaр қиймaтларигa мoс кeлaди. Шу сaбaбли, статистик физикaгa бaғишлaнгaн адабиётдa Гиббс тақcимoт функциясининг тaдбиқигa эътибoр бeрилaди. Биз эcа қуйидa (шу бoбдa) статистик физикa усулини вa у билaн бoғлиқ тақcимoт функциясининг кўринишларини aсoслaшгa aсoсий эътибoрни қaрaтaмиз. Бизнингчa, бу мaсaлaни муҳoкaмa қилиш услубий нуқтaн нaзaрдaн ҳам қизиқaрлидир.

Мaълумки, N тa зaррaдaн ибoрaт тизимнинг динaмик микрoскопик ҳoлати зaррaлар ҳарaкaти тeнглaмaлари (мa-

салан, классик механикада Гамильтон тенгламалари ёки квант механикасида Шредингер тенгламаси) асосида аниқланади. Статистик физикада тизимнинг статистик микроҳолати Лиувилль тенгламаси билан тавсифланади.

Мувозанатдаги статистик физикада Лиувилль тенгламасини қаноатлантирувчи ихтиёрий функция $f(H)$ нинг ошкор кўринишини аниқлаш бош масаладир.

В. Гиббс статистик ансамбль тушунчасини киритиб, унинг асосида $f(H)$ нинг ошкор кўриниши учун

$$f(H) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} \quad (1)$$

ифодани ёзди. Бунда $H = E$ тизимнинг тулиқ энергияси, β ва Z берилган тизим учун доимий параметрлар бўлиб, термодинамика муносабатлари билан таққослаш ва нормалаш шarti асосида

$$\beta = 1/kT; Z = \exp(-\beta F) \quad (2)$$

эканлиги аниқланади; F — тизимнинг эркин энергияси, T унинг температураси.

Статистик физика фани яратилишида ансамбль тушунчаси киритилиши ва шу асосда (1) ифоданинг аниқланиши фундаментал аҳамиятга эга бўлсада, (бунда Р. Винер квант механика ва нисбийлик назариялари кашф қилинишидан устун қўяди [8]) (1) ифодани асослашда, масалан, термодинамикага мурожаат қилиниши назариянинг мантиқий жиҳатдан мукаммал эмаслигидан далолат беради.

Ҳақиқатан ҳам, статистик физикани асослашда купгина ноаниқликлар мавжуд. Зубарев Д. Н. айтганидай "Ансамбль назариясини яратиш ва олинган тақсимот функцияларни асослаш мураккаб ва ҳозиргача тула ечилмаган муаммодир. Хатто, бу аниқ ечим қандай даражада мумкинлиги ноаниқдир". [5, 27-бет].

Биз шу ерда таъкидлаймизки, гарчи Гиббс тақсимоти функцияси, назарий-мантиқий жиҳатдан қатъий исбот қилинмаган бўлса-да, бунинг ўринли эканлигига ундан келиб чиқадиган натижалар термодинамика муносабатларига мувофиқ келиши ва, демак, тажриба натижаларига мос келиши билан қаноат ҳосил қилинар эди.

Шундай қилиб, Гиббс ансамбли ва унинг асосида тақсимот функцияларини асослаш қатъий айтилганда, узилокесил, тула ҳал қилинмаган масаладир. (қ. [4, 5, 9, 10] ва

бошқалар). Юқорида айтилган сабаблар туфайли, информация назарияси тушунчаларига таяниб, Шеннон формуласи асосида статистик физиканинг асосини куриш, тақсимот функцияларини асослаш мумкин эди. Аммо бу йулни рўёбга чиқаришда услубий жиҳатдан қийинчиликлар бор эди.

Биз статистик физикани асослашдаги бу қийинчиликлар, ноаниқликлар ва услубий қийинчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилдик. Бошқача айтганда, статистик физика ва статистик термодинамика асосларини ҳам назарий, ҳам услубий жиҳатдан мукаммаллаштиришга уриндик.

3.2-§. ЯККАЛАНГАН ТИЗИМ. МИКРОКАНОНИК ТАҚСИМОТ

Таърифга асосан, яккаланган тизимнинг энергияси E ва зарралар сони N доимийдир, яъни:

$$E = E_0 = \text{const}, \quad N = \text{const} \quad (1)$$

Бу ҳолда микроҳолатлар эҳтимолликлари тенг эҳтимолли статистик микроҳолатлар каби аниқланади: $W_1 = W_2 = \dots = W$. Нормалаш шarti:

$$\sum_i W_i = W \sum_i 1_i = W N_A = 1. \quad (2)$$

Бу ифодадан

$$W = \frac{1}{N_A}. \quad (3)$$

Барча микроҳолатлар учун бир хил бўлган (3) тақсимотни *микромиканоник тақсимот* дейилади. Энтропия эса яккаланган тизим учун

$$S = - \sum_i W_i \ln W_i = - \sum_i \left(\frac{n_i}{N} \ln \frac{n_i}{N} \right) = \ln N_A, \quad \frac{n}{N} = \frac{1}{N_A} \quad (4)$$

ифода билан аниқланади.

Тизимнинг микроҳолатини энергия қиймати орқали аниқлангани ва энергия фақат битта қиймат $E = E_0$ ни қабул қилгани туфайли тизимнинг бундай микроҳолати

битта бўлади ва унинг эҳтимоллиги $dW(E)$ узлуксиз ҳол учун

$$dW(E) = \delta(E - E_0)dE \quad (5)$$

ифода билан аниқланади; бунда эҳтимолликлар зичлиги $\delta(E - E_0)$ Диракнинг дельта-функцияси. Нормалаш шарти

$$\int_{(E)} dW(E) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(E - E_0)dE = 1 \quad (6)$$

кўринишга эга.

3.1-масала. Яккаланган тизим учун нормалаш шарти $\sum W_i = 1$ ва энтропия ифодаси $S = -\sum W_i \ln W_i$ дан фойдаланиб микроканоник тақсимот функциясини аниқланг.

Э с л а т м а: Мувозанат ҳолатида S максимум қийматга эга ва у ўзгармайди. Е ч и ш:

Нормалаш шарти ва энтропия ифодалари вариацияларини оламир:

$$\delta \sum W_i = 0, \quad (1)$$

$$\delta S = -\delta \sum W_i \ln W_i = 0 - \sum \ln W_i \delta W_i = 0. \quad (2)$$

(1) ни Лагранжнинг номаълум коэффициентини α га кўпайтириб, сўнг уни (2)га қўшиб, қуйидагини оламир

$$\sum W_i (\alpha - \ln W_i) \delta W_i = 0. \quad (3)$$

W_i ихтиёрий ўзгарганда (3) даги тенглик бажарилиши учун δW_i олдидаги коэффициентлар нолга тенг бўлиши шарт, яъни

$$\alpha - \ln W_i = 0. \quad (4)$$

бўлиши керак. Бундан барча ҳолатлар учун

$$W_i = e^\alpha \quad (5)$$

тақсимот функциясини оламир. W_i ни нормалаш шартига қўямиз:

$$\sum_i W_i = \sum_i e^{\alpha} - 1_i = e^{\alpha} \sum_i 1_i = 1$$

Бундан ҳолатлар сони $N_A = \sum_i 1_i$ учун

$$N_A = e^{\alpha}$$

ифодани оламиз; демак,

$$W_i = 1/N_A. \quad (6)$$

Бу ҳолда тизимнинг ҳар бир микроҳолатда бўлиш эҳтимоллиги W_i , микроҳолатлар эҳтимолликлари ўзаро тенг бўлганлиги учун, микроҳолатлар сонининг тескари қиймати $1/N_A$ га тенг. Бошқача айтганда, 1 ни микроҳолатлар сони N_A га бўлиб, микроҳолатлар эҳтимоллиги W_i топилади. Демак, микроканоник тақсимот учун асосий матндаги ифодани оламиз. (6) ни энтропия ифодасига қўйиб маълум ифодани оламиз:

$$S = \ln N_A.$$

3.3-§. БЕРК ТИЗИМ. КАНОНИК ТАҚСИМОТ

Таъриф буйича, берк тизимда зарралар сони ўзгармайди, яъни $N = \text{const}$. Ташқи тизим билан қаралаётган тизим контактда бўлгани туфайли унинг E энергияси $(0, \infty)$ оралиқда ўзгариши мумкин. Тизим термодинамик мувозанат ҳолатда бўлганда унинг ўртача энергияси, яъни ички энергияси

$$U = \sum_i E_i W_i \quad (7)$$

доимий бўлади.

Бундай тизимнинг микроҳолатлари эҳтимолликлари тақсимооти функцияси

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad (8)$$

узлуксиз ҳол бўлганда эса тақсимот функцияси

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} \quad (9)$$

эканлигини биринчи бобда аниқлаган эдик. (8) ёки (9) каноник тақсимоёт дейилади. Бундаги номаълум Z нинг ифодасини нормалаш шарти

$$\sum_i W_i = 1 \quad (10)$$

дан аниқланади:

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

Z — статистик йиғинди (микроҳолатлар узлуксиз узгарган ҳолда статистик интеграл) дейилади. Иккинчи номаълум коэффициент β ни (7) дан аниқланади.

3.2-м а с а л а. Берк тизим учун каноник тақсимоёт функциясини Гиббс формуласи

$$S = -\sum_i W_i \ln W_i, \quad (1)$$

ички энергия ифодаси (7) ва нормалаш шарти (10) ифодалардан фойдаланиб аниқланг.

Е ч и ш. 1. Анъанавий усул. Мувозанатдаги ҳолат учун (7), (10) ва энтропия S нинг вариацияларини олиб,

$$\delta U = \delta \sum_i E_i W_i = 0; \quad (2)$$

$$\delta \sum_i W_i = 0; \quad (3)$$

$$\delta S = -\delta \sum_i W_i \ln W_i = -\sum_i \ln W_i \delta W_i = 0 \quad (4)$$

тенгламаларга эга бўламиз. (2) ва (3) ни номаълум коэффициентлар β ва α га кўпайтириб, сўнг (2), (3) ва (4) ни қўшиб,

$$\sum_i (\alpha - \ln W_i - \beta E_i) \delta W_i = 0 \quad (5)$$

ифодани оламиз.

W_i ихтиёрий узгарганда (5) тенглик бажарилиши учун коэффициентлар нолга тенг бўлиши шарт, яъни

$$\alpha - \ln W_i - \beta E_i = 0 \quad (6)$$

булиши керак. Бундан изланаётган каноник тақсимотни топамиз

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad (7)$$

бунда

$$\frac{1}{Z} = e^{\alpha} \quad (8)$$

белгилаш киритилди. Каноник тақсимотдаги иккита номаълум коэффициент Z (ёки α ва β ни нормалаш шарти ва ички энергия ифодаларидан фойдаланиб аниқланади; ҳақиқатан, (7) ни нормалаш шартига қўйиб,

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (9)$$

ифодани оламиз. β ни аниқлашни кейинроқ кўрамиз. (7) ни ички энергия ифодасига қўямиз.

$$U = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\sum_i e^{-\beta E_i} \right) = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}.$$

Демак,

$$U = - \left| \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right|_{E_1, E_2, \dots} \quad (10)$$

(7) ни энтропия ифодаси (1) га қўямиз:

$$S = - \langle \ln W_i \rangle = \beta \langle E_i \rangle + \ln Z.$$

Демак,

$$S = \beta U + \ln Z. \quad (11)$$

2. Янги усул. Квазистатик (мувозанатдаги) жараёнлар учун нормалаш шарти $\sum W_i = 1$, энтропия ифодаси $S = - \sum W_i \ln W_i$ ва ички энергия $U = \sum E_i W_i$ нинг узгаришларини ёзайлик:

$$0 = \sum_i dW_i, \quad (12)$$

$$dS = - \sum_i \ln W_i dW_i, \quad (13)$$

$$dU = \sum_i W_i dE_i + \sum_i E_i dW_i. \quad (14)$$

Энергия ўзгаришларининг (камаишларининг) ўрта-часи $-\sum W_i dE_i = -\langle dE \rangle$ тизим томонидан бажарилган dA ишга тенг, яъни $-\langle dE \rangle = dA$. Шунга биноан (14) ни қайта ёзамиз:

$$\sum_i E_i dW_i = dU + dA \quad (15)$$

Термодинамиканинг биринчи қонунини ёзамиз:

$$dQ = dU + dA. \quad (16)$$

(15) билан (16) ни таққослаб, иссиқлик ифодасини оламиз:

$$dQ = \sum_i E_i dW_i. \quad (17)$$

(12) ни α га купайтириб, сўнгра уни (13) га қўшиб, мувозанатдаги жараён учун

$$dS = \sum_i (\alpha - \ln W_i) dW_i, \quad (18)$$

тенгликни оламиз.

Мувозанатдаги жараёндаги иссиқлик миқдори dQ_0 ни dS га тенглаштириш учун, уни β га купайтирамиз*, яъни

$$dS = \beta dQ_0 = \sum_i \beta E_i dW_i. \quad (19)$$

(18) билан (19)ни таққослаб, қуйидагини оламиз:


$$\alpha - \ln W_i = \beta E_i$$

* Берилган тизим учун шундай β купайтувчи (математик нуқтан назардан шундай интегралловчи купайтувчи) мавжуд деб қаралди.

ёки бундан каноник тақсимотни аниқлаймиз

$$W_i = e^{\alpha} e^{-\beta E_i} = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}.$$

3.3-масала. Микроҳолатлар тизим энергияси қийматлари E билан аниқланади. Тизим энергиясининг қиймати (O, E) оралиқда бўлмасдан, балки унинг радиуслари E ва $E + dE$ бўлган икки гиперсфера билан чекланган элементар ҳажмдаги ҳолатлардан бирида бўлиши эҳтимоли аниқлансин (3.1-рasm).



3.1-рasm.

Еч и ш. Икки гиперсфера орасидаги элементар ҳажмда статистик микроҳолатлар сони dn га тенг бўлсин. Бу ҳолда тизим энергияси E нинг қиймати радиуслари E ва $E + dE$ бўлган гиперсфералар билан чекланган элементар ҳажмдаги dn ҳолатлардан ихтиёрий бирида бўлиш эҳтимоли $dW(E)$ асосий постулатга асосан dn га пропорционал, яъни:

$$dW(E) \sim dn(E) \quad (1)$$

Тизим энергиясининг қийматлари (O, E) оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги $P(E)$ ни аниқлайлик. Тизим энергиясининг $(O, E + dE)$ оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги $P(E + dE)$ га тенг. Бу $P(E + dE)$ функцияни dE нинг даражалари бўйича қаторга ёйайлик:

$$P(E + dE) = P(E) + \frac{\partial P}{\partial E} dE + \dots \quad (2)$$

Иккинчи томондан, энергия қийматларининг $(O, E + dE)$ оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги энергиянинг (O, E) оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги $P(E)$ нинг шу энергия қийматининг $(E, E + dE)$ оралиқда ҳам бўлмаслик эҳтимоллиги P га кўпайтмасидан иборат, яъни:

$$P(E + dE) = P(E)P. \quad (3)$$

Эҳтимолликларнинг тенг тақсимланиши ҳақидаги асосий постулатга биноан энергия қийматининг $E, E + dE$ оралиқда бўлиш эҳтимоллиги dE га мутаносиб. Шунинг учун

$$P + \beta dE = 1 \quad (4)$$

Бунда β аниқланиши лозим бўлган "масштаб" параметри (3) да:

$$P(E + dE) = P(E) - P(E)\beta dE. \quad (3)$$

(2) қаторда биринчи иккита ҳад билан чегараланиб, сўнг уни (5) билан тенглаштирсак, қуйидаги тенгламани оламиз:

$$\frac{dp(E)}{p(E)} = -\beta dE.$$

Бундан

$$P(E) = A e^{-\beta E}$$

тенгликни оламиз. Узунлиги нолга тенг бўлган $(0, E)$ оралиқ тизимнинг бўлмаслиги муқаррар воқеа ҳисобланади. Муқаррар воқеанинг эҳтимоллиги, маълумки, бирга тенг, яъни $P(0) = A = 1$. Демак,

$$P(E) = e^{-\beta E}. \quad (6)$$

Шундай қилиб, изланаётган эҳтимоллик $dW(E)$ эҳтимолликларни кўпайтириш теоремасига асосан, $dW(E) \sim e^{-\beta E} dn$ ёки

$$dW(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} dn \quad (7)$$

ифода билан аниқланади; Z — параметрни нормалаш шартидан топилади. (7) дан эҳтимоллик зичлиги — каноник тақсимот функцияси $f(E)$ учун

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} \quad (8)$$

ифодага эга бўламиз.

1-и 3-о ҳ. Эҳтимолликлар зичлиги ифодасидаги тизимнинг тулиқ энергияси (гамилтониан) E умумлашган координаталар $q_1, q_2, \dots$ ва умумлашган импульслар $p_1, p_2, \dots$ га боғлиқ, яъни $E = E(p, q)$. Статистик физикада умумлашган координаталар ва умумлашган импульслар (қисқача уларни q, p билан белгилаймиз) ва, демак, $E(p, q)$ гамильтониан тасодифий катталиклардир. Шунингдек, dn энергия E га ва, демак, (p, q) га боғлиқ, яъни $dn(E)$ ёки $dn(p, q)$.

Таксимот функциясидаги Z ва масштаб параметр β нинг микроҳолатларига, яъни умумлашган координатлар ва умумлашган импульсларга боғлиқ бўлмаган катталар.

3-и 30 х. Статистик физикада β ни $1/kT$ га тенг деб қабул қилинган; бунда k — Больцман доимийси, T эса тизимнинг Кельвин шкаласида олинган температураси. Бу ҳолда эҳтимолликлар тақсимооти функцияси (8)

$$f(E) = \frac{1}{Z} \exp(-E/kT) \quad (9)$$

кўринишга келади. (9) **каноник тақсимот** дейилади.

3.4-§. ОЧИҚ ТИЗИМ. КАТТА КАНОНИК ТАҚСИМОТ

Очиқ тизимнинг таърифга кўра, унинг энергияси E ва зарралари сони N ўзгариши мумкин, яъни улар доимий бўлмайди. Аммо очиқ тизим термодинамик мувозанат ҳолатида бўлса, унинг ўртача энергияси (ички энергияси)

$$U = \sum_i E_i W_i \quad (10)$$

ва зарраларнинг ўртача сони

$$\langle N \rangle = \sum_i N_i W_i \quad (11)$$

ўзгармайди.

Очиқ тизим учун ҳам аввалги усул билан E_i ва N_i ларга боғлиқ тақсимот функциясининг

$$W_i = \frac{1}{Z(U, \langle N \rangle)} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \quad (12)$$

ифодасини олиш мумкин. Бунда μ , яна битта номаълум коэффициент бўлиб, у (11) ифода асосида топилади; Z ва β ни нормалаш шarti

$$\sum_i W_i = 1 \quad (13)$$

ва ички энергия ифодаси (10) дан фойдаланиб топилади. Масалан, (12) ни (13) га қўйиб қуйидагини топамиз:

$$Z(U, < N >) = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}. \quad (14)$$

(12) ни *катта каноник тақсимот функцияси* дейилади, $Z(U, < N >)$ ни эса *статистик йиғинди* дейилади.

Биз тизим зарралари сони (ёки эркинлик даражалари сони) доимий бўлганда унинг энергияси қийматлари тақсимотини тавсифлайдиган каноник тақсимотни кўрдик. Аммо амалда фақатгина энергияси эмас зарралар сони ва, демак, эркинлик даражалари сони ҳам ўзгарадиган тизимлар ҳам учрайди. Масалан, суюқликдан бугга ва бугдан суюқликка молекулалар ўтиб туриши мумкинки, суюқликни ҳам, бугни ҳам зарралари сони ўзгарувчи тизимлар деб қаралиши мумкин. i тизим ташқи тизим билан зарралар алмашиб турсин. Ташқи тизим билан бирликда берк тизим (хусусий ҳолда, яккаланган тизим) ҳосил қилсин. Бундай берк тизимнинг мувозанат ҳолати учун каноник тақсимот ўринли:

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}. \quad (15)$$

Бунда Z — умумий берк тизим учун ҳам, биз қараётган i тизим учун ҳам умумий параметр. Ёзамиз:

$$\frac{1}{Z} e^{\beta F}. \quad (16)$$

Бунда $F = \Phi - PV$ аддитив функция $F = \sum_i F_i$, бундан:

$$F_i = \Phi_i - PV_i. \quad (17)$$

F_i , Φ_i ва V_i — қаралаётган i очиқ тизимнинг мос равишда эркин энергияси, термодинамик потенциали ва ҳажмидан иборат эканини кейинроқ кўрамиз.

Умумий берк тизим энергияси E , зарралар сони N ва унинг ҳажми V қуйидагича аниқланади:

$$E = \sum_i E_i, N = \sum_i N_i, V = \sum_i V_i. \quad (18)$$

Бу ерда тизимчаларнинг ўзаро таъсир энергияси ҳисобга олинилади. Мувозанат ҳолатда химик потенциаллар

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots + \mu_r = \mu \quad (19)$$

эканлигини эътиборга олиб ва $\Phi_i = N_i \mu_i = N_i \mu$ ни ҳисобга олиб, умумий тақсимот функцияси $f(E)$ учун ушбу ифодани ёзамиз:

$$\begin{aligned} f(E) &= \exp\left[\sum_i (\mu N_i - E_i - PV_i)\right] = \\ &= e^{-\beta PV} \exp\left[\sum_i (\mu N_i - E_i)\right] = \frac{1}{Z} e^{-\beta(E_N - \mu N)}. \end{aligned} \quad (20)$$

Бунда:

$$\frac{1}{Z} = \exp(-\beta PV); \quad PV = \theta \ln Z. \quad (21)$$

Агар (20) да N ўзгарувчи деб қаралса, нормалаштириш шартидан катта каноник тақсимотдаги статистик интеграл (ёки йиғинди) Z учун ушбу ифодани оламиз:

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{N=0}^{\infty} \int e^{-\beta(E_N - \mu N)} dn(p, q) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \int e^{-\beta E_N} dn(p, q) = \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_N. \end{aligned} \quad (22)$$

Бунда узлуксиз ҳол учун:

$$Z_N = \int e^{-\beta E_N} dn, \quad (23)$$

дискрет ҳол учун:

$$Z_N = \sum_i e^{-\beta E_{iN}}, \quad (24)$$

E_{Ni} — N та заррадан иборат тизимнинг i -ҳолатдаги энергияси. (20) ифодани **катта каноник тақсимот** дейилади; (22) ифодани эса очиқ тизим учун **статистик интеграл** ёки **йиғинди** дейилади.

3.4-масала. Очиқ тизим учун асосий матндаги (10), (11), (13) ва энтропия ифодаси

$$S = -\sum W_i \ln W_i \quad (1)$$

дан фойдаланиб катта каноник тақсимотни аниқланг.

Е ч и ш. Мувозанатдаги ҳол учун

$$\delta U = \delta \sum_i E_i W_i = 0, \quad (2)$$

$$\delta \langle N \rangle = \delta \sum_i N_i W_i = 0, \quad (3)$$

$$\delta \sum_i W_i = 0, \quad (4)$$

$$\delta S = -\delta \sum_i W_i \ln W_i = -\sum_i \ln W_i \delta W_i = 0 \quad (5)$$

тенгламаларни оламиз. Бу (2), (3), (4) тенгламаларни номаълум коэффициентлар β , $-\beta\mu$, α га мос равишда кўпайтириб, (5) ни ҳам эътиборга олиб, қуйидаги умумий ифодани оламиз

$$\sum_i (\alpha - \ln W_i - \beta E_i + \beta\mu N_i) \delta W_i = 0. \quad (6)$$

Аввалги 1, 2 масалалардаги каби, бундан W_i ни аниқлаймиз:

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}. \quad (7)$$

(7) ни **катта каноник тақсимот** дейилади, бунда

$$\frac{1}{Z} = e^{\alpha} \quad (8)$$

белгилаш киритилди; номаълум коэффициентлар β ва μ (10) ва (11) шартлар асосида топилади. (7) ни (13) га қўйиб статистик йиғинди ифодаси Z ни оламиз. (7) ни энтропия S ифодасига қўйиб, мувозанат ҳолат энтропияси учун қуйидаги ифодани оламиз:

$$S = -\sum_i W_i (-\ln Z - \beta E_i + \beta\mu N_i) = \ln Z + \beta U - \beta\mu \langle N \rangle. \quad (9)$$

3.5-масала. Термодинамик потенциал Φ учун

$$\Phi = \mu, \langle v \rangle = U - \theta S + PV \quad (10)$$

дан фойдаланиб, $PV = \theta \ln Z$ тенгликни исбот қилинг.

Е ч и ш. Таърифга кура,

$$\begin{aligned} S &= \sum_i W_i \ln W_i = - \langle \ln W_i \rangle = - \langle -\ln Z - \beta(E_i - \mu_i v_i) \rangle = \\ &= \ln Z + \beta \langle E_i \rangle - \beta \mu_i \langle v_i \rangle = \ln Z + \beta U - \beta \Phi = \\ &= \ln Z + \beta U - \beta(U - \theta S + PV); \end{aligned}$$

$$S = \ln Z + \beta \theta S - \beta PV.$$

Бунда $\theta\beta = 1$. Демак,

$$PV = \theta \ln Z.$$

3.6-масала. Яккаланган тизимда ички жараёнлар (масалан, флуктуациялар), "реакциялар" туфайли "тузилишлар" (тартиблиликлар), "бузилишлар" бўлиб туриши мумкин. Бу ҳолда тизимни характерловчи "қисмлар" ("молекулалар" ёки улардан тузилган "комплекс" молекулалар) сони ўзгариб туради. Шу туфайли тизимни характерловчи "эркинлик даражалари сони" ν ҳам ўзгариб туради. Аммо тизим термодинамик мувозанат ҳолатида бўлганда бу ν соннинг ўртачаси, яъни

$$\langle \nu_i \rangle = \sum_i \nu_i W_i \quad (11)$$

ўзгармайди. Тизим микроҳолатлари эҳтимолликларининг "эркинлик даражалари"

$$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_i$$

буйича тақсимотини аниқланг.

Е ч и ш. Яккаланган тизим учун умумий ифодалар маълум:

$$\sum_i W_i = 1 \quad (12)$$

$$- \sum_i W_i \ln W_i = S \quad (13)$$

Мувозанатдаги ҳолат учун:

$$\delta \sum_i W_i = 0, \quad (14)$$

дан фойдаланиб катта каноник тақсимотни аниқланг.

Е ч и ш. Мувозанатдаги ҳол учун

$$\delta U = \delta \sum_i E_i W_i = 0, \quad (2)$$

$$\delta \langle N \rangle = \delta \sum_i N_i W_i = 0, \quad (3)$$

$$\delta \sum_i W_i = 0, \quad (4)$$

$$\delta S = -\delta \sum_i W_i \ln W_i = -\sum_i \ln W_i \delta W_i = 0 \quad (5)$$

тенгламаларни оламиз. Бу (2), (3), (4) тенгламаларни номаълум коэффициентлар β , $-\beta\mu$, α га мос равишда қўпайтириб, (5) ни ҳам эътиборга олиб, қуйидаги умумий ифодани оламиз

$$\sum_i (\alpha - \ln W_i - \beta E_i + \beta\mu N_i) \delta W_i = 0. \quad (6)$$

Аввалги 1, 2 масалалардаги каби, бундан W_i ни аниқлаймиз:

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad (7)$$

(7) ни **катта каноник тақсимот** дейилади, бунда

$$\frac{1}{Z} = e^{\alpha} \quad (8)$$

белгилаш киритилди; номаълум коэффициентлар β ва μ (10) ва (11) шартлар асосида топилади. (7) ни (13) га қўйиб статистик йиғинди ифодаси Z ни оламиз. (7) ни энтропия S ифодасига қўйиб, мувозанат ҳолат энтропияси учун қуйидаги ифодани оламиз:

$$S = -\sum_i W_i (-\ln Z - \beta E_i + \beta\mu N_i) = \ln Z + \beta U - \beta\mu \langle N \rangle. \quad (9)$$

3.5-масала. Термодинамик потенциал Φ учун

$$\Phi = \mu_v \langle v \rangle = U - \theta S + PV \quad (10)$$

дан фойдаланиб, $PV = \theta \ln Z$ тенгликни исбот қилинг.

Е ч и ш. Татърифга кўра,

$$\begin{aligned} S &= \sum_i W_i \ln W_i = - \langle \ln W_i \rangle = - \langle -\ln Z - \beta(E_i - \mu_i v_i) \rangle = \\ &= \ln Z + \beta \langle E_i \rangle - \beta \mu_i \langle v_i \rangle = \ln Z + \beta U - \beta \Phi = \\ &= \ln Z + \beta U - \beta(U - \theta S + PV); \end{aligned}$$

$$S = \ln Z + \beta \theta S - \beta PV.$$

Бунда $\theta\beta = 1$. Демак,

$$PV = \theta \ln Z.$$

3.6-масала. Яккаланган тизимда ички жараёнлар (масалан, флуктуациялар), "реакциялар" туфайли "тузилишлар" (тартиблиликлар), "бузилишлар" бўлиб туриши мумкин. Бу ҳолда тизимни характерловчи "қисмлар" ("молекулалар" ёки улардан тузилган "комплекс" молекулалар) сони ўзгариб туради. Шу туфайли тизимни характерловчи "эркинлик даражалари сони" ν ҳам ўзгариб туради. Аммо тизим термодинамик мувозанат ҳолатида бўлганда бу ν соннинг ўртачаси, яъни

$$\langle \nu_i \rangle = \sum_i \nu_i W_i \quad (11)$$

ўзгармайди. Тизим микроҳолатлари эҳтимолликларининг "эркинлик даражалари"

$$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_i$$

буйича тақсимотини аниқланг.

Е ч и ш. Яккаланган тизим учун умумий ифодалар маълум:

$$\sum_i W_i = 1 \quad (12)$$

$$-\sum_i W_i \ln W_i = S \quad (13)$$

Мувозанатдаги ҳолат учун:

$$\delta \sum_i W_i = 0, \quad (14)$$

$$\delta \langle v \rangle = \delta \sum_i v_i W_i = 0, \quad (15)$$

$$\delta \sum_i W_i \ln W_i = \delta S = 0 \quad (16)$$

тенгликларга эгамиз. (14) ни номаълум коэффициент α га купайтирамиз.

(11) ни ёки (15) ни номаълум коэффициентга купайтириб, сунг $\langle v \rangle$ ва v_i билан белгилаш мумкин. Бунда v учун маъно ўзгармайди. Унинг қийматини эса кейин аниқлаймиз. (14), (15) ва (16) тенгликларни қушиб,

$$\sum (\alpha - \ln W_i - v_i) \delta W_i = 0 \quad (17)$$

ифодани оламиз. W_i ихтиёрий ўзгарганда (17) тенглик бажарилиши учун

$$\alpha - \ln W_i - v_i = 0 \quad (18)$$

тенглама бажарилиши шарт. Бу тенгламадан

$$W_i = e^{\alpha} e^{-v_i} = \frac{1}{z} e^{-v_i} \quad (19)$$

таксимот функциясини оламиз. Буни нормалаш шартига қўйиб,

$$z = \sum_i e^{-v_i} \quad (20)$$

ифодани оламиз.

1-и з о ҳ. Юқори температурадаги сийрак газ деярли идеал газ деб қаралиши мумкин. Аммо температура камайиши ва зичликнинг ортиб бориши билан газда икки молекула, уч молекула ва ҳ. к. лардан иборат гуруҳлар ҳосил бўлиши мумкин ва ниҳоят суюқлик фазасида ҳамма молекулалар маълум даражада бир-бири билан боғланган бўлади.

Зич газлар ва суюқликлардаги ҳосил бўлиши мумкин бўлган бундай гуруҳларни *псевдомолекулалар* деб қаралиши мумкин. Бу ҳолда гуруҳлар ичидаги, яъни псевдомолекулалардаги боғланишлар туфайли тизимни характерловчи эркинлик даражалари умуман ўзгарувчан бўлади.

Мувозанатдаги тизимдаги берилган температура ва бо-
 симида (энергияда) бўлган псевдомолесуларнинг тақсимо-
 тистик тақсимоотга эга бўлади. Албатта, бу псевдомолесула
 орасидаги ўзаро таъсир ҳақиқий молекуладагидай кучли
 бўлмайди.

2-и 3 о ҳ. Биз каноник тақсимоот учун

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i} \quad (21)$$

ифодани олган эдик. Агар тизим яккаланган бўлса,
 $E_1 = E_2 = \dots = U$ бўлади. Демак, (21) ни

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta U} \quad (22)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Яккаланган, ички "реакциялар"
 бўлмаган ҳол учун

$$v_1 = v_2 = \dots = \langle v \rangle = v$$

эканлигини назарда тутиб, (19) ифодани

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-v} \quad (23)$$

кўринишда ёзиш мумкин. (22) ва (23) тақсимоотларнинг
 тенг эканлиги ва улардаги Z бир хил эканлигидан муҳим
 натижа оламиз:

$$\beta U = v \quad (24)$$

Хусусий ҳолларда v нинг қийматларини билганимиз
 ҳолда, β нинг ҳам маъносини аниқлашга муваффақ бўла-
 миз. Кейинроқ (24) ни бошқа умумий усул билан келти-
 ribs чиқарамиз.

3.5-§. БЕРК ТИЗИМ ЭНЕРГИЯСИ ҚИЙМАТЛАРИНИНГ ТАҚСИМОТИ

Биз микроҳолатлар бўйича тақсимоотни — каноник тақ-
 симоотни кўрдик. Энди тизим энергияси қийматлари бўйича
 эҳтимолликлар тақсимоотини кўрайлик.

Бунинг учун аввалги параграфдаги (7) га асосан $dW(E)$
 эҳтимолликни

$$dW(E) = e^{-\beta E} \frac{dn}{Z} \quad (25)$$

қуринишда ёзайлик. Бунда dn/Z — тизим энергияси қий-
матининг радиуслари E ва $E + dE$ бўлган гиперсфералар
билан чегараланган ҳажм элементи $d\Gamma_E$ даги ҳолатлардан
ихтиёрий бирида бўлиш эҳтимоллигини кўрсатади. Бунда
микроҳолатлар сони $dn(E)$ ҳажм элементи $d\Gamma_E$ га мутано-
сиб, яъни:

$$dn(E) = d\Gamma_E$$

Куп ўлчовли фазо учун маълум мутаносиблик $\Gamma_E \sim E^v$
ёки

$$d\Gamma_E \sim E^{v-1} dE$$

бўлишини назарга олсак, $dW(E)$ қуйидаги

$$dW(E) = \frac{C}{Z} e^{-\beta E} E^{v-1} dE \quad (26)$$

қўринишга келади: бунда C — нормалаш шартидан топи-
ладиган мутаносиблик коэффициенти, яъни:

$$\frac{C}{Z} \int_0^\infty e^{-\beta E} E^{v-1} dE = \frac{C}{Z \beta^v} \int_0^\infty e^{-x} x^{v-1} dx = 1$$

Бундан C/Z ни топамиз:

$$\frac{C}{Z} = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)}. \quad (27)$$

бу ерда $\Gamma(v)$ — гамма-функция қуйидаги

$$\Gamma(v) = \int_0^\infty e^{-x} x^{v-1} dx \quad (28)$$

интеграл ифода билан берилади.

(27) ни (26) га қўйиб,

$$dW(E) = f_{\beta^v}(E) dE. \quad (29)$$

ифодани топамиз.

Энергия қийматлари эҳтимолликлари тақсимоти (эҳтимолликлар зичлиги)

$$f_{\nu}(E) = \frac{\beta^{\nu}}{\Gamma(\nu)} e^{-\beta E} E^{\nu-1} \quad (30)$$

ифода билан аниқланади. Бу $f_{\nu}(E)$ — функцияни *гамма-тақсимот* дейилади.

(29) ва (30) ифодалар асосида ўртача энергия $\langle E \rangle$ ни, яъни ички энергияни аниқлайлик:

$$\langle E \rangle = \int_0^{\infty} E f_{\nu}(E) dE = \frac{\Gamma(\nu+1)}{\Gamma(\nu)\beta}. \quad (31)$$

Бунда $\Gamma(\nu+1) = \nu\Gamma(\nu)$ эканлигини назарда тутсак, ички энергия учун

$$U = \langle E \rangle = \nu / \beta = \nu\theta \quad (32)$$

тенгликни оламиз. Бундан

$$\beta = \nu/U \quad (33)$$

эканлиги (термодинамик муносабатларга мурожаат қилмасдан) бевосита келиб чиқади.


Шундай қилиб, номаълум параметр β нинг тизимнинг катталиклари орқали ифодасини топдик. ν — квант ҳолда тизим гамильтонианини аниқловчи узгарувчилар сони, 2ν — классик ҳолда тизим гамильтонианини аниқловчи умумлашган координаталар ва умумлашган импульслар сони.

1-изоҳ. Тизимнинг фазавий ҳажми Γ ни гиперболалар орасидаги элементар ҳажм $d\Gamma$ ларга бўлиш мумкин; шу фазавий ҳажм Γ ни гиперкуб $d\Gamma = dq_1 dq_2 \dots dq_s dp_1 \dots dp_s$ ларга ҳам бўлиш мумкин; гиперкубларга бўлингандagi микроҳолатлар эҳтимолликлари тақсимоти

$$dW(E(p, q)) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(p, q)} dn(p, q) \quad (34)$$

ифода билан аниқланади; $dn(p, q)$ — гиперкубдаги статистик микроҳолатлар сони.

2-изоҳ. Агар фазавий фазонинг энг кичик элементи h бўлса (h — Планк доимийси, s — фазавий фазо улчами), Γ/h^s нисбат ҳолатлар сонига тенг бўлади; агар ҳолатнинг



3.2-расм.

айниш даражаси g бўлса, элементар ҳажм dV учун қуйдаги тенглик ўринли бўлади:

$$d\Gamma = h g d n. \quad (35)$$

3.7-масала. Эҳтимолликлар зичлиги тақсирот функцияси

$$f_{\nu}(E) = \frac{\beta^{\nu}}{\Gamma(\nu)} e^{-\beta E} E^{\nu-1} \quad (1)$$

энергия E нинг маълум қийматида максимумга эга бўлади (3.2-расм). Шу қиймат E_m ни топинг.

Е ч и ш. (1) ифодадан E бўйича ҳосила олиб, сўнг нолга тенглаштириб, қуйдаги тенгламани оламиз:

$$\nu - 1 - \beta E_m = 0.$$

Бу тенгликдан:

$$E_m = \theta(\nu - 1) = U(1 - 1/\nu) \quad (2)$$

а) идеал газ учун $\nu = 3/2$. Демак,

$$E_m = U/3. \quad (3)$$

б) агар $\nu \gg 1$ бўлса,

$$E_m \approx U. \quad (4)$$

3.6-§. ГАММА-ТАҚСИМОТГА ОИД МИСОЛЛАР

Биз юқорида энергия қийматлари эҳтимолликлари гамма-тақсирот билан аниқланишини кўрдик. Энди шу тақсиротнинг бошқача исботини келтирайлик.

1. Фараз қилайлик, тизим ν та эркин ўзгарувчиларга эга бўлсин ва унинг ҳар бирига тегишли энергия ϵ , принцип жиҳатдан, $(0, \infty)$ оралиқда ўзгариши мумкин бўлсин.

Гиббс ансамбли тушунчасига асосан, эркин ўзгарувчилар (параметрлар) чексиз кўп бўлсин. Шу ерда динамик эркин ўзгарувчи тасодифий катталиқ билан, унга те-

тегишли энергия ҳам тасодифий катталик билан алмаштирилади. Ҳосил бўлган эркин ўзгарувчилар тўплами ва унга тегишли энергиялар тўплами эҳтимолликлар назариясидаги бош тўпламни ифодалайди. Шу бош тўпламдан ихтиёрий ν та ўзгарувчи биз қараётган тизимга тегишли Гиббс ансамблининг элементини ифодалайди (тавсифлайди).

Энди статистик физикадаги асосий масалани қўямиз: ν та эркинлик даражаларига эга тизим энергияси "вектор" E нинг учи ($E, E + dE$) ораликда бўлиш эҳтимоллиги аниқлансин.

E катталик учун бошланғич қиймат $E_0 = 0$ ёки $E_0 > 0$ бўлиши мумкин. Юқоридаги айтилганларга асосан:

$$E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_\nu. \quad (5)$$

Асосий постулатга биноан бош тўпламдаги ҳар бир эркинлик даражаси (элемент) тенг эҳтимолли. Демак, унга тегишли энергия қийматлари ҳам тенг эҳтимолли (узлуксиз ҳолда текис тақсимланган).

Бу постулат асосида юқоридаги асосий масалани қуйидагича ҳал қиламиз. 1) Бош тўплам элементлари билан, масалан, $n \geq \nu$ марта синов ўтказилганда бу синовларнинг 1 мартасида $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ лардан ихтиёрий бирининг чиқиши эҳтимоллиги $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ воқеалар содир бўлиши эҳтимолликларининг йиғиндисига тенг. Аммо бу эҳтимолликлар, энергиянинг текис тақсимланиши ҳақидаги постулатга (фаразга) кўра, $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_\nu$ энергия қийматларига мутаносиб. Бошқача айтганда, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ лардан бирининг чиқиш эҳтимоллиги (5) ифодага мутаносиб.

2) Бош тўплам билан $n \geq \nu$ марта синов (тажриба) ўтказилганда бу синовларнинг ν мартасида $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ ларнинг чиқиш эҳтимоллиги, яъни E энергияли Гиббс ансамбли элементларидан бири ҳосил бўлиши эҳтимоллиги (бизнинг содда баёнимизда тизимнинг E энергияли микроҳолатда бўлиш эҳтимоли) $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ воқеалар содир бўлиш эҳтимолликлари кўпайтмасидан иборат, яъни E га мутаносиб, бу эҳтимоллик $W(E) \sim E^\nu$ "вектор" учининг (O, E) ораликда бўлишлигини аниқлайди. Бизни эса "вектор" E нинг ($E, E + dE$) ораликда бўлиш эҳтимоллиги $dW(E)$ қизиқтиради. Бу эса $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_\nu$ лардан бирининг учи ($E, E + dE$) ора-

лиқда бўлиши зарурлигини кўрсатади. Бу эҳтимоллик $dW(E)$, кўриниб турибдики,

$$dW(E) \sim E^{-1} dE \quad (6)$$

билан аниқланади.

3) n синовнинг $n - \nu$ мартасида E нинг қиймати (E, E_n) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги, аёнки,

$$(E_n - E)^{(n-\nu)} \quad (7)$$

га тенг.

Шундай қилиб, биз излаётган асосий эҳтимоллик $dW(E)$: ν та $\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_\nu$ ларнинг ($0, E$) оралиқда ва улардан бирининг ($E, E + dE$) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги (6) ва $(n - \nu)$ та ϵ_i ларнинг (E, E_n) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги (7) ларнинг ўзаро кўпайтмасидан иборат, яъни:

$$dW \sim E^{-1} dE (E_n - E)^{n-\nu}. \quad (8)$$

Бунда, E_n энергия n та ϵ_i лар энергиялари йигиндиси.

Демак, бош тўпلامда ν -сайланмага тўғри келган тасодифий катталиқ — энергия қийматлари эҳтимолликлари (8) ифода билан аниқланади.

Ушбу

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{E_n}{n\theta} \right) \rightarrow \theta \quad (9)$$

шарт бажарилганда (8) ифодани кўрайлик:

$$dW(E) \sim E^{-1} E_n^{n-\nu} \left(1 - \frac{E}{n\theta}\right)^\nu \left(1 - \frac{E}{n\theta}\right)^{n-\nu} dE.$$

Бунда $\nu < \infty$ ва $n \rightarrow \infty$ бўлганлиги учун

$$\left(1 - \frac{E}{n\theta}\right)^\nu \rightarrow e^{-E/\theta}, \quad \left(1 - \frac{E}{n\theta}\right)^{n-\nu} \rightarrow 1. \quad (10)$$

Демак,

$$dW(E) = C E^{-1} e^{-E/\theta} dE, \quad (11)$$

бунда $\beta = 1/\theta$; C эса

$$\int_{(E)} dW(E) = C \int_0^\infty E^{-1} e^{-\beta E} dE = 1 \quad (12)$$

нормалаштириш шартидан топилади:

$$C = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)}. \quad (13)$$

(13) ни ҳисобга олиб, (11) ни қайта ёзамиз:

$$dW(E) = f_{\beta v}(E)dE, \\ f_{\beta v}(E) = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)} e^{-\beta E} E^{v-1}, \quad E \geq 0, \quad (14)$$

(14) бизга маълум гамма-тақсимот.

Шуни яна таъкидлаймизки:

квант ҳолда тизим гамильтониани v — эркин ўзгарувчилар сонига тенг;

классик ҳолда тизим гамильтониани $2v$ та эркин ўзгарувчи — умумлашган координаталар ва умумлашган импульслар сонига тенг.

3.8-масала. Бош тўпламда n марта сайланма ўтказилганда энергия бу синовларнинг v мартасида $(0, E)$ оралиқда, $n-v$ мартасида $(E_n - E)$ оралиқда бўлишлиги биномиал тақсимотга бўйсунилишини кўрсатинг. Шунингдек, маълум шарт бажарилганда, бу биномиал тақсимотдан гамма-тақсимот келиб чиқишини кўрсатинг.

Е ч и ш. Асосий постулатга кўра, энергия қийматлари

$$E = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n$$

текис тақсимланган. Шунинг учун эҳтимолликлар зичлиги доимий; эҳтимолликлар тақсимот функцияси $(0, E)$ оралиқда энергия қийматининг бўлиш эҳтимоллиги эса, аёнки,

$$F(E) = \frac{E - E_0}{E_n - E_0} \quad (15)$$

ифода билан аниқланади; бунда E_0 энергиянинг бошланғич қиймати. Бу ҳолда изланаётган эҳтимоллик

$$W(F) \sim P(1 - F)^{n-v}$$

биномиал тақсимот билан аниқланади. Бунда $(1 - F)$ энергия қийматларининг $(0, E)$ оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги, яъни (E, E_n) оралиқда бўлиш эҳтимоллигини кўрсатади.

Бош тўпланда n марта тажриба ўтказилганда, масалан v тасида биринчи $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$ та келиб чиқиши, шу $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$ лардан ихтиёрий ε нинг келиб чиқиши эҳтимолликлари E ларнинг кўпайтмасига тенг; яъни v та $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$ дан ихтиёрий бирининг келиб чиқиши шу қийматлар йиғиндисидан E (ёки $E - E_0$) га мутаносиб. n марта синов ўтказилганда, бу синовларининг ҳар бирида статистик ансамбль элементи

$$E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_v$$

нинг v тасида биринчи $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$ ларнинг келиб чиқиши E га (ёки $E \neq 0$ бўлганда $(E - E_0)$ га) мутаносибдир. Бу ҳолда $n - v$ тасида $\varepsilon_{v+1}, \varepsilon_{v+2}, \dots, \varepsilon_n$ лардан бирининг чиқиши $\varepsilon_{v+1} + \varepsilon_{v+2} + \dots + \varepsilon_n = E_n - E$ га, бунда $n - v$ марта келиб чиқиши эса $(E_n - E)$ нинг $n - v$ даражасига, яъни $(E_n - E)^{n-v}$ га мутаносиб. n марта синовдан v тасида $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$; $\dots$, $n - v$ тасида $\varepsilon_{v+1}, \varepsilon_{v+2}, \dots, \varepsilon_n$ ларнинг келиб чиқиши эҳтимоллиги $E (E_n - E)^{n-v}$ ёки $(E - E_0) (E_n - E)^{n-v}$ га мутаносибдир. Бу ҳолда $n - v$ тасида $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_v$ ларнинг келиб чиқиши эҳтимоллиги $E^n (E_n - E)^{n-v}$ ёки $(E - E_0)^n (E_n - E)^{n-v}$ га мутаносиб. Ансамбль элементи бўлиши учун биринчи $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_v$ бўлиш шарт эмас, унинг учун n тадан v таси бўлиши етарли. Бу ҳолда n тадан v та ҳосил қилган гуруҳларнинг эҳтимолликларини қўшиш лозим. Бундай гуруҳлар сони $n!/v! (n - v)!$. Демак, изланаётган эҳтимоллик

$$\frac{n!}{v!(n-v)!} E^v (E_n - E)^{n-v}$$

га мутаносиб (15) ни эътиборга олиб, изланаётган эҳтимоллик $W(F)$ биномиал эҳтимоллик эканлигини қўрамыз:

$$W(F) = \frac{n!}{v!(n-v)!} F^v (1 - F)^{n-v} \quad (16)$$

F эҳтимоллик ΔF га ўзгарса, $W(F)$ ҳам ўзгаради:

$$\Delta W(F) = W(F + \Delta F) - W(F), \quad (17)$$

бунда

$$W(F + \Delta F) \sim (F + \Delta F)^v (1 - F - \Delta F)^{n-v} \quad (18)$$

иккита ҳад билан чегараланамиз, яъни:

$$(F + \Delta F)^r = F^r + r F^{r-1} \Delta F + \dots \quad (19)$$

Иккинчи купайтмада $\Delta F \rightarrow 0$ бўлганда 1 га нисбатан уни ҳисобга олмаймиз, яъни

$$(1 - F - \Delta F)^{n-r} \approx (1 - F)^{n-r}. \quad (20)$$

Энди (19) ва (20) ифодаларни назарга олиб, (17) ни қуйидагича ёзамиз:

$$dW(F) \sim F^{r-1} (1 - F)^{n-r} dF, \quad (21)$$

бундан, (15) ни назарда тутиб, яна гамма тақсимот $f_\mu(E)$ ни оламиз.

1-и з о ҳ. Одатдаги усул билан статистик физикани асосланганда тенг эҳтимолликлар ҳақидаги постулат яккаланган тизим микроҳолатларига нисбатан уринли деб ҳисобланади. Биз эса постулатнинг қўлланиш чегарасини бирмунча кенгайтирдик.

2-и з о ҳ. Математика адабиётида $f(E)$ ёки $f_{\mu\nu}(E)$ *эҳтимолликлар зичлиги*, физика адабиётида эса *эҳтимолликлар тақсимот функцияси* дейилади. Эҳтимолликлар тақсимот функцияси деб, математика адабиётида

$$W(E) = \int_0^E dW(E) = \int_0^E f_{\mu\nu}(E) dE$$

функцияни айтилади. Атамашуносликда бу икки хиллик ғализликка, англашилмовчиликка олиб бормаслиги лозим.

3.7-§. СТАТИСТИК ЭНТРОПИЯ ВА КАНОНИК ТАҚСИМОТ

Гиббс энтропияси S ни таъриф буйича энергия қийматлари узлуксиз ўзгарган ҳол учун қуйидагича аниқланади:

$$S = - \int f \ln f dn. \quad (36)$$

Ҳолатлар дискрет қийматлар қабул қилганда эса

$$S = - \sum_i W_i \ln W_i \quad (37)$$

куринишда аниқланади. Умуман статистик физикада энтропия S ни ўлчамли катталиқ деб қабул қилинган. Шу сабабли (36) ва (37) ифодаларда ўнг томонларни Больцман доимийси k га кўпайтирилади. Аммо биз энтропия S ни ўлчамсиз катталиқ сифатида қабул қилдик; ҳам маъно, ҳам услубий жиҳатдан бундай қабул қилиш қулайдир (Бу масалаларга IV бобда тулароқ тўхталамиз).

Каноник тақсимоат $f(E)$ ва статистик интеграл (йиғинди) Z узлуксиз ўзгарувчи (классик) тизим учун

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad (38)$$

$$Z = \int e^{-\beta E} dn, \quad (39)$$

ифодалар воситасида, энергияси дискрет (квант) қийматлар қабул қилувчи тизимлар учун эса

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad (40)$$

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (41)$$

ифодалар билан аниқланиши бизга маълум. Шунингдек берк тизим учун энтропия

$$S = \langle s \rangle = \langle \ln 1/f \rangle = \beta U + \ln Z \quad (42)$$

ифода билан аниқланишини кўрган эдик. $\beta U = \nu$ эканлигидан, энтропия S учун (42) дан

$$S = \nu + \ln Z \quad (43)$$

ифодани оламиз.

Тартиблиликдан тартибсизликка (хаотизацияга) ўтишда тизимнинг эркинлик даражалари сони ортиб боради (демак, ν ортиб боради), юқори энергияли ҳолатлардан паст энергияли ҳолатларга ўтишда Z ортиб боради, яъни бу икки ҳолда ҳам энтропия S ортади. (43) асосида тизим эн-

тропияси S аддитив катталиқ эканлигини осонликча кўрсатиш мумкин. Фараз қилайлик, тизим икки қисмдан иборат бўлсин. Унинг энергияси E қисмларнинг энергиялари E_1 ва E_2 ларнинг йигиндисига тенг бўлсин. Бу ҳолда

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} = \sum_k e^{-\beta E_k} \sum_l e^{-\beta E_l} = Z_1 Z_2 \quad (44)$$

формуладан:

$$\begin{aligned} S &= \nu_1 + \nu_2 + \ln Z_1 + \ln Z_2 = \nu_1 + \ln Z_1 + \nu_2 + \ln Z_2 = \\ &= S_1 + S_2 \end{aligned} \quad (45)$$

Бундан энтропия S нинг аддитив эканлиги кўринади.

3.9-масала. Каноник тақсимот асосида

$$S = - \sum_i W_i \ln W_i$$

статистик энтропия олинишини кўрсатинг.

Еч и ш. Берк тизим учун тақсимот функцияси

$$W_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad (1)$$

бунда статистик йиғинди

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}. \quad (2)$$

Ички энергия U таъриф бўйича аниқланади:

$$U = \sum_i E_i W_i. \quad (3)$$

(3) ни дифференциаллаб: қуйидагини оламиз:

$$dU = \sum_i W_i dE_i + \sum_i E_i dW_i = -dA + \sum_i E_i dW_i \quad (4)$$

бунда dA тизим бажарган иш:

$$\sum_i E_i dW_i = dU + dA. \quad (5)$$

(1) дан:

$$E_i = -\theta(\ln Z + \ln W_i), \theta = 1/\beta. \quad (6)$$

Демак,

$$\begin{aligned} \sum_i E_i dW_i &= -\theta \ln Z \sum_i dW_i - \theta \sum_i \ln W_i dW_i = \\ &= -\theta \sum_i \ln W_i dW_i. \end{aligned} \quad (7)$$

Бунда $d \sum_i W_i = 0$ эканлиги назарда тутилди. Буни назарда тутиб, (7) ни ўзгартириб ёзамиз:

$$\sum_i E_i dW_i = -\theta \sum_i \ln W_i dW_i - \theta d \sum_i W_i = -\theta d \sum_i W_i \ln W_i. \quad (8)$$

$$S = - \sum_i W_i \ln W_i \quad (9)$$

деб белгилаш киритсак, (5) ва (9) дан:

$$\theta dS = dU + dA. \quad (10)$$

(10) муносабат термодинамиканинг биринчи ва иккинчи қонунларининг умумий ифодасидир. S нинг (9) ифодаси (Гиббс таърифи бўйича) энтропия формуласидир.

Изох. Мувозанатли тақсимот функцияси асосида квазистатик жараёнлар учун (9) ифода билан аниқланган S функция мавжудлиги ва унинг ўзгариши (10) муносабат билан аниқланишини умумий ҳолда кўрсатдик.

3.8-§. СТАТИСТИК ЭНТРОПИЯ. МИКРОКАНОНИК ТАҚСИМОТ

Яккаланган тизимнинг ҳолати микроканоник тақсимот билан тавсифланади. Таърифга кўра, яккаланган тизим ташқи муҳит билан энергия ҳамда модда (зарралар) алмашмайди, яъни унинг энергияси E , зарралар сони (ёки ўзгарувчилар сони v ўзгармайди:

$$E(p, q) = E_0 = U = \text{const}, v = v_0 = \text{const}. \quad (a)$$

Яккаланган тизимда микроҳолатлар дискрет бўлганда

$$Z = \sum_i e^{\beta E_i} = e^{-\beta U} \sum_i I_i, \quad (b)$$

узлуксиз булганда эса

$$Z = \int e^{-\beta E} dn = e^{-1} \int dn \quad (d)$$

ифодалар уринли. (b) ва (d) ни энтропия ифодаси (42) га куйиб, яккаланган тизим энтропиясини топамиз:

$$S = \ln \sum_i l_i, \quad (46)$$

$$S = \ln \Omega. \quad (47)$$

Бундан $\sum_i l_i$ — микроҳолатлар (статистик микроҳолатлар ёки Гиббс ансамбли элементлари) сони;

$$\Omega = \int_{(p,q)} dn(p,q). \quad (48)$$

Бундай микроҳолат учун тақсимот функцияси куйидаги кўринишда ёзилиши мумкин:

$$f_v(E) = \delta(E(p,q) - E_0) \delta(v - v_0), \quad (49)$$

бунда $\delta(E - E_0)$ ва $\delta(v - v_0)$. Диракнинг дельта-функциялари $E = E_0$, $v = v_0$ булгандагина нолдан фарқлидирлар! Одатда $\delta(E - E_0)$ ни *микроканоник тақсимот* дейилади. Бу тақсимот функция яккаланган тизимнинг барча хоссаларини, жумладан, микроканоник параметр қийматларини ҳисоблашга имкон беради.

Аёнки, берк тизимнинг энергияси узгармас, яъни $E = \text{const}$ дейилса, у яккаланган тизимга айланади. Табиийки, унинг ҳолатини характерловчи тақсимот функцияси

$$f_{\beta v}(E) = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)} E^{v-1} e^{-\beta E}$$

эса ўз навбатида Диракнинг дельта-функцияси $\delta(E - E_0)$ га ўтиши зарур. Ҳақиқатан ҳам шундай.

Энергия қийматлари учун санок тизимининг бошланиши деб E_0 ни қабул қилайлик. У ҳолда гамма-тақсимотдаги $(0, \infty)$ оралиқда узгарадиган E ўрнига $E - E_0$ ни ёзиш лозим

қулади, бу ҳалда тақсимот функцияси $f_{\beta\nu}(E - E_0)$ қуйидаги кўринишга келади:

$$f_{\beta\nu}(E - E_0) = \begin{cases} \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} (E - E_0)^{\nu-1} \exp[-\beta(E - E_0)], & E - E_0 \geq 0, \\ 0 & E - E_0 < 0. \end{cases} \quad (50)$$

Бунда:

$$\beta = \frac{\nu}{(U - E_0)}, \quad (U - E_0) = \int_0^{\infty} (E - E_0) f_{\beta\nu}(E - E_0) dE. \quad (51)$$

Таърифга кўра $U = \langle E \rangle$ ва яккаланган тизим учун эса $U = E_0$ га эгамиз. Шунинг учун $\beta \rightarrow \infty$ шарт келиб чиқади. Бу шарт бажарилганда, $f_{\beta\nu}(E - E_0)$ функцияни текширайлик. $E \neq E_0$ бўлсин. Бунда $E > E_0$ ҳол бўлиши мумкин. Бу ҳолда аён бўладики,

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} f_{\beta\nu}(E) = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{(E - E_0)^{\nu-1}}{\Gamma(\nu)} \beta^\nu e^{-\beta(E - E_0)} = 0. \quad (52)$$

$E < E_0$ бўлган ҳолда, таърифга кўра,

$$f_{\beta\nu}(E - E_0) = 0. \quad (53)$$

Бу ҳолда $E < E_0$ бўлгани учун U катталики E_0 га чап томондан интилади, яъни $U - E_0 \rightarrow -0$, демак $\beta \rightarrow \infty$. Шундай қилиб, яна қуйидагини оламиз:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} f_{\beta\nu}(E - E_0) = 0, \quad E < E_0$$

Шу маънода каноник тақсимотдан хусусий ҳолда микроканоник тақсимотни келтириб чиқариш мантиқан тўғрироқдир. Нормалаштириш шартига асосан:

$$\int_0^{\infty} f_{\beta\nu}(E - E_0) dE = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\beta\nu}(E - E_0) dE = 1. \quad (54)$$

Бундан келиб чиқади.

$$f_{\beta\nu}(E - E_0) \rightarrow \infty, E = E_0 \quad (55)$$

булиши келиб чиқади.

Шундай қилиб, $\beta \rightarrow \infty$ шарт бажарилганда, яъни яккаланган тизим учун тақсимот функцияси (эҳтимоллар зичлиги) қуйидаги кўринишга келади:

$$f_{\beta\nu}(E - E_0) = \begin{cases} \infty, & E = E_0, \\ 0, & E \neq E_0. \end{cases} \quad (56)$$

Демак, (54) ва (56) лардан

$$f_{\beta\nu}(E - E_0) = \delta(E(p, q) - E_0) \quad (57)$$

эканлиги келиб чиқади.

Шундай қилиб, биз микроканоник тақсимот каноник тақсимотнинг энергия доимий бўлганда келиб чиқадиغان хусусий ҳоли эканлигини кўрсатдик. Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, статистик физикани аъёнавий усул билан баён этишда микроканоник тақсимотдан маълум шартлар бажарилганда каноник тақсимотни келтириб чиқаришга уриналади. Аммо бу ерда келтирилган бизнинг усул мантиқан равшанроқдир.

Ч е т л а н и ш Динамик узгарувчининг, жумладан гамильтонианнинг ҳар бир қийматини ишончли воқеа деб тасаввур қилсак, бу ишончли воқеанинг эҳтимолликлари зичлигини дельта-функция орқали тавсифлаш мумкин. Шу маънода динамик қонуният статистик қонуниятнинг хусусий ҳоли кўринишга келади; бунда статистик физикадаги одатдаги эҳтимолликлар зичлигидан Диракнинг дельта-функцияси билан аниқланадиган эҳтимолликлар зичлигига ўтиш лозим бўлади.

Масалан, бирор динамик узгарувчи динамик қонуниятга кўра X_0 қийматни қабул қилса, буни эҳтимолликлар зичлиги $\delta(X - X_0)$ бўлган тасодикий катталик деб тасаввур қилиш мумкин; бунда X тасодикий катталик фикран қабул қилиши мумкин бўлган қийматлар. Шу маънода динамик қонуният статистик қонуниятнинг хусусий ҳолидир.

да, умумлашган координаталар q ва умумлашган импульслар p узгариши туфайли яққаланган тизимнинг статистик микроҳолатлари сони жуда кўплир

3.9-§. СТАТИСТИК ИНТЕГРАЛ. ҲОЛАТЛАР ЗИЧЛИГИ

Фараз қилайлик, берк тизимнинг энергияси узлуксиз қийматлар қабул қилсин. У ҳолда каноник тақсимот $f(E) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta E)$ ва нормалаштириш шарти

$$\int f(p, q) dn = 1 \quad (58)$$

дан статистик интеграл Z учун

$$Z = \int e^{-\beta E(p, q)} dn(p, q) \quad (59)$$

ифодани оламиз; дискрет ҳолдаги статистик йиғинди Z учун

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (60)$$

ифодани оламиз.

Z нинг янги ифодасини олайлик. Бунинг учун

$$dW = f_{\beta v}(E) dE = f(p, q) dn(p, q)$$

дан:

$$\frac{1}{Z} e^{-\beta E} dn(p, q) = \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} E^{\nu-1} e^{-\beta E} dE \quad (61)$$

бундан:

$$Z = \frac{\Gamma(\nu)}{\beta^\nu E^{\nu-1}} \Omega, \quad \Omega = \frac{dn}{dE} \quad (62)$$

Бунда Ω — ҳолатлар зичлиги.

$dn(E) = d\Gamma_E/h$; бунда $d\Gamma_E$ радиуслари E ва $E + dE$ бўлган гипербсфералар орасидаги фазавий фазонинг ҳажмий эле-

менти. Фазавий фазо ҳажми $\Gamma_r = AE$ дан $d\Gamma_r = vAE^{v-1}dE$ экан.

$$\Omega(E) = \frac{vAE^{v-1}}{h^3}$$

ифодани оламиз.

Классик статистикада статистик интеграл Z ни ҳисоблаш учун $dn(p, q)$ ни $d\Gamma/h^3$ билан алмаштириш лозим, бунда $d\Gamma = dpdq$ фазавий фазонинг элементи (элементар гипиркуб ҳажми). Бундан ташқари, Z ни ҳисоблашда бир хил энергия қийматини ҳосил қилувчи усуллар сони g га (58) интегрални бўлиш лозим (буни **Больцман фактори** дейилади; g сон зарраларнинг ўрин алмаштиришлари сонини ҳам назарда тутати), яъни:

$$Z = \int e^{-\beta E} dn(p, q) = \int e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{h^3 g}.$$

Демак, классик физикада Ω ва Z учун

$$\Omega = \frac{dn(p, q)}{dE} = \frac{vAE^{v-1}}{h^3 g},$$

$$Z = \frac{A\Gamma(v+1)}{\beta v h^3 g} \quad (63)$$

ифодаларни оламиз.

Статистик интеграл Z ни ихчам шаклда ёзиш мумкин:

$$Z = \frac{\Gamma(v)}{\beta^v E^{v-1}} \frac{dn}{dE} = \frac{\Gamma(v+1)}{\beta^v} \frac{dn}{dE^v},$$

$$Z = \frac{\Gamma(v+1)}{\beta^v} \Omega(E^v), \quad (64)$$

бунда "зичлик"

$$\Omega(E^v) = \frac{dn}{dE^v}.$$

Мисол. N та заррадан иборат классик тизимнинг статистик интеграли Z ни аниқлайлик. Унинг энергияси $E = E_p + E_q$ бўлсин. Бунда кинетик энергия

$$E_p = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m},$$

узaro таъсир потенциал энергияси

$$E_q = E_q(q_1, q_2, \dots, q_{3N})$$

ифодалар билан аниқланган бўлсин. Бу классик ҳол учун статистик интеграл Z ни қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$Z = \frac{1}{h^{3N} g} \int e^{-\beta E_p} dp \int e^{-\beta E_q} dq. \quad (65)$$

Бунда

$$\begin{aligned} \int e^{-\beta \sum_i p_i^2 / 2m} dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} &= \left(\frac{2m}{\beta} \right) \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right]^{3N} = \\ &= (2\pi m / \beta)^{3N/2}, \end{aligned} \quad (66)$$

$$Q_N = \int_{(q)} e^{-\beta E_q} dq. \quad (67)$$

(66) ва (67) ларни назарда тутиб статистик интеграл Z ни ёзамиз:

$$Z = \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3N/2} \frac{Q_N}{g_N}, \quad s = 3N. \quad (68)$$

Бунда Q_N ни *конфигурацион интеграл* дейилади.

3.10-масала. Идеал газ учун усуллар сони g ни аниқланг.

Ечиш. Бу ҳолда $E_q = 0$ бўлгани учун $Q_N = V$ бўлади; энергия эса $E = E_1 + E_2 + \dots + E_N$ йиғинди билан аниқланади. E ни ҳосил қилувчи элементлар сони ҳам N та. Бу ҳолда усуллар сони N^N га тенг бўлади. Демак, N та заррадан иборат идеал тизимнинг статистик интеграли

$$Z = \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \right]^N = \left[\frac{1}{n} \left(\frac{2\pi m_0}{h^2} \right)^{3/2} \right]^N, \quad n = N/V$$

ифода билан аниқланади.

3.11-масала. V ҳажмли идишда ҳаракатланувчи зарра (идеал газ) учун статистик интеграл Z_1 ни аниқланг.

Е ч и ш. Идеал газ учун тақсимот функцияси

$$f(p, q)dn = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta E_1} dn, \quad (1)$$

бунда:

$$E_1 = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2),$$

$$dn = \frac{1}{h^3} dp_x dp_y dp_z dx dy dz, \quad (2)$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{\beta^v h^3 g}{\Lambda \Gamma(v+1)}, \quad \bar{p} = \frac{1}{kT}, \quad (3)$$

$$\Gamma = A E^v. \quad (4)$$

Аёнки,

$$v = 3/2, \quad h^3 = h^3, \quad g = 1$$

$$\begin{aligned} \Gamma &= \int_V dx dy dz \int_{E \leq \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = \\ &= V \frac{4\pi}{3} (2mE)^{3/2} = \frac{4\pi}{3} V (2m)^{3/2} E^{3/2} = A E^{3/2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Бунда:

$$A = \frac{4\pi}{3} V (2m)^{3/2}, \quad (6)$$

$$\Gamma(v+1) = \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right), \quad (7)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty x^{1/2-1} e^{-x} dx = \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}.$$

Кўрсатма. $x = y^2$, $dx = 2ydy$ алмаштириш қилинса,
 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ Пуассон интегралига ўтади:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}.$$

Демак,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}.$$

Демак, β , A ва $\Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right)$ нинг ифодаларини (3) га қўйиб,
 қуйидагини топамиз:

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2}. \quad (8)$$

3.12-масала. N га заррадан ташкил топган идеал газ статистик интегралини аниқланг.

Е ч и ш . Бу ҳолда

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_N = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{3N}^2). \quad (1)$$

Демак, $2v = 3N$; $s = 3N$. Биз Z_N ни аниқлаш учун қуйидаги усулни қўлаймиз. Қаралаётган ҳол учун тақсимот функцияси

$$f_N(E) dn = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta E} dn, \quad \beta = \frac{1}{kT}, \quad (2)$$

бунда E энергия (1) ифодадан аниқланади. Кўрилатган ҳолда N та идеал зарра бўлгани учун унинг тақсимот функцияси N та бир заррали тақсимот функциялари кўпайтмасига мутаносиб бўлади (эҳтимолликларни кўпайтириш теоремасига асосан), яъни

$$\frac{1}{Z_N} e^{-\beta E} \sim f(E_1) f(E_2) \dots f(E_N) = \frac{1}{Z_1^N} e^{-\beta(E_1 + E_2 + \dots + E_N)} \quad (3)$$

Энди $E_1, E_2, \dots, E_N$ элементларнинг N та катакда N та заррадан жойлашиш усуллари сони N^N га ўнг томонини қўпайтириб, сўнг тенглаштириб

$$\frac{1}{Z_N} e^{-\beta E} = \left(\frac{N}{Z_1} \right)^N e^{-\beta E} \quad (4)$$

ифодани оламиз. Бундан изланаётган статистик интеграл Z_N ни топамиз:

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{Z_1} \right)^N, \quad (5)$$

бунда

$$\frac{1}{Z_N} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}. \quad (6)$$

(5) ифода Z учун аввал олинган ифодага мос келади.

3.10-§. МАКСВЕЛЛНИНГ ТАҚСИМОТ ҚОНУНИ

Статистик қонуният намоён бўладиган муҳим мисол — идеал газ молекулаларининг энергия (тезлик ёки импульс) қийматлари бўйича тақсимланиши қонуни — Максвеллнинг тезликлар тақсимоти қонунидир.


Авалло шуни таъкидлаш лозимки, идеал газ — бу битта зарра учун тузилган Гиббс ансамблидир. Шу сабабли идеал газ учун

$$E(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = m \vartheta^2/2, \quad 2v = 3. \quad (69)$$

Бизга энергия қийматлари учун келтирилган гамма-тақсимот маълум

$$dW(E) = f_{\beta v}(E) dE, \quad (70)$$

$$f_{\beta v}(E) = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)} E^{v-1} e^{-\beta E}, \quad \beta = \frac{1}{kT}. \quad (71)$$



3.3-расм.

(70) ва (71) лардан фойдаланиб, тезлик қийматлари эҳтимолликлари тақсимотини қуйидаги тенгламадан топамиз:

$$f_{\theta}(E)dE = f(\vartheta)d\vartheta. \quad (72)$$

(69) дан:

$$dE = m\vartheta d\vartheta, \quad \Gamma(3/2) = \int_0^{\infty} x^{1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}/2 \quad (73)$$

ифодаларни назарда тутсак, (72) дан эҳтимолликлар тақсимо-ти учун

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\theta} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\beta m v^2/2} \quad (74)$$

ифодани оламиз.

$$dW(E) = dW(\vartheta) = f(\vartheta)d\vartheta;$$

бу ерда $dW(\vartheta)$ — молекуланинг тезлиги (ϑ , $\vartheta + d\vartheta$) оралиқда бўлиш эҳтимоллигидир (3.3-расм).

Изоҳ. Қаралаётган ҳолдаги битта зарра учун Гиббс ансамбли — бу идеал газдир. Идеал газ ёки сийрак газ молекулаларининг сони N етарли даражада катта бўлганда, бу (74) ифодадан фойдаланилади. У ҳолда (74) ифодадан (ϑ , $\vartheta + d\vartheta$) оралиқдаги тезликли молекулалар улушини аниқлаш учун фойдаланилади (Идеал газ учун тақсимо-т функцияларини, жумладан, Максвелл тақсимо-тини VI бобда кўра-миз).

Идеал газ учун $\beta = 1/kT$ эканлигини кўрсатайлик.

Идиш деворининг бирлик юзасига бирлик вақтда молекулалар (идеал газ зарралари) урилишдан берилаётган импульслар — бу газнинг деворга босимидир. Ҳисоблаш кўрса-тадики, (қ. 13-масала) бу босим

$$P = \frac{n}{\beta} = n\theta \quad (75)$$

ифода билан аниқланади, бунда $n = N/V$ — бирлик ҳажмдаги зарралар сони.

Тажрибадан маълумки, идеал газ учун ҳолат тенгламаси қуйидагича:

$$P = nkT, \quad (76)$$

бунда k — Больцман доимийси. (75) ва (76) дан идеал газ учун

$$\left(\frac{1}{\beta}\right) = \theta = kT \quad (77)$$

эканлиги келиб чиқади.

Максвеллнинг тезликлар тақсимоти қонуни (74) дан кўринадики (3.3-расм), $f(\vartheta)$ функция $\vartheta = 0$ ва $\vartheta \rightarrow \infty$ бўлганда нолга тенг, яъни бу функция $f(\vartheta) \geq 0$ ва ϑ нинг маълум қиймати ϑ_2 да максимумдан ўтади.

Тезликнинг бу $\vartheta_2 = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ қиймати энг катта эҳтимолли тезлик дейилади (2.14-масала). Энг катта эҳтимолли тезликли зарраларнинг (кинетик) энергиялари $m\vartheta_2^2/2$ температурага мутаносибдир, яъни:

$$\frac{m\vartheta_2^2}{2} = kT. \quad (78)$$

(74) ва (78) дан кўринадики, температура ортиши билан $f(\vartheta)$ функциянинг максимал қиймати

$$f(\vartheta_2) = \frac{4}{e} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \quad (79)$$

камаяди ва 3.3-расмда ўнгга силжийди, температура камайиши билан эса у ортади (чапга силжийди) (3.3-расм). Шунингдек,

$$\begin{aligned} f(\vartheta_2) &\rightarrow 0, & T &\rightarrow \infty, \\ f(\vartheta_2) &\rightarrow \infty, & T &\rightarrow 0. \end{aligned} \quad (80)$$

Нормалаштириш шарти

$$\int_0^{\infty} f(\vartheta) d\vartheta = 1. \quad (81)$$

ва (80) дан кўринадики, $T \rightarrow 0$ бўлганда $f(\vartheta)$ тақсимот функция дельта-функцияга интилади, яъни

$$\lim_{T \rightarrow 0} f(\vartheta) = \delta(\vartheta). \quad (82)$$

3 та эркинлик даражасига эга булган битта заррага тўғри келган ички энергия U учун $\beta = v/U$ дан

$$U = 3 \frac{kT}{2} \quad (83)$$

келиб чиқади, яъни ҳар бир эркинлик даражасига $kT/2$ энергия тўғри келади.

Аммо, умумий ҳолда, U ва демак, β фақатгина температурагагина боғлиқ эмас.

Тезлик қийматининг (ϑ , $\vartheta + d\vartheta$) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги $f(\vartheta)d\vartheta$ ни радиуслари ϑ ва $\vartheta + d\vartheta$ булган сфералар орасидаги ҳажм $dV(\vartheta)$ да бўлиши орқали ёзайлик. Бунда, аёнки, эҳтимолликлар бир хил, аммо эҳтимоллик зичлиги узгаради. Ҳақиқатан ҳам,

$$f(\vartheta) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} dV(\vartheta), \quad (84)$$

бунда

$$dV(\vartheta) = d\left(\frac{4\pi}{3} \vartheta^3 \right) = 4\pi \vartheta^2 d\vartheta. \quad (85)$$

Бу эҳтимолликни импульсларга нисбатан ёзайлик:

$$dW(p) = f(p)dp = f(\vartheta)d\vartheta = \left(\frac{1}{2\pi mkT} \right)^{3/2} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dV(p), \quad (86)$$

бунда $dV(p) = m^3 dV(\vartheta)$ — импульслар фазосида радиуслари p ва $p + dp$ бўлган сфералар орасидаги ҳажм. (86) дан кўринадики, импульс проекциялари

$$\begin{aligned} p_x, & p_x + dp_x, \\ p_y, & p_y + dp_y, \\ p_z, & p_z + dp_z \end{aligned} \quad (87)$$

оралиқларда бўлиш эҳтимоллиги $dW(p_x, p_y, p_z)$ ни топиш учун эҳтимолликлар зичлигини

$$f(p_x, p_y, p_z) = \left(\frac{1}{2\pi mkT} \right)^{3/2} e^{-\frac{p^2}{2kTm}} \quad (88)$$

элементар ҳажм $dp_x dp_y dp_z$ га кўпайтириш керак, яъни:

$$dW(p_x, p_y, p_z) = f(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z \quad (89)$$

Идеал газ учун умумлашган импульс қийматлари (87) оралиқда ва умумлашган координата қийматлари

$$\begin{aligned} q_x, & q_x + dq_x, \\ q_y, & q_y + dq_y, \\ q_z, & q_z + dq_z \end{aligned} \quad (90)$$

оралиқда бўлиш эҳтимоллиги $dW(p_x, p_y, p_z, q_x, q_y, q_z)$ ни аниқлаймиз.

Идеал газ зарралари (Гиббс ансамбли элементлари) идиш ҳажми V нинг ихтиёрий нуқтасида бўлиш эҳтимоллиги бир хил бўлганлиги учун умумлашган координата қийматларининг (90) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги

$$dW(q_x, q_y, q_z) = dq_x dq_y dq_z / V \quad (91)$$

ифода билан аниқланади.

Умумлашган импульс қийматларининг (87) оралиқда бўлиши ҳамда умумлашган координата қийматларининг (90) оралиқда бўлиши бир-бирига боғлиқ воқеалар бўлмаганлиги учун изланаётган эҳтимоллик $dW(p, q)$ уларнинг эҳтимолликларининг кўпайтмасига тенг, яъни:

$$dW(p, q) = \frac{1}{V} \left(\frac{1}{2\pi mkT} \right)^{3/2} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dp dq \quad (92)$$

Бу ифодада элементар "ҳажм" $dp dq = dp_x dp_y dp_z dq_x dq_y dq_z$ нинг ўлчамлиги (энергия $\times$ вақт)³, эҳтимолликлар зичлиги ўлчамлиги эса (энергия $\times$ вақт)⁻³ дан иборат. Эҳтимолликлар зичлиги ўлчамсиз бўлиши учун уни ўлчами (энергия $\times$ вақт)³ бўлган h^3 га кўпайтирамиз (h — Планк доимийси). Бу ҳолда (92) ифода

$$dW(p, q) = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dn \quad (93)$$

кўринишда ёзилади. Бунда

$$p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2; \quad dn = dp dq / h^3.$$

(93) даги эҳтимолликлар зичлиги учун қуйидагини оламиз:

$$f(p, q) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{p^2}{2mkT}}, \quad (94)$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2} \quad (95)$$

Бунда Z_1 — қаралаётган идеал газ учун статистик интеграл. (93) тақсимот функциясини импульс, тезлик ва координаталар қийматлари тақсимотлари бўйича ёзайлик:

$$dW(p, q) = dW(p) dW(q) = \left(\frac{\beta h^2}{2\pi m} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} \frac{dp_x dp_y dp_z}{h^3} \frac{dq_x dq_y dq_z}{V}.$$

Бунда

$$dW(p) = \left(\frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z, \quad (96)$$

$$dW(q) = \frac{dq_x dq_y dq_z}{V}, \quad \beta = 1/kT, \quad (97)$$

...езайлик:

$$dW(p) = dW(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = \left(\frac{m}{2\pi\theta} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2\theta}(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2)} d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z. \quad (98)$$

Буларда тақсимот функциялари (эхтимолликлар зичлиги)

$$f(q_x, q_y, q_z) = \frac{1}{V}; \quad (99)$$

$$f(p_x, p_y, p_z) = \left(\frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}, \quad (100)$$

$$f(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = \left(\frac{m}{2\pi\theta} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2\theta}(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2)}. \quad (101)$$

(100) ва (101) лардан кўринадикки, импульс ва тезлик компонентлари қийматларининг эҳтимолликлари тақсимотини мумкин. Масалан,

$$f(p_x, p_y, p_z) = f(p_x) f(p_y) f(p_z),$$

$$f(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = f(\vartheta_x) f(\vartheta_y) f(\vartheta_z)$$

ифодаларда

$$f(p_i) = \left(\frac{\beta}{2\pi m} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta p_i^2}{2m}}, \quad (102)$$

$$f(\vartheta_i) = \left(\frac{m}{2\pi\theta} \right)^{1/2} e^{-\frac{m\vartheta_i^2}{2\theta}}, \quad i = x, y, z. \quad (102, a)$$

Эслатма:

$$f(E)dn = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad \frac{1}{Z} = \frac{\beta^v h^3 g_v}{\Lambda \Gamma(v+1)}$$

ифодада битта зарра учун

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{m\theta^2}{2} = \frac{m}{2}(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2),$$

$$\beta = \frac{3}{2U} = \frac{1}{kT}; \quad v = \frac{3}{2}, \quad s = 3, \quad g_v = 1$$

эканлигидан (93) ифодани бевосита олиш ҳам мумкин эди.

3.13-мисала. Идеал газ зарраларининг идиш деворига босими аниқлансин ва бу ҳолда $\beta = 1/kT$ эканлиги кўрсатилсин.

Еч иш. Ҳар бир зарра OX ўққа тик юзага $2m\vartheta_x$ импульс беради (3.4-расм). Бирлик вақтда бирлик юзага тезликлари $(\vartheta_x, \vartheta_x + d\vartheta_x)$ оралиқда бўлган молекулаларнинг урилишлари сони

$$n\vartheta_x f(\vartheta_x) d\vartheta_x; \quad (1)$$

n — бирлик ҳажмдаги молекулалар сони. Бунда

$$f(\vartheta_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{m\vartheta_x^2}{2kT}}. \quad (2)$$

Газнинг идиш деворига босимини топиш учун $\vartheta_x n f(\vartheta_x) d\vartheta_x$ ни $2m\vartheta_x$ га қўпайтириб, $(0; \infty)$ оралиқда ϑ_x бўйича интеграллаш лозим (цилиндр ичидаги молекулалар сони $n\vartheta_x$, цилиндр асосининг юзи 1 см^2):


$$P = 2mn \int_0^{\infty} \vartheta_x^2 f(\vartheta_x) d\vartheta_x. \quad (3)$$

Интегрални ҳисоблаб,

$$P = 2mn \int_0^{\infty} \vartheta_x^2 f(\vartheta_x) d\vartheta_x = \frac{4n}{\beta\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = n/\beta \quad (4)$$

эканлигини аниқлаш мумкин. Тажрибадан идеал газ тенгламаси маълум:

$$P = nkT. \quad (5)$$



3.4-расм.

(4) ва (5) лардан идеал газ учун $1/\beta = \theta = kT$ тенгликни топамиз.

Изоҳ.

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3}{m\beta}$$

ифодада

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

тенгликни эътиборга олсак, $\overline{v_x^2} = 1/m\beta$ келиб чиқади. Бундан фойдаланиб, яна $P = n/\beta$ ифода олиниши мумкин.

3.14-масала. Максвеллнинг тезликлар тақсимоти

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

максимумга эришадиган қийматга тўғри келадиган энг катта эҳтимолли тезлик v , ни аниқланг.

Еч и ш. Функция $f(v)$ нинг максимумга эришиш шартини $\partial f(v)/\partial v = 0$ бўлганлиги учун $f(v)$ дан ҳосила олиб, уни нолга тенглаштириб, қуйидаги тенгламани оламиз:

$$1 - v^2 m / 2kT = 0.$$

Бундан:

$$v = \sqrt{2 \frac{kT}{m}}.$$

3.15-масала. Тезлик v нинг ўртача арифметик қиймати $\bar{v}$ ни аниқланг.

Еч и ш.

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = \\ &= 4 \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} \int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx. \end{aligned}$$

$$\beta = \frac{3}{2U} = \frac{1}{kT}; v = \frac{3}{2}, s = 3, g_v = 1$$

эканлигидан (93) ифодани бевосита олиш ҳам мумкин эди.

3.13-масала. Идеал газ зарраларининг идиш деворига босими аниқлансин ва бу ҳолда $\beta = 1/kT$ эканлиги кўрсатилсин.

Еч иш. Ҳар бир зарра OX ўққа тик юзага $2m\vec{v}_x$ импульс беради (3.4-рasm). Бирлик вақтда бирлик юзага тезликлари $(v_x, v_x + dv_x)$ оралиқда бўлган молекулаларнинг урилишлари сони

$$n\vec{v}_x f(v_x) dv_x; \quad (1)$$

n — бирлик ҳажмдаги молекулалар сони. Бунда

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}. \quad (2)$$

Газнинг идиш деворига босимини топиш учун $v_x n f(v_x) dv_x$ ни $2m\vec{v}_x$ га қўпайтириб, $(0; \infty)$ оралиқда v_x бўйича интеграллаш лозим (цилиндр ичидаги молекулалар сони $n\vec{v}_x$, цилиндр асосининг юзи 1 см^2):


$$P = 2mn \int_0^{\infty} v_x^2 f(v_x) dv_x. \quad (3)$$

Интегрални ҳисоблаб,

$$P = 2mn \int_0^{\infty} v_x^2 f(v_x) dv_x = \frac{4n}{\beta\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = n/\beta \quad (4)$$

эканлигини аниқлаш мумкин. Тажрибадан идеал газ тенгламаси маълум:

$$P = nkT. \quad (5)$$



3.4-рasm.

(4) ва (5) лардан идеал газ учун $1/\beta = \theta = kT$ тенгликни топамиз.

Изоҳ.

$$\overline{\vartheta^2} = \int_0^\infty \vartheta^2 f(\vartheta) d\vartheta_x = \frac{3}{m\beta}$$

ифодада

$$\overline{\vartheta^2} = \overline{\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2} = 3\overline{\vartheta_x^2}$$

тенгликни эътиборга олсак, $\overline{\vartheta_x^2} = 1/m\beta$ келиб чиқади. Бундан фойдаланиб, яна $P = n/\beta$ ифода олиниши мумкин.

3.14-масала. Максвеллнинг тезликлар тақсимооти

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}}$$

максимумга эришадиган қийматга туғри келадиган энг катта эҳтимолли тезлик ϑ_* ни аниқланг.

Еч и ш. Функция $f(\vartheta)$ нинг максимумга эришиш шарти $\partial f(\vartheta)/\partial \vartheta = 0$ бўлганлиги учун $f(\vartheta)$ дан ҳосила олиб, уни нолга тенглаштириб, қуйидаги тенгламани оламиз:

$$1 - \vartheta_*^2 m / 2kT = 0.$$

Бундан:

$$\vartheta_* = \sqrt{2 \frac{kT}{m}}.$$

3.15-масала. Тезлик ϑ нинг ўртача арифметик қиймати $\bar{\vartheta}$ ни аниқланг.

Еч и ш.

$$\begin{aligned} \bar{\vartheta} &= \int_0^\infty \vartheta f(\vartheta) d\vartheta = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty \vartheta^3 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta = \\ &= 4 \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} \int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx. \end{aligned}$$

Бундан:

$$\bar{\vartheta} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}.$$

3.16-масала. Ўртача квадратик тезлик $\overline{\vartheta^2}$ ни аниқланг.

Е ч и ш .

$$\overline{\vartheta^2} = \int_0^{\infty} \vartheta^2 f(\vartheta) d\vartheta = \frac{8}{\sqrt{\pi}} \frac{kT}{m} \int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2} dx.$$

Бундан

$$\overline{\vartheta^2} = \frac{3kT}{m}, \quad \sqrt{\overline{\vartheta^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}.$$

3.17-масала. Ҳар бир заррага тўғри келувчи ўртача энергия U ни топинг.

Е ч и ш .

$$U = \langle E \rangle = \int_0^{\infty} \frac{m\vartheta^2}{2} f(\vartheta) d\vartheta = \frac{m}{2} \int_0^{\infty} \vartheta^2 f(\vartheta) d\vartheta = \frac{m}{2} \overline{\vartheta^2}.$$

$\overline{\vartheta^2} = 3kT/m$ эканлигидан фойдалансак:

$$U = \langle E \rangle = \frac{3kT}{2}.$$

3.18-масала. Идеал газ иккита молекуласи квадратик нисбий тезлиги g^2 нинг ўртача қиймати аниқлансин ҳамда

$$\overline{g_{ik}^2} = \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2}, \quad (1)$$

бир хил зарралар учун эса

$$\overline{g^2} = 2\overline{\vartheta^2} \quad (2)$$

эканлиги кўрсатилсин.


Е ч и ш . 1) Ечимни бевосита ҳисоблаб кўрсатиш мумкин (қ. [10]) i ва k зарраларнинг нисбий тезлиги

$$\overline{g_{ik}} = \overline{\vartheta_i} + \overline{\vartheta_k}$$

ифодадан

$$g_{ik}^2 = \vartheta_i^2 + \vartheta_k^2 + 2\vartheta_i \vartheta_k \cos \theta_{ik}$$

ифодани оламиз (3.5-расм). Бунда θ_{ik} тезликлар $\vec{\vartheta}_i$ ва $\vec{\vartheta}_k$ орасидаги бурчак. Маълум йўналишга, масалан, $\vec{\vartheta}_k$ йўналишга нисбатан



3.5-расм.

$\vec{\vartheta}_i$ ларнинг йўналишлари (мувозанат ҳолатида) симметрик-дир (тенг эҳтимоллидир). Акс ҳолда газда ички оқимлар ҳосил бўлган бўлади. Шунинг учун $\overline{\theta_{ik}} = 0$,

$$\overline{g_{ik}^2} = \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2} + 2\overline{\vartheta_i \vartheta_k \cos \theta_{ik}} = \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2}$$

натижани оламиз. Бир хил молекулалар учун: $\overline{g^2} = 2\overline{\vartheta^2}$.

3.11-§. ЧИЗИҚЛИ ГАРМОНИК ОСЦИЛЛЯТОР КООРДИНАТАСИ ВА ИМПУЛЬСИ ҚИЙМАТЛАРИ ЭҲТИМОЛЛИКЛАРИ ТАҚСИМОТИ

Осцилляторни қараш билан боғлиқ масалалар физикада жуда кўп учрайди. Масалан, қаттиқ жисм атомлари узининг мувозанат ҳолати атрофида кичик тебраниб туриши масаласини қарайлик. Бундай тизим энергиясини (гамилъ-тонианини) қуйидагича ёзиш мумкин:

$$E = \sum_{\alpha} \left(\frac{1}{2m} p_{\alpha}^2 + \frac{k_{\alpha} x_{\alpha}^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} (p_{\alpha}^2 + \omega_{\alpha}^2 q_{\alpha}^2) = \sum_{\alpha} \epsilon_{\alpha}; \quad (103)$$

бунда $p_{\alpha} = p'_{\alpha} / \sqrt{m}$ — умумлашган импульслар, $q_{\alpha} = x_{\alpha} \sqrt{m}$ — нормал координаталар; $\omega_{\alpha}^2 = k_{\alpha} / m$. Демак, бу ҳолда тизимнинг энергияси E бир-бирига боғлиқ бўлмаган нормал тебранишлар энергиялари йиғиндисига, яъни чизиқли гармоник осцилляторлар энергиялари йиғиндиси кўринишига келади. Чизиқли гармоник осцилляторнинг энергияси

$$\epsilon_{\alpha} = \frac{1}{2} (p_{\alpha}^2 + \omega_{\alpha}^2 q_{\alpha}^2); \quad (104)$$

қуйида индекс α ни ёзмаймиз.

Асосий масала, осциллятор нормал координати q нинг қийматлари $q, q + dq$ оралиқда бўлиш эҳтимоллиги

$$dW(q) = f(q)dq \quad (105)$$

ҳамда умумлашган импульслар p нинг қийматлари $p, p + dp$ оралиқда бўлиш эҳтимоллиги

$$dW(p) = f(p)dp \quad (106)$$

ифодаларини аниқлашдан иборат.

Классик статистикада кинетик ва потенциал энергиялар $E_p = p^2/2$, $E_q = \omega^2 q^2/2$ кўринишда бўлгани учун одатда бу масала осонгина ечилади:

$$dW_{kn}(q) = a \exp[-\omega^2 q^2/2kT], \quad (107)$$

$$dW_{kn}(p) = b \exp[-p^2/2kT], \quad (108)$$

бунда a ва b нормалаш шартларидан топилади. Ҳақиқатан,

$$a \int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-\omega^2 q^2 / 2kT] dq = 1,$$

$$b \int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-p^2 / 2kT] dp = 1$$

тенгликлардан a ва b ни топамиз: $a = \omega / \sqrt{2\pi kT}$; $b = 1 / \sqrt{2\pi kT}$. Бу ерда интеграллар тез яқинлашгани сабабли q ва p лар $(-\infty, \infty)$ оралиқда ўзгаради деб қабул қилинди.

Квант статистикасида (105) ва (106) даги эҳтимолликлар зичликлари $f(q)$, $f(p)$ ни қуйидаги ифодалардан топилади:

$$f(q) = \sum_n \rho_n |\psi_n(q)|^2, \quad (109)$$

$$f(p) = \sum_n \rho_n |\psi_n(p)|^2, \quad (110)$$

бунда ρ_n — Гиббс тақсимооти:

$$\rho_n = \frac{1}{Z} e^{-\epsilon_n / kT} \quad (111)$$

$$\epsilon_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) \quad (112)$$

$\psi_n(q)$ ва $\psi_n(p)$ — осцилляторнинг энергиясига мос келган тўлқин функциялар. Осцилляторга тегишли эҳтимолликлар зичликлари $f(q)$ ва $f(p)$ ни биринчи марта Блох аниқлаган. Унинг (109) ва (110) асосида аниқлаган йўли етарли даражада мураккаб (қ. [11]).

Биз бу ерда Блох томонидан олинган натижани ўз усулимиз билан осонгина оламиз.

Чизиқли осциллятор учун $\nu = 1$. Шунинг учун

$$\beta = \nu/U = 1/\langle \epsilon \rangle, \quad (113)$$

$\langle \epsilon \rangle$ — чизиқли осцилляторнинг ўртача энергияси. Квант ҳолатларда энергия қийматлари (112) ифода билан, тақсимот функцияси Гиббс тақсимои (111) бўйича аниқланади деб, $\langle \epsilon \rangle$ нинг умумий ифодасини оламиз:

$$\langle \epsilon \rangle = \sum_n \epsilon_n \rho_n = \frac{\hbar\omega}{2} \coth \frac{\hbar\omega}{2kT} \quad (114)$$

q ва p қийматлари эҳтимолликлари тақсимотини ўзимизнинг усулимиз билан аниқлаймиз. Аммо бунда тақсимот функцияси $f(\epsilon) = \frac{1}{Z} e^{-\beta\epsilon}$ ифодасида ϵ нинг классик ифодаси (104) дан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} f(\epsilon) &= A \exp(-\beta\epsilon) = A \exp\left(-\frac{\beta}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)\right) = \\ &= A_1 \exp\left[-\frac{\omega}{\hbar}\left(\hbar \frac{\hbar\omega}{2kT}\right)q^2\right] \cdot A_2 \exp\left[-\frac{1}{\omega\hbar}\left(\hbar \frac{\hbar\omega}{2kT}\right)p^2\right]. \end{aligned} \quad (115)$$

Нормалаштириш шартларидан

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(p) dp = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(q) dq = 1.$$

A_1 ва A_2 ларни топиб ва ўрнига қўйиб, эҳтимолликлар зичликлари $f(q)$ ҳамда $f(p)$ учун ушбуларни оламиз:

$$f(q) = \left(+ \frac{\omega}{\pi \hbar} \frac{\hbar \omega}{2kT} \right)^{1/2} \exp \left[-q^2 \frac{\omega}{\hbar} \frac{\hbar \omega}{2kT} \right], \quad (116)$$

$$f(p) = \left(+ \frac{1}{\omega \pi \hbar} \frac{\hbar \omega}{2kT} \right)^{1/2} \exp \left[-p^2 \frac{1}{\omega \hbar} \frac{\hbar \omega}{2kT} \right]. \quad (117)$$

(116) ва (117) ифодаларнинг хусусий ҳолларини кўрайлик:

1. Классик ҳол, яъни $\hbar \omega \ll kT$ бўлсин. Бунда $\left(x = \frac{\hbar \omega}{kT} \right)$

$$\frac{\hbar \omega}{2kT} = \frac{e^{x/2} - e^{-x/2}}{e^{x/2} + e^{-x/2}} = \frac{x}{2} = \frac{\hbar \omega}{2kT}.$$

Демак, (116) ва (117) дан классик статистика натижаларини оламиз:

$$f_{\text{кл}}(q) = \left(\frac{\omega^2}{2\pi kT} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\omega^2 q^2}{2kT} \right], \quad (118)$$

$$f_{\text{кл}}(p) = \left(\frac{1}{2\pi kT} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{p^2}{2kT} \right]. \quad (119)$$

Бу ерда иккинчи ифода — Максвелл тақсимооти функцияси.

2. Квант ҳол, яъни $\hbar \omega \gg kT$. Бунда $\frac{\hbar \omega}{2kT} = 1$.

Демак, бунда (116) ва (117) ифодалар қуйидагича бўлади:

$$f(q) = \left(\frac{\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{\omega}{\hbar} q^2 \right] = \psi_0^2(q), \quad (120)$$

$$f(p) = \left(\frac{1}{\omega \pi \hbar} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{1}{\omega \hbar} p^2 \right] = \psi_0^2(p), \quad (121)$$

буларда

$$\psi_0(q) = \left(\frac{\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{\omega}{2\hbar} q^2 \right], \quad (122)$$

$$\psi_0(p) = \left(\frac{1}{\omega \pi \hbar} \right)^{1/4} \exp \left[\frac{-1}{2\omega \hbar} p^2 \right] \quad (123)$$

$\psi_0(q)$ ва $\psi_0(p)$ осциллятор асосий ҳолатининг q — тасаввур ва p — тасаввурдаги тулқин функцияларидир.

3.19-масала. Нормал координата q ва нормал импульс p ларнинг ўртача квадратик қийматлари $\overline{q^2}$ ва $\overline{p^2}$ аниқлансин.

Е ч и ш. Бизга маълумки,

$$\frac{p^2}{2} + \frac{\omega^2 q^2}{2} = \epsilon.$$

Бундан, умумий усул билан ўртачалаб қуйидагини оламиз:

$$\overline{p^2} + \omega^2 \overline{q^2} = 2\bar{\epsilon}.$$

Чизиқли гармоник осциллятор ўртача энергияси $\bar{\epsilon}$ кинетик ва потенциал энергияларга тенг тақсимлангани учун

$$\frac{\overline{p^2}}{2} = \frac{\bar{\epsilon}}{2}; \quad \frac{1}{2} \overline{\omega^2 q^2} = \frac{\bar{\epsilon}}{2}$$

ёки


$$\langle p^2 \rangle = \langle \epsilon \rangle, \quad \langle q^2 \rangle = \langle \epsilon \rangle / \omega^2.$$

Умумий усул билан ўртача олинганда у тажрибадан ёки бошқа усул билан аниқланган деб қаралади. Биз $\langle \epsilon \rangle$ учун (114) ифодани қабул қилайлик. У ҳолда

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\omega \hbar}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT}, \quad \langle q^2 \rangle = \frac{\hbar}{2\omega} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT} \quad (1)$$

Табиий импульс ва табиий координаталарга ўтиш учун $p = p_x \sqrt{m}$, $q = x / \sqrt{m}$ ларни эътиборга олиш керак:

$$\langle p_x^2 \rangle = \frac{\omega \hbar}{2m} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT}, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{\hbar m}{2\omega} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT} \quad (2)$$



3.6-расм.

3.20-масала. Чизиқли гармоник осциллятор учун фазавий фазонинг энг кичик элементар ҳажми $\Delta p_x \Delta x$ ва $\tau \Delta E$ лар h га тенг эканлигини исбот қилинг (τ — тебраниш даври).

Е ч и ш.

$$\Delta p_x \Delta x = \tau \Delta E = h \quad (1)$$

эканлигини исбот қиламиз. Осциллятор энергияси

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}$$

ифодасини ўзгартириб ёзамиз:

$$\frac{p_x^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/k} = 1. \quad (2)$$

Бундан кўринадики, осциллятор фазавий фазода эллипс чизади (3.6-расм). Шу эллипс билан чегараланган фазавий фазо "ҳажмини" топайлик:

$$\Gamma_E = \pi \sqrt{2mE \frac{2E}{k}} = 2\pi E \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2\pi E}{\omega} = \tau E. \quad (3)$$

Бундан, тебраниш даври $\tau = \text{const}$ бўлганда

$$\Delta \Gamma_E = \tau \Delta E \quad (4)$$

Энергиянинг дискретлик хоссаси

$$\epsilon_n = \hbar \omega (n + 1/2)$$

га асосан, (3) дан икки эллипс орасидаги фазавий фазо элементи учун

$$\Delta \Gamma_E = \Gamma_{n+1} - \Gamma_n = \frac{2\pi}{\omega} \hbar \omega = h \quad (5)$$

ифодани оламиз.

Энергиянинг дискретлик хоссасига асосан, (5) дан куринадики, элементар ҳажм $\Delta \Gamma_E$ Планк доимийси h дан кичик бўла олмайди. Демак, фазавий фазонинг Декарт координаталар тизимида ёзилган элементар ҳажми $\Delta p_x \Delta x$ ҳам h дан кичик бўла олмайди. Булардан исбот қилиниши лозим бўлган (1) ифода келиб чиқади, яъни:

$$\Delta \Gamma_E = \Delta p_x \Delta x = \tau \Delta E = h. \quad (6)$$

Умумий ҳолда:

$$\Delta p_x \Delta x = \tau \Delta E = n h \quad (7)$$

ёки

$$\Delta p_x \Delta x = \tau \Delta E \geq h. \quad (8)$$

Изоҳ. (7) ифода, яъни фазавий фазонинг дискретлиги энергиянинг дискретлигидан келиб чиқди.

Демак, энергия дискрет қийматлар қабул қилганда бу энергияли тизимнинг фазавий фазоси ҳам дискрет бўлади ва аксинча фазавий фазонинг дискретлигидан энергия қийматларининг дискретлиги келиб чиқади.

3.12-§. УМУМЛАШГАН КООРДИНАТА ВА УМУМЛАШГАН ИМПУЛЬС КВАДРАТИК ФЛУКТУАЦИЯЛАРИ ОРАСИДАГИ МУНОСАБАТ

Нормал координата ва нормал импульснинг квадратик флуқтауациялари бизга аввалги параграфдан маълум:

$$\overline{(\Delta p)^2} = \langle \epsilon \rangle, \quad \overline{(\Delta q)^2} = \langle \epsilon \rangle / \omega^2, \quad (122)$$

бунда

$$\langle \epsilon \rangle = \theta = \frac{\hbar \omega}{2} \coth \frac{\hbar \omega}{2 k T}. \quad (123)$$

Умумлашган координата ва умумлашган импульсга нисбатан (122) ифода

$$\overline{(\Delta p_x)^2} = m \langle \epsilon \rangle, \quad \overline{(\Delta x)^2} = \langle \epsilon \rangle / m \omega^2, \quad (124)$$

куринишда булади. (122) ёки (124) дан. (123) ни назарда тутиб,

$$[(\Delta p)^2 (\Delta q)^2]^{1/2} = [(\Delta p_x)^2 (\Delta x)^2]^{1/2} = \frac{\hbar}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT} \quad (125)$$

муносабатни оламир. Бунда $\operatorname{cth} x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ гиперболик тангенс ($1, \infty$) оралиқда ўзгаради (3.7-расм), $x = \hbar \omega / 2kT$ белгилан киритайлик.

1. $T \rightarrow \infty$ (ёки $\omega \rightarrow 0$) бўлганда $x \rightarrow 0$ бўлади. Бу ҳолда $\operatorname{cth} x \rightarrow \infty$ эканлиги ўзининг ифодасидан маълум.

2. $T \rightarrow 0$ бўлганда $x \rightarrow \infty$ бўлади. Бу ҳолда $\operatorname{cth} x \rightarrow 1$ бўлади. Демак, бу ҳолда (125) муносабат

$$[(\Delta x)^2 (\Delta p)^2] = \frac{\hbar^2}{2} \quad (126)$$


тенгликдан иборат. Квант механикасида маълумки, бу тенглик вакуум ҳолат учун (энергиянинг минимал қиймати учун) ўринли. Бошқача айтганда, квант механикасидаги вакуум ҳолат статистик физикадаги температура ноль ($T = 0$) бўлгандаги ҳолатнинг ўзидир. Шундай қилиб, юқоридаги айтилганлардан

$$\operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT} \geq 1 \quad (127)$$

муносабат ўринли. Бу муносабат туфайли (125) ни

$$[(\Delta x)^2 (\Delta p_x)^2]^{1/2} \geq \frac{\hbar}{2} \quad (128)$$

куринишда ёзиш мумкин: бу эса квант механикасидаги Гейзенберг муносабатидир. (128) ифода (125) муносабатнинг хусусий ҳоли эканлиги табиий.



3.7-расм.

(125) ифодани қисқача *иккинчи флуктуацион муносабат* (Гейзенбергнинг умумий муносабати) деб атала бошланди. Қўшалоқ куч ва координата (термодинамик куч ва термодинамик оқим) флуктуациялари флуктуацион-диссиптацион теоремаси ва бошқа бир қанча муносабатлар билан (125) муносабат орасида умумий боғланиш борлигини кейин кура-миз.

IV Б О Б

ТЕРМОДИНАМИК МУНОСАБАТЛАР

Термодинамик муносабатлар, жумладан термодинамика қонунлари тажрибалар асосида аниқланган.

Статистик физикада термодинамик параметрлар ва улар орасидаги муносабатларни молекуляр-кинетик тасаввур асо-сида келтириб чиқарилади, сўнг уларни тажрибанинг нати-жалари билан солиштирилади. Статистик физиканинг асо-сий тажрибавий таянчи ҳам шунда. Биз бу бобда термоди-намик параметрлар (моментлар) ва улар орасидаги муно-сабатларни статистик физика асосида келтириб чиқарамиз.

4.1-§. СТАТИСТИК ТЕРМОДИНАМИКАНИНГ АСОСИЙ МУНОСАБАТИ

Мувозанатдаги тизим учун тақсимот функцияси маълум:

$$f(E) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E}{\theta}\right), \quad \theta = U / \nu, \quad U = \langle E \rangle, \quad (1)$$

бунда статистик интеграл

$$Z = \int \exp\left(-\frac{E}{\theta}\right) dn. \quad (2)$$

Z нинг мувозанатдаги жараёнда ўзгаришини аниқлаш учун уни дифференциаллаймиз:

$$\frac{dZ}{Z} = \frac{1}{Z} \int_{(n(p,q))} e^{-\frac{E}{\theta}} d\left(-\frac{E}{\theta}\right) dn = \int_{(n(p,q))} f(E) d\left(-\frac{E}{\theta}\right) dn.$$

Бундан:

$$\frac{dZ}{Z} = \langle d(-\frac{E}{\theta}) \rangle, \quad (3)$$

(3) нинг ўнг томонини (1) ни назарга олган ҳолда бундай ёзамиз:

$$\langle d(-\frac{E}{\theta}) \rangle = \frac{1}{\theta} (\langle E \rangle - \langle dE \rangle) - d\ln \theta.$$

Энди (3) ни қайта ёзамиз:

$$\theta d(\ln Z) = d\langle E \rangle + \langle -dE \rangle. \quad (4)$$

Бу тенглик статистик термодинамика учун асос бўлади. Асосий термодинамик муносабат (4) дан мувозанатдаги жараёнлар учун тулиқ дифференциал

$$dS = d(\ln Z), \quad \ln Z = \beta U \quad (5)$$

ва демак, ҳолат функцияси S мавжуд деган муҳим хулоса келиб чиқади.

Бизнинг бу янги услубимиз асосида олинган S функция тизимнинг энтропияси эканлигини кейинроқ кўрамиз.

4.1-масала. Ўзаро мувозанатда бўлган икки A ва B берк тизим учун

$$W_i = \frac{1}{Z_A} e^{-\beta_A E_i^A}, \quad W_j = \frac{1}{Z_B} e^{-\beta_B E_j^B} \quad (1)$$

каноник тақсимотлар ўринли. Буларда $\beta_A = \beta_B$ эканлигини кўрсатинг.

Еч и ш. Ҳар икки $(A + B)$ тизим учун каноник тақсимот

$$W_{ij} = \frac{1}{Z_{AB}} e^{-\beta_{AB} E_{ij}^{AB}} \quad (2)$$

кўринишда бўлади. W_{ij} — умумий тизимнинг A қисми i ҳолатда бўлганда, B қисми j ҳолатда бўлиш эҳтимолидир; бунда

$$E_{ij}^{AB} = E_i^A + E_j^B. \quad (3)$$

Икки A ва B тизим бир-бирига боғлиқ эмас деб қаралганда

$$W_{ij} = W_i^A W_j^B \quad (4)$$

тенглик уринли. Демак, (1) ва (2) ифодалардан

$$\frac{1}{Z_{AB}} e^{-\beta_{AB}(E_i^A + E_j^B)} = \frac{1}{Z_A Z_B} e^{-\beta_A E_i^A - \beta_B E_j^B} \quad (5)$$

тенгликни оламиз. Буларда:

$$Z_{AB} = \sum_{ij} e^{-\beta_{AB}(E_i^A + E_j^B)}$$

$$Z_A Z_B = \sum_{ij} e^{-\beta_A E_i^A + \beta_B E_j^B}$$

(5) ни қуйидагича ёзамиз:

$$\begin{aligned} \ln \frac{Z_{AB}}{Z_A Z_B} &= -\beta_{AB}(E_i^A + E_j^B) + \beta_A E_i^A + \beta_B E_j^B = \\ &= (\beta_A - \beta_{AB})E_i^A + (\beta_B - \beta_{AB})E_j^B. \end{aligned} \quad (6)$$

Бунда E_i , E_j мусбат қийматлар. (i, j) ихтиёрий бўлганда (6) нинг ўнг томони доимий бўлиши учун $\beta_A = \beta_B = \beta_{AB}$ бўлиши шарт. Булардан $Z_A Z_B = Z_{AB}$ тенглик келиб чиқади. $\beta_A = \beta_B$ тенгликни *термодинамиканинг полинчи қонуни* деб ҳам юритилади. Анъанавий қарашда $\beta = \frac{1}{kT}$ бўлганлиги учун $\beta_A = \beta_B$ тенглик $T_A = T_B$ тенгликка эквивалентдир.

4.2-§. ТЕРМОДИНАМИКАНИНГ БИРИНЧИ ҚОНУНИ

Тизимнинг энергияси (гамильтониани) E унинг ҳажми V , эркинлик даражалари сони ν (одатдаги баёнда зарралар сони N) ва умумлашган параметрлар x_i ларга боғлиқ, яъни

$$E = E(p, q; V, \nu, x_i)$$

булсин. Бу ҳолда

$$dE = \sum_i \left(\frac{\partial E}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial E}{\partial p_i} dp_i \right) + \frac{\partial E}{\partial V} dV + \frac{\partial E}{\partial v} dv + \sum_k \frac{\partial E}{\partial x_k} dx_k. \quad (6)$$

Гамильтон тенгламалари

$$\dot{q}_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial E}{\partial q_i}$$

асосида

$$\sum_i \left(\frac{\partial E}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial E}{\partial p_i} dp_i \right) = \sum_i (-\dot{p}_i dq_i + \dot{q}_i dp_i) = 0 \quad (7)$$

бўлади. Тизим томонидан ташқи тизимга кўрсатилаётган босимни P , ташқи тизимга таъсир қилаётган умумлашган кучларни эса F_k деб белгиласак, эркинлик даражасига мос келган кимёвий потенциал μ_v ни, таърифга кўра, қуйидагича аниқланади:

$$P = -\left\langle \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{x_k, v} \right\rangle, F_k = -\left\langle \left(\frac{\partial E}{\partial x_k} \right)_{V, v} \right\rangle, \mu_v = +\left\langle \left(\frac{\partial E}{\partial v} \right)_{V, x_k} \right\rangle. \quad (8)$$

(6), (7) ва (8) ифодаларни назарда тутиб, асосий муносабат (4) ни қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\theta d(v + \ln Z) = dU + p dV + \sum_k F_k dx_k - \mu_v dv. \quad (9)$$

Агар ташқи босим ва ташқи кучларга қарши бажарилган ишни dA билан белгиласак, яъни

$$dA = p dV + \sum_k F_k dx_k \quad (10)$$

деб олсак, (9) муносабатни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\theta d(v + \ln Z) = dU + dA - \mu_v dv. \quad (11)$$

Маълумки, термодинамиканинг биринчи қонуни учун қуйидаги умумий муносабат ўринли

$$dQ = dU + dA - \mu_v dN, \quad (12)$$

бунда dQ тизимга берилаётган (ёки ундан олинаётган, агар $dQ < 0$ бўлса) иссиқлик миқдори.

Биздаги μdv ўрнига одатда $\mu_N dN$ ёзилади; dN зарралар сони ўзгариши, μ_N — битта заррага туғри келган кимёвий потенциал; аёнки,

$$\mu dv = \mu_N dN.$$

Карно теоремасига асосан, умумий ҳолда, яъни қайтмас (хусусий ҳолда қайтувчан) жараёнларда бажарилган (12) даги dA иш қайтувчан жараёнларда бажарилган (11) даги) dA ишдан катта бўла олмайди. Мазкур теоремани ҳамда $\mu_N dN = \mu dv$ ни эътиборга олсак, (11) ва (12) тенгликлардан қуйидаги муҳим муносабатни оламиз

$$dQ \geq \theta d(v + \ln Z). \quad (13)$$

Бунда тенглик ишораси қайтувчан (мувозанатдаги жараёнлар учун), тенгсизлик ишораси эса қайтмас жараёнлар учун ўринли.

Асосий муносабат (4) ни эътиборга олиб ушбуни ёзишимиз мумкин:

$$dQ \leq d \langle E \rangle - \langle dE \rangle. \quad (14)$$

Бу муносабатдан dQ нинг статистик маъноси келиб чиқади: мувозанатдаги (қайтувчан) жараёнларда тизим томонидан олинган иссиқлик миқдори dQ ички энергия ўзгариши (ўртача гамильтониан ўзгариши) билан гамильтонианлар ўзгариши ўртачаси орасидаги фарққа тенг. Қолган ҳолларда, яъни қайтмас жараёнларда тизим томонидан олинган иссиқлик миқдори dQ бу фарқдан кам бўлади. (12) ва (13) дан

$$\theta d(v + \ln Z) \geq dU + dA - \mu_N dv \quad (15)$$

муносабат ўринли эканлигини кўрамиз. Шундай қилиб,

$$dQ = \theta d(v + \ln Z) \quad (16)$$

ни назарга олсак, (11) муносабатнинг мувозанатдаги (қайтувчан) жараёнлар учун статистик физика асосида олинган термодинамиканинг биринчи қонуни эканлигини кўрамиз.

Бу ерда шуни таъкидлаймизки, классик термодинамикада бирламчи тушунчалар "иссиқлик" ва "иш" асосида янги тушунча бўлган ҳолат функцияси — "ички энергия" киритилади. Статистик термодинамикада кўрдикки, "ички энергия" ва "иш" тушунчалари асосида янги тушунча "иссиқлик", киритилди.

Биз статистик интеграл (йиғинди) ифодасини биламиз:

$$\frac{1}{Z} = \frac{h^S g \beta^v}{A \Gamma(v+1)}; \quad \beta = 1/\theta, \quad (17)$$

бунда Z ни ўзгарувчилар θ , v , V ва $x_1, x_2, \dots, x_k$ ларнинг функцияси деб қарайлик, яъни:

$$Z = Z(\theta, v, V; x_1, \dots, x_k, \dots). \quad (18)$$

Z нинг дифференциалини (17) асосида аниқлайлик:

$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial Z}{\partial v} dv + \sum_k \frac{\partial Z}{\partial x_k} dx_k + \frac{\partial Z}{\partial V} dV. \quad (19)$$

Бунда, (17) га асосан,

$$\frac{\partial Z}{\partial \theta} = \frac{v}{\theta} Z, \quad d\theta = \frac{1}{v} (dU - \theta dv). \quad (20)$$

(20) ни эътиборга олиб, (19) ни қайта ёзамиз:

$$\begin{aligned} \theta d(v + \ln Z) &= dU + \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{\theta, v, x_k} dV + \\ &+ \sum_k \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial x_k} \right)_{\theta, v, V} dx_k + \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial v} \right)_{\theta, V, x_k} dv. \end{aligned} \quad (21)$$

(21) ни умумий муносабат (9) билан солиштириб ушбуларни оламиз:

$$P = \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{\theta, v, x_k}, \quad (22)$$

$$F_k = \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial x_k} \right)_{\theta, V, V'} \quad (23)$$

$$\mu_r = -\theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial v} \right)_{\theta, V, x_k} \quad (24)$$

Тарихий маълумот. Термодинамиканинг I қонунининг кашф этилиши учта буюк олим номи билан боғланади:

Немис олимлари **Юлиус Роберт Майер** (1814—1878), **Германн Людвиг Фердинанд Гельмгольц** (1821—1894), инглиз олими **Жеймс Прескотт Жоуль** (1818—1889). Майер термодинамиканинг I-қонунини кашф қилган бўлса, Гельмгольц ривожлантириб, энергиянинг сақланиш қонуни деб атади; инглиз олими иш билан иссиқлик эквивалентлигини исбот қилиш учун қирқ йилдан ортиқ тажрибавий тадқиқотлар устида ишлади.

4.3-§. ИССИҚЛИК СИҒИМИ

Таърифга кўра, тизимнинг иссиқлик сиғими қуйидагича аниқланади:

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad (25)$$

Бунда иссиқлик миқдори dQ ни олиши (ёки бериши) туфайли унинг температураси T нинг ўзгариши dT га тенг.

Берк тизим учун термодинамиканинг биринчи қонуни

$$dQ = dU + dA \quad (26)$$

Қулайлик учун тизимнинг ҳолати иккита параметр билан аниқлансин дейлик, яъни $U(T, V)$

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV \quad (27)$$

ва шу билан бирга иш dA фақат босим P туфайлигина бажарилсин дейлик. У ҳолда (26) ни

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] dV \quad (28)$$

ёки

$$C = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \frac{dV}{dT} \quad (29)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

1. Фараз қилайлик, $dV = 0$, яъни V доимий бўлсин. У ҳолда (29) дан

$$C \equiv C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V. \quad (30)$$

Демак,

$$C = C_V + l_V \frac{dV}{dT}, \quad l_V = P + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V. \quad (31)$$

2. Фараз қилайлик, босим ўзгармас бўлсин. У ҳолда (29) дан

$$C \equiv C_P = C_V + l_V \alpha, \quad l_V = \frac{C_P - C_V}{V\alpha}, \quad (32)$$

бунда

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

ҳажмий кенгайиш коэффициентини.

3. Бир моль идеал газ учун (32) ифодани кўрайлик. Идеал газ учун,

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0, \quad l_V = P. \quad (33)$$

Бир моль идеал газнинг ҳолат тенгламаси

$$PV = RT \quad (34)$$

дан $\alpha = 1/T$. (33) ва (34) лардан фойдаланиб, (32) ни ёзамиз:

$$C_P = C_V + R, \quad (35)$$

бунда R — универсал газ доимийси. Буни *Майер тенгламаси* дейилади.

4.4-§. ҲОЛАТ ТЕНГЛАМАЛАРИ

Термодинамиканинг биринчи қонунини берк тизим учун

$$dQ = dU + PdV \quad (36)$$

қурилишда ёзамиз. Ҳолат тенгламаларини V , T ва P , T параметрларга нисбатан ёзайлик

Иссиқлик сифими

$$C = dQ/dT \quad (37)$$

ифода билан аниқланади. Ўзгарувчилар V , T бўлганда

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV. \quad (38)$$

(37) ва (38) ни назарда тутиб, (36) дан

$$(C - C_V)dT = l_V dV \quad (39)$$

тенгламани оламиз, бунда:

$$l_V = P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T. \quad (40)$$

Фараз қилайлик, жараён вақтида $P = \text{const}$ бўлсин. У ҳолда (39) дан

$$l_V = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = \frac{C_P - C_V}{V\alpha} \quad (41)$$

ёки

$$P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{C_P - C_V}{V\alpha},$$

бундан $P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$ деб белгилаш киритиб,

$$(P + P_n)V = \frac{C_P - C_V}{\alpha} \quad (42)$$

ҳолат тенгламасини оламир. (41) ни (39) га қўйиб, T ва V га нисбатан қўйидагича

$$(C - C_V)dT = \frac{C_P - C_V}{V\alpha} dV$$

ёки

$$\frac{dV}{V} = \alpha n_V dT \quad (43)$$

дифференциал ҳолат тенгламасини оламир, бунда

$$n_V = \frac{C - C_V}{C_P - C_V}. \quad (44)$$

Энди (P, T) га нисбатан ҳолат тенгламасини кўрайлик. Бунинг учун (36) нинг ўнг томонини ўзгартириб ёзайлик:

$$dQ = dH - VdP = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + l_P dP, \quad (45)$$

бунда $H = U + PV$;

$$l_P = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T - V. \quad (46)$$

(45) да

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P,$$

чунки $dH_P = d(U + PV) = dU + PdV = dQ$. Шунинг учун (45)

$$(C - C_P)dT = l_P dP \quad (47)$$

кўринишга келади.

Фараз қилайлик, $V = \text{const}$ бўлсин. У ҳолда (47) дан

$$Pl_P \beta = C_V - C_P$$

ёки

$$l_P = \frac{C_V - C_P}{P\beta} \quad (48)$$

ифодани оламиз. (46) ва (48) дан

$$\frac{C_V - C_P}{P\beta} = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T - V$$

ёки $V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ деб белгилаш киритиб,

$$P(V - V_n) = \frac{1}{\beta} (C_P - C_V) \quad (49)$$

ҳолат тенгламасини оламиз. (47) ва (48) лардан P ва T параметрларга нисбатан

$$(C - C_P) dT = \frac{C_V - C_P}{P\beta} dP$$

ёки

$$\frac{dP}{P} = \beta n_P dT \quad (50)$$

ҳолат тенгламасини оламиз; бунда

$$n_P = \frac{C - C_P}{C_V - C_P} \quad (51)$$

Биз

$$C_P - C_V = PVT\alpha\beta \quad (52)$$

эканлигини назарга олсак (қ. 4. 2-масала), (42) ва (49) тенгламаларни

$$(P + P_n) = PT\beta, \quad P_n = P(T\beta - 1), \quad (53)$$

$$(V - V_n) = VT\alpha, \quad V_n = V(1 - T\alpha) \quad (54)$$

қўринишда ёзиш мумкин. Идеал газ учун $V_n = 0$, $P_n = 0$; (53) ва (54) дан идеал газнинг термик коэффициентлари $\alpha_0 = \beta_0 = 1/T$ қиймат қабул қилади. Бу (53) ва (54) ни бири-бирига кўпайтириб, (52) ни назарда тутиб, қуйидаги ҳолат тенгламаси

$$(P + P_n)(V - V_n) = PVT^2 \alpha\beta = T(C_P - C_V) \quad (55)$$

олинади. (53) ва (54) ҳолат тенгламаларидан термик коэф-
фициентлар α ва β учун

$$\beta = \frac{1}{T} + \frac{P_n}{TP} = \beta_0 \left(1 + \frac{P_n}{P} \right), \quad (56)$$

$$\alpha = \frac{1}{T} - \frac{V_n}{VP} = \alpha_0 \left(1 - \frac{V_n}{V} \right) \quad (57)$$

ифодаларни оламир; бунда $\frac{V_n}{TV}$ ва $\frac{P_n}{TP}$ молекулаларнинг ўза-
ро таъсири туфайли α ва β нинг α_0 ва β_0 лардан фарқини
кўрсатувчи параметрлар. (49) ва (50) ҳолат тенгламаларини
бир-бирига қўшамиз:

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = (\alpha n_V + \beta n_P) dT. \quad (58)$$

Бу ҳолат тенгламасини идеал газ учун ёзайлик. Бу ҳолда,
 $\alpha = \beta = 1/T$ эканлигидан, (58) тенглама

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = \frac{dT}{T} \quad (59)$$

қўринишга келади; бунда $n_V + n_P = 1$ эканлиги назарда ту-
тилди. (59) тенгламани интеграллаб ушбуни оламир:

$$PV = \text{const } T,$$

бундан, 1 моль учун $\text{const} = R$ белгилашни киритиб,

$$PV = RT \quad (60)$$

Клапейрон тенгламасини келтириб чиқарамиз.

(58) умумий тенгламанинг унғ томонини (56) ва (57)
ларни назарда тутиб, ўзгартириб ёзайлик:

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = \frac{dT}{T} + \left(n_P \frac{P_n}{P} - n_V \frac{V_n}{V} \right) \frac{dT}{T}. \quad (61)$$

Бу тенгламани интеграллаб,

$$PV = RTe^f \quad (62)$$

ҳолат тенгламасини оламиз; бунда

$$f = \int \left(n_p \frac{P_n}{P} - n_v \frac{V_n}{V} \right) \frac{dT}{T}. \quad (63)$$

$\text{const} = R$ белгилашларни киритдик.

Идеал газ учун $f = 0$, чунки

$$P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0, \quad V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = 0. \quad (64)$$

Бу ҳолда (62) тенгламадан

$$PV = RT \quad (65)$$

Клапейрон тенгламаси (1834 й.) келиб чиқади.

f нинг хусусий ҳоллардаги ифодасини кўрайлик:

$$f = n_p \int \frac{P_n}{P} \frac{dT}{T} - n_v \int \frac{V_n}{V} \frac{dT}{T}.$$

1. Изохорик жараёнда $n_v = 0$, $n_p = 1$,

$$f_v = \int \frac{P_n}{P} \frac{dT}{T}.$$

2. Изобарик жараёнда $n_p = 0$, $n_v = 1$,

$$f_p = - \int \frac{V_n}{V} \frac{dT}{T}.$$

Ван-дер-Ваальс тенгламасидаги

$$P_n = \frac{a}{V^2}, \quad V_n = b \quad (66)$$

тузатмалардан фойдаланиб, қуйидагиларни ёзамиз:

$$f_v = a \int \frac{dT}{PV^2T}, \quad f_p = -b \int \frac{dT}{VT}. \quad (67)$$

$PV = RT$ тенгламадан фойдаланиб, f_p нинг тақрибий ифодасини аниқлаймиз:

$$f_P = -b \frac{P}{R} \int \frac{dT}{T^2} = \frac{b}{V} + \psi(P). \quad (68)$$

Ван-дер-Ваальс тенгламаси $PV^2 = \frac{RTV^2}{V-b} - a = \frac{RTV^2}{V-b}$ дан фойдаланиб f_V ни аниқлаймиз:

$$f_V = a \frac{V-b}{RV^2} \int \frac{dT}{T^2} = -\frac{a}{RTV} (1 - \frac{b}{V}) + \varphi(V). \quad (69)$$

(68) ва (69) ифодалардаги $\varphi(V)$ ва $\psi(P)$ интеграл доимийлари. Бу тақрибийликларда f нинг ҳажм бўйича узгариши, (68) дан кўринадики, $\varphi(V) = b/V$ ифода билан аниқланади. Шунинг учун f нинг ифодасини

$$f = -\frac{a}{VRT} \left(1 - \frac{b}{V}\right) + \frac{b}{V} = \frac{1}{V} \left[b - \frac{a}{RT} \left(1 - \frac{b}{V}\right) \right] \quad (70)$$

кўринишида олайлик. Бундай тақрибийликдаги янги ҳолат тенгламаси

$$PV = RT \exp \left\{ \frac{1}{V} \left[b - \frac{a}{RT} \left(1 - \frac{b}{V}\right) \right] \right\} \quad (71)$$

кўринишга эга бўлади. Бизнинг бу ҳолат тенгламамизнинг хусусий ҳолларини кўрайлик:

1) Идеал газ учун $a = 0$, $b = 0$. Бу ҳолда (71) Клапейрон тенгламасига ўтади.

2) Молекуляр физика нуқтаи назардан a — тортишиш кучлари ва b — итариш кучлари билан боғлиқ тузатмалар. Маълум температурада (инверсия температурасида Бойль нуқтасида) уларнинг ҳиссалари тенглашади ва бу температурада реал газ идеал газ каби бўлади. Бизнинг тенгламамиз (71) дан кўринадики, $b - (a/RT_i)(1 - b/V) = 0$ да, яъни $T_i = (a/Rb)(1 - b/V)$ бўлганда (71) тенглама идеал газ тенгламасига ўтади:

$$PV = RT_i.$$

3) (71) тенгламада b/V кичик бўлгани учун уни

$$e^{b/V} = 1 + \frac{b}{V} = \frac{1}{1 - b/V} = \frac{V}{V-b} \quad (72)$$

куринишда езиш мумкин. (72) ни (71) га қўйиб

$$P(V-b) \approx RT \exp \left[-\frac{a}{RTV} \left(1 - \frac{b}{V}\right) \right] \approx RT e^{-\frac{a}{RTV}} \quad (72a)$$

Дитеречининг тенгламасини оламир.

4) Дитеречи тенгламасидан $(b/V) \ll 1$ бўлганда Ван-дер-Ваальс тенгламаси келиб чиқади. Ҳақиқатан ҳам

$$e^{-\frac{a}{RTV}} \approx 1 - \frac{1}{RTV}$$

ни (72a) га қўйиб, Ван-дер-Ваальснинг ушбу

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V(V-b)} \approx \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

тенгламасини оламир.

Амалда фойдаланиш учун (71) нинг ўрнида ихчамроқ қуйидаги

$$P(V-b) = RT \exp \left[\frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] \quad (73)$$

ҳолат тенгламасини тавсия этамир.

4.5-§. ПОЛИТРОПИК ЖАРАЁНЛАР ВА УЛАРНИНГ ТЕНГЛАМАЛАРИ

Жараён вақтида тизимнинг иссиқлик сифими узгармай қолсин. Бундай жараёнларни *политропик жараёнлар дейилади*.

Берк тизим учун термодинамиканинг биринчи қонунини ёзайлик:

$$dQ = dU + pdV,$$

бунда босимдан бошқа кучлар йўқ деб қабул қилинди.

1. Тизимнинг ҳажми ва температураси орасидаги боғланиш (Гей-Люссак қонуни). Бу ҳолда ички энергия $U(T, V)$ ни назарда тутиб, (39) ни қайта ёзамиз:

$$CdT = C_V dT + l_V dV, \quad (74)$$

бунда:

$$C = \frac{dQ}{dT}, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad l_V = P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \quad (75)$$

V нинг (32) даги қийматини (74) га қўйиб тизимнинг ҳажми V ва температураси T орасидаги боғланишни топамиз:

$$\frac{dV}{V} = \frac{C - C_V}{C_P - C_V} \alpha dT = n_V \alpha dT, \quad n_V = \frac{C - C_V}{C_P - C_V}, \quad (76)$$

ёки бунини интеграллаб,

$$V = V_0 \exp \int n_V \alpha dT \quad (77)$$

қўринишда ёзиш мумкин; V_0 — иссиқлик сизими $C = C_V$ бўлган ҳолдаги тизимнинг ҳажми. (76) ёки (77) тизимнинг ҳажми ва температураси орасидаги боғланишни кўрсатувчи тенгламадир.

Фараз қилайлик, ҳажм ва температура ўзгаришлари ўзгармас босимда содир бўлсин. Бундай жараёнларни **изобарик жараёнлар** дейилади. Бу ҳолда $C = C_P$ бўлгани учун (76)

$$dV = V \alpha dT \quad (78)$$

ёки

$$V_T = V(1 + \alpha \Delta T) \quad (79)$$

қўринишга келади; бунда V_T — тизимнинг температураси ўзгариб T бўлгандаги ҳажм, V — бошланғич ҳажм. (79) ни **Гей-Люссак қонуни** дейилади.

2. Тизимнинг босими P ва температураси T орасидаги боғланиш (Шарль қонуни). Термодинамиканинг I қонунини ўзгартириб ёзайлик:

$$dQ = d(U + PV) - VdP = dH - VdP, \quad (80)$$

бунда $H = U + PV$ **энтальпия** ёки **иссиқлик функцияси** дейилади. (80) да босим доимий бўлса, $dQ_P = dH$ бўлади.

Агар тизимнинг ҳолати P ва T га нисбатан аниқланган бўлса,

$$dH(P, T) = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = C_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP, \quad (81)$$

бунда

$$C_P = \frac{dQ_P}{dT} = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

(81) ва $dQ = CdT$ ни назарда тутиб, (80) ни

$$CdT = C_p dT + l_p dP \quad (82)$$

кўринишда ёзамиз; бунда

$$l_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - V. \quad (83)$$

Фараз қилайлик, жараён вақтида ҳажм доимий қолсин. Бундай жараёнларни **изохорик жараён** дейилади. Бу ҳолда $C = C_v$ эканлигини назарда тутиб, (82) ни

$$C_v = C_p + l_p P\beta \quad (84)$$

кўринишда ёзамиз, бундан:

$$l_p = \frac{C_v - C_p}{P\beta}, \quad (85)$$

бунда $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ — босимнинг термик коэффициенти, (85) ни (82) га қўйиб, тизимнинг босими P ва температура-си T орасидаги боғланишни тавсифловчи тенгламани ола-миз:

$$\frac{dP}{P} = \frac{C - C_p}{C_v - C_p} \beta dT = n_p \beta dT, \quad n_p = \frac{C - C_p}{C_v - C_p}. \quad (86)$$

Фараз қилайлик, изохорик жараёнлар содир бўлаётган бўлсин. Бу ҳолда $C = C_v$ эканлигидан (86) тенглама

$$dP = P\beta dT, \quad P_T = P(1 + \beta\Delta T) \quad (87)$$

кўринишга келади. Бунда P_T ва P температура T бўлгандаги ва бошланғич ҳолатдаги босимлар. (87) муносабатни **Шарль қонуни** дейилади.

3. Тизимнинг босими ва ҳажми орасидаги муносабатни аниқлайлик. (76) ва (86) дан изланаётган тенгламани ола-миз:

$$n\mu \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0, \quad (88)$$

V нинг (32) даги қийматини (74) га қўйиб тизимнинг ҳажми V ва температураси T орасидаги боғланишни топамиз:

$$\frac{dV}{V} = \frac{C - C_V}{C_P - C_V} \alpha dT = n_V \alpha dT, \quad n_V = \frac{C - C_V}{C_P - C_V}, \quad (76)$$

ёки бунини интеграллаб,

$$V = V_0 \exp \int n_V \alpha dT \quad (77)$$

қўринишда ёзиш мумкин; V_0 — иссиқлик сизими $C = C_V$ бўлган ҳолдаги тизимнинг ҳажми. (76) ёки (77) тизимнинг ҳажми ва температураси орасидаги боғланишни кўрсатувчи тенгламадир.

Фараз қилайлик, ҳажм ва температура ўзгаришлари ўзгармас босимда содир бўлсин. Бундай жараёнларни **изобарик жараёнлар** дейилади. Бу ҳолда $C = C_P$ бўлгани учун (76)

$$dV = V \alpha dT \quad (78)$$

ёки

$$V_T = V(1 + \alpha \Delta T) \quad (79)$$

қўринишга келади; бунда V_T — тизимнинг температураси ўзгариб T бўлгандаги ҳажм, V — бошланғич ҳажм. (79) ни **Гей-Люссак қонуни** дейилади.

2. Тизимнинг босими P ва температураси T орасидаги боғланиш (Шарль қонуни). Термодинамиканинг I қонунини ўзгартириб ёзайлик:

$$dQ = d(U + PV) - VdP = dH - VdP, \quad (80)$$

бунда $H = U + PV$ **энтальпия** ёки **иссиқлик функцияси** дейилади. (80) да босим доимий бўлса, $dQ_P = dH$ бўлади.

Агар тизимнинг ҳолати P ва T га нисбатан аниқланган бўлса,

$$dH(P, T) = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = C_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP, \quad (81)$$

бунда

$$C_P = \frac{dQ_P}{dT} = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

(81) ва $dQ = CdT$ ни назарда тутиб, (80) ни

$$CdT = C_p dT + I_p dP \quad (82)$$

кўринишда ёзамиз; бунда

$$I_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P - V. \quad (83)$$

Фараз қилайлик, жараён вақтида ҳажм доимий қолсин. Бундай жараёнларни **изохорик жараён** дейилади. Бу ҳолда $C = C_v$ эканлигини назарда тутиб, (82) ни

$$C_v = C_p + I_p P\beta \quad (84)$$

кўринишда ёзамиз, бундан:

$$I_p = \frac{C_v - C_p}{P\beta}, \quad (85)$$

бунда $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ — босимнинг термик коэффиценти, (85) ни (82) га қўйиб, тизимнинг босими P ва температура-си T орасидаги боғланишни тавсифловчи тенгламани ола-миз:

$$\frac{dP}{P} = \frac{C - C_p}{C_v - C_p} \beta dT = n_p \beta dT, \quad n_p = \frac{C - C_p}{C_v - C_p}. \quad (86)$$

Фараз қилайлик, изохорик жараёнлар содир бўлаётган бўлсин. Бу ҳолда $C = C_v$ эканлигидан (86) тенглама

$$dP = P\beta dT, \quad P_T = P(1 + \beta \Delta T) \quad (87)$$

кўринишга келади. Бунда P_T ва P температура T бўлгандаги ва бошлангич ҳолатдаги босимлар. (87) муносабатни **Шарль қонуни** дейилади.

3. Тизимнинг босими ва ҳажми орасидаги муносабатни аниқлайлик. (76) ва (86) дан изланаётган тенгламани ола-миз:

$$n\mu \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0, \quad (88)$$

бунда

$$n = \frac{C - C_p}{C - C_v}, \quad \mu = \frac{\beta}{\alpha}. \quad (89)$$

n — *политропа кўрсаткичи* дейилади; μ ни *изотерма кўрсаткичи* (ёки *корреляция параметри*) деб атаймиз.

а) Фараз қилайлик, P ва V ўзгарганда температура ўзгармасин; бундай жараёнларни *изотермик жараёнлар* дейилади. Бу ҳолда $dQ/dT = C$ дан $C \rightarrow \infty$ эканлиги маълум бўлади. Демак, политропа кўрсаткичи n изотермик жараёнларда 1 га тенг ($n = 1$) бўлади. Умумий тенглама (88)

$$\mu \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \quad (90)$$

кўринишни олади.

Идеал газ учун (88) ва (90) мос равишда

$$n \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0, \quad (91)$$

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \quad (92)$$

кўринишларга ўтади; чунки бу ҳолда $\mu = 1$ (идеал газ учун $\alpha = 1/T$, $\beta = 1/T$), (88) билан (91) ни ҳамда (90) билан (92) ҳолат тенгламаларини таққослаб, қуйидаги жуда муҳим хулосани чиқарамиз: *реал тизимнинг ўзаро таъсир потенциали ёки унинг корреляция функцияси фақат μ параметрга боғлиқдир. Шу сабабдан μ ни корреляция параметри деб атадик.*

б) Фараз қилайлик, тизимнинг босими ва ҳажми ўзгарганда тизим ташқи муҳит билан иссиқлик алмашмасин, яъни $dQ = 0$ бўлсин. Бундай ҳолдаги жараёнларни *адиабатик жараёнлар* дейилади. Адиабатик жараёнда $(dQ/dT) = C$ ифодадаги $C = 0$ эканлиги маълум бўлади. Бу ҳолда $n = \gamma = \frac{C_p}{C_v}$ бўлади. Умумий тенглама (88) адиабатик жараёнлар учун

$$\gamma \mu \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \quad (93)$$

кўринишга келади.

Идеал газ учун эса (93) дан

$$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \quad (94)$$

тенгламани оламиз.

Политропик жараёнларда n , удоимий булгани учун (91), (94) ҳамда (92) тенгламаларни интеграллаб, мос равишда

$$PV^n = \text{const}, \quad (95)$$

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad (96)$$

$$PV = \text{const} \quad (97)$$

тенгламаларни оламиз. (96) ва (97) тенгламаларни мос равишда *Пуассон* ва *Бойл-Мариотт қонуни* дейилади.

Агар μ ни деярли (P , V) га боғлиқ эмас ёки жуда заиф боғлиқ дейилса, (88), (93) ва (90) тенгламаларни интеграллаб, мос равишда

$$PV^{\mu_1} = \text{const}, \quad (98)$$

$$PV^{\mu_2} = \text{const}, \quad (99)$$

$$PV^{\mu} = \text{const}, \quad (100)$$

тенгламаларни оламиз. Булар (95), (96) ва (97) тенгламаларнинг реал газлар учун умумлашганларидир.

4. Тизимнинг босими, ҳажми ва температураси орасидаги боғланишни аниқлайлик. (76) ва (86) ни қушиб, P , V , T параметрлар орасидаги боғланишни тавсифловчи


$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = \epsilon \alpha dT, \quad \epsilon = \frac{\mu n - 1}{n - 1} \quad (101)$$

тенгламани оламиз. Идеал газ учун $\mu = 1$, $\alpha = 1/T$ эканлигидан (101) тенглама

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = \frac{dT}{T} \quad (102)$$

қурилишга келади. (102) ни интеграллаб, идеал газ учун умумий ҳолда

$$PV = \text{const } T \quad (103)$$



4.1-расм.

ҳолат тенгламасини оламиз. (103) дан 1 моль идеал газ учун, $\text{const} = R$ белгилаш киритиб, Клапейрон тенгламасини оламиз:

$$PV = RT. \quad (104)$$

1-и з о ҳ. $\mu = \beta/\alpha$ параметрнинг корреляция функцияси интеграли билан боғлиқ эканлигини кейинроқ кўрсатамиз.

2-и з о ҳ. Умумий ҳолда $\mu = \beta/\alpha$ босим ва ҳажмга боғлиқ. Шу сабабли реал газлар учун олинган политропа тенгламаси (98), адиабата тенгламаси (99), изотерма тенгламаси (100) тақрибий тенгламалардир. Босимнинг (ёки ҳажмнинг) катта ораликда ўзгаришларида (98), (99) ва (100) тенгламалар тажриба натижаларидан фарқли натижаларга олиб келса, аниқ дифференциал тенгламалар (88), (90) ва (93) га мурожаат қилиш мумкин.

Изобара $P = \text{const}$, изохора $V = \text{const}$, изотерма $T = \text{const}$ ва $dQ = 0$ адиабаталар 4.1-расмда келтирилди. Бу жараёнлар тенгламаларидан иссиқлик машиналари назариясида, портлаш (ёниш), товуш жараёнларини таҳлил этишда фойдаланадилар.

4.2-масала.

$$(P + P_n)(V - V_n) = T(C_p - C_v) \quad (1)$$

тенглама

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (2)$$

Вандер-Ваальс тенгламаси билан солиштирилсин ва изоҳлансин.

Е ч и ш. Маълумки, идеал газ учун $C_p - C_v = R$. Бу ҳолда (1) ва (2) тенгламаларнинг унғ томони бир-бирига тенг. (1) ва (2) тенгламаларнинг чап томонлари тенг бўлиши учун

$$P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{a}{V^2}, \quad V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = b \quad (3)$$

тенгликлар бажарилиши шарт.

Фараз қилайлик, молекулалар орасидаги ўзаро таъсир тортишиш кучидан иборат бўлиб,

$$U(V, T) = f(T) + U(V) \quad (4)$$

кўринишда бўлсин. $P_n = \frac{a}{V^2}$ бўлиши учун, тортишиш кучига боғлиқ потенциал

$$U(V) = -\frac{a}{V} \quad (5)$$

кўринишда бўлиши талаб этилади. Ҳақиқатан ҳам

$$P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{\partial U(V)}{\partial V} = \frac{a}{V^2}. \quad (6)$$

Энди $V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ ни таҳлил этайлик. Идеал газ учун

$$V_n = \left[\frac{\partial}{\partial P} (U + PV) \right]_T = \left[\frac{\partial}{\partial P} (U + RT) \right]_{T=\text{const}} = 0. \quad (7)$$

Реал тизим учун:

$$\begin{aligned} V_n &= \left[\frac{\partial}{\partial P} (U(T, V) + PV) \right]_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T + \\ &+ V + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \left[\frac{\partial U}{\partial V} + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T + V. \end{aligned} \quad (8)$$

Бизга маълумки,

$$P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{C_P - C_V}{V\alpha}, \quad (9)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -V\chi_T = -\frac{V}{P\mu}. \quad (10)$$

(9) ва (10) ни (8) га қўямиз:

$$V_n = V - \frac{C_p - C_v}{P\beta}.$$

$C_p - C_v = PV\alpha\beta$ дан фойдалансак,

$$V_n = V(1 - T\alpha) = -\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H C_p - C_p M_{ж.т.}$$

Демак:

$$V_n = -C_p M_{ж.т.} \quad (11)$$

$M_{ж.т.}$ — Жоуль-Томсон эффекти коэффициенти. Шу сабабли $V_n \leq 0$ бўлиши мумкин.

1-и зох. Агар $V_n = V(1 - T\alpha)$ ни (1) тенгламага қўйилса,

$$(P + P_n)V = (C_p - C_v) \frac{1}{\alpha}$$

тенглама олинади.

2-и зох. $TdS = C_v dT + l_v dV$ дан

$$l_v = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V.$$

Бу ифодани $l_v = \frac{C_p - C_v}{V\alpha}$ билан солиштириб, $C_p - C_v = PV\alpha\beta$ ифодани оламиз.

4.3-масала. μ корреляцион параметрининг V_n ҳамда P_n тузатмалар орқали ифодаланишини аниқланг ва унинг Ван-дер-Ваальс газ и учун ифодасини топинг. Олинган натижани изоҳланг.

Еч и ш. Бизга маълумки,

$$V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T, \quad P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T, \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -V\chi_T; \quad \chi_T = \frac{1}{P\mu}; \quad (2)$$

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha}; \quad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (3)$$

Аниқлайлик:

$$V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = \left[\frac{\partial}{\partial P} (U + PV) \right]_T = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + V + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \\ = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + V - PV \chi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + V - V \frac{\alpha}{\beta}. \quad (4)$$

$$P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = - \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T \frac{1}{V \chi_T} = - \frac{P \mu}{V} \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T. \quad (5)$$

(5) ни (4) га қўйсак:

$$V_n = - \frac{V \alpha}{P \beta} P_n + V - V \frac{\alpha}{\beta}$$

ёки

$$- \frac{V_n}{V} + 1 = \frac{\alpha}{\beta} \left(1 + \frac{P_n}{P} \right).$$

Бундан изланган ифодани оламиз:

$$\mu = \frac{1 + \frac{P_n}{P}}{1 - \frac{V_n}{V}}. \quad (6)$$

Ван-дер-Ваальс тенгласида

$$V_n = b > 0, \quad P_n = \frac{a}{V^2} > 0. \quad (7)$$

(7) ни назарда тутиб, Ван-дер-Ваальс тенгласига бўйсунадиган газ учун корреляцион параметрни аниқлаймиз:

$$\mu = \frac{1 + \frac{a}{PV^2}}{1 - \frac{b}{V}}. \quad (8)$$

1-и з о ҳ. Термодинамиканинг биринчи ва иккинчи қонунларидан фойдаланиб олинган

$$V_n = V(1 - \alpha T),$$

$$P_n = P(\beta T - 1)$$

муносабатлардан T ни топиб, сўнг уларни тенглаштириб, яна (6) ифодани олиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам

$$\left(1 - \frac{V_n}{V} \right) \frac{1}{\alpha} = T,$$

$$\left(1 + \frac{P_\alpha}{P}\right) \frac{1}{\beta} = T$$

ва буларни тенглаштириб,

$$\left(1 + \frac{P_\alpha}{P}\right) \frac{1}{\beta} = \left(1 - \frac{V_\alpha}{V}\right) \frac{1}{\alpha} = T \quad (9)$$

натижани оламиз; бундан (6) ифода келиб чиқади.

2-и з о ҳ. (9) даги биринчи тенгликдан кўринадики, босимга ва ҳажмга тузатмалар P_α ҳамда V_α бир-бирига боғлиқ. Термодинамикада агар α, β лар берилган бўлиб, бир тузатма маълум бўлса, иккинчисини аниқлаш мумкин.

3-и з о ҳ. Берилган температурада ҳар хил босимларда

$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ аниқланганда (масалан, тажрибадан)

$$P_\alpha = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \quad (10)$$

тузатманинг қийматларини аниқлаш мумкин. Бу эса реал тизимнинг ички энергияси U ҳажм V га қандан боғланишда эканлигини топишга имкон беради.

4-и з о ҳ. 3-изоҳ натижаларига асосланиб тизим молекулалари орасидаги ўзаро таъсир ҳақида, миқдорий муносабат ҳақида хулоса чиқариш имкони бўлади; булардан эса корреляцион функциялар ҳақида хулосалар чиқариш мумкин.

5-и з о ҳ. (9) муносабат муайян температурада доимийдир, яъни биринчи ва иккинчи қонунларга кўра абсолют характерга эга. Бошқача айтганда, ҳар хил модел ва яқинлашувларга бу доимий боғлиқ эмас. Берилган температурада (бирор модель учун) ҳар хил босим ва ҳажмларда доимийликдан четланиш содир бўлса, у ҳолда бунинг изоҳини термодинамиканинг иккинчи қонуни ифодаси TdS даги T дан излаш зарур бўлади.

6-и з о ҳ. Ван-дер-Ваальс газида $a > 0$ ва $b > 0$ бўлгани учун (8) дан кўринадики, корреляцион параметр бундай газ учун ҳар доим

$$\mu > 1 \quad (11)$$

бўлади ва демак,

$$\beta > \alpha. \quad (12)$$

4.4-масала. Газнинг кенгайишида унинг энтальпиясини ўзгармас деб ҳисоблаб, температураси ўзгариши ифодаси топилсин. Бу температуранинг ўзгариши ички энергиянинг потенциал қисмининг ўзгаришига боғлиқ эканлиги кўрсатилсин. Олинган натижани молекуляр-кинетик нуқтаи назардан изоҳлансин.

Е ч и ш. Энтальпия $H(P, T) = U + PV$, масаланинг шартига кўра ўзгармас:

$$dH(P, T) = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = C_P dT + V_n dP.$$

Бундан температуранинг босим ўзгаргандаги (камайгандаги, яъни ҳажм ортгандаги) ўзгаришини тавсифловчи ифодани оламиз:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = -\frac{V_n}{C_P}, C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P > 0, V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T \quad (1)$$

Бизга маълумки,

$$V_n = V(1 - \alpha T), \quad (2)$$

$$P_n = P(\beta T - 1). \quad (3)$$

(1) ни (2) дан фойдаланиб, қайта ёзамиз:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1). \quad (4)$$

Газ кенгайганда, босим камаяди, яъни


$$dP < 0. \quad (5)$$

(2) ёки (4) дан кўринадики, агар $V_n < 0$, яъни $\alpha T > 1$ бўлса, $dT < 0$ бўлади, яъни бу ҳолда газ совийди; агар $V_n > 0$, яъни $\alpha T < 1$ бўлса, $dT > 0$ бўлади, яъни бу ҳолда газ исийди. Инверсия температураси T_i да реал газ идеал газ каби бўлгани сабабли $V_n = 0$, $P_n = 0$ бўлади; (2) ва (3) дан

$$T_i \alpha(T_i) = 1,$$

$$T_i \beta(T_i) = 1$$

тенгламаларни оламиз.



4.2-расм.

Газ температураси T инверсия температураси T_1 дан катта ё кичик бўлганда корреляцион параметр бир хил характерга эга бўлиши учун (1-масалага қ.) $V'' < 0$ бўлса, $P'' > 0$ бўлиши, $V'' > 0$ бўлса, $P'' < 0$ бўлиши лозим.

Демак, $V'' < 0$ бўлганда,

яъни газ совиған ҳолда

$$P'' = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T > 0 \quad (6)$$

булади; $V'' > 0$ бўлганда, яъни газ исиган ҳолда:

$$P'' = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T < 0. \quad (7)$$

Изоҳ. (6) ва (7) дан кўринадики, газнинг $H = \text{const}$ бўлгандаги кенгайишида совиши тортишиш ($U < 0$) кучлари билан, исигиши эса итаришиш ($U > 0$) кучлари билан характерланади.

4.6-§. ТОВУШНИНГ ТАРҚАЛИШ ТЕЗЛИГИ

Берк тизим учун босим ва ҳажм орасидаги умумий боғланиш дифференциал тенглама (88) билан аниқланиши маълум. Шу тенгламани қуйидагича ёзамиз:

$$-V^2 \frac{dP}{dV} = \eta \mu PV. \quad (105)$$


Таърифга қўра, товуш тарқалиш тезлиги $\vartheta^2 \geq 0$ ни қуйидагича аниқлаймиз:

$$\vartheta^2 = -V^2 \frac{dP}{dV} \quad (106)$$

ёки (105) ни ҳисобга олиб, товуш тарқалиш тезлигининг қуйидагича термодинамик ифодасини оламиз:

$$\vartheta^2 = \eta \mu PV. \quad (107)$$

n нинг иссиқлик сифими C га боғлиқлиги 4.2-расмда кўрсатилган. 4.2- ва 4.3-расмлардан кўринадики, товуш изохорик жараёнга қанча яқин бўлса, яъни сиқилувчанлик қанча кичик бўлса, товуш тезлиги шунча катта бўлади.



4.3-расм.

Шу сабабдан, қаттиқ jisмда товушнинг тарқалиш тезлиги нисбатан катта, чунки $C = C_V$.

Хусусий ҳолларни кўрайлик.

1. Товуш тарқалиш жараёнини изотермик жараён деб қарайлик. Бу ҳолда $C \rightarrow \infty$ ва $n = 1$ бўлади. Демак, товуш тезлиги учун

$$\partial_T^2 = \mu PV \quad (108)$$

ифодани оламиз. Идеал газ учун $\mu = 1$ ва, демак, (108) дан:

$$\partial_T^2 = PV \quad (109)$$

Ньютон формуласини оламиз.

2. Товуш тарқалиш жараёни адиабатик жараён бўлсин, дейлик. Амалда, ҳақиқатан ҳам шундай деб қаралади. Бу ҳолда $C = 0$, демак, $n = \gamma$. Товуш тезлиги учун эса (107) дан

$$\partial_P^2 = \gamma \mu PV \quad (110)$$

формулани оламиз.

Идеал газда товуш тарқалиш тезлиги учун (110) дан Лапласнинг куйидаги формуласини оламиз:

$$\partial_P^2 = \gamma PV. \quad (111)$$

Умуман тажрибадан $\partial(\omega)$ орқали $n(\omega)$, сунг $C(\omega)$ ни аниқлаб, товуш тарқалиши жараёни қайси политропик жараёнга яқин эканлиги ҳақида маълумот олиш мумкин.

4.5-масала. Газлар ва газларга ухшаш тизимлар учун термодинамиканинг биринчи қонуни учун эркин ўзгарувчилар иккита бўлганда

$$dQ = dU + PdV = C_V dT + l_V dV, \quad (1)$$

$$C_V = (\partial U / \partial T)_V, \quad l_V = P + (\partial U / \partial V)_T, \quad (2)$$

$$dQ = C_P dT + l_P dP, \quad (3)$$

$$dQ = m_0 dV + m_P dP \quad (4)$$

муносабатлар ўринли.

1) C_P, l_P, m_0, m_P нинг ифодаларини топинг.

2) Қуйидагиларни исбот қилинг:

$$l_P = \frac{C_V - C_P}{P\beta}, \quad l_V = -\frac{C_V + C_P}{V\alpha},$$

$$m_P = \frac{l_V C_P}{C_P - C_V}, \quad m_V = -\frac{l_P C_V}{C_P - C_V}.$$

$$\text{Изотерма кўрсаткичи } \mu = \frac{\beta_V}{\alpha_P} = -\frac{V l_V}{P l_P}.$$

3) Адиабата кўрсаткичи $\gamma = C_P / C_V$ қуйидаги муносабатларни қаноатлантиришини кўрсатинг:

$$\gamma = \frac{(\partial P / \partial V)_S}{(\partial P / \partial V)_T},$$

$$+ \frac{1}{1-\gamma} = \frac{(\partial V / \partial T)_S}{(\partial V / \partial T)_P},$$

$$+ \frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{(\partial P / \partial T)_S}{(\partial P / \partial T)_V}. \quad \mu = \frac{1}{P\chi_T} = \frac{\gamma}{P\chi_S}.$$

4) Изотермик ва адиабатик сиқилувчанликлар нисбати

$$\chi_T / \chi_S = \gamma, \quad \chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T; \quad \chi_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S$$

эканлигини кўрсатинг.

5) Грюнайзен коэффициенти

$$\Gamma = \alpha_P V / \chi_T C_V$$

учун қуйидагилар ўринли эканлигини исбот қилинг:

$$\Gamma = \frac{V(\partial P / \partial T)_V}{C_V} = \frac{PV\beta_V}{C_V} = \frac{V}{(\partial U / \partial P)_V} = \frac{V}{m_P}.$$

6) Грюнайзен коэффициент босимга боглиқ булмаган ҳол учун газнинг умумий ҳолат тенгламасини топинг.

Ечиш:

$$\begin{aligned} 1) \quad dQ &= dU(T, P) + PdV(T, P) = \\ &= \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \right] dP. \end{aligned}$$

Бундан

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial}{\partial T} \right) [U + PV]_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dQ_P}{dT} = C_P,$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T - PV\alpha_T = l_P,$$

$$dQ = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + P \right] dV + \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T dP,$$

Бундан эса:

$$m_V = P + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P; \quad m_P = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V.$$

2) (1) ва (3) дан қўидагини оламиз:

$$(C_P - C_V) dT = l_V dV - l_P dP. \quad (5)$$

Буни (4) билан солиштириб, ушбуларни топамиз:

$$m_V = \frac{l_V C_P}{C_P - C_V}, \quad m_P = -\frac{l_P C_V}{C_P - C_V}. \quad (6)$$

(5) тенгламадан қўидаги ифодаларни аниқлаймиз:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{C_P - C_V}{l_V}, \quad \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = -\frac{C_P - C_V}{l_P}$$

ёки булардан:

$$l_P = \frac{C_V - C_P}{\beta}, \quad l_V = \frac{-C_V + C_P}{V\alpha}, \quad (l_P < 0) \quad (7)$$

(7) дан l_V нинг l_P нисбатини олиб,

$$\mu = -V_V/P_V \quad (8)$$

ифодани оламиз. Идеал газ учун $\mu = 1$.

3) (4) ва (6) дан, жараён адиабатик, яъни $dQ = 0$ бўлганда

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\frac{m_V}{m_P} = \frac{C_P l_V}{C_V l_P} \quad (9)$$

Жараён изотермик, яъни $dT = 0$ бўлганда, (1) ва (3) дан

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \frac{l_V}{l_P} \quad (10)$$

ифодани оламиз. (9) ва (10) дан:

$$\left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S / \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\right] = \gamma = \frac{z_T}{z_S} \quad (11)$$

(1) муносабатдан:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S = -\frac{C_V}{l_V}$$

(3) ва (4) дан

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{m_V}$$

Бу ва $m_V = C_P l_V / (C_P - C_V)$ муносабатлардан

$$\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S}{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P} = \frac{\alpha_S}{\alpha_P} = -\frac{C_V m_V}{C_P l_V} = -\frac{1}{\gamma - 1}$$

(3) дан:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = -\frac{C_P}{l_P}$$

(1) ва (4) дан жараён изохорик бўлганда:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{m_P}$$

Кейинги муносабатлардан

$$m_P = -\frac{l_P C_V}{C_P - C_V}$$

ифодани назарда тутиб, қуйидагини оламиз:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = \frac{\beta_S}{\beta_V} = \frac{C_P l_P C_V}{C_V l_P (C_P - C_V)} = \frac{\gamma}{\gamma - 1}.$$

(8) ва (10) дан

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \frac{l_V}{l_P} = -\mu \frac{P}{V}$$

ёки бундан:

$$1/\chi_T = \mu P. \quad (12)$$

(11) ва (12) дан:

$$\mu = 1/P\chi_T = 1/\gamma P\chi_S.$$

4) (4) дан:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = -\frac{m_P}{m_V} = \frac{C_V l_P}{C_P l_V}.$$

(1) ва (3) дан:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{l_P}{l_V}.$$

Кейинги икки муносабатдан:

$$\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S} = \frac{\chi_T}{\chi_S} = \gamma.$$

$$5) \Gamma = \frac{\alpha_P V}{\chi_T C_V} = \frac{V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P}{-\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T C_V} = -\frac{V}{C_V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T.$$

Маълумки,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -1.$$

Бундан фойдаланиб, Грюнайзен коэффициенти Γ ни ёзмаиз:

$$\Gamma = \frac{V}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{PV\beta_V}{C_V},$$

$$\Gamma = \frac{V \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V}{\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V} = V \left(\frac{\partial P}{\partial U} \right)_V = \frac{V}{\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V} = \frac{V}{m_P}.$$

6) $\Gamma = \frac{V}{m_P} = \frac{V}{\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V}$ тенгликдан:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = \frac{V}{\Gamma}$$

ёки

$$dU = \frac{V}{\Gamma} dP.$$

Бундан:

$$U = \frac{1}{\Gamma} (PV + f(V));$$

бу ерда $f(V)/\Gamma$ — интеграл доимийси.

4.6-масала. 4.5-масаланинг шартидан фойдаланиб $\mu_S = \gamma \mu$ термодинамик муносабатни исботланг. Бунда

$$\mu_S = \beta_S / \alpha_S; \beta_S = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_S, \alpha_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S.$$

Еч и ш. Товуш тезлиги

$$v^2 = -V^2 \frac{dP}{dV} \quad (1)$$

ни ўзгартириб ёзайлик:

$$v^2 = -V^2 \frac{dP/dT}{dV/dT}. \quad (2)$$

Товуш тарқалишини адиабатик жараён десак,

$$v_S^2 = -V^2 \frac{(dP/dT)_S}{(dV/dT)_S} = \frac{\frac{1}{P} (dP/dT)_S}{-\frac{1}{V} (dV/dT)_S} PV = \frac{\beta_S}{\alpha_S} PV = \mu_S PV. \quad (3)$$

Буни

$$\nu_3^2 = \gamma \mu PV \quad (4)$$

билан солиштириб, исбот қилинмоқчи бўлган ифода $\mu_S = \gamma \mu$ ни оламиз.

Изоҳ. Бу тенгликни эътиборга олсак, адиабата тенгламаси (90) қуйидаги кўринишни олади:

$$PV^\mu = \text{const}, \quad (5)$$

бу ерда μ — реал адиабата кўрсаткичи, идеал газ учун адиабата кўрсаткичи γ га тенг.

4.7-масала. 4. 5-масаланинг шартидан фойдаланиб ва инверсия температурасида идеал газ ҳолат тенгламаси ўринли деб ҳисоблаб, корреляция параметри μ билан P_n тузатма орасидаги муносабатни аниқланг. Олинган натижани изоҳланг.

Ечиш. Умумий ҳолат тенгламаси

$$PV = RTe^f \quad (1)$$

идеал газ ҳолат тенгламаси $PV = RT$ га

$$f = \int \left(n_p \frac{P_p}{P} - n_v \frac{V_p}{V} \right) \frac{dT}{T} = 0 \quad (2)$$

шарт бажарилганда ўтади. (2) шарт бажарилиши учун интеграл ишораси остидаги ифода нолга тенг бўлиши зарур:

$$n_p \frac{P_p}{P} - n_v \frac{V_p}{V} = 0$$

ёки бундан

$$-\frac{V_p}{V} = n \frac{P_p}{P}, \quad n = \frac{C - C_p}{C - C_v}. \quad (3)$$

μ учун умумий ифода маълум:

$$\mu = \frac{1 + P_p/P}{1 - V_p/V}. \quad (4)$$

(3) ни (4) га қўйиб, корреляция параметри μ билан тузатма $P_n = (\partial U / \partial V)_T$ орасидаги изланаётган муносабатни оламиз:

$$\mu = \frac{1 + P_p/P}{1 + n P_p/P} \cdot \frac{P_p}{P} = \frac{1 - \mu}{n\mu - 1} = \frac{\mu^{-1} - 1}{n - \mu^{-1}} \quad (5)$$

4.8-масала. Ҳолат тенгламасини

$$PV = RT \left(1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \dots \right) \quad (1)$$

кўринишда ёзадилар, бунда B , C ва ҳоказо температурага боғлиқ вириал коэффицентлар 4.5-масала шартидан фойдаланиб, Ван-дер-Ваальс газидан вириал коэффицент B ни аниқланг.

Еч и ш. Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT,$$

бу тенгламани ўзгартириб ёзайлик:

$$PV = RT \left(1 + \frac{a}{PV^2} \right)^{-1} \left(1 - \frac{b}{V} \right)^{-1}. \quad (2)$$

$ab \ll V^2 RT$ бўлганда, (2) ни тақрибан қуйидагича ёзамиз:

$$PV = RT \left[1 + \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{PV} \right) \right]. \quad (3)$$

(3) нинг ўнг томонидаги PV ни RT билан алмаштирамиз:

$$PV = RT \left[1 + \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right]. \quad (4)$$

(1) ва (4) ни солиштириб, изланаётган вириал коэффицент B ни топамиз:

$$B = b - \frac{a}{RT}. \quad (5)$$

Изоҳ: умумий ҳолат тенгламаси

$$PV = RTe^f.$$

$f \ll 1$ бўлганда, $\exp f = 1 + f$ эканлигидан

$$PV = RT(1 + f) \quad (6)$$

кўринишни олади. (6) ни (4) билан солиштириб Ван-дер-Ваальс яқинлашувида f ни топамиз:

$$f = \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right). \quad (7)$$

Бу яқинлашувда умумий тенглама асосий матнда келтирилган кўринишни олади, яъни

$$PV = RTe^{\frac{1}{V}(b - \frac{a}{RT})}. \quad (8)$$

4.9-масала. Ҳолат тенгламасини

$$PV = E_1 + E_2P + E_3P^2 + \dots \quad (9)$$

кўринишда ёзиш мумкин; E_1, E_2 ва ҳоказо вириал коэффициентлар 4.5-масала шартидан фойдаланиб, Ван-дер-Ваальс гази учун

$$E_1 = RT, \quad E_2 = b - \frac{a}{RT} \quad (10)$$

эканлигини кўрсатинг.

Е ч и ш: аввалги масалада Ван-дер-Ваальс тенгламасининг тақрибий ифодаси (3)

$$PV = RT + \frac{RT}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \quad (11)$$

кўринишда эди, (11) да $(RT/V) \approx P$ деб қабул қилинса, (9) билан (11) ни солиштириб изланаётган (10) ифодаларни топамиз.

4.10-масала. θ ва V параметрларни эркин ўзгарувчилар деб ҳисоблаб, P ва U орасидаги боғланишни — ҳолат тенгламасини аниқланг.

Е ч и ш. Таъриф бўйича ички энергия

$$U = \theta^2 (\partial \ln Z / \partial \theta)_{\theta, v, x_k} \quad (1)$$

ифодадан ва босим

$$P = \theta (\partial \ln Z / \partial V)_{\theta, v, x_k} \quad (2)$$

ифодадан аниқланади. Булардан аёнки,

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (P / \theta) = \left(\frac{\partial}{\partial V} \right) (U / \theta^2) \quad (3)$$

ёки бундан умумий ҳолат тенгламаси

$$P + (\partial U / \partial V)_\theta = \theta (\partial P / \partial \theta)_v \quad (4)$$

ни оламиз.

низоҳ (1) ва (2) дан фойдаланиб ушбуни эзишимиз мумкин:

$$d \ln Z = \frac{\partial \ln Z}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \ln Z}{\partial V} dV = \frac{U}{\theta^2} d\theta + \frac{P}{\theta} dV, \quad (5)$$

бунда

$$d\theta = \frac{dU}{v} - \frac{U}{v^2} dv$$

эканлигидан фойдаланиб, (5) ни ёзамиз:

$$\theta d(v + \ln Z) = dU + PdV. \quad (6)$$

Бунда мувозанатдаги жараёнлар учун тулиқ дифференциал

$$dS = d(v + \ln Z),$$

яъни ҳолат функцияси S мавжуд эканлиги яна бошқа усул билан кўрсатилди.¹

4.11-масала.

$$\frac{1}{Z} = \frac{h^S g_V}{A \Gamma(v+1) \theta^v}$$

ифодадаги A функцияни

$$A = V^N A_0 \quad (7)$$

кўринишда деб,

$$P = \theta \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{\theta, v, N}$$

дан ҳолат тенгламасини аниқланг; бунда N — зарралар сони. (Идеал классик тизимда A_0 ҳажм V га боғлиқ эмас).

Е ч и ш. Фараз қилайлик, ҳажм ўзгарганда A нинг ўзгаришига асосий ҳиссани биринчи кўпайтувчи V^N қўшсин, яъни асосий таъсирни V^N кўрсатсин. У ҳолда:

¹ Классик термодинамикада аввал ҳолат функцияси S мавжудлигини курсатиб, сўнг (4) муносабатни ва, демак, ҳолат тенгламасини курсатилади (θ) нинг ўрнида kT олинади. Статистик термодинамикада биз аввал (3) муносабатни, сўнг эса S ҳолат функцияси мавжуд эканлигини курсатдик.

$$\frac{dA}{dV} = \frac{N}{V} A. \quad (8)$$

(8) ўринли бўлган ҳолда (2) ҳолат тенгламаси ниҳоятда содда кўринишга келади:

$$P = \theta \frac{N}{V} = n\theta \quad (9)$$

ёки

$$PV = N\theta = \frac{N}{v} U. \quad (10)$$

Изоҳ: 1) N та заррадан иборат классик идеал газ учун $v = 3N/2$ $\theta_0 = kT$. Демак, ҳолат тенгламаси

$$PV = NkT$$

ёки бундан Авогадро сони N бўлганда Клапейрон тенгламасини оламиз:

$$PV = RT.$$

2) Квант идеал газ. Бу ҳолда $v = 3N$ ҳолат тенгламаси (10), демак,

$$PV = U/3$$

ёки

$$P = u/3, \quad U = uV.$$

3) Квант идеал зарралар маълум йўналишдагина ҳаракатлансалар (бу статистик физика масаласи эмас, албатта), учта компонентадан фақат шу йўналишнигина эътиборга (ҳисобга) олиш лозим, яъни $v = N$. (9) ҳолат тенгламаси $P = u$ кўринишга келади.

4.12-масала. Аввалги масала шартидан фойдаланиб,

$$PV = U(\gamma - 1)$$

ҳолат тенгламасини олинг.

Ечиш:

$$PV = \frac{N}{v} U$$

тенгламадаги N/v нинг ўрнига, аввалги масаладаги

$$\frac{N}{v} + 1 = \gamma$$

тенгликнинг қийматини қўйиб, масала шартидаги ҳолат тенгламасини оламиз.

Изоҳ. Идеал газ учун $\mu = 1$ эканлигини назарда тутиб, газодинамикада фойдаланиб келинадиган

$$PV = U(\gamma - 1)$$

тенгламани оламиз.

4.13-масала. Адиабатик жараён учун

$$PV^{\gamma} = \text{const} \quad (1)$$

тенгламадаги доимий сон const нинг $A = A_0 V^N$ шарт бажарилгандаги ифодасини топинг.

Ечиш.

$$Z = e^{S-v}, \quad \frac{1}{Z} = \frac{h^S g}{A_0 V^N \Gamma(v+1) \theta^v}$$

тенгликлардан

$$e^{S-v} = \frac{A_0 V^N \Gamma(v+1) \theta^v}{h^S g}$$

Бу тенгликни, $PV = N\theta$ ни назарда тутиб, қайта ёзамиз:

$$e^{S-v} = \frac{A_0 \Gamma(v+1)}{h^S g} V^N (PV / N)^v.$$

Бундан:

$$e^{S/v-1} = \frac{1}{N} \left(\frac{A_0 \Gamma(v+1)}{h^S g} \right)^{1/v} PV^{N/v+1}$$

ёки

$$PV^{N/v+1} = B e^{S/v}.$$

Бу тенгламани адиабата тенгламаси (99) билан солиштириб, аввалги масаладаги тенгламани оламиз:

$$\gamma \mu = 1 + N / v.$$

Бу тенгликни эътиборга олсак, изланаётган

$$PV^{\gamma} = B e^{S/v}$$

тенгламани оламиз; бунда

$$B = N e \left(\frac{h^S g}{A_0 \Gamma(v+1)} \right)^{1/v} \quad (2)$$

Изох. Агар адиабатик жараёнда энтропия доимий эканлигини эсласак, охириги (2) тенглама яна (1) тенгламага келади.

4.14-масала. Маълум йуналишда қатъий ҳаракатланаётган идеал газда товуш тезлиги v_B^2 Ньютон формуласи бўйича ҳисобланган товуш тезлиги v_H^2 дан икки марта катта эканлигини кўрсатинг, яъни

$$v_B^2 = 2v_H^2$$

эканлигини исбот қилинг.

Ечиш. Маълум йуналишда ҳаракатланаётган газ учун $N = \nu$. Демак,

$$\gamma\mu = 1 + N / \nu = 2,$$

$$v_B^2 = PV\gamma\mu = 2PV; \quad v_H^2 = PV$$

ифодалардан изланаётган тенгликни аниқланади.

4.15-масала. $PV = N\theta$ тенгламадан фойдаланиб,

$$P = U(\gamma\mu - 1)$$

ҳолат тенграмасини келтириб чиқаринг.

Ечиш. Оддийгина курсатиш мумкин ($PV = N\theta$ бўлганда)

$$C_V = \beta U, \quad C_P = \alpha(U + PV) = \alpha H.$$

Булардан изланаётган тенглама олинади.

4.16-масала. Статистик интеграл (йиғинди)

$$Z = \int e^{-\beta E} dn, \quad Z = \sum e^{-\beta E_i} \quad (1)$$

асосида

а) ν нинг аниқ қийматида

$$Z = C_1(V, \nu, X_k) \theta^\nu; \quad (2)$$

б) U нинг аниқ қийматида

$$Z = C_2(U, V, X_k) e^\nu; \quad (3)$$

эканлигини кўрсатинг. C_1 ва C_2 ошкор бўлмаган функциялар.

Е ч и ш. а) таърифга кура, ички энергия ифодасини ёзамиз:

$$U = \int E f(E) dn = \frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dn = - \frac{1}{Z} \frac{dZ}{d\beta}; \quad (4)$$

ν — берилган (фиксацияланган) десак, $\theta = 1/\beta$ эканлигидан фойдаланиб, (4) ни қуйидагича ёзамиз:

$$\nu \frac{d\theta}{\theta} = \frac{dZ}{Z}.$$

Бундан

$$Z = C_1(\nu, V, X_k) \theta^\nu. \quad (5)$$

ёки

$$Z = C_1(\nu, V, X_k) (U/\nu)^\nu. \quad (6)$$

И з о ҳ. Статистик интеграл (йигинди) ифодаси

$$\frac{1}{Z} = \frac{h^S \beta^\nu g}{\Gamma(\nu+1)}, \quad (1/\beta) = \theta = U/\nu$$

дан (6) ифода олиниши мумкин, яъни:

$$Z = C_1(\nu, V) (U/\nu)^\nu, \quad (7)$$

бунда

$$C_1(\nu, V) = \frac{\Gamma(\nu+1)}{h^S g}.$$

б) U фиксацияланганда

$$d\beta = \frac{1}{U} d\nu.$$

Буни эътиборга олиб, қуйидагини ёзамиз:

$$U = - \frac{U}{Z} \frac{dZ}{d\nu}$$

ёки

$$Z = C_2(\nu, V, X_k) e^{-\nu}. \quad (8)$$

Z нинг ифодасида шундай $e^{-\nu}$ купайтувчи бор эканлигини бошқача усул билан ҳам курсатиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам

$$S = \nu + \ln Z$$

ифодадан

$$Z = e^{\epsilon^*}$$

эканлиги келиб чиқади.

4.17-масала. Статистик интеграл Z учун олинган

$$\frac{1}{Z} = \frac{h^S \beta^v g}{A \Gamma(v+1)}, \quad (1/\beta) \equiv \theta = U/v \quad (1)$$

ифода асосида 4.16-масалада олинган (2) ва (3) ифодаларни аниқланг.

Е ч и ш. а) (1) ифодада

$$C(v, V) = \frac{A \Gamma(v+1)}{h^S g} \quad (2)$$

белгилаш киритиб, (1) ифоданинг изланаётган

$$Z = C(v, V) \theta^v \quad (3)$$

ифода билан бир хил эканлигини кўрамиз.

б) Фараз қилайлик, v — бутун ва етарли даражада катта сон бўлсин. Бу ҳолда Стирлинг формуласидан фойдаланамиз:

$$\Gamma(v+1) = v! \approx v^v e^{-v}. \quad (4)$$

Буни эътиборга олиб, (2) ни

$$C(v, V) = A v^v e^{-v} / h^S g \quad (5)$$

кўринишда ёзамиз. Энди $\theta = U/v$ эканлигини назарда тутиб, (3) ни ёзамиз:

$$Z = \frac{A v^v e^{-v}}{h^S g} \theta^v = C(v, V) U^v e^{-v} \quad (6)$$

бунда

$$C(v, V) = A/h^S g. \quad (7)$$

4.18-масала. Осциллятор учун статистик интеграл Z ни анъанавий ва янги усул билан аниқланг. Олинган натижаларни солиштиринг.

Е ч и ш.

$$Z = \sum_n e^{-\beta \epsilon_n}, \quad (1)$$

$$\epsilon_n = \hbar \omega (n + 1/2), \quad n = 0, 1, \dots, \quad (2)$$

$$\theta = 1/\beta = U/v = \langle \epsilon \rangle / v, \quad v = 1. \quad (3)$$

Идеал газ учун

$$\theta_0 = 1 / \beta_0 = kT. \quad (4)$$

(1) асосида Z ни топайлик:

$$Z = \sum_n e^{-\beta_0 \hbar \omega (n+1/2)} = e^{-x/2} \sum_n e^{-nx} = \frac{1}{e^{x/2} - e^{-x/2}} \quad (5)$$

$$x = \beta_0 \hbar \omega = \hbar \omega / kT$$

$\langle \epsilon \rangle$ ни аниқлайлик:

$$\begin{aligned} \langle \epsilon \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_n \epsilon_n e^{-\beta_0 \epsilon_n} = -\frac{1}{Z} \frac{dZ}{d\beta_0} = \\ &= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \beta_0} = \frac{\hbar \omega}{2} \cdot \frac{e^{x/2} + e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} = \frac{\hbar \omega}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT}. \end{aligned} \quad (6)$$

Энди Z ни

$$\frac{1}{Z} = \frac{\hbar^2 g}{A \Gamma(v+1) \theta^v} \quad (7)$$

асосида аниқлайлик.

$$s = 1, v = 1, \theta = U / v = \langle \epsilon \rangle, g = 1,$$

$$\Gamma(v+1) = \Gamma(2) = 1,$$

$$\Gamma_E = AE = A\epsilon_n = A\hbar \omega (n+1/2) = (n+1/2)\hbar.$$

Бундан:

$$A = h / \hbar \omega = 2\pi / \omega.$$

(7) дан Z ни аниқлаймиз:

$$Z = \frac{2\pi \langle \epsilon \rangle}{\hbar \omega} = \frac{2\pi}{\hbar \omega} \frac{\hbar \omega}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT}.$$

Демак,

$$Z = \frac{1}{2} \frac{e^{x/2} + e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} = \frac{\langle \epsilon \rangle}{\hbar \omega}. \quad (8)$$

(5) ва (8) ифодаларни солиштирайлик.

Фараз қилайлик, $x = \beta_0 \hbar \omega \ll 1$ бўлсин, яъни температу-
ра етарли даражада катта бўлсин. У ҳолда

$$e^{\epsilon/2} + e^{-\epsilon/2} = 2$$

Демак, бу ҳолда анъанавий усул билан олинган (5) ифода ва янги усул билан олинган (8) ифода бир-бирига мос келади.

1-и з о ҳ. (8) дан кўринадики, Z берилган термодинамик ҳолатдаги ўртача квант ҳолатлар сони:

$$Z = \frac{\langle \epsilon \rangle}{h\nu} = \langle n \rangle + \frac{1}{2}$$

2-и з о ҳ. Асосий ҳолат эътиборга олинмаса, $Z = \langle n \rangle$.

3-и з о ҳ. т сатҳдаги "зарралар" сони ўртача $\langle n \rangle$ эса квант статистикаси тақсимооти эканлигини кейинроқ кўрамиз.

4.7-§. ЭНТРОПИЯ. ТЕРМОДИНАМИКАНИНГ ИККИНЧИ ҚОНУНИ

Биз мувозанатли жараёнлар учун

$$\theta d(v + \ln Z) = dQ, \quad (112)$$

номувозанат ҳолатлар учун, Карно теоремаси асосида

$$\theta d(v + \ln Z) > dQ \quad (113)$$

ифодаларни ёзган эдик. (112) ва (113) даги

$$S = v + \ln Z \quad (114)$$

функцияни тизимнинг энтропияси, (114) тенгликни эса энтропия тенгламаси деб юритамиз¹. (112) ва (113) бирликда ёзилган умумий муносабат

$$\theta dS \geq dQ \quad (115)$$

ни *термодинамиканинг иккинчи қонуни* дейилади.

Бизнинг усулимиздан фарқли равишда одатда энтропияни Гиббс таърифига кўра,

$$S = - \langle \ln f(E) \rangle \quad (116)$$

кўринишда ёки Больцман формуласи (кейинроқ бу формула билан танишамиз) асосида киритилади.

Гиббс таърифи (116) дан ва

¹ Энтропия S нинг бундай усул билан киритилиши ва унинг тенгламаси (114) биринчи марта ёзиляпти.

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad \beta = \nu / U \quad (117)$$

ифодаларни назарда тутиб, яна биз киритган энтропия ифодаси (114) ни оламиз. Демак, энтропия тенгламаси (114) Гиббс таърифига мос келади¹.

Термодинамиканинг иккинчи қонунига мувофиқ тизимнинг ҳолат функцияси S қуйидаги хоссаларга эга:

1) Энтропия узгариши dS икки қисмдан иборат:

$$dS = dS_q + dS_r, \quad (118)$$

бунда dS_q — ташқи муҳитдан тизимга келувчи (ёки кетувчи) энтропия; dS_r — тизимнинг узида қайтмас (диссипатив) жараёнлар туфайли ҳосил булувчи энтропия.

2) dS_r тизимдаги қайтувчан (мувозанатдаги) жараёнлар учун нолга тенг ва қайтмас жараёнлар учун мусбатдир, яъни:

$$dS_r \geq 0. \quad (119)$$

3) Тизимга келувчи энтропия тизим билан ташқи муҳит узаро таъсирининг конкрет характериға қараб мусбат, ноль ёки манфий бўлиши мумкин, яъни:

$$dS_q \gtrless 0 \quad (120)$$

Хусусан, адиабатик яккаланган тизим учун, яъни ташқи муҳит билан иссиқлик ҳам, модда ҳам алмашмайдиган тизим учун

$$dS_q = 0. \quad (121)$$

тенглик уринли. Бу ҳолда (118) қуйидагича ёзилади:

$$dS \geq 0. \quad (122)$$

(122) ифода — адиабатик яккаланган тизим учун термодинамиканинг иккинчи қонунининг ёзилишидир. (118) тенгликда, Карно-Клаузиус теоремасига асосан,

$$dS_q = dQ/\theta \quad (123)$$

¹ Одатда, энтропияни ўлчамли параметр $S_r = -k \langle \ln f \rangle$ кўринишда қабул қиладилар; k — Больцман доимийси.

ва демак, яна термодинамиканинг иккинчи қонунининг умумий ифодасига келамиз:

$$dS \geq dQ/\theta. \quad (124)$$

Термодинамиканинг биринчи қонуни (12) ни эътиборга олиб, биринчи ва иккинчи қонунларни биргаликда

$$\theta dS \geq dU + dA - \mu dN \quad (125)$$

кўринишда ёзамиз. Буни *Гиббс-Дюгем муносабати* дейилади; Классик ҳолда $\theta = kT$.

Статистик физикада энтропияни ҳолат эҳтимоллигининг ўлчови сифатида қаралади. Энтропиянинг статистик маъноси билан танишиш учун қуйидаги мисолни қараймиз.

Аввал бир-биридан ажралган S_1^0 ва S_2^0 энтропияли тизимлар мувозанатда бўлсин. Сўнг улар ўртасида контакт ҳосил қилингандан кейин S_1 ва S_2 энтропияли янги мувозанат ҳолатига келинади.

Агар бу тизимларни яна қайтадан ажратилса, уларнинг мувозанат ҳолатлари бузилмайди; қатъийроқ маънода айтадиган бўлсак, мувозанат ҳолатларнинг бузилмаслиги деярли ишончли воқеадир; бунда $S = S_1 + S_2$. Бошқача айтганда, охирги ҳолат — мувозанат ҳолат энг катта эҳтимолли ҳолатдир ($Z = 4$, $N = 2$ бўлгандаги мисолни эсланг!). Бу эса 1 ва 2 тизимлардан иборат тизим эҳтимоли кичик $S_1^0 + S_2^0$ ҳолатдан эҳтимоли катта $S_1 + S_2$ ҳолатга ўтганлигини кўрсатади, бунда тизимнинг энтропияси S деярли ишончли воқеа каби ортади, яъни $\Delta S > 0$.

Шуни айтиш лозимки, тизим термодинамик эҳтимоллиги кичик ҳолатдан термодинамик эҳтимоллиги катта ҳолатга ўз-ўзидан, ўзининг хоссасига кўра, табиий равишда ўтади; яккаланган тизимда энтропия ортади, яъни $dS > 0$ бўлади; умумий ҳолда эса $dS \geq dQ/\theta$ бўлади.

Фараз қилайлик, мувозанатдаги яккаланган тизимнинг микроҳолатлари сони N бўлсин. У ҳолда текис тақсимланишга асосан i -ҳолат эҳтимоллиги

$$W_i = 1/N$$

ифода билан аниқланади. Гиббс таърифига асосан:

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad \beta = v/U \quad (117)$$

ифодаларни назарда тутиб, яна биз киритган энтропия ифодаси (114) ни оламиз. Демак, энтропия тенгламаси (114) Гиббс таърифига мос келади¹.

Термодинамиканинг иккинчи қонунига мувофиқ тизимнинг ҳолат функцияси S қуйидаги хоссаларга эга:

1) Энтропия ўзгариши dS икки қисмдан иборат:

$$dS = dS_q + dS_r, \quad (118)$$

бунда dS_q — ташқи муҳитдан тизимга келувчи (ёки кетувчи) энтропия; dS_r — тизимнинг ўзида қайтмас (диссипатив) жараёнлар туфайли ҳосил булувчи энтропия.

2) dS_r тизимдаги қайтувчан (мувозанатдаги) жараёнлар учун нолга тенг ва қайтмас жараёнлар учун мусбатдир, яъни:

$$dS_r \geq 0. \quad (119)$$

3) Тизимга келувчи энтропия тизим билан ташқи муҳит ўзаро таъсирининг конкрет характериға қараб мусбат, ноль ёки манфий бўлиши мумкин, яъни:

$$dS_q \gtrless 0. \quad (120)$$

Хусусан, адиабатик яккаланган тизим учун, яъни ташқи муҳит билан иссиқлик ҳам, модда ҳам алмашмайдиган тизим учун

$$dS_q = 0. \quad (121)$$

тенглик ўринли. Бу ҳолда (118) қуйидагича ёзилади:

$$dS \geq 0. \quad (122)$$

(122) ифода — адиабатик яккаланган тизим учун термодинамиканинг иккинчи қонунининг ёзилишидир. (118) тенгликда, Карно-Клаузиус теоремасига асосан,

$$dS_q = dQ/\theta \quad (123)$$

¹ Одатда, энтропияни ўлчамли параметр $S_r = -k < \ln f >$ кўринишда қабул қиладилар; k — Больцман доимийси.

ва демак, яна термодинамиканинг иккинчи қонунининг умумий ифодасига келамиз:

$$dS \geq dQ/\theta. \quad (124)$$

Термодинамиканинг биринчи қонуни (12) ни эътиборга олиб, биринчи ва иккинчи қонунларни биргаликда

$$\theta dS \geq dU + dA - \mu dN \quad (125)$$

қурилишда ёзамиз. Буни *Гиббс-Дюгем муносабати* дейилади; Классик ҳолда $\theta = kT$.

Статистик физикада энтропияни ҳолат эҳтимоллигининг ўлчови сифатида қаралади. Энтропиянинг статистик маъноси билан танишиш учун қуйидаги мисолни қараймиз.

Аввал бир-биридан ажралган S_1^0 ва S_2^0 энтропияли тизимлар мувозанатда бўлсин. Сўнг улар ўртасида контакт ҳосил қилингандан кейин S_1 ва S_2 энтропияли янги мувозанат ҳолатига келинади.

Агар бу тизимларни яна қайтадан ажратилса, уларнинг мувозанат ҳолатлари бузилмайди; қатъийроқ маънода айтдиган бўлсак, мувозанат ҳолатларнинг бузилмаслиги деярли ишончли воқеадир; бунда $S = S_1 + S_2$. Бошқача айтганда, охирги ҳолат — мувозанат ҳолат энг катта эҳтимолли ҳолатдир ($Z = 4$, $N = 2$ бўлгандаги мисолни эсланг!). Бу эса 1 ва 2 тизимлардан иборат тизим эҳтимоли кичик $S_1^0 + S_2^0$ ҳолатдан эҳтимоли катта $S_1 + S_2$ ҳолатга ўтганлигини кўрсатади, бунда тизимнинг энтропияси S деярли ишончли воқеа каби ортади, яъни $\Delta S > 0$.

Шуни айтиш лозимки, тизим термодинамик эҳтимоллиги кичик ҳолатдан термодинамик эҳтимоллиги катта ҳолатга ўз-ўзидан, ўзининг хоссасига кўра, табиий равишда ўтади; яккаланган тизимда энтропия ортади, яъни $dS > 0$ бўлади; умумий ҳолда эса $dS \geq dQ/\theta$ бўлади.

Фараз қилайлик, мувозанатдаги яккаланган тизимнинг микроҳолатлари сони N бўлсин. У ҳолда текис тақсимла-нишга асосан i -ҳолат эҳтимоллиги

$$W_i = 1/N$$

ифода билан аниқланади. Гиббс таърифига асосан:

$$S = - \sum W_i \ln W_i = - \ln M$$

Юқоридаги ҳолат учун Больцман формуласи бўлади.

Юқоридагилардан, агар микроҳолатларнинг эҳтимолликлари текис тақсимланмаган бўлса, энтропия максимум қийматга нисбатан кичик қийматга эга бўлади, яъни ҳолат номувозанатда бўлади, деган хулосани чиқариш мумкин.

Бунда тизим релаксация тамойилига асосан мувозанат ҳолатга яқинлашаверади ва, ниҳоят мувозанат ҳолатга келади, энтропия максимум бўлади, эҳтимолликлар зичлиги текис тақсимланган бўлади, яъни бу ерда юқоридагилардан энтропиянинг ортиш тамойили келиб чиқади.

1-и з о ҳ. Флуктуация жараёнларида мувозанатдаги тизим катта эҳтимолли ҳолатлардан кичик эҳтимолли ҳолатларга утади, бунда тизимнинг энтропияси камаяди.

2-и з о ҳ. Энтропиянинг улчамсиз катталики сифатида аниқланиши, бизнингча, методик нуқтаи назардан қулайлик ҳосил қилади. Ундан ташқари энтропиянинг бундай аниқланиши, биринчидан, унинг тартибсизлик даражасини курсатишга, иккинчидан, информация назариясидаги энтропиянинг Шеннон томонидан таърифланишига ва, ниҳоят, учинчидан, қатъий айтганда, ихтиёрий тўплам элементлари ихтиёрий объектлар бўлиши мумкинлигига жуда мос тушади, яъни унинг улчамли бўлмай, улчамсиз бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Физика адабиётида энтропия (энергия/градус) улчамга эга.

Тарихий маълумот. Энтропия тушунчаси 1865 йилда немис олими Клаузиус томонидан киритилган.

Молекуляр-кинетик тасаввурларга асосланиб энтропиянинг ортиши ҳақида биринчи бобда айтганларимизга қўшимча фикрлар юритамиз.

Биз ички энергия U учун умумий ҳолда

$$U = \sum_i E_i W_i \quad (127)$$

ифодага эгамиз. Квазистатик (мувозанатдаги) жараён содир бўлганда

фойдаланиб.

$$dU = \sum_i W_i dE_i + \sum_i E_i dW_i = \langle dE \rangle + \sum_i E_i dW_i \quad (129)$$

ифодани оламиз. dW_i ни ўзгартириб ёзайлик:

$$dW_i = -W_i d(\ln Z + \beta E_i) = -W_i dS_i, \quad (130)$$

бунда $S_i = \ln Z + \beta E_i$ — микроҳолатнинг энтропияси; равшанки, $S = \langle S \rangle = \ln 1/W_i$. (130) дан фойдаланиб (129) ни

$$dU + dA = - \sum_i W_i E_i dS_i = - \langle E_i dS_i \rangle \quad (131)$$

қурилишда ёзамиз. Термодинамиканинг биринчи қонуни

$$dU + dA = dQ \quad (132)$$

ва иккинчи қонуни

$$dQ \leq \theta dS \quad (133)$$

ифодаларига асосан (131) дан мувозанатдаги ҳол учун

$$- \langle E dS_i \rangle = \theta dS \quad (134)$$

тенгликни оламиз ёки умумий ҳолда

$$- \langle E dS_i \rangle = \theta dS \geq dQ \quad (135)$$

муносабатга эга бўламиз. Яккаланган тизимдаги жараёнлар учун

$$- \langle E dS_i \rangle = \theta dS \geq 0, \quad (136)$$

бунда тенглик қайтувчан, тенгсизлик қайтмас жараёнлар учун ўринли.

а) Қайтувчан жараёнларни қурайлик. Бунда

$$- \langle E dS_i \rangle = \theta dS = 0. \quad (137)$$

Табииyki, (137) муносабат бажарилиши учун

$$-\langle E_i dS_i \rangle = -\sum_i W_i E_i dS_i \quad (138)$$

йингида N_1 та микроҳолатлар энтропияларининг ўзгариши dS_1 манфий, N_2 та микроҳолатларнинг энтропияларининг ўзгариши dS_2 эса мусбат ишорали бўлиши шарт; $N = N_1 + N_2$ — микроҳолатларнинг умумий сони.

$i = \overline{1, N_1}$; $k = \overline{1, N_2}$ белгилашлар киритиб, (138) ифодани

$$-\sum_j^N W_j E_j dS_j = -\sum_i^{N_1} W_i E_i dS_i - \sum_k^{N_2} W_k E_k dS_k = 0$$

қуринишда ёзиш мумкин; бунда $dS_i < 0$ бўлгани учун

$$-\overline{E_i dS_i} > 0 \quad (139)$$

булади; бунда $dS_i < 0$ ҳол микроҳолат эҳтимоллиги W_i нинг ортишига мос келади, яъни кичик эҳтимолли микроҳолатлардан катта эҳтимолли микроҳолатларга ўтишлар содир бўлади. $dS_k > 0$ бўлган ҳолларда микроҳолатларнинг катта эҳтимолликларидан кичик эҳтимолликларига ўтишлар содир бўлади. Мувозанатда бу икки конкурент ўтишларнинг ўртачаси тенг ва $dS = 0$ бўлади. Умумий ҳолда $dS > 0$ ва, демак,

$$-\sum_i^{N_1} W_i E_i dS_i > \left| -\sum_k^{N_2} W_k E_k dS_k \right|. \quad (140)$$

Демак, кичик эҳтимолли микроҳолатлардан катта эҳтимолли микроҳолатларга ўтишлар аксинча ўтишларга нисбатан ўстунлик билан боради. "Номувозанатдаги жараёнлар чоғида тизим кичик эҳтимолли ҳолатлардан катта эҳтимолли ҳолатларга ўтади", дейилган иборани шу маънода тушунмоқ лозим.

Агар тизим бошланғич пайтда муқаррар (динамик) ҳолатда (ёки унга яқин ҳолатда) бўлса, ташқи таъсир бўлмаганда вақт ўтиши билан у мувозанат ҳолатга катта эҳтимоллик билан келади, яъни энтропиянинг ўзгариши $dS > 0$ бўлади. Бу ҳолда эҳтимоллик W нинг камайишига энтропиянинг

$$-\theta dS = \sum_j W_j E_j ds_j = \sum_i W_i E_i dS_i + \sum_k W_k E_k dS_k$$

ифодаси мос келган. Бундан $dS > 0$ бўлиши учун

$$\sum_k W'_k E_k dS_k > \left| \sum_i W_i E_i dS_i \right|$$

шарт бажарилиши зарур (қ. 1.4-расмда унғ қанот); бунда W нинг камайишига тўғри келган $dS_k > 0$; унинг ортишига тўғри келган $dS_i < 0$. Бошқача айтганда тизим дельта-функцияли ҳолатдан каноник тақсимотли ҳолатга келади.

4.19-масала. 1) Энтропиянинг Гиббс ифодаси

$$S = - \sum_i W_i \ln W_i, \quad (1)$$

ички энергия ифодаси

$$U = \sum_i E_i W_i \quad (2)$$

ва каноник тақсимот

$$W_i = \frac{1}{Z} \exp(-\beta E_i) \quad (3)$$

асосида термодинамиканинг иккинчи қонунини келтириб чиқаринг.

2) Термодинамиканинг биринчи ва иккинчи қонунлари

$$\theta dS = dU + PdV, \quad \theta = U/v \quad (4)$$

асосида ҳолат тенгламасини

$$P = n\theta \quad (5)$$

келтириб чиқаринг.

Е ч и ш. 1) (1) дан ушбуни оламиз:

$$dS = \sum_i \ln W_i dW_i, \quad (6)$$

бунда $\sum_i dW_i = 0$ эътиборга олинди. (3) ни (6) га қўйиб қўйидагини оламиз:

$$dS = \beta \sum_i E_i dW_i. \quad (7)$$

(2) дан эса:

$$\sum_i E_i dW_i = dU + dA, \quad (8)$$

бунда $dA = - \langle dE \rangle$. Термодинамиканинг биринчи қонуни

$$dQ = dU + dA \quad (9)$$

(8) ва (9) дан иссиқлик миқдорининг умумий ифодасини аниқлаймиз:

$$dQ = \sum_i E_i dW_i. \quad (10)$$

Мувозанатли ва қайтар жараёнлар учун (7) ва (10) дан

$$\beta dQ_0 = dS. \quad (11)$$

Карно теоремасига асосан, умумий ҳолда

$$dS \geq \beta dQ. \quad (12)$$

Адиабатик жараён учун

$$dS \geq 0, \quad (13)$$

қайтмас жараёнлар учун

$$dS > 0. \quad (14)$$

(12), (13) ва (14) термодинамика иккинчи қонунининг ифодалари.

2) Ҳолат (T, V) параметрларга нисбатан аниқлансин; (11) тенглама $v = \text{const}$ ҳол учун (зарралар сони доимий бўлган ҳол учун) ёзилган. (13) ни

$$dS = + \frac{1}{\theta} \frac{\partial U}{\partial T} dT + \frac{1}{\theta} \left[\frac{\partial U}{\partial V} + P \right] dV \quad (15)$$

қўринишда ёзайлик. dS тўла дифференциаллигидан

$$\frac{\partial}{\partial V} \left[\frac{1}{\theta} \frac{\partial U}{\partial T} \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left\{ \frac{1}{\theta} \left[\frac{\partial U}{\partial V} + P \right] \right\} \quad (16)$$

тенгликни ёзиш мумкин. (16) ни қуйидагича ёзайлик:

$$\frac{1}{\theta} \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} - \frac{1}{\theta^2} \frac{\partial \omega U}{\partial V \partial T} = \frac{1}{\theta} \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} + \frac{1}{\theta} \frac{\partial P}{\partial T} - \frac{1}{\theta^2} \frac{\partial \omega U}{\partial T \partial V} - \frac{P}{\theta^2} \frac{\partial \theta}{\partial T} \quad (17)$$

$\theta = U/v$ ва $v = \text{const}$ ни эътиборга олсак,

$$\frac{\partial \theta}{\partial V} \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial \theta}{\partial T} \frac{\partial U}{\partial V}$$

тенглик уринли. Буни назарда тутиб, (17) дан

$$\frac{\partial \ln P}{\partial T} = \frac{\partial \ln \theta}{\partial N}, \quad P = C\theta$$

тенгликни оламир; C — интеграл доимийси T га боғлиқ эмас. Идеал газ учун

$$P_0 = n\theta_0 = nkT.$$

Бундан $C = n$ — зарралар зичлиги. Демак, умумий ҳолда

$$P = n\theta, \quad \theta = U/v \quad (18)$$

ҳолат тенгламасини оламир.

4.20-масала.

$$C_p - C_v = TV \frac{\alpha^2}{\chi_T} \quad (1)$$

тенгликни исбот қилинг.

Е ч и ш. Бизга маълумки,

$$C_p - C_v = V\alpha l_v,$$

$$TdS = C_v dT + l_v dV$$

ва Массвелл муносабати бўлган

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

тенгликдан

$$l_v = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = TP\beta;$$

$$C_p - C_v = PVT\alpha\beta; \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -1. \quad (3)$$

(3) дан фойдаланиб, β нинг ифодасини ёзамиз:

$$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\alpha_P \frac{V}{P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T} = \frac{\alpha}{P\chi_T}. \quad (4)$$

Демак, (4) ни назарда тутиб, (2) дан (1) ифодани оламиз.

4.21-масала.

$$\chi_T - \chi_S = VT \frac{\alpha^2}{C_P}$$

тенгликни исбот қилинг.

Е ч и ш. Бизга маълумки,

$$\frac{\chi_T}{\chi_S} = \gamma = \frac{C_P}{C_V}.$$

Аввалги масалада

$$C_P - C_V = VT\alpha^2 \frac{1}{\chi_T} \quad (1)$$

экани кўрсатилган эди. Буни ўзгартириб ёзайлик:

$$C_P \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) = C_P \left(1 - \frac{\chi_S}{\chi_T}\right) = \frac{C_P}{\chi_T} (\chi_T - \chi_S). \quad (2)$$

(1) ва (2) дан:

$$\chi_T - \chi_S = VT\alpha^2 \frac{1}{C_P}.$$

4.22-масала. Гиббс-Дюгем муносабати асосида Стефан-Больцман қонунини исботланг.

К ў р с а т м а. Фотон газ ички энергияси

$$U = V\varepsilon(T) \quad (1)$$

ифода билан аниқланади деб ҳисоблансин.

Е ч и ш. Гиббс-Дюгем муносабати

$$dS_T = \frac{1}{T} (dU + PdV) = \frac{1}{T} \left[\frac{\partial U}{\partial T} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} + P \right) dV \right]. \quad (2)$$

dS_T нинг тўла дифференциаллигидан

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{T} \frac{\partial U}{\partial T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + P \right) \right]$$

теңгликни оламиз, бундан $P = \epsilon/3$ ни назарда тутиб,

$$T \frac{d\epsilon}{dT} = 4\epsilon$$

теңгликни оламиз ёки бундан

$$\epsilon = \sigma T^4$$

Стефан-Больцман қонуни келиб чиқади. σ — интеграл доимийси. Унинг қиймати Планк назариясидан аниқланади.

4.8-§. САКУР-ТЕТРОД ТЕНГЛАМАСИ. ГИББС ПАРАДОКСИ

Энтропия формуласи

$$S = \nu + \ln Z \quad (141)$$

ни N та заррадан иборат бўлган идеал классик газ учун татбиқ этайлик. Бундай идеал газ учун $\nu = 3N/2$; $\theta_0 = kT$ ва статистик интеграл Z учун

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{Z_1} \right)^N \quad (142)$$

ифодага эгамиз; бунда

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m \theta_0} \right)^{3/2} \quad (143)$$

формула билан аниқланади: (142) ва (143) ни назарда тутиб, (141) ни қайта ёзамиз:

$$S = N \left[\frac{3}{2} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m \theta_0}{h^2} \right) - \ln n \right]$$

ёки

$$\frac{S}{N} = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{4\pi m k T}{h^2} \right) \right], \quad n = \frac{N}{V}. \quad (144)$$

Битта заррага тугри келган S/N энтропия (144) ни Са-кур-Тетроуд тенгламаси дейилади. (144) дан куринадики, температура T ва зичлик $n = N/V$ узгармаса, (S/N) энтропия ҳам ўзгармайди.

N та заррадан иборат классик идеал газнинг энтропиясини Гиббс-Дюгем термодинамик муносабатидан аниққлайлик:

$$\theta dS = dU + PdV. \quad (145)$$

Идеал газ учун $U = U(T)$ ва демак

$$dU = C_V dT. \quad (146)$$

Маълумки,

$$PV = NkT. \quad (147)$$

(146) ва (147) ни ҳисобга олиб, (145) тенгламани ёзамиз:

$$kdS = C_V \frac{dT}{T} + \frac{Nk}{V} dV. \quad (148)$$

Бундан

$$kS = C_V \ln T + Nk \ln V + S_0, \quad (149)$$

бунда S_0 — интеграл доимийси. У умуман, эркинлик даражалари сони ёки зарралар сонига боғлиқ:

$$S_0 = S_0^v \quad \text{ёки} \quad S_0 = S_0(N) \quad (150)$$

Биз масалани қараётганимизда N ни ихтиёрий доимий деб қабул қилган эдик.

Ушбу мисолни кўрайлик: V ҳажмли идиш тусиқ билан икки a ва b қисмга ажратилган бўлсин. V_a ҳажмда N_a , V_b ҳажмда N_b идеал газлар бир хил температурада бўлсин. Бу газларнинг (149) га асосан энтропиялари

$$kS_a = C_{V_a} \ln T + N_a k \ln V_a + kS_0(N_a), \quad (151)$$

$$kS_b = C_{V_b} \ln T + N_b k \ln V_b + kS_0(N_b). \quad (152)$$

Ҳар икки газдан иборат умумий тизимнинг энтропияси энтропиянинг аддитивлик хоссасига асосан, (151) ва (152) ларнинг йиғиндиси, яъни

$$S^* = S_a^* + S_b^*$$

(153)

билан аниқланади.

Агар идиш қисмлари орасидаги тўсиқни олиб, газлар аралашади, диффузия ҳодисаси юз беради. Маълум вақтдан (релаксация вақтидан) кейин тизим ўзининг мувозанат ҳолатига келади, a ва b газнинг ҳар бири идишнинг бутун ҳажми V ни эгаллайди. Диффузиядан кейин, тизим мувозанатда бўлганда a ва b газларнинг энтропияларини (149) формула асосида аниқлаймиз, яъни:

$$kS_a = C_{Va} \ln T + N_a k \ln(V_a + V_b) + kS_0(N_a), \quad (154)$$

$$kS_b = C_{Vb} \ln T + N_b k \ln(V_a + V_b) + kS_0(N_b). \quad (155)$$

Газлар аралашгандан кейин аралашма тизимнинг умумий энтропияси

$$S = S_a + S_b \quad (156)$$

йиғиндидан иборат бўлади.

Энди a ва b газларнинг аралашishi (диффузияси) туфайли тизимнинг умумий энтропиясининг ўзгаришини топайлик. Бунинг учун (151), (152), (154) ва (155) ифодаларни назарда тутиб, (156) ифодадан (153) ни айирамиз, яъни:

$$k\Delta S = kS - kS^0 = N_a k \ln \frac{V_a + V_b}{V_a} + N_b k \ln \frac{V_a + V_b}{V_b} \quad (157)$$

ёки бундан

$$\Delta S = N_a \ln \frac{N_a + N_b}{N_a} + N_b \ln \frac{N_a + N_b}{N_b} \quad (158)$$

ифода олинади.

Бу формула (158) газлар учун, масалан, аргон, неон ва бошқа газлар учун тасдиқланади (қ. (12)). Фараз қилайлик иккита бир хил газ $N_a = N_b = N$ идишда аралашсин. (157) ёки (158) формулага асосан, аралашish (узлиффузия туфайли) энтропиянинг ортиши

$$\Delta S = 2Mn2 \quad (159)$$

ифода билан аниқланади. Умуман, бир хил газ учун энтропиянинг ортиши энтропиянинг мавжуд эмаслигига олиб келади; чунки газнинг ҳар қандай ҳолатини, биз газ қисм-

ларининг орасидаги тўсиқларнинг олиниши туфайли келган, деб тасаввур этишимиз мумкин. Бу эса унинг энтропияси, (159) га асосан, аввалдан берилган ҳар қандай сондан катта бўла олишини кўрсатади.

Аммо бир хил газ бўлганда тўсиқ бўлиши ёки унинг олиниши макроскопик жараёнининг (диффузия ҳодисасининг) бўлишига олиб бормади. Мувозанатдаги тизимда макроскопик жараён бўлмаслиги учун (бир хил газда ўзидиффузия ҳодисаси — термодинамик жараён эмас!) унинг энтропияси ўзгармаслиги лозим. Шундай қилиб, термодинамикадан келиб чиққан (159) ифода амалдаги натижага зиддир. Бу зиддиятни *Гиббс парадокси* дейилади.

Гиббс бу зиддиятни эмпирик усул билан ҳал қилди. Статистик физикадаги (144) формула асосида бу зиддият ўзидан бартараф этилади; ҳақиқатан ҳам, ҳар хил газлар аралашганда (144) формуладаги зичлик $n = N/V$ ўзгаради ва, демак, энтропия ўзгаради; бир хил газлар "аралашганда" эса тўсиқ бўлиши ёки олиниши билан зичлик ўзгармайди ва, демак, энтропиянинг қиймати ўзгармайди (Гиббс парадокси бўлмайди).

1-изоҳ. Статистик физиканинг одатдаги баёнида бу зиддиятни квант механикасидаги (ҳозирги замон микрозаррлар физикасидаги) айнанлик тамойилини ҳисобга олиб, сўнг Стирлинг формуласидан фойдаланиш орқали ҳал қилинади (Сакур-Тетрод формуласини олишда ҳам, анъанавий усулда шундай қилинади).

Бизнинг усулимизда эса, Гиббс парадоксини ҳал этишда Стирлинг формуласидан фойдаланишга эҳтиёж бўлмайди (қ. [12] 241-бет).

2-и з о ҳ. Сакур-Тетрод тенгламасида $T \rightarrow 0$ бўлганда энтропия S нолга интилмагани учун, Сакур-Тетрод тенгламаси термодинамиканинг учинчи қонунини қаноатлантирмайди, дейилади (масалан, қ. [12] 219-бет). Аммо температура T нолга интилиши ҳар бир эркинлик даражасига тўғри келган энергиянинг нолга интилиши демакдир. Энергия узлуксиз ўзгарган ҳолда фазо ҳам узлуксиз ўзгариши талаб этилади, яъни $h \rightarrow 0$ бўлиши кўзда тутилади. Шу сабабли, Сакур-Тетрод тенгламасида h^2/θ ёки h^2/kT нисбат ноаниқ бўлиб қолади ва, демак, $T \rightarrow 0$ бўлганда тенглама термодинамиканинг учинчи қонунини қаноатлантирмаганлиги (ёки

қаноатлантириши, номуайым бўлиб қолади. Агар қаноатлантиради, яъни $T \rightarrow 0$ да $S \rightarrow 0$ бўлади дейилса, (h^2/T) учун маълум чегаравий қийматни олиш мумкин.

4.9-§. БОЛЬЦМАН ФОРМУЛАСИ

Яккаланган тизимни қарайлик. Таърифга кўра бу ҳолда

$$E = \langle E \rangle = U = \text{const.} \quad (160)$$

К в а н т ҳ о л. Статистик йиғинди

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}, \quad (161)$$

бунда E_i — i -микроҳолатнинг энергияси, аммо, (160) га асосан, бу ҳолатлардаги энергия ўзаро тенг. Шунинг учун (161) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$Z = \sum_i e^{-\frac{\beta E_i}{U}} = e^{-\beta} \sum_i l_i$$

ёки

$$Z = e^{-\beta} N_x, \quad (162)$$

бунда

$$N_x = \sum_i l_i, \quad (163)$$

Ҳолатлар сони Z нинг (162) ифодасини энтропия тенгламаси

$$S = \nu + \ln Z \quad (164)$$

га қўйиб яккаланган тизим энтропияси учун ушбу ифода-ни оламиз:

$$S = \ln N_x. \quad (165)$$

Бу ифода Больцманнинг машҳур формуласидир.

К л а с с и к ҳ о л. Бу ҳолда статистик интеграл

$$Z = \int e^{-\beta E} dn \quad (166)$$

кўринишда аниқланади. (160) га асосан $E = \text{const}$ бўлганлиги учун

$$Z = e^{-\beta E} \int dn = e^{-\beta E} N_x, \quad (167)$$

тенгликни оламиз; бунда:

$$N_x = \int dn = \frac{1}{gh^3} \int d\Gamma. \quad (168)$$

(167) ни энтропия тенгламаси (164) га қуйиб, яна Больцман формуласини оламиз¹. Бу ерда N_x тизим фазавий фазодаги "ячейкалар" катаклар сони билан аниқланади.

Энтропиянинг бошқача кўринишини кўрайлик. Яккаланган тизим учун

$$N_x = \int dn = \frac{1}{gh^3} \int d\Gamma = \frac{1}{gh^3} \int d\Gamma_E \quad (169)$$

экани маълум. Бундаги $d\Gamma_E$ фазавий E ва $E + dE$ радиусли гиперсфералар орасидаги ҳажм. $d\Gamma_E$ етарли даражада кичик бўлиши мумкин. (Яккаланган тизим учун сиртлар ораси жуда юпқа деб юритилади ва $dE \rightarrow 0$ дейилади.) У ҳолда

$$\Gamma_E = \int_{(E)} d\Gamma_E \quad \text{ёки} \quad \Delta\Gamma_E = \int_{(\Delta E)} d\Gamma_E$$

Физикада купинча энтропиянинг узгариши муҳим бўлганлиги учун, (165) нинг ўрнига

$$\Delta S = \ln \Gamma_E \quad \text{ёки} \quad \Delta S = \ln \Delta\Gamma_E \quad (170)$$

ёзилиши мумкин. Энтропиянинг одатдаги ифодаларида Больцман доимийси k иштирок этади:

$$S_x = k \ln N_x. \quad (171)$$

Гиббс таърифи бўйича энтропия S_f киритилганда

$$S_f = -k \langle \ln f_f \rangle, \quad (172)$$

$$f_f = \frac{1}{Z} e^{-E/kT}$$

¹ Статистик физикада Больцман формуласи постулат сифатида қабул қилинади. Бизнинг баёнимизда эса у энтропия тенгламасидан келтириб чиқарилди.

Аммо энтропия S тартибсизлик даражасини аниқлайдиган катталиқ бўлгани учун у ўлчамли бўлиши шарт эмас ва хатто ўлчамсиз бўлиши тартибсизлик даражасини кўрсатувчи (ёки информацияни аниқловчи) сифатида ҳам мантиқан, ҳам услубий жиҳатдан бизнингча туғрироқ эканлигини юқорида айтган эдик.

Тарихий маълумот. Энтропия формулаларининг, жумладан, Больцман формуласининг физика учун жуда муҳимлигини Кубонинг "Статистик механика" китобида келтирилган қуйидаги маълумотдан ҳам билиб олиш мумкин. "Гүзал Венанинг марказий қабристониди Людвиг Больцман (1844—1906 йиллар) хотирасига қўйилган ёдгорликка, унинг инсониятга бебаҳо тухфаси, яъни $S = R \ln W$ формуласи абадий муҳраб қўйилганлигини йўловчилар кўришлари мумкин.

Маълум бўлишича, $S = R \ln W$ формулани айнан шу кўринишда Больцман ўзи ҳеч қачон ёзмаган. Планк ўзининг иссиқлик нурланиши назарияси бўйича қилган лекцияларида шу формулани беради..." [4].

Машҳур япон физиги Кубо термодинамиканинг биринчи ва иккинчи қонунлари ҳақида ёзиб, у қуйидаги чиройли ўхшатишни келтиради: Табиий жараёнларнинг буюк фабрикасида энтропия тамойили директорлик қилиб, ҳамма битимлар (келишувлар) турларини тузишга ва уларнинг бажарилишига буйруқ беради; худди шу пайтда энергиянинг сақланиш қонуни фақатгина бухгалтер ролини ўйнаб, дебет ва кредит (кирим ва чиқим)ни мувофиқлаштириш (тенглаштириш) билан шуғулланади.

1-и з о ҳ. Яккаланган тизим учун

$$Z = e^{-\gamma N_x} \quad (1)$$

ифода олинди. (1) дан.

$$\nu = \ln(N_x/Z). \quad (2)$$

N та заррадан иборат идеал газ учун (2) ни

$$\frac{3N}{2} = \ln \frac{N_x}{Z_N} \quad (3)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Узлуксиз ҳол учун "ҳолатлар сони" N_x ни

$$N_x = \int dn = \frac{1}{gh_x} \int d\Gamma$$

ёки

$$gN_x = \frac{\int d\Gamma}{h^3} \quad (4)$$

кўринишда ёздик. (4) фазавий фазо "катак"лар сонини аниқлайди. Идеал классик газ учун (зарралар сони N та бўлганда) $g = N^N$. Демак,

$$N^N N_x = \frac{\int d\Gamma}{h^3} \quad (5)$$

(5) да N^N — усуллар сони. Демак, ҳар бир микроҳолатда одатдаги адабиётда қабул қилинганидек M та усул бўлмасдан, балки N^N та усул бордир, яъни ҳар бир микроҳолатни N^N хил усул билан олиш мумкин. Шу сабабли микроҳолатлар сонини N^N га (M — бу усуллар сонининг бир қисмини ташкил этади) кўпайтириш зарур.

2-и з о ҳ. Идеал классик газ зарралари

$$(P_x, P_y, P_z)_1, (P_x, P_y, P_z)_2, \dots, (P_x, P_y, P_z)_N \quad (6)$$

ҳолатларда бўлсин. Микроҳолатлар сони N_x га тенг бўлсин. Аммо бундаги N_x та микроҳолатнинг ҳар бири юқоридаги қавсларнинг (зарраларнинг) ўринларини алмаштириш туфайли ҳосил қилиниши мумкин. Бундай "янги ҳолатлар" сони $N!W$ тадан иборат бўлади. Аммо бу янги ҳолатлар маълум E энергияли микроҳолатни ҳосил қилинишининг бир қисми холос. E энергияли микроҳолатни юқоридаги қавслардан N^N та усул билан ҳосил қилиш мумкин, шунинг учун N_x ни N^N га кўпайтириш керак:

$$N^N N_x = \frac{\int d\Gamma}{h^3}$$

Статистик физикада битта усулга тўғри келган микроҳолатларнинг сонини топиш учун катаклар сонини N^N га бўлиш лозим.

4.23-масала.

$$\nu = \ln(N_x/Z) \quad (1)$$

формула асосида N та заррадан иборат идеал газ "ҳолатлар сони" N_x ни аниқланг.

Е ч и ш. Бу ҳолда $\nu = 3N/2$,

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3N/2}$$

Булардан фойдаланиб, (1) ни қайта ёзамиз:

$$e^{1N/2} = \frac{N_x}{Z_N}$$

ёки

$$N_x = Z_N e^{1N/2} = \frac{1}{n^N} \left(\frac{2\pi emkT}{h^2}\right)^{3N/2} = \left(\frac{2\pi emkT}{n^2 h^2}\right)^{3N/2}$$

Бундан, микроҳолатлар сони N_x температура T ва зичлик n га боғлиқ эканлиги келиб чиқади.

4.10-§. ТЕРМОДИНАМИК ФУНКЦИЯЛАР

Тақсимот функцияси ва энтропия учун

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad (173)$$

$$S = \nu + \ln Z = \beta U + \ln Z \quad (174)$$

ифодага эгамиз.

Статистик интеграл Z ни қуйидагича алмаштираемиз:

$$Z = \sum e^{-\beta F} \quad (175)$$

Бундан:

$$\ln Z = -\beta F$$

ёки

$$F = -\theta \ln Z \quad (176)$$

тенгликни топамиз. (176) ни (174) га қўйсак

$$S = \beta U - \beta F$$

ёки

$$F = U - \theta S \quad (177)$$

Агар $\theta_0 = kT$ бўлса,

$$F = U - TkS$$

ёки

$$F = U - TS_r \quad (178)$$

бунда $S_r = kS$. (178) даги F нинг ифодасини — термодинамикадаги *эркин энергия (Гельмгольц потенциали)* дейилади.

$\theta = U/v$ дан фойдаланиб, (177) ни

$$F = U(1 - S/v) \quad (179)$$

ёки

$$\frac{F}{U} + \frac{S}{v} = 1 \quad (180)$$

қурилишда ёзиш мумкин.

Яккаланган тизимда қайтмас жараёнлар содир бўлаётган бўлса, термодинамиканинг иккинчи қонунига асосан, унинг энтропияси S мувозанат ҳолатига келгунга қадар ортиб боради, яъни максимум қийматига эришгунга қадар ортиб боради. Бу ҳолда энергия E ва, демак, ички энергия U узгармаганлиги (сақланганлиги) сабабли, (179) дан қуринадики, эркин энергия F камайиб боради ва S максимум қиймат қабул қилганда у минимум қиймат қабул қилади.

Статистик термодинамика нуқтаи назаридан тартибсизлик даражасининг ортиши (тизимнинг мувозанатга яқинлашуви) тартибли ҳаракатнинг камайишига мос келади. Тартибли ҳаракатнинг камайиши тизимнинг иш бажара олиш қобилиятининг камайиши демакдир. Шундай қилиб, эркин энергия тизимнинг иш бажара олиш қобилиятини ҳарактерлайди. Тизим мувозанатга яқинлашиши билан эркин энергия камаяди ва, демак, тизимнинг иш бажара олиш қобилияти камаяди ва, ниҳоят, F минимум қиймат қабул қилганда тизимнинг иш бажара олиш қобилияти йўқолади.

Термодинамикада

$$\Phi = F + PV \quad (181)$$

ифодани *термодинамик потенциал* (ёки *Гиббснинг термодинамик потенциали*) дейилади;

$$H = U + PV \quad (182)$$

ифодани *энтальпия* (ёки *иссиқлик функцияси*) дейилади.

(181) дан кўринадик, яққаланган тизимда жараёнлар содир бўлаётган бўлса, унинг термодинамик потенциали камайиб боради.

Энди термодинамик функциялар: ички энергия U , эркин энергия F , термодинамик потенциал Φ ва энтальпия H нинг ўзгаришларини кўрайлик.

Термодинамиканинг I ва II қонунларининг умумий ифодаси Гиббс-Дюгем муносабати

$$\theta dS = dU + dA - \mu_v dv \quad (183)$$

бизга маълум. Бунда $\mu_v dv = \mu_A dN$ тенгликдан фойдаланиб, (183) ни қайта ёзамиз:

$$\theta dS = dU + dA - \mu dN, \quad (184)$$

бунда μ — кимёвий потенциал, N — тизим зарралари сони.

Тизимга P босим ва ундан ташқари $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$ кучлар таъсир қилаётган бўлса, булар таъсирида унинг ҳажми ва бошқа $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$ параметрлари ўзгариши мумкин. Бу ҳолда тизим томонидан бажарилаётган иш

$$dA = PdV + \sum X_i dx_i \quad (185)$$

ифода билан аниқланади.

Фараз қилайлик, берк тизимга (яъни $dN = 0$ бўлганда) фақат босим таъсир қилаётган бўлсин. У ҳолда (183) муносабат

$$\theta dS = dU + PdV \quad (186)$$

ёки

$$dU = \theta dS - PdV \quad (187)$$

кўринишни олади. Бундан ички энергия U — термодинамик функциянинг аргументлари энтропия S ва ҳажм V эканлиги кўринадик. (187) дан босим P ва θ учун

$$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = - \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial V}, \quad (188)$$

$$\theta = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \quad (189)$$

ифодаларни оламир.

Идеал газ учун $\theta_0 = kT$. Бу ҳолда (189) дан, хусусий ҳолда абсолют температура T нинг термодинамик таърифи

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S_r} \right)_V \quad (190)$$

ни оламир.

(187) тенгликни

$$d(U - \theta S) = -Sd\theta - PdV \quad (191)$$

ёки

$$dF = -Sd\theta - PdV \quad (192)$$

қўринишда ёки умумий ҳолда

$$dF = -Sd\theta - PdV + \mu dN - \sum_i X_i dx_i \quad (193)$$

қўринишда ёзиш мумкин. (192) дан қўринадики, эркин энергия F ҳам V ва θ га нисбатан термодинамик потенциалдир (функциядир). Ундан

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_V, \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_\theta \quad (194)$$

ифодаларни оламир. Агар $\theta = \text{const}$ бўлса, яъни жараён изотермик бўлса, (192) ифода

$$-dF_\theta = PdV \quad (195)$$

қўринишга келади. Бундан изотермик жараёнда эркин энергиянинг камайиши тизимнинг босими томонидан ташқи кучларга қарши бажарилган ишга тенг, деган хулоса чиқади.

(193) муносабатни

$$d(F + PV) = VdP - Sd\theta + \mu dN - \sum_i X_i dx_i$$

ёки

$$d\Phi = VdP - Sd\theta + \mu dN - \sum_i X_i dx_i \quad (196)$$

қўринишга осонлик билан келтириш мумкин, бунда

$$\Phi = F + PV = U - \theta S + PV. \quad (197)$$

(196) муносабатдан

$$V = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right)_{\theta, N, \bar{x}_i}, \quad S = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{P, N, \bar{x}_i} \quad (198)$$

(196) дан P, θ, N доимий бўлганда

$$-d\Phi = dA'$$

ифодани оламиз. Демак, босим, температура ва N доимий бўлганда тизим томонидан босимдан бошқа ташқи кучларга қарши бажарилган иш термодинамик потенциалнинг камайишига тенгдир.

Яккаланган тизимда қайтмас жараён бораётганда энтропиянинг ўсиши туфайли унинг термодинамик потенциали Φ камаяди. (187) муносабатни қуйидагича қуринишда ёзайлик:

$$dH = \theta dS + VdP, \quad (199)$$

бунда

$$H = U + PV. \quad (200)$$

H — энтальпия ёки иссиқлик функцияси. Умумий ҳолда

$$dH = \theta dS + Vdp + \mu dN - \sum_i X_i dx_i \quad (201)$$

Бундан қуйидагини оламиз:

$$\theta = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_{P, N, X_i}, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_{S, N, X_i}. \quad (202)$$

Шунингдек (201) дан қуринадики, P, N ва x доимий бўлганда

$$dH = (\theta dS)_{P, N, X_i} = dQ_{P, N, X_i} \quad (203)$$

тенгликни оламиз.

Шундай қилиб, берк тизимда ташқи шароит узгармаганда изобарик жараёнда тизимга берилаётган иссиқлик миқдори тизим энтальпиясининг ўзгаришига тенгдир.

Энди бир нечта термодинамик муносабатларни келтирайлик: (188) ва (189) дан:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \left(\frac{\partial \theta}{\partial V} \right)_S, \quad (204)$$

(193) дан

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \theta} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_\theta. \quad (205)$$

(198) дан:

$$(\partial V / \partial \theta)_S = -(\partial S / \partial P)_\theta. \quad (206)$$

(202) дан

$$(\partial V / \partial S)_P = (\partial \theta / \partial P)_S. \quad (207)$$

олинган (204)–(207) тенгликларни *Максвелл муносабатлари* дейилади.

Берк тизим учун $v = \text{const}$ бўлгани туфайли (180) да S нинг ўрнига (194) дан унинг қийматини келтириб қўйиб,

$$\frac{F}{U} - \left(\frac{\partial F}{\partial U} \right)_{V, N, x_i} = 1$$

тенгликни оламиз. (184), (193), (196) ва (201) ифодалардан, яъни

$$dU = \theta dS - PdV + \mu dN - \sum_i X_i dx_i,$$

$$dF = -Sd\theta - PdV + \mu dN - \sum_i X_i dx_i,$$

$$d\Phi = -Sd\theta + VdP + \mu dN - \sum_i X_i dx_i,$$

$$dH = \theta dS + VdP + \mu dN - \sum_i X_i dx_i$$

тенгликлардан, тегишли параметрлар ўзгармай қолганда,

$$(dU)_{SVN} = (dF)_{\theta VN} = (d\Phi)_{P\theta N} = (dH)_{SPN} \quad (208)$$

тенгликларни оламиз.

4.24-масала. dU , dF , $d\Phi$, dH ларни вириал коэффициентлар орқали ифодаланг.

Курс а т м а: тизимнинг идеалликдан четланишлари учун ҳам (208) тенгламалар ўринли бўлсин. деб ҳисобланг.

Е ч и ш. Ҳолат тенгламасини вириал коэффициентлар $B(T)$, $C(T)$, ..., орқали ёзайлик:

$$PV = NkT(1 + nB(T) + n^2C(T) + \dots) \quad (1)$$

ёки

$$PV - NkT = nNkT[B(T) + nC(T) + \dots] \quad (2)$$

бунда $(PV)_{\mu\kappa} = NkT$ — Клапейрон ҳолат тенгламаси. Курсатмага асосан, (208) даги ўзгариш

$$U - U_{\mu\kappa} = NnkT[B(T) + nC(T) + \dots] \quad (3)$$

(208) ифодага асосан:

$$F - F_{\mu\kappa} = NnkT[B(T) + nC(T) + \dots]. \quad (4)$$

Φ ва H ларга нисбатан ҳам шу каби тенгликларни ёзилади.

2.25-масала. Умумий ҳолда босим учун

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{0,SN} \quad (5)$$

ифода маълум. Аввалги масаладаги (4) ифодадан фойдаланиб, (5) дан вириал коэффициентлар орқали ҳолат тенгламасини келтириб чиқаринг.

Е ч и ш. (5) даги F нинг ўрнига унинг ифодаси

$$F - F_{\mu\kappa} = NnkT[B(T) + nC(T) + \dots]$$

ни қўямиз:

$$\begin{aligned} P &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial F_{\mu\kappa}}{\partial V}\right)_T - \frac{\partial}{\partial V}[NnkT(B(T) + nC(T) + \dots)]_T = \\ &= P_{\mu\kappa} + \frac{N^2}{V^2} kTB(T) + \dots = P_{\mu\kappa} + n^2 kTB(T) + \dots = P_{\mu\kappa}(1 + nB(T) + \dots) \end{aligned}$$

бунда $P_{\mu\kappa} = nkT$ эканлигини эътиборга олинса, уни вириал коэффициентлар орқали ёзилган ҳолат тенгламаси эканлиги маълум бўлади.

4.26-масала. Берк тизим учун статистик интеграл

$$Z = C(v, V, X_i) U^v \quad (6)$$

кўринишга эга эканлигини кўрсатинг.

Е ч и ш. Берк тизим учун зарралар сони N ва, демак, v ўзгармайди. Шу сабабли

$$dS = d \ln Z = \frac{1}{Z} dZ \quad (7)$$

Бизга (189) дан маълумки,

$$\theta = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{v, N, X_i} \quad \theta = U / v \quad (8)$$

(7) ни эътиборга олиб, (8) ни ёзайлик:

$$\frac{U}{v} = Z \left(\frac{\partial U}{\partial Z} \right)_{vNX_i}$$

ёки бундан

$$\frac{dZ_{vNX_i}}{Z} = v \frac{dU_{vNX_i}}{U}$$

тенгликни ёзамиз. Бу тенгликни интеграллаб, изланаётган (6) ифодани топамиз. Бунда $C(v, V, X_i)$ — интеграллаш доимийси v , V ва x_i ларга боғлиқ бўлиб, θ га боғлиқ эмас.

4.27-масала. Умумий ҳолат тенгламаси

$$\alpha\beta PV(P + P_n)(V - V_n) = (C_p - C_v)^2 \quad (1)$$

исбот қилинсин, бунда

$$P_n = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T, \quad V_n = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T. \quad (2)$$

Е ч и ш. Бизга маълумки,

$$I_v = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P = \frac{C_p - C_v}{\alpha}, \quad (3)$$

$$I_p = \left(\frac{\partial H}{\partial V} \right)_T - V = \frac{C_v - C_p}{\beta}. \quad (4)$$

(2) белгилашларга асосан (3) ва (4) ни ёзамиз:

$$(P + P_n)V = \frac{1}{\alpha}(C_p - C_v), \quad (5)$$

$$(V - V_n)P = -\frac{1}{\beta}(C_p - C_v). \quad (6)$$

$V_n < V$ эканлиги $C_p > C_v$ дан келиб чиқади. (5) ва (6) ни бир-бирига кўпайтириб, изланаётган ҳолат тенгламаси (1)ни оламиз:

$$(P + P_n)(V - V_n)PV = \left(\frac{1}{\alpha\beta} \right) (C_p - C_v)^2. \quad (7)$$

Тарихий маълумот. Термодинамик функцияларнинг номлари ҳақида (қ. [4]). "Энергия" атамаси "эн" (Inhalt = capacity) сигим, миқдорни билдиради; эрг ($\epsilon\rho\gamma\omicron\nu$ — иш) иш сузидан келиб чиққан. Тизим энергияси атамаси Арис-

тотель асарларида учрайди; "ички энергия" атамасини Томсон (1852 й.), Клаузиус (1876 й.) киритган, "энтропия" атамасини Клаузиус (1865 й.) киритган; юнонча ўзгариш. ўзгарувчан катталиқ сўзидан олинган. "Энтальпия" (Камерлинг-Оннес, 1909 й.) юнонча иссиқлик миқдори сўздан олинган (Гиббс шу функцияни босим доимий бўлганда иссиқлик функцияси деган). "Эркин энергия" атамасини Гельмгольц (1882 й.) киритган. Термодинамик потенциал Φ ни (Гиббснинг эркин энергияси) Гиббс киритган.

4.11-§. КИМӨВИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ички энергия U , энтропия S , эркин энергия F , термодинамик потенциал Φ ва энтальпия H ушбу P ва T параметрлар доимий бўлганда аддитив катталиқдирлар. Бу эса тизимнинг модда миқдори, шу билан бирга эркинлик даражалари сони ва, демак, зарралар сони неча марта ошса, бу функциялар ҳам шунча марта ортади демакдир.

Аддитивлик хоссасига асосан қуйидагиларни ёзиш мумкин:

$$U = Nf\left(\frac{S}{N}, \frac{V}{N}\right), \quad (209)$$

$$F = Nf\left(\frac{V}{N}, T\right), \quad (210)$$

$$H = Nf\left(\frac{S}{N}, P\right) \quad (211)$$

$$\Phi = Nf(P, T), \quad (212)$$

бунда f битта заррага тўғри келган функциядир.

Қуйидаги дифференциалларни ёзайлик:

$$dU = \theta dS - PdV - \sum X_k dx_k + \mu_N dN, \quad (213)$$

$$dF = -Sd\theta - PdV - \sum X_k dx_k + \mu_N dN, \quad (214)$$

$$d\Phi = -Sd\theta + VdP - \sum X_k dx_k + \mu_N dN, \quad (215)$$

$$dH = \theta dS + VdP - \sum X_k dx_k + \mu_N dN. \quad (216)$$

(213) — (216) дифференциаллардан

$$\mu_N = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{SVX_k} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{\theta V X_k} = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N} \right)_{\theta P X_k} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{SP X_k} \quad (217)$$

эканлиги келиб чиқади, яъни кимёвий потенциал μ ни U , F , Φ , H термодинамик функциялардан зарралар сони бўйича ҳосила олиб аниқлаш мумкин. Аммо буларнинг ҳар биридан μ аниқланганида унинг ўзгарувчи параметрлари ҳар хил бўлиши (217) дан кўринади. (212) ва (217) дан аёнки,

$$\Phi = N\mu(\theta, P). \quad (218)$$

Демак, бир хил зарралардан иборат тизимнинг кимёвий потенциали бир заррага тўғри келган термодинамик потенциалдан иборат.

x_i параметрлар бўлмаганда $d\Phi$ учун

$$\begin{aligned} d\Phi &= -Sd\theta + VdP + \mu dN = \\ &= -Sd\theta + VdP + d(\mu N) - Nd\mu. \end{aligned} \quad (219)$$

Бундан, (218) ни назарга олиб, ёзамиз:

$$d\mu = -sd\theta + vdP, \quad (220)$$

бунда s ва v битта заррага тўғри келган энтропия ва ҳажм. Дифференциал dF ни ёзамиз:

$$dF = -Sd\theta - PdV + \mu dN = -Sd\theta - PdV + d(\mu N) - Nd\mu$$

ёки

$$d(F - \mu N) = -Sd\theta - PdV - Nd\mu. \quad (221)$$

Бунда

$$F - \mu N = F - \Phi = -PV. \quad (222)$$

(221) ва (222) дан:

$$-d(PV) = -Sd\theta - PdV - Nd\mu$$

ёки

$$N = V \left(\frac{\partial P}{\partial \mu} \right)_{\theta V} \quad (223)$$

4.28-масала. Термодинамик функция Φ ифодасидан фойдаланиб,

$$N = \nu \left(\frac{\partial P}{\partial \mu} \right)_T, \quad S = \nu \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\mu$$

тенгликларни исбот қилинг.

Е ч и ш. Гиббс-Дюгем муносабатини ёзамиз:

$$TdS = dU + PdV - \mu dN, \quad (1)$$

$$\mu N = \Phi = U + PV - sT. \quad (2)$$

(1) ва (2) лардан:

$$\begin{aligned} TdS &= dU + PdV + Nd\mu - d(N\mu) = \\ &= dU + PdV + Nd\mu - dU - PdV - VdP + TdS + SdT \end{aligned}$$

ёки

$$SdT + Nd\mu - VdP = 0. \quad (3)$$

(3) дан изланаётган ифодаларни оламиз.

4.12-§. ПАСТ ТЕМПЕРАТУРЛАРИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

1. Жоул-Томсон эффекти.

Яккаланган тизимни кўрайлик. Бундай тизимда ички энергия ўзгармайди. Газ молекулалари орасида ўзаро таъсир кучлари ва, демак, потенциал энергия мавжуд бўлса, газ кенгайишида молекулалар орасидаги масофа ўзгариши туфайли потенциал энергияси ўзгариши керак. Газ ташқаридан адиабатик ажратилгани учун бу энергия ўзгариши молекулаларнинг кинетик энергиялари ҳисобига бўлади. Бошқача айтганда, агар молекулаларнинг ўзаро таъсир потенциали мавжуд бўлса, газ кенгайганда унинг температураси ўзгариши зарур. Ана шу масалани ҳал қилиш учун 1852—1862 йилларда Жоул ва Томсон тажрибалар ўтказдилар. Бу тажрибаларда газнинг температураси ортиши, камайиши ва ҳатто маълум температурада газ кенгайганда унинг температураси ўзгармай қолиши ҳам мумкинлиги аниқлан-

ди. Бу ҳодисани *Жоул-Томсон эффекти* деб аталади. Бунда температура пасайиши (газ совуши) *музбат эффект*, температура кўтарилиши (газ қизиши) *манфий эффект* деб атала бошланди.

Фараз қилайлик, 4.4-расмда цилиндрдаги поршенлар остидаги газларнинг босимлари $P_1 > P_2$ бўлсин. Бу ҳолда, агар жўмрак очиқ бўлса, пахта қўйилгани сабабли газ секинлик билан кенгаяди. Ташқаридан адиабатик ажратилган бундай жараён учун термодинамиканинг биринчи қонуни

$$\Delta U + \Delta A = 0. \quad (224)$$

бўлади бунда:

$$\Delta U = U_2 - U_1, \quad (225)$$

1 моль газ чап томондан ўнг томонга ўтганда унинг бажарган иши қуйидагига тенг:

$$\Delta A_1 = 0 - P_1 V_1 = -P_1 V_1$$

Ўнг томондаги газнинг бажарган иши $\Delta A_2 = P_2 V_2 - 0 = P_2 V_2$. Умумий бажарилган иш:

$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 = P_2 V_2 - P_1 V_1. \quad (226)$$

(225) ва (226) ни (224) га қўямиз:

$$\begin{aligned} U_2 - U_1 + P_2 V_2 - P_1 V_1 &= \\ = U_2 + P_2 V_2 - (U_1 + P_1 V_1) &= H_2 - H_1 = 0. \end{aligned} \quad (227)$$

Бу ҳолда тизимнинг энтальпияси H доимий қолади, яъни $dH = 0$. Тизимнинг ҳолатини (P , T) га нисбатан аниқланган деб,


$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = 0 \quad (228)$$

тенгламадан

$$\chi = \left(\frac{dT}{dP} \right)_H = - \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P} = - \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T}{C_P} \quad (229)$$

нисбатни оламиз; $dP < 0$, $C_P > 0$ эканлигидан dT нинг ишораси $\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ га боғлиқ бўлади, яъни Жоул-Томсон эффек-

тини ифодаловчи коэф-
фициент χ нинг ишора-
си $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ нинг ишораси-
га боғлиқ. Гиббс-Дюгем
муносабати



4.4-расм.

$$TdS = dU + PdV$$

ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$TdS = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP - VdP. \quad (230)$$

Бунда dS тўлиқ дифференциал бўлгани учун

$$\frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right) \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial P} - V \right) \right]$$

тенглик бажарилади. Бундан

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = V(1 - T\alpha) \quad (231)$$

тенгликни топамиз. Демак, Жоул-Томсон эффекти учун

$$\chi = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V(T\alpha - 1)}{C_P} = \frac{TV(\alpha - \alpha_0)}{C_P} \quad (232)$$

нисбатни оламиз, бунда $\alpha_0 = 1/T$.

(232) ифодани таҳлил этайлик. 1. $\alpha = \alpha_0 = 1/T$ бўлса, яъни газ идеал бўлса, унинг ҳажми кенгайганда температу-
раси, кутилгандек, ўзгармайди, яъни эффект $\chi = 0$ бўлади.

2. $\alpha > \alpha_0$ шарт бажарилса, $dP < 0$ бўлганлиги учун $dT < 0$ бўлади, яъни бундай шарт бажарилгандаги кенгайишда газ совийди ($dT < 0$).

3. $\alpha < \alpha_0$ шарт бажарилганда газ кенгайганда у қизийди ($dT > 0$).

4. Юқоридагилардан куринадики, берилган босим P да

$$\alpha(P, T_i) = 1/T_i \quad (233)$$

тенглик қаноатлантириладиган температура T_i да газ кен-
гайганда $\chi = 0$ бўлади ва, демак, газнинг температураси

ди. Бу ҳодисани *Жоул-Томсон эффекти* деб аталади. Бунда температура пасайиши (газ совуши) *мусбат эффект*, температура кўтарилиши (газ қизиши) *маикий эффект* деб атала бошланди.

Фараз қилайлик, 4.4-расмда цилиндрдаги поршенлар остидаги газларнинг босимлари $P_1 > P_2$ бўлсин. Бу ҳолда, агар жўмрак очиқ бўлса, пахта қўйилгани сабабли газ секинлик билан кенгаяди. Ташқаридан адиабатик ажратилган бундай жараён учун термодинамиканинг биринчи қонуни

$$\Delta U + \Delta A = 0. \quad (224)$$

бўлади бунда:

$$\Delta U = U_2 - U_1, \quad (225)$$

1 моль газ чап томондан ўнг томонга ўтганда унинг бажарган иши қуйидагига тенг:

$$\Delta A_1 = 0 - P_1 V_1 = -P_1 V_1$$

Ўнг томондаги газнинг бажарган иши $\Delta A_2 = P_2 V_2 - 0 = P_2 V_2$. Умумий бажарилган иш:

$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 = P_2 V_2 - P_1 V_1. \quad (226)$$

(225) ва (226) ни (224) га қўямиз:

$$\begin{aligned} U_2 - U_1 + P_2 V_2 - P_1 V_1 &= \\ = U_2 + P_2 V_2 - (U_1 + P_1 V_1) &= H_2 - H_1 = 0. \end{aligned} \quad (227)$$

Бу ҳолда тизимнинг энтальпияси H доимий қолади, яъни $dH = 0$. Тизимнинг ҳолатини (P, T) га нисбатан аниқланган деб,


$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = 0 \quad (228)$$

тенгламадан

$$\chi = \left(\frac{dT}{dP} \right)_H = - \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P} = - \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T}{C_P} \quad (229)$$

нисбатни оламиз; $dP < 0$, $C_P > 0$ эканлигидан dT нинг ишораси $\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ га боғлиқ бўлади, яъни Жоул-Томсон эффек-

тини ифодаловчи коэф-
фициент χ нинг ишора-
си $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ нинг ишораси-
га боғлиқ. Гиббс-Дюгем
муносабати



4.4-расм.

$$TdS = dU + PdV$$

ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$TdS = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP - VdP. \quad (230)$$

Бунда dS тўлиқ дифференциал бўлгани учун

$$\frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right) \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial H}{\partial P} - V \right) \right]$$

тенглик бажарилади. Бундан

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = V(1 - T\alpha) \quad (231)$$

тенгликни топамиз. Демак, Жоул-Томсон эффекти учун

$$\chi = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V(T\alpha - 1)}{C_P} = \frac{TV(\alpha - \alpha_0)}{C_P} \quad (232)$$

нисбатни оламиз, бунда $\alpha_0 = 1/T$.

(232) ифодани таҳлил этайлик. 1. $\alpha = \alpha_0 = 1/T$ бўлса, яъни газ идеал бўлса, унинг ҳажми кенгайганда температу-
раси, кутилгандек, ўзгармайди, яъни эффект $\chi = 0$ бўлади.


2. $\alpha > \alpha_0$ шарт бажарилса, $dP < 0$ бўлганлиги учун $dT < 0$ бўлади, яъни бундай шарт бажарилгандаги кенгайишда газ совийди ($dT < 0$).

3. $\alpha < \alpha_0$ шарт бажарилганда газ кенгайганда у қизийди ($dT > 0$).

4. Юқоридагилардан куринадики, берилган босим P да

$$\alpha(P, T_1) = 1/T_1 \quad (233)$$

тенглик қаноатлантириладиган температура T_1 да газ кен-
гайганда $\chi = 0$ бўлади ва, демак, газнинг температураси



4.5-расм.

ўзгармайди. Бу T температура *инверсия температураси* дейилади.

5. (233) тенгламада босим P нинг ўзгариши билан инверсия температураси ўзгаради, (қ. 4.5-расм) инверсия чизиғи пайдо бўлишини тажриба курсатади. Бу инверсия чизиғидан босимнинг бир қийма-

тига инверсия температурасининг икки қиймати туғри келиши ва минимал ҳамда максимал инверсия температуралари мавжудлиги кўринади. Инверсия чизиғи мусбат Жоул-Томсон эффекти соҳасини (яъни газ кенгайганда совийдиган соҳани), манфий эффект соҳасидан (газ кенгайганда қизийдиган соҳадан) ажратиб туради.

Қуйидаги жадвалда бунга мисоллар келтирилган:

газ	r , атм	T_{max} , К	T_{min} , К
CO ₂	18—100	2050	249
Ar	50	723	125
ҳаво	150	553	140

Шундай қилиб, Жоул-Томсон эффекти ёрдамида паст температура олиш учун газнинг температураси T инверсия температураси T_{max} дан кичик, яъни $T < T_{min}$ бўлиши шарт.

Идеал газ ва Ван-дер-Ваальс гази учун инверсия температурасини аниқлайлик. Жоул-Томсон эффекти коэффициенти ифодаси бизга маълум:

$$\left(\frac{dT}{dP}\right)_H = \frac{V(T\alpha - 1)}{C_P}, \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (234)$$

1) Идеал газ учун ҳолат тенгламаси $PV = RT$ дан $\alpha = 1/T$ келиб чиқади. Демак, $(\partial T / \partial P)_H = 0$. Идеал газ кенгайганда унинг энергияси ва демак температураси ўзгармайди.

2) Умумий ҳолда $V(T, \alpha(T)) - 1 = 0$ дан T_i ни топиш лозим. Бу тенгликни

$$T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V = 0 \quad (235)$$

ёки

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right) = -1$$

дан

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V}{\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T} \quad (236)$$

эканлигини назарда тутиб, (235) ни

$$-T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (237)$$

кўринишга келтирамиз.

Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2},$$

Демак, бундан:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V-b}, \quad \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = - \frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}. \quad (238)$$

(238) ни (237) га қўйсақ:

$$- \frac{RT}{V-b} + \frac{RTV}{(V-b)^2} - \frac{2a}{V^2} = - \frac{2a}{V^2} + \frac{RTb}{V^2(1-b/V)^2} = 0$$

ёки

$$\frac{RbT_i}{(1-b/V)^2} = 2a, \quad T_i = \frac{2a}{Rb} \left(1 - \frac{b}{V} \right)^2,$$

Зичлик катта бўлмаганда $b/V \ll 1$ бўлади. Бу ҳолда

$$T_i = \frac{2a}{Rb}. \quad (239)$$

$T < T_i$ да газ совийди, $T > T_i$ да газ қизийди.

Изох. (239) дан кўринадики, инверсия температураси T_i итариш кучларини (молекула "ҳажм"ини) характерловчи b га тескари пропорционал ва тортишиш кучларини характерловчи тузатма a га тўғри пропорционал.

2. Газни адиабатик кенгайтириб паст температураларни олиш усули.

П.Л. Капица газни қайтувчан адиабатик жараён билан кенгайтириб паст температураларни олиш усулини ишлаб чиқди ва амалда уни кўрсатди.

Гиббс-Дюгем муносабатини қайтувчан адиабатик жараён учун қуйидагича ёзайлик:

$$TdS = dH - VdP = C_p dT + \left[\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T - V \right] dP = 0. \quad (240)$$

Бизга маълумки,

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - VT\alpha. \quad (241)$$

(241) дан фойдаланиб, (240) тенгликни қуйидагича ёзамиз:

$$\left(\frac{dT}{dP} \right)_S = \frac{VT\alpha}{C_p} > 0. \quad (242)$$

Бундан, $dP < 0$ бўлгани учун, газ қайтувчан адиабатик жараён билан кенгайганда ҳар доим совийди, яъни $dT < 0$ бўлади.

3. Парамагнитларни адиабатик магнитсизлантириш йўли билан паст температураларни олиш усули.

Суюқ водороднинг температураси $14^\circ K + 20^\circ K$ ни, суюқ гелий температура соҳаси $1^\circ K + 4,2^\circ K$ ни ташкил этади. Ҳозирги замонда мазкур гелий температурасини, одатда, **паст температуралар соҳаси** дейилади; $1^\circ K$ дан паст температурани эса **ўта паст температура соҳаси** дейилади.

Ўта паст температура қийматларини олиш учун 1926 йилда Дебай мутлақ янги услубни яратди, у магнито-калорик эффектдан фойдаланиб парамагнитларни адиабатик магнитсизлантириш орқали ўта паст температура олиш усулини тақлиф этди.

Магнито-калорик эффектни — жисмнинг температураси билан ундаги магнит майдони орасида боғланишни тушунтирайлик. Бунинг учун жисмнинг энтропияси S ни температураси T ва магнит майдони H га боғлиқ деб қарайлик, яъни $S(T, H)$ бўлсин. Магнит майдони H жисмдаги (пара-

магнитдаги) тартибсизликка таъсир этиб, унда тартибли-
ликни ҳосил қилмоқчи бўлгани учун H қанча катта бўлса
тартибсизлик даражасини кўрсатувчи энтропия S шунча
кичик бўлади (қ. 4.6-расм).


Температура камайиши билан, табиийки, $S(T, H)$ ҳам
камаяди. Парамагнит аввал T_1 температурада ва H_1 (ёки
 $H_1 = 0$) магнит майдонда $S_1(T, H)$ ҳолатда бўлсин. Парамаг-
нитдаги магнит майдонни изотермик қайтувчан жараён би-
лан H_2 қийматгача оширамиз (4.6-расм, AB чизиқ). Бу ҳолда
ташқи кучлар парамагнитда тартиблилик ҳосил қилиш учун
 dF га (эркин энергия ортишига) тенг иш бажаради. Бу ҳолатда
энтропия $S_2(T_1, H_2)$ қийматни қабул қилади. Бу ҳолда жисм
(парамагнит) томонидан термостатга берилган иссиқлик
миқдори

$$\Delta Q = T_1(S_1 - S_2) \quad (243)$$

ифода билан аниқланади. Энди қайтувчан адиабатик жара-
ён билан магнит майдонни камайитириб (парамагнитни маг-
нитсизлантириб) аввалги H_1 қийматга туширамиз. Бунда
парамагнит ҳолати энтропияси $S_2(T_2, H_1)$ дан иборат була-
ди. Бу жараён 4.6-расмда BC чизиқ билан берилган. Бу
адиабатик жараёнда температура T_1 дан T_2 гача пасаяди.
Адиабатик жараёнда $dQ = 0$ бўлгани учун биринчи қонун

$$\Delta U + \Delta A = 0 \quad (244)$$

кўринишда бўлади. Парамагнитда магнит майдон олинган-
да тартибли магнетиклар (ионлар) тартибсизликка келиши
учун уларнинг ўзаро таъсирларини енгилш учун иш бажара-
дилар. (244) дан кўринадики бу иш ички энергия ҳисобига,
яъни температуранинг па-
сайиши ҳисобига бўлади.
Демак, температура пасая-
ди. Яна шу температурада
парамагнитни изотермик
магнитлаб, сўнг уни адиа-
батик магнитсизлантириб,
температурани пасайитириш
мумкин. Бу усулни қайта-
қайта қўллаб, маълум чегар-
равий ўта паст температу-



4.6-расм.

рани олиш мумкин. (4.6-расмда пунктир чизиқ билан кўрсатилган). Бу чегара парамагнитни ташкил қилган магнетикларнинг ўзаро таъсир энергияси билан аниқланади. Бундай ўзаро таъсир энергияси жуда кичик бўлган тизимларда, масалан, электронлар спинлари ёки ядро спинлари ўзаро таъсири билан боғлиқ тизимларда температуранинг чегаравий қийматлари ўта паст бўлади. Демак, бу усул билан ана шу чегарадан пастга (уни хусусий абсолют температура деб атадик) тушиб бўлмади.

4.6-расмдан кўринадик, температура камайиши билан $S(T, H)$ ҳам камайиб боради ва H нинг барча қийматларида у маълум лимитга (уни нолга тенглаштирилади) интилади. Аввал $1^\circ K$ даги парамагнитни изотермик жараён билан магнитлаб, сўнг адиабатик жараён билан магнитсизлантириб ва бу усулни бир неча марта такрорлаб, ўта паст температурани олиш мумкин. Масалан, $0,001^\circ K$ ҳатто ундан ҳам паст температура қийматини олиш мумкин (қ. [13, 14]).

Ўта паст температурани олишдаги чегаравий қиймат парамагнитнинг магнитчалари орасидаги ўзаро таъсир потенциалига боғлиқлигини ва бу ўзаро таъсир потенциали қанча кичик бўлса, температура қийматининг чегараси шунча паст бўлишлигини шу ўринда яна бир бор такрорлаймиз. Паст температурани олишнинг бу усули қайтувчан адиабатик жараёнга асосланади. Бу ҳолда $S = S(T, H)$ ни ёзишимиз мумкин:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H dT + \left(\frac{\partial S}{\partial H} \right)_T dH = 0. \quad (245)$$

Бунда

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H = \frac{1}{T} \left(T \frac{\partial S}{\partial T} \right)_H = \frac{C_H}{T}. \quad (246)$$

Бизга маълумки Максвелл муносабати

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P.$$

Магнито-калорик ҳодисаларни қараш учун (P, V) жуфтдан (H, M) жуфтга ўтиш керак. Бунда (V, P) лардан бирининг ортишига иккинчисининг камайиши мос келади. (M, H) да эса бирининг ортишига иккинчисининг ортиши мос келади. Шунинг учун Максвелл муносабати

$$\left(\frac{\partial S}{\partial H}\right)_T = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H \quad (247)$$

қўринишда ёзилади. (246), (247) ни эътиборга олиб, (245) ни қайта ёзамиз:

$$\frac{C_H}{T} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H dH = 0, \quad (248)$$

бунда H — магнит майдон кучланганлиги, M — магнитланиш вектори. Бундан

$$\left(\frac{dT}{dH}\right)_S = -\frac{T\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H}{C_H}. \quad (249)$$

Магнито-калорик эффект $(\partial M / \partial T)_H$ ҳосилага боғлиқ. Парамагнит учун

$$M = \chi H. \quad (250)$$

Кюри қонуни

$$\chi = \frac{C}{T}, \quad (251)$$

бунда C — доимийдир. (250) ва (251) ифодалар асосида ушбуни оламиз:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H = -\frac{CH}{T^2}. \quad (252)$$

Паст температураларда қаттиқ jismlar иссиқлик сиғими учун Дебай қонуни

$$C_H = AT^3 \quad (253)$$

ифода билан аниқланади. A — доимий миқдор. (252) ва (253) ни (249) га қўйиб, магнито-калорик эффект учун ушбу тенгликни топамиз:

$$\left(\frac{dT}{dH}\right)_S = \frac{CH}{AT^4} = \frac{B}{T^4} H > 0, \quad (254)$$

бунда $B = C/A$. Адиабатик магнитсизлантирилганда, яъни $dH < 0$ бўлганда, (254) дан кўринадики, температуранинг

камайтиши $dT < 0$, яъни температуранинг $1/T$ қонун бўйича пасайиши содир бўлади.

1-и з о ҳ. "Магнетиклар" нинг ўзаро таъсир потенциали (энергияси) билан аниқланадиган температуранинг энг паст чегаравий қиймати T_0 ни тажрибада олиш мумкин. Аммо $T = 0$ қийматни олиш мумкин эмаслиги мантиқан келиб чиқади. (Бу ҳулоса $T = 0$ температурани олиб бўлмаслик ҳақидаги термодинамиканинг III қонунидир).

2-и з о ҳ. Биринчи изоҳ ҳулосасидан аёнки, 4.6 расмда H_1 ва H_2 бўлгандаги эгри чизиқлар, адабиётда айтилгандай $T = 0$ да эмас, $T = T_0 \neq 0$ да ўзаро кесишади.

4.13-§. ЛЕ ШАТЕЛЬЕ-БРАУН ТАМОЙИЛИ


1. Ле-Шателье тамойили. Мувозанатдаги тизимга X таъсир кўрсатилаётган бўлса, тизимнинг тўғри реакцияси (жавоби) шу таъсирни камайтиришга қаратилган бўлади (Анри Луи Ле-Шателье (1850—1936 й.) француз олими).

М и с о л. T температурали 1- ва 2-тизимлар мувозанатда булсин (қ. 4.7-расм). Фараз қилайлик, 1-тизимга иссиқлик бериш (X таъсир) билан 1- ва 2-тизимлар орасида мувозанат бузилади. Бу ҳолда иссиқлик 1-тизимдан 2-тизимга ўта бошлайди (тизим реакцияси x). Тизимнинг бу реакцияси температуралар фарқини камайтиришга олиб келади. Ле-Шателье тамойили тизимнинг ўз температурасининг ортишига қарши реакциясига асосланган. Бунда иссиқлик оқими сабабли 1-тизимнинг энтропияси камаяди:

$$T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = C_V > 0,$$

бундан


$$\Delta T = \frac{T \Delta S}{C_V} = \frac{\Delta Q}{C_V} < 0, \quad \Delta Q < 0, \quad \Delta S < 0.$$



4.7-расм.

2. Ле Шателье-Браун тамойили. Агар мувозанатдаги тизимга X таъсир бўлаётган бўлса, бу таъсирга тизимнинг билвосита реакцияси у шу таъсир X ни камайтиришга қаратилган бўлади.

Мисол. Модда иссиқлик ўтказадиган цилиндр ичига жойлаштирилган бўлиб, (қ. 4.8-рasm), у мувозанатда бўлсин. Мувозанат ҳолатда ички ва ташқи босимлар бир-бирига миқдор жиҳатидан тенг бўлади; поршень ҳаракатсиз бўлади. Моддага ΔQ иссиқлик берилсин (X таъсир курсатилсин). У ҳолда мувозанат бузилади; модданинг температураси T ортади. Бу модданинг туғри реакцияси. Бундан ташқари поршень остидаги модданинг босими, ҳажми ортиши мумкин. Бу — тизимнинг билвосита реакцияси (жавоби). Бунда поршень силжиши мумкин. Бу ҳолда, аёнки,



4.8-рasm.

$$(\Delta T)_v > (\Delta T)_p.$$

Шундай қилиб, ҳажм ўзгармас бўлгандаги температура ўзгариши $(\Delta T)_v$ босим ўзгармас бўлгандаги $(\Delta T)_p$ дан (яъни поршень ўзгарадиган ҳолдагидан) катта. Бу иккинчи ҳолда поршеннинг ҳаракати тизимнинг билвосита реакцияси X таъсирни камайтиришга қаратилган.

4.14-§. НЕРНСТ ТЕОРЕМАСИ. ТЕРМОДИНАМИКАНИНГ УЧИНЧИ ҚОНУНИ

Бизга маълумки иссиқлик сифими

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v > 0. \quad (255)$$

C_v нинг ҳар доим мусбатлигидан температуранинг ўзгариши билан ички энергиянинг монотон ўзгариши келиб чиқади.

Агар тизимнинг температураси нолга интилса, у имконияти бўлган энг кичик энергия E_0 га эга ҳолатда бўлади.

Иккинчи томондан, мувозанат ҳолатда микроҳолатлар эҳтимолликлари тақсимооти функцияси

$$f_{B_v}(E) = \frac{P^v}{T(v)} (E - E_0)^{v-1} e^{-\beta(E - E_0)}$$

билан аниқланади. $\theta = (1 / \beta) \rightarrow 0$ булганда бу функция $f_{\beta}(E)$ Диракнинг дельта-функциясига ўтиши бизга маълум, яъни

$$f_{\beta}(E) = \delta(E - E_0). \quad (256)$$

Бундан энг кичик энергияли микроскопик ҳолат ягона-дир деган маъно чиқади. Гайзенберг ноаниқлик доирасидаги энергия қийматларига мос келадиган динамик ҳолатларни квант механикаси нуқтаи назаридан ҳам кузатиш мумкин эмас. Шу сабабли кузатиш мумкин булмаган у ҳолатлар, амалда статистик физикада ягона ҳолат деб қаралиши мумкин.

Яккаланган тизимда энергия E таърифга кура, ягона қиймат E_0 ни қабул қилади; унинг тақсимот функцияси — микроканоник тақсимот, яъни Диракнинг дельта-функцияси $\delta(E - E_0)$ дан иборатдир. Аммо E_0 энергияли яккаланган тизимдаги зарраларнинг ҳаракати туфайли микроҳолатлар сони N , чегараланган булса-да, жуда куп булади.

Шу сабабли энг кичик энергияли тизимнинг микроҳолатлари яккаланган тизимнинг микроҳолатларидан тубдан фарқли.

Ҳақиқатан, бу қаралаётган ҳолда энергия температура-нинг камайиши билан квант флуктуацион фонгача камайиб боради. Масалан, қаттиқ жисмнинг осциллятор моделида ҳар бир осцилляторнинг энергияси $\hbar\omega / 2$ гача камайиб боради. Иккинчи томондан, энергиянинг қийматини аниқлашдаги ноаниқлик Гейзенберг ноаниқлик муносабатига кура $\hbar\omega / 2$ тартибида.

Демак, энергия қийматининг ўзи ноаниқлик соҳаси $\hbar\omega / 2$ да ётади. Ҳозирги замон физикаси тасаввурига асосан битта макроҳолатга амалда битта микроҳолат мос келади.

Бундай ҳолда статистик йиғинди

$$Z = \sum e^{-\beta E_i} = e^{-\beta E} = e^{-\nu}. \quad (257)$$

Бу ҳолда энтропия тенгламасидан

$$S = \nu + \ln Z = 0 \quad (258)$$

эканлиги келиб чиқади. Демак, куйидаги теорема уринли:

$$\theta \rightarrow 0 \text{ да } S \rightarrow 0 \text{ булади.} \quad (259)$$

Бу теоремани *Нернстнинг кенгайтирилган* (ёки *умумлашган*) *теоремаси* деб атаймиз.

Тажриба натижалари шуни курсатдики (W. Nernst — В. Нернст, 1906 й.) бир жинсли тизимнинг температураси T нолга интилганда унинг энтропияси босимга, зичликка ёки фазага боғлиқ булмаган лимит (доимий қиймат)га интилади. М. Планк (1911 й.) бу доимий S_0 қийматни нолга тенг, яъни

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = S_0 = 0 \quad (260)$$

деб қабул қилишни таклиф этди.

(260) ифодани *Нернст* (ёки *Нернст-Планк*) *теоремаси* дейилади. Тажрибалар натижаси булган бу (260) ифола термодинамиканинг биринчи ва иккинчи қонунлари билан биргаликда термодинамиканинг асосини ташкил этади ва уни *термодинамиканинг учинчи қонуни* деб аталади.

Статистик физика нуқтан назаридан термодинамиканинг учинчи қонуни тизимни ташкил этган зарраларнинг бири-бирига нисбатан (кузатиладиган) ҳаракатларининг тўхтаганини ифодалайди (асосий ҳолатдаги зарра ҳаракати статистик физикада қаралмайди!), яъни бу ҳолда ягона динамик микроҳолат ва, демак, ягона статистик микроҳолатга эга булилади. Бундай воқеа муқаррар воқеа бўлиб, унинг эҳтимоллиги бирга тенгдир (термодинамик эҳтимоллик ҳам бирга тенг). Бундай ҳолдаги тизимнинг энтропияси нолга тенг булади (яъни бунда $W_i = 1$, $S_i = 0$, $S = 0$). Нернстнинг умумий теоремаси (259) дан $\theta_0 = kT$ булганда, Нернст теоремасининг ифодаси келиб чиқади.

Энергия $\theta = U/v$ идеал θ_0 (кинетик энергияга боғлиқ) ва потенциал θ_n (потенциал энергияга боғлиқ) қисмлардан иборат, яъни

$$\theta = \theta_0 + \theta_n.$$

Фараз қилайлик, $\theta_n < 0$ булсин. Бу ҳолда $\theta = \theta_0 - |\theta_n|$ Нернстнинг умумий теоремасига асосан, $\theta = \theta_0 - |\theta_n| \rightarrow 0$ булганда, $S \rightarrow 0$ булиши учун

$$\theta_0 \rightarrow |\theta_n| \quad (261)$$

булиши зарур. Агар $|\theta_n| = kT_0$ деб олсак, (261) ни

$$T \rightarrow T_0 \quad (262)$$

қўринишда ёзамиз. Демак, ҳар бир модда ўзининг хусусий потенциалга эга эканлигига эътиборни қаратсак, ҳар бир модда учун ўзининг хусусий абсолют температураси T_0 мавжуд эканлиги келиб чиқади.

Бу тасаввурга қўра, ҳар бир модда ўзининг энг паст (чегаравий) температурасига эга. Унинг температурасини амалда шу T_0 температурагача тушириш мумкин. (261) ифодадан куринадики, идеал тизим учун $|\theta_n| = 0$ бўлганлигидан унинг абсолют паст температураси $T_0 = 0$ бўлади.

Термодинамиканинг учинчи қонунидан, хусусан иссиқлик сифими, термик коэффициентлар (иссиқликдан кенгайиш α , босимнинг термик коэффициенти β) ва бошқа шу каби катталиклар температура $T \rightarrow T_0$ бўлганда (хусусан, $T_0 = 0$ да) нолга интилади.

4.29-масала. Температура T нолга интилганда иссиқлик сифими C_x нолга интилиши, яъни

$$\lim_{T \rightarrow 0(T_0)} C_x = 0 \quad (1)$$

эканлигини кўрсатинг.

Е ч и ш. Таърифга асосан, иссиқлик сифими C_x учун

$$C_x = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_x = T \left(\frac{dS}{dT} \right)_x \quad (2)$$

ифода уринли. Термодинамиканинг учинчи қонунига асосан:

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow 0(T_0)} S &= \lim \frac{TS}{T} = \lim \frac{[\partial(TS)/\partial T]_x}{[\partial T/\partial T]_x} = \lim \left[T \left(\frac{dS}{dT} \right)_x + S \right] = \\ &= \lim [C_x + S] = \lim S + \lim C_x = 0. \end{aligned} \quad (3)$$

(3) дан, учинчи қонунга қўра

$$\lim C_x = 0 \quad (4)$$

эканлиги кўрсатилади.

4.30-масала. Термик коэффициентлар:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad \beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (1)$$

термодинамиканинг учинчи қонунига асосан $T \rightarrow 0$ да нолга интилишини кўрсатинг.

Ечиш.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \quad (2)$$

Максвелл муносабатлари бизга маълум. Учинчи қонунга асосан $T \rightarrow 0$ бўлганда тизимнинг энтропияси S босим P га, зичлик $\rho = 1/V$ га боғлиқ бўлмаган ҳолда доимийликка (доимий катталиikka) интилади, демак $\Delta S \rightarrow 0$ бўлади. Буни эътиборга олинса, (2) да

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = 0, \quad \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (3)$$

(2) ва (3) га асосан,

$$\lim_{T \rightarrow 0} \alpha = 0, \quad \lim_{T \rightarrow 0} \beta = 0. \quad (4)$$

Изоҳ. Иссиқлик сифими C учун


$$\theta dS = dQ = CdT$$

муносабатдан Нернстнинг умумий теоремасига асосан

$$S = \int_{T_0}^T \frac{C}{\theta} dT$$

ифодани оламиз. Бунда $T \rightarrow T_0$ бўлганда $S \rightarrow 0$ бўлганлиги учун, албатта, $T \rightarrow T_0$ бўлганда $C \rightarrow 0$ бўлиши шарт, акс ҳолда интеграл остидаги ифода (C/θ) чексиз катта бўларди.

Қаттиқ жисмнинг иссиқлик сифими C нинг температурага боғланиши характери 4.9-расмда схематик кўрсатилган, бу ерда $C(T)$ чизиқнинг Дюлонг-Пти қонунидан оғиш



4.9-расм.

характери ва унинг чегараси T_0 модданинг "қаттиқлик", "мўртлик" каби хоссаларини характерлайди. Агар фонларнинг ўзаро таъсири эътиборга олинса, умуман, Дебай қонуни

$$C = A(T - T_0)^3$$

кўринишда бўлиши лозим. Бу ерда келтирилган асосга кўра, электронлар тизими учун потенциал энергия (спин ўзаро таъсир бундан мустасно) итаришиш характерига эга бўлгани сабабли $U_n > 0$. Бу ҳолда

$$\theta = \theta_0 + \theta_n$$

ифодадан $\theta \rightarrow 0$ бўлганда $\theta_0 < 0$ эканлиги келиб чиқади. Демак, $T = 0$ да электронлар тизимининг иссиқлик сифими C нолга тенг эмас (4.9-расм).

$T = 0$ даги $C = a$ электронлар ўзаро итаришиш кучи билан боғлиқ. Назариянинг бу хулосасини тажрибада текшириш мумкин.

Бизнингча, қаттиқ жисм иссиқлик сифимининг Дюлонг-Пти қонунидан четланишига ҳамда эгри чизиқ характерига қараб, унинг қаттиқлик қайишқоқлик ва бошқа хоссалари ҳақида маълумот олиш мумкин. Унинг хусусий абсолют температураси T_0 ни аниқлаш потенциал энергия ҳақида маълумот беради.

4.31-масала. Характеристик функциядан фойдаланиб, гамма-тақсимот $f_{\beta\nu}(E)$ нинг $\theta \rightarrow 0$ бўлганда дельта-функцияга утишини исботланг.

Е ч и ш. Характеристик функция $\varphi(\xi)$ таърифга кўра қуйидагича аниқланади:

$$\varphi_{\beta\nu}(\xi) = \int_0^{\infty} e^{i\xi E} f_{\beta\nu}(E) dE, \quad (1)$$

бунда

$$f_{\beta\nu}(E) = \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} E^{\nu-1} e^{-\beta E}.$$

Демак,

$$\varphi_{\beta\nu}(\xi) = \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty e^{i\xi E - \beta E} E^{\nu-1} dE.$$

Узгарувчини қуйидагича алмаштирайлик:

$$E(\beta - i\xi) = y.$$

Бунда интеграл қуйидаги кўринишга келади:

$$\varphi_{\beta\nu}(\xi) = \frac{\beta^\nu}{(\beta - i\xi)^\nu} \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty e^{-y} y^{\nu-1} dy$$

ёки бундан:

$$\varphi_{\beta\nu}(\xi) = \frac{\beta^\nu}{(\beta - i\xi)^\nu} = \frac{1}{(1 - i\xi / \beta)^\nu} = \frac{1}{(1 - i\xi 0)^\nu}. \quad (2)$$

Бунда эса:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \varphi_{\beta\nu}(\xi) = 1, \quad \beta = 1 / \theta. \quad (3)$$

Демак, характеристик функция таърифи (1) га асосан

$$I = \int_0^\infty e^{i\xi E} f_{\beta\nu}(E) dE,$$

тизим ҳолати ягона $E = 0$ қийматли (ёки асосий $E = E_0$ қийматли) ҳолатда бўлади. Демак, тақсимот функцияси

$$F(E) = \int_0^E f_{\beta\nu}(E) dE$$

битта нуқтага тўпланган. Шундай қилиб, гамма-зичлик дельта-функцияга ўтади (қ. Феллер [15] 573-бет), бошқача айтганда, (1) даги гамма-тақсимот дельта-функциядан иборат бўлади:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} f_{\beta\nu}(E) = \delta(E).$$

1-изоҳ. $\beta \rightarrow \infty$ (ёки $\theta \rightarrow 0$) бўлганда статистик интеграл (йиғинди) Z нинг

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (4)$$

ифодаси. ҳолат битта бўлганлиги учун

$$Z = e^{-\nu}$$

қуринишга келади. Энтропия тенгламаси

$$S = \nu + \ln Z$$

асосида

$$S = 0$$

келиб чиқади. Бу натижани, яъни Нернстинг умумий теоремасини юқорида кўрдик.

2-и з о ҳ. Идеал газ учун $\beta \rightarrow \infty$ бўлганда

$$\frac{1}{Z} = \frac{h^3 \beta^3 g}{\Lambda^3 (\nu + 1)} \quad (5)$$

ифодадан

$$Z \rightarrow 0$$

эканлиги ва, демак, $S = \nu + \ln Z$ асосида

$$S \rightarrow -\infty \quad (\nu < \infty) \quad (6)$$

келиб чиқади. Худди шунингдек, идеал газ энтропияси

$$S_r = kS = C \ln T + \ln V + kS_0 \quad (7)$$

ифодасидан ҳам $T \rightarrow 0$ бўлганда (6) ифода келиб чиқади.

Биринчидан, тартибсизлик даражасини аниқловчи статистик катталиқ S манфий бўлиши, бизнингча, маънога эга эмас. Чунки тартибсизлик даражаси нолга тенг бўлиши, бу тўла тартиблилик демакдир.

Иккинчидан, умумий ифодалар (4) ва (5) бу $\beta \rightarrow \infty$ чегаравий ҳолда бир-биридан фарқ қиладилар. Чегаравий ҳолда бундай бир-бирига мос келмаслик таажжубланарлидир.

(7) ифодадан $T \rightarrow 0$ да $S \rightarrow -\infty$ эканлиги келиб чиққанлиги сабабли адабиётда энтропия ифодаси (7) учун Нернст теоремаси ўринсиз дейилади. Идеал газ учун бу чегаравий ҳолда олинган зиддиятни қуйидагича тушунтирилади: паст температурада газларда айниш, жумладан суюқлик ва қат-

тиқ агрегат ҳолатларга ўтиш юз беради. Бундай ҳолатлар учун идеал газ энтропияси ифодасининг (7) куруниши уринсиз бўлади. (Масалан, қ. [14] 194-бет).

Аслида масалани чуқурроқ қаралса, термодинамик усул билан Нернст теоремаси орасида тафовут бўлмаслиги ишонч ҳосил қилиш мумкин ва, демак, адабиётдаги қўшимча тушунтиришларга ҳам эҳтиёж бўлмаслиги мумкин.

Ҳақиқатан ҳам, $\beta \rightarrow \infty$ ёки $\theta \rightarrow 0$ ёхуд $U \rightarrow 0$ (идеал газ учун $T \rightarrow 0$) бўлиши, энергия қийматининг узлуксиз ўзгаради дейилишига олиб келади. Бу эса физикадаги умумий тамойил $h \rightarrow 0$ бўлгандаги лимитини аниқлаш лозим бўлади:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} \frac{1}{Z} = \frac{h^3 \beta^v g}{A \Gamma(v+1)}. \quad (8)$$

Бу ноаниқликни топиш учун (4) ва (5) ларни эквивалент деб қараб, (4) ни $\beta \rightarrow \infty$ бўлгандаги лимитига тенглаштириш мақсадга мувофиқдир. Бу ҳолда:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} \frac{1}{Z} = \frac{h^3 \beta^v g}{A \Gamma(v+1)} = e^v, \quad (9)$$

Бундай чегаравий ҳолда

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} h^3 \beta^v g = A \Gamma(v+1) e^v \quad (10)$$

N та заррадан иборат идеал газ учун

$$s = 3N, \quad v = 3N/2, \quad g = N^v.$$

Буларни эътиборга олсак, (10) дан:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} h^3 \beta = \frac{2\pi e m}{n^{2/3}} \quad (11)$$

ёки $\beta = 1/kT_0$ эканлигидан, бу чегаравий ҳолда:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty, h \rightarrow 0} (T_0 / h^2) = \frac{1}{2\pi e k} \frac{n^{2/3}}{m} \quad (12)$$

Бу (12) шарт бажарилганда, Сакур-Тетрод тенгламаси (144) дан ҳам Нернст теоремаси келиб чиқади. Одатдаги

умумий фикр: идеал газ учун Нернст теоремаси ёки термодинамиканинг учинчи қонуни бажарилмайди, дейишга ўрин қолмайди. Аксинча, бизнинг қарашимизда, идеал тизим учун, яъни $\theta_0 = 0$ учун Нернст теоремасининг ҳозирги замон таърифи тула бажарилади. Термодинамика усули билан олинган (7) ни идеал газ учун Сакур-Тетрод тенгламаси (144) билан солиштириб,

$$S_0 = \ln \left[\left(\frac{1}{N} \frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{2/3} \right]^N$$

эканлигини қўрамиз; бунда e — натурал логариф асоси. Буни ҳисобга олсак, (7) да Гиббс парадокси ҳам пайдо бўлмайди. Умумий ҳолда эса, бизнингча, Нернст умумий теоремаси уринли бўлади.

4.32-масала. Термодинамик усул билан олинган энтропия

$$S = C \ln T + R \ln V + S_0 \quad (1)$$

ифодаси билан Сакур-Тетрод тенгламаси

$$S = \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \ln \left[\frac{1}{n^{2/3}} \left(\frac{2\pi mk T}{h^2} \right) \right] \quad (2)$$

ни солиштириб, S_0 ифодасини топинг.

Е ч и ш. $S_r = kS$ эканлигини эътиборга оламиз. Идеал газ учун $C_v = 3Nk/2$, $R = Nk$, kS_0 эканлигидан:

$$S = \frac{3N}{2} \ln T + N \ln V + S_0. \quad (3)$$

(2) ни ёзамиз:

$$S = \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \ln T + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right) - \ln N^N.$$

Бу ифодани (3) га тенглаштирсак:

$$\begin{aligned} S_0 &= \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right) - \ln N^N = \\ &= \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{2\pi mke}{h^2} \right) - \ln N^N = \ln \left[\frac{1}{N} \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right)^{3/2} \right]^N, \end{aligned}$$

$$S_0 = \ln \left[\frac{1}{N} \left(\frac{2\pi emk}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (4)$$

Изоҳ. Битта заррага тўғри келган $s_0 = S_0/N$ ни топайлик:

$$s_0 = \ln \left[\frac{1}{N} \left(\frac{2\pi emk}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (5)$$

Шундай қилиб, интеграл доимийси S_0 зарралар сони N нинг ҳамда зарра массаси m нинг функцияси экан.

V БОБ

ФАЗАЛАР МУВОЗАНАТИ ВА ФАЗАВИЙ ЎТИШЛАР

5.1-§. ТЕРМОДИНАМИК МУВОЗАНАТ ШАРТЛАРИ

Термодинамиканинг иккинчи қонунига асосан ҳар қандай тизим мувозанат ҳолатга келади. Бу мувозанат ҳолатда уни характерлайдиган термодинамик потенциал (функция), масалан $J(x)$ экстремумга эришади, яъни мувозанат ҳолатда $J(x)$ нинг биринчи тартибли ҳосиласи нолга тенг бўлади:

$$\left(\frac{\partial J(x)}{\partial x} \right)_0 = 0, \quad (1)$$

Параметр x нинг мувозанатдаги қийматида (масалан, $x = x_0$ да) $J(x)$ функция максимум бўлиши учун $J(x)$ нинг иккинчи тартибли ҳосиласи манфий ишорали, яъни

$$\left(\frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} < 0, \quad (2)$$

бўлиши зарур, минимумга эга бўлиши учун эса мусбат ишорали бўлиши керак:

$$\left(\frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} > 0, \quad (3)$$

Термодинамик тасаввурга кўра, тизимга ташқи таъсир бўлмаса, у узоқ вақт шу мувозанат ҳолатда бўлади, яъни термодинамик мувозанат ҳолат барқарордир. Ҳолатнинг бу барқарорлик мезони (критерияси) термодинамик потенциалнинг экстремумга эришганлигидир. Тизимнинг термодинамик потенциали J , босим P , ҳажм V , температура T ва зарралар сони N га нисбатан аниқланган, яъни $J(P, V, T, N)$ бўлсин. Қуйидаги бир неча ҳолни кўрайлик.

1. Тизим яккаланган бўлсин; таърифга кўра

$$dE = 0, dN = 0, \quad (4)$$

бу ҳолда, таъриф бўйича, ички энергия ўзгармайди, яъни $dU = 0$.

Бизга

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \quad (5)$$

экани маълум. Тизимнинг ҳажми ўз-ўзидан кенгайиши мумкин. Бу ҳолда $dS > 0$ бўлади ва, демак, S максимумга интилади. Агар ҳажм V доимий бўлса, бундай тизим барқарор мувозанатда бўлиши учун

$$dS = 0, \quad (6)$$

$$\left(\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}\right) < 0 \quad (7)$$

бўлиши талаб этилади.

2. Тизим учун доимий температура T , доимий ҳажм V ва доимий зарралар сони N бўлсин. Бу ҳолда бизга маълумки,

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \quad (8)$$

Бу берк тизимда энергия ўзгариши мумкин, зарралар сони N ўзгармайди, ҳажм V ҳам ўзгармайди. Тизимда жараёнлар ўз-ўзидан бораётган бўлса, бу ҳолда температура (ёки ҳажм) ортиши мумкин, бу ҳолда $dF < 0$ эканлиги талаб этилади. Мувозанат ҳолатда бундай берк тизимда $dT = 0$, $dV = 0$, $dN = 0$ бўлгани учун F минимум қиймат қабул қилади, яъни $dF = 0$,

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right)_{x=x_0} > 0. \quad (9)$$

3. Тизим P , T , N ларга нисбатан аниқланган бўлса, бизга маълумки,

$$d\Phi = -SdT - VdP + \mu dN. \quad (10)$$

Тизимда жараён ўз-ўзидан кечаётган бўлса, $\Phi = F + PV$ дан F минимумга интилишидан Φ ҳам минимумга интилиши келиб чиқади, яъни

$$d\Phi < 0. \quad (11)$$

Мувозанат ҳолатда $dT = 0$, $dP = 0$, $dN = 0$ булганидан

$$d\Phi = 0, \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right)_{T=P,N} > 0 \quad (12)$$

бўлади, яъни термодинамик потенциал минимум қиймат қабул қилади. Тизимнинг термодинамик функциясининг, масалан, энтропиясининг бир неча максимумлари мавжуд бўлиши мумкин. Тизимнинг энг катта максимумга туғри келган ҳолати стабиль (абсолют турғун), мувозанатли ҳолат нисбатан кичик қийматли максимумларга туғри келган ҳолатларни эса метастабиль ҳолатлар дейилади. Тизим метастабиль ҳолатда бўлса, флуктуациялар туфайли метастабиль ҳолатлардан чиқиб абсолют стабиль ҳолатга — термодинамик мувозанат ҳолатга келиши мумкин. Аммо баъзан тизимнинг метастабиль ҳолатидан узининг асосий термодинамик мувозанат ҳолатига келиши учун шунчалик катта вақт кетадики (яъни флуктуация туфайли утиши эҳтимоли шунчалик кичик бўладики) бу метастабиль ҳолатни стабиль (термодинамик мувозанатдаги ҳолат) деб ҳисобланиши амалий жиҳатдан мумкин бўлади. Масалан, одатдаги шиша метастабиль (аморф) ҳолатда бўлади, у асосий термодинамик мувозанат ҳолатига утиб кристалланиши учун жуда кўп йиллар керак бўлади. Фараз қилайлик, тизим T , P , U , S , V параметрли (қийматли) мувозанат ҳолатдан унга жуда яқин ҳолатга P , T доимий бўлганда қайтмас жараён билан ўтсин. Бу мувозанат ҳолатга келганда U_1 , S_1 , V_1 қийматлар қабул қилган бўлсин. Бу ҳолда, термодинамиканинг II қонунига мувофиқ, тизимнинг термодинамик потенциали Φ камаяди, яъни:

$$\Delta\Phi = U - U_1 - T(S - S_1) + P(V - V_1) < 0. \quad (13)$$

Фараз қилайлик, тизим P_1, T_1, U_1, S_1, V_1 мувозанат ҳолатдан P_1, T_1 доимий бўлганда қайтмас жараён билан P_1, T_1, U, S, V мувозанат ҳолатга ўтсин. Бу ҳолда ҳам термодинамик потенциал Φ камаяди, яъни:

$$\Delta\Phi = U_1 - U - T_1(S_1 - S) + P_1(V_1 - V) < 0. \quad (14)$$

(13) ва (14) ларни қўшиб, $(S_1 - S)(T - T_1) + (P_1 - P)(V_1 - V) < 0$ ёки

$$(S_1 - S)(T_1 - T) - (P_1 - P)(V_1 - V) > 0 \quad (15)$$

тенгсизликни оламиз. Икки мувозанат ҳолатининг параметрлари қийматларининг фарқини ифодаловчи тенгсизлик (15) ни

$$\Delta S \Delta T - \Delta P \Delta V > 0 \quad (16)$$

кўринишда ёзайлик. (15) ёки (16) муносабат тизим мувозанати барқарорлигининг етарли шартидир.

Бир мувозанат ҳолатдан иккинчи мувозанат ҳолатга ҳар хил ўтишларда турғунликнинг муайян критерийларини (шартларини) аниқлаш мумкин. Масалан, тизим изохорик жараён билан ўтса, (16) дан

$$\Delta S_v \Delta T > 0 \quad (17)$$

шарт келиб чиқади. Бунда $\Delta S_v > 0$ эканлигидан $\Delta T > 0$ эканлиги келиб чиқади.

$$\Delta S_v = \frac{1}{T} C_v \Delta T > 0$$

ифодадан

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v > 0 \quad (18)$$

шарт бажарилиши келиб чиқади, яъни бундай ҳолда тизим ҳолатининг барқарорлик шarti (18) дан иборатдир.

Агар тизим бир мувозанат ҳолатдан иккинчи мувозанат ҳолатга изотермик жараён билан ўтган бўлса (яъни $\Delta T = 0$ бўлса) (16) дан мувозанатнинг барқарорлиги учун

$$- \Delta P_v \Delta V > 0 \quad (19)$$

шарт келиб чиқади. Ҳолатлар бир-бирига жуда яқин бўлганда

$$dP_T = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \Delta V$$

ифодадан фойдаланиб, (16) ни ёзамиз:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T (\Delta V)^2 > 0.$$

Бунда $(\Delta V)^2 > 0$ бўлганлиги учун мувозанатнинг барқарор бўлиши



$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T < 0 \quad (20)$$

шарт бажарилишини талаб этади.

5.2-§. ГОМОГЕН ТИЗИМИНИНГ МУВОЗАНАТ ШАРТИ

Аввал фаза ва компонент тушунчалари билан танишайлик.

1. Компонент тушунчаси. Тизим n хил молекуладан ташкил топган бўлсин. Агар молекулалар орасида кимёвий реакциялар бўлмаса, бундай тизимни n компонентли дейиладди, яъни хиллар сонига компонентлар сони тенг бўлади. Агар тизимни ташкил этган ҳар хил молекулалар орасида кимёвий реакциялар, масалан, m та реакция мавжуд бўлса, компонентлар сони хиллар сонидан m тача кам бўлади. Масалан,



Бунда сув H_2O ва O_2 лардан ташкил топганига қарамай битта компонент. Агар тизим H_2 , O_2 ва H_2O аралашмадан иборат деб қаралса, хиллар сони 3 та, реакция битта деб қаралса (масалан, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$), унда 2 та компонентли тизим (H_2O ва O_2 ёки H_2) ҳосил бўлади. Бошқа реакцияларга нисбатан ҳам шундай фикр айтилади. Компонент тизимнинг шундай қисмики, унинг миқдори бошқа компонентлар миқдорининг узгаришига боғлиқ бўлмайди. Масалан, 1 кг сув ва 1 кг спиртдан ташкил топган тизимнинг сув компонентининг миқдори ҳар қанча узгартирилмасин, шу тизимда 1 кг спирт миқдори узгармайди (реакция мавжуд эмас деб қаралади).

Тизим n та компонентдан ташкил топган бўлиб, k компонентнинг массаси m^k га тенг бўлсин. Бу ҳолда

$$C^{(k)} = m^{(k)} / M \quad (21)$$

k компонентнинг концентрацияси бўлади; M — тизимнинг массаси; $k = 1, 2, \dots, n$ эркин концентрациялар сони компонентлар сонидан битта кам бўлади, яъни $n - 1$ га тенг бўлади.

2. Фаза тушунчаси. Физик хоссалари ҳамма нуқталарда бир хил бўлган тизим *гомоген тизим* дейилади; бир нечта гомоген тизимдан ташкил топган тизим *гетероген тизим* дейилади. Физик бир жинсли жисмни *фаза* дейилади. Гетероген тизим икки ва ундан кўп фазадан ташкил топган бўлиши мумкин.

Мисол. Сув ва спирт тула аралашиб бир жинсли муҳит ҳосил қилган бўлса, уни *бир фазали тизим* дейилади, бир нечта компонентдан иборат газ аралашма ҳам бир фазали бўлиши мумкин; тизим сув ва муздан иборат бўлса, бундай тизимни *икки фазали гетероген тизим* дейилади. Фазанинг характерли томони (белгиси) шундан иборатки, у бошқа фазалардан аниқ чегара билан ажралиб туради: Бир компонентнинг, масалан, сувнинг агрегат ҳолатлари қаттиқ, суюқ ва буғ фазаларни ташкил этади. Аммо агрегат ҳолатлари 3 та (плазма ҳолатни алоҳида деб қаралмаса), фазалар сони эса кўп бўлиши мумкин; масалан, музнинг 6 хил модификациялари — фазалари мавжуд; магнит кристалл қаттиқ жисмнинг ферромагнит, парамагнит фазалари мавжуд; металл — қаттиқ жисмнинг нормал ва ўта ўтказувчанлик ҳолатлари (фазалари) мавжуд.

Гомоген тизимнинг мувозанат шартини кўрайлик. Тизим физик бир жинсли n та компонентдан иборат бўлсин. Бу гомоген тизимнинг термодинамик потенциали

$$\Phi = \Phi(P, T, N_1, N_2, \dots, N_n)$$

компонентлар зарралари сонлари $N_1, N_2, \dots, N_n$ га боғлиқ бўлади. Температура ва босим доимий бўлганда термодинамик потенциалнинг ўзгариши мувозанат ҳолатда нолга тенг, яъни:

$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial T} dT + \frac{\partial \Phi}{\partial P} dP + \frac{\partial \Phi}{\partial N_1} dN_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial N_2} dN_2 + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial N_i} dN_i + \dots = 0$$


ёки

$$\sum_i \mu_i dN_i = 0 \quad (22)$$

бунда

$$\mu_i = \frac{\partial \Phi}{\partial N_i} \quad (23)$$

i компонентнинг кимёвий потенциали. Тизимда кимёвий реакциялар, шу жумладан диссоциациялар ва полимеризациялар бўлса, зарралар сони N_i ўзгаради ва $dN_i \neq 0$ бўлади. Кимёвий реакцияларда зарралар сонининг ўзгариши dN_i (ёки компонента массасининг ўзгариши dm_i) стехиометрик коэффициент ν_i га мутаносиб бўлади. Масалан,



реакцияда J ва H молекулалар сони (ёки унинг ўзгариши) $\nu_{JH} = 2$ га, J_2 ва H_2 молекулалар сонлари эса $\nu_{J_2} = 1$ ва $\nu_{H_2} = 1$ га мутаносибдир. Шундай қилиб,

$$dN_i \sim \nu_i$$

ни назарда тутиб, гомоген тизимнинг мувозанати шартини (22) ни

$$\sum_i \mu_i \nu_i = 0 \quad (24)$$

кўринишда ёзамиз.

Идеал газлар учун (24) ифодани кўрайлик. Ички энергия ва энтропия аддитивлигидан эркин энергияни

$$F = U - TS = \sum_i n_i U_i - T \sum_i n_i S_i = \sum_i n_i (U_i - TS_i) = \sum_i n_i F_i$$

кўринишда ёзиш мумкин; бунда U_i ва S_i — i компонентли газнинг бир молининг ички энергияси ва энтропияси (ара-лашиб V ҳажми эгаллагандан сўнг):

$$U_i = C_{V_i} T, S_i = C_{V_i} \ln T + R \ln V/n_i + S_{oi}$$

Маълумки,

$$\begin{aligned} \mu_i &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial n_i} \right)_T = U_i - TS_i + PV = -RT \ln \frac{V}{n_i} + U_i + RT - TC_{V_i} \ln T - \\ &- TS_{oi} = RT \ln n_i - RT \ln V_i + U_i + RT - TC_{V_i} \ln T - TS_{oi} = \\ &= RT \ln C_i + f(T), \end{aligned}$$

бунда $n_i = C_i N$ эканлиги назарда тутилди. (24) мувозанат шартини ёзамиз:

$$\sum_i \mu_i \nu_i = RT \sum_i \nu_i \ln C_i + f(T) \sum_i \nu_i = 0$$

Бундан

$$\sum_i \nu_i \ln C_i = -\frac{f(T)}{RT} \sum_i \nu_i = \ln K(T, P)$$

ёки

$$\prod_i C_i^{\nu_i} = K(T, P). \quad (25)$$

(25) ифолани *массаларнинг таъсир қонуни* дейилади; $K(P, T)$ ни *кимёвий реакциянинг константаси* дейилади. Умумий ҳолда K босимга ҳам боғлиқ.

5.3-§. ГЕТЕРОГЕН ТИЗИМНИНГ МУВОЗАНАТ ШАРТИ. ФАЗАЛАР ҚОИДАСИ

n та компонента ва r та фазага яккаланган гетероген тизим берилган бўлсин, шу тизимнинг мувозанат шартини аниқлайлик. Қулайлик учун тизим икки қисмдан (фазадан) иборат бўлсин. Уларнинг ҳар бири мувозанатда бўлиб, умумий тизим эса мувозанатда бўлмасин. Бу қисмлар (фазалар) мувозанатга келиши учун улар иш бажариши, иссиқлик алмашилиши рўй бериши ва зарралар бир фазадан иккинчи фазага ўтишлари мумкин.

Бу фазалардаги мувозанатдаги жараёнлар учун термодинамиканинг асосий муносабатини ёзамиз:

$$\begin{aligned} T_1 dS_1 &= dU_1 + P_1 dV_1 - \mu_1 dN_1, \\ T_2 dS_2 &= dU_2 + P_2 dV_2 - \mu_2 dN_2. \end{aligned} \quad (26)$$

Умумий тизим яккаланган бўлгани учун

$$-dU_1 = dU_2, \quad dV_1 = -dV_2, \quad dN_1 = -dN_2, \quad (27)$$

чунки

$$U = U_1 + U_2 = \text{const}, \quad V = V_1 + V_2 = \text{const}, \quad N_1 + N_2 = \text{const}.$$

Фазалар мувозанати (яккаланган тула тизимнинг мувозанати) унинг энтропияси максимум қийматга эришганда, яъни

$$dS = dS_1 + dS_2 = 0 \quad (28)$$

бўлганда содир бўлади. (27) ва (28) ни назарда тутиб, (26) дан

$$\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)dU_1 + \left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2}\right)dV_1 + \left(\frac{\mu_2}{T_1} - \frac{\mu_1}{T_2}\right)dN_1 = 0 \quad (29)$$

тенгликни оламиз. Бунда dU_1 , dV_1 , dN_1 ихтиёрий ўзгариши мумкин бўлганлиги сабабли (29) тенгликдан фазалар мувозанатда бўлиши учун уларнинг температуралари, босимлари ҳамда кимёвий потенциаллари бир-бирига тенг бўлиши келиб чиқади:

$$\begin{aligned} T_1 &= T_2, \\ P_1 &= P_2, \\ \mu_1 &= \mu_2. \end{aligned} \quad (30)$$

Фазалар температуралари тенглиги $T_1 = T_2$ да иссиқлик алмашилиши бўлмайди, термик мувозанат юзага келади; босимлар тенглиги $P_1 = P_2$ да механик мувозанат юзага келади, механик иш бажарилмайди; кимёвий потенциаллар тенглиги $\mu_1 = \mu_2$ да диффузия жараёни тўхтайди, зарраларнинг бир фазадан иккинчи фазага устун равишда ўтиши тўхтайди.

Агар фазалар температуралари ва босимлари тенг ($T_1 = T_2$ ва $P_1 = P_2$) бўлсаю, аммо кимёвий потенциаллари тенг бўлмаса, яъни $\mu_1 \neq \mu_2$ бўлса, тизимнинг фазалари орасида биридан иккинчисига устун равишда зарралар ўтиши юз беради. Бу ҳолда мувозанат қарор топгунга қадар тизимнинг энтропияси ортиб боради, яъни (28) ва (29) дан:

$$dS = \frac{\mu_2 - \mu_1}{T_1} dN_1 \geq 0. \quad (31)$$

Агар $\mu_2 > \mu_1$ бўлса, биринчи фаза зарралари сони ортиб боради: $dN_1 > 0$. Демак, зарралар кимёвий потенциали кичик бўлган фаза томон ўтадилар.

Агар икки фазали тизим фақат битта компонентдан иборат бўлса, кимёвий потенциал (термодинамик потенциал) фа-

$$\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T)$$

тенгликдаги (P, T) лардан бирининг ўзгариши функция сифатида иккинчисининг ўзгаришига мослаштирилади, яъни фазалар мувозанатида T, P ларни ихтиёрий ўзгартириб бўлмайди.

Гетероген тизим учун умумий ҳолда фазалар орасида механик ва термик мувозанат бўлганда

$$\begin{aligned} P_1 &= P_2 = \dots = P_r, \\ T_1 &= T_2 = \dots = T_r, \end{aligned} \quad (32)$$

тенгликлар бажарилади. Фазалар орасида зарралар ўтиши тўхтаб, мувозанатга келган бўлса, уларнинг кимёвий потенциаллари бир-бирига тенг бўлади:

$$\mu_1^k = \mu_2^k = \dots = \mu_r^k, \quad k = 1, \dots, n \quad (33)$$

Бунда кимёвий потенциал температура T , босим P ва концентрациялар C_i нинг функциясидир; пастки индекс $i = \overline{1, r}$ фазани кўрсатади.

n та компонента ва r та фазадан иборат гетероген тизимни тавсифлайдиган термодинамик параметрлар сонини аниқлайлик. Тизимнинг ҳар бир фазасини характерлайдиган параметрлар — бу $n - 1$ та концентрация ва P, T параметрлардан иборат. P ва T параметрлар ҳамма фазалар учун умумийдир. Демак, r та фазалардаги ўзгарувчилар сони

$$2 + (n - 1)r \quad (34)$$

ифода билан аниқланади. r та фаза мувозанатда бўлиши учун уларнинг ҳар бир компонентасининг кимёвий потенциаллари, (33) га асосан, бир-бирига тенг, яъни

$$\begin{aligned} \mu_1^k &= \mu_2^k = \dots = \mu_r^k \\ \mu_1'' &= \mu_2'' = \dots = \mu_r'' \\ &\dots\dots\dots \\ \mu_1^n &= \mu_2^n = \dots = \mu_r^n \end{aligned} \quad (35)$$

мак, қаралаётган гетероген тизимнинг мувозанатдаги ҳолатини аниқловчи эркин параметрлар сони

$$N = 2 + (n - 1)r - (r - 1)n = n + 2 - r \quad (36)$$

булади. N тизимнинг *термодинамик эркинлик даражалари сони* дейилади. Ўзининг маъносига кура $N \geq 0$, демак,

$$r \leq n + 2. \quad (37)$$

Демак, n та компонентдан иборат тизимнинг $n + 2$ тадан ортиқ бўлмаган фазалари мувозанатда бўлиши мумкин. Бу (37) ифодани *Гиббснинг фазалар қондаси* дейилади.

5.4-§. ИККИ ФАЗАНИНГ МУВОЗАНАТИ. УЧЛАНМА НУҚТА


Бир компонентли тизимни кўрайлик. Агар бу тизим бир фазада бўлса, унинг мувозанатдаги ҳолатини тавсифлайдиган параметрлар сони $N = n + 2 - r$ дан $n = 1$, $r = 1$ бўлгани учун $N = 2$ булади. Бу ҳолда тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари 2 та, яъни босим ва температурадир. Буларни маълум ораликда ихтиёрий ўзгартирилса ҳам фаза узгармайди. Тизим икки фазада мувозанат ҳолатда бўлсин (масалан, сув ва муз). Бу ҳолда тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари сони $N = 1$ булади. Табiiйки, фазаларнинг температуралари T_1 , T_2 , ва босимлари P_1 , P_2 узаро тенг, яъни

$$T_1 = T_2, P_1 = P_2 \quad (38)$$

бўлиши шарт. Булардан ташқари бундай гетероген тизим мувозанатда бўлиши учун бу икки фазанинг кимёвий потенциаллари тенг, яъни

$$\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T) \quad (39)$$

бўлиши керак. Бу тенгламадан икки фаза мувозанатда бўлганда температура T ва босим P орасидаги боғланиш аниқланиши мумкин. Бошқача айтганда, икки фаза температура ва босимнинг ихтиёрий қийматларида мувозанатда бўла олмайди, балки (39) тенгламани қаноатлантирадиган температура ва босим қийматларидагина мувозанатда бўла олади.



5.1-расм.

яъни T ва P лардан биттаси эркин узгарувчи, иккинчиси унинг функцияси сифатида узгаради.

Худди икки фаза мувозанатидаги каби, уч фазанинг мувозанати учун

$$N = 2 + n - r = 0 \text{ ва}$$

$$T_1 = T_2 = T_3; P_1 = P_2 = P_3,$$

$$\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T), \quad (40)$$

$$\mu_2(P, T) = \mu_3(P, T) \quad (41)$$

шартлар бажарилиши зарур. Демак, учта фаза мувозанатда бўлганда тизимнинг термодинамик эркинлик даражалари сони N нолга тенг, яъни эркин узгарувчилар бўлмайди. Учта фазанинг мувозанати (40) ва (41) алгебраик тенгламаларни қаноатлантирадиган P ва T нинг қийматлари билан аниқланадиган битта ҳолатда содир бўлади. Бу нуқтани **учланма нуқта** дейилади. Икки фаза ва учта фазанинг мувозанатларини (39), (40), (41) тенгламалар асосида графикда тавсифлайлик (қ. 5.1-расм). Бу мувозанат чизиги (39) асосида (агар унинг ошкор кўриниши маълум бўлса) олинади, 3 та фазанинг мувозанати 5.1-расмда координатлари (40) ва (41) асосида аниқланадиган учланма C нуқта билан кўрсатилган. Нуқтанинг координатлари T ва P ни (40) ва (41) тенгламаларни ечиб (унинг ошкор кўриниши маълум бўлса) аниқланади.

5.5-§. ФАЗАВИЙ УТИШЛАР

Кўп фазали (гетероген) тизим номувозанат ҳолатда бўлса, моддалар бир фазадан иккинчи фазага ўтишлари мумкин. Масалан, модда суюқ ҳолатдан газ ёки қаттиқ ҳолатга ўтиши, модданинг ферромагнит фазадан парамагнит фазага ўтиши, металлнинг нормал ҳолатдан ўта ўтказувчанлик ҳолатига ўтиши, гелий I нинг гелий II га айланиши фазавий ўтишларга мисол бўлади.

Фазавий ўтишлар икки турли бўлади: биринчи тур фазавий ўтишда яширин иссиқлик ажралади (ёки ютилади) ҳамда солиштирма ҳажм (зичлик) ўзгаради; масалан, бўғнинг суюқликка айланиши, суюқликнинг қаттиқ ҳолатга ўтиши биринчи тур фазавий ўтишлардир.

Иккинчи тур фазавий ўтишда яширин иссиқлик ажралмайди ёки ютилмайди ҳамда солиштирма ҳажм ўзгармайди. Аммо бошқа ҳоссалар, масалан, иссиқлик сиғими ўзгаради (масалан, қаттиқ жисм ферромагнетикнинг Кюри температурасидан юқорида парамагнетикка айланиши, гелий I нинг $2,2^\circ K$ да гелий II га айланиши ва бошқалар).

Икки фазали гетероген тизим мувозанат ҳолатда бўлсин. Бу ҳолда фазаларнинг кимёвий потенциаллари ёки солиштирма термодинамик потенциаллари $\varphi_1(P, T)$ ва $\varphi_2(P, T)$ бир-бирига тенг бўлади (фазаларнинг мувозанат шарт):

$$\varphi_1(P, T) = \varphi_2(P, T). \quad (42)$$

Фазалар мувозанатини бузмасдан термодинамик потенциалларни ўзгартирайлик:

$$\varphi_1(P, T) + d\varphi_1(P, T) = \varphi_2(P, T) + d\varphi_2(P, T)$$

ёки бунда температуранинг ўзгаришига мос равишда босимни (42) асосида ўзгартирилса, фазалар мувозанати бузилмайди, яъни:

$$\frac{\partial \varphi_1(P, T)}{\partial T} + \frac{\partial \varphi_1(P, T)}{\partial P} \frac{dP}{dT} = \frac{\partial \varphi_2(P, T)}{\partial T} + \frac{\partial \varphi_2(P, T)}{\partial P} \frac{dP}{dT}. \quad (43)$$

Буларда

$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial T} \right)_P = -S_1, \quad \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial T} \right)_P = -S_2,$$

$$\left(\frac{\partial \varphi_1(P, T)}{\partial P} \right)_T = \vartheta_1, \quad \left(\frac{\partial \varphi_2(P, T)}{\partial P} \right)_T = \vartheta_2$$

эканлигини назарда тутиб, (43) ни

$$\frac{dP}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{\vartheta_2 - \vartheta_1}. \quad (44)$$

қўринишга келтирамиз; бунда S_1 , S_2 ва ϑ_1 , ϑ_2 мос равишда фазаларнинг солиштирма энтропиялари ва солиштирма ҳажм-ларидир.

Мисол. Идишда сув ва сув устидаги идиш қопқоси остида (поршень тагида) буг мувозанат ҳолатда бўлсин. Агар босимни оширсак, бугнинг бир қисми сувга айланиши, шу билан босим ошишига тескари жараён — босим камайиши содир бўлади. Бошқача айтганда, Ле-Шателье тамойилига мувофиқ босим ошишига тескари йўналишда жараён кечади. Фазалар мувозанати бузилмаслиги учун температурани босимга мос равишда ошириш зарур.

5.6-§. БИРИНЧИ ТУР ФАЗАВИЙ УТИШ. КЛАПЕЙРОН — КЛАУЗИУС ТЕНГЛАМАСИ

Биринчи тур фазавий утишда энтропия S , солиштирма ҳажм V ўзгаради. Улар фазалар чегарасида сакраб ўзгаради, яъни:

$$S_2 - S_1 \neq 0, \quad V_2 - V_1 \neq 0. \quad (45)$$

Шу тур фазавий утишда яширин иссиқлик q ажралиб чиқади ёки ютилади, яъни:

$$T(S_2 - S_1) = T\Delta S = \Delta Q \equiv q. \quad (46)$$


(46) ни назарда тутиб, (44) ни

$$T \frac{dP}{dT} = \frac{q}{\partial_2 - \partial_1} \quad (47)$$

куринишда ёзамиз. Биринчи тур фазавий утиш учун ёзилган (47) ни *Клапейрон-Клаузиус тенгламаси* дейилади. Бу тенгламада солиштирма ҳажм V ва фазавий утишдаги яширин иссиқлик q температура ва босимга боғлиқ. Шундай қилиб, биринчи тур фазавий утишларда фазалар термодинамик потенциаллари узлуксиз ((42) тенглик), аммо уларнинг температура ва босим бўйича биринчи тартибли ҳосилалари узилишга эга ((45) ифодага қаранг). Жуда кўп қаттиқ жисмлар эриганда $q > 0$ бўлади ва уларнинг солиштирма ҳажмлари ортади, яъни $V_2 > V_1$ бўлади.

Шу сабабли $(dP/dT) > 0$, яъни босим ортиши билан эриш температураси ортади. Бундай молекулалар икки фазасининг мувозанатида температура ортиши билан босим ҳам ортади, яъни $\Delta T > 0$ да $\Delta P > 0$ бўлади. Аммо сув ва муз бу қондан истисно, яъни $q < 0$, аммо музнинг солиштирма ҳажми сувникидан кичик: $V_2 < V_1$. Шунинг учун температура ортиши

билан босим камаяди (қ. 5.2-расм), яъни босим ортиши билан музнинг эриш температураси пасаяди 5.2-расмда (47) тенглама билан тавсифланувчи муз ва сув фазалари мувозанати чизиғи, сув ва буғ фазалари мувозанати чизиғи, муз ва буғ фазалари мувозанати чизиғи ҳамда учта фазанинг мувозанатини тавсифловчи учланма нуқта тарҳий



5.2-расм.

(схематик) равишда келтирилган. Сув ва буғ мувозанати чизиғи A нуқтадан критик нуқта B гача давом этади. Учланма A нуқтадан пастда сув фазаси мавжуд эмас. Сув учун учланма нуқта координаталари:

$$t_y = 0,0078^\circ\text{C}, P_y = 0,006 \text{ атм.}$$

Модда паст температурали фазадан юқори температура-ли фазага ўтганда яширин иссиқлик q ни ютади. Тизим (муз) E нуқтада барқарор (турғун) (5.2 расм). Агар шу нуқтада муз-сув тизим бўлса, у нотурғун бўлади ва сув музга айланади. Агар босимни ўзгартирмай иссиқлик берилса, унинг (музнинг) температураси орта бориб, мувозанат чизиғига борганда (O нуқтада) температура ортиши тўхтайди, сув фазаси пайдо бўлади. Иссиқлик миқдорининг бу O нуқтада берилиши сув массасининг (миқдорининг) ортишига олиб боради. Агар бу нуқтада босим ортса, унга мос равишда температура ўзгарса (муз учун температура пасаяди), икки фаза мувозанати сақланади. Босимни ўзгартирмасдан бу нуқтада температура ошса, модда бир фазага — сувга айланади ва унинг температураси EF чизиғи бўйича ортиб боради.

5.7-§. КРИТИК ҲОЛАТ

Учланма нуқтадан бошланган қаттиқ жисм — суюқлик фазалар мувозанати чизиғи, қаттиқ жисм — газ фазалар мувозанати чизиғи юқори босим, температура ва паст босим, температура томонларидан чегараланмаган. Бу чизиқ-



5.3-расм.

ларни давом эттириш мумкин. Аммо суюқлик — газ фазалари мувозанати чизиғи K нуқтада тўхтайди (қ. 5.1-расм). Бу нуқтани (ҳолатни) **критик нуқта (ҳолат)** дейилади.

Суюқлик — газ тизимининг фазалар мувозанати ва фазавий ўтишларини таҳлил

қилиш учун P, V диаграммада тажриба натижасида олинган изотермалар (5.3-расм) ва Ван-дер-Ваальс изотермаларини келтирамиз (5.4-расм).


5.3-расмдаги AKB соҳада модда гетероген ҳолатда бўлганда суюқлик ва буғ фазалар биргаликда мавжуд. AK чизиқнинг чап томонида фақат суюқлик фазаси, BK чизиқнинг ўнг томонида фақат буғ фазаси мавжуддир. Юқори температурали изотермаларда икки фазанинг мавжудлиги соҳаси қисқариб борали ва T_k изотермада (критик температурадаги изотермада) ҳар икки фаза бир фазали ҳолатга — критик ҳолатга айланади. Бу ҳолатда модда суюқлик ҳам, буғ ҳам эмас. Бу ҳолат параметрларининг махсус қийматлари T_k, P_k, V_k да содир бўлади. P, V диаграммадаги изотермаларда солиштирма ҳажмлар $V_g > V_l$ фарқи температура ортиши билан камайиб бориб, критик нуқтада бу фарқ нолга тенг, яъни $V_g = V_l = V_k$ бўлади.

Критик нуқта K даги ўтишда солиштирма ҳажм ўзгармайди, иссиқлик ютилмайди (чиқарилмайди), аммо иссиқлик сигими, ҳажмий кенгайиш коэффициентини, сиқилувчанлик сакраб ўзгаради (узилишга эга). 5.4-расмда Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \quad (48)$$

асосида олинган изотермалар келтирилган. Бунда $T < T_k$ бўлганда P нинг ҳар бир қийматига V нинг учта қиймати тўғри келади. $P(V)$ чизиқ — изотерма максимум ва минимумдан ўтади. Температура орта бориши билан P нинг максимум ва минимум қийматлари бир-бирига яқинлашиб боради ва, ниҳоят, $T = T_k$ да максимум ва минимумлар бирилашиб бурилиш нуқтасига айланади. Бу нуқта K **критик нуқта**

дейилади. Реал изотермалар билан Ван-дер-Ваальс изотермаларини солиштирилса, ҳажмнинг камайишига босимнинг камайиши тўғри келадиган Ван-дер-Ваальс изотермасининг DC қисми модданинг нотурғун ҳолатига тўғри келади. У тажрибада кузатилмайди, яъни у реал эмас. Унинг ўрнига тажрибада горизонтал (изобара) чизиқ AB кузатилади. Бу ерда шуни айтиш керакки, реал изотермада ҳам K нуқтага **бурилиш нуқтаси** деб қаралади.



5.4-расм.

Тажриба кўрсатадики, суюқлик — газ тизимида газ фазаси BD метастабил ҳолатда — ўта тўйинган буғ ҳолатида, суюқлик фазаси AC метастабил ҳолатда — ўта қизиган суюқлик ҳолатида бўлишлари мумкин. 5.4-расмдан кўринадикки, критик изотерма T_k дан юқоридаги изотермалар, яъни $T > T_k$ даги изотермаларда $P(V)$ монотон ўзгарувчи ва бир фазали тизим (газсимон ҳолат)ни тавсифлайди; T_k дан пастдаги изотермаларда $P(V)$ минимум ва максимум қийматлар қабул қилади. Бу максимум ва минимум орасида Ван-дер-Ваальс изотермасида $(\partial P / \partial V)_T > 0$ қийматли соҳа реал тизимларда мавжуд бўлмайди. Реал тизимларда бу соҳада $(\partial P / \partial V)_T = 0$, яъни горизонтал қисмдан иборат бўлади. Умуман, T_k изотермадаги K нуқтада бурилиш нуқтаси мавжуд.


Статистик физика нуқтаи назаридан кристалл қаттиқ жисмларда уларни ташкил қилган зарралар орасида маълум тартиблилик (узоқ тартиб) мавжуд. Температура ортиши билан кристалл панжара тугунларидаги зарраларнинг (атомларнинг, ионларнинг) тебраниши кучая бориши ва оқибат натижада тартиблиликнинг бузилиши юз бериши туфайли қаттиқ жисм эрийди ва суюқ агрегат ҳолат пайдо бўлади. Суюқ фазада тартибсизлик даражаси устун бўлади. Моддала кескин сифат ўзгариши содир бўлади; қаттиқ жисмда деярли бўлмаган илгариланма ҳаракат роль ўйнай бошлайди. Шундай қилиб, қаттиқ фаза суюқлик фазасидан кескин фарқланади.

Суюқлик фазасида тартиблилик "қолдиги" қолган бўлса-да (унда яқин тартиблилик мавжуд), оқувчанлик, шакл ўзгарувчанлик каби муҳим хоссалари уни характерлайди.

Суюқ фазанинг температураси ортиши билан молекулаларнинг, атомларнинг, уларнинг комплексларининг илгариланма ҳаракатлари устун равишда тартиб боради; "қолдик тартиблилик" даражаси камайиб боради ва ниҳоят буғланиш температурасида қаттиқ жисмдан қолган "қолдик тартиблилик" (яқин тартиблилик) йўқолади, илгариланма ҳаракат билан боғлиқ тартибсизлик устунликка эришади. Температуранинг яна орттирилиши принципаал янгиликка олиб бормайди, тартибсизлик даражасининг ортишига олиб боради (газсимон фазада). Тартибсизлик даражасида энтропия асосида газсимон фазадан суюқлик фазасига ўтиши таҳлил этилса, илгариланма ҳаракат билан боғлиқ энтропия $S_{\text{м}}$ температура пасайиши билан камайиб боради. Фазавий ўтишда унинг тартибсизликдаги устунлик даражаси фазавий ўтишда йўқолади, бу ўтишда маълум даражада "тартиблилик" пайдо бўлади. Шу сабабли энтропия бу ўтишда сакраб ўзгаради. Температуранинг камайиши билан газ фазасининг "қолдик тартибсизлик" даражаси камайиб боради ва у "суюқлик-қаттиқ жисм" фазавий ўтишда, яъни абсолют тартибли кристалл қаттиқ жисм фазасига ўтганда, газнинг "қолдик тартибсизлик" даражаси нолга тушади, яъни йўқолади. Ўзига хос "Нернст теоремаси" юз беради, яъни қотиш (эриш) температураси — бу илгариланма ҳаракат билан боғлиқ энтропия учун "абсолют" ноль температурадир. Шундай қилиб, "суюқлик" қаттиқ жисмнинг "тартиблилиги" қолдиги, газсимон фазанинг "тартибсизлиги" қолдиги билан характерланадиган "оралиқ" фазадир.

Суюқлик — газ гетероген тизим температура ортиши билан суюқлик фазасининг тартибсизлик даражаси ортиб боради (энтропия ортади), суюқлик фазасидаги "қолдик тартиблилик" камайиб боради ва ниҳоят критик нуқтада бу "қолдик тартиблилик" йўқолади, икки фазада бир хил тартибсизлик даражаси ҳосил бўлади, яъни бу нуқтада энтропиянинг сакраб ўзгариши бўлмайди. Бу критик ҳолатдир. Критик ҳолатга яқинлашишда солиштирма ҳажмлар бири-бирига яқинлашади: яширин иссиқлик камайиб боради ва критик ҳолатда $q = 0$ ва $V_1 = V_2$ бўлади.

Яширин иссиқлик q нимага сарф булади? Бизнесингча, суюқликдан газга айланишда суюқликдаги "қолдиқ тартиблилик" ни бузиш, йуқотиш учун сарф булади. Температура T критик температурага қанча яқин булса, шунча "қолдиқ тартиблилик" кам булгани учун q (яширин иссиқлик) кам булади. Критик нуқтада эса $q = 0$ булади.



5.5-расм.

Газ фазасида температура ва босим ортиши, солиштирма ҳажмининг камайиши билан суюқликка айланиш учун зарур булган q камайиб боради. Бу эса "тартибсизлик" даражаси камайиб боришини, яъни энтропия $S(T, P)$ камайишини кўрсатади. Босим ортиши билан узгармас температурада $S(P)$ камаяди. Маълум тартибсизликни йуқотиб (камайтириб), "қолдиқ тартиблилик" ни тиклаш учун (буғ суюқликка айланиганда) кам q зарур бўлади! Критик ҳолатда эса $q = 0$ ва, демак, $S_1 = S_2$ булади.

МАСАЛАЛАР

5.1-масала. Ван-дер-Ваальс газининг критик нуқтадаги P_k , V_k , T_k ни аниқланг; критик коэффициент $RT_k/P_k V_k$ ни ҳисобланг ва уни тажриба натижалари билан таққосланг.

Еч и ш. Бизга Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \quad (1)$$

маълум. Ван-дер-Ваальс газининг изотермалари 5.5-расмда кўрсатилган. Ван-дер-Ваальс изотермаси максимум ва минимумдан ўтади. Бу экстремал қийматларда

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (2)$$

шарт бажарилади. Критик нуқтада максимум ва минимум бирлашиб, бурилиш нуқтасини ҳосил қилади. Бу бурилиш нуқтасида

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_T = 0 \quad (3)$$

шарт бажарилади.

Бу ерда шуни таъкидлаймизки, реал тизимнинг критик ҳолати барқарор бўлиши учун ҳам (2) ва (3) шартлар бажарилиши талаб этилади. Энди (1), (2), (3) тенгламалардан учта номаълум P_k , V_k , T_k аниқланади: яъни

$$P_k = \frac{RT_k}{V_k - b} - \frac{a}{V_k^2}, \quad (4)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T_k} = -\frac{RT_k}{(V_k - b)^2} + \frac{2a}{V_k^3} = 0, \quad (5)$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T_k} = +\frac{RT_k}{(V_k - b)^3} - \frac{6a}{V_k^4} = 0. \quad (6)$$

Булардан:

$$V_k = 3b, \quad P_k = \frac{a}{27b^2}, \quad T_k = \frac{8a}{27Rb} \quad (7)$$

$$\frac{a}{b} = 9P_k V_k, \quad a = \frac{9}{8} RT_k V_k, \quad b = \frac{RT_k}{8P_k}. \quad (8)$$

(7) ва (8) дан критик коэффициентни аниқлаймиз:

$$\frac{RT_k}{P_k V_k} = \frac{8}{3} = 2,667. \quad (9)$$

Критик коэффициент учун тажриба натижалари қуйидаги жадвалда келтирилган:

Модда	$RT_k/P_k V_k$
Гелий	3,13
Водород	3,03
Азот	3,42
Кислород	3,42
Сув	4,46
Бензин	3,75
Сирка кислота	4,99
Метил спирт	4,56

1-и з о ҳ. Идеал газ учун $RT_k/P_k V_k = 1$.

2-и з о ҳ. (7) дан фойдаланиб, Ван-дер-Ваальс тенгламасини келтирилган шаклда ёзамиз:

$$\frac{P}{P_k} = \pi, \quad \frac{V}{V_k} = v, \quad \frac{T}{T_k} = \tau. \quad (10)$$

(10) ни (1) га қўямиз; бунда (7) ни ҳисобга оламиз:

$$\pi \frac{a}{27b^2} = \frac{R_+ 8a}{27Rb^2(3\nu-1)} - \frac{a}{9\nu^2 b^2},$$

бундан

$$\left(\pi + \frac{3}{\nu^2}\right)(3\nu-1) = 8\tau$$

келтирилган Ван-дер-Ваальс тенгламасини оламиз.

5.2-масала. Дитеричи ҳолат тенгламасидан критик нуқтадаги P_k , V_k , T_k ни аниқланг. Критик коэффициент $RT_k/P_k V_k$ ни ҳисобланг; келтирилган ҳолат тенгламасини аниқланг.

Е ч и ш. Дитеричи тенгламаси

$$P = \frac{RT}{V-b} \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right). \quad (1)$$

Критик ҳолатда

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0, \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0 \quad (3)$$

шартлар қаноатлантирилади.

(1) дан топамиз:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = P \left[\frac{a}{RTV^2} - \frac{1}{V-b} \right], \quad (4)$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = P \left[\frac{a}{RTV^2} - \frac{1}{V-b} \right] + P \left[\frac{1}{(V-b)^2} - \frac{2a}{RTV^3} \right]. \quad (5)$$

(2) ва (3) шартларга асосан (4) ва (5) ни ёзамиз:

$$\frac{V^2}{V-b} = \frac{a}{RT}, \quad (6)$$

ва

$$\frac{V^3}{(V-b)^2} = \frac{2a}{RT}. \quad (7)$$

(6) ва (7) дан

$$\frac{V_k}{V_k-b} = 2; \quad V_k = 2b. \quad (8)$$

(6) дан

$$T_k = \frac{a}{4Rb} \quad (9)$$

(1) дан

$$P_k = \frac{a}{4b^2e^2} \quad (10)$$

Критик коэффициент

$$\frac{RT_k}{P_k V_k} = \frac{e^2}{2} = 3,65. \quad (11)$$

Дитеричи тенгламаси келтирилган шаклда

$$\pi = \frac{\tau}{2v-1} \exp\left(-\frac{2}{\tau v}\right) \quad (12)$$

қурилишда ёзилади.

Изоҳ. Дитеричи ҳолат тенгламасидан келиб чиқадиган

$$\frac{RT_k}{P_k V_k} = \frac{e^2}{2} = 3,65$$

критик коэффициент Ван-дер-Ваальс тенгламасидан олинган натижа

$$\frac{RT_k}{P_k V_k} = \frac{8}{3} = 2,67$$

га нисбатан тажриба натижаларига яқинроқ (жадвалга қ.).

5.3-масала. Биз

$$PV = RT \exp\left[\frac{1}{V}\left(b - \frac{a}{RT}\right)\right]$$

ҳолат тенгламасини олган эдик. Шу тенгламанинг чап томонига b тузатмани киритиб, ўнг томонига тенглаштирайлик:

$$P(V - b) = RT \exp\left[\frac{1}{V}\left(b - \frac{a}{RT}\right)\right]. \quad (1)$$

Шу ҳолат тенгламасининг критик параметрлари P_k , V_k , T_k аниқлансин ва $RT_k/P_k V_k$ ҳисобланиб, Ван-дер-Ваальс ҳамда, Дитеричи тенгламалари натижалари билан таққослансин.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T &= - \frac{RT}{(V-b)^2} \exp \left[\frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] + \\ &+ \frac{RT}{(V-b)} \exp \left[\frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] \left[- \frac{1}{V^2} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] = \\ &= \frac{RT}{(V-b)} \exp \left[\frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] \left[- \frac{1}{V-b} - \frac{1}{V^2} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] = \\ &= P \left[- \frac{1}{V-b} + \frac{1}{V^2} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

(2) дан

$$\frac{V_k^2}{V_k - b} = \frac{a}{RT_k} - b. \quad (3)$$

(2) ни назарда тутиб қуйидагича оламир:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_T &= P \left[- \frac{1}{V-b} - \frac{1}{V^2} \left(b - \frac{a}{RT} \right) \right] + \\ &+ P \left[+ \frac{1}{(V-b)^2} - \frac{2}{V^3} \left(\frac{a}{RT} - b \right) \right] = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

(4) дан:

$$\frac{V_k^3}{(V_k - b)^2} = 2 \left(\frac{a}{RT_k} - b \right). \quad (5)$$

(3) ва (5) дан:

$$\frac{V_k}{V_k - b} = 2; \quad V_k = 2b. \quad (6)$$

(6) ни (3) га қўйиб, T_k ни топамиз:

$$T_k = \frac{a}{5Rb}. \quad (7)$$

(6) ва (7) ни (1) га қўйиб, P_k ни оламир:

$$P_k = \frac{a}{5b^2 e^2}. \quad (8)$$

Бизнинг ҳолат тенгламамининг келтирилган шакли

$$\pi = \frac{\tau}{(2V-1)} \exp \left[\frac{1}{V} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\tau} \right) \right]$$

кўринишда бўлади.

Критик коэффициентни ҳисоблаймиз:

$$\frac{RT_k}{P_k V_k} = \frac{e^2}{2}. \quad (9)$$

Қуйидаги жадвалда Ван-дер-Ваальс, Дитеричи ва (1) тенглама натижалари таққосланган.

	V_k/b	$P_k b^2/a$	$T_k Rb/a$	RT_k/P_k
Ван-дер-Ваальс т-си	3	1/27	8/27	8/3 = 2,7
Дитеричи тенгламаси	2	1/4e ²	1/4	e ² /2 = 3,65
(1) тенглама	2	1/5e ²	1/5	e ² /2 = 3,65

5.8-§. ЯНГИ ФАЗАНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ

Янги фаза маълум шароитда эски фазاداги модданинг флукутацияси туфайли содир бўлади. Бунда, масалан, суюқликда қайнаш чоғида буғ фазасининг куртаклари — пуфаклар, тўйинган буғда суюқлик фазасининг "вакиллари" — томчилар пайдо бўладилар. Буларнинг пайдо бўлишига модда зичлигининг флукутацияси сабабчи бўлади. Аммо янги фазага ўтиш рўёбга чиқиши учун янги фазанинг куртаклари берилган маълум шароитда ўсиш, ривожланиш имкониятига эга бўлиши зарур. Қисқаси, янги фаза куртагининг ўсиши, ривожланиши бир қанча омилларга боғлиқ, жумладан, ҳосил бўлган янги фаза куртагининг ўлчамига боғлиқ. Агар куртак кичик бўлса, янги фаза зарралар (молекулалари) ининг анчагина қисми янги ва эски фазалар орасидаги сиртда бўлади. Шу сабабли янги фаза куртагини таҳлил этилганда сирт билан боғлиқ ҳодисаларни ҳам назарда тутмоқ лозим.

Маълумки, сирт юзининг ўзгариши $d\Sigma$ туфайли бажарилган иш $dA = -\sigma d\Sigma$ (бунда σ — сирт таранглик коэффициенти). Доимий температурада бажарилган иш эркин энергиянинг камайишига тенг, яъни $dF = \sigma d\Sigma$. Шу сабабли, янги ва эски фазаларнинг турғунлик шартини аниқлаш учун, сирт хоссаларини назарда тутган ҳолда, эркин энергия ўзгаришидан фойдаланмоқ лозим.

Тизимнинг температураси T , ҳажми V ва зарралар сони N доимий бўлсин. Бу ҳолда эркин энергиянинг ўзгариши: қуйидагидек бўлади:

$$dF = -P_1 dV_1 - P_2 dV_2 + \mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 + \alpha d\Sigma. \quad (49)$$

Шартимизга асосан:

$$V = V_1 + V_2 = \text{const}, \quad N = N_1 + N_2 = \text{const}.$$

Бундан:

$$-dV_1 = dV_2, \quad dN_1 = -dN_2. \quad (50)$$

(50) ни назарда тутиб, (49) ни

$$dF = \left(P_2 - P_1 + \sigma \frac{\partial \Sigma}{\partial V_1} \right) dV_1 + (\mu_1 - \mu_2) dN_1 \quad (51)$$

қўринишда ёзамиз, бунда

$$d\Sigma = \frac{\partial \Sigma}{\partial V_1} dV_1.$$

Икки фаза мувозанатда бўлганда $dF = 0$ ва $\mu_1 = \mu_2$. Бу ҳолда (51) дан

$$P_2 = P_1 - \sigma \frac{\partial \Sigma}{\partial V_1} \quad (52)$$

ифодани оламиз. $\partial \Sigma / \partial V_1$ ҳосила сирт эгрилигига ва, демак, эгрилик радиуси R га боғлиқ. Сфера учун:

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial V} = \frac{d(4\pi R^2)}{d\left(\frac{4\pi}{3} R^3\right)} = \frac{2}{R}. \quad (53)$$

Бундай сфера қўринишида ҳосил бўлган янги фаза барқарор бўлиши учун

$$P_2 = P_1 - \frac{2\sigma}{R} \quad (54)$$

тенгликни оламиз. (52) даги $\sigma \frac{\partial \Sigma}{\partial V_1}$ сирт босими дейилади. Бу босим сиртнинг қабарик томонидан ботиқ томонига йўналган. Бу босим фазалар чегараси текис бўлганда нолга тенг бўлади. Шунингдек, катта сиртли жисмлар (фазалар) учун ҳам у ҳисобга олмаслик даражасида кичик. Кичик куртакка эга бўлган янги фазалар (масалан, томчилар) учун

бу босим сезиларли ва унинг радиуси қанча кичик бўлса, шунча катта бўлади.

Масалан, сувда буғ фазаси (пуфаклар)нинг пайдо бўлишини кўрайлик. Агар ташқи босим ва сирт босими ҳосил бўлган пуфакнинг ичидаги тўйинган буғ босимидан катта, яъни

$$P_{\text{сирт}} + \sigma \frac{\partial \Sigma}{\partial V} > P_{\text{буғ}} \quad (55)$$

бўлса, у ҳолда пуфак сиқилади ва янги фаза сув қизиган пайтда ҳосил бўлмай, йўқолади. Температура ортиши ёки босим камайиши билан янги фаза (буғ)нинг бундай куртаклари (пуфаклари) кўпаяди, барқарор бўлади, сув қайнайди, яъни бунда

$$P_{\text{сирт}} + P_{\text{сирт}} \leq P_{\text{буғ}} \quad (56)$$

бўлади.

Тўйинган буғда конденсация ҳодисаси (томчилар) пайдо бўлади ва барқарорли бўлиши учун

$$P_{\text{буғ}} + P_{\text{сирт}} \leq P_{\text{сирт}} \quad (57)$$

бўлиши лозим. Акс ҳолда буғланиб, томчи йўқолади (босим катталашади, температура ортади ва буғланади).

5.9-§. ИККИНЧИ ТУР ФАЗАВИЙ УТИШЛАР

Тажрибадан маълумки, айрим фазавий утишларда иссиқлик ажралиши ёки ютилиши содир бўлмайди, солиштирма ҳажм ўзгармайди. Масалан, Кюри нуқтасида ферромагнитнинг парамагнитга айланиши, суюқ гелийнинг $2,18^\circ \text{K}$ да гелий II суюқликка айланиши иккинчи тур фазавий утишга мисолдир.

Бу фазавий утишда (44) ифодадаги сурат ҳам, маҳраж ҳам (яъни $S_2 - S_1$ ва $V_2 - V_1$) нолга тенгдир. Шу сабабли бу касрнинг лимитини олиш учун Лопиталь қондасига асосан сурат ва маҳражнинг ҳосилаларини олиб, уларнинг нисбатини аниқламоқ керак:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta \theta} = \frac{\Delta \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P}{\Delta \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P} \quad (58)$$

Бунда:


$$\Delta \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial S_2}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial S_1}{\partial T} \right)_P = \frac{C_{P2} - C_{P1}}{T} = \frac{\Delta C_P}{T}, \quad (59)$$

$$\Delta \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial V_2}{\partial T} \right)_P - \left(\frac{\partial V_1}{\partial T} \right)_P = V_2 \alpha_2 - V_1 \alpha_1 = V \Delta \alpha. \quad (60)$$

Демак, иккинчи тур фазавий ўтишларда $\varphi_1 = \varphi_2$, буларнинг биринчи тартибли ҳосилалари $S_2 - S_1$, $V_2 - V_1$ ўзаро тенг бўлиб, термодинамик потенциалнинг иккинчи тартибли ҳосилалари $\frac{\partial S_1}{\partial T} \neq \frac{\partial S_2}{\partial T}$, $\frac{\partial V_1}{\partial T} \neq \frac{\partial V_2}{\partial T}$, ва ҳ. к.лар узилишга (сакрашга) эгадир. 5.6-расмда *HeI* нинг *HeII* га айланишида иссиқлик сизимининг температура бўйича ўзгариши келтирилган.

Унда C_P нинг $2,18^\circ K$ да сакрашга эга эканлиги кўрсатилган.

(59) ва (60) ни назарда тутиб, (58) ни қайта ёзамиз:



5.6-расм.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta C_P}{TV \Delta \alpha}. \quad (61)$$

(58) ифодада $\Delta S / \Delta V = 0/0$ ноаниқликни Лопиталь қоидаси бўйича лимитини аниқлашда босим бўйича ўзгаришини олайлик (лимит ишоралари ёзилмади)

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T}{\Delta \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T}, \quad (62)$$

бунда:

$$\Delta \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial S_1}{\partial P} \right)_T - \left(\frac{\partial S_2}{\partial P} \right)_T = \partial \Delta \alpha, \quad (63)$$

$$\Delta \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial V_2}{\partial P} \right)_T - \left(\frac{\partial V_1}{\partial P} \right)_T = \partial \Delta \chi_T. \quad (64)$$

Демак,

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\chi_T} \quad (65)$$

(61) ва (65) лар *Эрифест тенгламалари* дейилади. Уларни бир-бирига кўпайтириб,

$$\Delta C_p = \Delta\chi_T \left(\frac{dP}{dT} \right)^2 TV \quad (66)$$

тенгликни оламиз.

VI БОБ

КЛАССИК СТАТИСТИКА. ИДЕАЛ ГАЗ

6.1-§. КИРИШ

Статистик усулнинг асослари ва унинг статистик термодинамикадаги муносабатлари билан умумий ҳолда танишдик. Бу бобда статистик усулнинг идеал газга татбиқи билан танишамиз. Идеал газ учун статистик физика усули бўйича ҳисоблашни охирига етказиш мумкин. Бундан ташқари эмпирик усул ёки элементар кинетик назария асосида олинган муносабатларни, парадоксларни статистик физиканинг фундаментал усул асосида олиш бу усулнинг самардорлигини кўрсатади, шу билан бирга уни ўзлаштиришга ёрдам беради. Статистик физика усулини фақат физик ҳодисаларгагина эмас, балки табиий фанлар ўрганадиган соҳаларнинг кўп ҳодисаларига қўллаш мумкинлигига ҳам ишонч ҳосил қилинади.

Газ хоссаларини ўрганишда статистик физика усулини яққол тасаввур этиш ва уни ўзлаштириш қулайдир.

Зарралар орасидаги ўзаро таъсир нисбатан заиф (кучсиз) бўлганда газ хоссаларини кўп ҳолларда алоҳида зарра ёки жуфт зарралар хоссалари асосида ўрганилади. Газ хоссаларини ўрганилаётганда унинг зарралари орасида ўзаро таъсир йўқ деб қаралса, бундай газларни идеал газ дейилади.

Тўғри, газ номувозанат ҳолатда бўлса, мувозанат ҳолатга келиши учун зарралар (молекулалар, атомлар) орасида ўзаро таъсир, албатта, бўлиши шарт. Аммо мувозанат ҳолатдаги газнинг хоссаларини баъзан унинг зарралари орасида ўзаро таъсир йўқ деб фараз қилиб ўрганиш мумкин.

Умуман, тизим заррасининг ҳолати унинг атрофидаги зарралар билан бўлган ўзаро таъсирга боғлиқ. Бу ўзаро таъсир принципиал жиҳатдан икки турга: зарядлар (масалан, электр, ранг, ҳид¹) билан боғлиқ ўзаро таъсир ва зарядлар билан боғлиқ бўлмаган (спин билан боғлиқ бўлган) ўзаро таъсирларга бўлинади. Спин ҳам заряд каби зарранинг индивидуал хоссасидир ва у бошқа зарралар билан муносабатда таъсир кўрсатади.

Зарралар ҳаракатини корреляция қилувчи бундай квант хосса газ зарралари бир-бирларига де Бройль тўлқин узунлиги $\lambda = h / P$ масофасида ёки бундан яқинроқ масофада бўлганларида намоён бўлади; бунда $\bar{P}$ — зарранинг ўртача импульси: $\bar{P} \sim \sqrt{T}$. Равшанки, температура пасайиши билан де Бройль тўлқин узунлиги ортиб боради ва, демак, квант корреляция намоён бўладиган масофа ҳам ортиб боради!


Шундай қилиб, квант корреляция нафақат зарранинг ҳаракат қонунининг қайта қаралишига сабаб бўлмай, балки статистик физиканинг ҳам муҳим ўзгаришига — квант статистик физиканинг яратилишига олиб келди. Ўз навбатида эса квант статистикасининг бозонлар статистикаси ва фермионлар статистикасига бўлинишига олиб келди.

Демак, квант статистикаси паст $T \leq T_0$ ($T_0 \sim n^{2/3} h^2 / m$ айниш температураси) температураларда квант газларга қўлланилади. Фотонлар, фононлар, оқ мптти юлдузлар, нейтрон юлдузлар ва бошқалар квант газларга мисоллардир.

Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, аксарият газларнинг айниш температураси шунчалик пастки, унинг квант хоссалари намоён бўлишга улгурмай, улар суюқлик, хатто қаттиқ жисм ҳолатига ўтади.

Таъриф бўйича, молекулалари орасида ўзаро таъсир йўқ бўлган газни идеал газ дейилади. Демак, газ молекулалари орасида ўзаро таъсир шунчалик заиф бўлсаки, уларни ҳисобга олинмаса, бундай газларни идеал газ дейиш мумкин. Амалда реал газ етарли даражада сийраклашган бўлса, бундай ҳолларда молекулаларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олмаслик мумкин.

¹ Бу ерда ранг ва ҳид кучли ва заиф (кучсиз) ўзаро таъсирларнинг манбан бўлган зарядларнинг номлари.



6.1-расм.

Зарралар орасида ўзаро таъсир йўқлиги ёки уни ҳисобга олмаслик даражасида заиф (кичик)лиги, кўп зарралар физикаси масалаларини бир заррали усул масаласига келтиришга имкон беради. Яъни кўп зарралардан иборат бўлган тизим масаласини битта зарра учун масалани назарий жиҳатдан ечиб, олинган

натижани зарралар тизимига қўллаш имконини беради (квант статистикага қаранг). Бу ерда шуни таъкидлаймизки, нормал шароитдаги температура ҳамда босимдаги реал газни деярли идеал газ деб қараш мумкин. Аммо жуда паст температура ва юқори босимдаги газларни квант механикаси асосида қараш лозим бўлади.

Сийрак газни тақрибан идеал газ деб қараш мумкин. Шу муносабат билан "сийрак газ" тушунчасини ойдинлаштирайлик.

Нейтрал атом ва молекулаларнинг таъсир радиуси тахминан $10^{-7} - 10^{-8}$ см тартибда бўлади. Газ сийрак бўлган ҳолда зарраларнинг умумий ҳажми шу N та зарра ҳаракат қилаётган идиш ҳажми V дан жуда кичик, яъни

$$Nb \ll V \quad (1)$$

деб ҳисобланади. Бошқача айтганда, идишда зарралар деярли эркин ҳаракатланади. Бу ерда b радиуси $2r_0$ га тенг бўлган шарнинг ҳажми (6.1-расм), яъни:

$$b = (4\pi/3)(2r_0)^3.$$

Газнинг сийраклик шarti (мезони) (1) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$10r_0^3 n \ll 1, \quad (2)$$

бунда $n = (N/V)$ зарралар зичлиги; (2) дан кўринадики, газ сийрак деб ҳисобланиши учун унинг зичлиги

$$n \ll 10^{20} - 10^{21} \text{ см}^{-3} \quad (3)$$

шартни қаноатлантириши керак.

(2) шартни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$r_0 \ll \Delta, \quad (4)$$

бунда $V/N = \Delta^3$, бу ерда Δ — молекулаларнинг ўртача эркин югуриш йули. Демак, сийрак газда ўртача эркин югуриш йули Δ узаро таъсир радиусидан жуда катта бўлади; бошқача айтганда, зарралар куп вақт эркин ҳаракатда бўладилар. Масалан, зарранинг эркин югуриш вақти τ , га нисбатан икки зарранинг тўқнашиш ҳолатида бўлиш вақти τ_T жуда кичик бўлади, яъни сийрак газ учун ёзилган (4) шартга

$$\tau, \gg \tau_T \quad (5)$$

шарт тенг кучлидир. Бошқача айтганда, икки зарранинг тўқнашиш вақти жуда кичик бўлиб, бу вақт τ_T давомида учта зарранинг биргаликда тўқнашиши амалда (деярли) бўлмайди. Зич газлар ва суюқликлар учун $10r_0^3 \geq 1$ ёки $r_0 \approx \Delta$ шарт бажарилади. Бу ҳолда тўқнашишлар тушунчаси ўз кучини йўқотиши мумкин, чунки молекула ҳар доим ўзининг атрофидаги қўшни молекулаларнинг таъсири доирасида бўлади.

6.2-§. КЛАССИК СТАТИСТИКА

Берк тизим микроҳолатлари эҳтимолликлари тақсимоти:

$$dW(E) = f(E)dn. \quad (6)$$

Бу ифодада тақсимот функцияси

$$f(E) = (1/Z) \exp(-\beta E) \quad (7)$$

қуринишга эга. Классик ҳолда энергия $E = E(p, q)$ ни кинетик энергия $E(p)$ ва потенциал энергия $E(q)$ лар йиғиндиси қўринишида қуйидагича ёзилади:

$$E(p, q) = E(p) + E(q). \quad (8)$$

Бу ҳолда классик статистикадаги тақсимот функцияси $f(E)$ ни

$$f_e(p, q) = \frac{1}{Z_p} e^{-\beta E(p)} \cdot \frac{1}{Z_q} e^{-\beta E(q)} \quad (9)$$

қўринишда ёзиш мумкин. Бундаги Z_p ва Z_q ни нормалаш шартларидан топилади:

$$Z_p = \int_{E_p} e^{-\beta E(p)} dn_p, \quad (10)$$

$$Z_q = Q = \int_{E_q} e^{-\beta E(q)} dq, \quad (11)$$

бунда

$$dn = dn_p dn_q = \frac{d\Gamma}{h^3 g} = \frac{dp dq}{h^3 g}.$$

Идеал газ учун $E(q) = 0$. Бу ҳолда классик статистиканинг тақсимот функцияси (9)

$$f(E_p) = \frac{1}{Z_p} e^{-\beta E(p)} \frac{1}{Q}$$

кўринишга эга бўлади. (11) дан кўринадики,

$$Q = V^N,$$

бунда V — тизимнинг ҳажми; N — зарралар сони. Шундай қилиб, идеал классик газ учун эҳтимоллик

$$dW(E_p) = \frac{1}{Z_p} e^{-\beta E(p)} dn_p \frac{dq}{V^N} \quad (12)$$

кўринишга, эҳтимолликлар зичлиги тақсимот функцияси

$$f(E(p)) = (1/Z_p \cdot V^N) \exp[-\beta E(p)] \quad (13)$$

кўринишга эга. Биз Z_p нинг ифодасини аввал аниқлаган эдик:

$$\frac{1}{Z_p} = N^N \left(\frac{h^2}{2\pi m \theta} \right)^{3N/2}, \quad \beta = 1/\theta. \quad (14)$$

6.3-§. КЛАССИК ТИЗИМДА ЭНЕРГИЯНИНГ ЭРКИНЛИК ДАРАЖАЛАРИ БЎЙИЧА ТЕНГ ТАҚСИМЛАНИШИ

Классик тизим учун энергия

$$E(p, q) = E(p) + E(q) \quad (15)$$

бунда

$$E(p) = \sum_i p_i^2 / 2m \quad (16)$$

тизим зарраларнинг кинетик энергияси;

$$E(q) = E(q_1, q_2, \dots, q_r) \quad (17)$$

тизимнинг потенциал энергияси, 2ν — умумлашган импульслар ва умумлашган координаталар сони. Энергия қийматлари E учун юқорида гамма-тақсимот ўринли эканлигини кўрдик.

Энди E_p ва E_q тасодифий миқдорлар қийматлари учун тақсимот функцияларини оламыз.

Энергетик тасаввур ўзгарувчилар сони координата ва импульслар сонига нисбатан 2 марта кам бўлади. Энергетик тасаввурда ўзгарувчилар сони

$$\nu = \nu_p + \nu_q, \quad (18)$$

бунда ν_p ва ν_q — кинетик ва потенциал энергияларни энергетик тасаввурда аниқлайдиган ўзгарувчилар сони.

Таърифга кўра бета-функция

$$B(\nu_p, \nu_q) = \int_0^1 (1-t)^{\nu_p-1} t^{\nu_q-1} dt = \frac{\Gamma(\nu_p)\Gamma(\nu_q)}{\Gamma(\nu)}. \quad (19)$$

E_p ва E_q қийматларининг эҳтимолликлари тақсимотини аниқлайлик. (19) га асосан қуйидаги тенглик ўринли:

$$\Gamma(\nu) / \Gamma(\nu_p)\Gamma(\nu_q) \cdot \int_0^1 (1-t)^{\nu_p-1} t^{\nu_q-1} dt = 1. \quad (20)$$

Қуйидаги айнинг эъзайлик:

$$f_{\beta\nu}(E) = [\beta^\nu / \Gamma(\nu)] E^{\nu-1} e^{-\beta E} \frac{\Gamma(\nu)}{\Gamma(\nu_p)\Gamma(\nu_q)} \int_0^1 (1-t)^{\nu_p-1} t^{\nu_q-1} dt.$$

Бунинг ўнг томонини $E_q = Et$ орқали ўзгартириб эъзайлик. У ҳолда

$$\begin{aligned} f_{\beta\nu}(E) &= \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu_p)\Gamma(\nu_q)} e^{-\beta E} \int_0^E (E - E_q)^{\nu_p-1} E_q^{\nu_q-1} dE_q = \\ &= \int_0^E \frac{\beta^{\nu_p}}{\Gamma(\nu_p)} (E - E_q)^{\nu_p-1} e^{-\beta(E-E_q)} \frac{\beta^{\nu_q}}{\Gamma(\nu_q)} E_q^{\nu_q-1} e^{-\beta E_q} dE_q = \\ &= \int_0^E \frac{\beta^{\nu_p}}{\Gamma(\nu_p)} E_p^{\nu_p-1} e^{-\beta E_p} \frac{\beta^{\nu_q}}{\Gamma(\nu_q)} (E - E_p)^{\nu_q-1} e^{-\beta(E-E_p)} dE_p \end{aligned}$$

$$f_{p_r}(E) = \int_0^E f_{p_p} v_p (E - E_q) f_{p_q} v_q (E_q) dE_q = \\ = \int_0^E f_{p_p} v_p (E_p) f_{p_q} v_q (E - E_p) dE_p. \quad (21)$$

Бундан йиғма ҳақидаги теоремага асосан:

$$f_{p_r}(E) = f_{p_p} v_p (E_p) * f_{p_q} v_q (E_q) \quad (22)$$

бунда

$$\beta = \beta_p = \beta_q \quad (23)$$

(22) тенгликдан берк тизимнинг кинетик ва потенциал энергиялари қийматлари эҳтимолликлари гамма-тақсимот билан берилиши (аниқланиши) келиб чиқади. (23) ифодани ёзайлик:

$$\frac{v}{\langle E \rangle} = \frac{v_p}{\langle E_p \rangle} = \frac{v_q}{\langle E_q \rangle}$$

ёки

$$\frac{\langle E \rangle}{v} = \frac{\langle E_p \rangle}{v_p} = \frac{\langle E_q \rangle}{v_q}. \quad (24)$$

Бундан классик тизим учун ички энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланиш қонуни келиб чиқади (қ. 4.1-масала). Классик идеал тизим учун

$$E_q = 0, \quad E = E_p. \quad (25)$$

Бу ҳолда $\beta_q = v_q / \langle E_q \rangle$ дан $\langle E_q \rangle \rightarrow 0$ бўлгани учун $\beta_q \rightarrow \infty$. Бу шарт бажарилганда

$$\beta v_q (E_q) = \delta(E_q) = \delta(E - E_p) \quad (26)$$

тенглик ўринли бўлишини кўрсатиш мумкин (IV бобга қаранг).

Буни назарда тутиб, дельта-функция хоссасига асосан (21) дан:

$$\beta v(E) = \beta_p v_p(E) = \beta_p v_p(E_p). \quad (27)$$

Шундай қилиб, классик тизим учун энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланишини умумий ҳолда исбот қилдик.

6.1-масала. Гамма-тақсимот учун йиғма ҳақидаги теорема ўринли эканлигини исбот қилинг.

Е ч и ш. Гамма-тақсимот учун қуйидаги ифодалар маълум:

$$\left. \begin{aligned} f_{\beta\nu}(E) &= [\beta^\nu / \Gamma(\nu)] E^{\nu-1} e^{-\beta E}, \\ \Gamma(\nu) &= \int_0^\infty x^{\nu-1} e^{-x} dx, \\ \beta &= \nu / \langle E \rangle, \quad E(x_1, x_2, \dots, x_{2\nu}) \end{aligned} \right\}. \quad (1)$$

Классик ҳолда

$$E = E(P_1, P_2, \dots, P_\nu) + E(q_1, q_2, \dots, q_\nu). \quad (2)$$

Йиғма теоремасига асосан:

$$\begin{aligned} f_{\beta\nu}(E) &= f_{\beta_P \nu_P}(E_P) \cdot f_{\beta_q \nu_q}(E_q), \\ \nu &= \nu_P + \nu_q, \beta = \beta_P = \beta_q. \end{aligned} \quad (3)$$

(3) ифодани исбот қилиш учун унинг ўнг томонини кўрамиз:

$$\begin{aligned} f_{\beta_P \nu_P}(E_P) \cdot f_{\beta_q \nu_q}(E_q) &= \int_0^E \frac{\beta^{\nu_P}}{\Gamma(\nu_P)} (E - E_q)^{\nu_P-1} e^{-\beta(E-E_q)} \times \\ &\times \frac{\beta^{\nu_q}}{\Gamma(\nu_q)} E_q^{\nu_q-1} e^{-\beta E_q} dE_q = \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu_P)\Gamma(\nu_q)} e^{-\beta E} \int_0^E (E - E_q)^{\nu_P-1} E_q^{\nu_q-1} dE_q. \end{aligned}$$

$E = Et$ алмаштириш ўтказиб, охириги ифодани ёзамиз:

$$\begin{aligned} f_{\beta_P \nu_P}(E_P) \cdot f_{\beta_q \nu_q}(E_q) &= \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu_P)\Gamma(\nu_q)} e^{-\beta E} E^{\nu-1} \int_0^1 (1-t)^{\nu_P-1} t^{\nu_q-1} dt = \\ &= f_{\beta\nu}(E) \cdot \frac{\Gamma(\nu)}{\Gamma(\nu_P)\Gamma(\nu_q)} \int_0^1 (1-t)^{\nu_P-1} t^{\nu_q-1} dt, \end{aligned}$$

бу ердаги интеграл бета-функция дейилади ва у $B(\nu_P, \nu_q) = \frac{\Gamma(\nu_P)\Gamma(\nu_q)}{\Gamma(\nu)}$ кўринишга эга. Буни эътиборга олсак гамма-тақсимот учун (йиғма) теоремаси исбот қилинган бўлади.

6.4-§. МАКСВЕЛЛ ТАҚСИМОТИ ҚОНУНИ ВА УНИНГ ТАТБИҚИ

Берк тизим учун тақсимот функциялари маълум:

$$f(E)dn = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} dn, \quad (28)$$

$$f_{\beta\nu}(E)dn = \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} E^{\nu-1} e^{-\beta E} dE. \quad (29)$$

Буларда Z — статистик интеграл (йиғинди), $\beta = \nu/U$, $\Gamma(\nu)$ — гамма-функция: идеал газ учун $\beta = 1/kT$. Умумий ифодалар (28) ва (29) ни N та ички структурага эга бўлмаган, яъни бир атомли молекулалар (зарралар)дан иборат классик идеал газ учун ёзилганда

$$E = \sum_i E_i, \quad E_i = \frac{1}{2m} (p_{xi}^2 + p_{yi}^2 + p_{zi}^2) \quad (30)$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{Z_1} \right)^N; \quad \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2} \quad (31)$$

$$\beta = \frac{1}{kT}, \quad 2\nu = 3N \quad (32)$$

ифодалар назарда тутилади.


Тарихий маълумот. Стокс саволи. Инглиз олими Стокс имтихон вақтида талабаларга битта қўшимча савол берар, саволнинг жавобини ўзи ҳам билмаслиги ва бу савол талабанинг имтиҳондаги баҳосига таъсир этмаслигини айтар экан.

Бир куни (1859) талабалардан биттаси Стокснинг бу саволига жавоб топибди. Бу Максвелл эди.

Куйида шу саволни ва унга жавобнинг асосий мазмунини келтирамиз. Тартибсиз (хаотик) ҳаракатдаги газ молекулалари бир-бири билан узлуксиз тўқнашиб туради. Шу туфайли уларнинг тезликлари ҳар хил бўлади. Табиийки, термодинамик мувозанат ҳолатидаги газда жуда кичик (ноль) ва жуда катта (чексиз катта) тезликли молекулаларнинг сони нисбатан кам (нолга яқин) бўлади. Демак, газ молекулалари тезлик қийматлари бўйича тақсимланади.

Савол: Молекулаларнинг (нисбий сонининг) тезликлар бўйича шу тақсимои қандай қонунга бўйсинади?

Жавоб. Идиш ичида мувозанатдаги идеал газ молекулалари учун барча йўналишлар баб-баравар (тенг кучли), яъни тенг эҳтимолли. Агар Декарт координаталари тизими қўлланилса x , y , z



6.2-расм.

йўналишлар бўйича молекулаларнинг ҳаракати баравар (6.2-расм). Масалан, OX ўқи бўйича ҳар икки томонга ҳаракатланаётган молекулалар тенг кучли (акс ҳолда зарралар бир томонда кўпроқ тўпланиб қолар эди). Айтилганларга қўра, масалан, ϑ_x , $\vartheta_x + d\vartheta_x$ ораликда OX ўқ бўйича ҳаракатланаётган молекулалар сони $dn(\vartheta_x)$ ва OX ўққа тескари йўналишда ҳаракатланаётган молекулалар сони $dn(-\vartheta_x)$ ўзаро тенг, яъни:

$$dn(\vartheta_x) = dn(-\vartheta_x) > 0. \quad (1)$$

Бошқача айтганда, $dn(\vartheta_x)$ катталиқ тезликнинг (яъни ϑ_x нинг) жуфт функциясидир:

$$dn(\vartheta_x) = f(\vartheta_x^2) d\vartheta_x. \quad (2)$$

Албатта $dn(\vartheta_x)$ оралик ϑ_x , $\vartheta_x + d\vartheta_x$ оралик (катталиқ)ка муносиб эканлиги равшандир. Ҳудди шунингдек,

$$dn(\vartheta_y) = f(\vartheta_y^2) d\vartheta_y, \quad (3)$$

$$dn(\vartheta_z) = f(\vartheta_z^2) d\vartheta_z. \quad (4)$$

ифодалар ўринли. (2), (3) ва (4) ифодаларда

$$\frac{dn(\vartheta_x)}{d\vartheta_x} = f(\vartheta_x^2), \quad \frac{dn(\vartheta_y)}{d\vartheta_y} = f(\vartheta_y^2) \quad \text{ва} \quad \frac{dn(\vartheta_z)}{d\vartheta_z} = f(\vartheta_z^2)$$

тезликнинг бирлик оралиқларидаги молекулалар сони зичликларидир. Тезликлар фазосида томонлари $d\vartheta_x$, $d\vartheta_y$, $d\vartheta_z$ бўлган параллелопипеднинг $d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z$ ҳажмдаги (6.2-расмга қаранг) молекулалар сони $dn(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z)$ ни, яъни

$$\vartheta_x, \vartheta_x + d\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_y + d\vartheta_y, \vartheta_z, \vartheta_z + d\vartheta_z \quad (5)$$

оралиқлардаги зарралар сонини топиш учун (2), (3), (4) ни ўзаро кўпайтириш лозим (қ. 6.3-расм):

$$\begin{aligned} dn(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) &= dn(\vartheta_x) dn(\vartheta_y) dn(\vartheta_z) = \\ &= f(\vartheta_x^2) f(\vartheta_y^2) f(\vartheta_z^2) d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z \end{aligned} \quad (6)$$

ёки

$$dn(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = F(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z, \quad (7)$$

бунда

$$F(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = f(\vartheta_x^2) f(\vartheta_y^2) f(\vartheta_z^2). \quad (8)$$

(8) да ўнг томон жуфт функция бўлгани учун чап томондаги $F(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z)$ ҳам жуфт функциядир:

$$F(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = F(\vartheta_x^2, \vartheta_y^2, \vartheta_z^2).$$

Бу тезликлар фазосидаги "бирлик ҳажм" га тўғри келган молекулалар сони барча йўналишлар тенг кучли бўлганлиги учун $\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z$ ларнинг алоҳида қийматларига боғлиқ бўлмай, "бирлик ҳажм" нинг қандай "масофада" (яъни $\vartheta^2 = \vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2$ да) олинганлигига боғлиқ (6.2-расмга қаранг), яъни вектор $\vec{\vartheta}$ га эмас, балки $\vartheta^2 = \vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2$ га боғлиқ. Демак,

$$F(\vartheta_x^2, \vartheta_y^2, \vartheta_z^2) = F(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2). \quad (9)$$

Шундай қилиб,

$$F(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2) = f(\vartheta_x^2) f(\vartheta_y^2) f(\vartheta_z^2) \quad (10)$$

эканлиги аниқланди.

(10)нинг ҳар икки томонидан ϑ_x^2 бўйича ҳосила олайлик:

$$\frac{\partial F}{\partial \vartheta_x^2} \frac{\partial \vartheta^2}{\partial \vartheta_x^2} = \frac{\partial F}{\partial \vartheta_x^2} = \frac{\partial F}{\partial \vartheta^2}, \quad (11)$$



6.3-расм.

$$\frac{\partial f(\vartheta_x^2)}{\partial \vartheta_x^2} \cdot f(\vartheta_y^2) f(\vartheta_z^2), \quad (12)$$

буларни тенглаштириб, сўнгра ҳар икки томонини (10) ифодага бўлиб, ушбуни топамиз:

$$\frac{\partial F(\vartheta^2)}{F \partial \vartheta^2} = \frac{\partial f(\vartheta_x^2)}{f(\vartheta_x^2) d \vartheta_x^2} \quad (13)$$

Худди шунингдек, бошқа ϑ_y, ϑ_z проекциялар учун ҳам (13) каби ифодаларни ёзиш мумкин. Сунгра уларнинг ҳар доим бир-бирларига тенглигидан улар бирор доимий сон $\beta > 0$ га тенг эканлиги келиб чиқади, яъни:

$$\frac{1}{F} \frac{\partial F(\vartheta^2)}{\partial \vartheta^2} = \frac{1}{f(\vartheta_x^2)} \frac{\partial f(\vartheta_x^2)}{d \vartheta_x^2} = \frac{1}{f(\vartheta_y^2)} \frac{\partial f(\vartheta_y^2)}{d \vartheta_y^2} = \frac{1}{f(\vartheta_z^2)} \frac{\partial f(\vartheta_z^2)}{d \vartheta_z^2} = -\beta. \quad (14)$$

Бундан

$$F(\vartheta) = A e^{-\beta \vartheta^2}, \quad f(\vartheta_i) = B e^{-\beta \vartheta_i^2} \quad (15)$$

тақсимот қонунини топамиз. β нинг мусбат қилиб олингани термодинамикадаги муносабатларга мос келади. (8) ва (15) муносабатлардан $A = B^3$ эканлиги келиб чиқади.

A (ёки B) ни нормалаш шarti

$$B \int e^{-\beta \vartheta_i^2} d \vartheta_i = 1 \quad (16)$$

дан аниқланади: $B = (\beta/\pi)^{1/2}$. Демак,

$$f(\vartheta_i) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\beta \vartheta_i^2}, \quad (17)$$

$$F(\vartheta) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta(\vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2)}. \quad (18)$$

(17) ва (18) ифодаларни **Максвелл тақсимот қонуни** дейилади. Бу қонунни, юқорида айтганимиздек, 1859 йилда Максвелл кашф этган.

Максвелл тақсимот қонуни — бирлик "ҳажмга" туғри келган эҳтимоллик

$$dn(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) / d \vartheta_x d \vartheta_y d \vartheta_z = F(\vartheta) \quad (19)$$

ϑ нинг камайиши билан ортиб боради ва ϑ нинг энг кичик қиймати $\vartheta = 0$ да энг катта қийматга эришади. Бу эса Максвелл (ёки Максвелл—Больцман) тақсимот функциясининг одатдаги тушунтирилишига зиддир. Бу зиддият айниқса бир

ўлчовли ҳолни қаратаётганда яққол намоён бўлади. Ҳақиқатдан ҳам, узгармас узунликка эга бўлган оралиқ $\vartheta_x, \vartheta + d\vartheta$ га тугри келган молекулалар (нисбий) сони

$$dn(\vartheta_x) = f(\vartheta_x) d\vartheta_x. \quad (20)$$

(17) га асосан ϑ_x^2 камайиши билан $f(\vartheta_x)$ ва, демак, $dn(\vartheta_x)$ ортиб боради ва $\vartheta_x = 0$ да (аниғи $\vartheta_x = 0$ ни ўз ичига олган оралиқда) $f(\vartheta_x)$ ва, демак, $dn(\vartheta_x)$ энг катта қийматга эга бўлади. Худди шунингдек, $dn(\vartheta_y), dn(\vartheta_z)$ га нисбатан ҳам юқоридагиларни айтиш мумкин. Демак, яна ϑ нинг камайиши билан $F(\vartheta)$ нинг ортишини тушунишга келамиз. (Эслатамиз: $d\vartheta_x, d\vartheta_y, d\vartheta_z$ лар узгармас катталиклар деб ҳисобланади). Ҳосил бўлган бу зиддиятни (парадоксни) бартараф этиш учун эҳтимоллик dW ни одатдаги тушунтиришга тузатиш киритиш лозим: Ҳақиқатда $dW(\vartheta)$ мураккаб воқеанинг эҳтимоллиги: у ϑ векторнинг учи $\vartheta_x, \vartheta_x + d\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_y + d\vartheta_y, \vartheta_z, \vartheta_z + d\vartheta_z$ оралиқларда бўлиш эҳтимоллиги (одатда шу иборани айтиш билан чекланилади). Бу эҳтимоллик — ансамбль элементлари эҳтимолликларининг текис (тенг) тақсимланиши ҳақидаги бизнинг постулатимизга асосан $d\vartheta_x, d\vartheta_y, d\vartheta_z$ ҳажмга пропорционал ва V векторнинг қийматлари $(0, \vartheta)$ оралиқда бўлмаслик эҳтимоллиги (бу эҳтимоллик $\exp(-\beta\vartheta^2)$ га тенг) купайтмасидан иборат. Бунда $(0, \vartheta)$ оралиқда ϑ қийматининг бўлмаслик эҳтимоллиги $\exp(-\beta\vartheta^2)$ оралиқ узунлиги ϑ камайгани сари ортиб боради ва у нол узунликка эга оралиқда $(0, 0)$ муқаррар воқеанинг эҳтимоллигига тенглашади, яъни $\exp(-\beta\vartheta^2) = 1$ бўлади.


6.1-мисол. Молекуляр-кинетика асосида идиш деворига босимни аниқлаш.

Молекуляр-кинетик тасаввурга асосан, идиш деворига идеал газ молекулаларининг босими: бу бирлик юзага бирлик вақтда (масалан, $\Delta S = 1 \text{ см}^2, \Delta t = 1 \text{ с}$) молекулалар томонидан берилаётган импульсларга тенг. ОХ ўққа тик бўлган идиш деворига фақат тезлик проекцияларидан $\vartheta_x > 0$ бўлганларигина импульс беради (қ. 6.4-расм), молекула деворга

урилиб қайтганда унинг тезлиги $-\vartheta_x$ га тенг бўлади. Демак, зарранинг (молекуланинг) идиш деворига бераётган импульси

$$m\vartheta_x - (-m\vartheta_x) = 2m\vartheta_x \quad (1)$$

бўлади. ϑ_x , $\vartheta_x + d\vartheta_x$ оралиқдаги бундай тезликли молекулалар сони



6.4-расм.

$$dn(\vartheta_x) = n\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\beta\vartheta_x^2} d\vartheta_x. \quad (2)$$

Демак, бу молекулаларнинг идиш деворига бераётган импульслари

$$2m\vartheta_x \cdot dn(\vartheta_x) = 2mn\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} \vartheta_x e^{-\beta\vartheta_x^2} d\vartheta_x \quad (3)$$

дан иборат. Бирлик вақтда (масалан, 1 секундда) идиш деворига етиб бориб уриладиган ϑ_x тезликли молекулалар сони топиш учун (3) ифодани цилиндр ҳажми ϑ_x га купайтириш зарур (6.5-расм), яъни

$$2m\vartheta_x^2 \cdot dn(\vartheta_x) = 2mn\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} v_x^2 e^{-\beta\vartheta_x^2} d\vartheta_x. \quad (4)$$


Юқоридаги босим таърифига асосан, босим P ни топиш учун (4) ни $(0, \infty)$ оралиқда интеграллаш керак (манфий йўналишдаги молекулалар деворга урилмайди!)

$$P = 2mn\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} \int_0^{\infty} V_x^2 e^{-\beta\vartheta_x^2} d\vartheta_x, \quad (5)$$

$$J = \int_0^{\infty} V_x^2 e^{-\beta\vartheta_x^2} d\vartheta_x = \left(\frac{1}{\beta}\right)^{3/2} \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{\beta^{3/2}} \frac{\sqrt{\pi}}{4}.$$

J нинг бу қийматини (5) га қўйиб, P ни топамиз:

$$P = 2mn\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{\beta^{3/2}} \frac{\sqrt{\pi}}{4} = \frac{mn}{2\beta}. \quad (6)$$



6.5-рasm.

6.5-расмдан куринадики, бирлик юзага эга булган, ясовчиси V_x га тенг цилиндр ичидаги V_x тезлик-ли ҳамма молекулалар 1 секундда идиш деворига бориб урилади.

Изоҳ. Максвелл тақсимотидаги номаълум β ни аниқлаш учун Клапейрон тенгламаси:

$$P = nkT \quad (7)$$

дан фойдаланамиз. (7) ни (6) билан солиштириб, идеал газ учун муҳим ифодани аниқлаймиз:

$$\beta = \frac{m}{2kT}. \quad (8)$$

6.2-мисол. Молекулаларнинг тезликнинг абсолют қийматлари бўйича тақсимланишини аниқлаш.

Бунда биз ϑ , $\vartheta + d\vartheta$ оралиқдаги молекулаларнинг нисбий сони $dn(\vartheta)$ ни ($dW(\vartheta)$ эҳтимолликни) аниқлайлик. (Битта зарра учун Гиббс ансамбли — бу идеал газдир!) Умумий ҳолда:

$$dW(E) = f_n(E)dE = f(\vartheta)d(\vartheta). \quad (1)$$

Идеал газ учун

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{m\vartheta^2}{2}, \quad (2)$$

$$dE = m\vartheta d\vartheta, \quad \nu = 3/2.$$

(2) ни назарда тутиб (1) дан қуйидагини оламиз:

$$f(\vartheta)d(\vartheta) = \frac{\beta^{3/2}}{\Gamma(3/2)} E^{1/2} e^{-\beta E} dE = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta, \quad (3)$$


бунда $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$, $\beta = 1/kT$ эканлиги эътиборга олинди. Демак, ϑ , $\vartheta + d\vartheta$ оралиқдаги молекулаларнинг нисбий сони $dn(V)/n$ ёки $dW(\vartheta)$ эҳтимоллик қуйидаги тақсимот қонуни билан аниқланади:

$$dn(\vartheta) = nf(\vartheta)d\vartheta, \quad (4)$$

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} \quad (5)$$

(5) ифода ҳам **Максвелл тақсимоти** деб аталади.

(5) муносабатнинг геометрик ифодасини кўрайлик (қ. 6.6-рasm). 6.6-рasmдан кўринадики, эгри чизик (буни Максвелл эгри чизиги дейилади) тезликнинг маълум ϑ , қийматида максимумдан ўтади, яъни ϑ , тезликли молекулалар сони энг кўп бўлади ва ϑ , дан кичик ва ундан катта тезликли молекулаларнинг нисбий сони кичик бўлади. (5) дан кўринадики, бу



6.6-рasm.


функция $f(\vartheta)$ нинг максимум қиймати $\vartheta_0 = \sqrt{2 \frac{kT}{m}}$ (3.14-масалага қаранг) бўлганлигидан температура ортиши билан уннг томонга силжиб боради. Масалан, $T_1 < T_2 < T_3$ ларда 6.7-рasmда Максвелл эгри чизиклари келтирилган¹.

Молекулаларнинг тезликлар буйича тақсимои қонуни — Максвелл тезликлар тақсимои тажрибаларда бир неча марта синаб кўрилган ва ўз тасдиғини топган. Шундай тажрибалардан бири — Штерн тажрибаси. Бу тажрибанинг тарҳи қуйида келтирилган (6.9-рasm). Бу тажрибада металл буглари булган печь атрофида икки коаксиал цилиндр айланади. Печь ичидаги металл буғи молекулалари мувозанат ҳолатда. Молекулалар печнинг K тирқиши ва S_1 ва S_2 тирқишларидан чиқиб, бу тирқишлар билан ички цилиндр тирқиши D бир тўғри чизикда ётганда



6.7-рasm.

¹ (3) ифодада $4\pi\vartheta^2 d\vartheta = dV(\vartheta)$ бор. Зарранинг (ёки зарраларнинг ϑ , $\vartheta + d\vartheta$ оралиқда бўлиш эҳтимоллиги, албатта радиуслари r ва $r + dr$ булган сферик сиртлар орасидаги ҳажм $dV(\vartheta) = 4\pi\vartheta^2 d\vartheta$ га мутаносиб. Иккинчи томондан, O ва ϑ тезликлар орасидаги зарранинг (зарраларнинг) тезлиги бўлмаслик эҳтимоллиги $e^{-\beta v^2/2}$ мутаносибдир. Демак, мураккаб воқеанинг, яъни (O, ϑ) да бўлмаслик ва ϑ , $\vartheta + d\vartheta$ да бўлиш-лик эҳтимоллиги улар эҳтимолликлари (3) дан иборатдир (қ. 6.8 рasm).



6.8-расм.

молекулалар D тирқишдан ўтиб ташқи цилиндр сиртга бориб ўтирадилар (ёпишадилар). Агар молекулаларнинг тезлиги жуда катта ва бир хил бўлса, улар тирқиш D нинг рўпарасига ташқи цилиндр ички сиртининг бир жойига бориб ўтирар (ёпишар) эдилар. Аммо молекуланинг тезликлари Максвелл тезликлар тақсимотига бўйсунса, улар та-

шқи цилиндр сиртига маълум ҳар хил қалинликда ўтиради. ϑ , тезликка мос келган ташқи цилиндр жойига энг кўп молекулалар бориб ўтирганлиги учун у жойда нисбатан қалин қатлам ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган қатламни текшириш молекулаларнинг тезликлар бўйича тақсимооти — Максвелл тақсимооти қонунининг ўринли эканлигини кўрсатди.

Максвелл тақсимооти татбиқига оид масалалар кўрайлик.

6.3-масала. Идеал зарраларнинг тақсимоот функцияси ва статистик интеграл Z_1 аниқлансин.

Е ч и ш. Умумий ҳолда:

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad (1)$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{\beta \vartheta h^3 q}{A \Gamma(\nu + 1)}. \quad (2)$$

Шунинг учун қуйидагини ёзишимиз мумкин:

$$E = \frac{m \vartheta^2}{2} = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2). \quad (3)$$



6.9-расм.

2ν — энергия E ни (гамильтониани) аниқлайдиган ўзгарувчилар сони. Бу қаралаётган ҳолда $S = 3$, $2\nu = 3$ бўлади. У ҳолда

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{h^3 \beta^{3/2}}{A \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right)}. \quad (4)$$

$$\Gamma = \int dx dy dz \int dP_x dP_y dP_z = V \cdot \frac{4\pi}{3} (2mE)^{3/2} = A \cdot E^{3/2},$$

$$E \leq \frac{1}{2m} (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2),$$

$$A = V \frac{4\pi}{3} (2m)^{3/2};$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \Gamma(3/2) = \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \beta = 1/kT.$$

Демак, идеал газ статистик интеграл Z_1 учун ушбу ифодани оламиз:

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}. \quad (5)$$

Идеал газнинг тақсимои функцияси

$$f(E) = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta E}, \quad (6)$$

қуринишда аниқланди.

6.4-масала. Идеал газ молекулаларининг тезликнинг абсолют қийматлари бўйича тақсимои аниқлансин.

Ечиш. Идеал газ — битта зарра учун статистик ансамбл эканлигини назарда тутиб,

$$E = \frac{m\vartheta^2}{2}, \quad \vartheta^2 = \vartheta_x^2 + \vartheta_y^2 + \vartheta_z^2 \quad (1)$$

ифодани ёзамиз. Бу ҳолда $2\nu = 3$. Демак, тақсимои функцияси

$$dW(E) = dW(\vartheta) = \frac{\beta^{3/2}}{\Gamma(3/2)} E^{1/2} e^{-\beta E} dE, \quad (2)$$

$$dE = m\vartheta d\vartheta, \quad \Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2. \quad (3)$$

Демак, изланаётган тақсимои функцияси ифодасини топамиз:

$$dW(\vartheta) = f(\vartheta) d\vartheta = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta, \quad (4)$$

бунда эҳтимолликлар зичлиги

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}}, \quad \theta = kT. \quad (5)$$

Бу Максвелл тақсимои функциясидир.

1-и з о ҳ. Идеал газ учун тажриба кўрсатадики, $\theta = kT$.
 2-и з о ҳ. Идеал газ — Гиббс ансамбли. Ансамбл элементи — бу битта зарра.

6.5-масала. Тизим N та классик идеал заррадан иборат бўлсин. Қуйидаги эҳтимолликлар аниқлансин:

а) p импульс қийматининг p , $p + dp$ оралиқда бўлиши; бунда

$$E = p^2 / 2m, \quad p^2 = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{3N}^2; \quad (1)$$

б) $p_1, p_2, \dots, p_{3N}$ импульслар қийматларининг

$$\begin{aligned} & p_1, p_1 + dp_1, \\ & p_2, p_2 + dp_2, \\ & \dots \dots \dots \\ & p_{3N}, p_{3N} + dp_{3N} \end{aligned} \quad (2)$$

оралиқларда бўлиши;

в) $P_1, P_2, \dots, P_{3N}$ импульслар қийматларининг (2) оралиқларда бўлиши, умумлашган $q_1, q_2, \dots, q_{3N}$ координаталар қийматларининг

$$\begin{aligned} & q_1, q_1 + dq_1, \\ & \dots \dots \dots \\ & q_{3N}, q_{3N} + dq_{3N} \end{aligned} \quad (3)$$

оралиқларда бўлиши.

Е ч и ш. (1) дан кўрамизки, гамильтониан (энергия E) ни аниқлайдиган ўзгарувчилар сони $3N$ га тенг, яъни $2v = 3N$.

а) $2v = 3N$ ва (1) ни назарда тутиб, энергия ва, демак, импульс қийматлари учун изланаётган эҳтимоллик $dW(p)$ ни ёзамиз:

$$\begin{aligned} dW(E) = dW(p) &= \frac{\beta^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{\frac{3N}{2}-1} e^{-\beta E} dE = \\ &= \left(\beta^{3N/2} / \Gamma(3N/2) \right) \frac{1}{m} \left(\frac{1}{2m} \right)^{\frac{3N}{2}-1} p^{3N-1} e^{-\beta E} dp. \end{aligned} \quad (4)$$

Агар N — жуфт бўлса, $\Gamma(3N/2) = \left(\frac{3N}{2} - 1 \right)!$ Агар N тоқ бўлса,

$$\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right) = \left(\frac{3N}{2} - 1\right)\left(\frac{3N}{2} - 3\right) \dots \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

б) (1) даги

$$p^2 = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{3N}^2$$

$3N$ ўлчамли импульслар фазосидаги шар тенгламасидир. Бу шарнинг ҳажми:

$$V_{3N}(p) = C_{3N} p^{3N}.$$

Радиуслари p ва $p + dp$ бўлган гиперсфералар орасидаги ҳажм

$$dV_{3N}(p) = 3NC_{3N} p^{3N-1} dp \quad (5)$$

бўлади. Аёнки, $N=1$ да $C_3 = 4\pi/3$. (5) ифодани назарда тутиб, (4) эҳтимолликни қайта ёзамиз:

$$dW(p) = \frac{\beta^{3N/2}}{3NC_{3N}\Gamma(3N/2)} \frac{1}{m} \left(\frac{1}{2m}\right)^{\frac{3N}{2}-1} e^{-\beta E} dV_{3N}(p), \quad (6)$$

бунда P ва, демак, $V_{3N}(p)$ ҳажм $(0, \infty)$ оралиқда ўзгаради.

Гиперсфералар орасидаги элементар ҳажм $dV_{3N}(p)$ бўйича интеграллаш ўрнига, табиийки, гиперкуб элементар ҳажми $dp_1 dp_2 \dots dp_{3N}$ бўйича интеграллаш мумкин, яъни:

$$\int_0^\infty dV_{3N}(p) = \int \dots \int dp_1 dp_2 \dots dp_{3N}. \quad (7)$$

Аммо $f_{3N}(p)dV_{3N}(p)$ ва $f_{3N}(p_1, p_2, \dots, p_{3N}) dp_1 dp_2 \dots dp_{3N}$ лардаги эҳтимолликлар зичликлари $f_{3N}(p)$ ва $f(p_1, p_2, \dots, p_{3N})$ ларни тенглаштириш учун p нинг ҳар бир қийматини $p_1, p_2, \dots, p_{3N}$ лардан неча хил усуллар билан олиниш сонини ҳисобга олиш зарур.

Ҳар бир зарранинг p_x, p_y, p_z ларининг алмаштириш зарранинг янги энергиясига олиб келмайди. Шу сабабли усуллар сонини ҳисоблаганда бундай алмаштиришларни эътиборга олмаймиз. Бу ҳолда

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_N$$

бўлганлигидан p (ёки E) қийматни ("сузни") ҳосил қилувчи элементлар ("ҳарфлар") сони N га тенг бўлади. Бу элемент-

лар i та ҳопаларда (зарраларда) жойлашади. Маълумки, N элементларни $Z = N$ (ячейкаларда) ҳоналарда жойлаштириш усуллари сони $Z^N = N^N$ га тенг.

$dW(p) = f(p)dp$ даги эҳтимолликлар зичлиги $f(p)$ ни қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$f(p)dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} = f(E_1)dp_1, dp_2 \dots f(E_N)dp_{1,N} dp_{2,N} \dots dp_{3N} \quad (8)$$

Унг томондаги купайтмаларнинг ҳар бири $f(E_i)dp_1 dp_2 dp_3$ бир заррага тегишли эҳтимоллик. Зарралар классик идеал зарралар эканлигини эътиборда тутамиз. Энергияси ёки импульси E , $E + dE$ ёки p , $p + dp$ да бўлган ва ҳамда гиперкублардан бирида (яъни (2) ораликда) бўлиш эҳтимоллиги $dW_p(p_1, p_2, \dots, p_{3N}) = f_p(p_1, p_2, \dots, p_{3N})dp_1 dp_2 \dots dp_{3N}$ ни топиш учун (8) ни усуллар сони N^N га купайтириш лозим, яъни:

$$\begin{aligned} dW_p &= f_p(p_1, \dots, p_{3N})dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} = N^N f(p)dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} = \\ &= N^N \frac{\beta^{3N/2} \frac{1}{m} \left(\frac{1}{2m} \right)^{\frac{3N}{2}-1}}{3NC_{3N} \Gamma(3N/2)} \times \\ &\times e^{-\beta E} dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} = N^N \frac{(\beta/2m)^{3N/2}}{C_{3N} \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right)} e^{-\beta E} dp. \end{aligned} \quad (9)$$

Изланаётган (2) ораликдаги $dW(p, \dots, p_{3N})$ эҳтимоллик (9) ифода орқали аниқланади. Юқоридагиларни солиштиришдан

$$dV_{3N}(p) = N^N dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} \quad (10)$$

экани келиб чиқади.

Бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, (9) ни $p_1, p_2, \dots, p_{3N}$ лар бўйича $(-\infty, +\infty)$ ораликда интегралланганда, $f(p)$ нинг dV бўйича $(0, \infty)$ ораликдаги интеграли билан бир хил бўлиши учун уни N^N га бўлиш керак¹.

¹ Бу масаланинг статистик физикадаги баёнида (9) интегрални $E_1, E_2, \dots, E_N$ ларнинг ўрин алмаштиришлари сони M га бўладилар. Бу ҳолда N^N усуллар сонининг бир қисмидир.

Энди (9) ифодадаги C_n ни аниқлайлик. Бунинг учун қуйидаги интегрални икки хил усул билан ҳисоблаймиз.

$$V_n = C_n x^n \quad dV_n = n C_n x^{n-1} dx$$

эканлигини кўзда тутиб, ёзамиз:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx_1 e^{-x_1^2} \dots \int_{-\infty}^{\infty} dx_n e^{-x_n^2} = \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right]^n = \pi^{n/2}, \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)} dx_1 dx_2 \dots dx_n &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dV_n(x) = \\ &= n C_n \int_0^{\infty} e^{-x^2} x^{n-1} dx = C_n \frac{n}{2} \int_0^{\infty} e^{-y} y^{\frac{n}{2}-1} dy = C_n \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right). \end{aligned} \quad (12)$$

(11) ва (12) дан:

$$C_{3N} = \pi^{3N/2} / \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right). \quad (13)$$

(13) ни назарда тутиб, (9) ни бундай ёзамиз:

$$\begin{aligned} dW_p(p_1, p_2, \dots, p_{3N}) &= N^N \beta^{3N/2} \left(\frac{1}{2\pi m}\right)^{3N/2} \pi^{3N/2} e^{-\beta E} dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} = \\ &= N^N \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{\frac{3N}{2}} e^{-\beta E} dp_1 dp_2 \dots dp_{3N}. \end{aligned} \quad (14)$$

в) Ташқи майдон бўлмаганда идеал классик зарралар идиш ҳажми V да текис тақсимланади. Шу сабабли умумлашган координаталарнинг (3) оралиқда бўлиш эҳтимоллиги $dW(q_1, q_2, \dots, q_{3N})$ қуйидагича аниқланади:

$$dW(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) = \frac{dq_1 dq_2 \dots dq_3}{V} \dots \frac{dq_{3N-2} dq_{3N-1} \dots dq_{3N}}{V}. \quad (15)$$

Умумлашган импульслар ва умумлашган координаталарнинг бир вақтда (2) ва (3) оралиқларда бўлиш эҳтимоллиги (14) ва (15) эҳтимолликларнинг кўпайтмасига тенг, яъни:

$$\begin{aligned} dG(p_1, p_2, \dots, p_{3N}; q_1, q_2, \dots, q_{3N}) &= \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{\frac{3N}{2}} \times \\ &\times e^{-\beta E} dp_1 dp_2 \dots dp_{3N} dq_1, \dots, dq_{3N}. \end{aligned} \quad (16)$$

Бу ифодада

$$d\Gamma = dp_1 \dots dp_{3N} \dots dq_1 \dots dq_{3N}$$

[энергия вақт]^{3N} ўлчамликка эга ва, демак, эҳтимолликлар зичлиги ҳам [энергия вақт]^{3N} ўлчамликка эгадир. Аммо математик нуқтаи назардан эҳтимолликлар зичлиги ўлчамсиз миқдор бўлгани маъқул.

Шу сабабли, (16) ни ўлчамлиги [эрг·сек] бўлган h^{3N} га бўлиб, h^{3N} га кўпайтирамиз, яъни:

$$dG = \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m}\right)^{3N/2} e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{h^{3N}} = f(E) dn \quad (17)$$

Бунда:

$$dn = d\Gamma/h^{3N}, \quad f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}, \quad (18)$$

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m}\right)^{3N/2} \quad (19)$$

Z_N бу ерда N та идеал заррадан ташкил топган газнинг статистик интеграли.

6.6-масала. Идеал газ зарраларининг бир-бирига боғлиқ эмаслигидан фойдаланиб, аввалги масаладаги $dW(p, q)$ эҳтимолликни аниқланг.

Еч и ш. Умумлашган импульсларнинг (2) ораликда, умумлашган координаталарнинг эса (3) ораликда бўлиш эҳтимоллиги $dW(p, q)$ қуйидаги эҳтимолликларнинг кўпайтмасидан иборат:

$$dW_i(p_x, p_y, p_z; q_x, q_y, q_z) = \frac{1}{Z_i} e^{-\beta E} dn_i; \quad i = 1, 2, \dots, N, \\ dn_i = dP_x dP_y dP_z dq_x dq_y dq_z / h^3, \quad \frac{1}{Z_i} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi}\right)^{3/2}. \quad (20)$$

Зарралар бир-бирига боғлиқ бўлмагани учун изланаётган $dW(p, q)$ эҳтимоллик dW_i эҳтимолликларнинг узаро кўпайтмасига мутаносиб, яъни:

$$dW(p_1, p_2, \dots, p_{3N}; q_1, \dots, q_{3N}) \sim \prod_i dW_i. \quad (21)$$

Бу ерда E нинг қийматини $E_1, E_2, \dots, E_N$ лардан N та усул билан ҳосил қилиш мумкинлигини (ҳолатнинг айниш қаралигини) ҳисобга олсак, изланаётган ифодаларни оламит:

$$dW(p, q) = N^N \prod_i dW_i -$$

$$= \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3N/2} e^{-\beta E} dp_1 \dots dq_{3N} = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta E} dn, \quad (22)$$

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{\hbar^2 \beta}{2\pi m}\right)^{3N/2}. \quad (23)$$

1-и з о ҳ. (9) ва (22) ларни солиштириб,

$$C_{3N} = \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right)}$$

эканлигини кураимиз.

2-и з о ҳ. Аввалги масалани бошқа усул билан ечиш мумкин. Бизга статистик интеграл ифодаси маълум:

$$\frac{1}{Z_N} = \frac{\beta^N \hbar^3 q}{A \Gamma(v+1)}, \quad (24)$$

Бунда:

$$E = \sum_i E_i, \quad E_i = \frac{1}{2m} (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2) \quad (25)$$

Бу ҳолда $2v = 3N$ ёки

$$v = \frac{3N}{2}, \quad s = 3N. \quad (26)$$

E ни ҳосил қилувчи усуллар сони $g = N^3$. Энди $\Gamma(v+1)$ ва A ни ҳисоблаш лозим.

Агар N жуфт бўлса, $\Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) = \frac{3N}{2}!$.

Агар N тоқ бўлса, $\Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) = \frac{3N}{2} \left(\frac{3N}{2} - 1\right) \dots \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

Фазавий фазо ҳажми

$$\Gamma = A E^v = A E^{3N/2}. \quad (27)$$

Иккинчи томондан,

$$\begin{aligned} \Gamma &= \int dq dp = V^N \cdot \int_{E \leq \frac{1}{2m}(p_1^2 + p_2^2 + p_{3N}^2)} dp = V^N \cdot C_{3N} (2mE)^{3N/2} = \\ &= V^N C_{3N} (2m)^{3N/2} E^{3N/2}. \end{aligned} \quad (28)$$

(27) ва (28) дан:

$$A = V^N C_{3N} (2m)^{3N/2}. \quad (29)$$

Бунда:

$$C_{3N} = \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right)}. \quad (30)$$

(29) ва (30) ни назарда тутиб, (24) дан яна аввалги натижа (23) ни оламир.

6.7-масала. m массали зарра бир ўлчовли фазода (кутида) $(0, l)$ оралиқда ҳаракатланаётир (6.10 расм). Шу зарранинг квант ҳолатлари сонини аниқланг ва уни фазавий фазо билан солиштиринг.

Е ч и ш. Бу ҳол учун Шредингер тенгламаси қуйидагидек бўлади:

$$-\frac{\hbar}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E \psi(x). \quad (1)$$

Бу тенгламанинг ечими

$$\psi(x) = A e^{i \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x} + B e^{-i \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x}.$$

Эйлер формуласидан фойдаланиб, буни

$$\psi(x) = a \sin \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x + b \cos \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x \quad (2)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Идиш деворида $x=0$, $x=l$ да


$$\psi(0) = \psi(l) = 0 \quad (3)$$

бўлсин. Бу ҳолда умумий ечим (2)

$$\psi(x) = a \sin \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x \quad (4)$$

кўринишга келади, чунки бу чегаравий ҳолда $\psi(l) = 0$ бўлиши талаб этилади.

$$\psi(l) = a \sin \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} l = 0$$



6.10-расм.

дан

$$\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} l = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5)$$

экани келиб чиқади. Бундан:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} n^2 = \frac{\hbar^2}{8ml^2} n^2. \quad (6)$$

Бундан ҳолатлар сони n ни топамиз:

$$n = \sum_{E_n \leq E} 1 = \sqrt{\frac{8ml^2 E}{\hbar^2}} = \frac{\sqrt{8ml^2 E}}{\hbar} = \frac{\Gamma}{\hbar}, \quad (7)$$

Бунда фазавий фазо ҳажми

$$\Gamma = \sqrt{8ml^2 E} = 2l\sqrt{2mE} = AE^{1/2} \quad (8)$$

ифода билан аниқланади. Бир ўлчовли фазо учун

$$\Gamma \sim E^{1/2}$$

ва

$$A = 2l(2m)^{1/2}.$$

6.8-масала. Бир ўлчовли ҳол учун статистик интеграл Z , каноник тақсимот ва Максвелл тезликлар тақсимотини ҳолатлар зичлиги ифодасидан фойдаланиб аниқланг.

Еч и ш. Бир ўлчовли ҳол учун $E(V) = m\vartheta_x^2 / 2$, демак,

$$\vartheta = 1/2, \quad s = 1, \quad g = 1.$$

Бир ўлчовли ҳол учун зарранинг энергияси (6.7-масалага қ.).

$$E = \frac{\hbar^2}{8mL^2} n^2, \quad (1)$$

бунда L — "кути" нинг кенглиги. Бундан:

$$\frac{dE}{dn} = E^{1/2} \left(\frac{\hbar^2}{2mL^2} \right)^{1/2}. \quad (2)$$

Z нинг ифодаси

$$\frac{1}{Z} = \frac{\beta^r}{\Gamma(v)} E^{v-1} \frac{dE}{dn} \quad (3)$$

дан, (2) ни эътиборга олиб, ушбуни топамиз:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{L} \left(\frac{\beta \hbar^2}{2\pi m} \right)^{1/2}. \quad (4)$$

Демак, каноник тақсимот функцияси:

$$f(p, q) = \frac{1}{L} \left(\frac{p h^2}{2\pi m} \right)^{1/2} e^{-\beta E} \quad (5)$$

Бир ўлчовли ҳолда:

$$dn = \frac{dp_x dq_x}{h} = \frac{m}{h} d\vartheta_x dq_x$$

dq_x бўйича интегралласак,

$$dn = \frac{mL}{h} d\vartheta_x$$

бўлади. Энди

$$f(\vartheta_x) d\vartheta_x = f(p, q) dn$$

тенгликдан қуйидагини топамиз:

$$f(\vartheta_x) d\vartheta_x = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{m v_x^2}{2kT}} d\vartheta_x \quad (6)$$

Бунда $f(\vartheta_x)$ бир ўлчамли ҳол учун Максвелл тезликлар тақсимотидир.

6.9-масала. m массали зарра L ёнли куб ичида ҳаракатланаётир. Ҳолатлар сони ва фазавий фазони аниқланг.

Е ч и ш. Бу ҳол учун Шредингер тенгламаси:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi = E \psi; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1)$$

Ечимни

$$\psi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z) \quad (2)$$

қурунишда излаймиз. (2) ни (1) га қўйиб, ёзамиз:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{X''}{x} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{Y''}{y} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{Z''}{z} = E, \quad (3)$$

$$X'' = \frac{\partial^2 X}{\partial x^2}, \quad Y'' = \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}, \quad Z'' = \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}.$$

(3)да ҳар бир ҳад x ёки y га, ёки z га боғлиқ бўлиб, уларнинг йиғиндиҳи доимий E га тенг. Демак, ҳар бир ҳад доимий сонга тенгдир, яъни:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 X}{dx^2} = E^{(1)}, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Y}{dy^2} = E^{(2)}, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Z}{dz^2} = E^{(3)} \quad (4)$$

Аввал эҳтисобнинг ечимидан фойдаланиб, қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\psi(x, y, z) = S \sin \frac{n_1 \pi}{L} x \sin \frac{n_2 \pi}{L} y \sin \frac{n_3 \pi}{L} z, \quad (5)$$

$$E_n = E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2). \quad (6)$$

Демак, ҳолатлар сонини белгилаймиз:

$$\sum_{E_n \leq E} 1 = \sum_{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \leq \frac{8mL^2}{h^2} E} 1 \quad (7)$$

E етарли даражада катта бўлганда:

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \frac{8mL^2}{h^2} E. \quad (8)$$

(8) ни шар тенгламаси деб қараб, бу шарнинг ҳажмини аниқлаймиз:

$$V_n = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{8mL^2}{h^2} E \right)^{3/2}. \quad (9)$$

n_1, n_2, n_3 координаталарнинг бутун ва мусбат қийматларига тўғри келган панжаранинг ҳар бир нуқтаси квант-ҳолатга мос келади. Бундай n_1, n_2, n_3 нинг мусбат қийматларига мос келган ҳажм V_n нинг қисми (9) нинг 8 га бўлинганига тенг, яъни:

$$\frac{V_n}{8} = \frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} \left(\frac{8mL^2}{h^2} E \right)^{3/2} \quad (10)$$

Демак, ҳолатлар сони:

$$\sum_{E_n \leq E} 1 = \frac{4\pi}{3} \frac{V}{h^3} (2mE)^{3/2} = \frac{\Gamma}{h^3}, \quad (11)$$

$$\Gamma = AE^{3/2}, \quad L^3 = V, \quad A = V \frac{4\pi}{3} (2m)^{3/2}. \quad (12)$$

Изоҳ. Классик ҳолда фазавий фазо Γ ни бевосита қуйидагича аниқланади:

$$\Gamma = \int_{E_n \leq E} d\vec{q} d\vec{p} = V \frac{4\pi}{3} (2mE)^{3/2}$$

Бу ифода (12)га мос келади.

6.10-масала. $N = 1$ бўлганда статистик интегрални ҳисобланг.

Ечиш. Биринчи усул. Бу масалда $g=1, s=3, 2v=3$, Z ни ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^3} \int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z dq_x dq_y dq_z = \\ &= \frac{V}{h^3} \int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = \\ &= \frac{V}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right]^3 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}. \end{aligned} \quad (13)$$

Иккинчи усул. Бу ҳолда шар тенгламаси

$$2mE = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$$

ни назарда тутиб,

$$V_p = \frac{4\pi}{3} (2m)^{3/2} E^{3/2}$$

эканлигини оламиз; $\Gamma = (3/2 + 1) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.

Демак, $1/Z_N = \beta^v h^3 / A \Gamma (v+1)$ ифодадан қуйидагини оламиз:

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \quad (14)$$

6.11-масала. N та идеал газ учун статистик интегрални ҳисобланг.

Ечиш. Биринчи усул. Бу ҳолда $s=3N, 2v=3N, g=N^v$ ни ҳисоблаймиз.

$$\begin{aligned} Z_N &= \frac{1}{h^{3N} N^N} \int e^{-\beta E_p} dp dq = \frac{V^N}{h^{3N} N^N} \int e^{-\beta E_p} dp = \\ &= \frac{V^N}{h^{3N} N^N} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3N/2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right]^{3N} = \left(\frac{V}{N} \right)^N \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}. \end{aligned} \quad (15)$$

Иккинчи усул

$$\Gamma_E = \int dp dq = V^N \int dp, \quad (16)$$

$$2mE = p^2 = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{3N}^2$$

дан шар ҳажми

$$\int dp = C_{3N} (2mE)^{3N/2}. \quad (17)$$

Бунда

$$C_{3N} = \pi^{3N/2} / \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right). \quad (18)$$

Демак,

$$A = (2\pi m)^{3N/2} \frac{V^N}{\Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right)}. \quad (19)$$

Буни назарда тутиб, Z_N ифодани ёзамиз:

$$\frac{1}{Z} = \left(\frac{N}{V}\right)^N \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m}\right)^{3N/2}. \quad (20)$$

(15) ва (20) ифодалар бир хил.

6.12-масала. Чизиқли гармоник осцилляторнинг статистик интегралини ҳисобланг.

Еч и ш. Чизиқли гармоник осциллятор учун

$$s = 1, 2\nu = 2, g = 1,$$

статистик интеграл Z ни ҳисоблаймиз:

$$Z = \frac{1}{h} \int e^{-\beta E} dp dq. \quad (1)$$

Бунда:

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}. \quad (2)$$

Демак,

$$Z = \frac{1}{h} \frac{2\pi}{\beta} \left(\frac{m}{k}\right)^{1/2} = \frac{1}{\beta \hbar \omega}. \quad (3)$$

бунда $(k/m)^{1/2} = \omega$ эканлиги назарда тутилди. Энди Z ни иккинчи усул бўйича ҳисоблайлик:

$$\frac{1}{Z} = \frac{\hbar \beta}{A}; \quad \Gamma(2) = 1. \quad (4)$$

(2) ифода яримўқлари

$$a = \sqrt{2mE}, \quad b = \sqrt{2E/k}$$

булган эллипснинг тенгламаси. Эллипс билан чегараланган фазо ("ҳажм" $\Gamma_E = AE$) қуйидагича аниқланади:

$$\Gamma_E = \pi ab = 2\pi E/\omega.$$

Демак,

$$A = 2\pi/\omega.$$

Шундай қилиб, Z учун

$$\frac{1}{Z} = \beta \hbar \omega \quad (5)$$

ни топамиз. (3) ва (5) ифодалар бир хил. Энди чизиқли осцилляторнинг энергияси дискрет

$$E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (6)$$

қийматлар қабул қилишини ҳисобга олиб, статистик йиғинди

$$Z = \sum_n e^{-\beta \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)} \quad (7)$$

ни ҳисоблайлик. (6) ни назарда тутиб (7) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$Z = e^{-x/2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx}, \quad (8)$$

бунда $x = \beta \hbar \omega$ (8) да йиғинди камаювчи геометрик прогрессия. Шунинг учун

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = \frac{1}{1 - e^{-x}}, \quad (9)$$

(8) ва (9) лардан

$$Z = \frac{1}{e^{x/2} - e^{-x/2}} \quad (10)$$

Бизнинг усулимизда $\beta = 1/U$. Бу қаралаётган ҳол учун $\beta = 1/U$, бунда U — чизиқли осцилляторнинг ўртача энергияси. Бу ўртача энергия умумий ҳолда

$$U = \frac{\hbar \omega}{2} \frac{e^{x/2} + e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}}, \quad x = \hbar \omega / kT \quad (11)$$

эканлигини ҳисобга олсак, x нинг кичик қийматларида, яъни хусусий ҳолда (3) ёки (5) дан (10) ифода Z келиб чиқади.

Изоҳ. Бу масалада (3) ва (10) ифодаларнинг бир-бирига аниқ мос келмаслигининг сабаби: (3) интеграл, (10) йиғинди (дискрет қийматлар учун) усуллар билан аниқланган. x нинг кичик қийматларида дискрет хоссалар кичик бўлган ҳолларда уларнинг бир-бирига мос келиши табиийдир.

6.13-масала. Чизиқли гармоник осцилляторнинг фаза-вий фазо ҳажми ва ҳолатлар сони аниқлансин.

Е ч и ш. Осциллятор тенгламаси

$$\frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = E. \quad (1)$$

Бунн

$$\frac{p_x^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/k} = 1 \quad (2)$$

кўринишда ёзиб, у эллипс тенгламаси эканлигини кўра-
миз. E энергияли осцилляторнинг фазавий фазоси ҳажми
(у сиртдан иборат бўлади)

$$S_E = \pi \sqrt{2mE} \sqrt{\frac{2E}{k}} = \frac{2\pi E}{\sqrt{k/m}} = \frac{2\pi E}{\omega}, \quad (3)$$

бу ерда $\omega = \sqrt{k/m}$ даврий частота.

S_E ни h га бўлиб, ҳолатлар сонини топамиз:

$$\frac{S_E}{h} = \frac{2\pi E}{h\omega} = \frac{E}{h\omega}. \quad (4)$$

Квант механикасида энергиянинг қийматлари

$$E_n = h\omega (n + 1/2) \quad (5)$$

ифода билан аниқланади. Демак, ҳолатлар сони

$$\sum_i l_i = \frac{E}{h\omega} = n + \frac{1}{2}. \quad (6)$$

Икки эллипс орасидаги сиртни ("ҳажм"ни) аниқлайлик.
(3) дан

$$S_n - S_{n-1} = \frac{2\pi}{\omega} h\omega = h. \quad (7)$$

Энг кичик "ҳажм" элементи h га тенг.

Бу ерда

$$S = AE, \quad A = \frac{2\pi}{\omega} = \tau - \text{давр}. \quad (8)$$

6.14-масала. N та осциллятордан иборат тизимнинг фа-
завий фазо ҳажми, ҳолатлар сони, статистик йиғиндисини
аниқлансин.

Е ч и ш. Бундай тизимнинг гамильтониани

$$H = \sum_i \left(p_i^2 / 2m + \frac{kq_i^2}{2} \right). \quad (1)$$

(1) да ўзгарувчиларни алмаштирайлик:

$$\frac{p_i^2}{2m} = x_i^2, \quad \frac{kq_i^2}{2} = x_i^2. \quad (2)$$

(2) ни эфирбўра билан, (1) ни ётаман:

$$E = \sum_{i=1}^{2N} x_i^2. \quad (3)$$

(3) ифода $2N$ ўлчовли шар (E ўзгармас) тенгламаси.

$$\begin{aligned} \Gamma(p, q) &= \int dp dq = (2mE)^{N/2} \cdot (2E/k)^{N/2} \int \prod_i dx_i = \\ &= \left(\frac{2E}{\omega}\right)^N \int \prod_i^{2N} dx_i = \left(\frac{2E}{\omega}\right)^N \frac{\pi^N}{\Gamma(N+1)} = \frac{(2\pi E/\omega)^N}{\Gamma(N+1)}. \end{aligned}$$

Демак,

$$\Gamma(p, q) = AE^N, \quad (4)$$

$$A = (2\pi/\omega)^N / \Gamma(N+1).$$

Ҳолатлар сони

$$\sum_i I_i = \frac{\Gamma}{h^N} = \left(\frac{2\pi E}{\omega h}\right)^N \frac{1}{\Gamma(N+1)} = \left(\frac{E}{\hbar\omega}\right)^N \frac{1}{\Gamma(N+1)}. \quad (5)$$

Осциллятор учун ўртача энергия $\langle \epsilon \rangle$ ва унинг энергияси ϵ_n маълум:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \coth \frac{\hbar\omega}{2kT},$$

$$\epsilon_n = \hbar\omega (n + 1/2).$$

Статистик йиғинди

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n},$$

$$E_n = E_1 + E_2 + \dots + E_i + \dots + E_N.$$

Демак, $Z = \prod_n Z_i$. Ҳар бир осцилляторнинг статистик йиғиндиси маълум:

$$Z = \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} = \frac{1}{2sh(\hbar\omega/2kT)}.$$

N та осциллятордан иборат тизимнинг статистик йиғиндиси

$$Z = Z_i^N = [1/2sh(\hbar\omega/2kT)]^N. \quad (6)$$

6.15-масала. Қутида идеал газ бор. Шу идеал газ учун ҳолат зичлиги dn/dE ва Z ни аниқланг.

6.15-иш. Идеал газ — бу битта зарра учун тузилган Гиббс ансамбли. Зарранинг энергияси

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2). \quad (1)$$

Бу ҳолда $2\nu = 3$.

(1) ифода — радиуси $\sqrt{2mE}$ бўлган шарнинг тенгламасидир. Импульслар фазасидаги шу шар ҳажми

$$V_p = \frac{4\pi}{3} (2mE)^{3/2} \quad (2)$$

бўлади. Идеал газли идишнинг ҳажми V бўлсин. Умумий тамойилга асосан, кўриляётган ҳол учун "ячейкалар" (ҳолатлар) сони

$$(VV_p/h^3) = n \text{ ёки } (VdV_p/h^3) = dn \quad (3)$$

бўлади; бунда h^3 — VV_p "ҳажм"нинг энг кичик қисми ("ячейка") ҳажми (h — Планк доимийси). (2)дан

$$dV_p = 2\pi(2m)^{3/2} E^{1/2} dE. \quad (4)$$

$\nu = 3/2$ бўлганда гамма-функция

$$\Gamma = (3/2) = \sqrt{\pi}/2 \quad (5)$$

бўлади. (3) ва (4) лардан ҳолатлар зичлигини топамиз:

$$\frac{dn}{dE} = V 2\pi (2m/h^2)^{3/2} E^{1/2}. \quad (6)$$

Умумий ҳолда ҳолатлар зичлиги

$$\frac{dn}{dE} = Z \frac{\beta^\nu}{\Gamma(\nu)} E^{\nu-1} \quad (7)$$

ифода билан аниқланади.

(6) ва (7) ифодалардан фойдаланиб, Z учун

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m \theta} \right)^{3/2}, \quad \theta = 1/\beta \quad (8)$$

ларни оламир.

6.16-масала. Томонлари L_x, L_y, L_z бўлган қутида микро-зарралар бўлсин. Шу ҳол учун ҳолатлар зичлиги (dn/dE) ни аниқланг.

Еч иш. Қутида де Бройль турғун тўлқинлари ҳосил бўлиши учун ярим тўлқин узунлиги ($\lambda/2$) томонлар бўйича қарали жойлашиши зарур, яъни

$$n_x \frac{\lambda}{2} = L_x, \quad n_y \frac{\lambda}{2} = L_y, \quad n_z \frac{\lambda}{2} = L_z \quad (1)$$

n_x, n_y, n_z бутун сонларни қабул қилади, (1) ни де Бройл формуласидан фойдаланиб қуйидагича ёзамиз:

$$\frac{h^2}{4L^2} n_x^2 = p_x^2, \quad \frac{h^2}{4L^2} n_y^2 = p_y^2, \quad \frac{h^2}{4L^2} n_z^2 = p_z^2. \quad (2)$$

$L_x = L_y = L_z = L$ бўлганда энергия

$$E = \frac{1}{2m} \cdot (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

учун (2) дан фойдаланиб,

$$(8mL^2 / h^2) E = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \quad (3)$$

ифодани оламиз. (3) радиуси $[8mL^2/h^2]E^{1/2}$ бўлган шарнинг тенгламаси. Бу шарнинг ҳажми

$$V_n = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{8mL^2}{h^2} E \right)^{3/2}.$$

n_x, n_y, n_z ларнинг мусбат қийматларига тўғри келган бу шар ҳажмларининг қисми ҳолатлар сонига тенг, яъни:

$$\frac{V_n}{8} = \frac{\pi}{6} \left(\frac{8mL^2}{h^2} E \right)^{3/2} = n.$$

Бундан ҳолатлар зичлигини оламиз:

$$\frac{dn}{dE} = 2\pi \left(\frac{2mL^2}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2}.$$

$L^3 = V$ деб қабул қилсак, бу ифода ҳолат зичлиги (6.13-масала) билан бир хил бўлади.

Изоҳ. Томонлари L_x, L_y, L_z бўлган қутида битта микрозарра бўлсин. Унинг ҳолатлари ва қабул қилиши мумкин булган энергия қийматлари E Шредингер тенгламаси асосида топилади, бу ҳолда Шредингер тенгламасидан микрозарра энергияси учун қуйидаги тенглик олинади:

$$E = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2).$$


Бу (3) ифода билан бир хил. Шундай қилиб, зарралар табиати классик ёки квант бўлишидан қатъи назар, статистик интеграл (йиғинди) ни $\frac{1}{Z} = \frac{\beta^v}{\Gamma(v)} \frac{dn}{dE}$ ифода асосида аниқлаш мумкин.

Изоҳ. Кейинги икки ҳолда, аснки, энергия дискрет қийматлар қабул қилади. Аммо E учун классик формула $E = m\vartheta^2/2$ дан фойдаланиб,

$$f(\vartheta) d\vartheta = \frac{1}{Z_1} e^{-\beta E} dn$$

дан яна Максвелл тезликлар тақсимотини оламиз:

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}}.$$



6.11-расм.

6.17-масала. Қуйидаги ифодадан Максвелл тақсимот қонуни $f(\vartheta)$ ни келтириб чиқаринг:

$$dW(V_x, V_y, V_z) = f(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z, \quad (1)$$

$$f(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z) = \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta v^2}, \quad \beta = \frac{m}{2kT}. \quad (2)$$

Еч и ш. Декарт координаталар тизимидан сферик координаталар тизимига ўтайлик (6.11-расм). Бунда:

$$\vartheta_x = \vartheta \sin \theta \cos \varphi, \quad \vartheta_y = \vartheta \sin \theta \sin \varphi, \quad \vartheta_z = \vartheta \cos \theta$$

Якобиан

$$J = \frac{\partial(\vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z)}{\partial(\vartheta, \theta, \varphi)} = \vartheta^2 \sin \theta.$$

Демак,

$$d\vartheta_x d\vartheta_y d\vartheta_z = \vartheta^2 \sin \theta d\vartheta d\theta d\varphi.$$

Бу ҳолда (1)

$$dW(\vartheta, \theta, \varphi) = \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \vartheta^2} \vartheta^2 d\vartheta \sin \theta d\theta d\varphi \quad (3)$$

қўринишни олади. Бурчакларни ҳамма қийматлари бўйича интеграллаймиз.

$$\begin{aligned} \int \int dW(\vartheta, \theta, \varphi) &= dW(\vartheta) = f(\vartheta) d\vartheta = \\ &= d\vartheta \cdot \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \vartheta^2} \vartheta^2 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \vartheta^2} \vartheta^2 d\vartheta, \quad (4) \end{aligned}$$

бунда

$$f(\vartheta) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} \quad (5)$$

(5) изланаётган тақсимот функцияси.

6.18-масала. Энг катта эҳтимолий тезлик, $\vartheta_0 = \sqrt{2 \frac{kT}{m}}$ эканлигини курсатинг.

Е ч и ш. Бунинг учун Максвелл тақсимоти $f(\vartheta)$ дан ϑ бўйича ҳосила олиб, уни $\vartheta = \vartheta_0$ да нолга тенглаштириш зарур, яъни $\left[\frac{df(\vartheta)}{d\vartheta} \right]_{\vartheta=\vartheta_0} = 0$. Бундан:

$$\left(2\vartheta, -2\vartheta, \frac{m}{2kT} \vartheta^2 \right) = 0, \quad \vartheta_0 \neq 0.$$

Бу тенгликдан изланаётган

$$\vartheta_0^2 = 2 \frac{kT}{m}, \quad \vartheta_0 = \sqrt{2 \frac{kT}{m}} \quad (1)$$

ифодани аниқлаймиз.

6.19-масала. Ўртача арифметик тезлик $\bar{\vartheta}$ ни аниқланг. Е ч и ш. Таъриф бўйича

$$\begin{aligned} \bar{\vartheta} &= \int_0^{\infty} \vartheta f(\vartheta) d\vartheta = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \vartheta^3 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta = \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^2 \int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2} dx = 4\pi \left(\frac{2kT}{m} \right)^{1/2} \frac{1}{\pi^{3/2}} \cdot J, \\ J &= \int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2} dx = 1/2, \end{aligned}$$

$$\bar{\vartheta} = 2 \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \quad (2)$$

Бунда $\int_0^{\infty} x^{2n+1} e^{-x^2} dx = n!/2$ дан фойдаландик.

6.20-масала. Ўртача квадратик тезлик $\bar{\vartheta}^2$ ни аниқланг.

$$\begin{aligned} \bar{\vartheta}^2 &= \int_0^{\infty} \vartheta^2 f(\vartheta) d\vartheta = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \vartheta^4 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta = \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{5/2} \int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2} dx = 3 \cdot \frac{kT}{m}, \end{aligned}$$

бунда $\int_0^{\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots (2n-1)}{2 \cdot 2^n} \sqrt{\pi}$ дан фойдаландик.

Демак,

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3 \frac{kT}{m}}. \quad (3)$$

(1), (2) ва (3) дан $\overline{v_x} < \overline{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$ эканлиги куринади. (6.5-расмга қ.)

6.21-масала. Молекуланинг ўртача энергияси $\overline{E}$ ни аниқланг. Олинган натижани изоҳланг.

Е ч и ш. Бизга $\overline{v^2} = 3 \frac{kT}{m}$ экани маълум. Бундан

$$\overline{E} = \frac{m \overline{v^2}}{2} = \frac{m}{2} \cdot 3 \frac{kT}{m} = 3 \cdot \frac{kT}{2}. \quad (1)$$

Демак, ҳар бир заррага тўғри келган энергия $3 \frac{kT}{2}$ га тенг. Бундай эркин ҳаракат қилаётган идеал газ молекуласининг эркинлик даражалари сони 3 та. Демак, ҳар бир эркинлик даражасига тўғри келган ўртача энергия $kT/2$ га тенг дейилган қонунга мувофиқ келади.

6.22-масала. Нисбий тезлик g_{ik} нинг арифметик ўртачаси $\overline{g_{ik}}$ ни ва квадратик нисбий тезликнинг ўртачаси $\overline{g_{ik}^2}$ ни аниқланг.

Е ч и ш. 1) Аввал ўртача квадратик нисбий тезлик $\overline{g_{ik}^2}$ ни аниқлайлик.

Иккита ихтиёрий i ва k молекула мос равишда $\overline{v_i}$ ва $\overline{v_k}$ тезликлар билан ҳаракатланаётган бўлсин. Уларнинг нисбий тезлиги $\overline{g_{ik}} = \overline{v_i} - \overline{v_k}$ ва унинг модули

$$\overline{g_{ik}} = |\overline{v_i} - \overline{v_k}| \quad (1)$$

бўлади. Идеал газ молекулалари бир-бирига боғлиқ эмас ва улар Максвелл тақсимот қонунига бўйсундилар. Шунинг учун нисбий тезлик $\overline{g_{ik}}$ Максвелл тақсимот функциялари $f(\overline{v_i}), f(\overline{v_k})$ нинг кўпайтмаси орқали аниқланади:

$$\overline{g_{ik}^2} = \int g_{ik}^2 f(\overline{v_i}) f(\overline{v_k}) d\overline{v_i} d\overline{v_k}, \quad (2)$$

$\overline{g_{ik}} = \overline{\vartheta_i} - \overline{\vartheta_k}$ дан:

$$g_{ik}^2 = \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2} - 2\overline{\vartheta_i \vartheta_k} \cos \theta. \quad (3)$$

(3) ни (2) га қўямиз ($n = 2$):

$$\begin{aligned} \overline{g^2} &= \int \vartheta_i^2 f(\vartheta_i) d\overline{\vartheta_i} \int f(\vartheta_k) d\overline{\vartheta_k} + \int \vartheta_k^2 f(\vartheta_k) d\overline{\vartheta_k} \int (\vartheta_i) d\overline{\vartheta_i} - \\ &- 2 \int \int \vartheta_i \vartheta_k \cos \theta f(\vartheta_i) f(\vartheta_k) d\overline{\vartheta_i} d\overline{\vartheta_k} = \\ &= \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2} - 2 \int \int \vartheta_i \vartheta_k \cos \theta f(\vartheta_i) f(\vartheta_k) d\overline{\vartheta_i} d\overline{\vartheta_k}. \end{aligned}$$

Охирги ҳадда интегрални ҳисоблаш учун $\overline{\vartheta_k}$ йўналиш-га нисбатан $\overline{\vartheta_i}$ ни қараб, Декарт координаталар тизими-дан сферик координаталар тизимига ўтамиз, бунда i -молекула ҳаракатининг изотропликлигига асосланиб, охир-ги ҳадни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$2 \int \vartheta_k f(\vartheta_k) \left[\vartheta_i^3 f(\vartheta_i) d\overline{\vartheta_i} \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta \right] d\overline{\vartheta_k} = 0.$$

Чунки бунда $\int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^\pi \sin \theta d \sin \theta = \int_0^0 x dx = 0$. Де-мак, зарралар бир хил бўлса,

$$\overline{g_{ik}^2} = \overline{\vartheta_i^2} + \overline{\vartheta_k^2} = 2 \cdot 3 \frac{kT}{m} = 2\overline{\vartheta^2} \quad (4)$$

— 2) Нисбий тезлик g_{ik} нинг ўртача арифметик қиймати $\overline{g_{ik}}$ ни аниқлайлик:

$$\begin{aligned} \overline{g_{ik}} &= \int g_{ik} A_i e^{-\frac{m_i \vartheta_i^2}{2kT}} A_k e^{-\frac{m_k \vartheta_k^2}{2kT}} d\overline{\vartheta_i} d\overline{\vartheta_k} = \\ &= A_i A_k \int g_{ik} e^{-\frac{1}{2kT}(m_i \vartheta_i^2 + m_k \vartheta_k^2)} d\overline{\vartheta_i} d\overline{\vartheta_k} \end{aligned} \quad (1)$$

Бунда:

$$A_i = \left(\frac{m_i}{2kT\pi} \right)^{3/2}, \quad A_k = \left(\frac{m_k}{2kT\pi} \right)^{3/2}. \quad (2)$$

(1) ни ҳисоблаш учун молекулаларнинг $\overline{\vartheta_i}$ ва $\overline{\vartheta_k}$ тезлик-ларидан уларнинг нисбий тезлиги $\overline{\vartheta_{ik}}$ ва масса маркази тезлиги $\overline{G}$ га ўтайлик:

$$\overline{G}(m_i + m_k) = m_i \overline{\vartheta_i} + m_k \overline{\vartheta_k}. \quad (3)$$

Бир хил молекулаларни қарайлик. У ҳолда $m_i = m_k$ ва, ле-
мак, (3) дан

$$2\bar{G} = \bar{\vartheta}_i + \bar{\vartheta}_k \quad (4)$$

тенгликни оламиз. Нисбий тезлик, таъриф бўйича

$$\bar{g}_{ik} = \bar{\vartheta}_i - \bar{\vartheta}_k \quad (5)$$

(4) ва (5) лардан (g_{ik} да индексларни тушириб ёзамиз)

$$\bar{\vartheta}_i = \bar{G} + \bar{g} / 2; \quad (6)$$

$$\bar{\vartheta}_k = \bar{G} - \bar{g} / 2$$

Тезликлар фазоси элементлари қуйидагича алмаштирилади:

$$d\bar{\vartheta}_i d\bar{\vartheta}_k = J d\bar{g} d\bar{G}. \quad (7)$$

Алмаштириш якобиани

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial \bar{\vartheta}_i}{\partial \bar{g}} & \frac{\partial \bar{\vartheta}_k}{\partial \bar{g}} \\ \frac{\partial \bar{\vartheta}_i}{\partial \bar{G}} & \frac{\partial \bar{\vartheta}_k}{\partial \bar{G}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \quad (8)$$

(1) ифодани (2), (6), (7) ва (8) ни назарда тутиб, қайта ёзамиз:

$$\bar{g} = A^2 \iint g e^{-\frac{m}{4kT} \left(2G^2 + \frac{g^2}{2} \right)} d\bar{G} d\bar{g}. \quad (9)$$

Бунда интеграл чегаралари ўзгармайди $[(-\infty, +\infty)$ да бўлади]. (9) да сферик координаталар тизимига ўтамиз; бунда бурчаклар бўйича интеграллангандан кейин $d\bar{g} d\bar{G}$ нинг ўрнига $4\pi g^2 dg \cdot 4\pi G^2 dG$ ни ёзиш лозим бўлади, яъни:

$$\begin{aligned} \bar{g} &= 16\pi^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \int_0^\infty g^3 e^{-\frac{mg^2}{4kT}} dg \cdot \int_0^\infty G^2 e^{-\frac{mG^2}{kT}} dG = \\ &= 16\pi^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \left(\frac{4kT}{m} \right)^2 \left(\frac{kT}{m} \right)^{3/2} \int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx \int_0^\infty y^2 e^{-y^2} dy; \end{aligned}$$

бунда:

$$\int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx = 1/2, \quad \int_0^\infty y^2 e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi} / 4.$$

Демак,

$$\bar{g} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{3kT}{\pi m}} = \sqrt{2} \bar{v}. \quad (10)$$

6.23-масала. Водорол ва азот молекулаларининг 273°K даги ўртача тезлигини аниқланг!

Жавоб: $\bar{v}_{H_2} = 1698 \text{ м/с}$, $\bar{v}_N = 454 \text{ м/с}$.

6.24-масала. Нормал шароитда 1 секундда 1 см^2 юзага урилаётган азот молекулалари сонини аниқланг.

Еч и ш. 1 секундда 1 см^2 га келиб урилаётган ϑ_x , $\vartheta_x + d\vartheta_x$ ораликдаги молекулалар сони

$$\vartheta_x n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{1/2} e^{-\beta \vartheta_x^2} d\vartheta_x, \quad \beta = \frac{m}{2kT} \quad (1)$$

дан иборат. Буни $(0, \infty)$ ораликда интеграллаб, топамиз:

$$\begin{aligned} n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{1/2} \int_0^\infty \vartheta_x e^{-\beta \vartheta_x^2} d\vartheta_x &= n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{1/2} (\beta)^{-1} \int_0^\infty x e^{-x^2} dx = \\ &= n \frac{1}{\pi^{1/2}} (1/\beta)^{1/2} \frac{1}{2} \left(-e^{-x^2} \right) \Big|_0^\infty = \frac{n}{2} \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} = \frac{n \bar{v}_{N_2}}{4}. \end{aligned} \quad (2)$$

$n_0 = 2,69 \cdot 10^{19} / \text{см}^3$, $\bar{v}_{N_2} = 454 \text{ м/с}$ эканлигидан азот молекулаларининг девор билан туқнашишлари сони

$$\frac{n_0 \bar{v}_{N_2}}{4} \approx 3,4 \cdot 10^{23} / \text{сек см}^2$$

эканлигини аниқлаймиз.

6.25-масала. ϑ дан кичик тезликли молекулалар қисмини аниқланг.

Еч и ш. ϑ , $\vartheta + d\vartheta$ ораликдаги молекулалар сони:

$$dn(\vartheta) = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta, \quad (1)$$

Бундан $\vartheta \leq \bar{\vartheta}$ тезликли молекулалар сонини топиш учун уни $(0, \bar{\vartheta})$ ораликда интеграллаймиз:

$$\begin{aligned} n(\vartheta \leq \bar{\vartheta}) &= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\bar{\vartheta}} \vartheta^2 e^{-\frac{m\vartheta^2}{2kT}} d\vartheta = \\ &= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} \int_0^{1/2} x^2 e^{-x^2} dx = \end{aligned}$$

$$= 4\pi N \left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2} \int_0^{1,13} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{4N}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{1,13} x^2 e^{-x^2} dx =$$

$$= \frac{4N}{\sqrt{\pi}} \left[-\frac{x e^{-x^2}}{2} \right]_0^{1,13} + 1/2 \int_0^{1,13} e^{-x^2} dx = [-0,35 + \Phi(1,13)] N.$$

(2) да $\Phi(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ — хатолар интегралы, $\Phi(1,13) = 0,8900$.
Бинобарин,

$$n(\vartheta \leq \bar{\vartheta}) = N(-0,35 + 0,89) = N \cdot 0,54. \quad (3)$$

Демак, $\frac{n(\vartheta \leq \bar{\vartheta})}{N} = 0,54$, яъни 54% ни ташкил этади. $\vartheta \geq \bar{\vartheta}$ молекулалар сони эса 46% ни ташкил этади.

6.26-масала. Энг катта эҳтимолли тезликдан катта тезликли молекулалар нисбий сонини аниқланг.

Жавоб: $(n(\vartheta \geq \bar{\vartheta})/N) = 0,57$, яъни 57%.

6.27-масала. Тезлиги $\frac{\vartheta_1}{2}$ билан $2\vartheta_1$ оралиғида бўлган молекулаларнинг нисбий сонини аниқланг.

Жавоб: $\frac{\Delta n}{N} = 0,87$, яъни 87%.

6.28-масала. $\frac{3}{2} kT$ ўртача кинетик энергиядан катта энергияли молекулаларнинг нисбий сонини аниқланг.

Жавоб: $\frac{n}{N} = 0,39$, яъни 39%.

6.29-масала. Моддий нуқта $x = a \cos \omega t$ қонун билан гармоник тебранма ҳаракатланаётир. Унинг x , $x + dx$ оралиқда бўлиш эҳтимоллигини аниқланг.

Ечиш. x , $x + dx$ оралиқда зарранинг бўлиш эҳтимоллиги $dW(x)$, шу оралиқда бўлиш вақти dt нинг ярим даври $T/2$ га нисбати билан аниқланади, яъни

$$dW(x) = dt / (T/2) = \frac{\omega dt}{\pi}; \quad dt = \frac{dx}{\left| \frac{dx}{dt} \right|} = \frac{dx}{\omega a \sin \omega t}. \quad (1)$$

Демак

$$dW(x) = \rho(x) dx = \frac{\omega dx}{\pi a \omega \sin \omega t} = \frac{dx}{\pi a \sin \omega t}, \quad (2)$$

бундан

$$x^2 = a^2 \cos^2 \omega t = a^2 (1 - \sin^2 \omega t), \quad (3)$$

$$1 - \frac{x^2}{a^2} = \sin \omega t; \sin \omega t = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}.$$

(2) ва (3) дан

$$dW(x) = \rho(x) dx = \frac{dx}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}}; \quad (4)$$

$$\rho(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} \quad (5)$$

Демак, $x \rightarrow a$ булганда, яъни бурилиш нуқтасида (тезлик нолга тенг булганда) зарранинг эҳтимоллиги энг катта бўлади.

6.30-масала. N заррадан иборат идеал газнинг ҳолат тенгламасини аниқланг.

Е ч и ш. Идеал газнинг статистик интегралли

$$\frac{1}{Z_N} = \left(\frac{N}{Z_1} \right)^N; \quad (1)$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}; \quad (2)$$

$$\frac{1}{Z_N} = e^{-\beta F} \text{ дан } F = -\theta \ln Z_N; \quad (3)$$

ҳолат тенгламаси

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_\theta = \theta \left(\frac{\partial \ln Z_N}{\partial V} \right)_\theta = \theta \frac{N}{V} = n\theta = nkT.$$

Демак,

$$P = nkT.$$

6.5-§. МАКСВЕЛЛ-БОЛЬЦМАН ТАҚСИМОТ ҚОНУНИ

Фараз қилайлик, идеал газ (ёки сийрак газ) ташқи майдон таъсирида бўлсин. У ҳолда ҳар бир зарра шу майдон таъсирида маълум потенциал энергияга эга бўлади. Бундай газ ҳолати масаласини қараш учун бир заррали усулни қўллаш мумкин.

Юқорида айтилганларга асосан, ихтиёрий бир зарранинг тулиқ энергияси

$$E_i = \frac{p_i^2}{2m} + U(x_i, y_i, z_i), \quad p_i^2 = p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2 \quad (33)$$

ифода билан аниқланади; $U(x_i, y_i, z_i)$ — i зарранинг (x, y, z) нуқтадаги потенциал энергияси.

Классик статистикага асосан, заррачинг

$$p_x, p_x + dp_x, \quad p_y, p_y + dp_y, \quad p_z, p_z + dp_z \quad (34)$$

$$x, x + dx, \quad y, y + dy, \quad z, z + dz$$

оралиқларда бўлиш эҳтимоллиги dW

$$dW(\vec{p}, \vec{r}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} dn, \quad \beta = 1/kT \quad (35)$$

билан аниқланади; бунда $dn = d\vec{p} d\vec{z} / h^3$; статистик интеграл

$$Z = \int e^{-\beta E} dn = \frac{1}{h^3} \int e^{-\beta \left[\frac{p^2}{2m} + U(x, y, z) \right]} dp_x dp_y dp_z dx dy dz \quad (36)$$

ифода билан аниқланади. (35) даги

$$f(E_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i} \quad (37)$$

функцияни Максвелл-Больцман тақсимооти функцияси дейилади. Бу ерда интеграл

$$\int e^{-\beta \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = (2\pi mkT)^{3/2}. \quad (38)$$

Демак,

$$Z = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \int e^{-\frac{U(x, y, z)}{kT}} dx dy dz = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} Q_1, \quad (39)$$

$$Q_1 = \int e^{-U/kT} dx dy dz. \quad (40)$$

Максвелл-Больцман тақсимоот функцияси (35)ни

$$dW(p_x, p_y, p_z) = \left(\frac{1}{2\pi mkT} \right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2kTm}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z, \quad (41)$$

$$dW(x, y, z) = \frac{1}{Q_1} e^{-\frac{1}{kT}U(x, y, z)} dx dy dz \quad (42)$$

қўринишларда ёзиш мумкин.

Маълумки, (41)ни Максвелл тақсимоот функцияси дейилади; (42) ни эса Больцман тақсимоот функцияси дейилади. Эҳтимоллик dW ни

$$dW(\vec{p}, \vec{q}) = dW(\vec{p}) dW(\vec{q}) \quad (43)$$

қўриқишда ёзишимиз мумкин эканлигининг сабаби, зарранинг фазодаги ҳаракати унинг фазодаги ўрнига боғлиқ эмаслигидандир.

Юқоридагилардан, жумладан (43) дан қўринадик, зарраларга куч таъсир этишига қарамай (ҳатто реал газларда ҳам), молекулаларнинг тезликлар бўйича тақсимоти Максвелл тезликлар тақсимотидан иборат.

6.6-§. ГАЗ ЗАРРАЛАРИНИНГ КУЧ МАЙДОНИДАГИ ТАҚСИМОТИ, БАРОМЕТРИК ФОРМУЛА

Биз бир заррали усулда зарранинг потенциал майдон $U(x, y, z)$ да тақсимот функцияси (Больцман тақсимоти)-ни аввалги § да кўрдик:

$$dW(x, y, z) = \frac{1}{Q_1} e^{-\frac{U(x, y, z)}{kT}} dx dy dz. \quad (44)$$

Агар майдон бўлмаса, яъни $U(x, y, z) = 0$ бўлса, $Q = V$ ва

$$dW(x, y, z) = \frac{dx dy dz}{V} \quad (45)$$

тақсимот ўринли бўлади, яъни зарранинг V ҳажмининг барча нуқталарида бўлишлиги тенг эҳтимолли.

Фараз қилайлик, заррага таъсир этаётган майдон — бу Ернинг тортиш майдони $U = mgz$ бўлсин. У ҳолда Больцман тақсимоти (44)

$$dW(z) = Ae^{-\frac{mgz}{kT}} dz \quad (46)$$

қўриқишни олади. Бунда $dW(z) = dn(z)/n$ эканлигини назарда тутиб, (46) ни қайта ёзамиз:

$$dn(z) = nAe^{-\frac{mgz}{kT}} dz = n(z) dz$$

ёки чекли z баландлигидаги зарралар зичлиги бу ердан

$$n(z) = ce^{-mgz/kT} \quad (47)$$

ёки $z = 0$ да $n(0) = n_0$ бўлса, зарралар зичлигининг баландлик z бўйича тақсимоти

$$n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \quad (48)$$

билан аниқланади. Идеал газ учун $P = nkT$ эканлигини назарда тутиб, (47) асосида босимнинг баландлик бўйича узгаришини кўрсатувчи ушбу барометрик формулани оламиз:

$$P(z) = P_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}; \quad (49)$$

бунда $z = 0$ даги босимни P_0 га тенг деб олинди.

Изоҳ. Реал шароитда z ортиши билан температура доимий бўлмай, у пасаяди. Шу сабабли, z баландлик ортиши билан босим $P(z)$ янада кучлироқ камаяди! Бундан ташқари, реал шароитда газ номувозанат ҳолатда булганлиги учун, босимнинг баландликка қараб узгариши мураккаб бўлиб, барометрик формуладан фарқ қилади.

6.7-§. ИДЕАЛ ГАЗ СТАТИСТИК ИНТЕГРАЛИ

Статистик интеграл ва статистик йиғинди ифодалари

$$Z = \int e^{-\beta E} dn, \quad (49)$$

$$Z = \sum e^{-\beta E_i} \quad (50)$$

кўринишга эга; бунда $\beta = 1/kT$ ва E (ёки E_i) тизимнинг гамилтониани (тўла энергияси).

1. Бир атомли молекулалар.

Бу ҳолда зарралар илгариланма ҳаракатдагина буладилар. Уларнинг кинетик энергиялари $E_k = p_k^2 / 2m$ йиғиндиси тизимнинг энергияси E га тенг, яъни

$$E = \sum_{k=1}^{3N} E_k = \sum_{k=1}^{3N} p_k^2 / 2m. \quad (51)$$

Бу ҳолда N та заррадан ташкил топган тизимнинг статистик интеграл

$$\begin{aligned} Z &= \int e^{-\beta \frac{1}{2m} \sum_k p_k^2} dn = \frac{1}{gh^{3N}} \int e^{-\beta \frac{1}{2m} \sum_k p_k^2} dp_1 \dots dp_{3N} \cdot dq_1 \dots dq_{3N} = \\ &= \frac{V^N}{gh^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2} = \frac{V^N}{g} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}; \quad \beta = 1/kT. \end{aligned}$$

Бунда $E = E_1 + E_2 + \dots + E_N$ нинг ҳар бир қийматига мос келувчи усуллар сони $g = N^N$ эканлигини назарда тутиб, аввал олинган

$$Z_N = \left(\frac{V}{N}\right)^3 \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3N/2} \quad (52)$$

ёки

$$Z_N = (Z_1/N)^N \quad (53)$$

$$Z_1 = V(2\pi mkT/h^2)^{3/2} \quad (54)$$

натижаларни аниқлаймиз.

2. Икки атомли молекулалар.

Биз юқоридаги статистик интеграл ифодаларини ёзма-
нимизда фақат зарранинг илгариланма ҳаракатини ҳисобга
олдик. Агар молекуланинг ички тузилишини эътиборга оли-
надиган бўлса, ички эркинлик даражаларига тўғри келган
(зарранинг) молекуланинг энергияларини ҳисобга олиш
керак.

Молекуланинг i квант ҳолатидаги энергиясини ϵ_i ва бу
ҳолатнинг айниш каррасини g_i билан белгиласак, битта мо-
лекуланинг статистик йиғиндисини, умумий таърифга асо-
сан, қуйидагича аниқланади:

$$Z(1) = \sum g_i e^{-\epsilon_i/kT}. \quad (55)$$

Яккаланган молекуланинг квант ҳолати ундаги 1) элек-
тронларнинг квант ҳолатларига, 2) ядронинг квант ҳолат-
ларига, 3) ички тебранма ҳаракатларига мос ҳолларга ҳамда
4) молекуланинг айланма ҳаракатларига мос ҳолатларига
боғлиқдир. Бу ҳаракатлар, умумий ҳолда, бир-бирига боғ-
лиқ бўлгани учун молекуланинг квант ҳолати бу ҳаракат-
ларнинг ўзаро таъсирига ҳам боғлиқ бўлади. Аммо бу ўзаро
таъсирни (корреляцияни) ҳисобга олиш қийин бўлганили-
гидан, энг муҳими бу ўзаро таъсир энергияси юқорида кел-
тирилган тўртта ҳаракатнинг энергияларига нисбатан жуда
кичик бўлгани учун куп ҳолларда, жумладан статистик йи-
ғинди ифодаси (55)ни ҳисоблашда эътиборга олинмай таш-
лаб юборилади. Шу сабабли, молекула квант ҳолатининг
энергияси ϵ_i юқоридаги тўртта ҳаракатлар энергиялари-
нинг йиғиндисини иборат бўлади, яъни

$$\epsilon_i = \epsilon_i(\text{эл}) + \epsilon_i(\text{я}) + \epsilon_i(\text{в}) + \epsilon_i(r), \quad (56)$$

бунда икки атомли молекула учун тебранма ҳаракат энер-
гияси $\epsilon_i(v)$ ва айланма ҳаракат энергияси $\epsilon_i(r)$ қуйидагича
аниқланади:

$$\epsilon_i(\vartheta) = \hbar\omega_i(n + 1/2), n = 0, 1, 2, \dots \quad (57)$$

$$\epsilon_l(r) = \frac{\hbar^2}{2J_l} l(l+1), l = 0, 1, 2, \dots \quad (58)$$

Кўп ҳолларда асосий электрон ҳолати уйғонган ҳолатдан старли даражада катта фарқ қилади. Шу сабабли одатдаги температураларда уйғонган ҳолатларни эътиборга олмаслик мумкин. Бу ҳолда электрон ҳолатларга тааллуқли айниш карраси (статистик йиғинди $Z(\varepsilon)$) $g_s = 1$ булади. Аммо ядро ҳолатлари (ҳатто бир атомли He , Ne , Ar бўлган ҳолларда ҳам) ядро спинининг ориентациялари туфайли g_n — каррали айнишга эга буладилар (масалан, битта ядро учун $g_n = 2s_n + 1$).

Умумий ҳолда, молекуланинг тебранма ҳаракатига унинг айланма ҳаракати таъсир этади. Аммо юқорида айтганимизга асосан одатдаги температураларда уларнинг ўзаро таъсирини эътиборга олмай, алоҳида-алоҳида қараш мумкин.

Юқорида айтганимизга кура, электроннинг асосий ҳолати уйғонган ҳолатдан одатдаги температурада жуда катта фарқ қилгани учун

$$g(\varepsilon) = 1, Z(\varepsilon) = 1. \quad (59)$$

(56) ифодадаги тебранма ҳаракат энергияси

$$\epsilon_i(\vartheta) = \hbar\omega_i(n + 1/2)$$

эканлигидан унга тегишли статистик йиғинди

$$Z_i(\vartheta) = 1 / (e^{x/2} - e^{-x/2}) = [2sh\hbar\omega / kT]^{-1}; x = \hbar\omega / kT \quad (60)$$

билан аниқланиши маълум (6.12-масалага қ.)

Ядронинг айниш карраси $g(\text{я})$ уни ташкил этган атомлар бир хил бўлса, яъни гомоядро молекула AB учун

$$g(\text{я}) = (2s_A + 1),$$

агар ҳар хил бўлса, яъни гетейдро молекула AB учун

$$g(\text{я}) = (2s_A + 1)(2s_B + 1)$$

ифодалардан иборат булади; s ядро спини.


Инерция моменти J га тенг бўлган чизиқли айлангич (ротатор)нинг энергияси

$$\epsilon_l(r) = \frac{\hbar^2}{8\pi^2J} l(l+1), l = 0, 1, 2, \dots, \quad (61)$$

бушда мос статистик якинлид $\epsilon(r) = 2l + 1$

$$Z(r) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{l^2}{8\pi^2 JkT}} = \sum_l (2l+1) e^{-l(l+1) \theta_T / T},$$

$$\theta_T = \frac{h^2}{8\pi^2 Jk} \quad (62)$$



6.12-расм.

Квазиклассик яқинлашишда, яъни $\theta_T \ll T$ бўлганда

$$Z(r) = \frac{8\pi^2 JkT}{h^2} = \frac{2JkT}{h^2} \quad (63)$$

ифода ўринли бўлади (6.31-масалага қ.)

6.31-масала. Икки атомли молекуланинг айланма ҳолати θ , φ ўзгарувчи, бурчаклар билан тавсифланади (6.12-расм). Бу ҳаракатларга мос келувчи им-

пульслар p_θ, p_φ . Бу ҳолда айланма ҳаракат энергияси

$$\epsilon(r) = \frac{p_\theta^2}{2J} + \frac{p_\varphi^2}{2J} = \frac{p_\theta^2}{2J} + \frac{p_\varphi^2}{2J \sin^2 \theta} \quad (1)$$

(1) асосида айланма ҳаракатнинг статистик интеграли $Z(r)$ ни ҳисобланг.

Е чи ш.

$$\begin{aligned} Z(r) &= \frac{1}{h^2} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} dP_\theta \exp \left[-\frac{1}{kT} \left(\frac{P_\theta^2}{2J} \right)^2 \right] \times \\ &\times \int_{-\infty}^{+\infty} dP_\varphi \exp \left[-\frac{1}{kT} \left(\frac{P_\varphi^2}{2J \sin^2 \theta} \right) \right] = \\ &= \frac{2\pi}{h^2} \int_0^\pi d\theta \left[(kT - J)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} (2J \sin^2 \theta \cdot kT)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} \right] = \\ &= \frac{2\pi}{h^2} \int_0^\pi d\theta (2JkT)^{1/2} (2JkT \sin^2 \theta)^{1/2} \pi = \\ &= \frac{2\pi^2 \cdot 2JkT}{h^2} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{8\pi^2 JkT}{h^2} = \frac{2JkT}{h^2} \end{aligned}$$

3. Кўп атомли молекулалар (насос газ).

Кўп ҳолларда молекулаларнинг инерция моментлари жуда катта бўлгани учун, яни $(\hbar^2 / JkT) \ll 1$ бўлгани сабабли молекуланинг айланма ҳаракатини классик механика асосида қараш мумкин. Бу ҳолда молекуланинг айланма ҳаракати учун статистик интеграл ифодаси $Z_r(T)$ классик статистикадагидан иборат бўлади.

Молекуланинг ички ҳаракати билан боғлиқ статистик йиғиндини қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$Z_n = g_e(\text{эл}) g_y(\text{я}) \frac{Z(r)}{\gamma} Z(v). \quad (64)$$

Бунда $g_e(\text{эл})$ асосий электрон ҳолатининг айланиш карраси; $g_y(\text{я})$ ядронинг спин ҳолатининг айланиш карраси; $g(r) = \prod_{(s_i)} (2s_i + 1)$; γ симметрия сони (у бир хил атомлардан иборат молекула айланишида ҳосил буладиган симметриялар сони).

Юқори температурада $Z(r)$ айланма ҳаракат учун статистик йиғинди ифодаси

$$Z(r) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\pi}{Y_A Y_B Y_C} \right)^{1/2}; \quad (65)$$

$$Y_A = \hbar^2 / J_A kT, \quad Y_B = \hbar^2 / J_B kT, \quad Y_C = \hbar^2 / J_C kT.$$

Бу ерда J_A, J_B, J_C — молекуланинг бош инерция моментлари.

$Z(v)$ — тебранма ҳаракат учун статистик йиғинди

$$Z(v) = \prod_{i=1}^{3n-6} (2s_i \hbar x_i) \quad , \quad x_i = \hbar \omega_i / 2kT \quad (66)$$

Бунда ω_i (1, 2, ... 3n - 6) нормал тебранишлар частотаси; n — молекуладаги атомлар сони.

6.8-§. МОЛЕКУЛАЛАРНИНГ ТУҚНАШИШЛАРИ СОНИ

1. Биз юқорида бирлик вақтда идиш деворининг бирлик юзига келиб урилаётган молекулалар сони (6.5-расмга қ.)

$$\int_0^\infty \vartheta_x f(\vartheta_x) d\vartheta_x = n \left(\frac{kT}{2\pi m} \right)^{1/2}$$

ифода билан аниқланишини кўрдик.

вақтда келиб урилишлар сонини аниқлийлик билан биринчи ва иккинчи бир зарра билан dt вақтда тўқнашиши учун улар 6.13-расмдаги цилиндр ичида бўлиши керак. Бир заррани сочувчи, иккинчи заррани сочилувчи деб қабул қилайлик. Сочувчи заррани радиуси зарра диаметрига тенг бўлган шар билан, сочилувчи заррани нуқта билан алмаштирайлик (6.13-расм). Шарнинг кесими $\sigma = \pi(2r_0)^2$ дан иборат; g — икки зарранинг нисбий тезлиги, яъни сочилувчи зарранинг сочувчи заррага нисбатан тезлиги. Бу ҳолда dt вақтда ясовчиси gdt бўлган цилиндр ичидаги ҳамма зарралар сочувчи зарра (марказ) билан тўқнашади. Цилиндрнинг ҳажми σgdt га тенг. Бирлик ҳажмдаги тезлиги (импульси) $\bar{P}$, $\bar{P} + d\bar{P}$ даги зарралар сони $f(\bar{P})d\bar{P}$ га тенг.

Сочувчи заррага dt вақтда келиб урилувчи зарралар сони

$$\sigma gdt d\bar{P} f(\bar{P}). \quad (67)$$

Сочувчи зарралар (марказлар) сони ҳам юқоридагидай аниқланади, яъни $\bar{P}'$, $\bar{P}' + d\bar{P}'$ оралиқдаги бирлик ҳажмдаги тўқнашишлар сони $f(\bar{P}')d\bar{P}'$ га тенг.

Демак, dt вақтда тезликлари (импульслари)


$$\bar{P}, \bar{P} + d\bar{P} \text{ ва } \bar{P}', \bar{P}' + d\bar{P}'$$

оралиқларда бўлган зарраларнинг ўзаро тўқнашишлари сони

$$f(\bar{P})f(\bar{P}')\sigma gdt d\bar{P}d\bar{P}'$$

ифода билан аниқланади; Бирлик вақтда барча тўқнашишлар сони эса

$$\int d\bar{P} \int d\bar{P}' f(\bar{P})f(\bar{P}')g\sigma d\bar{P}d\bar{P}' \quad (68)$$



6.13-расм.

интеграл ифода билан аниқланади. Бунда σ кесим, уни урилиш (тўқнашиш)нинг эффектив кесими дейилади, умуман у нисбий тезлик g га боғлиқ, яъни $\sigma(g)$.

бу ҳолда (68) ни қуйидагича ўзгартириш мумкин:

$$\begin{aligned}
 N^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \int d\vec{\vartheta} \int d\vec{\vartheta}' e^{-\frac{m}{2}(\vec{\vartheta} + \vec{\vartheta}')^2} g\sigma(g) d\vec{\vartheta} d\vec{\vartheta}' &= \\
 = N^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \int d\vec{G} e^{-\frac{mG^2}{2kT}} \int d\vec{g} g\sigma(g) e^{-\frac{mg^2}{4kT}} &= \\
 = N^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 (4\pi)^2 \int_0^\infty dG e^{-\frac{mG^2}{2kT}} G^2 \int_0^\infty g^3 \sigma(g) e^{-\frac{mg^2}{4kT}} dg &= \\
 = N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int d\vec{G} e^{-\frac{mG^2}{2kT}} \cdot NA \int d\vec{g} e^{-\frac{mg^2}{4kT}} g\sigma(g) &= \\
 = N^2 A \int d\vec{g} e^{-\frac{mg^2}{4kT}} g\sigma(g) = N^2 \left(\frac{m}{4kT} \right)^{3/2} \int d\vec{g} e^{-\frac{mg^2}{4kT}} g\sigma(g) &= \\
 = 4\pi N^2 \left(\frac{m}{4\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty dg e^{-\frac{mg^2}{4kT}} g^3 \sigma(g) &= \\
 = \frac{N^2}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty g^3 \sigma(g) e^{-\frac{mg^2}{4kT}} dg. & \quad (69)
 \end{aligned}$$

Демак, бирлик вақтдаги туқнашишлар сони $v_{\text{тук}}$ қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$v_{\text{тук}} = \frac{N^2}{2\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty g^3 \sigma(g) e^{-\frac{mg^2}{4kT}} dg. \quad (70)$$

Изоҳ. 1. Агар идеал қаттиқ шарлар учун $\sigma = \pi d^2 = 4\pi r_0^2$ (бунда r_0 — зарранинг радиуси) қабул қилинса, (70)ни қуйидаги кўринишга келтириш мумкин:

$$\begin{aligned}
 v_{\text{тук}} &= \frac{N^2}{2\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \pi r_0^2 \left(\frac{4kT}{m} \right)^2 \int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx = \\
 &= \frac{16N^2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{kT}{m} \right)^{1/2} \pi r_0^2 = 16N^2 \left(\frac{\pi kT}{m} \right)^{1/2} r_0^2; \\
 v_{\text{тук}} &= 16N^2 \left(\frac{\pi kT}{m} \right)^{1/2} r_0^2. \quad (71)
 \end{aligned}$$

Бунда

$$\frac{1}{Z} = \mu \frac{dn}{dn} = \mu \hbar \omega, \quad \mu = e^{-\beta \hbar \omega} \quad (7)$$

Бу усул билан олинган статистик йиғинди

$$Z = \frac{1}{2} \coth \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \frac{e^{x/2} - e^{-x/2}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} \quad (8)$$

2. Агар $x \ll 1$ шарт бажарилса,

$$e^{x/2} + e^{-x/2} \approx 2$$

эканлигидан $Z \approx Z_0$ келиб чиқади.

3. (6) даги тақсимот функцияси

$$f(E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} \quad (9)$$

ифодасида E энергия (5) билан аниқланади; $\beta = 1/\langle \epsilon \rangle$. Бундай тақсимот функцияси биринчи марта Блох томонидан бошқача усул билан олинган (қ. [11]).

4. Иссиқлик сифими $C = \partial U / \partial T$ асосида (4) дан фойдаланиб топилади:

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial \langle \epsilon \rangle}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial T} = k (x Z_0)^2 \quad (10)$$

6.33-масала. N та бир-бирига боғлиқ бўлмаган осцилляторлар тизимининг ўртача энергияси $\langle E \rangle$ ва статистик йиғиндиси Z_N аниқланг.

Еч и ш. Идеал осцилляторлар учун тизимнинг ўртача энергияси ҳар бир осцилляторнинг ўртача энергиялари йиғиндисига тенг, яъни

$$\langle E \rangle = N \langle \epsilon \rangle = N \frac{\hbar \omega}{2} \coth \frac{x}{2}, \quad x = \frac{\hbar \omega}{kT} \quad (1)$$

Бир-бирига боғлиқ бўлмаган фарқланувчи осцилляторлар учун эҳтимолликларни кўпайтириш теоремасидан фойдаланиб

$$Z_N = Z_1^N \quad (2)$$

эканлигини аниқлаш мумкин. Осцилляторлар тизимининг энергияси

$$E_j = E_1 + E_2 + \dots + E_N = \hbar \omega \left(\frac{N}{2} + j \right), \quad (3)$$

Ҳар бир энергия сатҳи j

$$g_j = \frac{(j+N-1)!}{j!(N-1)!} \quad (4)$$

қаррали айланишга эга. Демак, тизимнинг статистик йиғиндисини

$$Z_N = \sum_{j=0}^{\infty} g_j e^{-\beta_0 h \omega \left(\frac{N}{2} + j \right)} = e^{-N\epsilon/2} \sum_{j=0}^{\infty} g_j e^{-\beta \epsilon}.$$

Биноминал тақсимотдан қуйидаги муносабат маълум:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+N-1)!}{j!(N-1)!} \alpha^j = (1-\alpha)^{-N}. \quad (5)$$

Бунда $\alpha = e^{-\epsilon}$ деб ҳисоблаб, ушбуни оламиз:

$$Z_N = e^{-N\epsilon/2} (1 - e^{-\epsilon})^{-N} = \left(\frac{e^{-\epsilon/2}}{1 - e^{-\epsilon}} \right)^N = Z_1^N \quad (6)$$

6.10-§. КВАНТ РОТАТОР

Бир атом атрофида иккинчисининг айланиши туфайли ҳосил бўладиган айланма ҳаракатланувчи (икки атом орасидаги масофа ўзгармайдиган) айлангични р о т а т о р дейилади (6.17-расм). Классик механикада бундай ротаторнинг кинетик энергияси


$$E_k = \frac{m v^2}{2} = \frac{m \omega^2 r^2}{2} = \frac{J \omega^2}{2} = \frac{M^2}{2J} \quad (80)$$

(илгариланма ҳаракатдаги масса m , импульс p айланма ҳаракатда инерция моменти J ва ҳаракат миқдори моменти M билан алмашинади).

Квант механикасида M^2 дискрет қийматлар қабул қилади:

$$M_l^2 = \hbar^2 l(l+1) \quad (81)$$

Айланма ҳаракатдаги ротаторнинг энергияси (81) га асосан



6.17-расм.

$$\begin{array}{l}
 \text{--- } l=4, E_4 = \frac{16h^2}{J} \\
 \text{--- } l=3, E_3 = \frac{9h^2}{J} \\
 \text{--- } l=2, E_2 = \frac{4h^2}{J} \\
 \text{--- } l=1, E_1 = \frac{h^2}{J} \\
 \text{--- } l=0, E_0 = 0
 \end{array}
 \quad E_l = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2J} \quad (82)$$

6.18-расм.

ифода билан аниқланган, яъни у дискрет қийматлар қабул қилади. Аммо осциллятордан фарқли ўлароқ, ротатор энергиясининг ҳар бир қийматига магнит квант сонлари билан фарқланувчи $(2l + 1)$ та ҳар хил ҳолатлар

тўғри келади, яъни ротаторнинг ҳолати $2l + 1$ каррали айнишга эга.

(82) дан кўринадики, l ортиши билан икки энергия сатҳлари орасидаги фарқ ҳам ортиб боради (6.18-расм):

$$E_l - E_{l-1} = \frac{\hbar^2 l}{J} \quad (83)$$

6.11-§. ИДЕАЛ ГАЗЛАРНИНГ ИССИҚЛИК СИҒИМИ

Классик статистикада исботланган энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланиш теоремасини идеал газнинг иссиқлик сиғимини аниқлашга қўлайлик.

N та кўп атомли молекуладан иборат идеал газни кўрайлик. Ҳар бир молекула 3 та илгариланма, 3 та айланма ва s та тебранма эркинлик даражаларига эга бўлсин. Эркинлик даражалари орасидаги ўзаро таъсир эътиборга олинмасин. Бундай газнинг ички энергияси U ҳар бир эркинлик даражасига $kT/2$ энергия тўғри келиши ҳақидаги теоремага асосан,

$$U = Nu = N \left(3 \frac{kT}{2} + 3 \frac{kT}{2} + skT \right) = NkT(3 + s) \quad (84)$$

ифода билан аниқланади. Бундай газнинг иссиқлик сиғими

$$C_V = \partial U / \partial T = Nk(3 + s) \quad (85)$$

ифода билан аниқланади. (85) ифодадан кўринадики, кўп атомли молекулалардан иборат иссиқлик сиғими C_V температурага боғлиқ эмас. Аммо тажриба натижалари ҳар доим ҳам (85) ифодага мос келавермайди. Айниқса, паст температураларда (85) ифода билан тажриба натижалари орасида кескин фарқ мавжуд.

Масалан, икки атомли газ учун назария бунича 3 та илгариланма, 2 та айланма ва 1 та тебранма эркинлик даражалари булганлиги туфайли $U = N(3kT/2 + kT + kT) = \frac{7N}{2} kT$. 1 моль учун эса $C_V = 7R/2 \approx 29,3$ Ж/моль $\cdot$ К иссиқ сиғим булиши лозим. Хона температурасидаги икки атомли газ бундай катта иссиқлик сиғимига эга эмаслигини тажриба курсатади. Бундан ташқари иссиқлик сиғими температурага боғлиқ эканлиги ҳам кузатилади.

1 моль қаттиқ жисмнинг иссиқлик сиғими, энергиянинг тенг тақсимланиши ҳақидаги теоремага асосан, $C_V = 3R = 25$ Ж/моль $\cdot$ К тенг (Дюлонг-Пти қонуни). Аммо паст температураларда қаттиқ жисмнинг иссиқлик сиғими температурага боғлиқ ва температура нолга интилганда иссиқлик сиғими ҳам нолга интилади. Классик статистика натижаси билан тажриба орасидаги бундай тафовут сабаби — молекулаларнинг квант табиати эътиборга олинмаганлигидадир ва, демакки, энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланиши қонунини паст температурали тизимлар учун ҳам қўллаш оқибатидир.

Икки атомли молекулалардан ташкил топган газни (масалан, H_2 , O_2 , N_2 , CO ва башқаларни) қарайлик. Бундай ҳолда ҳар бир молекуланинг илгариланма, айланма, тебранма ҳаракати мавжуд; булардан ташқари электрон ва ядро энергиялари ҳам мавжуд. Шу сабабли бундай газнинг ички энергияси умумий ҳолда юқоридаги ҳаракат энергияларига боғлиқ, яъни

$$U = U_{\text{илг}} + U_{\text{айл}} + U_{\text{тебр}} + U_{\text{эл}} + U_{\text{яд}}. \quad (86)$$

Одатда, амалда кузатиладиган температураларнинг ўзгариши атом ва молекулаларнинг электрон ва ядро ҳолатларига, яъни унинг ўзгаришига деярли таъсир этмайди. Шунинг учун газларнинг иссиқлик сиғимини қаралганда электрон ва ядро ҳолатларига тегишли ички энергияни одатда ҳисобга олинмайди. Демак, икки атомли газнинг иссиқлик сиғими

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = C_{\text{илг}} + C_{\text{айл}} + C_{\text{тебр}} \quad (87)$$

ифода билан аниқланади.

1 моль газни қарайлик. Классик статистика қонунини асосан, ҳар бир илгариланма эркинлик даражасига $kT/2$ энергия тўғри келишини эътиборга олсак,

$$U_{\text{илг}} = \frac{kT}{2} \cdot 3N_A$$

булади ва бундан

$$C_{\text{илг}} = \frac{3N_A k}{2} = \frac{3R}{2} \quad (88)$$

келиб чиқади.

Айланма ҳаракатга тегишли иссиқлик сифими $C_{\text{илг}}$ ни қарайлик. l ҳолатдаги ротаторнинг энергияси

$$E_l = \frac{\hbar^2}{8\pi^2 J} l(l+1) = \frac{\hbar^2}{2J} l(l+1). \quad (89)$$

Ротаторнинг ҳолати $(2l+1)$ каррали айниш сонига тенг бўлгани учун унга тегишли статистик йиғинди $Z \approx Z_r$

$$Z_r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta E_l} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2JkT}} \quad (90)$$

ифода билан аниқланади. Бу Z_r ифоданинг икки чегаравий ҳолларини қарайлик.

а) Температура жуда паст бўлсин, яъни $T \rightarrow 0$. Бу ҳолда (90) ифодада 2 та ҳд ($l=0, l=1$) билан чегараланамиз, яъни

$$\lim_{T \rightarrow 0} Z_r = 1 + 3e^{-\frac{\hbar^2}{JkT}}. \quad (91)$$

б) Юқори температурали ҳол

$$T_s = \frac{\hbar^2}{2Jk} \ll T \quad (92)$$

бўлсин. Бу ҳолда ротатор энергияси сатҳлари бир-бирига нисбатан яқин бўлгани учун, l ни узлуксиз узгаряпти деб қараб, (90) даги йиғиндини интеграл ифода билан алмаштирамиз:

$$Z_r = \int_0^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\hbar^2}{2JkT} l(l+1)} dl = \int_0^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{T_s}{T} l(l+1)} dl \quad (93)$$

ёки $x = (T_s/T)l(l+1)$ узгарувчи киритиб, (93) ни қуйидагича ёзишимиз мумкин:

$$Z_r = \frac{T}{T_s} \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \frac{T}{T_s} (-e^{-x}) \Big|_0^{\infty} = \frac{T}{T_s} = \frac{2JkT}{\hbar^2}. \quad (94)$$

Ички энергия U ни статистик физиканинг умумий усулига асосан

$$U = NkT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} \quad (95)$$

ифода билан аниқланади. Бу ифодадан $T \rightarrow 0$ да U температурага боғлиқ эмаслиги ва демак $T \rightarrow 0$ да C_v нолга тенг эканлиги келиб чиқади, яъни

$$U_v = \text{conste} \frac{1}{kT}.$$

$T \rightarrow 0$ да $U_v \rightarrow 0$ ва демак $C_v = 0$, яъни температура $T \rightarrow 0$ бўлганда иссиқлик сифими нолга интилади $C_v \rightarrow 0$ (6.19-расм).

Юқори температурада, яъни $T \gg T_v$ да

$$U_v = N_A k T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = N_A k T \quad (96)$$


Бундан 1 моль учун

$$C_v = R \quad (97)$$

ифодани оламиз (6.19-расмга қ.). Расмда айланма ҳаракатга тегишли иссиқлик сифими C_v нинг температурага боғлиқлик характери (схематик равишда) берилган. Симметрик икки атомли молекуланинг 2 та айланма эркинлик даражалари мавжуд (2 та бурчак). Классик статистикага асосан ҳар бир эркинлик даражасига ўртача $kT/2$ энергия тўғри келганлиги учун 1 моль икки атомли газнинг ички энергияси $U_v = N_A k T$ дан иборат, яъни юқори температура ($T \gg T_v$) да квант статистикасининг натижаси (96) классик статистикага мос келади.

Бу ерда шуни таъкидлаймизки, айланма характеристик температура T_v молекуланинг инерция моменти J га тесқари мутаносиб бўлгани учун ((92) формулага қ.) энг енгил молекула H_2 да $T_v = 95^\circ\text{K}$. Бошқа молекулаларда эса бундан кичик температураларда квант эффектлар намоён бўла бошлайди.

Тебранма ҳаракатга тегишли иссиқлик сифими C_v ни қарайлик. Ҳар бир икки атомли молекулани квант осцил-



6.19-расм.

Демак, 1 моль икки атомли газнинг тебранма ҳаракатига тугри келган ички энергия

$$U_V = N_A \langle \varepsilon \rangle = \frac{N_A \hbar \omega}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega}{2kT}. \quad (99)$$

Бу тебранма ҳаракатга тегишли иссиқлик сифими

$$\frac{C_{vib}}{N_A} = \frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial T} = \frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T},$$

$$x = \beta \hbar \omega, \quad \beta = 1/kT;$$

$$\frac{\partial x}{\partial \beta} = \hbar \omega; \quad \frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{k}{T^2}, \quad \frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial x} = \hbar \omega Z^{-1}, \quad Z = \frac{1}{e^{x/2} - e^{-x/2}};$$

$$C_{vib} = N_A k (xZ)^2 = R(xZ)^2.$$

Демак, 1 моль учун

$$C_{vib} = R(xZ)^2. \quad (100)$$

Бу C_{vib} иссиқлик сифимининг чегаравий ҳолларини кўрайлик.

а) $x = \frac{\hbar \omega}{kT} = \frac{T_x}{T} \ll 1$ бўлсин; $T_x = \frac{\hbar \omega}{k}$ характеристик температура; $T \gg T_x$ юқори температурали ҳол. Бу ҳолда

$$Z = \frac{1}{e^{x/2} - e^{-x/2}} \approx \frac{1}{1 + \frac{x}{2} - 1 + x/2} = \frac{1}{x}.$$

Демак,

$$C_{vib} \approx R. \quad (101)$$

б) $x \gg 1$ ($T \ll T_x$) паст температурали ҳол:

$$Z = \frac{1}{e^{x/2} - e^{-x/2}} \approx e^{-x/2}. \quad (102)$$

(102)ни назарда тутиб, (100) ни қуйидагича ёзамиз:

$$C_{vib} \approx R x^2 e^{-x}, \quad x = \frac{\hbar \omega}{kT}. \quad (103)$$

Демак, паст температураларда иссиқлик сифими (103) экспонента туфайли температура камайини билан камайиб


М-йилтаги жалвавлз айним икки атомли газларнинг ха-
рактеристик температуралари берилган.

Молекула газ	Айланма ҳаракат учун характеристик температура, °K	Тебранма ҳаракат учун характеристик температура, °K
H_2	95	6000
N_2	2,85	3340
O_2	2,07	2280
HCl	15,1	4140
HF	9,0	3300


Жадвалдан куринадики, тебранма характеристик темпе-
ратура бир неча минг градусга тенг булиб, одатда хона тем-
ператураларила бу эркинлик даражалари намоён булмайди;
улар "музлаган" ҳолатда булиб, энергия алмашинишларида
иштирок этмайди (ёки деярли иштирок этмайди). Электрон
ҳолатларига тегишли характеристик температура бу темпе-
ратуралардан ҳам юқори булгани учун улар ҳам хона темпе-
ратураси узгаришларида иштирок этмайди, уларнинг энер-
гия алмашинишида иштироки булмайди ва демак, иссиқлик
сиғимида иштирок этмайди.

Умуман $T > T_c$ да классик статистикадан, $T \leq T_c$ да эса
квант статистикасидан фойдаланиш зарур. Температура паст
 $T < T_c$ булганда зарраларнинг уртача энергияси kT квант
ҳолатларини уйғотиш учун етарли булмайди; температура
юқори $T > T_c$ булганда эса зарранинг уртача энергияси kT
уларнинг квант ҳолатларини уйғотиш учун етарли булади.

Энг юқори температура-
ларда ҳамма эркинлик да-
ражалари энергия алмаши-
нишида иштирок этиши
мумкин ва демак улар ис-
сиқлик сиғими ифодасида
иштирок этишлари мумкин.
Аммо температура камайи-
ши билан эркинлик дара-
жаларидан аввал тебранма



6.20-расм.



6.21-расм.

пажалари энергия алмаши-

қўядилар, яъни иссиқлик
сигими ифодаларида улар-
нинг ҳиссалари булмайди.
Иссиқлик сигимининг тем-
пература камайиши билан

узгариб, камайиб бориши шу билан изоҳланади (6.21-расм-
га қ.)

Қўп атомли молекулалардан иборат газ иссиқлик сиги-
мининг температурага боғлиқлиги худди юқоридагидай ту-
шунтирилади.

VII БОБ

РЕАЛ ГАЗЛАР

7.1-§. КИРИШ

Реал газларнинг молекулалари ўзаро таъсирда бўлиб, улар
тез-тез тўқнашиб турганликлари учун уларнинг хоссалари
идеал газ хоссаларидан фарқланади. Молекулаларнинг ўза-
ро таъсири уларнинг уйғонган ҳолатларига ҳам боғлиқ. Аммо
осонлик учун бу эффектни ҳисобга олмаймиз. Бу ҳолда мо-
лекуланинг ички ҳаракати билан боғлиқ статистик йиғинди
доимий қолади. Шу сабабли у катталикини қарамаймиз.
Бошқача айтганда, классик реал газнинг тўла энергияси E
ни зарраларнинг кинетик энергиялари йиғиндисидан E_k ва улар-
нинг ўзаро потенциал энергияси U дан иборат, яъни
 $E = E_k + U$ деб қараймиз:

$$E(\bar{p}_1, \bar{p}_2, \dots, \bar{p}_N, \bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_N) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{\bar{p}_i^2}{2m} + U(\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_N). \quad (1)$$

Классик физикада тизимнинг энергиясини кинетик ва по-
тенциал энергияларнинг йиғиндисидан иборат деб қараш
мумкин булгани сабабли, статистик физикадаги тақсимот
функцияси $\mathcal{Z}(E)$ ва статистик интеграл Z ни икки қўпай-
тирувчидан иборат деб қараш мумкин:

$$f(E)dn = \frac{1}{h^{3N}} e^{-\beta U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)} d\vec{p}_1, d\vec{p}_2, \dots, d\vec{p}_N \quad (2)$$

ёки

$$f(E)dn = f(E_k) d\vec{p}_1, d\vec{p}_2, \dots, d\vec{p}_N \cdot f(U) d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N$$

Буларда нормалаш шартлари қуйидагилар:

$$\int f(E_k) d\vec{p}_1, d\vec{p}_2, \dots, d\vec{p}_N = 1, \quad (3)$$

$$\int f(U) d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N = 1. \quad (4)$$

Бу ҳолда статистик интеграл нормалаш шартидан топилади:

$$Z = \int e^{-\beta E} dn, \quad (5)$$

$$Z = \frac{1}{h^{3N} g_N} \int e^{-\beta \sum_i \vec{p}_i^2 / 2m} d\vec{p}_1, d\vec{p}_2, \dots, d\vec{p}_N \times \\ \times \int e^{-\beta U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N, \quad (6)$$

$$dn = \frac{d\Gamma}{h^{3N} g_N} = \frac{dp dq}{h^{3N} g_N} = \frac{1}{h^{3N} g_N} d\vec{p}_1 \cdot d\vec{p}_2 \cdot \dots \cdot d\vec{p}_N \cdot d\vec{r}_1 \cdot d\vec{r}_2 \cdot \dots \cdot d\vec{r}_N \quad (7)$$

Булардан

$$Z = \frac{1}{h^{3N} g_N} (2\pi m \theta)^{3N/2} Q_N, \quad \theta = 1/\beta \quad (8)$$

$$Q_N = \int e^{-\beta U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N; \quad (9)$$

Q_N — конфигурацион интеграл умумий ҳолда қўп заррали тақсимот функцияси $f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$ орқали, хусусий ҳолда — тизим мувозанатда бўлганда

$$e^{-\beta U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)} \quad (10)$$

функция орқали аниқланади.

$$\overline{N_A} = nV_A. \quad (18)$$

Квадратик ўртача $\overline{N_A^2}$ нинг ифодасини аниқлайлик:

$$\overline{N_A^2} = \langle \sum_i \sum_j m(\vec{r}_i) m(\vec{r}_j) \rangle = \langle \sum_i m(\vec{r}_i)^2 + \sum_{i \neq j} m(\vec{r}_i) m(\vec{r}_j) \rangle. \quad (19)$$

Бунда $m(\vec{r}) m(\vec{r}) = m(\vec{r})$ экани ҳисобга олинди. (16) ва (18) га асосан

$$\langle \sum_i m(\vec{r}_i) \rangle = \overline{N_A} = nV_A. \quad (20)$$

(19) даги ўртачани қуйидагича ёзайлик:

$$\begin{aligned} & \langle \sum_{i,j} m(\vec{r}_i) m(\vec{r}_j) \rangle = \\ & = \sum_{i,j} \int \dots \int m(\vec{r}_i) m(\vec{r}_j) f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N = \\ & = N(N-1) \int \dots \int m(\vec{r}_1) m(\vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) d\vec{r}_3 d\vec{r}_4 \dots d\vec{r}_N = \\ & = \int \int m(\vec{r}_1) m(\vec{r}_2) f(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 = \\ & = n^2 \int \int m(\vec{r}_1) m(\vec{r}_2) g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2, \end{aligned} \quad (21)$$

бунда икки заррали тақсимот функцияси қуйидагича аниқланади:

$$\begin{aligned} f(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= N(N-1) \int \dots \int f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) d\vec{r}_3 d\vec{r}_4 \dots d\vec{r}_N = \\ &= f(\vec{r}_1) f(\vec{r}_2) g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = n^2 g(\vec{r}_1, \vec{r}_2). \end{aligned} \quad (22)$$

Бунда жуфт корреляция функцияси $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ биринчи зарра $d\vec{r}_1$ элементда бўлганда, иккинчи зарранинг $d\vec{r}_2$ элементда бўлиши эҳтимолини кўрсатади ёки аксинча, иккинчи зарра $d\vec{r}_2$ да бўлганда, биринчи зарранинг $d\vec{r}_1$ да бўлиши эҳтимолини аниқлайди.

Икки зарра бир-биридан етарли даражада узоқда бўлса, уларнинг орасидаги ўзаро таъсир ва, демак, корреляция ҳисобга олинмаслиги мумкин, яъни $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = |\vec{r}| \rightarrow \infty$ бўлганда,

$$f(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = f(\vec{r}_1) f(\vec{r}_2) g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \rightarrow f(\vec{r}_1) f(\vec{r}_2)$$

бўлади ва, демак, $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \rightarrow 1$ бўлади.

(20) ва (21) ни назарда тутиб, (19) ни қуйидагича ёзамиз:

$$\overline{N_A^2} = \overline{N_A} + n^2 \int g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2. \quad (23)$$

Саноқ тизимининг боши учун зарралардан бири, масалан, биринчи зарра турган жойни танлаб олинса, $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \rightarrow g(\vec{r})$ бўлади; $\vec{r}$ — икки зарра орасидаги масофа. Бу ҳолда

$$\int g(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 = \int d\vec{r}_1 \int g(\vec{r}) d\vec{r} = V_A \int g(\vec{r}) d\vec{r}.$$

Бунини эътиборга олиб, (23) ни ёзамиз:

$$\overline{N_A^2} = \overline{N_A} + n^2 V_A \int g(\vec{r}) d\vec{r}. \quad (24)$$

(18) ва (24) дан қуйидаги нисбатни ёзамиз:

$$\frac{\overline{N_A^2} - \overline{N_A}^2}{\overline{N_A}} = 1 + n \int g(\vec{r}) d\vec{r} - nV_A = 1 + n \int (g(\vec{r}) - 1) d\vec{r}. \quad (25)$$

(25) да $\overline{N_A^2} - \overline{N_A}^2 = (\Delta N_A)^2$ — зарралар сони флуктуациясидир. Флуктуация назариясига асосан

$$(\Delta N_A)^2 = N_A n \theta \chi_T \quad (26)$$

тенглик ўринли, $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$. Бизга маълумки (4.17-масалага қ.)

$$P = n\theta \quad (27)$$

ва

$$P \chi_T = \mu^{-1} \quad (28)$$

(26), (27) ва (28)лардан фойдаланиб, (25) ни қайта ёзамиз:

$$\mu^{-1} = 1 + n \int d\vec{r} (g(\vec{r}) - 1) \quad (29)$$

Изотроп тизим учун $g(\vec{r}) = g(r)$ бўлганлигидан

$$\mu^{-1} = 1 + n \int dr (g(r) - 1) \quad (30)$$

тенглама ўринли. (29) ва (30) тенгламалар жуфт корреляция функциялари $g(\vec{r})$ ва $g(r)$ нинг μ корреляцион параметр билан боғланишини аниқлайди.

Корреляция функциясини, таъриф бўйича, баъзан қуйидагича аниқлайдилар:

$$c(\vec{r}) = g(\vec{r}) - 1$$

§ 7.4-§. КОНФИГУРАЦИОН ИНТЕГРАЛ

Конфигурацион интеграл

$$Q_N = \int e^{-\beta U} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N \quad (31)$$

ифодасидаги ўзаро таъсир потенциали U ни жуфт яқинлашишга биноан

$$U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = \sum_{i>j} u(r_{ij}) \quad (32)$$

кўринишда ёзамиз. Бу ҳолда

$$e^{-\beta U} = \prod_{i,j} e^{-\beta u(r_{ij})} \quad (33)$$

Бу жуфтлар кўпайтмаси $e^{-\beta u_{ij}}$ ни

$$e^{-\beta u_{ij}} = 1 + f_{ij} \quad (34)$$

каби ўзгартириб ёзайлик. Бу ҳолда (33) қуйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned} e^{-\beta U} &= \prod (1 + f_{ij}) = \\ &= (1 + f_{12})(1 + f_{13}) \dots (1 + f_{1N}) \cdot (1 + f_{23}) \dots (1 + f_{N-1N}) = \\ &= 1 + f_{12} + f_{13} + \dots + f_{1N} + f_{23} + \\ &+ \dots + f_{N-1N} + f_{12}f_{13} + \dots f_{12}f_{13} \dots f_{N-1N}. \end{aligned} \quad (35)$$

$u(r)$ нинг масофага қараб ўзгариши тархий равишда 7.2-расмда кўрсатилган. Бунда d тақрибан зарра диаметрига (икки радиусга) тенг. Агар атомлар (ёки молекулалар) орасидаги масофа $r < d$ бўлса, улар электронлар қобиғини деформациялаб бир-бири билан тўқнашиш жараёнида бўладилар:

бир-бирини итаришади; $r > d$ бўлганда эса зарраларда бир-бирини тортишиш кучи намоеён бўлади.

Одатда нейтрал зарралар (атомлар, молекулалар) орасидаги ўзаро таъсир $r > \rho$ бўлганда (ρ эса d дан 3—4 марта катта) амалда нолга яқин бўлади.

Шу сабабли агар $r \leq \rho$ бўлса, f_v нолдан фарқли бўлади, агар $r > \rho$ бўлса, унинг ифодасидан куринадики, у амалда нолга тенг бўлади. $f_{12}f_{13}$ кўпайтма нолдан сезиларли фарқли бўлиши учун $r_{12} < \rho$ ва $r_{13} < \rho$ бўлиши лозим, $f_{12}f_{13}f_{14}$ да эса $r_{12} < \rho$, $r_{13} < \rho$, $r_{14} < \rho$ бўлиши зарур ва ҳ. к. Демак, бу ҳадлар нолдан сезиларли фарқли бўлиши учун ρ радиусли сфера ичида бир вақтда иккита, учта, тўртта ва ҳ. к. зарралар бўлиши талаб этилади.

Фараз қилайлик, реал газ етарли даражада сийрак бўлиб, бир вақтда ρ радиусли сфера ичида учта ва ундан ортиқ зарралар бўлиши эҳтимолн амалда нолга тенг булсин. У ҳолда


$$e^{-\beta U} \approx 1 + \sum_v f_v \quad (36)$$

тақрибий тенглик ўринли бўлади. (36) ифодани Q_v нинг ифодаси (31) га қўямиз:

$$\begin{aligned} \int e^{-\beta U} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N &= \int \left(1 + \sum_v f_v \right) d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N = \\ &= \int d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N + \sum_v \int f_v d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N = \\ &= V^N + \sum_v \left[\int f_v d\vec{r}_i, d\vec{r}_j \right] d\vec{r}_1, \dots, d\vec{r}_{i-1} d\vec{r}_{i+1} d\vec{r}_{j-1} d\vec{r}_{j+1} \dots d\vec{r}_N = \\ &= V^N + V^{N-2} \frac{N(N-1)}{2} \int f_v d\vec{r}_i, d\vec{r}_j. \end{aligned} \quad (37)$$

Интегрални ҳисоблаш учун сферик координаталар тизими-га ўтайлик. Координата боши учун i -зарра турган жойни қабул қилайлик. У ҳолда

$$\begin{aligned} \int f_v d\vec{r}_i, d\vec{r}_j &= \int d\vec{r}_i \int \left(e^{-\beta U(r)} - 1 \right) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr = \\ &= V \cdot 4\pi \int \left(e^{-\beta U(r)} - 1 \right) r^2 dr \end{aligned}$$



7.2-расм.

$$Q_N = V^N + V^{N-1} 2\pi N(N-1) \int_0^d (e^{-\beta U(r)} - 1) r^2 dr. \quad (38)$$

Қуйидаги белгилаш киритайлик:

$$b = 4\pi \int_0^d (e^{-\beta U(r)} - 1) r^2 dr = \int (e^{-\beta U(r)} - 1) d\vec{r}. \quad (39)$$

(39) ифодани эътиборга олиб (38) ни қайта ёзамиз:

$$Q_N = V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-1} b. \quad (40)$$

Реал сийрак газ статистик интегралли Z_N идеал газ статистик интегралли $(Z_1/N)^N$ дан

$$\left(1 + \frac{N(N-1)}{2V} b\right)$$

билан фарқланади, яъни

$$Z_N = (Z_1/N)^N \left(1 + \frac{N(N-1)}{2V} b\right). \quad (41)$$

(39) интегрални қуйидагича ёзамиз:

$$b = 4\pi \int_0^d [e^{-\beta U(r)} - 1] r^2 dr + 4\pi \int_d^\infty [e^{-\beta U(r)} - 1] r^2 dr. \quad (42)$$

Бу интеграл ифодаларни алоҳида-алоҳида таҳлил этайлик.

1) $r \leq d$ соҳада $U(r) > 0$ етарли даражада катта (7.2-расмга қ.) яъни $U(r) \gg 1$. Шу сабабли, берилган β қийматда

$$e^{-\beta U(r)} \ll 1. \quad (43)$$

Бу ҳолда биринчи интеграл

$$\begin{aligned} b_1 &= 4\pi \int_0^d [e^{-\beta U(r)} - 1] r^2 dr \approx -4\pi \int_0^d r^2 dr = \\ &= -\frac{4\pi}{3} d^3 = -\frac{4\pi}{3} (2r_0)^3 = -8 \frac{4\pi}{3} r_0^3 = -8\vartheta_0; \end{aligned} \quad (44)$$

бу ерда ϑ_0 — битта зарранинг ҳажми.

4) иккинчи интегрални қарайлик. Бунда $r > d$ бўлган-
лиги сабабли $U(r)$ жула кичик ва манфий қийматли, яъни
 $U(r) < 0$. Бу ҳолда $\beta|U(r)| \ll 1$ бўлса,

$$e^{-\beta U(r)} \approx 1 - \beta U(r) = 1 + \beta |U(r)|. \quad (45)$$

(45) ни (42) даги иккинчи интегралга қўйиб, ушбуни
оламир:

$$4\pi \int_d^{\infty} [e^{-\beta U(r)} - 1] r^2 dr \approx 4\pi\beta \int_d^{\infty} |U(r)| r^2 dr. \quad (46)$$

Демак,

$$b = -8v_0 + 4\pi\beta \int_d^{\infty} |U(r)| r^2 dr. \quad (47)$$

(46) ни қуйидагича тушуниш мумкин:

$$\frac{4\pi}{V} \int_d^{\infty} |U(r)| r^2 dr = \frac{1}{V} \int_d^{\infty} |U(r)| dV = \bar{U}_{r/v}, \quad (48)$$

бунда $\bar{U}_r$ — идиш ҳажми бўйича ўртачаланган тортиш ку-
чига тўғри келган жуфт ўзаро таъсир потенциалининг ўрта-
ча қиймати (мусбат қиймати (модули) олинган). Буни эъти-
борга олсак,

$$b = -8v_0 + \beta \bar{U}_r. \quad (49)$$

7.1-масала. 1) Реал газнинг статистик интеграл ифода-
си асосида ҳолат тенгламаси — босимнинг ифодасини аниқ-
ланг.

2) олинган ҳолат тенгламасини Ван-дер-Ваальс тенгла-
маси билан таққосланг.

3) Ван-дер-Ваальс тенгламасидаги a ва b тузатмалар-
нинг физик маъноларини аниқланг.

Е ч и ш. Юқорида қаралган сийрак реал газ учун статис-
тик интеграл

$$Z_N = (Z_1 / N)^N \left(1 + \frac{N(N-1)}{2V} b \right) \quad (1)$$

қурилишда эди; бунда

$$Z_1 = V \left(\frac{2\pi m \theta}{h^2} \right)^{3/2}, \quad \theta = U / v. \quad (2)$$

Эркин энергия F нинг ифодаси ва босим P нинг ифодаси
термодинамикадан маълум:

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \theta \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial V} \right)_T.$$

(1) дан қуйидагини оламиз:

$$\ln Z_N = \ln (Z_1 / N)^N + \ln \left(1 + \frac{N(N-1)}{2V} b \right). \quad (3)$$

$\frac{N(N-1)b}{2V} \ll 1$ шарт бажарилсин. У ҳолда

$$\ln \left(1 + \frac{N(N-1)b}{2V} \right) \approx \frac{N(N-1)b}{2V}. \quad (4)$$

У ҳолда

$$\ln Z_N \approx \ln (Z_1 / N)^N + \frac{N(N-1)b}{2V}. \quad (4, a)$$

Бундан фойдаланиб босим учун ушбуни оламиз:

$$P = \theta \left(\frac{\partial \ln (Z_1 / N)^N}{\partial V} \right)_T + \theta \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{N(N-1)b}{2V} \right)_T = \theta \frac{N}{V} - \theta \frac{N(N-1)b}{2V^2}. \quad (5)$$

Бу ҳолат тенгламаси $n = N/V$ эканлигидан,

$$P = n\theta \left(1 - \frac{N-1}{2V} b \right). \quad (6)$$

2) Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b_B) = NkT. \quad (7)$$

Буни қуйидагича ёзамиз:

$$P_B = \frac{NkT}{V - b_B} - \frac{a}{V^2} = \frac{NkT}{V(1 - b_B/V)} - \frac{a}{V^2}.$$

$\frac{b_B}{V} \ll 1$ шарт бажарилсин. Бу ҳолда

$$P_B = \frac{NkT}{V} + \frac{NkTb_B}{V^2} - \frac{a}{V^2}. \quad (8)$$

(5) ва (8) ларни таққослаб ва $\bar{\theta} = kT$ деб қабул қиллиб, ушбуни топамиз:

$$\frac{a(N-1)Nk}{2} = a - NkTb$$

ски бундан

$$b = \frac{2}{N-1} \left(\frac{a}{NkT} - b \right). \quad (9)$$

Демак, (9) тенглик бажарилганда жуфт таъсир ҳисобга олингандаги ҳолат тенгламаси (5) билан Ван-дер-Ваальс ҳолат тенгламаси (7) бир-бирига мос келади.

3) b учун ((49) га қ.)

$$b = -8\vartheta_0 + \bar{U}_T \cdot \beta \quad (10)$$

ифода олинган эди; бунда $\beta = 1/kT$. (9) ва (10) ларни солиштирсак,

$$b_0 = 4\vartheta_0(N-1), \quad (11)$$

$$a = \frac{N(N-1)}{2} \bar{U}_T. \quad (12)$$

(11) ифодадан кўринадики, Ван-дер-Ваальс тузатмаси b_0 зарраларнинг хусусий ҳажми ϑ_0 билан боғлиқ, N га кўпайтмаси эса ҳамма зарраларнинг хусусий ҳажмлари йиғиндиси билан боғлиқ. Демак, зарра эркин ҳаракат қилаётган ҳажм идиш ҳажми V дан уларнинг ҳажми айирмаси билан аниқланади, яъни

$$V - b_0 \text{ (идеал газ учун } b_0 = 0).$$

Ван-дер-Ваальс тенгламасидаги босимга тузатма a эса, (12) дан кўринадики, тортишиш кучлари билан боғлиқ. Бунда

$$\left(P_{\text{реал}} + \frac{a}{V^2} \right) = P_{\text{ид}} \quad (13)$$

десак,

$$P_{\text{реал}} = P_{\text{ид}} - \frac{a}{V^2}. \quad (14)$$

Бунда a/V^2 тортишиш кучлари туфайли ҳосил буладиган ички босим. Ана шу ички босим туфайли реал газнинг идиш деворига босими идеал газнинг идиш деворига босимидан шу ички босим a/V^2 га кам булади [(13) ифодадан бу равшан кўриниб турибди].

Ван-дер-Ваальс тенгламаси (7) дан кўринадикки, агар газ ҳажмини камайтириб (яъни газни сиқиб) V ни b_v га яқинлаштирсак, газ босими чексиз катталашиб боради.

Биз a ва b_v ларнинг ифодалари маълум шартлар бажарилганда (газ сийрак ва унинг температураси юқори бўлганда) олдик ва физик маъносини талқин этдик. Юқоридаги шартлар бажарилмаганда, унинг ифодаси, умуман бошқача бўлиши мумкин.

7.2-масала. Изотроп тизимда ўзаро потенциал жуфт потенциал бўлсин, яъни у фақат икки зарра орасидаги масофага боғлиқ бўлсин:

$$u(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|) = u(r_{ij}).$$

1) Бундай ҳолда ўзаро таъсир кучи вириалга

$$-\frac{1}{2} \sum_i r_{ij} f_{ij}$$

ҳисса қўшишини кўрсатинг.

2) V ҳажмли идиш девори томонидан P босимдаги газга таъсир этаётган куч вириалга $(3/2)PV$ ҳисса қўшишини кўрсатинг.

3) T температурали N та заррадан иборат классик реал газ учун

$$PV = n\theta + \frac{1}{3} \sum_i r_{ij} f_{ij}$$

тенглама ўринли эканлигини исбот қилинг.

Э с л а т м а. Эргодик теоремага асосан вақт бўйича ўртачалаш билан статистик ансамбль бўйича ўртачалаш ўзаро тенглиги ўринли деб қаралади.

Е ч и ш. 1) N та заррадан иборат тизимнинг вириали C , таъриф бўйича,

$$C = -\frac{1}{2} \sum_i \vec{F}_i \vec{r}_i$$

ифодадан аниқланади. Бунда $\vec{r}_i$ да турган заррага $\vec{F}_i = \frac{dp_i}{dt}$ куч таъсир этаётир. $\vec{r}_i$ ва $\vec{r}_j$ даги зарраларнинг ўзаро таъсир кучини ёзайлик (7.3-расм):

$$\vec{F}_i = -\vec{F}_j = \vec{F}.$$

Бу ҳолда, таъриф бўйича,

$$C_v = -\frac{1}{2} (\vec{F} \vec{r}_i - \vec{F} \vec{r}_j) = -\frac{1}{2} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \vec{F}. \quad (1)$$

Куч F ни қуйидагича ёзанлик

$$\vec{F}_y = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{r_{ij}} f_{ij} = \frac{r_{ij}}{r_{ij}} f_{ij}. \quad (2)$$

(1) ва (2) дан

$$C_{ij} = -\frac{1}{2}(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{r_{ij}} f_{ij} = -\frac{1}{2} r_{ij} f_{ij}. \quad (3)$$

Буни йиғиштириб (i ва j бўйича), сунг ансамбль бўйича ўртачалаб, изланаётган ифодани топамиз:

$$\sum_y \overline{C_{ij}} = -\frac{1}{2} \sum_y r_{ij} f_{ij}. \quad (4)$$

2) Идиш девори томонидан газнинг $d\sigma$ сирти элементи-га кўрсатилаётган куч $-Pnd\sigma$ га тенг ($\vec{n}$ — ташқи нормалнинг бирлик вектори). Шунга асосан вириалга қўшилаётган ҳисса:

$$\frac{P}{2} \int \vec{n} r d\sigma = \frac{P}{2} \int \text{div} \vec{r} dv = \frac{P}{2} \cdot 3 \int dV = 3PV/2 \quad (5)$$

ифодадан иборат.

Бунда Гаусс теоремасидан ва $\text{div} \vec{r} = 3$ эканлигидан фойдаландик. Тизим учун қуйидаги нормалаш шарти

$$\int f dn = A \int e^{-\beta E} dp dq = 1 \quad (6)$$

маълум. Бу интегралда $E(p, q)$ тизимнинг тула энергияси. Бу интегрални бўлаклаб интеграллайлик;

$$\begin{aligned} A \int dp e^{-\beta E} d\vec{q}_1, \dots, d\vec{q}_N &= A \int dp \left\{ \left[e^{-\beta E} \vec{q} \right] d\vec{q}_2, \dots, d\vec{q}_N + \right. \\ &+ \left. \beta \int \vec{q}_1 \frac{\partial E}{\partial q_1} e^{-\beta E} d\vec{q}_1 d\vec{q}_2 \dots d\vec{q}_N \right\} = A \beta \int dp \int \vec{q}_1 \frac{\partial E}{\partial q_1} e^{-\beta E} d\vec{q}_1 \dots d\vec{q}_N = \\ &= \beta \langle \vec{q}_1 \frac{\partial E}{\partial q_1} \rangle = 1 \end{aligned} \quad (7)$$


бундан умумий натижа

$$\theta = \langle \vec{q}_k \frac{\partial E}{\partial q_k} \rangle \quad (8)$$

ни оламиз.

Худди шунингдек,

$$\theta = \langle \vec{p}_k \frac{\partial E}{\partial p_k} \rangle = \langle \frac{\vec{p}_k^2}{m} \rangle \quad (9)$$



7.3-расм.

$$\left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle = \frac{n}{2} \quad (10)$$

($\bar{q}_k = a, \bar{q}_k = b$ ва $\bar{p}_k = a, \bar{p}_k = b$ да улар нолга тенг деб қабул қилинди).

Демак, кинетик энергиянинг ўртачаси учун:

$$\bar{E}_k = \sum_i \left\langle \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle = \frac{3n}{2} N = \frac{\theta}{2} \cdot 3N. \quad (11)$$

Бинобарин, вириал C га қўшилган ҳиссалар (1) ва (2) пунктлардаги ифодалар ҳисобга олиниб, вириал теоремани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\bar{E}_{(p)} = C = 3N \frac{\theta}{2} = \frac{3}{2} PV - \frac{1}{2} \sum_v \bar{r}_v f_v. \quad (12)$$

Бундан

$$P = n\theta + \frac{1}{3V} \sum_v \bar{r}_v f_v.$$

Тарихий маълумот. Вириал ҳақидаги теорема $E(p) = C$ Клаузиус томонидан 1870 йилда таърифланган. Бу теорема энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланиши ҳақидаги теоремадан келтириб чиқарилиши ҳам мумкин (Лотинча: vires — кучлар, vis — куч).

$$\bar{E}(p) = -\frac{1}{2} \sum_i \bar{r}_i \bar{F}_i$$

вириал дейилади. Агар куч потенциал характерли бўлса,

$$\bar{E}(p) = \frac{1}{2} \sum \bar{r}_i \nabla_i U(r) \text{ бўлади.}$$

7.3-масала. Реал газнинг ҳолат тенгламаси

$$PV = RT \left(1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \dots \right), \quad (1)$$

бу ерда B, C — вириал коэффициентлар. Ван-дер-Ваальс гази учун B, C ларни аниқланг.

Е ч и ш. Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT. \quad (2)$$

(2) ни қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$PV = \frac{RTV}{V-b} - \frac{a}{V} = RT \left(\frac{V}{V-b} - \frac{a}{RTV} \right) = RT \left(\frac{1}{1-b/V} - \frac{a}{RTV} \right). \quad (3)$$

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что в процессе формирования профессионального мышления у студентов факультета журналистики в процессе обучения в вузе происходит формирование профессионального мышления, которое проявляется в способности анализировать, синтезировать, обобщать, делать выводы, а также в способности к творческому мышлению.

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2 + \dots$$

дан фойдаланиб (3) ни ёзамиз:

$$PV = RT \left(1 + \frac{b}{V} + \frac{b^2}{V^2} + \dots - \frac{a}{RTV} \right) = RT \left[1 + \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right) + \frac{b^2}{V^2} + \dots \right]. \quad (4)$$

(1) ва (4) ни солиштириб, изланаётган коэффициентларни топамиз:

$$B = b - \frac{a}{RT}, C = b^2.$$

7.4-масала. Реал газ учун

$$PV = RTe^{\epsilon} \quad (1)$$

ҳолат тенгламаси мавжуд. Ван-дер-Ваальс газини учун f ни аниқланг.

Е ч и ш. (1) тенгламани

$$PV = RT \left(1 + f + \frac{1}{2} f^2 + \dots \right) \quad (2)$$

қўринишда ёзиш мумкин. Бу (2) тенгламани вириал коэф-
фициентлар B , C орқали ёзилган тенглама (қ. 7.3 масала)
билан солиштирсак,

$$\frac{B}{V} = f, \quad \frac{C}{V^2} = \frac{f^2}{2}. \quad (3)$$

Демак.

$$f = \frac{1}{V} \left(b - \frac{a}{RT} \right); C = \frac{1}{2} \left(b - \frac{a}{RT} \right)^2. \quad (4)$$

Изоҳ. fнинг ифодаси (4) ҳолат тенгламаси (4.68)га мос келишини таъкидлаймиз.

7.5-8. КҮП ЗАРРАЛИ ТАКСИМОТ ФУНКЦИЯСИ

Умумий ҳолда бир атомли N та заррадан иборат тизим-нинг

$$\begin{aligned} & \bar{q}_1, \bar{q}_1 + d\bar{q}_1, \quad \bar{p}_1, \bar{p}_1 + d\bar{p}_1, \\ & \bar{q}_2, \bar{q}_2 + d\bar{q}_2, \quad \bar{p}_2, \bar{p}_2 + d\bar{p}_2, \\ & \dots\dots\dots \\ & \bar{q}_N, \bar{q}_N + d\bar{q}_N, \quad \bar{p}_N, \bar{p}_N + d\bar{p}_N \end{aligned} \quad (50)$$

оралиқларда уларнинг умумлашган координаталари q ва умумлашган импульслари p бўлишлари эҳтимолини

$$\begin{aligned} dW(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N; \vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_N) &= \\ = f(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N; \vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_N) dp dq &\quad (51) \end{aligned}$$

билан белгилайлик. Умумий (тула) энергия $E(p, q)$ ни классик физикада

$$E(p, q) = E(p) + E(q) \quad (52)$$

кўринишда ёзиш мумкин бўлгани туфайли (51) тенгликни

$$dW(p)dW(q) = f(p)dp f(q)dq \quad (53)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Бу ифода каноник тақсимот ифодаси

$$f(p, q) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E} = A e^{-\beta E(p)} B e^{-\beta E(q)} \quad (54)$$

дан келиб чиқади. Идеал газ учун $E_q = 0$. Бу ҳолда (51) ва (54) ифодалардан

$$dW(p, q) = A e^{-\beta E(p)} \frac{dp dq}{V^N} \quad (55)$$

келиб чиқади.

$$A = \frac{1}{Z_p} = N^N \left(\frac{h^2}{2\pi k T m} \right)^{3N/2}, \quad (56)$$

$$E(p) = \sum_i^N p_i^2 / 2m. \quad (57)$$

Нормалаш шarti

$$\begin{aligned} \int f(p, q) dp dq &= \frac{1}{Z} \int e^{-\beta E(p, q)} dp dq = \\ &= \frac{1}{Z_p} \int e^{-\beta E(p)} dp \cdot \frac{1}{Z_q} \int e^{-\beta E(q)} dq = 1 \end{aligned} \quad (58)$$

ифодасида

$$\frac{1}{Z_p} \int e^{-\beta E(p)} dp = 1; \quad \frac{1}{Z_q} \int e^{-\beta E(q)} dq = 1 \quad (59)$$

нормалаш шартлари бажарилади.

(58) ва (59) дан кўринадики, классик статистикада

$$Z = Z_p \cdot Z_q \quad (60)$$

Бунда зарранин ички структураси тилиборга олинмани (59) дан конфигурацион интеграл Z учун қуйидаги

$$Z_q = Q - \int e^{-\beta E(q)} dq \quad (61)$$

ифодани оламиз. Тақсимот функциялари $f(p, q)$ ва

$$f(q) = f(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \dots, \bar{q}_N) = \frac{1}{Z_q} e^{-\beta E(q)} \quad (62)$$

ларни куп заррали тақсимот функциялари дейилади.

Агар зарралар орасидаги потенциал жуфт ўзаро потенциал деб қаралса, яъни

$$E(q) = \sum_{i < j} u_{ij}, \quad (63)$$

куп заррали тақсимот функцияси $f(q)$ ни қуйидагича

$$f(q) dq = Z_q^{-1} e^{-\beta E(q)} dq = Z_q^{-1} e^{-\beta \sum_{i < j} u_{ij}} dq = Z_q^{-1} \prod_{ij} e^{-\beta u_{ij}} dq \quad (64)$$

куринишда ёзиш мумкин. Бунда

$$Z_q = \int \prod_{ij} e^{-\beta u_{ij}} dq. \quad (65)$$

7.6-§. КОНФИГУРАЦИОН ИНТЕГРАЛНИ ГУРУХЛАРГА АЖРАТИШ

Биз 7.3-§ да f_{ij} функция киритиб

$$f_{ij} = e^{-\beta u_{ij}} - 1$$

конфигурацион ифода (65) даги кўпайтмани ёзган эдик:

$$\begin{aligned} \prod_{ij} e^{-\beta u_{ij}} &= \prod_{ij} (1 + f_{ij}) = (1 + f_{12})(1 + f_{13}) + \dots = \\ &= 1 + (f_{12} + f_{13} + \dots) + (f_{12}f_{13} + f_{12}f_{14} + \dots) + \\ &+ (f_{12}f_{13}f_{14} + \dots). \end{aligned} \quad (66)$$

Энди бу (66) ни қара йлик.

(66) ифодадаги ҳар бир ҳадни диаграмма (граф) кўринишда тасаввур этиш мумкин. Масалан, $f_{12}f_{13}$ ни ①—②.

①—③ ёки $f_{12}f_{13}$ ни ①—②—③ кўринишда. Шунингдек, $f_{12}f_{14} \times$

$\times f_{23}f_{46}f_{56}$ ни ①—②—③—④—⑤—⑥ кўринишда ва χ_k к-

Гуруҳ интегралларни, таъриф буйича, қуйидагича аниқланади (Масалан, l гуруҳли интеграл b_l):

$$b_l = \frac{1}{l!V} \quad (l \text{ гуруҳли ҳамма ҳадлар йиғиндисин}).$$

Масалан:

$$b_1 = \frac{1}{1!V} [\textcircled{1}] = \frac{1}{V} \int d\vec{r} = 1 ;$$

$$b_2 = \frac{1}{2!V} [\textcircled{1}-\textcircled{2}] = \frac{1}{2V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 f_{12} = \frac{1}{2} \int d\vec{r}_2 f(r_{1,2});$$

$$b_3 = \frac{1}{3!V} \left[\begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \diagup \quad \diagup \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \end{array} + \begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \diagdown \quad \diagdown \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \end{array} \right];$$

$$= \frac{1}{6V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 [f_{12}f_{23} + f_{13}f_{12} + f_{12}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23}];$$

.....

$$b_l = \frac{1}{l!V} \int \dots \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_l \sum \left(\prod f_{ij} \right). \quad (67)$$

Юқоридаги ифода йиғиндисидagi интеграллар қуйидаги кўринишга эга:

$$\beta_1 = \frac{1}{V} \int \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \bar{f}_{12}(\vec{r}_{12}) = \int f(r) dr,$$

$$\beta_2 = \frac{1}{2V} \int \int \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12}f_{13}f_{23},$$

$$\beta_3 = \frac{1}{6V} \int \int \int \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 d\vec{r}_4 \times$$

$$\times (3f_{12}f_{14}f_{23}f_{34} + 6f_{12}f_{13}f_{14}f_{23}f_{34} + f_{12}f_{13}f_{14}f_{23}f_{24}f_{34}).$$

β_1, β_2 ва ҳ. к ни келтирилмайдиган интеграллар дейилади. Умумий ҳолда гуруҳ интеграллар b билан келтирилмайдиган интеграллар орасида

$$b_l = \frac{1}{l!} \sum_n \prod_k \frac{(n\beta_k)^{n_k}}{n_k!} \quad (\sum kn_k = l-1) \quad (68)$$

боғланиш борлигини кўрсатиш мумкин (қ. [16]).

$$b_1 = 1,$$

$$b_2 = \frac{1}{2} \beta_1,$$

$$b_3 = \frac{1}{2} \beta_1^2 + \frac{1}{3} \beta_2.$$

Келтирилмайдиган интеграллар $\bar{r}$ орқали ҳолат тенгламаси (босим ифодаси) куйидагича ёзилади:

$$P = n\theta \left[1 - \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{1+s} \beta_s n^s \right] = n\theta \left[1 - \frac{1}{2} \beta_1 n - \frac{2}{3} \beta_2 n^2 - \frac{3}{4} \beta_3 n^3 - \dots \right] \quad (69)$$

Иккинчи томондан босим ифодасини зичлик n бўйича такрор ёйиб, куйидагини ёзиш мумкин:

$$P = n\theta [1 + nB(T) + n^2C(T) + n^3D(T) + \dots] \quad (70)$$

(69) ва (70) ларни солиштирсак:


$$B(T) = -\frac{1}{2} \beta_1, \quad (71)$$

$$C(T) = -\frac{2}{3} \beta_2, \quad (72)$$

$$D(T) = -\frac{3}{4} \beta_3. \quad (73)$$

Буларда $B(T)$, $C(T)$, $D(T)$ ва ҳ. к. ни иккинчи, учинчи, тўртинчи ва ҳ. к. вириал коэффициентлар дейилади.

Тарихий маълумот. 1927 йилда Урселл ўзининг диссертациясида нонидеал газ статистик интегралини гуруҳларга ажратиб, Ван-дер-Ваальс тенгламасини келтириб чиқаришни кўрсатди. Кейинроқ, 1937 йилда Майер, Кан, Уленбек ва бошқалар Урселл назариясини умумлаштирдилар ва ривожлантирдилар. Ҳозирги



7.5-расм.

пайтда суъюқлик ва қаттиқ жисмлар назариясини таҳлил этишда бу гуруҳларга ажратишдан кенг фойдаланилади.

7.5-масала. Молекулалар орасида жуфтли ўзаро таъсир бўлганда реал газ босими P учун

$$P = n\theta \left\{ 1 + \frac{n}{2} \int_0^{\infty} \left[1 - e^{-U(r)/kT} \right] d\vec{r} \right\} \quad (I)$$

ифода ўринли эканлигини кўрсатинг.

Е ч и ш. Масала шартига кўра

$$U = \sum_{i < j} u_{ij}. \quad (2)$$

Вириал теоремага асосан

$$PV = NkT - \frac{1}{3} \left\langle \sum_i \vec{r}_i \frac{\partial U}{\partial r_i} \right\rangle \quad (3)$$

ёки (2) га асосан

$$PV = NkT - \frac{1}{3} \left\langle \sum_{ij} \vec{r}_{ij} \frac{\partial u_{ij}}{\partial r_{ij}} \right\rangle = NkT - \frac{1}{3} \frac{N(N-1)}{2} \left\langle r \frac{\partial U(r)}{\partial r} \right\rangle. \quad (4)$$

Бунда

$$\begin{aligned} \left\langle r \frac{\partial U(r)}{\partial r} \right\rangle &= \frac{\int \dots \int r_{12} \frac{\partial U}{\partial r_{12}} e^{-\beta U} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N}{\int \dots \int e^{-\beta U} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N} = \\ &\approx \frac{1}{V^N} \int \dots \int r_{12} \frac{\partial U}{\partial r} e^{-\beta U} d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots, d\vec{r}_N \end{aligned} \quad (5)$$

(Махражда $U \approx 0$ деб қабул қилинди). Бу ҳолда (5) ифода

$$\left\langle r \frac{\partial U}{\partial r} \right\rangle \approx \frac{1}{V^2} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 e^{-\beta U} r_{12} \frac{\partial U}{\partial r} = \frac{1}{V} \int d\vec{r} e^{-\beta U(r)} r \frac{\partial U(r)}{\partial r} \quad (6)$$

$r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$. Сферик координаталар тизимига ўтилса, (6) ифодани қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} \left\langle r \frac{dU}{dr} \right\rangle &= \frac{4\pi}{V} \int r^3 e^{-\beta U(r)} \frac{dU}{dr} dr = \\ &= \frac{4\pi}{V} \left[\theta e^{-\beta U} r^3 \Big|_0^\infty - \left(\int_0^\infty -\theta e^{-\beta U} \cdot 3r^2 dr \right) \right] = \\ &= \frac{4\pi}{V} \left[r^3 e^{-\beta U} \Big|_0^\infty + 3 \int_0^\infty r^2 e^{-\beta U} dr \right] = \\ &= \frac{4\pi}{V} \left[-3 \int_0^\infty r^2 (1 - e^{-\beta U}) dr \right]. \end{aligned} \quad (7)$$

(7) дан фойдаланиб, P учун охириги ифодани оламин:

$$P = nkT \left[1 + \frac{n}{2} \int_0^\infty (1 - e^{-\beta U}) d\vec{r} \right] \quad (8)$$

$N \approx N - 1$ деб ҳисобланди.

7.6-масала. Газ молекулалари

а) $U(r) = \alpha r^{-n} \quad \alpha > 0, n > 3,$

б) $U(r) = \begin{cases} \infty & r < \alpha, \\ -U_0 = \text{const} < 0 & \alpha < r < b, \\ 0 & r > b \end{cases}$

қонулар буйича узаро таъсирда бўлсинлар. Иккинчи вириал коэффициент $B(T)$ ни ва Жоуль-Томсон коэффициентини топинг.

Еч и ш. Иккинчи вириал коэффициент учун

$$B(T) = -\frac{1}{2} \beta_1 \quad (1)$$

ифода маълум. Бунда

$$\beta_1 = \int d\vec{r} f_{12}(r_{12}) = \int d\vec{r} (e^{-\beta U} - 1). \quad (2)$$

(1) ва (2) дан

$$B(T) = \frac{1}{2} \cdot \int d\vec{r} (1 - e^{-\beta U(r)}). \quad (3)$$

$B(T)$ ни бўлаклаб интеграллайлик:

$$\begin{aligned} B(T) &= \frac{4\pi}{2} \cdot \int r^2 dr (1 - e^{-\beta U}) = \\ &= 2\pi \frac{1}{3} r^3 (1 - e^{-\beta U}) \Big|_0^\infty - \frac{2\pi}{3} \int_0^\infty r^3 \beta \frac{dU}{dr} e^{-\beta U} dr = \\ &= -\frac{2\pi\beta}{3} \int_0^\infty r^3 \frac{dU}{dr} e^{-\beta U} dr. \end{aligned}$$

а) $\frac{dU}{dr} = -\frac{\alpha n}{r^{n+1}}, \quad B(T) = \frac{2\pi\beta\alpha n}{3} \int r^{-n+2} e^{-\alpha\beta/r^n} dr$ узгарувчини

алмаштирайлик:

$$\frac{\alpha\beta}{r^n} = x; \quad -\frac{\alpha\beta n}{r^{n+1}} dr = dx.$$

У ҳолда

$$B(T) = \frac{2\pi}{3} (\alpha\beta)^{3/n} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = \frac{2\pi}{3} (\alpha\beta)^{3/n} \Gamma\left(\frac{n-3}{3}\right).$$

Гамма функция

$$\Gamma\left(\frac{n-3}{3}\right) = \int_0^\infty x^{\frac{n-3}{3}-1} e^{-x} dx.$$

б) Масала шартидан фойдаланиб, ушбунни ёзамиз

$$B(T) = \frac{1}{2} \left[\int_0^a 4\pi r^2 dr + \int_a^b (1 - e^{-\beta U_0}) 4\pi r^2 dr + \int_b^\infty 0 \right] = \\ = \frac{1}{2} \frac{4\pi}{3} a^3 + \frac{1}{2} \frac{4\pi}{3} (1 - e^{-\beta U_0}) (b^3 - a^3) = \frac{2\pi}{3} (b^3 - e^{-\beta U_0} (b^3 - a^3)).$$

Жоул-Томсон эффе́ктини кўрсатайлик:

Ҳолат тенгламаси иккинчи вирнал коэффициент орқали

$$PV \approx NkT(1 + nB(T)) \quad (1)$$

кўринишда ёзилади. Бундан V ни қуйидагича ёзамиз:

$$V = \frac{NkT}{P} + \frac{NkTN}{VP} B(T). \quad (2)$$

Бунда иккинчи ҳадда $NkT = PV$ деб қабул қилайлик.

$$V = \frac{NkT}{P} + NB(T). \quad (3)$$

Бундан

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{Nk}{P} + N \frac{\partial B(T)}{\partial T}. \quad (4)$$

Жоул-Томсон эффе́кти

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right]. \quad (5)$$

(3) ва (4) дан фойдаланиб, (5) ни ёзамиз:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{1}{C_P} \left[\frac{NkT}{P} + NT \frac{\partial B}{\partial T} - \frac{NkT}{P} - NB(T) \right] = \\ = \frac{N}{C_P} \left[T \frac{\partial B(T)}{\partial T} - B(T) \right] \quad (6)$$

$B(T)$ нинг ўрнига унинг ифодаларини қўйиб, Жоул-Томсон эффе́кти аниқланади.

7.7-масала. Гуруҳли интеграл b_j нинг келтирилмайдиган интеграллар β_1 ва β_2 орқали ифодасини аниқланг, бунда

$$\beta_1 = \frac{1}{V} \int d\vec{r} f_{12}(r), \quad (1)$$

$$\beta_2 = \frac{1}{2V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 f_{12} f_{13} f_{23}. \quad (2)$$

Еч и ш. Умумий ифода

$$b_l = \frac{1}{l!V} \int \dots \int \sum \left(\prod_{\theta} f_{\theta} \right) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_l,$$

$$b_3 = \frac{1}{6V} \iiint \left(\prod_{\theta} f_{\theta} \right) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 =$$

$$= \frac{1}{6V} \iiint [f_{12}f_{13} + f_{12}f_{23} + f_{13}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23} + f_{31}f_{21}f_{31}] d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3;$$

$l=3$ да



A



B

Интеграллар остидаги A диаграммага мос 3 та (графа-лар) ҳадлар бир хил қийматни беради, яъни

$$\beta_1 = \frac{1}{V} \int f_{12} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

эканлигидан ҳар бир ҳад бунда $d\vec{r}_2$ ва $d\vec{r}_3$, буйича интег-ралланганда β_1^2 ва улар 3 та бўлгани учун 3 β_1^2 ифодага тенг.

$$f_{12}f_{13}f_{23} + f_{31}f_{31} \cdot f_{32} = 2f_{12}f_{13}f_{23}$$

Демак,

$$b_3 = \frac{1}{6} (3\beta_1^2 + 2\beta_2) = \frac{1}{2} \beta_1^2 + \frac{1}{3} \beta_2,$$

$$\beta_k = \frac{1}{k!V} \int \dots \int \sum_{k+1 \leq l \leq 2l} \prod_{\theta} f_{\theta} d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_{k+l}.$$

b ва β орасидаги боғланишни аввал (исботсиз) келти-рилган.

7.8-масала. Жуфт ўзаро таъсир бўлганда иккинчи вири-ал коэффициент $B(T)$ нинг ифодасини аниқланг.

Е ч и ш. Вириал теорема асосида босимнинг ифодаси

$$P = nkT \left[1 + 2n \int_0^{\infty} \pi r^2 (1 - e^{-\beta U(r)}) dr \right] \quad (1)$$

эканлиги аниқланган (7.5-масалага қ.). Иккинчи томондан босимнинг вириал коэффициентлар орқали ифодаси

$$P = nkT(1 + nB(T) + n^2C(T) + \dots) \quad (2)$$

қурилишга эга. (1) ва (2) ни солиштириб, $B(T)$ ни топамиз:

$$B(T) = 2\pi \int_0^{\infty} r^2 \left(1 - e^{-\frac{U(r)}{kT}}\right) dr = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left(1 - e^{-\frac{U(r)}{kT}}\right) 4\pi r^2 dr =$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} f_{12} dr = -\frac{1}{2} \beta_1. \quad (3)$$

7.9-масала. Ван-дер-Ваальс тенгламаси учун иккинчи вириал коэффициент $B(T)$ ни аниқланг. Тенгламадаги тузатмалар a ва b ни таҳлил қилинг.

Еч и ш. Ван-дер-Ваальс тенгламаси

$$P = \frac{NkT}{V-b} - \frac{a}{V^2}. \quad (1)$$

$b \ll V$ шарт бажарилсин. У ҳолда

$$P = \frac{NkT}{V(1-b/V)} - \frac{a}{V^2} = \frac{NkT}{V} \left(1 + \frac{b}{V}\right) - \frac{a}{V^2} = \frac{NkT}{V} + \frac{1}{V^2} [NkTb - a]. \quad (2)$$

Иккинчи томондан

$$PV \approx NkT(1 + nB(T)). \quad (3)$$


(2) ва (3) ни солиштираш:

$$nB(T) = \frac{b}{V} - \frac{a}{NkTV},$$

$$NB(T) = b - \frac{a}{NkT}, \quad (4)$$

$$B(T) = 2\pi \int_0^{\infty} r^2 \left(1 - e^{-\beta U(r)}\right) dr. \quad (5)$$

Молекулалар орасидаги потенциал характери 7.6-расмда кўрсатилган. Бунда r_0 — зарра радиуси. U_0 — потенциалнинг минимум қиймати.



7.6-расм.

7.6 расмдан куринадики, кичик масофаларда r камайиши билан $U(r)$ кескин ортиб боради, яъни итариш кучи бу соҳада $(0, 2r_0)$ да устунлик қилади; $(0, 2r_0)$ ораликда эгри чизик деярли вертикал кўринишга эга бўлади. Шу сабабли бу r_0 ни атомларнинг "радиуси" дейиш мумкин.

Катта масофаларда оралик (атомлар орасидаги масофа) r ортиши билан $U(r)$ нисбатан секин ортиб боради; бу соҳа тор-

ишнинг кучларининг устурунги соҳасининг $r \rightarrow \infty$ бўлганда $1/r \rightarrow 0$ булади.

U_0 — минимал қиймат атомларнинг "барқарор" ҳолатида мос келади. Одатда, $U_0 \propto kT_{cr}$; бунида T_{cr} қараётган модданинг критик температураси. Юқорида айтилганларга қараб (5) интегрални икки соҳада қаралгани маъқул, яъни

$$B(T) = 2\pi \left[\int_0^{2r_0} r^2 \left(1 - e^{-\beta U(r)} \right) dr + \int_{2r_0}^{\infty} r^2 \left(1 - e^{-\beta U(r)} \right) dr \right]. \quad (6)$$

r нинг $(0, 2r_0)$ оралиқдаги қийматида $U(r) > 0$ жуда катта бўлгани туфайли

$$1 - e^{-\beta U(r)}$$

ифодада $e^{-\beta U(r)}$ бирга нисбатан жуда кичик бўлгани учун, уни ҳисобга олмаслик мумкин:

$$2\pi \int_0^{2r_0} r^2 \left(1 - e^{-\beta U(r)} \right) dr \approx 2\pi \int_0^{2r_0} r^2 dr = 4 \cdot \frac{4\pi}{3} r_0^3 = 4 \cdot \vartheta_0 = \sigma.$$

$\sigma = 4\vartheta_0$, ϑ_0 — зарранинг ҳажми, σ — тўртланган ҳажмга тенг миқдор.

$(2r_0, \infty)$ соҳада потенциал нисбатан кичик (одатда бу соҳада $kT > |U(r)|$ ва у манфий ишоралидир. Бу $(2r_0, \infty)$ соҳада $\beta U(r)$ бўлгани учун $e^{-\beta U(r)}$ ни қаторга ёйиб, иккита ҳад билан чегараланамиз (чекланамиз), яъни

$$e^{-\beta U(r)} \approx 1 + \beta |U(r)|. \quad (8)$$

Бу ҳолда

$$2\pi \int_{2r_0}^{\infty} r^2 \left(1 - e^{-\beta |U(r)|} \right) dr \approx -2\pi \int_{2r_0}^{\infty} r^2 |U| \beta dr = -\beta \alpha, \quad (9)$$

$$\alpha = 2\pi \int_{2r_0}^{\infty} r^2 |U(r)| dr. \quad (10)$$

(8), (9) ва (10) ифодаларни назарда тутиб, (5) ни

$$B(T) = \sigma - \frac{\alpha}{kT} \quad (11)$$

қуринишда ёзамиз.

(4) ва (11) ифодаларни солиштириб, ушбунни топамиз:

$$N\sigma - \frac{N\alpha}{kT} = b - \frac{a}{NkT} \quad (12)$$

$$b = N\sigma = 4N\sigma_0; \quad a = N^2\alpha = 2\pi N^2 \int_0^{\infty} r^2 |U(r)| dr. \quad (13)$$

(13) ни Ван-дер-Ваальс тенгламаларига қўямиз:

$$(P + n^2\alpha)(V - N\sigma) = RT, \quad n = N/V. \quad (14)$$

σ — итариш кучи, α — тортиш кучи билан боғлиқ мусбат тузатмалар.

$$P_{\text{реал}} + n^2\alpha = P_{\text{ид}},$$

$$V_{\text{идиш}} - N\sigma = V_{\text{эрк халқч.}}$$

(11) дан кўринадики, $T = T_i$ бўлганда, $B(T) = 0$ бўлади, яъни шу температурада $B(T)$ ўз ишорасини ўзгартади, бунда

$$T_i = \frac{\alpha}{k\sigma}. \quad (15)$$

(11) ифодадан кўринадики, $T > T_i$ бўлганда $B(T)$ ифодасида итаришиш кучлари устунлик қилади; $T < T_i$ бўлганда, тортишиш кучлари устунлик қилади. T_i температурани — инверсия температураси дейилади.

7.10-масала. Аввалги масаладаги инверсия температураси Жоуль-Томсон эффектидаги инверсия температурасига тенг эканлиги исбот қилинсин.

Еч и ш. Жоул-Томсон эффекти учун

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \left(T \frac{\partial B}{\partial T} - B\right) \quad (1)$$

эканлиги аниқланган эди.

Жоуль-Томсон эффекти нолга тенг бўлган температура T_i

$$T_i \frac{\partial B(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_i} - B(T_i) = 0 \quad (2)$$

тенгламани қаноатлантиради. Аввалги масалада

$$B = \sigma - \frac{\alpha}{kT} \quad (3)$$

эканлигини назарда тутиб, (2) тенгламани қайта ёзамиз:

$$T_i \left(\frac{\alpha}{kT_i^2} \right) - \sigma + \frac{\alpha}{kT_i} = \frac{\alpha}{kT_i} - \sigma + \frac{\alpha}{kT_i} = 0$$

$$\frac{2\alpha}{kT_i} = \sigma, \quad T_i = \frac{2\alpha}{k\sigma}.$$

КУЧЛИ ЎЗАРО ТАЪСИРЛИ ТИЗИМЛАР

8.1-§. КИРИШ

Биз юқорида сийрак газлар ҳолатини бир заррали усул (бир заррали тақсимот функцияси) билан тавсифлаш етарли эканлигини кўрдик. Қаттиқ жисмдаги кристалл панжара тугунлари ҳаракатини нормал координаталар билан тавсифлашда, умуман квазизарраларни деярли эркин деб қараш мумкин бўлган ҳолларда уларнинг ҳолатини бир заррали усул асосида қаралади. Шу билан бирга кучсиз (заиф) ўзаро таъсир мавжуд бўлган ҳолларда (жуфт ўзаро таъсир асосида) тизим ҳолатини вириал коэффициентлар орқали тавсифлаш ҳолини кўрдик.

Реал тизим зарралари орасида ўзаро таъсир кучли бўлганда юқоридагидай соддалаштиришлар яроқсиз бўлади. Кучли ўзаро таъсир мавжуд бўлган ҳолларни тадқиқ қилиш учун масалан, ферромагнетизм ҳодисасини, фазавий ўтишларни тавсифлаш учун бир қанча тақрибий усуллар ишлаб чиқилган. Биз қуйида шулардан айримларига тўхталамиз. Аввал ташқи магнит майдондаги парамагнит кристалларнинг магнитланишини кўрайлик.

8.2-§. ПАРАМАГНЕТИЗМНИНГ ЛАНЖЕВЕИ НАЗАРИЯСИ

Ташқи магнит майдон H таъсирида парамагнит кристаллнинг магнитланиш вектори

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$

ифода билан аниқланади, бунда $\chi > 0$ магнит қабул қилувчанлик.

Парамагнит моддаларнинг атомлари, молекулалари ташқи магнит майдон бўлмаганда ҳам хусусий магнит моментларга эга бўладилар. Шундай атомлар жумласига тоқ сондаги электронларга эга бўлган ва демак тўла спинлари нолга тенг бўлмаган атомлар, ҳамда $3d$, $4d$, $5d$ ва $4f$, $5f$ электрон ҳолатлари тўлмаган атомлар, жумладан ишқорий металлар атомлари киради. Кўпгина магнитларнинг қабул қилувчанлиги температурага боғлиқ бўлади. 1895 йилда П. Кюри шундай парамагнитларнинг қабул қилувчанлиги

$$\chi = \frac{C}{T} \quad (1)$$

конунга буйсунишини кашф этди, бунда C — Кюри доимийси (константаси), 1905 йилда Ланжвен статистик физика усули асосида парамагнитнинг классик назариясини яратди.

Термодинамикадан маълумки магнит модданинг эркин энергияси F билан унинг магнитланиши M орасидаги боғланиш қуйидагича:

$$M = - \left(\frac{\partial F}{\partial H} \right)_T \quad (2)$$

Қуйидаги боғланиш ҳам мавжуд:

$$F = -NkT \ln Z, \quad (3)$$

бунда статистик йиғинди

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (4)$$

булиб, E_i — i нчи сатҳнинг энергияси. Ташқи майдон $\vec{H}$ даги $\vec{\mu}$ магнит моментли зарранинг потенциал энергияси

$$U = -(\vec{\mu} \vec{H}) = -\mu H \cos \theta, \quad (5)$$

бу ерда θ — магнит майдон $\vec{H}$ билан магнит момент $\vec{\mu}$ орасидаги бурчак. E_i нинг ўрнига потенциал энергия U қўямиз ва бурчаклар узлуксиз ўзгаради деб ҳисоблаб, (4) даги йиғинди ўрнига бурчаклар бўйича интегралларни ёзамиз:

$$Z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta e^{-\frac{\mu H \cos \theta}{kT}} \sin \theta d\theta. \quad (6)$$

Белгилашлар киритайлик:

$$a = \frac{\mu H}{kT}, \quad x = \cos \theta, \quad dx = -\sin \theta d\theta, \quad (7)$$

$$Z = -2\pi \int_1^{-1} e^{ax} dx = -2\pi \int_1^{-1} e^{ax} dx = \frac{2\pi}{a} (e^a - e^{-a}) = \frac{4\pi}{a} \operatorname{sha}. \quad (8)$$

(8) ни (3) га қўямиз:

$$F = -NkT \ln \frac{4\pi}{a} \operatorname{sha} \quad (9)$$

Энди (2) га асосан магнитланиш M ни топамиз:

$$M = - \left(\frac{\partial F}{\partial H} \right)_T = NkT \frac{a}{\sinh a} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\sinh a}{a} \right) \frac{\partial a}{\partial H} = \frac{a \mu \sinh a}{\sinh a} \frac{N}{a} \left[\cosh a - \frac{1}{a} \right] =$$

$$= N \mu L(a), \quad (10)$$

бунда $L(a)$ — Ланжевэн функцияси

$$L(a) = \cosh a - \frac{1}{a}. \quad (11)$$

Шундай қилиб, магнитланиш вектори учун

$$M = N \mu L(a) \quad (12)$$

натижани оламиз. Хусусий ҳолларни қарайлик.

а) $a = \frac{\mu H}{kT} \rightarrow \infty$, яъни H ниҳоятда катта булсин. Бу ҳолда

$$L(\infty) \rightarrow 1, (\cosh a \rightarrow 1, 1/a \rightarrow 0)$$

Демак, бу ҳолда

$$M_{\infty} = N \mu. \quad (13)$$


Ҳамма атомларнинг магнит моментлари магнит майдонга параллел йўналиб, тўйиниш қийматини қабул қилади; бу ҳолида осон тушунилади (8.1-расм).

б) $a = \mu H/kT \ll 1$ булсин — майдон унча катта эмас (кучсиз магнит майдон) ва етарли даражада катта температурали парамагнит.

Бу ҳолда $\cosh a$ ни қаторга ёйиб, H нинг биринчи даражаси қатнашган ҳад билан чекланамиз:

$$\cosh a = \frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} = \frac{1 + a + \frac{a^2}{2} + 1 - a + \frac{a^2}{2}}{1 + a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{6} - 1 + a - \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{6}} =$$

$$= \frac{2 + a^2}{a \left(2 + \frac{a^2}{3} \right)} = \frac{1}{a} + \frac{\frac{2}{3} a^2}{a \left(2 + \frac{a^2}{2} \right)} = \frac{1}{a} + \frac{a}{3}. \quad (14)$$



8.1-расм.

Демак,

$$L(a) = \frac{1}{a} + \frac{a}{3} - \frac{1}{a} = \frac{a}{3} = \frac{\mu}{3kT} H,$$

$$M = \frac{N\mu^2}{3kT} H = \chi H. \quad (15)$$

Бунда магнит қабул қилувчанлик

$$\chi = \frac{N\mu^2}{3kT} = \frac{C}{T}, \quad (16)$$

$$C = \frac{N\mu^2}{3k}. \quad (17)$$

(16) ифодани Кюри қонуни дейилади, ундаги C — Кюри доимийсидир.

Паст температураларда парамагнитнинг магнитланиши (12) ифода билан тавсифланади. Бир моль парамагнитнинг магнит қабул қилувчанлигини баҳолайлик. $N \sim 10^{23}$ моль; $\mu \sim 10^{-20}$ эрг $\cdot$ с $^{-1}$; $T \sim 300$ К; $\chi \sim 10^{-4}$ см 3 /моль.

8.3-§. ПАРАМАГНЕТИЗМНИНГ БРИЛЛЮЭН НАЗАРИЯСИ

Зарра (атом, молекуланинг тула магнит моменти (орбитал магнит ва спин (хусусий) магнит моментлари йиғиндиси) фазода магнит квант сонлар $m_j = -j - (j - 1), \dots, 0, 1, 2, \dots, j - 1$, j лар билан аниқланувчи $2j + 1$ квантланган ориентацияларни (вазиятларни) қабул қилади (j — тула квант сон). Магнит момент μ нинг ташқи магнит майдон H йуналишидаги OZ ўқига проекцияси

$$\mu_z = g_j m_j \mu_B \quad (18)$$

ифода билан аниқланади; бунда g_j — Ланде фактори (қўпайтмаси), $\mu_B = e\hbar / 2m_e c$ — Бор магнетони. Ланжевен назариясида магнит моменти йуналишларининг бу квантлангани назарга олинмаган эди.

Потенциал энергия $U = -(\mu H)$ учун ёзамиз:

$$U_{m_j} = -\mu H \cos \theta_j = -\mu_z H = -g_j m_j \mu_B H. \quad (19)$$

Бу ҳолда статистик йиғинди

$$Z = \sum_{m_j=-j}^{+j} e^{\beta \mu_z H}, \quad \beta = 1/kT \quad (20)$$

ифода билан аниқланади.

Белгилаш киритайлик:

$$\alpha = g_j \mu_B H. \quad (21)$$

Бу ҳолда геометрик прогрессия йиғиндиси Z қуйидагича аниқланади:

$$Z = \sum_{m_j=-j}^j e^{m_j \alpha} = \frac{e^{-j\alpha} [e^{(2j+1)\alpha} - 1]}{e^{\alpha} - 1}, \quad (22)$$

(22) да биринчи ҳад $e^{-j\alpha}$ ва ҳадлар сони $(2j+1)$ эканлиги назарда тутилди. (22) ни ўзгартириб ёзайлик:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{e^{-\alpha/2-j\alpha} [e^{(2j+1)\alpha} - 1]}{e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2}} = \frac{[e^{-2j\alpha+\alpha-\frac{\alpha}{2}-j\alpha} - e^{-(j+\frac{1}{2})\alpha}]}{2\operatorname{sh}\alpha/2} = \\ &= \frac{1}{2\operatorname{sh}\alpha/2} \left[e^{(j+\frac{1}{2})\alpha} - e^{-(j+\frac{1}{2})\alpha} \right] = \frac{\operatorname{sh}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha}{\operatorname{sh}\frac{\alpha}{2}}. \end{aligned} \quad (23)$$

(23) ни назарда тутиб, эркин энергия ифодасини ёзамиз:

$$F = -NkT \ln \frac{\operatorname{sh}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha}{\operatorname{sh}\frac{\alpha}{2}}. \quad (24)$$

(24) асосида магнитланиш вектори M ни аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} M &= -\frac{\partial F}{\partial H} = NkT \cdot \frac{\operatorname{sh}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{sh}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha} \times \\ &\times \frac{\left(j+\frac{1}{2}\right) \operatorname{ch}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha \operatorname{sh}\frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{ch}\frac{\alpha}{2} \cdot \operatorname{sh}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha}{\operatorname{sh}^2\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial H}; \\ \frac{\partial \alpha}{\partial H} &= \frac{g_j \mu_B}{kT}. \end{aligned}$$

Демак, M учун ушбу ифода келиб чиқади:

$$M = Ng_j \mu_B \left[\left(j+\frac{1}{2}\right) \operatorname{cth}\left(j+\frac{1}{2}\right)\alpha - \frac{1}{2} \operatorname{cth}\frac{\alpha}{2} \right] \quad (25)$$

ёки ихчам шаклда

$$M = Ng_j \mu_B j B_j(a), \quad a = j\alpha = \frac{j g_j \mu_B H}{kT}; \quad (26)$$

оунда

$$B_j(a) = \frac{2j+1}{2j} \operatorname{cth} \frac{2j+1}{2j} a - \frac{1}{2j} \operatorname{cth} \frac{a}{2j} \quad (27)$$

Бриллюэн функциясиدير.

Туйинишдан узоқ ҳолларда $x \ll 1$ деб қараб,

$$\operatorname{cth} x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$$

тақрибий қийматдан фойдаланиб,

$$B_j(a) \approx \frac{a}{3} \frac{j+1}{j} \quad (28)$$

ифодани оламиз (8-1-масалага қ.). Буни эътиборга олиб магнитланиш учун

$$M = N \frac{g_j^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3kT} H = \chi_j H \quad (29)$$

ифодани оламиз. Бундан қуйидаги ифода келиб чиқади:

$$\chi_j = \frac{N g_j^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3kT} \quad (30)$$

(16) ва (30) ларни солиштириб кўрамизки, $a \ll 1$ бўлганда (туйинишдан узоқда бўлган ҳолда) Ланжевен ва Бриллюэн назариялари бир хил қонунга — Кюри қонунига олиб келади. Бунда магнит момент M тула квант сон ва Ланде фактори билан қуйидагича боғланишда бўлади:

$$\mu_j^2 = g_j^2 \mu_B^2 j(j+1). \quad (31)$$

Агар $a \ll 1$ шарт бажарилмаса, яъни a катта бўлса (кучли магнит майдон H ва температура T паст бўлганда), квант назарияси формуласи (26) Ланжевен назарияси натижасидан муҳим фарқ қилади. Квант назарияси туйиниш соҳасига яқин соҳаларда тажрибадан олинган натижаларни яхши тавсифлайди. Масалан, $H = 5000$ Э ва $T = 1,3$ К бўлганда, 99,5% га қадар туйиниш кузатилган (Ланжевен назариясидаги $M_{\max}$ нинг $H = 22000$ Э да ва $T = 1,3$ К да Камерлинг-Оннес томонидан 1923 йилда 84% гача қиймати олинган. Демак, Ланжевен назариясидаги $M_{\max}$ ҳақиқий (реал) туйинишдан анча фарқли. Тажриба сульфат гадолинит учун ўтказилган. Кейинги параграфда бир нечта моделларни кўрамиз.

8.4-§. ҲАМРОҲИЯТИ МУВОФИҚЛАШТАН МОЛЕКУЛЯР МАЙДОН

Тизимдаги бирор заррани қарайлик. Бу заррага унинг атрофидаги бошқа зарралар таъсир курсатади. Қаралаётган заррага таъсир қилаётган зарраларнинг ҳар хил ҳолатларига боғлиқ бўлган мураккаб кучни маълум ўртача майдон — молекуляр майдон билан аппроксимациялаймиз¹, яъни соддароқ майдон билан алмаштирамиз. Бу ҳолда қаралаётган (танланган) заррани статистик физика усули билан тавсифлаш мумкин. Ўз навбатида, атрофидаги қўшни зарраларга таъсир этувчи зарранинг ўртача майдонини аниқлаш мумкин бўлади. Тизимнинг зарралари бир хил бўлганда зарранинг бу ҳисобланган ўртача майдонини аввал киритилган молекуляр майдон билан бир хил бўлади. Бу ўртача майдон (молекуляр майдон) тизимнинг статистик хоссаларини тавсифлайди ва демак, унинг ёрдамида тизимнинг термодинамик параметрларини аниқлаш мумкин бўлади.

Кучли ўзаро таъсирли зарралар тизимини тавсифлаш учун яратилган бу умумий усулни квант механикасида Хартри-Фок усули (яқинлашуви) деб аталади.

8.5-§. ИЗИНГ МОДЕЛИ

Бу моделга асосан ферромагнит кристаллнинг ҳар бир атоми μ_0 магнит моментига эга ва у маълум йўналишга нисбатан параллел ёки антипараллел йўналган деб қабул қилинади (8.2-расм). Атомларнинг бу магнит моментларини **И з и н г** спинлари дейилади. Изинг спинлари σ_j ўзгарувчан ($j = 1, 2, \dots, N$; N — атомлар сони) ва $+1$ ёки -1 қийматни қабул қилади.



8.2-расм.

Панжарадаги қўшни спинларнинг ўзаро таъсири J , агар спинлар параллел бўлса, "манфий" ишорали, антипараллел бўлса "мусбат" ишорали бўлсин, яъни

$$J_{++} = J_{--} = -J; J_{+-} = J.$$

¹ Аппроксимация — латинча сўз — катталикини маълум ёки соддароқ бошқа катталик билан ифодалаш.

Бу ҳолда спинларнинг ўзаро таъсир энергияси қуйидаги ифода билан аниқланади;

$$U_{\text{инт}} = \sum_j J \sigma_i \sigma_j; \quad (32)$$

бунда бир-бири билан ўзаро таъсирлашувчи жуфтли қўшнилар буйича йиғиштирилади.

Агар $J > 0$ бўлса, (32) дан $U_{\text{пот}}$ минимум бўлиши учун $\sigma_i \sigma_j$ параллель, яъни қўшни спинлар параллел жойлашишга интиладилар. Бу ҳолда ферромагнетизм ҳодисаси рўй беради. Агар $J < 0$ бўлса, у ҳолда қўшни спинлар антипараллел жойлашишга интиладилар ва натижада антиферромагнетизм ҳодисаси содир бўлади. Бошқача айтганда, агар алмашинишнинг ўзаро таъсир энергияси J манфий бўлса, спинларнинг антипараллелик ҳолати барқарорроқ бўлади. Демак, агар етарли даражадаги паст температурада спинларнинг навбатма-навбат ҳар хил йўналишлари содир бўлса, бундай жойлашишлар натижасида кристаллнинг тула магнитланиши нолга тенг бўлади. Бундай кристалллар парамагнитлардир. Албатта бундай парамагнетиклар одатдаги парамагнетиклардан ўзларининг махсус хоссалари билан фарқланадилар. Маълум критик температура — Неёл температурасида спинларнинг бундай тартиблилиги йўқолади ва бундай парамагнетиклар одатдаги парамагнетикларга айланадилар.

Агар кристаллга ташқи магнит майдон киритилса, унинг ҳар бир атомига шу ташқи майдон H ҳамда қўшни атомларнинг магнит майдони (алмашинув ўзаро таъсир) таъсир этадилар. Алмашинув (атомлар спинлари алмашинуви) ўзаро таъсир майдони флуктацияланувчи майдондир. Лекин бу майдонни ўзаро мувофиқлашган яқинлашишга (моделга) асосан маълум ўртача молекуляр майдон (уни Вейсс майдони дейилади) H' билан алмаштириш мумкин. Бу ҳолда спинга таъсир этувчи эффектив майдонни

$$H_{\text{эф}} = H + H'$$

кўринишда ёзиш мумкин.


Агар кристаллдаги спинлар тизими магнитланишга эга бўлмаса ($M = 0$), ўртача молекуляр майдон H' ни нолга тенг деб қабул қилинади, яъни $H' = 0$. Шунга асосан, умумий ҳолда молекуляр майдон H' ни магнитланиш M га пропорционал деб қабул қилиб,

$$H' = qM \quad (33)$$

кўринишда ёзиш мумкин, бунда q — молекуляр майдон доимий-сидир.

Статистик физика усули асо-сида кристаллнинг магнитлани-ши M ни аниқлайлик.

Фараз қилайлик, $1/2$ спинга эга бўлган зарра μ магнит моментга эга бўлсин. Бундай зарра магнит майдонга кири-тилса, унинг энергия сатҳи зарра магнит моментининг май-донга параллел (μ) ёки антипараллел ($-\mu$) жойланишлари-га қараб икки



8.3-расм.

$$-\mu H, +\mu H$$

энергетик сатҳга булинадилар (8.3-расм).

Тизим N та заррадан иборат бўлсин. H ташқи майдонда-ги бу тизимнинг магнитланиши M ни аниқлайлик. Спинлар узаро таъсирда бўлмаса, ҳар бир спинни алоҳида қараш мум-кин (идеал ҳол). Бу ҳолда битта спин учун статистик йи-гинди.

$$Z_1 = \sum_i e^{-\epsilon_i / T} = e^{\mu H / T} + e^{-\mu H / T} = 2 \cosh(\beta \mu H) \quad (34)$$

ифода билан аниқланади. Спинлар узаро таъсирда бўлмаган ҳолда N та спинлар тизимининг статистик йигиндиси, маъ-лумки,

$$Z_N = Z_1^N = [2 \cosh \beta \mu H]^N. \quad (35)$$

Бундан эркин энергия учун қуйидагини топамиз:

$$F_N = -NkT \ln [2 \cosh \beta \mu H]. \quad (36)$$

$M = -(\partial F / \partial H)_T$ ифодадан фойдаланиб магнитланиш учун қуйидагини оламиз:

$$\begin{aligned} M &= \frac{\partial}{\partial H} [NkT \ln (2 \cosh \beta \mu H)] = NkT \frac{2}{2 \cosh \beta \mu H} \mu \beta (e^{\beta \mu H} - e^{-\beta \mu H}) = \\ &= N\mu \frac{e^{\beta \mu H} - e^{-\beta \mu H}}{e^{\beta \mu H} + e^{-\beta \mu H}} = N\mu \tanh \beta \mu H, \quad \beta = 1/kT. \end{aligned} \quad (37)$$

(37) да ферромагнитнинг магнитланиши учун H нинг ўрнига $H_{\text{эфф}}$ ни қўйиб, қуйидагини ёзамиз:

$$M = N\mu \tanh \beta \mu H_{\text{эфф}} = N\mu \tanh \beta \mu (H + qM) \quad (38)$$

$$\frac{H'}{q} = N\mu th\beta\mu (H + H'). \quad (39)$$

(38) ёки (39) ифодалар ўзаро мувофиқлашган майдон H' ёки магнитлашиш вектори M ни аниқловчи ифодалардир. (38) ёки (39) ифодалардаги молекуляр майдон доимийси q ни аниқлайлик.

Қаралаётган спин атрофидаги қўшни спинларнинг умумий сони z га тенг бўлсин, бунда юқорига ва пастга йўналган спинларнинг ўртача сонлари мос равишда $\bar{Z}_+$ ва $\bar{Z}_-$ бўлсин. Бу ҳолда $\frac{\bar{Z}_+}{Z}$ ва $\frac{\bar{Z}_-}{Z}$ лар юқорига ва пастга йўналган спинлар сонининг қисми. Буларнинг фарқи кристаллнинг магнитланиш даражасини аниқлайди. Тула магнитланиш, албатта, $M_\infty = N\mu$ га тенг эканлиги равшан. Шу сабабли

$$\frac{\bar{Z}_+}{Z} - \frac{\bar{Z}_-}{Z} = \frac{M}{M_\infty}, \quad M_\infty = N\mu \quad (40)$$

ёки

$$\bar{Z}_+ - \bar{Z}_- = Z \frac{M}{M_\infty} \quad (41)$$

деб ёзишимиз мумкин. μ магнит моментли ҳар бир спин қўшни спинлар майдони H' да ўзаро таъсир туфайли ўртача $\mu H'$ энергияга эга. Иккинчи томондан бу ўртача энергия $J(\bar{Z}_+ - \bar{Z}_-)$ га тенглигидан

$$\mu H' = J(\bar{Z}_+ - \bar{Z}_-) = J \frac{zM}{M_\infty} \quad (42)$$

ифодани ёзиш мумкин. Бундан $H' = qM$ эканлигини назарда тутиб,

$$q = \frac{ZJ}{\mu M_\infty} \quad (43)$$

ифодани оламиз. (43) ни (38) га қўямиз:

$$\frac{M}{M_\infty} = th \left(\beta\mu H + \beta ZJ \frac{M}{M_\infty} \right). \quad (44)$$

Шундай қилиб, ўзаро мувофиқлашган яқинлашув усули асосида кристаллнинг магнитланиши M ни (M/M_∞ ни) аниқладик. Агар ташқи майдон $H = 0$ бўлса, (44) ифодадан

$$\frac{M}{M_\infty} = th \beta ZJ \frac{M}{M_\infty} \quad (45)$$

тенгликни оламиз. (43) асосида берилган температурада кристаллнинг ўз-ўзидан (спонтан) магнитланиши M ни аниқлаш мумкин.

8.6-§. ГЕЙЗЕНБЕРГ МОДЕЛИ

Гейзенберг модели асосида ферромагнит кристаллни қараймиз. Ферромагнит кристаллнинг ҳар бир атоми $g\mu_B\bar{s}$ магнит моментига эга бўлсин, бунда $\mu_B = eh/2m_e c$ — Бор магнетони, $\bar{s}$ — атом спини, g — Ланде фактори. Ҳар бир атом ўзининг яқин қўшни атомлари билан $-2J\bar{s}_i\bar{s}_j$ алмашинув ўзаро таъсирда бўлсин, бунда J мусбат ишорали алмашинув интеграл. Етарлича паст температурада бу ўзаро таъсир спинларнинг параллел йўналишларини (ориентацияларини) юзага келтиради деб қаралади. Кристаллнинг бундай қаралиши — Гейзенберг моделидир.

$\bar{s}_0$ спинли атомнинг яқин қўшни атомларининг спинлари $\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots, \bar{s}_z$ бўлсин. $\bar{s}_0$ спинга боғлиқ энергия қисми

$$U = -2J\bar{s}_0 \cdot \sum_{m=1}^z \bar{s}_m - g\mu_B \bar{H}\bar{s}_0 \quad (46)$$

ифода билан аниқланади; бунда $\bar{H}$ — ташқи майдон. Молекуляр майдон яқинлашувида (моделида) $\bar{s}_0$ нинг атрофидаги спинлар $\sum_m \bar{s}_m$ ни уларнинг ўртачаси $\langle \bar{s} \rangle$ билан алмаштириш мумкин:

$$U \approx -2J\bar{s}_0 \cdot \langle \bar{s} \rangle - g\mu_B \bar{H}\bar{s}_0 = -g\mu_B (\bar{H} + q\bar{M}) \cdot \bar{s}_0, \quad (47)$$

бунда магнитланиш

$$\bar{M} = n g \mu_B \langle \bar{s} \rangle; \quad (48)$$

n — кристаллнинг бирлик ҳажмидаги спинлар сони, q катталиқ

$$q = \frac{2zJ}{ng^2\mu_B^2} \quad (49)$$

молекуляр майдон доимийси.

Магнит майдон $\bar{H}$ нинг йўналиши OZ йўналишда деб олсак, унинг фақат OZ компонентаси нолдан фарқли бўлади. Бу ҳолда магнитланиш вектори $\bar{M}$ нинг ўртача қиймати учун қуйидагини ёзишимиз мумкин:

$$\bar{M} = \frac{\sum_{m=-s}^{+s} m \exp\{\beta g \mu_B (H + qM)m\}}{\sum_{m=-s}^{+s} \exp\{\beta g \mu_B (H + qM)m\}} \quad (50)$$

$M = n g \mu_B \bar{s}$ даги $\bar{s}$ ўртача статистик йиғинди ифодаси оралиқли ёзилди. Бу ифодада, температура етарли даражада юқори бўлиб,

$$\beta g \mu_B H' \ll 1$$

шарт бажарилганда экспоненциал функцияни қаторга ёйиб, H' иштирок этган биринчи ҳад билан чегараланилса, (50) ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} M &= n (g \mu_B)^2 \beta (H + qM) \sum_{m=-s}^{+s} \frac{m^2}{(2s+1)} + \dots = \\ &= n (g \mu_B)^2 \beta (H + qM) \frac{(2s+1)s(s+1)}{3(2s+1)} = \\ &= \frac{n \beta (g \mu_B)^2}{3} s(s+1) (H + qM) + \dots \end{aligned}$$

ёки

$$M \left(1 - \frac{2}{3} \frac{s(s+1)}{kT} \right) = \frac{n (g \mu_B)^2}{3kT} s(s+1) H. \quad (51)$$

Бундан

$$M = \frac{n (g \mu_B)^2 s(s+1)}{3k(T-T_c)} H = \chi H; \quad (52)$$

$$\chi = \frac{n (g \mu_B)^2 s(s+1)}{3k(T-T_c)}, \quad (53)$$

$$T_c = \frac{2s(s+1)}{3k}. \quad (54)$$

(52) ифода парамагнит учун ўринли; бундаги χ катталиқ $T > T_c$ бўлганда ўринли (T_c — Кюри температураси). (52) ифодани Кюри-Вейсс қонуни дейилади. (53) дан кўринадики, $1/\chi$ билан T орасида чизиқли боғланиш мавжуд. Тажрибада кўпгина реал кристалларда T_c атрофидаги қийматларда бу чизиқли қонундан четланиш кузатилади. (8.4-расмда Ni никель учун тажрибадан олинган натпжалар пунктир чизиқ билан келтирилган: бунда T_c ни парамагнитнинг Кюри температураси, T_c ни ферромагнитнинг Кюри температураси дейилади (қ. [4].)

Агар

$$C = \frac{n(g\mu_B)^2 k(x+1)}{3k} \quad (55)$$

деб белгиласак, χ нинг ифодаси

$$\chi = \frac{C}{T - T_c} \quad (56)$$

кўринишни олади; C — Кюри доимийси дейилади.

8.1-масала. n та магнит моментга эга булган бирлик ҳажмдаги ферромагнит вектори M нинг умумий ифодасини аниқланг (Бриллюэн назарияси). Уни қаторга ёйиб M нинг ифодаси (29) ни келтириб чиқаринг ва изоҳланг.

Ечиш. Атом магнит моментининг магнит майдон H йўналишидаги проекцияси μ_i дискрет қийматлардан ихтиёрий бирини қабул қилиши мумкин; бунда m магнит квант сон $j, j-1, \dots, (j-1), -j$ қийматлар қабул қилади.

Бирлик ҳажмдаги ферромагнитнинг H майдондаги энергияси


$$U = -MH = -g\mu_B H \sum_{i=1}^n m_i \quad (1)$$

кўринишда аниқланади, бунда m_i — i -зарранинг магнит квант сони, M эса n та зарранинг тўла магнит моменти. Бундай тизимнинг статистик йиғиндиси

$$Z = \sum_{m_1=-j}^j \dots \sum_{m_n=-j}^j \exp(\beta MN) = \prod_{j=1}^n \sum_{m_j=-j}^j \exp(\beta \mu_B g H m_j) = \left[\frac{\sinh\left(\beta g \mu_B H \frac{2j+1}{2}\right)}{\sinh\left(\frac{1}{2} \beta g \mu_B H\right)} \right]^n, \quad \beta = 1/kT. \quad (2)$$

Бу ерда куйидаги муносабатдан фойдаланилди:

$$\sum_{k=-n}^{k=n} x^k = x^{-n} \sum_{l=0}^{2n} x^l = \frac{x^{2n+1} - 1}{x^n(x-1)} = \frac{x^{n+\frac{1}{2}} - 1}{x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}}.$$



8.4-расм.

Термодинамик муносабат

$$\bar{M} = \theta \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = \theta \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial H} \quad (3)$$

асосида ўртача магнитланиш $\bar{M}$ ни топамиз:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial H} &= \frac{\partial}{\partial H} \left(\frac{\text{sh}xH}{\text{sh}yH} \right)^n; \quad x = \beta g \mu_B \frac{2j+1}{2}, \quad y = \frac{1}{2} \beta g \mu_B, \\ \frac{\partial Z}{\partial H} &= n \frac{\text{sh}yH}{\text{sh}xH} \cdot Z \left[\frac{-y \text{sh}xH \cdot \text{ch}yH}{\text{sh}^2 yH} + \frac{x \text{ch}xH}{\text{sh}yH} \right] = \\ &= nZ [-y \text{cth}yH + x \text{cth}xH] = nZ \cdot \beta g \mu_B j \\ &\quad \left[\frac{2j+1}{2j} \text{cth}xH - \frac{1}{2j} \text{cth}yH \right]. \end{aligned} \quad (4)$$

(4) ни (3) га қўйсақ,

$$\bar{M} = ng \mu_B j \left\{ \frac{2j+1}{2j} \text{cth}xH - \frac{1}{2j} \text{cth}yH \right\};$$

қуйидагича белгилаш киритайлик:

$$\bar{M} = ng \mu_B S_z = ng \mu_B j B_j(a), \quad (5)$$

бунда

$$B_j(a) = \frac{2j+1}{2j} \text{cth} \frac{2j+1}{2j} a - \frac{1}{2j} \text{cth} \frac{a}{2j}. \quad (6)$$

$$a = \beta g \mu_B j H$$

Бриллюэн функциясидир.

$a \ll 1$ бўлганда, температура юқори ва H майдон кучсиз бўлганда Бриллюэн функцияси B ни қаторга ёйиб, H нинг биринчи даражаси билан чекланиш мумкин.

$\text{cth}y$ да агар у кичик бўлса, қаторга ёйиб қуйидаги ифодани оламиз:

$$\text{cth}y = \frac{1}{y} + \frac{y}{3}. \quad (7)$$

Бу тақрибий ифодадан фойдаланиб Бриллюэн функциясини ёзамиз:

$$\begin{aligned} B(a) &= \frac{2j+1}{2j} \text{cth} \frac{2j+1}{2j} a - \frac{1}{2j} \text{cth} \frac{a}{2j} = \\ &= \frac{2j+1}{2j} \left(\frac{2j}{a(2j+1)} + \frac{2j+1}{3 \cdot 2j} a \right) - \frac{1}{2j} \left(\frac{2j}{a} + \frac{a}{3 \cdot 2j} \right) = \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{1}{a} + \frac{(2j+1)^2 a}{3(2j)^2} \right) - \frac{1}{a} - \frac{a}{3(2j)^2} =$$

$$= \frac{a}{3} \frac{1}{(2j)^2} \left[(2j+1)^2 - 1 \right] - \frac{a}{3(2j)^2} 4j(j+1) = \frac{j+1}{3j} \cdot a. \quad (8)$$

Бу ҳолда магнитланиш $\bar{M}$ учун асосий матндаги (29) ифодани оламир:

$$\bar{M} = ng\mu_B j \cdot B_j(a) = ng\mu_B j \cdot \frac{j+1}{3j} \beta g\mu_B j H = n \frac{j(j+1)(g\mu_B)^2}{3kT} H. \quad (9)$$

Бундан

$$\frac{\partial \bar{M}}{\partial H} = \chi, \quad (10)$$

$$\chi = n \frac{j(j+1)(g\mu_B)^2}{3kT} = \frac{C}{T}, \quad (11)$$

$$C = n \frac{j(j+1)(g\mu_B)^2}{3k}. \quad (12)$$

Изоҳлар. 1. Агар $j = 1/2$ бўлса,

$$B_{1/2}(x) = 2 \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{e^{2x} - e^{-2x}} - \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x} - e^{2x} - e^{-2x} - 2}{e^{2x} - e^{-2x}} =$$

$$= \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{e^{2x} - e^{-2x}} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}},$$

$$B_{1/2}(a) = \tanh a. \quad (13)$$

Бу ҳолда

$$\chi = n \frac{(g\mu_B)^2}{4kT}. \quad (14)$$

2. Агар $j \rightarrow \infty$ бўлса, $g\mu_B j = \mu_0$ деб қабул қилсак,

$$B_{\infty}(a) = \frac{2j+1}{2j} \coth \frac{2j+1}{2j} a - \frac{1}{2j} \coth \frac{a}{2j} \approx$$

$$\approx \coth a - \frac{1}{2j} \frac{\frac{a}{2j} + e^{-\frac{a}{2j}}}{e^{\frac{a}{2j}} - e^{-\frac{a}{2j}}} = \coth a - \frac{1}{2j} \frac{1 + \frac{a}{2j} + 1 - \frac{a}{2j}}{1 + \frac{a}{2j} - 1 + \frac{a}{2j}} =$$

$$= \coth a - \frac{1}{2j} \frac{2j}{a} = \coth a - \frac{1}{a} = L(a). \quad (15)$$

Бу ҳолда магнитланиш

$$\bar{M} = n\mu_B L\left(\frac{\mu_B H}{kT}\right), \quad \chi = \frac{n\mu_0^2}{3kT}. \quad (16)$$

3. Эркин электрон учун $g = 2, j = 1/2$. Умумий ҳолда ферромагнитлар учун H ни $H_{\text{эфф}} = H + qM$ билан алмаштириб (5) ни қайта ёзамиз:

$$\bar{M} = ng\mu_B \bar{S}_z = ng\mu_B SB_z [\beta g\mu_B S(H + qM)]. \quad (17)$$

Эслатма. $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}$ — Бор магнетони, g — Ланде фактори. Эркин электрон учун $s = 1/2, g = 2$; $L(x)$ — Ланжевэн функцияси.

8.7-§. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ

Антиферромагнит кристаллнинг ҳар бир атоми S спинга эга бўлсин. Ферромагнетикнинг Гейзенберг моделидан антиферромагнетикнинг фарқи шундаки, бу ҳолда $2|J|\bar{S}_i\bar{S}_j$ га тенг бўлган алмашинув ўзаро таъсир қўшни спинларнинг антипараллел йўналишларида жойлашишини осонлаштиради.

Фараз қилайлик, кристаллнинг панжарасини бир-бирига ўзаро киришган 2 та a ва b панжарачаларга ажратиш мумкин бўлсин. Бир панжарачанинг спинлари параллел йўналиш тенденциясига, иккинчи панжарача спинлари эса антипараллел йўналишга интилсинлар. Кристаллнинг бу моделини Ван Флекнинг антиферромагнит модели дейилади. a панжарачанинг молекуляр майдони $-q_2\bar{M}_a - q_1\bar{M}_b$, b панжарачанинг молекуляр майдони $-q_2\bar{M}_b - q_1\bar{M}_a$ га тенг бўлсин; бунда $\bar{M}_a$ ва $\bar{M}_b$ лар a ва b панжарачаларнинг магнитланишлари, q_1 ва q_2 уларнинг магнитланиш доимийлари. Бу ҳолда магнитланишлар учун

$$\bar{M}_a = \frac{1}{2} ng\mu_B \bar{S}_a, \quad \bar{M}_b = \frac{1}{2} ng\mu_B \bar{S}_b \quad (57)$$

ифодаларни ёзиш мумкин.

Бунда n — бирлик ҳажмдаги атомлар сони. Кристалл панжарачаларидаги молекуляр майдонни қуйидагича ёзамиз:

$$\bar{H}'_a = \bar{H} - q_2\bar{M}_a - q_1\bar{M}_b, \quad \bar{H}'_b = \bar{H} - q_2\bar{M}_b - q_1\bar{M}_a. \quad (58)$$

Панжарачалар магнитланишлари учун қуйидагича ифода-
ларни ёзиш мумкин

$$\begin{aligned}\vec{M}_a &= \frac{1}{2} n g \mu_B \vec{S}_a = \frac{n}{2} \frac{(g \mu_B)^2}{3 k T} S(S+1) \vec{H}'_a = \\ &= \frac{C}{2T} (\vec{H} - q_2 \vec{M}_a - q_1 \vec{M}_b); \quad (59)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_b &= \frac{1}{2} n g \mu_B \vec{S}_b = \frac{n}{2} \frac{(g \mu_B)^2}{3 k T} S(S+1) \vec{H}'_b = \\ &= \frac{C}{2T} (\vec{H} - q_2 \vec{M}_b - q_1 \vec{M}_a); \quad (60)\end{aligned}$$

$$C = n (g \mu_B)^2 \frac{S(S+1)}{3k}. \quad (61)$$

(59) ва (60) асосида кристаллнинг тўла магнитланиш век-
тори

$$\vec{M} = \vec{M}_a + \vec{M}_b$$

ифодасини аниқлаймиз, яъни

$$\vec{M} = \frac{C}{T} \vec{H} - \frac{C}{2T} (q_1 + q_2) (\vec{M}_a + \vec{M}_b) = \frac{C}{T} \vec{H} - \frac{C}{2T} (q_1 + q_2) \vec{M}.$$

Бундан

$$\vec{M} = \frac{(C/T) \vec{H}}{1 + (C/2T)(q_1 + q_2)} = \frac{C}{T + \theta} \vec{H}; \quad (62)$$

бунда қуйидаги белгилашлар киритилган:

$$\theta = \frac{C}{2} (q_1 + q_2); \quad q_1 = \frac{2Z_1 |J_1|}{(1/2) n g^2 \mu_B^2}; \quad q_2 = \frac{2Z_2 |J_2|}{(1/2) n g^2 \mu_B^2}. \quad (63)$$

Z_1, Z_2 биринчи ва иккинчи панжарачалардаги яқин қўшни-
лар сони; J_1 ва J_2 лар a ва b панжарачаларнинг алмашинув
энергиялари. Олинган натижа $C/(T + \theta)$ ни *Кюри-Вейсс қонуни*
дейлади. Уни C/T билан солиштириш кўрсатдики, анти-
ферромагнитнинг қабул қилувчанлиги χ Кюри қонуни C/T
га нисбатан кичик; бунда спинлар антипараллел йўналишга
интиладилар.

Тарихий маълумот. Антиферромагнитлар панжарачала-
ридаги атомларнинг спинлари шундай тартибда йўналган-
ки, унинг магнитланиш вектори бўлмайди (у нолга тенг).
Кристаллнинг шундай тартибли ҳолат бўлиши мумкинли-
гини, яъни антиферромагнетизм мавжудлигини назарий жи-

хатдан биринчи бўлиб Нёел (1932 йил) ва Ландау (1933 йил) ашиқган эдилар.

8.2—масала. Антиферромагнитнинг Ван Флек модели ҳо-
сида Нёел температурасини аниқланг.

Еч иш. Бизга маълумки, критик температура T_N дан ки-
чик температурада антиферромагнит кристалл икки панжа-
рачага эга бўлиб, улар ўз-ўзидан (спонтан) магнитланиш-
лар $\vec{M}_a$ ва $\vec{M}_b$ га эга бўладилар. Бу магнитланишлар мос
равишда молекуляр майдон $\vec{H}_a$ ва $\vec{H}_b$ га параллел йўналган-
дирлар $\vec{M}_a \parallel \vec{H}_a$, $\vec{M}_b \parallel \vec{H}_b$:

$$\vec{H}_a = \vec{H} - q_2 \vec{M}_a - q_1 \vec{M}_b, \quad \vec{H}_b = \vec{H} - q_2 \vec{M}_b - q_1 \vec{M}_a. \quad (1)$$

Магнитланишлар учун

$$\vec{M}_a = \frac{1}{2} ng \mu_B SB, (\beta g \mu_B S \vec{H}_a); \quad (2)$$

$$\vec{M}_b = \frac{1}{2} ng \mu_B SB, (\beta g \mu_B S \vec{H}_b);$$

муносабатлар уринли. Агар ташқи майдон бўлмаса (яъни $H = 0$), магнитланишлар $\vec{M}_a$ ва $\vec{M}_b$ антипараллел булади ва
қуйидаги қийматларни қабул қилади:

$$\begin{cases} \vec{M}_a = -\frac{1}{2} ng \mu_B SB, [\beta g \mu_B S (q_2 \vec{M}_a + q_1 \vec{M}_b)], \\ \vec{M}_b = -\frac{1}{2} ng \mu_B SB, [\beta g \mu_B S (q_1 \vec{M}_a + q_2 \vec{M}_b)]. \end{cases} \quad (3)$$

(3) ифодада магнитланиш M ни етарлича кичик деб (яъни x ни кичик деб қабул қилиб) $B(x)$ функцияларни қаторга
ёямиз:

$$\begin{cases} M_a = -\frac{C}{2T} (q_2 M_a + q_1 M_b) + \gamma (q_2 M_a + q_1 M_b)^3, \\ M_b = -\frac{C}{2T} (q_1 M_a + q_2 M_b) + \gamma (q_1 M_a + q_2 M_b)^3, \end{cases} \quad (4)$$

бунда C ва γ мусбат доимийлар (қ. [4] V боб, 2-масала).

Ташқи магнит майдон бўлмаганда антиферромагнитлар
учун

$$M_a = -M_b = M' \quad (5)$$

(Агар $M_+ \neq -M_-$ бўлса, бундай кристалларни ферромагнетик дейилади). (5) ни (4) га қўйсак,

$$M' \left[1 - \frac{C}{2T} (q_1 - q_2) \right] = -\gamma (q_1 - q_2) M^2 \quad (6)$$

Агар

$$q_1 - q_2 > 0 \quad (7)$$

шарт бажарилса, (6) тенгламадан унинг ҳар икки томонидаги M' нинг олдидаги коэффициентлар манфий ишорали бўлсалар, M' ҳақиқий ечимга эга бўлади, яъни

$$\left[1 - \frac{C}{2T} (q_1 - q_2) \right] < 0$$

шарт бажарилганда M' ҳақиқий қийматлар қабул қилиши мумкин. Бу эса $T < T_N$ шарт бажарилганда содир бўлади; бунда

$$T_N = \frac{C}{2} (q_1 - q_2) \quad (8)$$

Нёел температурасидир.

Изоҳ. $q_1 < q_2$ бўлса, $T < T_N$ да тартибли спинлар ҳолати, яъни антиферромагнетизм бўлмайди.

8.8.5. БРЭГГ — ВИЛЬЯМС УСУЛИ

Статистик физика усули асосида молекуляр майдон моделини қарайлик. Фараз қилайлик, тизимнинг зарралари сони N , спинлари юқорига ва пастга қараган атомлар сони N_+ ҳамда N_- бўлсин ($N = N_+ + N_-$). Агар бу мусбат ва манфий спинлар аралашмасини идеал аралашма деб қаралса, у ҳолда тизимни ҳосил қилувчи конфигурациялар (усуллар) сони

$$W = \frac{N!}{N_+! N_-!} \quad (64)$$

ифода билан аниқланади. Стирлинг формуласи $M! \approx N^N e^{-N}$ дан фойдаланиб, (64) ни

$$W \approx \frac{N^N}{N_+^{N_+} N_-^{N_-}} \quad (65)$$

кўринишда ёзиш мумкин. Бундай тизимнинг энтропияси S ни (65) асосида

$$\begin{aligned} S &= + \ln W = - \left[N_+ \ln \frac{N_+}{N} + N_- \ln \frac{N_-}{N} \right] = \\ &= -N \left[\frac{1}{2} (1+x) \ln \frac{1}{2} (1+x) + \frac{1}{2} (1-x) \ln \frac{1}{2} (1-x) \right] \end{aligned} \quad (66)$$

куринишда ежамиз. Бунда

$$\frac{N_+}{N} = \frac{1}{2}(1+x), \quad \frac{N_-}{N} = \frac{1}{2}(1-x).$$

Кристаллда $\frac{1}{2}ZN$ жуфтли қушни спинлар мавжуд. Булар ичида N_{++} жуфт "++", N_{--} жуфт "--" ва N_{+-} жуфт "+-" типдаги жуфтлар мавжуд. Бу ҳолда ўзаро таъсир энергияси (қ. Изинг модели, (32) ифода)

$$E = + \sum J\sigma_i\sigma_j = -J(N_{++} + N_{--} - N_{+-}). \quad (68)$$

Умуман N_{++} , N_{--} , N_{+-} берилган N_+ ва N_- ларда ҳар хил қийматлар қабул қилиши мумкин. Уларнинг ўртача қийматини қуйидагича аниқлайлик:

$$\begin{cases} \overline{N_{++}} = \frac{1}{2}ZN_+P_+ = \frac{1}{2}ZN_+ \frac{N_+}{N} = \frac{1}{8}ZN(1+x)^2; \\ \overline{N_{+-}} = ZN_+P_- = ZN \frac{N_+}{N} \frac{N_-}{N} = \frac{1}{4}ZN(1-x^2); \\ \overline{N_{--}} = \frac{1}{2}ZN_-P_- = \frac{1}{2}ZN \left(\frac{N_-}{N}\right)^2 = \frac{1}{8}ZN(1-x)^2. \end{cases} \quad (69)$$

$P_+ = \frac{N_+}{N}$, $P_- = \frac{N_-}{N}$ ифодалар кристалл тугунларининг мусбат ёки манфий спин билан банд бўлиш эҳтимолини кўрсатади; $1/2$ коэффицент эса "++" ва "--" ZN_+P_+ ни ҳисоблаганда ҳар бир спин 2 мартадан ҳисоблангани учун 2 га бўлинади. (69) ни (68) га қўйиб (ҳақиқий қийматлар N_{++} , N_{+-} , N_{--} нинг ўрнига уларнинг ўртача қийматларини қўйиб), тўла энергия учун

$$E = -J \left[\frac{ZN}{8} (1+2x+x^2 + 1-2x+x^2 - 2+2x^2) \right] = -\frac{1}{2}ZJNx^2 \quad (70)$$

ифодани оламиз.

(66) ва (70) ни эътиборга олиб эркин энергия F ни аниқлаймиз:

$$F = E - TS = -\frac{1}{2}ZJNx^2 + NkT \left\{ \frac{1}{2}(1+x) \ln \frac{1}{2}(1+x) + \frac{1}{2}(1-x) \ln \frac{1}{2}(1-x) \right\}. \quad (71)$$

Мувозанат ҳолат (энг катта эҳтимолли ҳолат) даги x ни $(\partial F / \partial X) = 0$ шартдан топилади:

$$ZJx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (72)$$

Бундан

$$\beta ZJx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (73)$$

куринишда ёзамиз. Бундан яна

$$e^{2\beta ZJx} = \frac{1+x}{1-x};$$

куринишда ёзиш мумкин. Бундан

$$x = \frac{e^{2\beta ZJx} - 1}{e^{2\beta ZJx} + 1} = th(\beta ZJx),$$

$$x = th(\beta ZJx). \quad (74)$$

Шундай қилиб, Брэгг-Вильямс усули билан олинган бу ифода молекуляр майдон учун олинган (45) ифода билан бир хил.

Хулосалар. Ферромагнетизм, тизимдаги ўзаро таъсир мавжудлиги туфайли, унда маълум тартиблилик бўлишини курсатувчи типик мисоллардандир. Бунда температура пасая боргани сари тартиблилик даражаси кучая боради. Температура нолга тенг бўлганда тартиблилик максимумга эришади. Температура ортиши билан тартиблилик даражаси иссиқлик ҳаракати (тартибсизлик) туфайли камайиб боради ва Кюри температурасидан юқори температурада тартиблилик даражаси нолга тенглашиб тула тартибсизликка (парамагнит ҳолатга) ўтади (8.5-расм). Критик температура T_c дан юқори температурада иссиқлик ҳаракатининг кучлилиги (интенсивлиги) туфайли тизимнинг ўз-ўзини тартибга солиб туриш қобилияти йуқолади. Термодинамика нуқтаи назаридан бу тартиблилик (сақланиш) қобилиятининг йуқотилиши сабабини эркин энергия ифодасидаги энтропия билан боғлиқ ҳад — TS нинг энергия билан боғлиқ ҳад



8.5-расм.

лилик-тартибсизлик ўтишдан иборат.

Паст температураларда кристалл тартибли бўлади. Икки хил атомларнинг тартибли ҳолатида атомлар тартибли жойлашадилар (идеал кристалл панжарачаларидагидай). Бу ҳолда тартиблилик параметри x қуйдагича аниқланади (Умумий ҳолда тартиблилик параметрини танлаш, аниқлаш муҳим масала!).

Абсолют нол температурадаги тартибли икки панжарачалар a ва b ларни қарайлик. Температура нолдан фарқли бўлганда a панжарачадаги атомлар b га ва аксинча b панжарачадаги атомлар a га ўтиши мумкин ва абсолют тартиблилик бузилади. Бу ҳолда A ва B атомларнинг панжарачалардаги тақсимотини қуйдагича тавсифлаш мумкин:

$$\begin{aligned} \left[\frac{A}{a} \right] &= \frac{N}{4} (1+x); \quad \left[\frac{B}{a} \right] = \frac{N}{4} (1-x); \quad \left[\frac{A}{b} \right] = \\ &= \frac{N}{4} (1-x); \quad \left[\frac{B}{b} \right] = \frac{N}{4} (1+x), \end{aligned} \quad (75)$$

$\left[\frac{A}{a} \right]$ — A атомларнинг a панжарачадаги сони; N — панжарадаги тугунлар сони; $N/2$ — панжарачадаги тугунлар сони. $x = 1$ ёки $x = -1$ бўлганда идеал тартиблилик юз беради; $x = 0$ эса тўла тартибсизликка мос келади.

Умуман айтганда, кўп ҳолларда фазавий ўтишларни қандайдир тартибли-тартибсиз ўтишлар деб қараш мумкин. Аммо тизимнинг тартибли ҳолатини тавсифлаш учун қандай параметрни олиш ёки танлаш осон ечиладиган масалалардан эмас.

8.9-§. ДЕБАЙ — ХЮККЕЛЬ НАЗАРИЯСИ

Кулон ўзаро таъсирли зарралардан иборат тизимнинг характерли томони, унинг ўзаро таъсир радиуси катталиги, майдоннинг (кучнинг) узоққа таъсир этувчанлигидир. Бунда майдон потенциали масофа бўйича $1/r$ қонун асосида секин ўзгариб боради. Аммо бундай масалаларни қарашда ҳам ўртача молекуляр майдон тушунчасини киритиш мумкин бўлади.

қуринишда ёзиш мумкин; бунда s — зарранинг сортини курсатади; n_0 — майдон $\varphi = 0$ бўлгандаги s сортли зарралар сони

$$n_s(r) = n_0 \exp[-e_s \varphi(r) / kT] \quad (77)$$

— Больцман тақсимооти; $n_s(r)$ сон T температурадаги, r нуқтадаги s сортли зарралар сони. $\varphi(r)$ потенциал Пуассон тенгламаси асосида аниқланади:

$$\Delta \varphi(\vec{r}) = -4\pi \rho(\vec{r}). \quad (78)$$

(76) ва (78) асосида зарралар сони, $\varphi(r)$ потенциал аниқланиб, сўнг термодинамик параметрлар аниқланилади.

Бу назарияни Дебай ва Хюккель ионли эритмага татбиқ этдилар.

Эритмадаги маълум α сортли ион атрофидаги ўртача потенциал $\Psi(\vec{r})$ ни (76) ва (78) асосида аниқланади:

$$\Delta \Psi(\vec{r}) = -\frac{4\pi}{\epsilon} \sum_i e_i n_{0i} e^{-e_i \Psi(\vec{r}) / kT}. \quad (79)$$

Фараз қилайлик, тизим электрнейтрал бўлсин:

$$\sum_i n_i e_i = 0 \quad (80)$$

ва $e\psi(r) \ll kT$ шарт бажарилсин. Бу ҳолда $\exp(-e\psi/kT)$ ни қаторга ёйиб ва $(e\psi/kT)$ нинг биринчи даражаси билан чекланиб ҳамда (80) ни назарда тутиб, (79) ни қуйидаги қуринишга келтирамиз

$$\Delta \Psi(r) = \chi^2 \Psi(r); \quad \chi^2 = \frac{4\pi}{\epsilon kT} \sum_i n_i e_i^2. \quad (81)$$

$r \rightarrow \infty$ да $\psi(\infty) = 0$ шартни қаноатлантирувчи (81) тенгламанинг счими

$$\psi(r) = A e^{-\chi r} / r \quad (82)$$

ифодадан иборат.

$\chi = 0$ бўлганда, (82) ифодадан нуқтавий электр заряднинг Кулон майдонини оламинз. Эритмада маълум ион атро-

фида бошқа ионларнинг бўлиши (odatda манфий ион атрофида мусбат ионлар ва мусбат ион атрофида манфий ионлар тулланиши) шу ионнинг майдонини "экранлайди". Бу омилни $\psi(r)$ нинг ифодасида e^{-r/r_D} нинг мавжудлиги кўрсатади. Потенциал (82) ни

$$\Psi(r) = A \frac{e^{-r/r_D}}{r} \quad (83)$$

кўринишда ёзамиз, бунда

$$r_D = 1/\chi. \quad (84)$$

Кулон майдонининг экранланишини характерловчи бу радиус r_D ни Дебай-Хюккель радиуси дейилади (У 1923 йилда электролитлар назарияси ишланганда киритилган).

8.3-масала. Тизимда мусбат зарядлар ва манфий зарядлар (электронлар) n_0 текис тақсимланган бўлсин. Тизимнинг маълум нуқтасига Ze заряд киритилса, зарядларнинг фазо бўйича тақсимланиши ўзгаради. (Буни биз плазмада флуктуация туфайли заряд тулланиши деб талқин этишимиз мумкин). Электронлар тақсимотини қуйидаги икки ҳолда аниқланг: 1) Температура жуда юқори ва электронлар айнинаман, 2) Температура ОК га тенг, электронлар тула айниган.

Изоҳ. Масалани чизикли яқинлашувда ҳал этилсин.

Ечиш. Нуқтавий Ze заряд киритилган нуқтани координата боши деб қабул қилайлик. Бу заряд киритилиши туфайли ҳосил бўлган электростатик майдон ва зарраларнинг тақсимооти, масаланинг шартига асосан, сферик симметрик характерга эга бўлади.

Мусбат зарядлар en_0 билан ва манфий зарядлар (электронлар) $-|e|n$ билан аниқлансин. Электростатик майдон $\varphi(r)$ Пуассон тенгламасидан аниқланади:

$$\Delta \varphi(r) = \frac{4\pi e}{\epsilon} (n_- - n_+) \quad (1)$$

ва майдон $\varphi(r)$

$$\begin{aligned} \varphi(r) &= \frac{Ze}{r}, \quad r \rightarrow 0, \\ \varphi(r) &= 0, \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

чегаравий шартларни қаноатлантиради.

1. Масаланин шартини асосан

$$n_1 = n_0 e^{\frac{e\varphi(r)}{kT}}, \quad n_2 = n_0 e^{\frac{Ze\varphi(r)}{kT}}$$

Бунда $\varphi = 0$ да мусбат ва манфий зарралар сони n_0 . Бу ҳолда (1) тенглама

$$\Delta\varphi(r) = \frac{4\pi e}{\varepsilon} \left(e^{\frac{e\varphi}{kT}} - e^{\frac{Ze\varphi}{kT}} \right) n_0 \quad (2)$$

қурилишга келади. Бу ночизиқли тенгламани, $Ze\varphi \ll kT$ шарт бажарилади деб, чизиқли ҳолга келтирамыз:

$$\Delta\varphi(r) = \frac{4\pi e}{\varepsilon} [1 + Z] \frac{e\varphi}{kT} n_0 \quad (3)$$

ёки

$$\Delta\varphi(r) = \chi^2 \varphi(r), \quad (4)$$

$$\chi^2 = \frac{4\pi e^2 n_0}{\varepsilon kT} (1 + Z). \quad (5)$$

(4) нинг ечими

$$\varphi(r) = A \frac{e^{-r/r_D}}{r} \quad (6)$$

$$r_D = 1/\chi \quad (7)$$

эканлигини биламыз. Масала шартидан $\varphi(0) \sim \frac{A}{r} = \frac{Ze}{r}$ ва де-мак

$$\varphi(r) = \frac{Ze}{r} e^{-r/r_D} \quad (8)$$

ифодани оламыз. (1) ва (4) тенгликлардан

$$\frac{4\pi e}{\varepsilon} (n_- - n_+) = \chi^2 \varphi$$

ифодани оламыз. Бундан эса электронлар тақсимотини то-памиз

$$n_e(r) = n_+ + \frac{\chi^2 \varepsilon Z}{4\pi r} e^{-r/r_D}. \quad (9)$$

2. Электронлар тўла айниган, яъни ҳар бир ҳолатда бит-тадан ($T = 0$ К да) жойлашгани учун электрон ҳолатлари сони электронлар сонига тенг бўлади.

Бу ҳолатлар сони фазавий фазони h^3 га бўлиш орқали топилади. Бунда бирлик ҳажмдаги ҳолатлар сони

$$n(r) = 2 \cdot \frac{4\pi}{3h^3} p^3(r). \quad (10)$$

энергияси) доимийдир, яъни,

$$\frac{1}{2m} p^2(r) - e\varphi = \frac{1}{2m} p^2(\infty). \quad (11)$$

$n(\infty)$ даги қийматни n_0 деб қабул қиламиз. У ҳолда (10) дан

$$n_0 = \frac{8\pi}{3h^3} p_-^3; \quad P_- = \frac{h}{2} \left(\frac{3n_0}{\pi} \right)^{1/3}. \quad (12)$$

(11) дан

$$p(r) = [p_-^2 + 2me\varphi]^{1/2} \quad (13)$$

(13) ни (10) га қўйсак,

$$n(r) = \frac{8\pi}{3h^3} [p_-^2 + 2me\varphi(r)]^{3/2} = \frac{8\pi}{3h^3} p_-^3 \left[1 + \frac{2me\varphi(r)}{p_-^2} \right]^{3/2} \quad (14)$$

Фараз қилайлик.

$$\frac{2me\varphi(r)}{p_-^2} \ll 1. \quad (15)$$

(15) шарт бажарилганда (14) да ўнг томонни қаторга ёй-сак,

$$n(r) = \frac{8\pi}{3h^3} p_-^3 \left[1 + \frac{3}{2} \frac{2me}{p_-^2} \varphi(r) + \dots \right] = n_0 \left(1 + \frac{3me}{p_-^2} \varphi(r) \right); \quad (16)$$

$$n(r) = n_0 + \frac{4\pi me}{h^3} \left(\frac{3n_0}{\pi} \right)^{1/3} \varphi(r). \quad (17)$$

(17) ни (1) га қўйсак ва $n_- - n_+ = n(r) - n_0$ эканлигини эътиборга олсак,


$$\Delta\varphi = \frac{(4\pi e)^2 m}{h^2 \epsilon} \left(\frac{3n_0}{\pi} \right)^{1/3} \varphi(r) = \chi_\phi^2 \varphi(r) \quad (18)$$

$$\chi_\phi^2 = \left(\frac{4\pi e}{h} \right)^2 \left(\frac{3n}{\pi} \right)^{1/3} \frac{m}{\epsilon}; \quad r_\phi = 1/\chi_\phi. \quad (19)$$

(18) тенгламадаги $\varphi(r) = \frac{Ze}{r} e^{-r/r}$ нинг қийматини (17) га қўйиб, электронлар тақсимои $n(r)$ ни топамиз:

$$n(r) = n_0 + \frac{\epsilon Z \chi_\phi^2}{4\pi} \frac{e^{-r/r}}{r}. \quad (20)$$

тантаси дейилади; $1/\chi$ ни эса Дебай пардалаш радиуси дейилади; $1/\chi_{\phi}$ — Ферми-Томас пардалаш доимийси; $1/\chi_{\phi} = r_{\phi}$ — Ферми-Томас пардалаш радиуси.



8.6-расм.

8.4-масала. $\vec{E}$ кучланишли ташқи электр майдондаги электр дипол $\vec{p}$ нинг ўртача энергияси $\bar{U}$ ни аниқланг.

Ечиш. Ташқи электр майдондаги диполнинг потенциал энергияси $U = -PE \cos(\vec{P}, \vec{E}) = -PE \cos \theta$ (8.6-расмга қ.).

Иссиқлик ҳаракати туфайли $\vec{p}$ векторнинг йўналишлари ўзгариб туради. Бу ўзгариш туфайли фазодаги $\vec{p}$ векторнинг йўналишлари тақсимооти Больцман функцияси асосида аниқланади. Больцман тақсимотига асосан $d\Omega$ фазовий бурчак остидаги $\vec{p}$ векторнинг бўлиш эҳтимоли

$$dW = \text{conste}^{-\frac{U}{kT}} d\Omega = \text{conste}^{-\alpha \cos \theta} d\Omega \quad (1)$$

билан аниқланади; бунда $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$, $\alpha = \frac{PE}{kT}$ белгилаш киритилди.

(1) асосида энергия $U = -PE \cos \theta$ нинг ўртача қийматини топайлик:

$$\bar{U} = -\alpha kT \frac{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \cos \theta e^{-\alpha \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} e^{-\alpha \cos \theta} \sin \theta d\theta} = -\alpha kT \frac{\int_0^{\pi} \cos \theta e^{-\alpha \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^{\pi} e^{-\alpha \cos \theta} \sin \theta d\theta}.$$

Ўзгарувчини алмаштирайлик, $a \cos \theta = x$; u ҳолда

$$\begin{aligned} \bar{U} &= -kT \frac{\int_{-a}^a x e^x dx}{\int_{-a}^a e^x dx} = -kT \frac{-ae^{-a} - ae^a - a(e^{-a} - e^a)}{e^{-a} - e^a} = \\ &= -kT \left[a \frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} - 1 \right] = kT [1 - a \text{ctha}] = -akT \left[\text{ctha} - \frac{1}{a} \right] = \\ &= -akTL(a) = -PEL(a); \quad L(a) = \text{ctha} - \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

ФОНДАЛАНИЛГАН АДАБИЕТ

1. *Боголюбов Н. Н.* Проблемы динамической теории в статистической физике, М—Л., 1946.
2. *Пригожин И.* Неравновесная статистическая механика, "Мир", М. 1964.
3. *Гиббс Дж. В.* Основные принципы статистической механики. М—Л, 1946.
4. *Кубо Р.* Статистическая механика, "Мир", М., 1967.
5. *Зубарев Д. Н.* Неравновесная статистическая термодинамика "Наука", М. 1971.
6. Задачи по термодинамике и статистической физике; под ред. Ландсберга П., "Мир", М. 1974.
7. *Айзеншиц Р.* Статистическая теория необратимых процессов ИЛ, М. 1963.
8. *Винер Р.* Кибернетика или управление и связь в животном и машине. "Сов. радио", М. 1958.
9. *Левич В. Г.* Введение в статистическую физику. ГТ Из-во., М. 1954.
10. *Компанеев А. С.* Теоретическая физика. Гос. тех. Из-во, М. 1957.
11. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Статистическая физика, М. 1964.
12. *Хуанг К.* Статистическая механика, "Мир", М. 1966.
13. *Микрюков В.* Курс термодинамики, Мин. прос. М. 1956.
14. *Базаров И. П.* Курс термодинамики. М. 1961
15. *Феллер В.* Введение в теорию вероятностей и ее приложения. ТТ. 1, 2; "Мир", М. 1984.
16. *Майер Дж., Генперт-Майер М.* Статистическая механика, ИЛ, 1952.

2.2. Статистик физиканинг асосий тушунчалари

ва таърифлари

Кириш	5
1.1-§. Тизим ва унинг ҳолати	6
1.2-§. Қайтар ва қайтмас жараёнлар	8
1.3-§. Тизимнинг динамик микроскопик ҳолатлари	10
1.4-§. Тизимнинг динамик параметри ва унинг қийматлари	11
1.5-§. Динамик катталикларни вақт бўйича ўртачалаш	12
1.6-§. Статистик микроҳолат. Статистик ансамбль	14
1.7-§. Микроҳолатлар бўйича ўртачалаш	17
1.8-§. Микроҳолатлар ва уларнинг эҳтимолликлари	19
1.9-§. Микроҳолатлар эҳтимолликлари тақсимооти	20
1.10-§. Энтропия	24
1.11-§. Энтропиянинг ҳоссалари	28
Мисоллар ва масалалар	34
II боб. Эҳтимолликлар назариясидан маълумот	46
2.1-§. Кириш. Асосий тушунчалар	46
2.2-§. Дискрет тақсимоотлар	51
2.3-§. Узлуксиз тақсимоот функциялари	56
III боб. Мувозанатдаги тизим микроҳолатлари тақсимооти	62
3.1-§. Кириш.	62
3.2-§. Яқкаланган тизим. Микроканоник тақсимоот	65
3.3-§. Берк тизим. Каноник тақсимоот	67
3.4-§. Очiq тизим. Катта каноник тақсимоот	73
3.5-§. Берк тизим энергияси қийматларининг тақсимооти	79
3.6-§. Гамма — тақсимоотга оид мисоллар	82
3.7-§. Статистик энтропия ва каноник тақсимоот	87
3.8-§. Статистик энтропия. Микроканоник тақсимоот	90
3.9-§. Статистик интеграл. Ҳолатлар зичлиги	94
3.10-§. Максвеллнинг тақсимоот қонуни	99
3.11-§. Чизиқли гармоник осциллятор координатаси ва импульси қийматлари эҳтимолликлари тақсимооти	109
3.12-§. Умумлашган координата ва умумлашган импульс квадратик флукутуациялари орасидаги муносабат	115
IV боб. Термодинамик муносабатлар	117
4.1-§. Статистик термодинамиканинг асосий муносабати	117
4.2-§. Термодинамиканинг биринчи қонуни	119
4.3-§. Иссиқлик сигими	123
4.4-§. Ҳолат тенгламалари	125
4.5-§. Политропик жараёнлар ва уларнинг тенгламалари	131
4.6-§. Товушнинг тарқалиш тезлиги	142
4.7-§. Энтропия. Термодинамиканинг иккинчи қонуни	159
4.8-§. Сакур-Тетрод тенгламаси. Гиббс парадокси	169
4.9-§. Больцман формуласи	173

4.12-§. Ҳаёт температураларни олтиш устуни	187
4.14 §. Ҳернст исоремаси. Термодинамиканинг устуни қонуни	197
V боб. Фазалар мувозанати ва фазавий ўтишлар	207
5.1-§. Термодинамик мувозанат шартлари	207
5.2-§. Гомоген тизимнинг мувозанат шarti	211
5.3-§. Гетероген тизимнинг мувозанат шarti. Фазалар қондаси	214
5.4-§. Икки фазанинг мувозанати. Учланма нуқта	217
5.5-§. Фазавий ўтишлар	218
5.6-§. Биринчи тур фазавий ўтиш. Клапейрон-Клаузиус тенгламаси	220
5.7-§. Критик ҳолат	221
5.8-§. Янги фазанинг пайдо бўлиши	230
5.9-§. Иккинчи тур фазавий ўтишлар	232
VI боб. Классик статистика. Идеал газ	234
6.1-§. Кириш	234
6.2-§. Классик статистика	237
6.3-§. Классик тизимда энергиянинг эркинлик даражалари бўйича тенг тақсимланиши	238
6.4-§. Максвелл тақсимот қонуни ва унинг татбиқи	242
6.5-§. Максвелл-Больцман тақсимот қонуни	276
6.6-§. Газ зарраларининг куч майдонидаги тақсимоти. Барометрик формула	278
6.7-§. Идеал газ статистик интеграл	279
6.8-§. Молекулаларнинг тўқнашишлари сони	283
6.9-§. Квант осциллятор	286
6.10-§. Квант ротатор	289
6.11-§. Идеал газларнинг иссиқлик сифими	290
VII боб.	296
7.1-§. Кириш	296
7.2-§. Жуфт ўзаро таъсир потенциал	298
7.3-§. Жуфт корреляция ва унинг тенгламаси	299
7.4-§. Конфигурацион интеграл	302
7.5-§. Кўп заррали тақсимот функцияси	311
7.6-§. Конфигурацион интегрални гуруҳларга ажратиш	313
VIII боб. Кучли ўзаро таъсирли тизимлар	323
8.1-§. Кириш	323
8.2-§. Парамагнетизмнинг Ланжевен назарияси	323
8.3-§. Парамагнетизмнинг Бриллюэн назарияси	326
8.4-§. Ўзаро мувофиқлашган молекуляр майдон	329
8.5-§. Изинг модели	329
8.6-§. Гейзенберг модели	333
8.7-§. Антиферромагнетизм	338
8.8-§. Брегг-Вильямс усули	341
8.9-§. Дебай-Хюккель назарияси	344